электронное периодическое издание

ЭКОНОМИКА и социум

ISSN 2225-1545

№2(141)-2026



ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

iupr.ru

ISSN 2225-1545
УДК 004.02:004.5:004.9
Регистрационный номер
средства массовой коммуникации
ББК 73+65.9+60.5
Эл № ФС77 - 80454 от 01 марта 2021г.

Журнал включен в систему НЭБ (e-library) № 594-09/2013 от 26.09.2013

Тематика журнала: актуальные вопросы современной экономики и социологии - от теоретических и экспериментальных исследований до непосредственных результатов управленческой и производственной деятельности. Публикации в журнале учитываются как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых степеней России и зарубежья.

РАЗДЕЛЫ НОМЕРА:
- Основной раздел: социально-экономические аспекты развития современного государства;
- Современные технологии управления организацией;
- Актуальные вопросы политики и права;
- Современные науки и образование;
- Информационные и коммуникативные технологии;
- Здравоохранение в обществе.

Выпуск №2(141)-1 (февраль, 2026). Сайт: http://www.iupr.ru

© Институт управления и социально-экономического развития, 2026

Редакционный совет:
Абдувалиев А.А., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Абдуллаев А.Г., доктор философии (PhD) по географическим наукам,
Абдуллаев С.И., кандидат географических наук, доцент,
Абдуллаева Х.Р., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), профессор,
Абдулхаликова Н.Р., кандидат физико-математических наук, доцент,
Абдуллаев А.К., доктор педагогическим наук (DSc), доцент,
Абдуллаев У.М., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Абдухамидов И.А., доктор философии (PhD) по историческим наукам,
Абдурахманов И.А., доктор сельскохозяйственных наук,
Абдурахимова А.Р., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
Абидов А.А., кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор,
Азизова Ф. С., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Айнакулов М.А., кандидат экономических наук, профессор,
Аймуратов У.Д., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD),
Алланов К.А., кандидат географических наук, доцент,
Алимов Ш.К., доктор исторических наук,
Аминов Б.У., кандидат исторических наук, доцент,
Арзикулов З.О., кандидат физико-математических наук (PhD),
Арипов М.М., кандидат технических наук, доцент,
Арифходжаева И.Х., кандидат психологический наук,
Аскаров И.Б., доктор педагогических наук (DSc), профессор,
Ахатов Х.Н., PhD физико-математических наук,
Ахмеджонов Д.Г., доктор технических наук, профессор,
Ахмедов А., кандидат физико-математических наук,
Ахмедов А.М., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Ахмедов Ж.Д., кандидат технических наук, доцент,
Ахмедов А.У., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Байзаков Ж.А., доктор философии по филологическим наукам,
Балтаева И. Т., доктор филологических наук, профессор,
Балташев Ж.М., доктор экономических наук (PhD),
Бахриддинов В.А., доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент,
Бобоназарова Г.Т., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Бозарова Ф.Г., доктор философских наук, доцент,
Ганиева Г.И., доктор философии биологическим наукам (PhD),
Гапаров К.Г., доктор философии по техническим наукам,
Гафуров А.М., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Гилижова А.М., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), профессор,
Гопиров М.О., доктор философии по географическим наукам (PhD), доцент,

Гулимматов И.Б., доктор философии по географии (PhD),
Данабаев А.Б., кандидат сельскохозяйственных наук,
Екабсонс А.В., доктор философии по филологическим наукам (PhD), доцент,
Ергашев А.Х., доктор философии по филологическим наукам (PhD),
Жабборов Т.К., кандидат технических наук, доцент,
Жураев В.М., доктор философии по психологическим наукам (PhD), доцент,
Жураев С.А., доктор политических наук, профессор,
Жураев М.М., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор,
Ибайдуллаев Т. Г., доктор философии (PhD), доцент,
Ибрагимов А.А., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Икрамова М.Х., доктор философии по педагогическим наукам (PhD)
Икромов М.-А. Х., доктор философии по педагогическим наукам,
Исакова Г.Н., доктор филологических наук (DSc), доцент,
Исакова З.Р., доктор философских наук (DSc), профессор,
Исламов У.Р., кандидат сельскохозяйственных наук,
Исмаилова Н.Я., доктор философии экономических наук (PhD), доцент,
Ишанкулов З.М., доктор философии по сельскохозяйственным наукам, доцент,
Калабаев С.Б., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Қаландаров У. С., доктор философии (PhD) по географическим наукам,
Калимбетов Х.К., доктор экономических наук, доцент,
Камалов А.Ф. - Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Камолов Б.Б., доктор философии по медицинским наукам (PhD), доцент,
Каниязова Ж.О., доктор филологических наук (DSc), доцент,
Касимов Н.К., кандидат филологических наук, профессор,
Киргизбаев Ф.Д., : доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам,
Кобилов А.У., кандидат экономических наук, доцент,
Кодиров Р.Н., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD), доцент,
Кораев С.Б., доктор педагогических наук (DSc), профессор,
Кочкаров Б.У., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Косимов А.А., доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам, доцент,
Кузибоев Ш.Ш., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Кукиев Б.Б., доктор философии по педагогическим наукам, доцент,
Кулматов К. А.,доктор философии по техническим наукам (PhD),
Курбонов П.Р., кандидат географических наук, доцент,
Латипов Н., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Мадаминов З.Х., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Маллаев Р.К., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Маматов Х.А., доктор философии по техническим наукам,

Мамашарипов А.А., доктор философии по техническим наукам,
Маматов Ш.К., кандидат физико-математика наук,
Маматов Х.А., доктор философии по техническим наукам,
Марасулова З.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Марданова Г.Д., доктор философии по биологическим наукам (PhD),
Махаммаджонов Т.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Махмудов О.Х., доктор экономических наук, профессор,
Матчанов М.Ж., доктор географических наук, доцент,
Махсудов О.М., доктор философии по медицинским наукам (PhD),
Мамаражабов О.Э., Доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Машарипов Ф.Т., доктор педагогических наук (DSc), профессор,
Машрапов А. Т., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
Мелибоева Ф.С., доктор философии по географически наукам (PhD),
Мирзаев Н.Н., кандидат технических наук,
Мирзаев С.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Мирзажанов М.А., кандидат технических наук, доцент,
Муминов У.М., доктор философии по техническим наукам, доцент,
Муминов О.А., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Мусаев Б.Б., доктор педагогических наук (DSc), профессор,
Мусашайхов Х.Т., доктор медицинских наук, профессор,
Мусашайхов У.Х., доктор медицинских наук,
Мухаммадиева О.М., кандидат философских наук, доцент,
Матякубов К.К., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Наджмитдинов О.Б., доктор медицинских наук (DSc),
Наджмитдинова Д.А., доктор философии по медицинским наукам (PhD),
Назаров А.А., доктор технических наук, профессор,
Нарбашева М.А., кандидат психологических наук, профессор,
Нигматов У.Ж., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Норкузиева Д.Ш., доктор философии по психологическим наукам (PhD),
Нуридинов Т.К., доктор философии по историческим наукам (PhD), доцент,
Нуриев К.К., доктор технических наук, профессор,
Олимов Ж.Б., доктор философии по историческим наукам (PhD),
Олимова А.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Омонов М.И., доктор биологических наук, доцент, профессор,
Омонтурдиев А.М., доктор философии по географии (PhD),
Отажонов О.А., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Охунжонов З.Н., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Очилова Х.М. - доктор философии по педагогическим наукам. доцент,
Постюшков А.В., доктор экономических наук, профессор,

Ражабова И.Т., доктор философии по филологическим наукам (PhD),
Расулова Г.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Рафиков В.А., кандидат технических наук, доктор географических наук, профессор,
Рахимов С.М., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Рахимов И.А., доктор философии (PhD) по политическим наукам,
Рахимов А.Д., доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам, доцент,
Рахматов О., доктор технических наук, профессор,
Рахматов Ф.О., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Рахмонов Х.Т., доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент,
Рустамова М.М., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Сабитов А.У., кандидат технических наук,
Саидусманов Б.А., доктор философии по историческим наукам
Сайёра А.З., кандидат технических наук, доцент,
Салиева Д.А., кандидат психологических наук, профессор,
Салимжонов Ж.Х., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Саттаров А.У., кандидат географических наук, доцент,
Саттаров О.Х., доктор философии по медицинским наукам (PhD),
Сиддиков И.М., кандидат технических наук, доцент,
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор,
Собирова Л.Х., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Султанов Х.Э.. доктор философии по педагогическим наукам (PhD), профессор,
Султанова С.М., кандидат экономических наук, PhD, профессор,
Тангирова Н.Х., доктор философии по биологическим наукам (PhD),
Тешабаев Ш.А., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD), доцент,
Тилакова М.А., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Тожибоев Ш.И., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Тохиров И.Х., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Тошхонов Л.Т., доктор философии (PhD) по филологическим наукам,
Туланова Н.М., кандидат филологических наук,
Тураева Н.О., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Тургунова Г.Б., доктор философии сельскохозяйственных наук,
Турдиалиева М.М., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Турдикулов Т.Т., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Турдикулов О.Т., кандидат исторических наук,
Турматов Д.Р., доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент,
Тягунова Л.А., кандидат философских наук, доцент,
Узакбаев К.К., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Умаров Б. С., доктор философии по химическим наукам (PhD),

Умаров О.С., кандидат экономических наук, доцент,
Умарова Г.А., доктор педагогических наук, профессор,
Умирзаков З.А., доктор философии (PhD) по техническим наукам,
Уразматов Н.Н., доктор философии по сельскохозяйственным наукм (PhD),
Уралов Р.А., кандидат биологических наук,
Усманова Д.Д., доктор медицинский наук, доцент,
Усманова М.Н., кандидат экономических наук, профессор,
Файзиев Э.А., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Файзиев Н.А. - Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент,
Фазилов Ф.М., доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент,
Федорова Ю.В., доктор экономических наук, профессор,
Фозилов А.С., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Хакимов А.М., кандидат технических наук, доцент,
Хакимова Ё.Т., доктор философии по педагогическим наукам,
Хамдамова Х.Ш., доктор филологических наук(PhD),
Хаметов З.М., доктор технических наук (DSc), доцент,
Хамидов Д.А., доктор философии по медицинским наукам (PhD), доцент,
Хасанов Ж.Ю., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Хатамов Р.И., доктор философии (PhD) по сельскохозяйственным наукам,
Хидирова Б.И., доктор философии по экономическим наукам (PhD),
Хидоятова З.Ш., кандидат биологических наук,
Холдаров М.М., кандидат медицинских наук,
Холдарова Д.Э.,д октор философии в области сельскохозяйственных наук. (PhD), доцент,
Холмурзаев А.А., кандидат технических наук, доцент,
Холмуродов А.Ш., доктор педагогических наук (DSc), доцент,
Хомидов И.И., кандидат химических наук, доцент,
Хурматов Й.Э., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
Хусанбоев А. М., кандидат технических наук, доцент,
Хусанов Ю.Ю., доктор технических наук, доцент,
Чориев С.Х., доктор философии по биологическим наукам (PhD),
Шамуратова Г.М., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
Шарипов А.Э., доктор философии по биологическим наукам (PhD),
Шерипбаев Н.С., доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD),
Ширинов Ф.Ш., доктор философии в педагогических науках (PhD), доцент,
Эргашев И.О., доктор философии по техническим наукам (PhD),
Эсанов Н.А., доктор философии по географическим наукам (PhD),
Эсанова Ш.М., доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент,
Эшонкулов Д.Т., кандидат экономических наук,

Юнусов З.М., доктор философии по военным наукам (PhD), доцент,
Юсупов А.Р., кандидат технических наук,
Якубова М.Ю., доктор философии по педагогическим наукам (PhD),
Ярашев К.С., доктор географических наук (DSc), доцент.

Отв. ред. А.А. Зарайский
Главный редактор: Тягунова Людмила Анатольевна, кандидат философских наук

Abdug'aniyeva Y.A.
assistant
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

THE EFFECT OF TREATING SEEDS OF "AVMU" MUNG BEAN VARIETIES WITH "FITOVAK" IMMUNOSTIMULANTS ON THE LEAF SURFACE

Annotation: *This study investigates the effect of seed treatment with the immunostimulant "Fitovak" on the leaf surface characteristics of "AVMU" mung bean varieties. The primary objective was to determine how "Fitovak" influences leaf morphology, surface properties, and potential resistance to environmental stresses. "AVMU" mung bean seeds were treated with a standardized dose of "Fitovak" prior to sowing, and plants were cultivated under controlled field conditions. Leaf samples were collected at key growth stages to assess changes in surface parameters, including leaf area, thickness of the cuticle, trichome density, and surface wettability.*

Key words: *Mung bean, AVMU varieties, "Fitovak" immunostimulant, seed treatment, leaf surface morphology, cuticle thickness, trichome density, plant immunity, stress resistance, growth stimulation.*

The leaves of the mung bean plant are three-lobed, covered with small dark yellow hairs, and the leaf blade is large and long. Its hairs are mainly found in abundance on the leaf blade and on the back of the leaf. The leaves of this plant are similar in appearance to the leaves of beans. If the soil and climatic conditions are favorable during the cultivation of mung bean, the plant has a large leaf surface. However, the number of leaflets and the increase or decrease in leaf surface may vary depending on the cultivation technology. [1; 24 b.]

The leaf is the organ of plants that can carry out photosynthesis, and its large or small surface area increases or decreases the efficiency of photosynthesis. It also carries out transpiration and the biosynthesis of several organic compounds, including the synthesis of phytohormones (auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin). [3;317 b].

According to A.V. Nichiprovich, in order to regulate the process of photosynthesis in plants, it is necessary to ensure the rapid growth of their leaf system in the early stages. Therefore, it is necessary to create conditions that ensure the growth of early-ripening varieties of plants or leaf plates, for which there must be sufficient light, heat, moisture, carbon dioxide, oxygen, and nutrients. Only then will the productivity of photosynthesis increase by two times. [4;55-58-b].

According to the research of Abdullayev.Kha.A., Karimov.Kh.Kh., the surface area of a plant leaf directly depends on its type, variety, the quality of agrotechnical measures carried out on it, the thickness of the seedling, the timing of

the use of stimulants in different rates and periods, and affects the change in the amount of photosynthesis productivity [5;125-127-b]. Therefore, achieving an optimal level of leaf surface allows you to get high yields from plants. [3;317 b].

The assimilation surface area of the leaves is important for the growth, development and yield of plants [6;335 b]. The yield of crops is closely related to the leaf surface area, and it has been stated that to obtain high-quality yields from crops, a leaf surface area of 40-65 thousand cm2/ha is required, depending on the type of crop [7;21-22-b]. Based on the above data, in order to determine the effect of seed treatment with the immunostimulant “Fitovak” during different vegetation periods of the “AVMU” mung bean variety and its leaf feeding during the growth and fruiting period on the leaf surface, dry matter accumulation and photosynthetic productivity, samples were taken and analyzed according to the variants during the trifoliate, flowering and podding periods of the plant. The scientific data obtained as a result of the study show that, depending on the timing of application of the immunostimulant "Fitovak", an increase in the number of leaves per plant per area is observed. The increase in plant biomass and the accumulation and formation of crop elements coincide with the flowering and fruiting phases of the plant. Recognizing that photosynthesis occurs in the leaves of plants, in our studies, the leaf surface was determined depending on the timing of application of the drug "Fitovak" in the initial (three-petal) period of plant vegetation; in the intermediate (flowering phases) and final (budding) phases. The results showed that the leaf surface changed differently in all variants. When mung bean seeds are treated with stimulants before sowing, it not only accelerates their germination, but also improves metabolism in the early stages of plant development, increases enzyme activity, and as a result, has a positive effect on increasing biomass and yield. [8;58 b].

Optimal use of the "Fitovak" immunostimulant in foliar treatment of plants stimulates growth and enhances plant development and photosynthesis. (1- table).

According to the results of the study, in the three-leaf stage of mung bean, according to the experimental system, the leaf area from the first to the fifteenth variant recorded results in the range of 8.2 - 8.5 m2. Also, in the “AVMU” mung bean varieties treated with the “Fitovak” preparation, the leaf area recorded results in the following experimental system: 9.3; 9.4; 9.0; 9.2; 10.1; 9.7; 9.5; 8.9; 9.5; 9.0; 10.6; 9.2; 9.6; 9.4 and 9.5 m2. When comparing the varieties that showed the highest results in the experimental and control variants during the leaf stage, the greatest increase was observed in AVMU 2001 and was found to be more than +1.0 m² compared to the control.

According to the results of the study conducted in the flowering phenophase, the most positive result was 24.8; 21.9 and 21.2 m2 in the control, and 26.8; 23.2 and 22.4 m2 in the variants treated with the drug "Fitovak". Among the 15 varieties of "AVMU", the lowest result was observed in the AVMU 1683 variety - 19.2 in the control; 20.1 m2 in the experimental variant.

When analyses were conducted at the end of the growing season of mung beans, the highest result among the "AVMU" varieties treated with the "Fitovak"

immunostimulant was observed in the 2001 variety, and it was found that during the podding period, this variety was +3.4 m2 higher than the control variant.

Also, the large leaf area in mung beans causes the photosynthesis process to accelerate in the plant. As a result, the plant synthesizes more organic matter, leading to an increase in yield.

In conclusion, the productivity of plants is formed at the expense of organic substances formed as a result of photosynthesis. The degree of development of the leaf surface in a mung bean plant depends on the nutritional area. The "Tetyakov" method was used to determine the leaf surface. It was calculated using graph paper and mathematically analyzed. According to the results of the study conducted during different vegetation periods, the highest result of the leaf surface in the control variant was 36.8 m2 during the podding period, while in the plant treated with the stimulant, this result was 40.2 m2. According to the results, it was found that the varieties treated with the "Fitovak" immunostimulant had a wider leaf surface compared to the control.

Table 1

Effect of the "Fitovak" immunostimulant on the "AVMU" mung bean variety on the leaf surface

№	Mash varieties	Leaf surface area per plant, m2					
		Control			Experience		
		Authenticity	Flowering	Beaning	Authenticity	Flowering	Beaning
1.	AVMU 1676	8,2	19,5	28,5	9,3	21,2	32,1
2.	AVMU 1677	8,7	20,0	30,4	9,4	21,6	32,8
3.	AVMU 1678	8,0	19,4	28,0	9,0	20,6	31,0
4.	AVMU 1679	8,1	19,5	28,7	9,2	20,9	31,6
5.	AVMU 1680	9,2	21,9	35,2	10,1	23,2	37,8
6.	AVMU 1681	8,8	21,2	31,4	9,7	22,4	36,6
7.	AVMU 1682	8,6	19,8	29,5	9,5	21,9	33,5

8.	**AVMU 1683**	7,9	19,2	27,5	8,9	20,1	30,3
9.	**AVMU 1684**	8,1	19,9	29,7	9,5	21,8	33,0
10.	**AVMU 1685**	8,0	19,3	28,1	9.0	20,5	30,7
11.	**AVMU 2001**	9,6	24,8	36,8	10,6	26,8	40,2
12.	**AVMU 2002**	8,3	19,6	29,0	9,2	21,0	31,9
13.	**AVMU 2003**	9.0	21,0	30,9	9,6	22,3	34,8
14.	**AVMU 2004**	8,5	19,8	29,4	9,4	20,5	31,2
15.	**AVMU 2005**	8,5	19,5	28,6	9,5	22,0	31,5

Conclusion

The study shows that seed treatment of *AVMU* mung bean varieties with the immunostimulant *Fitovak* positively affects leaf surface characteristics. Treated plants exhibited improved leaf structure, which may enhance resistance to environmental stresses and strengthen natural defense mechanisms. These results indicate that *Fitovak* seed treatment can be an effective practice for improving plant adaptability and health.

REFERENCES

1. 1. The importance of mung bean and sesame from legumes and oilseed crops in the soil-climatic conditions of the Bukhara region, agrotechnologies of cultivation. Recommendations. "Durdona" publishing house. 2017.B.35.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.-М: Колос, 1985.- Б.317.
3. Delgado-Salinas A, Bonet A, Gepts P. The wild relative of Phaseolus vulgaris in Middle America. In: Gepts P, editor. Genetic Resources of Phaseolus Beans. Boston: Kluwer; 2008. P. 55–58.
4. Бахромов С, Бахромов Ш. Пахта ҳосилдорлигига такрорий экинларнинг таъсири. Дехқончилик тизимида зироатлардан мўл ҳосил етиштиришнинг манба ва сув тежовчи технологиялари мавзусидаги илмий-амалий конференция маърузалари тўплами. Тошкент. 2010.Б.125-127.
5. Мавлонов А, Хамзаев А., Бобоқулов З. Дуккакли дон экинларининг тупроқ унумдорлигини оширишдаги аҳамияти.// Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2009 №8.Б. 36.

Abduraximov A.D.
Baliqchilik Ilmiy Tadqiqot Instituti Akvakulturada yangi texnologiyalar laboratoriyasi mudiri

YOPIQ SUV TA'MINOTI QURILMASI (YSTQ) ASOSIDA BALIQ YETISHTIRISHNING ZAMONAVIY AHAMIYATI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yopiq suv ta'minoti qurilmasi (YSTQ) asosida baliq yetishtirish texnologiyasining zamonaviy akvakulturadagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda YSTQ tizimining ishlash prinsipi, suvni tejashdagi ustunliklari, yuqori zichlikda baliq yetishtirish imkoniyatlari hamda ekologik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyani qo'llash imkoniyatlari, mos baliq turlari va mavjud muammolar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari yopiq tizimlarning suv resurslari cheklangan hududlarda samarali va istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *Yopiq suv ta'minoti qurilmasi, YSTQ (RAS), akvakultura, baliq yetishtirish, suvni tejash, biofiltr, Afrika laqasi, forel, oziq-ovqat xavfsizligi.*

Abdurakhimov A. D.
Head of the Laboratory of new technologies in aquaculture scientific research institute of Fisheries

MODERN IMPORTANCE OF FISH PRODUCTION ON THE BASIS OF A CLOSED WATER SUPPLY DEVICE (YSTQ)

Annotation: *This article analyzes the role and importance of fish production technology in modern aquaculture based on the closed water supply device (YSTQ).nnotation: this article analyzes the role and importance of fish production technology in modern aquaculture based on the closed water supply device (YSTQ). The study covered the principle of operation of the YSTQ system, its advantages in water conservation, the possibilities of high-density fish production, and environmental nnotation: this article analyzes the role and importance of fish production technology in modern aquaculture based on the closed water supply device (YSTQ). The study covered the principle of operation of the YSTQ system, its advantages in water conservation, the possibilities of high-density fish production, and environmental aspects. Also, in the conditions of Uzbekistan, the possibilities of applying this technology, suitable fish species and existing problems will be discussed. The results of the study show that closed systems are effective and promising in areas with limited water resources.*

Keywords: *Closed water supply device, YSTQ (RAS), Aquaculture, fish farming, water conservation, biofilter, African lacs, forel, food safety.*

Kirish. Bugungi kunda dunyo miqyosida chuchuk suv resurslarining kamayib borishi qishloq xo'jaligi va ayniqsa akvakultura sohasida yangi, suvni

tejovchi texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda. An’anaviy ochiq hovuzlarda baliq yetishtirish katta miqdorda suv sarfini, mavsumiy cheklovlarni va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli yopiq suv ta’minoti qurilmasi (YSTQ, inglizcha RAS – Recirculating Aquaculture System) zamonaviy va istiqbolli yechim sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada YSTQ texnologiyasining ishlash prinsipi, afzalliklari, O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari hamda mavjud muammolari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. So‘nggi yillarda YSTQ tizimlari bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu texnologiyaning suv sarfini 90–99% gacha kamaytirishini ko‘rsatmoqda. Xalqaro tadqiqotlarda (Timmons & Ebeling, Badiola va boshqalar) yopiq tizimlarda baliqning o‘sish sur’ati, oziqa konversiya koeffitsiyenti va biologik xavfsizlik darajasi yuqori ekanligi ta’kidlangan.

Markaziy Osiyo va O‘zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar esa Afrika laqasi (Clarias gariepinus), forel va tilapiya kabi baliq turlari YSTQ sharoitiga yaxshi moslashishini ko‘rsatadi. Mahalliy mutaxassislar YSTQ texnologiyasini suv tanqisligi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning muhim vositasi sifatida baholamoqda.

Mazkur tadqiqotda nazariy va tahliliy metodlardan foydalanildi. Avvalo, yopiq suv ta’minoti qurilmasi asosida baliq yetishtirish bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar o‘rganildi hamda tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida YSTQ tizimining asosiy tarkibiy qismlari (mexanik filtr, biologik filtr, aeratsiya, dezgazator va zararsizlantirish uskunalari)ning ishlash mexanizmi taqqoslash usuli orqali ko‘rib chiqildi. Shuningdek, an’anaviy hovuz usuli bilan YSTQ texnologiyasi suv sarfi, mahsuldorlik va ekologik ta’sir ko‘rsatkichlari bo‘yicha solishtirildi.

O‘zbekiston sharoitida yetishtirilayotgan baliq turlarining biologik xususiyatlari inobatga olinib, YSTQ tizimiga mosligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari umumlashtirish va xulosa chiqarish usullari orqali yakunlandi.

Muhokama. YSTQ tizimining asosiy ustunligi — suvning doimiy aylanishi va tozalanishidir. Mexanik filtrlar yirik chiqindilarni ajratib olsa, biologik filtrlar maxsus bakteriyalar yordamida baliq uchun zaharli bo‘lgan ammiak va nitritlarni nitratlarga aylantiradi. Aeratsiya va oksigenatsiya tizimlari esa yuqori zichlikda saqlanayotgan baliqlar uchun yetarli kislorod bilan ta’minlaydi. Biroq ushbu tizimning kamchiliklari ham mavjud. Eng asosiy muammo — yuqori boshlang‘ich sarmoya va elektr energiyasiga to‘liq bog‘liqlikdir. Elektr ta’minotidagi uzilishlar qisqa vaqt ichida katta yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, suvning gidrokimyoviy ko‘rsatkichlarini doimiy nazorat qilish uchun malakali mutaxassis zarur.

Natijalar. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yopiq suv ta’minoti qurilmasi asosida baliq yetishtirish suv resurslaridan nihoyatda samarali foydalanish imkonini beradi. Ushbu texnologiyada suv doimiy ravishda tozalanib va qayta aylantirilib ishlatilgani sababli an’anaviy hovuz xo‘jaliklariga nisbatan suv sarfi keskin kamayadi. Bu holat, ayniqsa, suv resurslari cheklangan hududlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, YSTQ tizimi yopiq bino sharoitida faoliyat yuritganligi sababli suv harorati va sifat ko‘rsatkichlarini doimiy nazorat qilish imkonini beradi. Natijada baliq yetishtirish jarayoni mavsumiy omillarga bog‘liq bo‘lmaydi va yil davomida barqaror hamda oldindan rejalashtirilgan hajmda mahsulot olishga erishiladi. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga bozor talabiga mos ravishda uzluksiz mahsulot yetkazib berish imkonini yaratadi.

Yopiq tizimda suv sifati qat’iy nazorat ostida bo‘lgani uchun baliqlarni yuqori zichlikda saqlash mumkin. Bu esa bir birlik hajmdagi suvdan olinadigan mahsulot miqdorini sezilarli darajada oshiradi va ishlab chiqarish samaradorligini ta’minlaydi. Shu bilan birga, chiqindi suvlarning tashqi muhitga chiqarilmasligi ekologik ifloslanishning oldini oladi, hosil bo‘lgan loyqa va organik chiqindilar esa qishloq xo‘jaligida o‘g‘it sifatida foydalanilishi mumkin.

Mazkur texnologiya qimmatbaho va tez o‘suvchi baliq turlarini sanoat miqyosida yetishtirish uchun ham keng imkoniyatlar yaratadi. Xususan, O‘zbekiston sharoitida Afrika laqasi va tilapiya kabi baliq turlari YSTQ tizimiga yaxshi moslashadi, tez o‘sadi va bozor talabi yuqori bo‘lgani sababli iqtisodiy jihatdan eng maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa: Yopiq suv ta’minoti qurilmasida baliq yetishtirish zamonaviy akvakulturaning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biridir. Suv resurslari cheklangan hududlar, jumladan O‘zbekiston uchun YSTQ texnologiyasi nafaqat foydali biznes modeli, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim strategik ahamiyatga ega. To‘g‘ri rejalashtirish, sifatli texnologiyalar va malakali kadrlar bilan ushbu sohani muvaffaqiyatli rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraximov Abbosbek Dilmurod o‘g‘li, & Javxarov Oybek Zulfikorovich. (2025). TURILI OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING OQ AMUR BALIQLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRI. Pedagogs, 84(1), 4–7. Retrieved from https://inlibrary.uz/index.php/pedagogs/article/view/115196

2. Жавхаров Ойбек Зулфикорович, А. А. (2023). ЎСИМЛИКХЎР БАЛИҚЛАРНИ ЕТИШТИРИШДА АЗОЛЛА СУВ ЎТИДАН ФОЙДАЛАНИШ. MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE, 2(5), 54–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.7816247

3. Abduraximov , A. ., & Soyibjonov , A. . (2024). KARP YETISHTIRADIGAN XO’JALIKLARNI TASHKIL ETISH, KARP HOVUZLARINI QURISH TEXNOLOGIYASI. Модели и методы в современной науке, 3(18), 65–70. извлечено от https://www.inlibrary.uz/index.php/mmms/article/view/60921

4. Fayzullo o‘g‘li S. A., Qahramonjon o‘g‘li A. D. “MFFT–ZAMONAVIY BALIQ YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI” LOYIHASI ASOSIDA YOPIQ SUV TA’MINOTI QURILMASI BALIQCHILIGINI TASHKIL ETISH //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 3. – С. 145-148.

Akhmadaliyeva G.Kh.
senior lecturer
Department of Biomedical Engineering, Biophysics and Information Technologies of Fergana Medical Institute of Public Health

METHODS FOR DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT WORK SKILLS

Abstract: *The development of independent work skills among students is a critical component of modern education. Independent learning enables students to manage their time, organize resources, critically analyze information, and solve problems autonomously. This article examines effective methods and strategies for fostering independent work competencies in higher education, including project-based learning, inquiry-based learning, blended learning, and the integration of digital tools. The study highlights the importance of structured guidance, reflective practices, and performance-based assessments in supporting autonomous learning. The findings suggest that systematic implementation of these approaches enhances students' self-motivation, responsibility, and readiness for lifelong learning. This research provides practical recommendations for educators to strengthen students' capacity for independent study, contributing to academic success and professional development.*

Keywords: *Independent learning, Self-directed study, Student autonomy, Higher education, Pedagogical strategies, Digital learning tools.*

Introduction

In modern education, developing students' independent work skills has become a pressing issue. The quality of education depends not only on the teacher's pedagogical expertise but also on the student's ability to acquire knowledge independently. Independent work skills include a student's ability to organize themselves, select and analyze information, solve problems, and apply a creative approach in the learning process. Nowadays, the widespread use of information technologies and digital resources, as well as the high requirements of educational standards, make it insufficient to rely solely on classroom-based instruction. Therefore, fostering students' independent work skills is considered an integral part of the pedagogical process. A student's ability to deepen their knowledge independently, solve problems on their own, and actively engage in the learning process forms a necessary foundation for future professional success. Consequently, pedagogical research emphasizes identifying and implementing effective methods, techniques, and approaches for developing students' independent work skills. This article aims to explore these issues and provide practical recommendations for enhancing independent learning among students.

Relevance

Developing students' independent work skills is highly relevant in the context of modern education. Today's society requires individuals who can think critically,

solve problems creatively, and adapt to rapidly changing conditions. Educational systems are increasingly focused not only on knowledge acquisition but also on the formation of skills that enable lifelong learning. Independent work skills help students take responsibility for their own learning, effectively manage their time, and utilize various resources, including digital tools, to enhance their knowledge. In the absence of these skills, students may struggle to succeed academically and professionally. Therefore, exploring methods to foster independent learning is of significant practical and scientific importance.

Purpose

The purpose of this study is to identify and analyze effective methods for developing students' independent work skills. Specifically, the research aims to:

- Examine the key components of independent learning skills;
- Evaluate pedagogical approaches that promote self-directed learning;
- Provide practical recommendations for educators to enhance students' ability to work independently.

The ultimate goal is to contribute to the improvement of educational practices and support students in becoming autonomous, responsible, and competent learners.

Main part

Independent work skills refer to a student's ability to manage their own learning process, including planning, analyzing, and evaluating information, as well as solving problems independently. These skills are fundamental to the development of critical thinking, creativity, and lifelong learning. A clear understanding of the essence of independent work allows educators to design teaching strategies that promote autonomy. Such skills are not innate; they are formed gradually through consistent practice and guided learning. Students with well-developed independent work abilities demonstrate higher academic achievement, better self-regulation, and increased motivation. They are capable of identifying learning objectives, organizing resources, and monitoring their progress. Independent work skills also include the ability to reflect on one's own learning, recognize strengths and weaknesses, and apply knowledge to new situations. The development of these skills contributes to personal and professional growth, preparing students for the demands of higher education and the labor market. Pedagogical research emphasizes that fostering independence in learning is essential for creating active, responsible, and self-motivated learners. Moreover, it strengthens problem-solving and decision-making abilities, which are crucial in modern educational and professional environments.

In the contemporary educational landscape, independent work skills play a pivotal role in ensuring student success. Rapid technological changes, the increasing complexity of academic content, and the need for lifelong learning require students to take responsibility for their own educational development. These skills enable students to navigate information overload, critically evaluate sources, and integrate knowledge from various disciplines. Independent work fosters self-discipline, time management, and initiative, which are essential traits for academic and professional excellence. Moreover, students who actively engage in self-directed learning

demonstrate higher retention of knowledge and enhanced cognitive abilities. They develop the ability to formulate questions, seek solutions, and apply theoretical concepts in practice. Educators recognize that the traditional teacher-centered approach is no longer sufficient; students must be encouraged to take ownership of their learning. Therefore, developing independent work skills is closely linked to educational reforms aimed at enhancing student autonomy, creativity, and adaptability. Ultimately, these skills prepare learners for lifelong personal and professional success, contributing to a more competent and innovative workforce.

Several internal and external factors affect the development of independent work skills among students. Internal factors include motivation, cognitive abilities, self-confidence, and prior knowledge. A student's level of curiosity and willingness to engage actively in learning strongly influences their capacity for self-directed work. External factors encompass the educational environment, teaching methods, access to resources, and the support provided by teachers and peers. Modern learning technologies, such as online platforms and digital libraries, provide opportunities for students to engage in independent study effectively. Institutional policies and curriculum design also impact skill development by offering structured assignments, research projects, and problem-based learning tasks. Socio-cultural factors, including family support and peer influence, further shape students' attitudes toward independent learning. Recognizing these factors allows educators to create conditions that encourage self-directed study and develop personalized strategies for fostering independence. Addressing both internal and external influences ensures a balanced approach that enhances students' capabilities. Overall, a comprehensive understanding of these factors is essential for effective pedagogical planning and skill development.

Several pedagogical approaches effectively promote independent work skills among students. Student-centered learning focuses on active participation, critical thinking, and problem-solving. Project-based learning encourages students to explore real-world problems, plan tasks, and evaluate outcomes independently. Inquiry-based learning stimulates curiosity and motivates learners to seek answers through investigation and analysis. Blended learning, which combines traditional classroom methods with online tools, provides flexibility and access to diverse resources. Collaborative learning, while emphasizing teamwork, also allows students to take individual responsibility for certain tasks, fostering autonomy. The use of reflective practices, such as self-assessment and learning journals, enhances students' ability to monitor their progress. Teachers play a crucial role by acting as facilitators, guiding students while allowing them to make decisions and take initiative. These approaches collectively cultivate independence, responsibility, and self-confidence in learners. Effective implementation of these methods requires careful planning, clear learning objectives, and ongoing assessment to ensure skill development.

Information and communication technologies (ICT) have transformed the process of developing independent work skills. Digital tools, online databases, educational software, and e-learning platforms provide students with immediate

access to vast amounts of information. ICT enables learners to conduct research, analyze data, and present findings independently. Online discussion forums and collaborative tools foster communication and knowledge sharing while allowing individual accountability. Learning management systems (LMS) offer structured environments where students can organize tasks, track progress, and receive feedback. ICT also supports personalized learning by adapting resources and assignments to a student's level and pace. Additionally, multimedia content, simulations, and interactive exercises enhance understanding and engagement. Effective use of ICT encourages self-directed learning, critical evaluation of sources, and creative problem-solving. Teachers must integrate these technologies strategically, ensuring that they complement pedagogical goals and develop students' autonomy rather than creating dependency.

Assessing independent work skills requires approaches that go beyond traditional testing. Performance-based assessments, such as projects, research papers, and presentations, measure a student's ability to plan, analyze, and apply knowledge. Portfolios allow students to compile evidence of their learning, reflecting both process and outcomes. Self-assessment and peer-assessment techniques promote reflection, critical evaluation, and accountability. Rubrics with clear criteria help evaluate specific competencies related to independent work, such as organization, problem-solving, creativity, and information literacy. Continuous formative assessment provides ongoing feedback, guiding students in improving their skills. Innovative assessment methods, including digital tracking of assignments and online quizzes, can complement traditional evaluation tools. Accurate assessment encourages motivation, identifies areas for development, and supports targeted interventions by educators. Thus, evaluation is an integral part of fostering and reinforcing independent work skills.

Despite its importance, fostering independent work skills presents several challenges. Many students lack motivation or confidence to engage in self-directed learning. Poor time management, ineffective study strategies, and reliance on teacher guidance can hinder autonomy. Inadequate access to learning resources, including ICT tools, limits opportunities for independent study. Teachers may face difficulties in designing tasks that balance guidance with autonomy. Large class sizes and rigid curricula may restrict individualized support. Additionally, cultural attitudes toward education that emphasize rote learning over critical thinking can impede skill development. Addressing these challenges requires a combination of pedagogical innovation, resource allocation, and student support. Teachers must create a learning environment that encourages initiative, provides clear guidance, and gradually increases student responsibility. Overcoming these obstacles ensures effective development of independent work skills and prepares students for academic and professional success.

To strengthen students' independent work skills, several strategies can be implemented. Incorporating project-based and inquiry-based learning into curricula encourages autonomy. Teachers should use ICT tools to provide access to diverse resources and facilitate self-directed study. Regular formative assessments,

reflective journals, and feedback sessions support skill monitoring and improvement. Developing critical thinking and problem-solving activities enhances cognitive abilities and self-reliance. Educators should foster a supportive classroom environment that promotes initiative, motivation, and confidence. Collaboration with peers, while maintaining individual accountability, can further reinforce independent work. Training programs for teachers on effective strategies to develop autonomy are also recommended. Encouraging students to set personal learning goals and monitor their progress fosters responsibility. Overall, a systematic and integrated approach ensures that independent work skills are continuously nurtured, contributing to students' long-term academic and professional development.

Discussion

The development of students' independent work skills is a complex and multidimensional process influenced by both internal and external factors. Research indicates that motivation, cognitive abilities, and prior knowledge significantly contribute to the effectiveness of self-directed learning. Simultaneously, the educational environment, teaching methods, and access to resources play a crucial role in shaping these skills. The integration of student-centered pedagogical approaches, such as project-based, inquiry-based, and blended learning, has been shown to enhance autonomy, problem-solving abilities, and critical thinking.

Information and communication technologies provide additional opportunities for independent learning, facilitating access to diverse resources and interactive educational content. Assessment methods that emphasize performance, self-reflection, and portfolio-based evaluation support the continuous development of these skills. However, challenges remain, including insufficient motivation, lack of confidence, and limited access to digital tools, which may hinder the full realization of independent work potential.

To address these challenges, educators are encouraged to implement structured yet flexible learning activities that gradually increase student responsibility. Continuous feedback, formative assessment, and reflective practices reinforce self-regulation and accountability. Creating a supportive environment that encourages initiative, creativity, and collaboration further strengthens independent work competencies. Systematic integration of these strategies ensures that students not only acquire knowledge but also develop the ability to manage their learning autonomously, preparing them for future academic and professional success.

Results

The analysis of pedagogical strategies and educational practices demonstrates that the implementation of structured methods significantly enhances students' independent work skills. Students engaged in project-based learning exhibited improved problem-solving abilities, effective time management, and greater initiative in completing tasks. Inquiry-based learning promoted critical thinking and increased the capacity for self-directed research.

Use of digital tools and information technologies contributed to the development of resource management skills, allowing students to access, analyze, and apply information independently. Performance-based assessments, portfolios,

and reflective activities provided measurable evidence of students' growth in autonomy and responsibility.

Data also indicate that consistent guidance combined with gradual increase in student responsibility leads to higher engagement and better learning outcomes. Collaborative activities, when designed to include individual accountability, supported the development of both teamwork and independent decision-making skills. Students with access to varied resources, including digital and multimedia content, demonstrated greater confidence in planning and executing independent tasks. Overall, the findings confirm that systematic integration of student-centered pedagogical approaches, ICT tools, and reflective assessment techniques effectively fosters independent work competencies. These results highlight the importance of combining methodological strategies with supportive educational environments to ensure sustainable skill development.

Conclusion

The development of students' independent work skills is a crucial component of modern education, ensuring academic success and preparing learners for professional challenges. The findings indicate that pedagogical approaches such as project-based learning, inquiry-based learning, and blended learning, combined with the use of digital tools, significantly enhance students' autonomy, problem-solving abilities, and critical thinking skills. Structured guidance, continuous feedback, and reflective practices further support the growth of self-directed learning competencies. Challenges, including insufficient motivation, lack of confidence, and limited access to resources, may impede the effective formation of independent work skills. However, implementing systematic strategies that integrate student-centered methods, information technologies, and performance-based assessment can overcome these obstacles. Overall, fostering independent work skills contributes to the creation of responsible, self-motivated, and capable learners, capable of managing their learning process effectively and adapting to evolving academic and professional demands.

References

1. Ualiyeva, N. T., Murzalinova, A. Z., & Kucher, T. P. (2016). Competence-oriented independent work of students in higher education institutions: Characteristics, content and organization. International Review of Management and Marketing, 6(3S), 146–155.
2. Developing Students' Independent Learning Skills (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(09), 969–974.
3. Aspects of developing the ability for independent learning among students of higher educational institutions. (2024). Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research, 2(12), 9–18.
4. Features of developing students' independent learning skills through online educational platforms. (2025). International Journal of Artificial Intelligence, 5(11), 270–273.

5. Developing critical thinking skills in students in the process of independent study. (2025). American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education, 3(4), 104–108.
6. Methodology of developing independent learning skills in students of future English teachers. (2023). Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(6), 141–145.

Ashurov J. S.
Texnologiya va geografiya kafedrasi o'qituvchisi
Termiz davlat pedagogika instituti
Umarov Sh.Y.
Geografiya va iqtisodiy blim asoslari yo'nalishi 302-gurux talabasi
Termiz davlat pedagogika instituti
Xoliyorov H.O'.
Geografiya va iqtisodiy blim asoslari yo'nalishi 302-gurux talabasi
Termiz davlat pedagogika instituti

SURXONDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGINING HUDUDIY TARKIBI VA AGROGEOGRAFIK RAYONLASHTIRISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligining hududiy tarkibi va agrogeografik rayonlashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda viloyatning tabiiy-iqlim sharoitlari, er-suv resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi, aholining joylashuvi va qishloq xo'jaligi tarmoqlarining ixtisoslashuvi asosida Yuqori, O'rta va Quyi agrogeografik rayonlar ajratilgan. Har bir rayonning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidagi o'rni, ekin maydonlari tarkibi, yalpi hosil va hosildorlik ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil etilgan. Olingan natijalar viloyatda qishloq xo'jaligini hududiy tashkil etish va tarmoqlarni oqilona rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar. *Surxondaryo viloyati, qishloq xo'jaligi, agrogeografik rayonlashtirish, er-suv resurslari, hududiy ixtisoslashuv, sug'oriladigan erlar, hosildorlik, chorvachilik.*

Ashurov J. S.
teacher
Department of Technology and Geography
Termez State Pedagogical Institute
Umarov Sh.Y.
student of the 302nd group
course of geography and fundamentals of economic science
Termez State Pedagogical Institute
Kholiyorov H.O.
student of the 302nd group
course of geography and fundamentals of economic science
Termez State Pedagogical Institute

TERRITORIAL STRUCTURE OF AGRICULTURE IN THE SURKHANDARYA REGION AND FEATURES OF AGRO-GEOGRAPHICAL ZONING

Abstract. *This article analyzes the territorial structure of agriculture and the issues of agro-geographical zoning in the Surkhandarya region. Based on natural and climatic conditions, land and water resource availability, population distribution, and agricultural specialization, the region is divided into Upper, Middle, and Lower agro-geographical zones. The study provides a comparative analysis of crop structure, gross agricultural output, and productivity across these zones. The findings have scientific and practical significance for improving the territorial organization of agriculture and ensuring the rational use of natural resources in the region.*

Keywords. *Surkhandarya region, agriculture, agro-geographical zoning, land and water resources, territorial specialization, irrigated lands, crop productivity, livestock farming.*

Hududlarning o‘ziga xos tabiiy-iqlim va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, ishlab chiqarish yo‘nalishi va an’analariga asoslangan holda iqtisodiyot tarmoqlari, jumladan qishloq xo‘jaligi rivojlanganligi hududiy tashkil etiladi. Ta’kidlash joizki, tabiiy, iqtisodiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanishda qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvi va tarmoqlar tarkibini nafaqat hududlarda, balki xo‘jaliklar darajasida takomillashtirish hamda etishtirilgan mahsulotlar hajmi va hosildorligini oshirish mazkur sohada aniq alohida rayonlarni ajratishni talab qiladi. Bu vazifalarni ijobiy hal etish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini to‘g‘ri va oqilona rivojlanishiga sabab bo‘ladi.

Surxondaryo viloyati qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan erlar 1009,9 ming ga, shundan sug‘oriladigan erlar 270,5 ming gektar bo‘lib, bu foydalaniladigan yerlarning 26,8 foizini tashkil qiladi (2024 y.). Viloyat mamlakat yalpi qishloq xo‘jaligi mahsulotining 8,3 foizini beradi. Shu bilan birga, yalpi ichki mahsulotning deyarli 38,0 foizi aynan qishloq xo‘jaligida yaratilmoqda. Biroq, bu ko‘rsatkichlar viloyat uchun umumiy xarakterga ega bo‘lib, ular ostida katta hududiy tafovutlar, geografik farqlar yotadi. Bunday geografik xususiyatlar, eng avvalo, agroiqlimiy resurslar (yer, namlik va harorat) va ularning hududiy birikmalari, xo‘jaliklarning ixtisoslashuvi bilan tavsiflanadi. Shu nuqtai nazardan, viloyat doirasida turli ichki iqtisodiy rayonlarni ajratish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotda Surxondaryo viloyati qishloq xo‘jaligida er-suv resurslaridan foydalanish bo‘yicha bir-biridan keskin farq qiluvchi agrogeografik rayonlarga ajratildi. Viloyat qishloq xo‘jaligini rayonlashtirishda hududning tabiiy sharoiti, relyef xususiyati, tabiiy resurslari, xususan, er-suv resurslari bilan ta’minlanganlik darajasi, asosiy mahalliy ishlab chiqarish yo‘nalishlari va qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvi e’tiborga olindi.

Surxondaryo viloyati doirasida Yuqori agrogeografik rayoniga Sariosiyo, Denov, Oltinsoy, Uzun, O‘rta rayoniga — Boysun, Qumqo‘rg‘on, Sho‘rchi; Quyi rayoniga — Sherobod, Qiziriq, Jarqo‘rg‘on, Termiz, Angor, Muzrabot tumanlari kiradi.

Yuqori Surxondaryo agrogeografik rayoni tabiiy sharoiti, agroiqlimiy resurslari, er-suv resurslari bilan ta’minlanganlik darajasi ko‘ra boshqa hududlardan


farq qiladi. Viloyatning 36,7 % hududi, 38,4 % aholisi ushbu rayonga to‘g‘ri kelib, u viloyat yalpi qishloq xo‘jalik mahsulotining 37,5 foizini beradi. Bu rayonga viloyat jami qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan erlarning 22,6 foizi, ekin erlarining 24,3, sug‘oriladigan erlarning 22,0, lalmi erlarning 35,0, ko‘p yillik daraxtzorlar erlarining 47,6 va yaylovlarning 21,1 foizi to‘g‘ri keladi. Er fondining qishloq tumanlar orasida taqsimlanishi ham o‘ziga xos: qishloq xo‘jaligi erlar tarkibida ekin erlarining 2/5 qismi Denov tumaniga tegishli, ko‘p yillik daraxtzorlarning 43 foizi Oltinsoy, yaylovlarning 3/5 qismi Denov va Sariosiyo tumanlariga tegishlidir.

Mazkur rayonda “to‘g‘rilik koeffitsienti”ning yuqoriligi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan sug‘oriladigan erlarning kam bo‘lishiga sabab bo‘lgan (0,06 gektar). Vaholanki, bu ko‘rsatkich viloyat bo‘yicha 0,10 gektarni tashkil etadi (respublika — 0,13 ga). Qishloq tumanlarida eng past ko‘rsatkich Sariosiyo tumaniga (0,05 ga), yuqori daraja Denov tumanida (0,07 ga) qayd etiladi.

Yuqori rayon qishloq xo‘jaligi ekinlari maydoni jihatidan Qashqadaryo viloyatining turdosh rayonlariga nisbatan farq qiladi. Jumladan, uning hissasiga viloyat jami galla maydonining 21,7 foizi, paxta maydonining 24,0, kartoshkaning 35,2, sabzavotning 34,7 va mevaning 48,9 foizi mos keladi. Shu hududda qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari geografiyasi yuzaga xos, deyarli barcha ekin maydonlarida Denov tumanining hissasi katta. Rayon g’alla maydonining 41,7 foizi, paxtaning 44,3, kartoshkaning 43,8 foizi ushbu tumanda joylashgan. Mevali daraxtlarning maydoni bo‘yicha esa Sariosiyo tumani etakchilik qiladi.

Surxondaryo viloyatida etishtirilgan gallaning 25,2 foizi, paxtaning 26,7, kartoshkaning 45,0, sabzavotning 40,4 va mevaning 50,2 foizi Yuqori rayon hissasiga to‘g‘ri keladi. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining yalpi hosilida ham Denov tumani ajralib turadi, u rayon gallasining 42,1 foizi, paxtaning 47,1, kartoshkaning 40,6, sabzavotning 35,7, mevaning 35,2 foizini ta’minlaydi. Eng past ko‘rsatkich Sariosiyo tumanida, uning hissasiga rayon gallasining 16,8 foizi, paxtasining 19,3, kartoshkaning 10,8, sabzavotning 14,3 foizi to‘g‘ri keladi.

Mazkur rayon qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi bo‘yicha viloyatda etakchi o‘ringa ega. Chunonchi, gallaning o‘rtacha hosildorligi 62,6 s/ga, paxta 30,4, kartoshka 282,0, sabzavot 790,0, mevaning 87,0 sentnerga teng. Yuqori Surxondaryo chorvachilik mahsulotlari etishtirishda ham viloyatda salmoqli o‘ringa ega, go‘shtning 34,1, sutning 35,0, tuxumning 18,0 foizini beradi. Chorvachilik mahsulotlarining 2/3 qismi Denov va Uzun tumanlariga to‘g‘ri keladi.



1-rasm. Yuqori Surxondaryo rayonining qishloq xo‘jaligi ekinlari maydoni (2024 yil, ga). Rasm Surxondaryo viloyat statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tayyorlangan.

Shunday qilib, Yuqori Surxondaryo qishloq xo‘jaligi rayoni mahalliy suv resurslariga egaligi, sug‘oriladigan erlarning nisbatan kamligi, mehnat resurslarining ko‘pligi bilan ajralib turadi. Rayon qishloq xo‘jaligi asosan kartoshka, meva va sabzavot etishtirishga hamda qisman chorvachilikka ixtisoslashgan. Relef xususiyati hamda mahalliy suv resurslarining etarliligini inobatga olib, intensiv sug‘orma dehqonchilikni rivojlantirish, sug‘oriladigan erlarni kengaytirish va aholining muttasil ko‘payib borishini inobatga olgan holda bu erda, eng avvalo, g‘allachilik, meva-sabzavotchilik, go‘sht-sut chorvachiligi va parrandachilikni rivojlantirish maqbul hisoblanadi.

O‘rta Surxondaryo agrotumaniga Boysun, Sho‘rchi va Qumqo‘rg‘on tumanlari kiradi va viloyat hududining qariyb 1/3 qismini egallaydi. Bu erda viloyat aholisining 22,6 foizi istiqomat qiladi, uning hissasiga viloyat qishloq xo‘jalik mahsulotining 20,9 foizi to‘g‘ri keladi. Rayonda jami qishloq xo‘jalik mahsulotining yarmini Qumqo‘rg‘on tumani beradi.

Viloyat qishloq xo‘jaligi erlarining 41,0 foizi ushbu rayonga tegishli bo‘lib, uning 54,0 foizi Boysun, 34,5 foizi Qumqo‘rg‘on, qolgan kichik qismi esa Sho‘rchi tumaniga taalluqli. Ekin erlarining 2/3 qismida sug‘orib dehqonchilik qilinadi. Lalmi erlarning deyarli 100 foizi Boysun tumaniga tegishli bo‘lib, ekin erlarining atigi 15 foizi sug‘oriladi, xolos. Qumqo‘rg‘on va Sho‘rchi tumanlarida ekin erlarining barchasi sug‘orilib, viloyat sug‘oriladigan erlarining deyarli 14 foizi shu tumanlarda joylashgan. Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha sug‘oriladigan erlar hajmi Yuqori rayon darajasiga teng (0,06 ga), ammo viloyat ko‘rsatkichidan (0,10 ga) pastroq. Bu ko‘rsatkich Boysun tumanida eng kam (0,03 ga), Sho‘rchi va Qumqo‘rg‘on tumanlarida esa u 0,08 gektarga barobar. Rayonga viloyat yaylov maydonlarining 50 foizi to‘g‘ri kelib, uning yarmidan ko‘prog‘i birgina Boysun

tumanida joylashgan. Umuman, O‘rta Surxondaryo jami qishloq xo‘jaligi erlarining 85,0 foizini yaylovlar tashkil qiladi. Bu jihatdan u O‘rta Qashqadaryodan ancha ustun turadi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlari tarkibida g‘allaning ulushi 46,0 foiz (viloyat g‘alla maydonlarining 1/5 qismi ko‘rilayotgan rayonga to‘g‘ri keladi), paxtazorlar esa jami ekin maydonining 1/3 qismini egallaydi. G‘alla va paxta birgalikda jami ekin maydonining 78 foizini egallaydi, uning deyarli yarmi Qumqo‘rg‘on tumaniga taalluqli. Kartoshkaning umumiy maydoni 1745 gektar yoki viloyat jami kartoshka maydonining 1/5 qismiga teng. Bu soha ko‘proq Sho‘rchi tumanida rivojlangan, sabzavotzorlarning viloyatdagi ulushi 20 foizni hosil qiladi.

O‘rta Surxondaryo rayoni viloyat yalpi g‘alla hosilining 17,5 foizi, paxtaning 16,0, kartoshkaning 21,5, sabzavotning 17,0, mevaning 19,0 foizini ta’minlaydi. Hudud qishloq xo‘jaligida Kumqo‘rg‘on tumanining ulushi yuqori, u g‘allaning 58, paxtaning 53, sabzavotning 43 foizini beradi. Kartoshka etishtirishda esa Sho‘rchi tumanining hissasi ko‘proq (41%). Ekinlarning o‘rtacha hosildorligi viloyat o‘rtachasidan, kartoshka va mevani hisobga olmaganda, past ko‘rsatkichga ega. Boysun tumanida g‘allaning asosiy qismi lalmi erlarda etishtirilishi hosildorlikning past bo‘lishiga (17,1 s/ga) olib kelgan va rayon o‘rtacha hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatgan. Mazkur tumanda 2024-yilda paxtadan atigi 666 tonna hosil olindi, bu paxta yalpi hosilining 1,2 foizi demakdir. Binobarin, Boysun tumani dehqonchilik ixtisoslashuvida paxtachilik tarmog‘i o‘rniga (Qashqadaryo viloyatidagi Kitob va Dehqonobod tumanlari kabi), hudud tabiiy sharoitidan kelib chiqqan holda, lalmi dehqonchilik, kartoshkachilik, meva va sabzavotchilikka ixtisoslashuvi maqsadga muvofiqdir. Rayon viloyat chorvachilik mahsulotlaridan go‘shtning 24,0 foizini, sutning 23,0, tuxumning 22,0 foizini beradi. Bu tarmoqda ham Qumqo‘rg‘on tumanining hissasi yuqori, u go‘shtning 47, sutning 54, tuxumning 51 foizini etishtiradi.

Quyi Surxondaryo agrogeografik rayoni o‘z ichiga ma’muriy jihatdan Angor, Jarqo‘rg‘on, Muzrabot, Termiz, Sherobod va Qiziriq tumanlaridan iborat. Ushbu ma’muriy rayon viloyatning 39,0 foizini o‘zida mujassam qilgan.

Quyi Surxondaryo qishloq xo‘jaligi maydonining 32,2 foizini tashkil etadi va ularning 2/5 qismidan ko‘prog‘ini ta’minlaydi. Quyi Surxondaryo qishloq xo’jalik mahsulotlarining 3/5 qismini Jarqo‘rg‘on, Sherobod va Qiziriq tumanlari bersa, eng past ko’rsatkich Termiz tumanida (10,0 foiz) qayd etiladi.

Quyi rayonida viloyat g’alla va paxta yalpi hosilining 57,0 foizi, kartoshkaning 33,0 foizi, sabzavotning 43,0 foizi va mevaning 31,0 foizi etishtiriladi. Paxtachilikda Muzrabot, Sherobod, Qiziriq, paxta etishtirishga Qiziriq va Sherobod tumanlari ixtisoslashgan. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘rtacha hosildorligi faqat galla va sabzavotda viloyat o‘rtachasidan yuqori, qolgan ekinlar pastroq.

Chorvachilik bo‘yicha rayonning hissasi viloyat etishtiriladigan go‘shtning 2/5 qismi, tuxumning esa 3/5 qismi to‘g‘ri keladi. Go‘sht etishtirishda rayonida Jarqo‘rg‘on go‘sht va sutining 2/5 qismi, Sherobod va Jarqo‘rg‘onda, tuxum etishtirishda esa Termiz tumani ko‘zga tashlanadi.

Shunday qilib, Surxondaryo viloyati qishloq xo‘jaligi geografiyasi o‘ziga xos bo‘lib, bunday ajratilgan viloyatning yuqori qishloq xo‘jaligi mintaqalarida deyarli ko‘zga tashlanmaydi. Yuqorida biroz er usti tuzilishi, geomorfologik holati hamda suv bilan nisbatan yaxshi ta’minlangan, sug‘oriladigan er tanqisligiga olib keladi. O‘rta rayonida esa, uning vaziyati hududda er, ayniqsa, foydalaniladigan bo‘lsa ham er hamda suv muammosi mavjud. Quyi rayonga qishloq xo’jaligida foydalaniladigan erlar, jumladan, sug’oriladigan erlar hajmi ko’p, harorat ham etarli, ammo suv zaxiralari juda kam. Aynan cho’l hududlari viloyat agroiqtisodiyot tizimida muhim rolga ega.

Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyati qishloq xo‘jaligi hududiy jihatdan keskin farqlanuvchi agrogeografik rayonlardan iborat bo‘lib, har bir rayonning tabiiy sharoiti, er-suv resurslari va ishlab chiqarish ixtisoslashuvi o‘ziga xosdir. Yuqori rayon asosan meva-sabzavotchilik va kartoshkachilikka, O‘rta rayon lalmi dehqonchilik va chorvachilikka, Quyi rayon esa sug‘oriladigan dehqonchilik, ayniqsa g‘allachilik va paxtachilikka ixtisoslashgan. Hududiy farqlarni hisobga olgan holda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, er va suv resurslaridan samarali foydalanish hamda tarmoqlarni optimallashtirish viloyat agroiqtisodiy salohiyatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Ruziyev A. Территориалная система агропромышленного комплекса. – Т.: Мехнат, 1986.
2. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика ва амалиёт. Т. Камалак, 2013.
3. Файзуллаев М.А. Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан фойдаланишнинг ички тафовутлари. Т.,2015
4. Ashurov J. Surxondaryo viloyatida sel hodisalarining hosil bo‘lishi va uning xalq xo’jaligidagi ahamiyati. Pedagogical sciences and teaching methods 2025 yil 21-26 betlar.
5. Ashurov J. Surxondaryo viloyatining organik dunyosi va yer (agroiqlim) resurslaridan qishloq xo’jaligida foydalanish masalalari. Экономика и социум 25.11.2025 11(138) 2025
6. Ashurov J.S. (2024). “Cho’llardagi samum, kuy va sarob”. Экономика и социум, (4-1 (119)), 65-70.

Ashurov O.Sh.
assistant
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Bukhara State Medical Institute

DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS

Abstract: *Tuberculosis (TB) is a major global health problem caused by Mycobacterium tuberculosis. This article reviews the diagnostic and prognostic significance of clinical and laboratory parameters in TB patients. Common findings include anemia, lymphopenia, elevated inflammatory markers (ESR, CRP), and microbiological or molecular confirmation of Mycobacterium tuberculosis. These parameters provide insight into disease activity, severity, and treatment response. Systematic evaluation of clinical-laboratory markers supports early diagnosis, prognosis prediction, and individualized management strategies, highlighting their critical role in modern TB care.*

Keywords *tuberculosis, clinical parameters, laboratory tests, diagnosis, prognosis, Mycobacterium tuberculosis, molecular diagnostics*

Introduction

Tuberculosis (TB) remains a major global health challenge and is among the leading causes of morbidity and mortality worldwide. The causative agent, Mycobacterium tuberculosis, primarily affects the lungs but may involve extrapulmonary organs. Early diagnosis and assessment of disease severity are crucial for effective treatment, prevention of transmission, and prognosis evaluation.

Despite advances in imaging and molecular techniques, TB diagnosis is often challenging due to nonspecific clinical manifestations such as persistent cough, fever, night sweats, and weight loss. Therefore, clinical and laboratory parameters play a central role in confirming the diagnosis and monitoring disease progression.

Laboratory investigations, including complete blood count, biochemical tests, inflammatory markers such as erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP), immunological tests, and microbiological evaluations, provide critical information on the host response and disease activity. Microbiological confirmation through sputum microscopy and culture remains the “gold standard,” while molecular assays such as GeneXpert MTB/RIF enable rapid detection of Mycobacterium tuberculosis and rifampicin resistance.

Clinical-laboratory parameters are not only essential for diagnosis but also for prognostic assessment. Alterations such as anemia, lymphopenia, or hypoalbuminemia may reflect severe disease and predict adverse outcomes. Systematic evaluation of these parameters allows clinicians to monitor treatment response, adjust therapy, and predict disease course.

This article aims to review the diagnostic and prognostic significance of clinical and laboratory parameters in TB patients and to highlight their role in modern clinical practice.

Methods

This study is theoretical and analytical in nature; no experimental or patient-based research was conducted. Data were obtained from peer-reviewed scientific literature, international guidelines, and clinical recommendations.

The following clinical-laboratory parameters were evaluated:

- Clinical manifestations: cough, fever, night sweats, weight loss
- Complete blood count: leukocytosis, lymphocyte count, anemia
- Inflammatory markers: ESR, CRP
- Biochemical parameters: liver enzymes, total protein, albumin
- Microbiological and molecular diagnostic tests: sputum smear microscopy, culture, GeneXpert MTB/RIF

The review focused on the role of these parameters in diagnosing TB, assessing disease severity, and predicting clinical outcomes.

Results

Literature analysis indicates that TB patients commonly exhibit the following clinical-laboratory changes:

- Moderate anemia and elevated ESR in the complete blood count
- Relative lymphopenia
- Elevated CRP levels indicating systemic inflammation
- Detection of acid-fast bacilli in sputum samples
- Positive molecular detection of Mycobacterium tuberculosis DNA in rapid assays

These parameters correlate with disease activity, severity, and treatment response, demonstrating their diagnostic and prognostic value.

Discussion

Early and accurate diagnosis of TB is essential for reducing morbidity and preventing transmission. While clinical symptoms are often nonspecific, laboratory parameters provide objective evidence of disease.

1. Complete Blood Count and Biochemical Markers

Alterations in blood count and serum proteins reflect the systemic effects of chronic infection. Anemia and hypoalbuminemia are often associated with prolonged inflammation and nutritional compromise, indicating more severe disease.

2. Inflammatory Markers

Elevated ESR and CRP serve as surrogate markers of active infection and can guide treatment decisions and monitor therapeutic response.

3. Microbiological and Molecular Diagnostics

Sputum smear and culture remain the gold standard for confirming TB. However, culture results may take weeks. Molecular diagnostics, such as GeneXpert, allow rapid detection and assessment of drug resistance, improving clinical decision-making.

4. Prognostic Relevance

Patients with marked laboratory abnormalities, including high inflammatory markers, significant anemia, or lymphopenia, tend to have more severe disease and poorer outcomes. Monitoring these parameters over time supports individualized management and predicts recovery trajectory.

5. Integration into Clinical Practice

A comprehensive approach combining clinical assessment, laboratory testing, and molecular diagnostics optimizes TB management. Such integration allows for early diagnosis, risk stratification, and improved monitoring of treatment efficacy.

In summary, clinical and laboratory parameters are critical not only for diagnosing TB but also for evaluating disease severity and predicting patient outcomes. Their systematic and dynamic assessment enhances clinical management and supports evidence-based decision-making.

Conclusion

Clinical and laboratory parameters provide essential diagnostic and prognostic information in patients with tuberculosis. Combined evaluation of hematological, biochemical, inflammatory, microbiological, and molecular markers enables early diagnosis, assessment of disease severity, and monitoring of treatment response. Incorporating these parameters into routine clinical practice improves patient management, optimizes outcomes, and facilitates timely interventions. Continued research and guideline-based application of clinical-laboratory monitoring remain pivotal for controlling TB at both individual and public health levels.

References

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023. Geneva: WHO; 2023.
2. Zumla A, Nahid P. Tuberculosis. *The Lancet.* 2013;382(9907):1240–1253.
3. Murray CJL, Lonnroth K. Epidemiology of tuberculosis: Current perspectives. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease.* 2010;14(6):656–664.
4. Harries AD, Raviglione MC. Clinical features and laboratory findings in pulmonary tuberculosis. *Clin Microbiol Rev.* 2005;18(3):327–353.
5. Steingart KR, Boerma T. Sputum-based and molecular diagnostics for tuberculosis: Accuracy and applications. *PLoS Med.* 2014;11(4):e1001567.
6. Pai M, Schito M. Tuberculosis diagnostics: State of the art and future directions. *Expert Rev Mol Diagn.* 2015;15(6):723–738.
7. Lawn SD, Zumla AI. Tuberculosis. *Lancet.* 2011;378(9785):57–72.
8. Crofton J, Murray JF. Clinical Tuberculosis. 4th ed. London: Hodder Arnold; 2009.
9. Corbett EL, Bandason T. Predictive value of laboratory markers in tuberculosis prognosis. *Int J Tuberc Lung Dis.* 2012;16(3):330–338.
10. Tiwari PK. Clinical and hematological parameters in pulmonary tuberculosis: A review. *J Infect Dev Ctries.* 2016;10(2):123–131.

Axrorqulov Sh.
o'qituvchi
Tursunova M.
o'qituvchi
Bekmatova M.
o'qituvchi
Hakimova X.X.
Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi katta o'qituvchisi
Samarqand davlat tibbiyot universitetining

HOMILADORLIK DAVRIDA XAVF OMILLARINI ERTA ANIQLASHDA AKUSHERNING ROLI

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlashda akusherning roli va ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Zamonaviy akusherlik amaliyotida ona va homila salomatligini saqlashda xavf omillarini erta bosqichda aniqlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi akusherlik faoliyatida kuzatuv, skrining, kommunikativ yondashuv va profilaktik choralar orqali homiladorlik asoratlarining oldini olish imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv, so‘rovnoma va statistik ma’lumotlarni umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, akusher tomonidan xavf omillarining o‘z vaqtida aniqlanishi homiladorlik asoratlari, ona va perinatal o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *akusherlik, homiladorlik, xavf omillari, erta aniqlash, profilaktika, ona va bola salomatligi.*

Axrorqulov Sh.
teacher
Tursunova M.
teacher
Bekmatova M.
teacher
Hakimova Kh.Kh
senior
Department of Public Health and Health Care Management
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF THE MIDWIFE IN EARLY IDENTIFICATION OF RISK FACTORS DURING PREGNANCY

Abstract: *This scientific article analyzes the role and significance of the midwife in the early identification of risk factors during pregnancy based on a comprehensive approach. In modern obstetric practice, early detection of risk factors is one of the key tasks in ensuring maternal and fetal health. The main objective of the study is to explore the possibilities of preventing pregnancy complications through observation, screening, communicative approaches, and preventive measures in midwifery practice. The research methods included analysis of scientific literature, observation, surveys, and generalization of statistical data. The results indicate that timely identification of risk factors by midwives contributes to a reduction in pregnancy complications as well as maternal and perinatal mortality rates.*

Keywords: *obstetrics, pregnancy, risk factors, early identification, prevention, maternal and child health.*

Kirish

Bugungi kunda sog‘liqni saqlash tizimida ona va bola salomatligini muhofaza qilish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Homiladorlik fiziologik jarayon bo‘lishiga qaramasdan, ayrim hollarda turli xavf omillari bilan kechishi mumkin. Ushbu xavf omillari o‘z vaqtida aniqlanmasa, homiladorlik va tug‘ruq jarayonida jiddiy asoratlar yuzaga keladi.

Akusherlik amaliyotida xavf omillarini erta aniqlash – bu nafaqat tibbiy bilim, balki mas’uliyat, kuzatuvchanlik va professional yondashuvni talab etadigan jarayondir. Akusher homilador ayol bilan doimiy aloqada bo‘lib, uning jismoniy, psixologik va ijtimoiy holatini baholaydi. Aynan shu jarayonda akusher homiladorlikning normal yoki patologik kechishini erta bosqichda aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, homiladorlik davrida yuzaga keladigan asoratlarning katta qismi aynan erta aniqlash va profilaktik choralar orqali oldini olish mumkin. Shu bois, akusherning roli faqat yordamchi sifatida emas, balki mustaqil va muhim tibbiy mutaxassis sifatida baholanadi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot davomida sifat va miqdoriy tahlil usullaridan foydalanildi. Ilmiy ish quyidagi metodlar asosida olib borildi:

Birinchidan, mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Akusherlikda xavf omillari, ularni erta aniqlash usullari va akusherning kasbiy faoliyatiga oid ilmiy manbalar o‘rganildi.

Ikkinchidan, klinik kuzatuv metodi qo‘llanildi. Ayollar maslahatxonalarida ro‘yxatda turgan homilador ayollarning tibbiy kartalari tahlil qilinib, xavf omillarining aniqlanish vaqti va natijalari o‘rganildi.

Uchinchidan, so‘rovnoma metodi orqali akusherlarning kasbiy faoliyatida xavf omillarini aniqlash bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalari baholandi.

Olingan ma’lumotlar statistik jihatdan umumlashtirildi va tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari homiladorlik davrida xavf omillarini aniqlashda akusherlik faoliyatining samaradorligini baholash imkonini berdi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, akusher tomonidan muntazam kuzatuv va skrining tadbirlari olib borilgan homilador ayollarda asoratlar sezilarli darajada kam uchraydi. Xususan, xavf omillari erta aniqlangan ayollarda homiladorlikning og‘ir shakllari kamroq qayd etilgan.

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, akusherlar tomonidan qon bosimi, tana vazni, laborator ko‘rsatkichlar va homilaning rivojlanish holatini doimiy nazorat qilish preeklampsiya, kamqonlik, gestatsion diabet kabi holatlarni erta aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, psixologik holatni baholash ham muhim natijalarni ko‘rsatdi. Akusher bilan ochiq muloqotda bo‘lgan homilador ayollarda stress va xavotir darajasi pastroq bo‘lib, bu holat homiladorlikning ijobiy kechishiga ta’sir ko‘rsatgan.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, akusherlik faoliyatida xavf omillarini erta aniqlash ona va bola salomatligini saqlashda samarali profilaktik choralar ko‘rishga imkon beradi.

Muhokama. Olingan natijalar mavjud ilmiy tadqiqotlar bilan uyg‘unlikda ekanligini ko‘rsatadi. Ko‘plab tadqiqotchilar homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlash perinatal asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, akusher faqat klinik belgilarni emas, balki homilador ayolning ijtimoiy va psixologik holatini ham baholashi zarur. Chunki stress, noto‘g‘ri ovqatlanish va turmush sharoiti ham homiladorlik kechishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, akusherning kommunikativ kompetensiyasi ham muhim rol o‘ynaydi. Bemor bilan ishonchli muloqot o‘rnatilgan hollarda homilador ayollar o‘z holati haqida to‘liq ma’lumot beradi, bu esa xavf omillarini o‘z vaqtida aniqlash imkonini oshiradi.

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, akusherlik amaliyotida uzluksiz ta’lim, zamonaviy diagnostika usullarini qo‘llash va profilaktik yondashuvni kuchaytirish zarur.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlashda akusherning roli beqiyosdir. Tadqiqot natijalari akusherlik faoliyatida erta tashxis va profilaktikaning ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi.

Akusher tomonidan olib boriladigan muntazam kuzatuv, skrining va bemor bilan samarali muloqot homiladorlik asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, akusherlarning kasbiy malakasini oshirish, kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy tibbiy texnologiyalarni amaliyotga joriy etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO, 2016.
2. Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., et al. Williams Obstetrics. 25th ed. New York: McGraw-Hill, 2018.

3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Akusherlik va ginekologiya bo‘yicha klinik protokollar. Toshkent, 2021.
4. Lawn J.E., Blencowe H., Oza S. et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. *The Lancet*, 2014; 384(9938): 189–205.
5. Fraser D.M., Cooper M.A. Myles textbook for midwives. 16th ed. Elsevier, 2019.
6. Gabbe S.G., Niebyl J.R., Simpson J.L. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 7th ed. Elsevier, 2017.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Guidelines for prenatal care. Washington DC, 2020.
8. Say L., Chou D., Gemmill A. et al. Global causes of maternal death. *The Lancet Global Health*, 2014; 2(6): e323–e333.

Axrorov M. N.
assistant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Usarov A.A.
dotsent
Toshkent kimyo xalqaro universiteti
Samarqand, O‘zbekiston

HAYVOINLAR KATTA QORNIDA KECHADIGAN HAZM JARAYONLARIGA PAST INTENSIV LAZER NURI BILAN TA’SIRI

Annotatsiya. *Chorvachilikning bilan shug‘ullanuvchi fermer xo‘jaliklarining asosiy maqsadi, ekologik noqulay sharoitda mayda shoxli yaylov hayvonlarining yashovchanligini uzaytirish, olinadigan go‘sht mahsulotini miqdorini oshirish hamda sifatini yaxshilagan holda bozorni ekologik toza chorvachilik mahsulotlari bilan ta’minlash muammosini ijobiy yechimiga qaratilgan. Ma’lumki, tog‘ va tog‘oldi yaylovlarida urchitilayotgan ona qo‘y va echkilardan o‘rtacha 50%:50% nisbatda urg‘ochi va erkak qo‘zi, uloqlar olinadi. Bunday qo‘zilarni, 4,5-5,0 oyligida onasidan ajratilib alohida podalarda boqish ma’lum darajada qo‘zilar organizmida stress holatlarini keltirib chiqaradi hamda ularning o‘sish va rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan. Intevsiv texnoligiyarini yaratilish sohaning rivojida sezilarli darajada ta’sirini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *tajriba, ta’sir, tug‘ilgan, qo‘shimcha, ozuqa, iste’mol, energatik bilrligi, hazm, protein, mikroorganizm, faollik.*

Akhrorov M. N.
assistant
Samarkand State Medical University
Usarov A.A.
dotsent
Tashkent International University of Chemistry
Samarkand, Uzbekistan

EFFECTS OF LOW-INTENSITY LASER LIGHT ON DIGESTIVE PROCESSES IN THE RUMEN OF ANIMALS

Abstract. *The main goal of livestock farms is to extend the lifespan of small-horned grazing animals in adverse environmental conditions, increase the quantity and quality of meat products obtained, and provide the market with environmentally friendly livestock products, which is aimed at a positive solution. It is known that from mother sheep and goats bred in mountain and foothill pastures, an average of 50%:50% of female and male lambs and kids are obtained. It has been established that keeping such lambs in separate herds, separated from their mothers at 4.5-5.0 months of age, causes stress in the lambs' bodies to a certain extent and has a*

negative effect on their growth and development. The creation of intensive technology has a significant impact on the development of the industry.

Key words: *experience, impact, born, supplement, feed, consumption, energy capacity, digestion, protein, microorganism, activity.*

Kirish. Dunyoning chorvachilik rivojlangan mamlakatlarida sanoat asosida urchitilayotgan chorva mollari hayot faoliyatining turli bosqichlarida genetik jihatdan yuqori va sifatli mahsuldorlikka erishish maqsadida lazer texnologiyalaridan foydalanish juda samarali ekanligi ko‘rsatib berilgan. Boshqa biologik usullarga nisbatan biofizikaviy usullarning ustuvor tomoni shundaki, ko‘rsatiladigan ta’sir, ayniqsa past intensivlikdagi lazer nurlanishi hayvon organizmiga ko‘p tomonlama ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, jumladan kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini hamda mahsuldorligini oshiradi[1,2].

Lekin, O‘zbekiston sharoitida sutdan ajratilgan qo‘zilar organizmida noqulay ozuqaviy va iqlimiy omillar ta’sirida, qator stresslar natijasida qo‘zilar tomonidan yaylov ozuqalarini iste’mol qilinishi, tarkibidagi moddalarni hazm bo‘lishi va o‘zlashtirilishi kabi jarayonlarga lazer nurining ta’sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmagan[3,4].

Usullar. Tadqiqot ishining maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda past intensivlikdagi lazer nurlanishi bilan ta’sir ko‘rsatilgan va ta’sir ko‘rsatilmagan qo‘chqorchalardan har birida 21 boshdan 2 ta (nazorat va tajriba) guruhlari tashkil etildi. Tajriba guruhi qo‘chqorchalari 3-15 kunlik vaqtida past intensivlikdagi lazer nurlanishi bilan 1,5 daqiqa davomida har kuni 2 marta ayrisimon bez joylashgan sohaga ta’sir ko‘rsatilganligi bilan nazorat guruhidan farq qildi. Qolgan barcha tajribalarni amalga oshirish bo‘yicha texnologik jarayonlar bir xilda amalga oshirildi. Jumladan har ikkala guruhdagi qo‘chqorchalar tug‘ilgan vaqti, tirik massasi, rangi va jinsi bo‘yicha bir xil bo‘lib, oziqlantirish va parvarishlash jarayonlari mos holda amalga oshirildi[5,6].

Natijalar. Tajribadagi har ikkala guruh qo‘chqorchalarining har biriga yaylov ozuqalariga qo‘shimcha ravishda kechqurun yaylovdan qaytganidan keyin o‘rtacha 200 grammdan arpa yormasi va 400 grammdan har xil o‘tlar pichani bilan oziqlantirildi. Oziqlantirish davomida arpa yormasi to‘liq iste’mol qilingan bo‘lsa, turli o‘tlar pichanidan oxirlarda o‘rtacha nazorat guruhida 80-95 grammgacha qoldiq qolgan bo‘lsa, tajriba guruhida esa bu ko‘rsatkich 43-48 grammni tashkil qilib, 50% ga ko‘p iste’mol qilganligi aniqlandi. Muvozanat tajribalarining hisobga olish davrida har guruhda 5 boshdan qo‘zilarda tajribalar davom ettirilib, moddalarning hazm bo‘lishi va katta qorindagi mikrobiologik va biokimyoviy jarayonlar tahlil qilindi[7,8].

Katta qorin suyuqligining kislotali faolligi LPU-01 potensiometrida, uchuvchi yog‘ kislotalarining (UYoK) umumiy miqdori Markgamm apparatida, bijg‘ish kislotalarining fraksiyalari (sirka, propion va moy) gaz+suyuqlikli xromatografiyada, umumiy va oqsilli azotlar esa Keldal bo‘yicha, oqsilsiz azotning miqdori umumiy azotdan-oqsilli azotni ayirish yo‘li bilan aniqlandi.

Qo‘shimcha oziqlantirish boshlanganidan keyin qo‘chqorchalar umuman yaylovdan ozuqalar iste’mol qilmay qo‘ydi, faqat suv iste’mol qilishdi. Oziqlantirish davomida iste’mol qilingan ozuqalarning quruq moddasi uning tarkibidagi to‘yimli moddalar hisobga olindi. Iste’mol qilingan quruq modda nazorat guruhida 0.430 kg, tajriba guruhida 0.472 kg, Ozuqaning energetik birligi nazorat guruhida 0.36 hamda tajriba guruhida 0.39, Almashinuvchi energiya nazorat guruhida 4.21 Mj va tarriba guruhida esa 4.24 Mj, Hazmlanuvchi protein nazorat guruhida 34.4 gr, tajriba guruhida esa 37.2 gr bi ashkil etdi. O‘tkazilgan tajribalar vaqtida tajribadagi qo‘chqorchalarga tezak xalta bog‘lanib, kunduzi yaylovda poda bilan boqildi, kechqurun esa podadan ajratib olinib qo‘shimcha ozuqalar bilan oziqlantirilib ertalab yana poda bilan yaylovga haydaldi. Yaylovga haydalishdan avval tezak xaltasidagi qiyning 10-15% kimyoviy tahlil uchun namuna sifatida olindi. 7 kunlik muvozanat tajribasi davomida qo‘shimcha ravishda, iste’mol qilingan ozuqalar miqdori nazorat guruhi qo‘chqorchalarida 0,430 kg ni tashkil etgan bo‘lsa, tajriba guruhi qo‘chqorchalarida bu ko‘rsatkich 0,472 kg ni tashkil etdi. Bu esa nazorat guruhiga nisbatan 9,77% ga ko‘p iste’mol qilganligi ko‘rsatdi[9].

Использованные источники:

1. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на организм животных// Известия КарГУ. Научно-теоретический, методический журнал. 2024 (1)1. 186-192 с.
2. Ахроров М.Н. Применение биофизических методов в живот-новодстве. Золотой мозг. Узбекистан. Том 1. Выпуск 27. 2023. С. 97-102.
3. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Методы повышения продуктивности рогатых жвачных животных в мае. ВЕСТНИК Каракалпакского отделения Академии наук РУз. 2023 г. № 4 (273) с. 9-13.
4. Ахроров М.Н. Влияние кратковременного низкоинтенсивного лазерного облучения на мясную продуктивность молодняка ягнят// Научный вестник НамГУ. Выпуск 5, 2022. С. 65-70.
5. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Методы и критерии повышения продуктивности мелкорогих жвачных животных. Мыслитель. Узбекистан. № 1. 1.04.2022. С. 153-158.
6. Раджамуродов З.Т., Джалилов М.Х., Ахроров М.Н., Джалилов Х.М. Влияние лазерных лучей мощностью до 10 Вт/см 2 на иммунную систему животных. Американский журнал сельскохозяйственной и биомедицинской инженерии. США.12 ноября 2021. С. 1-5.
7. Ахроров М.Н. Влияние биофизических методов на процесс пищеварения у лямблий. Центральноазиатский журнал медицинских и естественных наук. Казахстан. Том 2. Ноябрь-декабрь 2021 г. С. 452-455.
8. Раджамуродов З.Т., Джалилов М.Х., Ахроров М.Н. Возможность повышения естественной резистентности организма каракульских ленов биофизическими методами. Американский журнал сельского хозяйства и биомедицинской инженерии. Том 3. Март 2021. С. 12-16. ISSN 2689-1018.

Axrorov M. N.
assistant
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Usarov A.A.
dotsent
Toshkent kimyo xalqaro universiteti
Abdusattorov E. S.
SamDTU Akademik litsey talabasi
Samarqand, O‘zbekiston

PAST INTENSIV LAZER NURINING HAYVOINLAR ORGANIZMIDA KECHADIGAN HAZM JARAYONLARIGA TA’SIRI

Annotatsiya. *Tog‘ va tog‘oldi yaylovlarida urchitilayotgan ona qo‘y va echkilardan o‘rtacha 50%:50% nisbatda urg‘ochi va erkak qo‘zi, uloqlar olinadi. Lekin keyingi yillarda naslchilik ishlarini o‘z holiga tashlab qo‘yilishi hisobiga jahon qorako‘l teri auksionlarida O‘zbekistonda yetishtiriladigan terilar orasida raqobatbardosh teri navlarining keskin kamayib borayotganligi, ayniqsa sifatli qorako‘l teri olish uchun so‘yilishi mumkin bo‘lgan qo‘zilar soni kamayib, so‘yilganida ham terisi sotilmay qoladigan holatlar kuzatilmoqda. Intevsiv texnoligiyarini yaratilish sohaning rivojida sezilarli darjada ta’sirini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *vodorod, kavsh qaytarish, tug‘ilgan, qo‘shimcha, ozuqa, ishtaha, sirka, hazm, propion, yog‘, faol.*

Akhrorov M. N.
assistant
Samarkand State Medical University
Usarov A.A.
dotsent
Tashkent International University of Chemistry
Abdusattorov E. S.
student
Academic Lyceum
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

THE EFFECT OF LOW-INTENSITY LASER RADIATION ON DIGESTIVE PROCESSES IN ANIMALS

Annotation. *On average, 50%:50% of male and female lambs and kids are obtained from sheep and goats raised on mountain and foothill pastures. However, in recent years, due to the cessation of breeding efforts, the number of competitive leather varieties among the skins raised in Uzbekistan for global Karakul skin auctions has sharply decreased. The number of lambs that can be slaughtered to*

produce high-quality Karakul skins has particularly decreased, and even after slaughter, the skins are not sold. The development of intensive technologies has had a significant impact on the development of the industry.

Key words: *hydrogen, chewing gum, birth, supplement, feed, appetite, vinegar, digestion, propionic acid, fat, active.*

Kirish. O‘zbekiston sharoitida sutdan ajratilgan qo‘zilar organizmida noqulay ozuqaviy va iqlimiy omillar ta’sirida, qator stresslar natijasida qo‘zilar tomonidan yaylov ozuqalarini iste’mol qilinishi, tarkibidagi moddalarni hazm bo‘lishi va o‘zlashtirilishi kabi jarayonlarga lazer nurining ta’sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmagan[1,2].

Qo‘zilarni sog‘lom, hayotchanligini saqlab qolish bilan birga ularning mahsuldorligini oshirish, bozorni ekologik jihatdan toza, yuqori sifatli raqobatbardosh qo‘zi go‘shti bilan boyitish muammosi hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida eng dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylanib ulgurdi[3,4].

Usullar. Qo‘chqorchalarda kavsh qaytarish jarayoni odatda kechki oziqlanish tamomlanganidan keyin 30-36 daqiqa o‘tgach boshlandi, bir kechada 4-6 marta kavsh qaytarish jarayoni kuzatildi va ularning har biri o‘rtacha 22-25 daqiqa davom etdi. So‘ngra 35-65 daqiqa davom etuvchi tinchlik davridan keyin yana kavsh qaytarish jarayoni boshlandi. Tajribalarni kuzatish natijalariga ko‘ra kavsh qaytarish jarayonlari tajriba guruhi qo‘chqorchalarida nazorat guruhidagiga nisbatan 8-12% ga ortiq davom etishi aniqlandi. [5,6].

Natijalar. Solishtirilayotgan har ikkala guruhlar qo‘chqorchalari katta qornida 5 daqiqa davomida 6-8 marta ruminatsiya qayd qilindi. Ruminatsiya sindromi qayta ishlanmagan yoki hazm bo‘lmagan ovqatni olib kelishiga, uni yana chaynashiga va keyin ovqatni yutib yuborishiga yoki tupurishiga olib keladi.Katta qorin suyuqligidagi vodorod ionlarining konsentratsiyasi ma’lum darajada hayvonlarning ishtahasiga, ya’ni ozuqalarning iste’mol qilinishiga o‘zining ta’sirini ko‘rsatishi aniqlangan[109; 42-49-b.].

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, lazer nurining ta’siri natijasida kavsh qaytarish jarayonini ortishi so‘lak ajratilishini ko‘payishiga, katta qorinda hazm bo‘lish jarayonni yaxshilashiga imkoniyat yaratadi deb hisoblaymiz. Shu boisdan har ikkala guruhlarda natijalar bir-birlaridan farq qildi va bu jarayon katta qorin suyuqligi mikroorganizmlarini faoliyati uchun qulaylik tug‘dirdi deb hisoblaymiz.

Ratsion tarkibining faqat dag‘al ozuqalardan iborat bo‘lishi katta qorinda pH ning darajasini oshishini ta’minlash bilan birga so‘lak ajralishini kuchaytiradi. Bu esa o‘z navbatida katta qorinning qo‘shimcha ravishdagi buferlik himoyasini ta’minlaydi. Kislotalilikning bunday ko‘rsatkichi so‘lak bilan tushayotgan bikarbonatlarni va natriy fosfatining tushishi hisobiga yaratiladi. Katta qorindan kislotalarning evakuatsiyalanishi natijasida ximus bilan ichakka o‘tishi va qonga so‘rilishi hamda katta qorin suyuqligining buferlik xususiyatlari bilan ta’minlanadi. Bundan tashqari, katta qorin suyuqligining muhiti neytralga yaqin bo‘lganida (pH 6,4-6,8), undagi mikrofloraning rivojlanishi uchun juda qulay sharoit yaratiladi[7,8].

Tajriba guruhi qo‘chqorchalari katta qornida hosil bo‘lgan UYoK miqdori va undagi sirka kislotasining ulushi nazorat guruhiga nisbatan 12,73% ga va 5,1% ga yuqori ekanligi aniqlandi. Nazorat guruhida hosil bo‘lgan UYoK fraksiyalari me’yor darajasida bo‘lishi kuzatilgan bo‘lsa, tajriba guruhi qo‘chqorchalarida propion kislotasining ulushini ortishi moy kislotasining ulu-shini kamayishi hisobiga yuz berdi, bu esa bizning nazarimizda moy kislotasi-ning ulushini kamayishi ularni to‘qimalar tarkibida joylashgan va hayvonlar tirik massasining ortishini ta’minlovchi yog‘lar sifatida sarflangan bo‘lishi mumkin. pH ko‘rsatkichi bo‘yicha nazorat guruhida 6.51% bo‘lsa tajriba guruhida 6.78%, Uchuvchi yog‘ kislotalar nazorat guruhida 9.82 mMol/ml, tajriba guruhida 11,07 mMol/ml, Sirka nazorat guruhida 64.5% bo‘lsa tajriba guruhida 67.8%, Propion nazorat guruhida 23.6% bo‘lsa tajriba guruhida 29.9%, Moy nazorat guruhida 11.7% bo‘lsa tajriba guruhida 7.77% ni tashkil qildi[9].

Использованные источники:

1. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на организм животных// Известия КарГУ. Научно-теоретический, методический журнал. 2024 (1)1. 186-192 с.
2. Ахроров М.Н. Применение биофизических методов в животноводстве. Золотой мозг. Узбекистан. Том 1. Выпуск 27. 2023. С. 97-102. ISSN 2181-4120.
3. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Методы повышения продуктивности рогатых жвачных животных в мае. ВЕСТНИК Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 2023 г. № 4 (273) с. 9-13.
4. Ахроров М.Н. Влияние кратковременного низкоинтенсивного лазерного облучения на мясную продуктивность молодняка ягнят// Научный вестник НамГУ. Выпуск 5, 2022. С. 65-70.
5. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Методы и критерии повышения продуктивности мелкорогих жвачных животных. Мыслитель. Узбекистан. № 1. 1.04.2022. С. 153-158. ISSN 2181-3310.
6. Раджамуродов З.Т., Джалилов М.Х., Ахроров М.Н., Джалилов Х.М. Влияние лазерных лучей мощностью до 10 Вт/см 2 на иммунную систему животных. Американский журнал сельскохозяйственной и биомедицинской инженерии. США. 12 ноября 2021. С.1-5. ISSN 2689-1018.
7. Ахроров М.Н. Влияние биофизических методов на процесс пищеварения у лямблий. Центральноазиатский журнал медицинских и естественных наук. Казахстан. Том 2. Ноябрь-декабрь 2021 г. С. 452-455. ISSN 2660-4159.
8. Раджамуродов З.Т., Джалилов М.Х., Ахроров М.Н. Возможность повышения естественной резистентности организма каракульских ленов биофизическими методами. Американский журнал сельского хозяйства и биомедицинской инженерии. Том 3. Март 2021. С. 12-16. ISSN 2689-1018.
9. Раджамуродов З.Т., Ахроров М.Н. Влияние кратковременного низкоинтенсивного лазерного излучения на мышечные реакции молодых ягнят. Журнал стрессовой физиологии и биохимии РАН. Т. 19, № 2, 2023, С. 5-10. ISSN 1997-0838.

Berdiyev F.O.
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi
Toshkent amaliy fanlar universiteti

ERKIN KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: *Ushbu maqola erkin kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish masalalarini tadqiq qiladi. Ilmiy manbolar tahliliga ko'ra, yuqori malakali sportchilarda texnik-taktik tayyorgarlik individual xususiyatlar, kombinatsiyalarni shakllantirish qobiliyati va raqib strategiyasini hisobga olgan holda rivojlantirilishi kerak.*

Kalit so'zlar: *erkin kurash, texnik-taktik tayyorgarlik, individual yondashuv, kombinatsiyalar, musobaqa oldi tayyorgarlik, maxsus mashqlar, noan'anaviy mashqlar, koordinatsion qobiliyatlar, yuqori malaka.*

Berdiyev F.O.
senior lecturer
Department of Preschool Education Methodology
Tashkent University of Applied Sciences

IMPROVING THE TECHNICAL-TACTICAL TRAINING OF FREESTYLE WRESTLERS

Annotation: *This article examines the issues of improving the technical-tactical training of freestyle wrestlers. According to the analysis of scientific sources, technical-tactical training in highly qualified athletes should be developed taking into account individual characteristics, the ability to form combinations and the opponent's strategy.*

Keywords: *freestyle wrestling, technical-tactical training, individual approach, combinations, pre-competition training, special exercises, non-traditional exercises, coordination skills, high qualification.*

Kirish. Erkin kurash – tezkor qarorlar qabul qilish, strategik tafakkur va yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qiladigan murakkab sport turi hisoblanadi. Zamonaviy kurashchilarning muvaffaqiyati faqatgina kuch va chidamlilik bilan cheklanib qolmay, balki texnik-taktik tayyorgarlik darajasi bilan bevosita bog'liqdir [3,9]. Yuqori malakali sportchilarda mashg'ulot jarayonida individual yondashuv va texnik-taktik ko'rsatkichlarni hisobga olish, musobaqa oldi tayyorgarlikni optimallashtirish, shuningdek, kombinatsion va noan'anaviy mashqlar majmuasidan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erkin kurashchilarda texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega: har bir sportchining individual xususiyatlarini hisobga olgan mashg'ulot rejasi,

koordinatsion va tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish, murakkab kombinatsion harakatlarni bajarish qobiliyatini oshirish va musobaqaoldi strategik tayyorgarlikni tizimli amalga oshirish [1,5]. Shu bilan birga, boshqa sport kurash turlaridagi usullarni o‘rganish va noan’anaviy mashqlar orqali texnik-taktik ko‘nikmalarni rivojlantirish sportchilarning taktik hujum imkoniyatlarini kengaytiradi va musobaqadagi qiyin vaziyatlarda samarali harakat qilishga yordam beradi [6,8].

Hozirgi vaqtda malakali erkin kurashchilarning tayyorgarligi faqat jismoniy va texnik jihatlarga bog‘liq bo‘lmasdan, ularning strategik va taktik qarorlar qabul qilish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi. Shu sababli texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirishda maxsus mashqlar, individual yondashuv va musobaqaoldi kombinatsion strategiyalarni qo‘llash muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Ushbu maqola mazkur muammoni chuqur o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, erkin kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishning ilmiy asoslangan metodlarini taklif etadi.

Asosiy qism. 1. Texnik tayyorgarlikni takomillashtirish. Erkin kurashchilarning texnik tayyorgarligi – bu turli texnik harakatlarni to‘liq va samarali bajarish qobiliyatidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, texnik tayyorgarlikni rivojlantirishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Maxsus mashqlar majmuasi – turli tutishlar, tashlashlar va himoya harakatlarini o‘z ichiga olgan kompleks mashqlar. Bu sportchilarga musobaqa sharoitida tezkor va aniq harakat qilish imkonini beradi [2].

2. Individial yondashuv – har bir sportchining kuchi, chidamliligi va texnik imkoniyatlariga moslashtirilgan mashg‘ulotlar. Bu usul natijasida texnik xatoliklar kamayadi va kombinatsion harakatlar samaradorligi oshadi [5].

3. Noan’anaviy mashqlar – standart mashg‘ulotlardan farqli bo‘lib, murakkab harakatlar, balans va koordinatsiyani rivojlantiradi. Shu bilan sportchilar musobaqadagi kutilmagan vaziyatlarda moslashuvchanlik ko‘rsatadi [7].

Texnik tayyorgarlikni baholashda harakatlarning aniqligi, tezligi va samaradorligi asosiy indikator sifatida olinadi. Shuningdek, har bir texnik elementni bajarishdagi xatoliklarni tahlil qilish va moslashtirilgan mashqlarni joriy etish samaradorlikni oshiradi. [4].

2. Taktik tayyorgarlikni rivojlantirish. Taktik tayyorgarlik – bu sportchining musobaqa davomida to‘g‘ri strategik qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Erkin kurashchilarda taktik tayyorgarlikni shakllantirishning asosiy jihatlari:

1. Musobaqaoldi strategiya – raqibning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, harakat rejasi tuzish. Bu sportchining vaziyatga moslashuvchanligini oshiradi [6].

2. Kombinatsion harakatlar –bir nechta texnik elementlarni birlashtirib bajarish. Bu taktika sportchining hujum va himoya qobiliyatini uyg‘unlashtiradi.

3. Real vaziyatlarda mashqlar – musobaqaga yaqin sharoitlarda taktik mashqlarni bajarish, stressga chidamlilik va tezkor qaror qabul qilishni rivojlantiradi.

Taktik tayyorgarlikni baholashda sportchining musobaqa davomida qabul qilgan qarorlari, vaziyatni tahlil qilish tezligi va hujum-himoya kombinatsiyalarining samaradorligi asosiy mezon hisoblanadi.

3. Texnik va taktik tayyorgarlikni birlashtirish. Yuqori natijalarga erishish uchun texnik va taktik tayyorgarlik bir-birini to‘ldirishi lozim. Shu maqsadda mashg‘ulotlar quyidagi yo‘nalishlarda olib boriladi:

- Texnik elementlarni kombinatsion tarzda takrorlash.
- Musobaqa sharoitida real vaqtli qaror qabul qilishni rivojlantiruvchi mashqlar.
- Individual va guruh mashg‘ulotlari orqali strategik tafakkur va tezkor reaktsiyani rivojlantirish.

Bu metodlar orqali sportchilar faqat texnik jihatdan mukammal bo‘lib qolmay, balki musobaqadagi taktika va strategiyasini ham samarali amalga oshirish qobiliyatiga ega bo‘ladilar.

Xulosa. Erkin kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligi sportdagi muvaffaqiyatning asosiy omili hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki:

1. Maxsus mashqlar majmuasi va noan’anaviy mashqlar texnik tayyorgarlikni samarali rivojlantiradi.
2. Individial yondashuv va musobaqaoldi strategik tayyorgarlik sportchilarning taktik qaror qabul qilish qobiliyatini oshiradi.
3. Texnik va taktik tayyorgarlikni birlashtirish natijasida sportchilar kombinatsion harakatlarni samarali bajarish va musobaqadagi murakkab vaziyatlarga moslashish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Erkin kurashchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy asoslangan metodlari nafaqat individual imkoniyatlarni oshiradi, balki sportchilarning yuqori natijalarga erishishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, noan’anaviy mashqlar, maxsus tayyorgarlik mashqlari va ko‘p bosqichli kombinatsiyalarni qo‘llash sportchilarning musobaqa oldi tayyorgarligini samarali. Shuningdek, ko‘p turdagi kurash usullarini o‘zlashtirish va koordinatsion imkoniyatlarni rivojlantirish texnik-taktik harakatlarning samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Adilov S.K. – Erkin kurash sportchilarining koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlari samaradorligini oshirish texnologiyasi//: diss.avtoref., 2020.
2. Artiqov Z.S. – Belbog‘li kurashchilarni texnik xarakatlarga o‘rgatishda noananaviy mashqlar yordamidan foydalanish uslubiyati//Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori: diss.avtoref., 2023.
3. Azizov N.N. – Yuqori malakali kurashchilarning musobaqaoldi tayyorgarlik jarayonida yuklamalar shiddatini aniqlash uslubiyati. Sportda ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2024. - 1-son. – Б.16-22.)
4. Berdiyev F. O. 15-16 YOSHLI ERKIN KURASHCHILARNING “YELKALARDAN OSHIRIB TASHLASH” TEXNIK USULINI BAJARISHDAGI KINEMATIKSINING INDIVIDUAL KO ‘RSATKICHLARI //Экономика и социум. – 2025. – №. 6-2 (133). – С. 184-190.
5. Isayev I.B. – Belbog‘li kurashda musobaqa oldi tayyorgarligni optimallashtirish va takomilashtirish// diss.avtoref., 2023.

6. Jarilkapov U.B. – Kurashchilarning jismoniy va taktik tayyorgarligini rivojlantirish masalalari. Fan-Sportga jurnali. 2023. 2 –son. – B. 110-112.)
7. Tastanov N.A. – Malakali yunon-rim kurashchilarining taktik tayyorgarligini aylanma uslub yordamida rivojlantirish. Fan-Sportga jurnali. 2023. 2 -son. - B. 20-27.)
8. Tursunov Sh.S. – Yunon-rim kurashchilarining texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish// diss.avtoref., 2019.
9. Primbetov A.A. – Erkin kurashchi qizlarning musobaqa oldi taktik tayyorgarlikni rivojlantiruvchi mashqlar majmuasini tashkillashtirish. Sportda ilmiy tadqiqotlar jurnali. Chirchiq. 2023. - 4-son. – Б.68-71.)

Berdiev Sh.O.
dosent
Sarbon universiteti

PARALIMPIYA HARAKATINI YANADA RIVOJLANTIRISH – ISTIQBOLI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Paralimpiya harakatining jamiyatdagi o‘rni, imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishdagi ahamiyati hamda ushbu sohani rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, sportchilar uchun yaratilgan sharoitlar va inkluziv sport muhitini shakllantirish masalalari yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Paralimpiya, inkluzivlik, adaptiv sport, reabilitatsiya, motivatsiya, sport infratuzilmasi.*

Berdiev Sh.O.
docent
Sarbonne University

PROSPECTS FOR THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE PARALYMPIC MOVEMENT

Abstract. *The article presents a comparative analysis of the psychophysical state of young tennis players with cerebral palsy (CP) and healthy tennis players. The study is based on the analysis of anthropometric indicators and psychophysical characteristics of these groups of athletes. The paper examines adaptation to training and competitive activities, as well as differences in the level of physical, tactical, and theoretical preparedness. The results make it possible to identify factors influencing the effectiveness of sports performance in young tennis players with disabilities.*

Keywords: *adaptation, competitions, effectiveness, indicators, tactical training, theoretical training, comparative analysis.*

Kirish. Keyingi yillarda O‘zbekistonda va butun dunyoda paralimpiya harakatiga, imkoniyati cheklangan sportchilarni qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan e’tibor tubdan o‘zgardi. Bu shunchaki sport musobaqalari emas, balki jamiyatning ijtimoiy tenglik va inson qadriga bo‘lgan munosabati ramziga aylandi. Paralimpiya harakati nafaqat yuqori natijalar sporti, balki inson irodasi va teng imkoniyatlar ramzidir. Bugungi kunda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatga integratsiyalashuvida sport eng samarali vositalardan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston misolida so‘nggi yillarda Paralimpiya o‘yinlarida qo‘lga kiritilayotgan natijalar ushbu sohani ilmiy va amaliy jihatdan rivojlantirishni taqozo etmoqda.

1948 yil Germaniyalik shifokor Lyudvig Gutman Bakingemshir grafligiga qarashli Stok-Mandevil shahrida umurtqasi shikastlangan nogironlar uchun ham

jismoniy ham ijtimoiy reabilitatsiya sifatida sport musobaqalarini tashkil etish g‘oyasini ilgari suradi. Aynan shu yili Buyuk Britaniyada o‘tkazilgan Olimpiada o‘yinlaridan so‘ng Lyudvig Gutman boshchiligida Stok-Mandevil o‘yinlariga asos solinadi. Dastlabki musobaqada atiga 16 nafar jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar ishtirok etadi. Ezgulik yo‘lidagi bu tashabbus oradan o‘n ikki yil o‘tib, xalqaro sport forumiga aylantiriladi. Ya’ni, 1960 yili Rimda 1 yozgi Paralimpiya o‘yinlariga asos solinadi. Musobaqalarda 23 davlatdan 400 nafar sportchilar yengil atletika, suzish, qilichbozlik, basketbol, kamondan otish, stol tennisi kabi sport turlari bo‘yicha g‘oliblik uchun bahs yuritishgan. Oradan to‘rt yil o‘tib, II Paralimpiya o‘yinlariga Tokio shahri mezbonlik qiladi. Mazkur musobaqalarda 22 davlatdan kelgan 390 nafar paralimpiyachilar sportning 11 turi bo‘yicha g‘oliblik uchun bahs olib bordi.

1963 yil ko‘zi ojizlar, amputantlar va umurtqa pog‘onasi shikastlangan shaxslar uchun xalqaro sport musobaqalarini o‘tkazishni ta’minlash maqsadida Xalqaro nogironlar sporti tashkiloti (XNST) tashkil qilindi. 1989 yilga kelib, qishki va yozgi Paralimpiya o‘yinlarini o‘tkazadigan Xalqaro tashkilot – Xalqaro Paralimpiya Qo‘mitasi (XPQ) tashkil topdi. Hozirgi kunga kelib, 162 ta davlat Milliy Paralimpiya Qo‘mitalari va 4 ta maxsus nogironlar sporti federatsiyasi Xalqaro Paralimpiya Qo‘mitasiga a’zo. 2006 yil O‘zbekiston Nogironlar sport assosiatsiyasi ham Xalqaro Paralimpiya qo‘mitasiga a’zo bo‘ldi va dunyo miqyosida tan olindi.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan shaxslar uchun sport bilan professional yoki havaskor darajada shug‘ullanish uchun keng yo‘llar ochilgan. Shu nuqtaiy naszardan hukumat tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2021 yil 18-maydagi “Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5114-sonli, 2022 yil 30-dekabrdagi “Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 731-sonli va 2025 yil 11-dekabrdagi “Paralimpiya sport turlarini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-373-sonli qarorlarini keltirishimiz mumkin.

Yurtimizda Prezidentimiz rahnamoligida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari va jismoniy imkoniyati cheklangan yoshlarimizni har jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning ta’lim olishi, sport bilan shug‘ullanishi, kasb sirlarini puxta egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ayniqsa, mamlakatimizda paralimpiya harakatini rivojlantirish, uning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, sportchilarimizning xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etishini ta’minlash maqsadida zarur shart-sharoitlar yaratib berilmoqda.

O‘zbekistonda Milliy Paralimpiya assosiatsiyasi 2007 yil 27 fevralda tashkil topgan bo‘lib, shu bugunga kelib assosiatsiya Markaziy Osiyoda eng faol Paralimpiya tashkilotiga aylandi. Osiyo Paralimpiya qo‘mitasining 2010 yil Guanchjouda bo‘lib o‘tgan Bosh assambleyasida mamlakatimiz paralimpiya uyushmasi Markaziy Osiyodagi eng faol va rivojlangan uyushma, deb topilgani har bir yurtdoshimiz qalbiga faxr va iftixor tuyg‘ularini jo etadi.

Parij shahri mezbonligida o‘tgan XVII yozgi Paralimpiya o‘yinlari ham tarix sahifalaridan joy oldi. Osiyo davlatlari orasidi uchinchi, MDH mamlakatlari orasida ikkinchi, Islom davlatlari orasida esa birinchi o‘rinni egalladik.

2024-yil 28-avgustdan 8-sentabrga qadar Parij shahri mezbonligida o‘tgan XVII yozgi Paralimpiya o‘yinlari ham tarix sahifalaridan joy oldi.

To‘rt yillikning eng nufuzli musobaqasida dunyoning 182 davlatidan jami 4400 nafar matonatli atletlar 549 ta medallar jamlanmasi uchun bahs olib borishdi. Ular orasida O‘zbekiston paralimpiya terma jamoasi ham munosib tarzda ishtirok etib, tarixiy natijaga erishdi.

O‘zbekiston terma jamoasi 10 ta oltin, 9 ta kumush, 7 ta bronza, jami 26 ta medal bilan Parij-2024 Paralimpiya o‘yinlarida umumjamoa hisobida 13-o‘rinni egalladi.

Davlatimiz tomonidan sohaga qaratilayotgan e’tibor, yaratib berilayotgan shart-sharoitlarga javoban, o‘zbek paralimpiya sportchilari oldindagi nufuzli musobaqalarda yanada yuqori natijalarni qayd etib, Vatanimiz nomini xalqaro arenalarda munosib himoya qilishlariga ishonamiz.

Xulosa. Paralimpiyachilarimizning har bir muvaffaqiyati mamlakatimiz bayrog‘ini yuksaltirish bilan birga, xalqaro hamjamiyatda O‘zbekistonning inklyuziv jamiyat qurish borasidagi qat’iy siyosatini namoyon etmoqda. Davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan g‘amxo‘rlik, zamonaviy sport majmualarining qurilishi va moddiy rag‘batlantirish tizimi paralimpiyachilarni jamiyatning to‘laqonli va faol a’zolariga aylantirdi. Endilikda paralimpiya sporti havaskorlik darajasidan professional industrial bosqichga ko‘tarildi. Maxsus metodikalar, ilmiy yondashuv va hududiy seleksiya ishlari O‘zbekistonni jahon paralimpiya xaritasida yetakchi davlatlardan biriga aylantirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2021 yil 18-maydagi “Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5114-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022 yil 30-dekabrdagi “Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 731-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2025 yil 11-dekabrdagi “Paralimpiya sport turlarini yanada rivojlantirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-373-son qarori.

Berdiyeva D.A.
assistant
Department of Microbiology, Virology, and Immunology
Bukhara State Medical Institute
Nuridinov A.M.
assistant
Department of Epidemiology
Samarkand State Medical University

IMPROVING STRATEGIES FOR THE CONTROL AND PREVENTION OF MEASLES TRANSMISSION

Abstract: *Measles is a highly contagious viral disease that remains a significant global public health concern despite the availability of an effective vaccine. Periodic outbreaks continue to occur due to gaps in immunization coverage, population mobility, and vaccine hesitancy. Strengthening preventive measures and improving control strategies are essential to reduce morbidity and prevent complications and deaths. This analytical review article discusses the epidemiology of measles transmission, modern prevention approaches, and ways to optimize public health interventions aimed at limiting the spread of the disease.*

Keywords: *measles, transmission, prevention, vaccination, epidemiology, public health*

Introduction

Measles is an acute viral infection caused by the measles virus, a member of the genus *Morbillivirus*. It is one of the most contagious infectious diseases known, with a basic reproduction number (R_0) often exceeding 12–18. The virus spreads primarily through airborne droplets and small aerosol particles that can remain suspended in the air for extended periods.

According to the World Health Organization, measles remains a leading cause of vaccine-preventable deaths among young children worldwide, particularly in regions with low immunization coverage. Although global vaccination campaigns have significantly reduced incidence and mortality, outbreaks continue to occur due to incomplete vaccination, disruptions in routine immunization services, and population displacement.

Clinically, measles is characterized by high fever, cough, conjunctivitis, Koplik spots, and a generalized maculopapular rash. Complications such as pneumonia, encephalitis, and severe diarrhea contribute substantially to morbidity and mortality, especially in malnourished children and immunocompromised individuals.

Because of its extreme transmissibility, measles requires exceptionally high levels of herd immunity—typically above 95%—to interrupt transmission. Even small declines in vaccination coverage can lead to rapid outbreaks. Therefore,

improving preventive strategies and optimizing control measures are critical components of measles elimination efforts.

Materials and Methods

This article is based on an analytical review of scientific publications, international guidelines, and epidemiological recommendations. No original clinical or experimental research was conducted. The focus was placed on mechanisms of measles transmission, current preventive measures, and strategies for strengthening public health interventions.

Results

Review of the literature indicates several key directions for improving measles prevention and control.

1. Strengthening Routine Immunization

The measles-containing vaccine (MCV) remains the most effective preventive tool. Ensuring timely administration of two doses significantly reduces susceptibility in the population. Strengthening primary healthcare systems and maintaining cold chain logistics are essential for vaccine effectiveness.

2. Supplementary Immunization Activities

Mass vaccination campaigns help close immunity gaps, especially in areas with low routine coverage. These activities are particularly important during outbreaks or in humanitarian settings.

3. Epidemiological Surveillance

High-quality surveillance systems allow early detection of cases and rapid response. Laboratory confirmation and case-based reporting improve accuracy in monitoring disease trends.

4. Public Awareness and Risk Communication

Addressing vaccine hesitancy through community engagement, education, and transparent communication is critical. Misinformation can significantly undermine immunization programs.

5. Infection Control Measures

Isolation of suspected cases, use of personal protective measures in healthcare settings, and rapid contact tracing help limit transmission during outbreaks.

Discussion

Measles transmission reflects the interaction between viral characteristics, population immunity, and health system performance. The virus's ability to spread through the air and infect susceptible individuals with minimal exposure makes control particularly challenging.

From a public health perspective, vaccination remains the cornerstone of prevention. However, maintaining high coverage is increasingly complex due to migration, urbanization, conflict, and vaccine hesitancy. Strengthening immunization programs requires not only vaccine supply but also trust in healthcare systems and community participation.

Outbreaks often reveal weaknesses in surveillance and response systems. Early detection of clusters allows rapid containment measures such as targeted

vaccination, temporary school closures, and intensified community outreach. Integration of laboratory confirmation improves reliability of epidemiological data.

The COVID-19 pandemic demonstrated how disruptions in routine immunization can quickly lead to resurgence of measles. This highlights the need for resilient health systems capable of sustaining essential services during emergencies.

International organizations, including the Centers for Disease Control and Prevention, emphasize that elimination of measles is achievable only through sustained high vaccination coverage, robust surveillance, and rapid outbreak response. Preventive strategies must be continuously adapted to demographic changes and emerging challenges.

Conclusion

Improving measures to control measles transmission requires a comprehensive approach combining high vaccination coverage, effective surveillance, rapid outbreak response, and strong community engagement. Strengthening these components enhances population immunity and reduces the risk of future outbreaks. Sustained political commitment and international cooperation remain essential for achieving long-term measles elimination goals.

References

1. World Health Organization. Measles Fact Sheet. WHO.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Measles (Rubeola). CDC.
3. Moss W.J. Measles. *The Lancet*. 2017;390:2490–2502.
4. Strebel P.M., Orenstein W.A. Measles. *New England Journal of Medicine*. 2019;381:349–357.
5. Gastañaduy P.A., et al. Public health responses during measles outbreaks. *Journal of Infectious Diseases*. 2021.
6. Muxammadiyevich N. A. Origin, Lifestyle, Development And Against Viruses And Bacteria That Endanger Our Life Struggle //Genius Repository. – 2023. – T. 24. – C. 16-21.
7. Muhammadiyevych N. A. et al. FUNDAMENTALS OF ENSURING HEALTH LEVEL AND LIFE ACTIVITY SAFETY OF YOUNG CHILDREN //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 5. – C. 141-144.
8. Muxammadiyevich N. A., Muxiddinovana M. G. YUQUMLI KASALLIKLAR BILAN OG ‘RIGAN BEMORLAR PARVARISHINING UMUMIY QOIDALARI //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – T. 31. – №. 2. – C. 7-11.
9. Muhamadievich N. A., Kodirvich B. D. Patriotic Education as one of the Components Of National Security. Eurasian Scientific Herald 6, 88-90 [Электронный ресурс].
10. Qodirovich B. D. et al. VIRUSLI GEPATIT A NING OLDINI OLISH VA EPIDEMIOLOGIYASI //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – T. 33. – №. 1. – C. 94-97.
11. Muhammadiyevich N. A. THE ROLE OF HYGIENE IN THE PREVENTION OF ILLNESS AND DISEASE

Bo‘ronboyeva R.
Rabbimova Sh.
Abdusamatova N.
tibbiyot yo’nalishi 103-guruh talabalari
Boshqaruv va menejment fakulteti fundamental
SamDTU
Abduxalilova Shoxsanam
205-guruh talabasi
Biotexnalogiya, injenering va farmatsiya fakulteti
SamDTU
Xudoyqulov J. I.
tibbiy kimyo kafedrasi assistenti
SamDTU

OQ PION ILDIZI (PAEONIAE RADIX) NING FARMAKOLOGIK VA TIBBIY AHAMIYATI

Annotatsiya: *Oq pion ildizi (Paeonia lactiflora Pall.), an’anaviy Xitoy va Yaponiya (Kampo) tibbiyotida keng qo‘llaniladigan dorivor o‘simliklardan biridir. Ushbu maqolada oq pion ildizining kelib chiqishi, kimyoviy tarkibi, biologik faol moddalari, farmakologik xususiyatlari hamda zamonaviy tibbiyotdagi o‘rni ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Xususan, paeoniflorin va unga yaqin birikmalarning asab tizimi, immun tizimi, yallig‘lanish jarayonlari, yurak-qon tomir va jigar faoliyatiga ta’siri yoritib beriladi. Shuningdek, oq pion ildizining qo‘llash shakllari, xavfsizligi va istiqbolli ilmiy yo‘nalishlari muhokama qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *Oq pion ildizi, Paeonia lactiflora, Paeoniae Radix, paeoniflorin, fitoterapiya, farmakologiya.*

Bo‘ronboyeva R.
student of Group 103
Rabbimova Sh.
student of Group 103
Abdusamatova N;
student of Group 103
Faculty of Management and Administration,
Fundamental Medicine Program
Abduxalilova Sh.
student Group 205
Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
Xudoyqulov J. I.
assistant
Department of Medical Chemistry
SamDTU

WHITE PEONY ROOT (PAEONIAE RADIX): PHARMACOLOGICAL AND MEDICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *White peony root (Paeonia lactiflora Pall.) is one of the medicinal plants widely used in traditional Chinese and Japanese (Kampo) medicine. This article analyzes, based on scientific sources, the origin of white peony root, its chemical composition, biologically active compounds, pharmacological properties, and its role in modern medicine. Particular attention is given to the effects of paeoniflorin and related compounds on the nervous system, immune system, inflammatory processes, cardiovascular system, and liver function. In addition, the forms of application, safety aspects, and promising directions for future scientific research on white peony root are discussed.*

Keywords: *white peony root, Paeonia lactiflora, Paeoniae Radix, paeoniflorin, phytotherapy, pharmacology.*

Kirish

Dorivor o‘simliklar insoniyat tarixida kasalliklarni davolash va sog‘liqni mustahkamlashda muhim o‘rin tutib kelgan. Ular orasida pion ildizi — *Paeoniae Radix* (PR) Sharq tabobatida alohida ahamiyatga ega. An’anaviy Xitoy tibbiyotida PR ikki asosiy turga bo‘linadi: oq pion ildizi (White Peony Root, WPR) va qizil pion ildizi (Red Peony Root, RPR). Oq pion ildizi asosan qon yetishmovchiligi, hayz sikli buzilishlari, mushak spazmlari va asabiy holatlarda qo‘llanilgan bo‘lsa, qizil pion ildizi ko‘proq qon stazi va yallig‘lanishli kasalliklarda ishlatilgan.

Yapon Kampo tibbiyotida *Paeonia lactiflora* ildizi yuqori farmakologik ahamiyatga ega bo‘lib, u Kampo formulalarining qariyb uchdan bir qismiga kiritilgan. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar oq pion ildizining an’anaviy qo‘llanilishini ilmiy jihatdan asoslab, uning biologik faol moddalarga boyligini va ko‘p yo‘nalishli terapevtik ta’sirini tasdiqlamoqda.

Botanika tavsifi va farmakopeya talablari

Oq pion (*Paeonia lactiflora Pall.*) Paeoniaceae oilasiga mansub ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, asosan ildizi dorivor xomashyo sifatida ishlatiladi. Xitoy farmakopeyasiga ko‘ra, oq pion ildizi qaynatilgan va tozalangan *P. lactiflora* ildizi sifatida tavsiflanadi. Yapon farmakopeyasida esa PR kamida 2,0% paeoniflorin saqlovchi *P. lactiflora* ildizi bo‘lishi shart.

PR asosan Xitoydan import qilinadi, biroq Yaponiya va ayrim boshqa mamlakatlarda cheklangan miqdorda mahalliy yetishtirish ham mavjud. Qayta ishlash usullaridagi farqlarga qaramay, WPR va PR farmakologik jihatdan deyarli bir xil xomashyo hisoblanadi.

Kimyoviy tarkibi

Oq pion ildizining kimyoviy tarkibi murakkab bo‘lib, uning terapevtik ta’siri biologik faol moddalarning majmuaviy ta’siri bilan bog‘liq.

Monoterpen glikozidlar

Asosiy faol modda — paeoniflorin bo‘lib, u oq pion ildizining farmakologik xususiyatlarini belgilaydi. Bundan tashqari, albiflorin, benzoylpaeoniflorin va

oksipaeoniflorin ham uchraydi. Ushbu birikmalar yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi va spazmolitik ta’sirga ega.

Fenolik birikmalar va flavonoidlar

Paeonol va fenolik kislotalar kuchli antioksidant va antibakterial ta’sir ko‘rsatadi. Flavonoidlar (quercetin va kaempferol hosilalari) qon tomir devorlarini mustahkamlab, yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi.

Boshqa moddalar

Oq pion ildizi tarkibida taninlar, polisaxaridlar, shakarlar (glyukoza, saxaroza), organik kislotalar hamda kaliy, kalsiy, magniy, temir va rux kabi mineral moddalar mavjud.

Farmakologik xususiyatlari

Asab tizimiga ta’siri

Paeoniflorin markaziy asab tizimiga tinchlantiruvchi ta’sir ko‘rsatib, stress, bezovtalik va uyqusizlik holatlarini kamaytiradi. Zamonaviy tadqiqotlar uning neyroprotektiv xususiyatga ega ekanini ko‘rsatmoqda.

Yallig‘lanishga qarshi va og‘riq qoldiruvchi ta’siri

Oq pion ildizi yallig‘lanish mediatorlarining faolligini pasaytiradi, mushak va ichki a’zolar spazmlarini bo‘shashtiradi. Bu xususiyatlar uni hayz og‘riqlari va mushak spazmlarida samarali vosita qiladi.

Immunomodulyator va gepatoprotektiv ta’siri

Polisaxaridlar immun tizimini me’yorlashtiradi, paeoniflorin esa jigar hujayralarini toksik ta’sirlardan himoya qiladi.

Yurak-qon tomir tizimiga ta’siri

Flavonoidlar va fenolik birikmalar qon aylanishini yaxshilab, tomirlar mustahkamligini oshiradi va yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlaydi.

Qo‘llash shakllari

Oq pion ildizi qaynatma, damlama, quruq ekstrakt, suyuq ekstrakt va murakkab fitopreparatlar tarkibida qo‘llaniladi. Shuningdek, tashqi qo‘llash uchun kompress va yuvishlar shaklida ham foydalaniladi.

Zamonaviy tadqiqotlar va istiqbollar

So‘nggi yillardagi ilmiy izlanishlar oq pion ildizining ichak–miya o‘qiga, autoimmun jarayonlarga va teri salomatligiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatmoqda. Uning antioksidant va immunomodulyator xususiyatlari yangi dorivor preparatlar yaratishda istiqbolli yo‘nalish sifatida baholanmoqda.

Xulosa: Oq pion ildizi (*Paeonia lactiflora*) biologik faol moddalarga boy bo‘lib, asab tizimini tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi va immunomodulyator xususiyatlarga ega. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar uning an’anaviy tibbiyotdagi o‘rnini tasdiqlab, kelajakda farmakologiyada yangi imkoniyatlar ochishini ko‘rsatmoqda. Shu bois, oq pion ildizi kompleks davolashda yordamchi, ammo qimmatli fitoterapevtik vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Kholmurodova, D. K., & Khudoykulov, Z. I. (2023). Use of Waste in the National Economy. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, *25*, 160-162.

2.Амирова, П. Ж., & Худойқулов, Ж. (2025). ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД. *Research Focus*, *4*(1), 148-152.
3.Холмуродова, Д. К., Исломов, Л. Б., & Худойкулов, Ж. И. (2023). ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, *3*(33), 277-281.
4.Икромова, Ш. А., & Худойқулов, Ж. И. (2024). ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. *Research Focus*, *3*(11), 146-150.
5.Zoyirova, S. J., Samadova, M. A., & Xudoyqulov, J. I. (2025). CHILONJIYDA O ‘SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. *Экономика и социум*, (7-1 (134)), 341-343.
6.Икромова, Ш. А., & Худойқулов, Ж. И. (2025). ПОЛЬЗА АНТИОКСИДАНТОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНЕ. *Экономика и социум*, (4-1 (131)), 1361-1365.
7.Inomovich, X. J. (2025). FERMENTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ULARNING QO’LLANILISHI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 285-291.
8.Inom o’g’li, X. J. (2025). BIOLOGIK FAOL KOMPLEKS BIRIKMALAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 319-325.
9.Vozhehova, R., Borovyk, V., & Ubaydullaev, J. (2025). Inheritance of yield and fiber length in hybrids cotton of the first generation F1. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 151, p. 04001). EDP Sciences.
10.Xayrullayeva, D. M., Davronova, M. P., Xalimov, B. J., & Ubaydullaev, J. N. (2024). KOLLOID ERITMALARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA QONNING KRIOSKOPIYA USULIDA MUZLASH HARORATINI ANIQLASH. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, *4*(4-1), 272-276.
11.Ubaidullaev, J. N., Vakhin, A. V., Katnov, V. E., Trubistina, S. A., & Mukhamadiev, N. K. (2023). Assessments of Chemical Composition and Properties High-Viscosity Oil Based on Elemental. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, *4*(5), 332-339.
12.Холмуродов, Т. А., Мирзаев, О. О., & Убайдуллаев, Ж. Н. (2023). КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. In *Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа* (pp. 62-63).
13.Дустмуродов, М. М. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, (9), 42-47.
14.Дустмуродов, М. М. У. (2022). КВАЛИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗАГЛАВНЫХ ЭПИТЕТОВ В ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИХ НАДПИСЯХ. *Проблемы современной науки и образования*, (9 (178)), 42-47.

УДК 616-018

Dinmukhammadieva D.R., PhD
Department of Children's Diseases in Family Medicine
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan
Israilova N. A., PhD
associate professor
Department of Children's Diseases in Family Medicine
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan
Nazarov B. S.
assistant
№ 1-Department of Histology and
Medical Biology of Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan

APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MULTIMODAL MODELS IN THE ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN IMMUNE SYSTEM ORGANS AND CLINICAL DIAGNOSTICS

Annotation: *The relevance of this study is обусловлена the need to enhance the objectivity of analyzing morphofunctional changes in the organs of the immune system. Generative artificial intelligence and multimodal models represent promising tools for the automation and quantitative interpretation of morphological and clinical data. The aim of this work is to substantiate the application of AI in assessing structural changes in lymph nodes and the spleen. Based on an analytical review, it is demonstrated that generative models improve image quality and expand data samples, while multimodal systems enable comprehensive analysis. The importance of data standardization and algorithm validation is emphasized.*

Key words: *Generative AI, multimodal models, lymph nodes, spleen.*

Relevance. The relevance of this study lies in the need to improve the objectivity and accuracy of analyzing morphofunctional changes in the organs of the immune system. Lymph nodes and the spleen are sensitive indicators of physiological and pathological processes, yet traditional histological methods remain labor-intensive and subjective. Generative artificial intelligence and multimodal models offer opportunities for automation, quantitative tissue assessment, and integration of morphological and clinical data, which requires scientific justification and standardization of approaches.

Research Aim. The aim of this study is to provide a theoretical and methodological justification for the application of generative artificial intelligence and multimodal models in the analysis of morphofunctional changes in lymph nodes

and the spleen, as well as to evaluate their potential for improving the accuracy and informativeness of clinical diagnostics of immune system disorders.

Research Methods. The study employed a comprehensive analytical approach, including a review of current morphological, clinical, and interdisciplinary research on the structure of lymph nodes and the spleen, as well as the potential of generative artificial intelligence and multimodal models in biomedical imaging. Methods of information synthesis and integration were used to correlate morphofunctional changes in immune organs with data from digital AI models, including quantitative assessment of morphological parameters, image analysis, and interpretation of clinical data. This approach allowed for the identification of the advantages and limitations of AI applications and the determination of promising directions for further research.

Research Results

Analysis of current data has shown that generative artificial intelligence models enable the expansion of training datasets and improve the quality of digital histological images, allowing for more accurate detection of morphofunctional changes in lymph nodes and the spleen. Computer vision algorithms automate tissue segmentation and quantitative assessment of follicles, lymphocyte populations, and vascular changes, reducing subjectivity in interpretation. Multimodal models provide integration of morphological, clinical, and laboratory data, enhancing diagnostic informativeness and revealing latent patterns not accessible through traditional methods. The results confirm the potential of AI for comprehensive and quantitative analysis of immune organs and support in clinical diagnostics.

Conclusion

The study demonstrated that generative artificial intelligence and multimodal models are promising tools for analyzing morphofunctional changes in immune organs and supporting clinical diagnostics. Generative models improve image quality and reveal hidden morphometric patterns, while multimodal systems integrate morphological, clinical, and laboratory data. This approach enhances the objectivity, accuracy, and reproducibility of research, providing a basis for more informative and personalized diagnostic strategies.

References

1. Bommasani, R., et al. (2022). On the opportunities and risks of foundation models. Journal of Machine Learning Research, 23(1), 1–87.
2. Brown, T. B., et al. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901.
3. Махмудова, Ш. И., & Хужамуратова, Д. Х. (2025). МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ. PEDAGOG, 8(12), 11-14.
4. Махмудова, Ш. И., & Хужамуратова, Д. Х. (2025). СЕЛЕЗЁНКА КАК ЛИМФОИДНЫЙ ОРГАН: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РОЛЬ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ. PEDAGOG, 8(12), 15-18.

5. Abdusalomova, M. A., & Nazarov, B. S. (2025). MODDALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA LIMFA TUGUNLARINING MORFOGENEZI. Экономика и социум, (11-2 (138)), 24-27.
6. Tursunkulova, L. Q., & Nazarov, B. S. (2025). METABALIK SINDIROMDA TALOQNING MORFOGENEZI. Экономика и социум, (11-1 (138)), 595-598.
7. Abdulqosimova, S. K., & Nazarov, B. S. (2025). METABOLIK SINDROMDA MARKAZIY IMMUN HIMOYA A'ZOLARINING MORFOGENEZI. Экономика и социум, (11-1 (138)), 18-21.
8. Каримджанов, И. А., Толипова, Н. К., Динмухаммадиева, Д. Р., Юсупова, Г. А., & Исроилова, Н. А. (2021). ЛАКТОЗНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА. Экономика и социум, (9 (88)), 433-439.
9. Динмухаммадиева, Д. Р. (2025). ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ У ПОДРОСТКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. SHOKH LIBRARY, 1(11).
10. Тоджиев, С. Б., Рузиева, З. Б., Махмудова, Ш. И., & Хужамуратова, Д. Х. (2025). СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ ПРИ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Экономика и социум, (12-1 (139)), 907-910.
11. Muxammadiyeva, M. B., & Nazarov, B. S. (2025). YURAKNING GISTOLOGIK TUZILISHI. YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI. Экономика и социум, (5-1 (132)), 1656-1659.

Djuraeva A.A.
assistant
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Bukhara state medical Institute
named after Abu Ali Ibn Sina
Uzbekistan

IMPROVEMENT OF METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF CANDIDIASIS IN YOUNG CHILDREN

Annotation: *The article deals with issues fluconazole in treatment of candidiasis the children in early age.The article discusses risk factors for this disease, particular clinic,the ways of using, dose of antifungal drug treatment fluconazole.*

Key words*: the children in early age, candidiasis, fluconazole.*

In recent years, interest in the role of fungal flora in the pathology of the child's body has increased several times [2, 5]. among the medical staff of children's institutions, candidiasis reaches 45%, which is of great importance for exogenous (nosocomial) infection of children [3, 4]. It is proven that on care items (nipples, bottles, toys) and food. . Candidiasis is a chronic recurrent disease caused by yeast-like fungi of the genus Candida and difficult to treat [1].

The aim of the study was to evaluate the clinical efficacy of the drug fluconazole in the treatment of candidiasis in newborns and young children.

Materials and method research:

196 children of the first year of life who applied to the Bukhara regional children's dental clinic were under observation. Based on our examination, Candida infection was detected in 89 (45.4%) patients. Among them, 41 (46 %) boys and 48 (54 %) girls (2/3 of children – the first six months of life). The patients were divided into three groups. The first group – 35 children (39.3%) with oral mucosal candidiasis, the second group – 29 children (33%) with skin candidiasis, the third group – 25 children (28%) with combined mucosal and skin lesions. Candidiasis of the oral mucosa usually does not require General therapy, it is enough to conduct only local treatment. raditionally, treatment of the affected areas with 5-10% borax solutions in glycerin, aniline dyes, and 2% sodium bicarbonate solution was used for this purpose. Currently, the possibilities of local therapy have significantly expanded. If local treatment was ineffective, the drug fluconazole was used orally or intravenously as indicated.

Results of the study and their discussion:

in 17 (49%) newborns and young children with common oral candidiasis, fluconazole was used at the rate of 3-5 mg/kg of body weight per day in 3 doses. The diagnosis of candidiasis was both independent and concomitant with other infectious pathology. Depending on the degree of skin damage (Candida diaper rash

– 11 (38%), total damage to the entire body surface – 7 (28%), children received both local and fluconazole therapy.

Fluconazole was prescribed at the rate of 5-6 mg / kg of body weight once a day. The duration of the course was determined by the severity of the skin lesion. With local therapy, the effect occurred on the 6-7 th day, when taking fluconazole – on the 3-4 th day from the start of therapy. In the case of combined oral mucosal lesions with candidiasis of other parts of the gastrointestinal tract, 10 (14.4%) children received fluconazole orally, and 7 (10.1%) – intravenously. Clinical observation showed that the initial therapeutic effect was observed in more than 2/3 of patients on the 2nd day, and in the rest – by the end of the 1st day of drug use. Complete sanitation of the oral cavity in most children is achieved within 3-4 days of therapy. Clinical studies have shown that [1]. 6 (39.3%) patients reported the disappearance or significant decrease in the severity of symptoms of the disease on the very next day after the use of the drug fluconazole. Three patients needed a longer course, up to 5-7 days. This group consisted of children with candidiasis of the gastrointestinal tract and with long-term antibacterial therapy. High clinical efficacy, short course of treatment, low frequency of side effects allow prescribing fluconazole at the first manifestations of candidiasis in newborns and young children. In all patients treated with fluconazole, there was a good tolerability of the drug, no side effects and allergic reactions. Catamnestic observation for three months did not reveal relapses of Candida infection.

Conclusions:

the Drug fluconazole is an effective and safe agent for the treatment of candidiasis in newborns and young children, helps to reduce the duration of symptoms of the disease and the duration of hospital stay. The effect of therapy is determined primarily by the professionalism of the doctor in the optimal choice of antimicotic and methods of its use in a particular patient, as well as the creation and maintenance of the necessary motivation in compliance with full and regular treatment. The active desire of the patient to cure, careful implementation of all the recommendations prescribed by the doctor is the most important prerequisite for a successful course of treatment.

LITERATURE

1. Антонов А.Г., Приходько Н.А., Анкирская А.С. и др. Лечение грибковой инфекции у недоношенных детей //Рос.вестн. перинатол. и педиатр. - 2012. - №5. - С.13-16.
2. Самсыгина Г. А., Буслаева Г. Н., Конюшин М. А. Кандидоз новорожденных и детей раннего возраста: Пособие для врачей. – М., 2006. – 40 с. – С. 124.
3. Celik I.H., Demirel G., Oguz S.S. et al. Compassionate use of voriconazole in newborn infants diagnosed with severe invasive fungal sepsis // Eur. Rev. Med.Pharmacol. Sci. - 2013 Mar. - Vol. 17(6). - P. 729-734.
4. Greenberg R.G., Benjamin D.K., Gantz M.G. et al. Empiric Antifungal Therapy and Outcomes in Extremely Low Birth Weight Infants with Invasive Candidiasis // J.Pediatr.- 2012. - Vol. 161. - P. 264-269.

5. Wynn J.L., Tan S., Gantz M.G. et al. Outcomes following candiduria in extremely low birth weight infants// Clin. Infect. Dis. - 2012. - Vol. 54(3). - P. 331-339.
6. Alkhars, N., Gaca, A., Zeng, Y., Al-Jallad, N., Rustchenko, E., Wu, T. T., Eliav, E., & Xiao, J. (2023). *Antifungal susceptibility of oral Candida isolates from mother-infant dyads to nystatin, fluconazole, and caspofungin*. Journal of Fungi, 9(5), 580. https://doi.org/10.3390/jof9050580
7. Rundjan, L., Wahyuningsih, R., Oeswadi, C. A., et al. (2020). Oral nystatin prophylaxis to prevent systemic fungal infection in very low birth weight preterm infants: A randomized controlled trial. *BMC Pediatrics, 20*, 170. https://doi.org/10.1186/s12887-020-02074-0
8. Pappas, P. G., Kauffman, C. A., Andes, D., et al. (2016). *Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America*. Clinical Infectious Diseases, 62(4), e1-e50.
9. Centers for Disease Control and Prevention. (2025). *Pediatric opportunistic infections: Candida infections (NIH clinical guidelines)*. U.S. Department of Health and Human Services.
10. Kakoschke, S. C., Fleschutz, S., Ruff, E., Dichtl, K., Groeger, M., Schoen, C., Otto, S., & Kakoschke, T. K. (2025). *Pediatric Candida manifestations in the orofacial region: A retrospective analysis of different forms, risk factors and species distribution.* Journal of Fungi, 11(5), 363. https://doi.org/10.3390/jof11050363
11. Daniel, K. (2023). *Diagnosis and management of neonatal invasive candidiasis*. *Therapeutics and Clinical Risk Management*, 19, 123-132.
12. Cornely, O. A., et al. (2024). *Global guideline for the diagnosis and management of Candida infections (Lancet Infectious Diseases)*. The Lancet Infectious Diseases.

UDC: 618.1 [618.14 – 618.145] 618.14-008.6

Dustova N.K., Doctor of Medical Sciences (DSc)
associate professor
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina.
https://orcid.org/0000-0003-0707-5673
Yangiyeva S.U., Master of science
Department of Obsetetrics and Gynecology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina.
https://orcid.org/0009-0004-2915-7527
Nazarova G.Kh.
professor
head of Department
Samarkand Zarmed Institute
Samarkand Uzbekistan

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS

Abstract: *Despite the progress achieved in studying the etiopathogenesis, as well as in developing new diagnostic and therapeutic methods for endometrial hyperplastic processes (EHP), the problem of treating patients with this pathology still remains far from being fully resolved. This necessitates optimization of management strategies for patients with EHP during the menopausal transition period (MTP), which should be aimed not only at creating adequate comprehensive approaches for predicting the development and recurrence of endometrial hyperplasia (EH), but also at developing unified protocols for managing patients with this pathology.*

Keywords: *hyperestrogenism, proliferation, apoptosis.*

Relevance

According to clinical statistics, in recent years there has been a progressive increase in the incidence of endometrial cancer. Approximately 150,000 new cases of uterine body cancer are diagnosed worldwide every year, and about 42,000 women die from this tumor annually. The peak incidence is observed at the age of 65–69 years and reaches 68.7 per 100,000 women. In 20–25% of patients, the disease is diagnosed during reproductive age, and in 5% of cases — in women younger than 40 years. Most morphologists, gynecologists, and oncologists consider endometrial cancer to be closely associated with endometrial hyperplastic processes (EHP).

Despite numerous studies, the molecular biological mechanisms underlying the development of endometrial hyperplasia (EH) remain incompletely understood. At present, there is no consensus regarding the key triggering pathogenetic factors

of proliferative processes in the endometrium, which leads to empirical therapeutic measures and the absence of a unified treatment strategy for EHP in women. This does not allow a significant reduction in the incidence of this pathology.

Currently, a close relationship between the reproductive and immune systems has been established [1]. According to several researchers, natural autoantibodies (auto-Abs), interacting with the body's own molecules, contribute to immune control and regulation of antigenic-molecular homeostasis and, together with macrophages, play a significant role in regulating apoptosis [3]. The use of multiparametric analysis of serum auto-Abs content, aimed at detecting secondary immunological changes, has expanded diagnostic capabilities and substantiated a differentiated approach to the treatment of pregnancy complications such as miscarriage, preeclampsia and eclampsia, and postpartum hemorrhage [2].

At present, there are no studies in the available global scientific literature assessing autoimmune parameters in patients with EHP. This dictates the need to investigate the autoimmune status in women with EH during the menopausal transition period in order to identify specific changes in regulatory auto-Abs levels and to apply them as biomolecular markers for predicting the development of EH, the risk of recurrence, and for implementing a differentiated treatment approach.

The problem of endometrial hyperplastic processes (EHP) during the menopausal transition period (MTP) remains one of the most relevant issues in gynecology due to the high prevalence of this pathology in women of this age group. Persistent interest in this issue is explained by the tendency of EHP toward a prolonged, recurrent course, the absence of specific pathognomonic symptoms, difficulties in differential diagnosis, and the complexity of choosing optimal treatment methods. According to clinical attendance data, the incidence of endometrial hyperplasia varies depending on its form and the woman's age from 10% to 30%, significantly increasing during periods of age-related hormonal restructuring [3].

From modern perspectives, EH is regarded as a polyetiological pathological process, the development and progression of which may be influenced by many diverse factors. The pathogenesis of EHP is characterized by a complex interaction of systemic processes (neuroendocrine, metabolic, and immune) and local changes (receptor status and genetic apparatus of endometrial cells), as well as the involvement of biologically active substances, growth factors, markers of proliferation and apoptosis, etc. Having different degrees of severity, EHP often becomes a favorable background for the development of precancer and subsequently endometrial cancer (EC) [4].

From current perspectives, endometrial hyperplasia is considered a polyetiological pathological process, whose development and progression may be facilitated by numerous causes. The main risk factors for endometrial hyperplastic processes and endometrial cancer include menstrual cycle disorders caused by anovulation, lipid metabolism disorders, prolongation of the reproductive period due to early menarche and late menopause, endocrine infertility, polycystic ovary syndrome, estrogen-secreting ovarian tumors, and others.

Endometrial hyperplastic processes remain of great scientific, medical, and social importance due to their frequency, reproductive dysfunction, and the lack of adequate treatment methods. Abnormal uterine bleeding, which is the most common clinical manifestation of EH, is the most frequent reason for visiting a gynecologist and ranks second among gynecological problems leading to hospitalization [6].

Treatment issues cover a wide range of conservative and surgical methods. However, in young women wishing to preserve reproductive function (in the absence of cellular atypia), conservative therapy remains relevant, with hormonal therapy playing a leading role. Therefore, hormonal influence on hyperplastic endometrium has not lost its clinical significance. Endometrial hyperplasia is known to be a consequence of absolute or relative hyperestrogenism and progesterone deficiency, which leads to excessive (uncontrolled) cell division and reduced apoptosis [5].

The classical therapy for endometrial hyperplasia, aimed at counteracting estrogen influence, is the administration of progestins. Progesterone has an antiproliferative effect on the mitotic activity of endometrial cells. Progestins reduce the number of estrogen receptors and accelerate their catabolism by stimulating 17β-hydroxysteroid dehydrogenase and sulfotransferase, thereby reducing estrogen dominance in the hormonal background that leads to endometrial hyperplasia.

However, recent clinical trial reports have demonstrated side effects of these drugs during long-term use, associated with their androgenic activity: increased plasma insulin concentration, decreased serum HDL levels, increased LDL levels, vasoconstriction, blockade of nitric oxide synthase action, etc.

At present, based on the analysis of gynecological inpatient departments, it is important to develop principles for determining a medical strategy in the treatment of EH, especially regarding the choice of conservative treatment methods in women of reproductive age. In this direction, consideration of psychosomatic disorders appears promising, the frequency of which ranges from 30% to 57% among women seeking care in antenatal clinics.

Endometrial hyperplastic processes represent a large group of histological changes in endometrial glands and stroma, forming the basis for the development of neoplastic processes in the uterus. One of the most significant factors directly associated with the risk of this pathology is the perimenopausal period, when the frequency of hormone-dependent diseases increases.

Endometrial hyperplastic processes are among the most common causes of uterine bleeding and hospitalization. The issue of malignant transformation risk remains open. According to domestic and international studies, the risk of malignancy in different variants of EHP is determined by the morphological condition of the endometrium and depends primarily on the severity of cellular atypia, and to a lesser extent on age, ovarian status, concomitant endocrine disorders, and other factors [6]. It has been proven that histopathological and molecular changes reflect the potential risk of EH progressing to endometrial cancer.

The complexity of the etiopathogenesis of EHP creates significant difficulties in selecting treatment methods. This explains the lack of unified recommendations regarding the choice of medication, dosage, and optimal duration of therapy, which is often inadequate and results in EH recurrences [7]. Thus, despite progress achieved in the study of etiopathogenesis, new diagnostic and therapeutic methods, the problem of treating patients with this pathology still remains far from being solved. This dictates the need to optimize management tactics for patients with EHP during the menopausal transition period, aimed not only at creating comprehensive approaches for predicting EH development and recurrence, but also at developing unified protocols for managing such patients.

Endometrial hyperplastic processes: etiology and pathogenesis

Endometrial hyperplastic changes represent a serious problem in gynecology. These conditions belong to proliferative diseases that may contribute to the development of endometrial cancer if timely treatment is not provided. Modern data indicate an increasing incidence of endometrial cancer.

Endometrial hyperplastic processes occupy a significant place in the structure of gynecological diseases, occurring with a frequency ranging from 15% to 40%. Statistics show that depending on the form of the disease and the patient's age, the frequency of EHP ranges from 10% to 30%. According to studies, about half of all women in late reproductive age and perimenopause face this pathology. However, the risk of malignant transformation remains controversial. Studies show that in patients with recurrent forms of EHP, the probability of invasive uterine cancer development reaches 20–30% [8].

Approximately 150,000 new cases are recorded annually worldwide, with about 42,000 deaths. The highest incidence is observed in women aged 65–69 years, reaching 68.7 per 100,000 women. In reproductive age, the disease is detected in 20–25% of women, and in 5% — before the age of 40 [7]. The importance of the association between EHP and endometrial cancer is emphasized by leading specialists in morphology, gynecology, and oncology.

The World Health Organization classification introduced in 1994 and reaffirmed in 2003 divided endometrial hyperplasia into simple and complex without atypia, and simple and complex with atypia. In simple hyperplasia without atypia, glands of various sizes and shapes are present, some with cystic dilatation. The glands are lined with cells in the proliferative phase of the cycle, with rare mitoses. The stroma contains a large number of cells. Such changes usually do not lead to cancer but end with cystic atrophy, where both epithelial and stromal cells undergo atrophy [9].

In 2014, taking into account a new binary classification system, WHO updated the classification of endometrial hyperplasia, which was confirmed in the 2020 revision. The current classification includes two categories:

1. **Endometrial hyperplasia without atypia** (synonym: benign endometrial hyperplasia), characterized by an increased gland-to-stroma ratio, tubular architecture, branching and/or cystically dilated glands resembling proliferative endometrium, and uniform nuclear distribution.

2. **Endometrioid intraepithelial neoplasia (EIN)** (synonym: atypical endometrial hyperplasia), characterized by gland crowding (more than 20 glands) and abnormal epithelial cytology distinct from adjacent glands.

The terms “simple” and “complex” hyperplasia have been excluded, and the term “EIN” is recommended to emphasize the association with endometrioid-type tumors rather than serous ones [10]. This classification was approved and recommended by international organizations such as the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) in 2016 and the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) in 2018 [9].

According to WHO 2014, EIN is included in the atypical hyperplasia group. In this review, the new classification is used; however, a significant part of the literature data refers to the older 1994 classification.

The WHO 1994 classification was based on studies of transformation of different hyperplasia types into adenocarcinoma. The risk is highest for atypical hyperplasia. Studies show that in 23–32% of women with atypical hyperplasia, endometrial cancer may develop, while other studies indicate malignancy in 52% of cases. In addition, a high percentage (23.9–27%) of atypical hyperplasia is accompanied by foci of adenocarcinoma [11].

For non-atypical hyperplasia, progression to atypical form occurs in 10.5%, while the risk of endometrial cancer is about 2% [13]. Recurrent hyperplasia increases the risk of invasive uterine cancer to 20–30%. Although the WHO 1994/2003 classification had advantages, it demonstrated low reproducibility, leading to the need for improved systems. Analysis shows that binary classification provides higher accuracy and reproducibility (10–52%) compared with WHO classification [12]. Some studies report that the binary system improves diagnostic reproducibility by 18%.

Endometrial hyperplasia is described as excessive proliferation of endometrial glands with irregular sizes and shapes. Unlike typical anovulatory changes, this disease is expressed through significant histological modifications. Hyperplasia is divided into two categories: polyclonal tissue responding to abnormal hormonal stimulation and monoclonal local proliferations with a high risk of malignant transformation [13].

Some studies suggest a possible association between human papillomavirus (HPV) and endometrial hyperplastic processes. While HPV’s role in cervical pathology is well known, data on its effect on the endometrium remain limited. The virus may contribute to cell cycle dysregulation and induce proliferative changes.

Risk factors include early menarche, delayed menopause, nulliparity, obesity, hyperlipidemia, insulin-dependent diabetes, menstrual disorders associated with anovulation, endocrine infertility, polycystic ovary syndrome, estrogen-producing ovarian tumors, and hormone therapy in postmenopause [14].

The main factor contributing to EH is hyperestrogenism, which may be absolute or relative. It can result from high-dose estrogen use, increased endometrial cell activity, imbalance in regulation and metabolism, increased endometrial sensitivity to estrogens, or prolonged estrogen use for therapeutic purposes.

It is important to note that free estrogens play the main role, as they have biological activity. Normally, up to 97% of sex steroids are bound to globulin, which regulates their activity. Anovulation and other hormonal disorders may decrease globulin levels, increasing active estrogen and androgen fractions. The effect depends not only on estradiol levels but also on its free fraction [15].

Cytochrome P450 aromatase (CYP19A1) is a key enzyme in steroidogenesis, converting androgens into estrogens (androstenedione into estrone and testosterone into estradiol). Aromatase is expressed in granulosa cells, placental syncytiotrophoblast, Leydig cells, brain, adipocytes, and dermal fibroblasts. In premenopausal women, aromatase is mainly localized in ovarian granulosa cells, while after menopause the main source becomes adipose tissue. Although the aromatase gene is present in normal endometrial cells, its expression is usually absent [16].

Studies show that in women under 40, atypical endometrial hyperplasia and early endometrial cancer are detected in 5–25% of cases. Data from the National Cancer Institute indicate that endometrial cancer occurs in 7% of reproductive-age women. The number of atypical EH and EC cases in this group is increasing.

In the USA, insurance analysis over the last decade identified 4,007 cases of precancer and endometrial cancer in women under 45 years, averaging 400 cases per year. Early diagnosis allows fertility preservation when needed.

According to Ya.V. Bokhman, atypical hyperplasia progresses to invasive endometrial cancer in 50% of cases. Endometrial cancer is the most common malignancy of the female reproductive system in highly developed countries, second only to breast cancer, and more common than cervical cancer worldwide. Endometrioid adenocarcinomas account for 80% of uterine malignancies. Up to 417,000 new cases are diagnosed annually worldwide.

The cumulative risk has increased by 0.45 over the last ten years, reaching 2.35. The main factor is hyperestrogenism. Endometrial proliferation is closely linked to aromatase activation, leading to increased estrogen levels and receptor expression [15].

Some studies indicate heterogeneous distribution of steroid receptors depending on cycle phase. Data on receptor expression in EH remain controversial. Observations show estrogen receptor expression may be high or moderate in proliferative phase but decreases in hyperplasia. Progression of atypical changes is accompanied by decreased estrogen and progesterone receptor levels [16].

Activation of endometrial proliferation is closely linked to growth factors triggering intracellular signaling. Two main groups include insulin-like growth factors (IGF) and epidermal growth factors (EGF), as well as transforming growth factor alpha (TGF-α). Variable EGF expression with limited TGF activity is characteristic of atypical EH [17].

An imbalance between cell death and growth indicates the importance of these processes. Apoptosis cascades are regulated via TNF-α receptor family (TNFR1, TNFR2), FasR/APO-1 (CD95), and their ligands. Signaling through tumor suppressor genes and oncogenes (k-ras, beta-catenin) also affects progression [18].

Currently, metabolic-endocrine disorders are considered a major cause of EH development. Insufficient molecular biological data prevents a complete understanding of pathogenesis and primary causes, which remains important in clinical practice and reproductive medicine.

In reproductive and premenopausal periods, the most common endometrial pathology is endometrial polyps. These are exophytic benign glandular neoplasms originating from the basal layer. WHO defines an endometrial polyp as a nodular formation protruding above the endometrial surface, containing glandular and predominantly fibrous stroma with numerous thick-walled vessels [17].

Polyps arise due to proliferation of basal glandular epithelium. Morphological features include polypoid outgrowths on a stalk or broad base, composed of fibrous stroma and thick-walled vessels. Glands show irregular orientation and seemingly chaotic arrangement [18].

Modern research focuses on growth factors in myometrium and endometrium, influencing auto- and paracrine mechanisms of uterine tumor processes. The pathogenesis of uterine fibroids and endometriosis is actively studied. Molecular biology, genetics, and clinical immunology have confirmed genetic, hormonal, and immune factors in fibroids and EH.

Regulation of endo- and myometrium involves not only hormones but also biologically active substances such as growth factors and cytokines [19]. Key roles include increased proliferative potential, reduced apoptosis, pathological neoangiogenesis, and increased IGF-1 expression [19].

Increased expression of these factors and receptors in fibroids, adenomyosis, and EH leads to pathological bleeding. Not only VEGF but also fibroblast growth factor, transforming beta growth factor, parathyroid hormone-related protein, and prolactin may play roles [17].

Uterine fibroids are common in women over 35, with frequency 25–50% [9]. They are hormone-dependent benign tumors formed by hypertrophy and proliferation of muscle and connective tissue [11]. Many authors note that fibroid formation occurs in late reproductive age, when somatic and gynecological diseases accumulate along with endometrial disorders [3].

Modern medicine is rethinking EH pathogenesis. Non-atypical EH is traditionally linked to hyperestrogenism, while atypical EH is associated with genetic mutations, and the role of estrogens remains under clarification. Non-atypical EH does not show mutations typical of endometrial adenocarcinoma. In EIN and endometrial cancer, mutations affect the same genes: PTEN inactivation in 44–63%, PAX2 in 71%, KRAS in 16%, and microsatellite instability in 20–25% [20].

Methods of diagnosis of endometrial hyperplastic processes

The complexity of early diagnosis of EHP and endometrial cancer remains a major issue, especially considering the increasing number of cases in reproductive-age women. Variability affects treatment quality and recurrence, reflecting the lack of objective, informative, and non-invasive diagnostic methods capable of accurately determining progression from benign to malignant stages. Literature

reports that many endometrial cancer cases were misdiagnosed and treated as hyperplastic pathology, indicating an increase in incorrectly treated patients [14].

At the pre-hospital stage, ultrasound is the main diagnostic method for uterine cavity pathology. Key concepts include echogenicity and sound conductivity. Echogenicity refers to tissue ability to reflect ultrasound waves. Tissues may be anechoic, hypoechoic, isoechoic, hyperechoic, or highly hyperechoic. Myometrial echogenicity is considered medium [20].

Pelvic ultrasound is performed using transabdominal and transvaginal approaches, complementing each other. Before transvaginal ultrasound, bladder emptying is recommended.

In diagnosing endometrial conditions, assessment of the M-echo is important, evaluating size, shape, and structure. The maximum anteroposterior size is a key indicator.

A series of ultrasound studies has led to new approaches:

- Transvaginal echography is the first-line method due to high-frequency probes and better visualization, especially in obese patients (78–92% of patients with EHP have obesity).
- Direct ultrasound determination of structural changes is difficult due to morphological variability; histology is required for accurate diagnosis.
- The clinical value of ultrasound morphotyping is limited, since treatment decisions depend on histology.
- Endometrial polyps appear as well-defined, smooth-contoured formations in the uterine cavity, round/oval, with high echodensity.
- EH ultrasound signs include oval formations in the uterine echo area with increased anteroposterior size, homogeneous structure and high echogenicity (type 1), or thickened 4–7 mm smooth endometrial contours with decreased sound conductivity (type 2).

Ultrasound differences between morphotypes were described. Glandular-cystic polyps show multiple internal echo-negative signals with posterior acoustic enhancement. Glandular-fibrous polyps show homogeneous texture with linear echopositive inclusions and no enhancement. Fibrous polyps show increased echodensity and may produce acoustic shadowing. Adenomatous polyps show large size, homogeneous structure, echopositive and echonegative formations up to 5 mm, and acoustic enhancement. Glandular-cystic hyperplasia shows sponge-like structure with multiple small echo-negative inclusions, absent in atypical hyperplasia [21].

However, even high ultrasound accuracy does not exclude false results in 20–30% of cases [22].

Hysteroscopy, enabling diagnosis and treatment of cervical canal pathology, was first performed in 1896 by D. Pantaleoni. It evolved into the “gold standard” for intrauterine pathology. By 1925, Rubin adapted cystoscopy and introduced uterine distension media. Modern hysteroscopy is performed on an outpatient basis and is a key technology replacing inpatient treatment. Vaginoscopic technique is considered the standard approach [23].

Hysteroscopy is highly informative for endometrial assessment and uterine cavity pathology. Videohysteroscopy provides detailed visualization. In early proliferative phase, the endometrium is thin, transparent, pale pink to yellow-pink, 1–2 mm thick. Tubal ostia are visible as oval or slit-like openings [24].

In mid-late proliferative phase, the endometrium becomes bright pink, folded, thicker, with less visible gland openings. Vascular network becomes less visible. In early secretory phase, the endometrium is pale pink, velvety, 4–6 mm thick. Before menstruation, dark-burgundy detached endometrial layers hang freely, indicating menstrual shedding [25].

A major diagnostic method is aspiration (Pipelle) biopsy. It is safer than diagnostic curettage, which may traumatize malignant tissue and contribute to metastasis, and increases thromboembolic and bleeding risks.

Aspiration biopsy provides sufficient material for histology and reduces risks. Other methods are less used due to insufficient material and errors [17]. Aspiration biopsy is fast, minimally painful, low-trauma, does not require cervical dilation, and can be performed outpatient. Its main indication is screening for EH and endometrial cancer [17].

Pipelle is a disposable flexible plastic cylinder (3.1 mm diameter) with a piston creating negative pressure to aspirate endometrial tissue.

Modern technologies improve diagnostic quality. However, accurate differentiation of morphotypes remains debated [25].

Local estrogen synthesis and aromatase activity in the endometrium are important in understanding hyperplastic and malignant mechanisms. Aromatase converts androstenedione to estrone and testosterone to estradiol, increasing local estrogen levels and stimulating proliferation. Literature confirms that increased aromatase expression may contribute to EH and endometrial cancer, and aromatase inhibition may reduce proliferation stimulation [16].

Additionally, biomarkers such as CTEC and SLULT, PROK-1, integrins, and angiogenesis markers like VEGFR-2 are used for prognosis. These markers help assess angiogenesis and invasive tumor potential, contributing to targeted therapy development [17].

Modern methods of treatment of endometrial hyperplastic processes

Treatment is based on age, causes, disease features, symptoms, contraindications, tolerance to medications, and comorbid gynecological and extragenital conditions [14]. Hormonal therapy is the main approach and must be individualized. Ultrasound monitoring is recommended after 3 and 6 months.

If hyperplasia is associated with PCOS, wedge resection of ovaries may be considered, especially in recurrent hyperplasia threatening precancerous transformation [11].

In EH treatment, hormonal therapy is the initial focus. If ineffective or in perimenopausal age, hysterectomy may be considered [9]. Atypical EH often requires surgery; up to 85% of hysterectomies are performed for this indication.

Treatment strategy for atypical EH is determined by high malignancy risk and possible inadequate biopsy diagnosis [7]. Studies of removed uteri showed that 11%

of endometrial cancer cases were initially diagnosed as hyperplasia after curettage, mostly atypical hyperplasia [8].

Nevertheless, conservative therapy remains important, especially for fertility preservation. Although 34% still require hysterectomy, two-thirds can avoid uterine removal [3].

Complex hyperplasia without atypia has a small malignancy risk (~3%), but hysterectomy is performed in 50% of cases. However, conservative therapy is effective in most patients [5].

For simple hyperplasia without atypia, hysterectomy is excessive. This condition is often a response to hormonal changes rather than true disease. Hormonal therapy is more appropriate [10].

The first stage often includes removal of abnormal tissue by curettage under hysteroscopic control. In premenopausal women, hormonal therapy aims to correct hyperestrogenism and anovulation and to stimulate cyclic secretory changes for normal cycle restoration [11].

In women wishing fertility preservation, treatment of bleeding due to simple EH is combined with endocrine infertility treatment [3].

Conservative therapy includes progestins, combined oral contraceptives (COCs), antigonadotropins, and GnRH agonists. Progestins remain most widely used [3].

Since the 1970s, high estrogen levels have been linked to increased endometrial cancer risk. Since the 1980s, progesterone and derivatives have been used to provide endometrial protection [8].

Estrogen receptors regulate the cell cycle in endometrial glands. Estrogens initiate the cycle, while progesterone blocks it. Synthetic progestins mimic progesterone. Dose selection is important, aiming to induce luteal-like changes. A sign of effective protection is withdrawal bleeding after 10–12 days of progestin use [9].

Progestins improve progesterone bioavailability. Progesterone metabolism involves reduction in GI tract and liver and hydroxylation. Modifications improve binding and allow lower doses [7,12,13].

Progestin effects depend on dose and regimen. Higher doses and continuous use lead to stromal decidualization and gland atrophy. Long-term monotherapy may cause significant side effects. Local administration is considered to reduce systemic effects and enhance local action [12].

COCs are effective for hormonal regulation in reproductive-age women without atypia. They reduce hyperandrogenism symptoms, menstrual blood loss, and dysmenorrhea [17]. They normalize cycle and reduce bleeding.

COCs are classified by ethinyl estradiol dose: high-dose (50 μg), low-dose (35 μg), microdose (<35 μg). For EH, low-dose and microdose monophasic COCs are used [19]. Microdose COCs are recommended in women >35 years due to reduced metabolic impact [20].

Progestins in COCs vary. Norgestimate, levonorgestrel, desogestrel, and gestodene are effective and require lower doses for secretory transformation [21].

COCs cause rapid regression of proliferative endometrium and induce secretory transformation. Vascular changes include suppression of spiral arteriole development and formation of capillary networks. These effects are linked to progestins [20].

COCs reduce endometrial cancer risk by 50%, also decreasing mortality [19].

Some progestins (e.g., gestodene) have weak anti-aldosterone effects, reducing estrogen-related side effects such as fluid retention, breast tenderness, and weight gain. This is important in overweight women and those with hypertension, where EH is common [15].

COCs affect folliculogenesis via hypothalamic-pituitary suppression, reducing gonadotropins. This is beneficial in PCOS patients, reducing hyperplasia risk. Prolonged regimens reduce LH and ovarian volume [16].

Prolonged COC regimens show higher effectiveness, restoring ovulation in many patients. Shortening pill-free intervals improves outcomes but may cause spotting, usually not preventing therapy continuation. Effectiveness is assessed after treatment. Morphological control is needed only in complex hyperplasia. Simple hyperplasia is monitored clinically by ultrasound and cycle assessment. Recurrence rates after COCs range from 7 to 16% [17].

Proper hormonal therapy selection helps avoid surgery and significantly reduces endometrial cancer risk, highlighting long-term protective effects.

Conclusions

Thus, despite progress in studying etiopathogenesis, diagnostic and therapeutic methods of endometrial hyperplastic processes, the problem of treating patients with this pathology remains far from being solved. This dictates the need to optimize management tactics for patients with EHP during the menopausal transition period, aimed not only at creating comprehensive approaches to predicting the development and recurrence of EH, but also at developing unified protocols for managing such patients.

Local estrogen synthesis and aromatase activity in the endometrium represent important targets for research and clinical practice in gynecology, since their regulation may serve as a significant marker in preventing and treating hyperplastic diseases and endometrial cancer.

References.

1. Gromova A.L. The relationship of recurrent hyperplastic processes of the endometrium with the genetic determinants Arg72Pro of the p53 gene and (ss) l-myc gene // Bulletin of NovSU. 2016. No. 1 (92).
2. Demakova N.A. Molecular genetic characteristics of patients with endometrial hyperplasia and polyps // Scientific results of biomedical research. 2018. No. 2.
3. Lapina I.A., Dobrokhotova Yu.E., Ozolinya L.A., Chirvon T.G., Taranov V.V. An integrated approach to the management of patients with endometrial hyperplasia and metabolic syndrome // Gynecology. 2021. No. 1.
4. Nazirova Z.M. Modern possibilities for diagnosing proliferative processes of the endometrium // Economy and Society. 2020. No. 4 (71).

5. Orazov M.R., Mikhaleva L.M., Mullina I.A. Prediction of recurrent endometrial hyperplasia // Difficult patient. 2021. No. 7.
6. Orazov M.R., Mikhaleva L.M., Mullina I.A., Leffad L.M. Pathogenesis of recurrent endometrial hyperplasia without atypia // Difficult patient. 2021. No. 6.
7. Ponomarenko I.V., Demakova N.A., Altukhova O.B. Molecular mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes // Current problems of medicine. 2016. No. 19 (240).
8. Saduakasova Sh. M., Argynbaev E. K., Shadenova E. E., Khaldarbekova E. N. Clinical effectiveness of hormonal therapy for endometrial hyperplasia // Bulletin of KazNMU. 2017. No. 1.
9. Sogikyan A.S., Idrisov Sh.T., Samsonova I.P. The effectiveness of thermal ablation of the endometrium with the “Thermachoice” system in the treatment of metrorrhagia and hyperplastic processes of the endometrium (recurrent endometrial polyps) in peri- and menopause // Research'n Practical Medicine Journal. 2016. No. Special issue.
10. Tikhomirov A.L. Rationale for the use of combined oral contraceptives for the prevention of relapses of typical endometrial hyperplasia // Gynecology. 2018. No. 4.
11. Tkachenko L.V., Sviridova N.I., Isaeva L.V. Prevention of relapses of endometrial hyperplasia in perimenopause // Bulletin of VolSMU. 2017. No. 4 (64).
12. Filippova R.D., Neustroeva T.N., Pavlova-Afanasyeva M.P. Modern methods of treating endometrial hyperplastic processes (new technology) // Research'n Practical Medicine Journal. 2016. No. Special issue.
13. Chekhoeva A.N., Gabaraev G.M., Baroeva M.D. Clinical and diagnostic aspects and therapeutic tactics of endometrial hyperplastic processes from modern positions (literature review) // Bulletin of new medical technologies. Electronic edition. 2019. No. 4.
14. Shakirova E.A., Artymuk N.V. Risk factors for treatment failure and recurrent course of endometrial hyperplastic processes in obese women of reproductive age // Fundamental and Clinical Medicine. 2016. No. 1.
15. Shakirova E.A., Zotova O.A. The state of metabolic processes in women of reproductive age with obesity and hyperplastic processes of the endometrium // Fundamental and clinical medicine. 2016. No. 2.
16. Al-Kaabi M, Noel K, Al-Rubai AJ. Evaluation of immunohistochemical expression of stem cell markers (NANOG and CD133) in normal, hyperplastic, and malignant endometrium. J Med Life. 2022 Jan;15(1):117-123. doi: 10.25122/jml-2021-0206.
17. Begum J, Samal R. A Clinicopathological Evaluation of Postmenopausal Bleeding and Its Correlation with Risk Factors for Developing Endometrial Hyperplasia and Cancer: A Hospital-Based Prospective Study. J Midlife Health. 2019 Oct-Dec;10(4):179-183. doi: 10.4103/jmh.JMH_136_18.
18. Behrouzi R, Barr CE, Crosbie EJ. HE4 as a Biomarker for Endometrial Cancer. Cancers (Basel). 2021 Sep 23;13(19):4764. doi: 10.3390/cancers13194764.

19. Catena U, Della Corte L, Raffone A, Travaglino A, Lucci Cordisco E, Teodorico E, Masciullo V, Bifulco G, Di Spiezio Sardo A, Scambia G, Fanfani F. Fertility-sparing treatment for endometrial cancer and atypical endometrial hyperplasia in patients with Lynch Syndrome: Molecular diagnosis after immunohistochemistry of MMR proteins. Front Med (Lausanne). 2022 Aug 25; 9:948509. doi: 10.3389/fmed.2022.948509.
20. Chae-Kim J, Garg G, Gavrilova-Jordan L, Blake LE, Kim TT, Wu Q, Hayslip CC. Outcomes of women treated with progestin and metformin for atypical endometrial hyperplasia and early endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis. Int J Gynecol Cancer. 2021 Dec;31(12):1499-1505. doi: 10.1136/ijgc-2021-002699.
21. Chen J, Cao D, Yang J, Yu M, Zhou H, Cheng N, Wang J, Zhang Y, Peng P, Shen K. Fertility-Sparing Treatment for Endometrial Cancer or Atypical Endometrial Hyperplasia Patients With Obesity. Front Oncol. 2022 Feb 18;12:812346. doi: 10.3389/fonc.2022.812346.
22. Chen J, Cheng Y, Fu W, Peng X, Sun X, Chen H, Chen X, Yu M. PPOS Protocol Effectively Improves the IVF Outcome Without Increasing the Recurrence Rate in Early Endometrioid Endometrial Cancer and Atypical Endometrial Hyperplasia After Patients Fertility Preserving Treatment. Front Med (Lausanne). 2021 Jul 27; 8:581927. doi: 10.3389/fmed.2021.581927.
23. Clarke MA, Long BJ, Sherman ME, Lemens MA, Podratz KC, Hopkins MR, Ahlberg LJ, Mc Guire LJ, Laughlin-Tommaso SK, Bakkum-Gamez JN, Wentzensen N. Risk assessment of endometrial cancer and endometrial intraepithelial neoplasia in women with abnormal bleeding and implications for clinical management algorithms. Am J Obstet Gynecol. 2020 Oct;223(4):549.e1-549.e13. doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.032.
24. Garzon S, Uccella S, Zorzato PC, Bosco M, Franchi MP, Student V, Mariani A. Fertility-sparing management for endometrial cancer: review of the literature. Minerva Med. 2021 Feb;112(1):55-69. doi: 10.23736/S0026-4806.20.07072-X.
25. Luo L, Luo B, Zheng Y, Zhang H, Li J, Sidell N. Oral and intrauterine progestogens for atypical endometrial hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Dec 4;12(12):CD009458. doi: 10.1002/14651858.CD009458.pub3.

UDK: 618.39-002.4-073.43-092.9

Dustova N.K., Doctor of Medical Sciences (DSc)
associate professor
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina.
https://orcid.org/0000-0003-0707-5673
Yangiyeva S.U., Master of science
Department of Obsetetrics and Gynecology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina.
https://orcid.org/0009-0004-2915-7527
Sharipova F.Kh.
Deputy chief physician of the Bukhara Maternity Complex
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0009-0000-6489-0610

PREDICTION OF PREGNANCY OUTCOME IN WOMEN WITH RETROCHORIAL HEMATOMA IN EARLY GESTATION: A LITERATURE REVIEW

Abstract. *Retrochorial hematoma (RCH) is a common pathological condition detected by ultrasound examination in women with a risk of miscarriage in early pregnancy. Despite the fact that in some patients the hematoma may not have a significant effect on the course of gestation, numerous studies confirm its association with an increased risk of adverse outcomes: spontaneous miscarriage, premature birth, placental abruption, and fetal growth disorders. The article presents current data on risk factors, pathogenesis, criteria for prognosis and management of pregnancy with retrochorial hematoma.*

Key words: *retrochorial hematoma, threat of miscarriage, pregnancy, prognosis, ultrasound diagnostics, biomarkers.*

Introduction. Retrochorial hematoma is a collection of blood between the chorion and decidua, resulting from partial detachment of the chorion from the uterine wall. It is most often detected in the first trimester during ultrasound in women who complain of bloody discharge and pain in the lower abdomen. According to various authors, the prevalence of RCH ranges from 3% to 22% among all pregnancies [13,2].

Despite the possible favorable course, retrochorial hematoma is associated with an increased risk of adverse outcome, especially in the case of large hematomas and persistent symptoms. Reasonable prognosis can contribute to individualization of management and reduce the risk of perinatal loss.

RHG occurs as a result of hemorrhage between the chorion and endometrium, which can be provoked by implantation disorders, thrombohemorrhagic disorders, and increased vascular permeability. According to the authors [11], the pathological

process may be associated with impaired remodeling of spiral arteries in the trophoblast implantation zone.

Particular attention is paid to the role of thrombophilia, hypercoagulable states, and autoimmune factors (for example, antiphospholipid syndrome), which can contribute to the formation of hematomas and an unfavorable pregnancy outcome [9].

The clinical picture of RCH varies from an asymptomatic course (incidental finding on ultrasound) to severe pain syndrome and bleeding. Detection of RCH in combination with clinical manifestations (especially in the first 12 weeks of gestation) requires increased attention from the doctor.

The main method for detecting RCH remains ultrasound examination. The hematoma is visualized as an anechoic or hypoechoic formation adjacent to the chorion. The size of the hematoma, its location and ratio to the volume of the gestational sac are important prognostic signs.

Studies show that hematomas occupying more than 25-30% of the chorion area significantly increase the risk of an unfavorable outcome [12]. According to the study by Nyberg DA et al. (1996), the risk of miscarriage is up to 20% for small hematomas and exceeds 50% for large ones[10].

The main factors influencing the pregnancy outcome with RCH are:

Hematoma size. The larger the volume, the higher the risk (Tuuli MG et al., 2011).

Location. Posterior location (on the back wall of the uterus) is associated with a worse prognosis [Bennett GL et al., 2019].

Bleeding duration. Long-term persistent bleeding increases the likelihood of pregnancy loss.

Associated symptoms. Pain, tachycardia, and syncope may indicate hemodynamically significant blood loss.

Hormonal and coagulopathic markers. A decrease in the level of β-hCG, progesterone, as well as an increased concentration of D-dimer are associated with a poor prognosis [Check JH et al., 2010].

Additionally, new markers are being considered, including the level of PAPP-A and angiogenic factors (VEGF, PlGF), which may improve risk stratification [Dugoff L et al., 2004].

Approaches to management and prevention of complications.

There is no standardized protocol for the treatment of RCH. Management tactics vary depending on symptoms, hematoma size, and associated risk factors [9].

Discussion. Retrochorial hematoma (RCH) in early pregnancy remains an important prognostic finding that requires the attention of an obstetrician-gynecologist. Modern studies confirm that the presence of RCH increases the risk of complicated gestation. According to a meta-analysis by Tuuli et al. (2011), which included more than 6,000 cases, subchorionic hematoma is associated with an increased likelihood of spontaneous miscarriage (OR 2.18; 95% CI: 1.29–3.68), preterm birth (OR 1.62) and placental abruption (OR 1.59).

The size and location of the hematoma are key prognostic factors. The study by Bennett et al. (2019) noted that posterior localization and a volume exceeding 50% of the chorion area significantly increase the risk of termination of pregnancy. Such data emphasize the need for quantitative assessment in ultrasound.

RCH acquires particular clinical significance in women with high-risk factors: thrombophilia, antiphospholipid syndrome, multiple pregnancies and gestations after ART. In a retrospective analysis by Maso et al. (2005), in patients after IVF, the presence of RCH in the first trimester was associated with a more than 3-fold increase in the risk of miscarriage. Similarly, according to Kupferminc MJ (2014), women with hereditary thrombophilia (FVL, MTHFR, protein S and C) more often have gestation complications in the presence of hematomas, which explains the need for timely hemostasis examination.

In recent years, attention has also been paid to biomarkers. A number of authors (Dugoff L et al., 2004; Check JH et al., 2010) point to a correlation between a decrease in the level of PAPP-A, β-hCG and progesterone and a high frequency of complications in RCG. The introduction of complex panels of biomarkers allows not only to stratify the risk, but also to individualize the management tactics. Thus, the discussion of the role of RCG in the pathogenesis of complicated pregnancy requires a comprehensive approach taking into account the volume, clinical symptoms, hormonal and hemostatic status of the patient. The introduction of standardized assessment scales and dynamic monitoring algorithms can significantly reduce the frequency of perinatal losses in this group.

Conclusion. Retrochorial hematoma in early pregnancy is a significant prognostic factor for possible complications of gestation. In clinical practice, it is necessary to take into account the size and location of the hematoma, the presence of symptoms, concomitant coagulopathies and hormonal changes. Early diagnosis and an individualized approach to the management of patients with RCH can increase the chances of a successful pregnancy outcome.

References:

1. Akmalovna, G.I., Komilovna, G.K., Orzijonovna, N.N., Rysbaeva, A.Z., Rahim, Shopulatovna F.O., Sayfulloyevna N.N., Baxtiyarovna T.S.Biochemical, laboratory and instrumental diagnostic indicators of early diagnosis of women with gestational diabetes. Endocrine and Metabolic Science. 2025; 18:10025225252.
2. Bennett GL, Bromley B, Benacerraf BR.Subchorionic hemorrhage: correlation of size and outcome. J Ultrasound Med. 2019;38(7):1729–1735.
3. Check JH et al.Progesterone treatment to decrease miscarriage rate in threatened abortion. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(4):287–289.
4. Dugoff L et al.First-trimester maternal serum PAPP-A and free-β-hCG concentrations and nuchal translucency are associated with obstetric complications: a population-based screening study. Am J Obstet Gynecol. 2004;191(4):1446–1451.
5. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Khasanova M. A., Suleymanova G. S., & Davlatov, S. S.Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with coronavirus COVID-19. International Journal of Pharmaceutical Research. 2021;13(1):1935–1942. doi: 10.31838/ijpr/2021.13.01.283

6. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. K., Kudratova, R. R., Bakhramova, S. U., & Khafizova, D. B.Pre-course training of women with reproductive loss of fetus in anamnesis. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021;25(1):6219–6226.
7. Ikhtiyarova, G. A., Dustova, N. Q., Oripova, F. S., Tosheva, I. I., Olimova, N. I., & Qurbonova, Z. S.PCOS in women with infertility and role of determinant genes of steroid hormones. In BIO Web of Conferences (Vol. 121, p. 04008). EDP Sciences. 2024.
8. Ikhtiyarova G.A., Dustova N.K., Bahramova Sh.U., Ruzieva N.H., Irgashev D.S., Matrizaeva G.J.Molecular genetic markers of hypertension risk in pregnant women with antiphospholipid syndrome. Clinical review for general practice. 2024;5(9). (In Russ.)
9. Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K., Orazov M.R., Navruzova N.O., Narzulloeva N.S., Rozikova D.K., Kostin I.N. Early biochemical markers and screening diagnosis of gestational diabetes mellitus. Clinical analysis in general medicine. 2025;6(5):83–88. DOI: 10.47407/kr2025.6.5.00617
10. Kupferminc M.Y. Thrombophilia and pregnancy. Reprod Biol Endocrinol. 2014;12:36. (in the original indicated as Kupferminc MJ - given as in the original)
11. Nyberg DA, Mack LA, et al. Subchorionic hemorrhage: association with pregnancy outcome. Radiology. 1996;200:803–806.
12. Oyelese Y, Smulian JC. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. Obstet Gynecol. 2010;115(4):926–941.
13. Rozikova D.K., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K., Navruzova N.O., Abdieva N.R., Rajabova O.I. New methods of early diagnostics of embryochorial insufficiency. Clinical analysis in general medicine. 2025;6(2):73–80. DOI: 10.47407/kr2024.6.2.00572
14. Tuuli MG, Norman SM, Odibo AO. Perinatal outcomes in women with subchorionic hematoma: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol. 2011;117(5):1205–1212.
15. Wittich AC, Firth ER.First-trimester bleeding: evaluation and management. Am Fam Physician. 2016;94(6):442–449.

Erdonov M.N.
associate professor
Termiz State University
Termiz, Uzbekistan
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8745-0615
Ergasheva O.X.
master's student
Termiz State University
Termiz, Uzbekistan

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEAVY INDUSTRY SECTORS IN THE SURXONDARYO REGION

Abstract. *Surkhandarya region is located in the southernmost part of our country and is one of the regions best endowed with natural resources in our country. Surkhandarya region is distinguished by its diversity of natural resources, including minerals, from various ores to oil and gas deposits, coal and the largest salt deposit in our country. This article provides a detailed analysis of the role of the region's natural resources in the development of industry in the region.*

Keywords: *natural resource, industry, resource, coal, oil and gas.*

Due to the fact that the Surxondaryo region is located in the southernmost and most remote part of the country and has long been regarded as an agricultural area, industrial sectors in the region have developed much more slowly compared to other regions. Surxondaryo accounts for only about 2–3 percent of the country's total industrial output [5] .

Within the structure of the region's industrial sectors, light industry currently occupies a relatively large share. It is well known that the region's rich natural resources form a raw material base for heavy industry, and in recent years the development of large mineral deposits has begun.

Industry is a branch of production that encompasses the processing of raw materials, the exploitation of underground resources, and the production of means of production and consumer goods [3].

As is known, heavy industry is a group of industrial sectors that produce means of production. Heavy industry includes all extractive industries and part of the manufacturing industries. It comprises electric power generation, the fuel industry, ferrous and non-ferrous metallurgy, machine building and metalworking, the chemical and petrochemical industries, woodworking, pulp and paper production, and the construction materials industry, among others. Heavy industry plays a decisive role in developing the productive forces of a given region and serves as the foundation for expanded reproduction of the national economy, technological modernization, strengthening regional defense capacity, and improving public welfare.

In recent years, fuel, electric power, and metallurgical industries have been developing in the Surxondaryo region, which is the object of this study. Examples include the Khanjiza polymetallic ore deposit, the discovery of the M25 gas field in Boysun district, and the commissioning of several coal and oil fields [5].

Although the first industrial enterprises established in the region belonged to light industry, the commissioning of oil fields related to heavy industry—namely "Xovdog'," "Uchqizil," and "Kakaydi"—dates back to the Soviet period. In addition, the commissioning of the Sharg'un and Boysun coal mines also dates to the Soviet era; however, coal extraction volumes at these deposits have increased in recent years. Nevertheless, coal extracted in the region accounts for only 2.5–3 percent of the total coal production of the country. This is due to several factors, including the relatively small reserves of these deposits and the difficulty of their development, as the mines are located in rugged mountainous terrain.

The fuel and energy industry in the region began to take shape in the 1950s with the extraction of oil and gas, and later coal, eventually becoming a separate branch of regional industry. Numerous oil and gas fields have been discovered and commissioned in the Surxondaryo region. The extraction of oil, gas, and coal has been increasing year by year.

At present, the region annually produces 126–130 thousand tons of oil, 220–240 thousand tons of coal, and 17,545 thousand cubic meters of natural gas. In particular, the geography of oil extraction is expanding with the discovery of new promising fields, and oil production volumes continue to grow. However, no oil refining industry has been established in the region. A portion of the extracted oil is transported to the Bukhara Oil Refinery. This practice increases the cost of various petroleum products obtained through refining for the region. Moreover, the issue of fully meeting the region's demand for petroleum products remains unresolved [1].

The machine-building industry is one of the key driving forces of both industry and the overall economy. Its development is directly linked to the development of the region's productive forces. Unfortunately, this leading industrial sector is poorly developed in Surxondaryo, with only certain branches having taken shape. For example, there are enterprises in Denov that repair various types of agricultural machinery, and factories in Termez that repair tractor engines and produce certain components for agricultural machinery, and little else.

The construction materials industry develops in close connection with the level and scale of capital construction in the regional center, major cities, district centers, and large newly established settlements. From this perspective, it is believed that significant efforts and decisive steps should be taken in the near future.

The natural geographic basis for the development of the construction industry in Surxondaryo includes natural stone, sand, limestone, gravel, gypsum, and other resources. Brick factories established in every district of the region, as well as enterprises producing lime, reinforced concrete (in Termez, Qumqo'rg'on, Surxon, and Denov), marble polishing (Kampirtepa), and gravel production (Sherobod, Jarkurgan cement plant, etc.), constitute the major pillars of the region's construction industry [4].

Chemical production involves the processing of organic and inorganic raw materials and materials through chemical processes, as well as the manufacture of finished products. According to the results for January–December 2024, the share of chemical production within the manufacturing industry amounted to 0.3 percent; the physical volume index compared to the corresponding period of the previous year reached 193.4 percent; and total production volume amounted to 44.5 billion soums.

In January–December 2024, compared to the corresponding period of the previous year, electricity production reached 149.2 percent, while thermal energy production amounted to 100.0 percent. As shown in Table 2, electricity generation increased from 1.9 million kWh in 2018 to 638.7 million kWh in 2024, indicating significant development of the regional electric power industry. At the same time, thermal energy production has declined, and in recent years new segments—such as electricity generated by solar power plants—have begun to account for a share of the region's electricity supply. In 2024, the amount of electricity generated by solar power plants in the region totaled 4.6 million kWh.

2- Table. Volume of Energy Industry Production

No.	Industrial products	2018	2020	2022	2024
1	Electricity, million kWh	1,9	0,005	232,3	638,7
2	Thermal energy, thousand Gcal	72,9	33,6	33,6	22,9
3	Electricity generated by solar power plants, million kWh	-	-	-	4,6
4	Diesel fuel, thousand tons	11,7	1,8	-	-
5	Petroleum bitumen, thousand tons			61,1	

Source: *Data from the Surxondaryo Regional Statistics Office (surxonstat.uz)*

In 2010, Jarkurgan district accounted for the largest share of industrial output in the region. It was followed by Termez city, Sho'rchi, Sherobod, and Denov districts, while the lowest indicators were recorded in Oltinsoy, Boysun, and Termez districts. In the Surxondaryo region, industrial production growth has accelerated since 2020. The total volume of industrial production increased from 756.6 billion soums in 2010 to 12,368 billion soums in 2024. In other words, industrial output in the region increased sixteenfold over this period.

In conclusion, it can be observed that in recent years the structure of industrial sectors and the volume of industrial production in the Surxondaryo region have been increasing. This growth is largely due to more intensive utilization of the region's rich natural resources and the rising volume of foreign investment, which together have contributed to the expansion of industrial production in the region.

References

1. Abdunazarov H.M. et al. *Geography of Surxondaryo Region. Economic and Social Geography. Part 2. Textbook*. Tashkent: Dimal Publishing, 2024. – 260 p. (*in Uzbek*).
2. Asanov G. et al. *Economic and Social Geography of Uzbekistan*. Tashkent: Teacher, 1994. – 209 p. (*in Uzbek*).

3. Baratov P. *Physical Geography of Uzbekistan*. Tashkent: Teacher, 1996. – 264 p. (*in Uzbek*).
4. Nabiyev E., Qayumov A.A. *Economic Potential of Uzbekistan*. Tashkent: Akademiya, University, 2000. – 88 p. (*in Uzbek*).
5. Qayumov A. et al. *Regional Economy*. Tashkent: University, 2004. (*in Uzbek*).
6. Soliyev A. *Economic and Social Geography of Uzbekistan*. Tashkent, 2014. – 268 p. (*in Uzbek*).
7. Vahobov H., Tillaboeva M. *Fundamentals of Economic Geography*. Tashkent: Teacher, 2001. – 136 p. (*in Uzbek*).
8. Zokirov O., Pardayev A. *Agricultural Economics*. Tashkent: OAJBNT Center, 2003. – 455 p. (*in Uzbek*).
9. stat.uz

Ergasheva M. D.
Ta'lim menejmenti yo'nalishi mustaqil tadqiqotchi
Orientel universiteti

SOG'LOM VA MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR O'RTASIDAGI FARQLAR VA INKLYUZIV TA'LIM KONTEKSTIDAGI YONDASHUVLAR

Annotatsiya: *Ushbu maqolada sog'lom va maxsus ehtiyojli bolalar o'rtasidagi farqlar pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatlar nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Maqolada inklyuziv ta'lim kontekstida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash, pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimlarini yaratish va maktab muhitini moslashtirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro va mahalliy tajribalar tahlil qilinib, inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim tizimi va pedagogik amaliyotda inklyuziv yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *Inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, sog'lom bolalar, pedagogik farqlar, ijtimoiy integratsiya, differensial pedagogika.*

Ergasheva M. D.
independent researcher
Department of Educational Management
Oriental University

DIFFERENCES BETWEEN HEALTHY AND SPECIAL NEEDS CHILDREN AND APPROACHES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION

Abstract*: This article analyzes the differences between typically developing children and children with special educational needs from pedagogical, psychological, and social perspectives. It discusses identifying students' individual needs, creating support systems, and adapting school environments within the context of inclusive education. The study also examines international and local experiences and provides recommendations to enhance the effectiveness of inclusive education. The findings contribute to the development of inclusive approaches in educational systems and pedagogical practices.*

Keywords:*Inclusive education, children with special educational needs, typically developing children, pedagogical differences, social integration, differentiated pedagogy.*

Kirish

Bugungi ta'lim tizimida inklyuziv yondashuv barcha bolalarning teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan asosiy prinsip sifatida qaraladi. Inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalarni jamiyatga

integratsiyalash, balki sog‘lom bolalar bilan birga ta’lim jarayonini tashkil etish orqali ularning o‘zaro ijtimoiy, psixologik va pedagogik farqlarini hisobga oladi [15]. Sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlar turli o‘lchamlarda namoyon bo‘ladi: kognitiv rivojlanish, o‘rganish qobiliyati, ijtimoiy moslashuv, diqqat e’tibori va emotsional barqarorlik. Bu farqlarni aniqlash va pedagogik jarayonda hisobga olish inklyuziv muhitni yaratishning asosiy sharti hisoblanadi.

Pedagogik jihatdan, sog‘lom bolalar odatda standart o‘quv dasturlariga tez moslashadi, o‘z bilimlarini mustaqil rivojlantira oladi va turli o‘quv vazifalarini muvaffaqiyatli bajaradi. Aksincha, maxsus ehtiyojli bolalar individual yordam va qo‘llab-quvvatlashni talab qiladi. Ularning rivojlanish sur’atlari turlicha bo‘lib, ba’zi vazifalarda qo‘shimcha vaqt, moslashtirilgan material yoki pedagogik strategiyalarni talab qilishi mumkin. Shu bois, inklyuziv ta’lim tizimlarida differensial pedagogika va individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik va ijtimoiy jihatdan farqlar ham sezilarli. Sog‘lom bolalar odatda ijtimoiy interaktsiyada faol, do‘stlashish va guruh faoliyatiga integratsiyalashuvda osonlik bilan muvaffaqiyatga erishadi. Maxsus ehtiyojli bolalar esa ba’zan ijtimoiy moslashuv va muloqotda qo‘llab-quvvatlashga muhtoj bo‘ladi, ular o‘zini baholash, stressga chidamlilik va motivatsiya jihatlarida turlicha xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Shu sababli, inklyuziv maktablarda psixologik qo‘llab-quvvatlash, guruh ishlari va ijtimoiy integratsiya strategiyalari ahamiyatli hisoblanadi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta’limning samaradorligi pedagogik, psixologik va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimining uyg‘unligiga bog‘liq. Masalan, Finlandiya maktablarida uch pog‘onali qo‘llab-quvvatlash modeli — umumiy, kuchaytirilgan va maxsus yordam — bolalarning individual ehtiyojlariga mos ta’lim strategiyasini tanlash imkonini beradi. Kanada va Buyuk Britaniyada multidissiplinar jamoalar — o‘qituvchi, psixolog, logoped va ijtimoiy pedagog hamkorligi — inklyuziv muhitning barqarorligini ta’minlashda asosiy vosita sifatida qo‘llaniladi. Shu bilan birga, O‘zbekiston tajribasida ham inklyuziv ta’limning amaliy jihatlari, normativ-huquqiy asoslari va o‘qituvchilarning kompetensiyasini oshirish masalalari tadqiq qilinmoqda[2]

Shu nuqtai nazardan, maqolada sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlar tahlil qilinib, inklyuziv ta’lim kontekstida ularni pedagogik va psixologik jihatdan moslashtirish yondashuvlari o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari o‘quv jarayonida differensial yondashuvni joriy etish, maktab muhitini moslashtirish va barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Bu esa inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirish va bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta’minlashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Inklyuziv ta’lim bo‘yicha xalqaro tadqiqotlar sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlarni o‘rganishga katta e’tibor qaratadi. Ainscow, Booth va Dyson inklyuziv ta’limni tizimli jarayon sifatida ko‘rib, muammoni individual bolada emas, balki ta’lim tizimida izlaydilar. Muallif Dysonning yondashuvini ijobiy baholaydi, chunki u bolalarning pedagogik va psixologik farqlarini hisobga

olgan holda, maktab muhitini va o‘qituvchilar amaliyotini transformatsiya qilishga urg‘u beradi.

Florian va Black-Hawkins esa inklyuziv yondashuvni individual ehtiyojlarni aniqlash va differensial strategiyalar orqali amalga oshirilishi lozimligini ta’kidlaydi. Muallif ularning qarashlarini maqbul deb biladi, chunki ular sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqni pedagogik rejalashtirishda asos sifatida ishlatadi.

Xalqaro tajribalar, jumladan Finlandiya, Kanada va Buyuk Britaniyadagi tadqiqotlar, inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirishda qo‘llab-quvvatlash tizimi va multidissiplinar jamoaning rolini ko‘rsatadi. Muallif bu manbalarni amaliy jihatdan foydali deb hisoblaydi, chunki ular O‘zbekistondagi maktab amaliyotiga moslashtiriladigan elementlarni aniqlash imkonini beradi [11].

Osiyo mamlakatlari (Janubiy Koreya, Singapur) tajribasi esa inklyuziv ta’limni joriy etishdagi tizimli to‘siqlarni ko‘rsatadi: moddiy-texnik baza yetishmasligi, o‘qituvchilarning tayyorgarligi pastligi va stereotiplar jarayonni sekinlashtiruvchi omil sifatida qayd etilgan. Muallif bu qarashlarni milliy sharoitni hisobga olgan holda tahlil qiladi.

O‘zbekistonda Islomova, Eshmamatova, Sodiqova va Yo’ldasheva, Teshaboyeva ishlarida inklyuziv ta’limning normativ-huquqiy, nazariy va pedagogik jihatlari yoritilgan. Muallif bu manbalarni foydali deb hisoblaydi [1], lekin ularning xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish va amaliy tavsiyalar yetishmasligini tanqid qiladi[2].

Shu tariqa, mazkur tadqiqot xorijiy va mahalliy adabiyotlarni tahlil qilgan holda, sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlarni inklyuziv ta’lim kontekstida pedagogik va ijtimoiy jihatdan moslashtirish yo‘llarini aniqlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi pedagogik, psixologik va ijtimoiy farqlarni aniqlash hamda ularni inklyuziv ta’lim kontekstida moslashtirish yondashuvlarini ishlab chiqishdir. Tadqiqot obyekti sifatida inklyuziv ta’lim muhitida ta’lim oluvchi bolalar, predmeti sifatida esa ular o‘rtasidagi farqlar va bu farqlarni pedagogik va psixologik jihatdan hisobga olgan holda inklyuziv yondashuvlarni shakllantirish masalalari tanlandi.

Tadqiqotda nazariy va empirik metodlar uyg‘un qo‘llaniladi. Nazariy metodlar qatoriga xalqaro va mahalliy adabiyotlarni tahlil qilish kiradi. Empirik metodlar sifatida maktablarda kuzatuvlar, testlar, intervyu va so‘rovnomalar qo‘llaniladi. Kuzatuvlar orqali bolalarning kognitiv rivojlanishi, diqqat e’tibori va ijtimoiy moslashuv jarayonlari o‘rganiladi, testlar yordamida esa ularning o‘quv natijalari va rivojlanish sur’atlari tahlil qilinadi. Intervyu va so‘rovnomalar esa o‘qituvchilar, ota-onalar va psixologlarning inklyuziv ta’lim jarayonidagi tajribasi va fikrlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqotda xalqaro va mahalliy tajribani solishtirish metodidan foydalaniladi. Finlandiya, Kanada va Singapur maktablaridagi inklyuziv strategiyalar o‘rganilib, ularning milliy sharoitga mos keladigan elementlari

aniqlanadi. Shu tariqa, tadqiqot nafaqat bolalar o‘rtasidagi farqlarni o‘rganishga, balki bu farqlarni hisobga olgan holda pedagogik va ijtimoiy jihatdan moslashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Tadqiqot jarayoni nazariy tahlildan boshlanib, empirik kuzatuv va tahlil bosqichlariga o‘tadi, yakuniy bosqichda esa olingan natijalar inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalarga aylantiriladi. Shu bilan birga, ushbu metodologiya O‘zbekiston maktablarida inklyuziv yondashuvlarni joriy etishda, pedagogik amaliyotni boyitishda va bolalarning individual ehtiyojlarini qondirishda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlarni pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatdan aniqlash imkonini berdi. Kuzatuv va testlar natijasida ma’lum bo‘ldiki, sog‘lom bolalar matematik va o‘qish topshiriqlarini o‘rtacha 85% muvaffaqiyat bilan bajarishadi, maxsus ehtiyojli bolalar esa 60–70% darajasida natija ko‘rsatadi. Shu bilan birga, sog‘lom bolalarning diqqat e’tibori va topshiriqlarni yakunlashdagi motivatsiyasi yuqori bo‘lib, ular 20 daqiqalik topshiriqlarni to‘liq bajarishga qodir, maxsus ehtiyojli bolalar esa o‘rtacha 10–15 daqiqa davomida maksimal konsentratsiyani saqlay oladi. Bu farqlar pedagogik yondashuvni individualizatsiyalash zaruratini ko‘rsatadi.

Ijtimoiy moslashuv bo‘yicha o‘tkazilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, sog‘lom bolalar guruh ishlarida va hamkorlik faoliyatida 80% darajada qatnashsa, maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtacha 50–60% faoliyat ko‘rsatadi. Shu bilan birga, intervyu va so‘rovnomalar natijalari, xususan o‘qituvchilar fikriga ko‘ra, ota-ona va multidissiplinar jamoaning faol ishtiroki maxsus ehtiyojli bolalarning ijtimoiy integratsiya darajasini 25–30% ga oshirishga yordam beradi.

Empirik natijalar shuningdek, differensial pedagogik yondashuvning ta’lim samaradorligiga ta’sirini ko‘rsatdi. Masalan, maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan mashg‘ulotlar orqali ularning matematik topshiriqlardagi muvaffaqiyati 15–20% ga oshdi. Shu bilan birga, o‘quv muhitini vizual va didaktik vositalar bilan boyitish diqqat e’tiborini saqlash va individual ehtiyojlarni qondirishda samarali bo‘ldi.

Xorijiy tajribalar bilan solishtirganda, Finlandiya maktablarida qo‘llanadigan uch pog‘onali qo‘llab-quvvatlash modeli va Kanada multidissiplinar jamoa yondashuvi bolalarning individual ehtiyojlarini qondirishda yuqori natija berishi kuzatilgan. Shu asosda O‘zbekiston maktablarida ham pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, differensial mashg‘ulotlar joriy etish va ota-ona hamkorligini tizimli yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi.

Shuningdek, natijalar Osiyo mamlakatlari tajribasini tasdiqladi: moddiy-texnik baza yetishmasligi, o‘qituvchilarning maxsus tayyorgarligi pastligi va jamiyatdagi stereotiplar maxsus ehtiyojli bolalarning muvaffaqiyatini cheklaydi. Shu bilan birga, davlat siyosati darajasidagi qo‘llab-quvvatlash mavjud bo‘lsa, inklyuziv ta’lim samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlarni hisobga olgan

holda inklyuziv ta’lim yondashuvlarini joriy etish, maktab muhitini moslashtirish va pedagogik qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish ta’lim samaradorligini oshiradi va bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta’minlaydi.

Xulosa va takliflar

Ushbu tadqiqotning natijalari shuni ko‘rsatdiki, sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasida pedagogik, psixologik va ijtimoiy jihatdan sezilarli farqlar mavjud. Sog‘lom bolalar o‘quv dasturini tezroq o‘zlashtiradi, mustaqil bilim olish va guruh ishlarida faol bo‘ladi, maxsus ehtiyojli bolalar esa individual yondashuv va qo‘llab-quvvatlashni talab qiladi. Shu bilan birga, maxsus ehtiyojli bolalarning diqqat e’tibori, motivatsiyasi va ijtimoiy integratsiyasi turlicha bo‘lib, bu farqlar inklyuziv ta’lim jarayonida pedagogik moslashtirish zaruratini taqozo etadi.

Differensial pedagogika, multidissiplinar jamoa yondashuvi va ota-ona hamkorligi bolalarning ta’limdagi muvaffaqiyatini oshirish va ijtimoiy integratsiyasini ta’minlashda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Xorijiy tajribalar, xususan Finlandiya, Kanada va Singapur maktablaridagi amaliyotlar, O‘zbekiston sharoitida ham inklyuziv yondashuvlarni samarali joriy etish uchun asos bo‘la oladi. Shu bilan birga, moddiy-texnik baza, o‘qituvchilarning tayyorgarligi va jamiyatdagi stereotiplar inklyuziv ta’limning samaradorligini cheklovchi omillar sifatida aniqlangan.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi. Birinchidan, maktablarda maxsus ehtiyojli bolalarning individual rivojlanish rejalarini ishlab chiqish va differensial pedagogik strategiyalarni joriy etish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, multidissiplinar jamoalar — o‘qituvchi, psixolog, logoped va ijtimoiy pedagog — faol ishlashini ta’minlash, ularning o‘quv jarayonida birgalikdagi amaliy faoliyatini kuchaytirish muhimdir. Uchinchidan, ota-ona va maktab o‘rtasida muntazam hamkorlikni yo‘lga qo‘yish orqali bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va ta’limga motivatsiyasini oshirish mumkin. To‘rtinchidan, moddiy-texnik baza va o‘qituvchilarning maxsus tayyorgarligi darajasini oshirish, shuningdek jamiyatdagi stereotiplarni kamaytirish bo‘yicha targ‘ibot ishlarini amalga oshirish zarur.

Shu tariqa, tadqiqot nafaqat sog‘lom va maxsus ehtiyojli bolalar o‘rtasidagi farqlarni aniqlashga, balki ularni inklyuziv ta’lim kontekstida pedagogik va ijtimoiy jihatdan moslashtirish bo‘yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ushbu takliflar O‘zbekiston maktablarida inklyuziv yondashuvlarni samarali joriy etish va ta’lim sifatini oshirish uchun asosiy yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Eshmamatova, D., & Sodiqova, F. (2025). Maxsus ehtiyojli bolalarni mumta’lim maktablariga integratsiya qilish tajribasi. Pedagogika va Psixologiya, 3(1), 45–59.
2. Isanova, M. (2021). Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta’lim jarayonida individual dasturlar asosida o‘qitish. Toshkent.
3. Karimova, D. (2023). Inklyuziv ta’limda differensial yondashuv metodikasi. Innovatsion rivojlanish nashriyoti.
4. Mahmudova, Z. (2020). Maxsus pedagogika va inklyuziv ta’lim. Toshkent.
5. Nasriddinova, M. Sh. (2022). O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirish muammolari. Ilmiy maqola.

6. Qodirova, S. (2023). Umumta’lim maktablarida inklyuziv muhitni shakllantirish omillari. Toshkent.
7. Raximova, N. (2021). Inklyuziv ta’limda o‘qituvchi kompetensiyasini rivojlantirish masalalari. Samarqand.
8. Saidova, G. (2022). Inklyuziv ta’limni tashkil etishning pedagogik asoslari. Toshkent.
9. Tursunova, L. (2020). Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash metodikasi. Toshkent.
10. UNICEF. (2017). Inclusive education: Every child has the right to learn. UNICEF.
11. Yuldasheva, O. (2023). Inklyuziv ta’lim samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. Toshkent.
12. Yo’ldasheva, M., & Teshaboyeva, S. (2023). O‘zbekiston maktablarida inklyuziv ta’limni joriy etishning amaliy tajribasi. Oliy va O‘rta Maxsus Ta’lim Jurnali, 2(4), 78–92.
13. Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Improving Schools, Developing Inclusion. London: Routledge.
14. Booth, T. & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Bristol.
15. Florian, L. & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813–828.
16. Hornby, G. (2015). Inclusive Education for Children with Special Educational Needs. Springer.

Fattoyev E.A.
Iqtisodiyot fakulteti "Umumiqtisodiy fanlar" kafedrasi assistenti
Toshkent amaliy fanlar universiteti (UTAS)

EKONOMETRIKANING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

Annotatsiya: *Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida ekonometrikaning yangi metodologik yondashuvlari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Raqamli iqtisodiyotda katta ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt va mashinaviy o‘qitish texnologiyalari iqtisodiy tahlilning asosiy manbaiga aylangani ko‘rsatib berilgan. Ekonometrika endilikda nazariy modellashtirish bilan bir qatorda sababiy tahlil, prognozlash va siyosiy qarorlarni asoslashda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotda O‘zbekiston misolida raqamli iqtisodiyotni boshqarishda empirik tahlilning ahamiyati va zamonaviy usullarning (DiD, IV, LASSO, DML) qo‘llanish imkoniyatlari ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, ekonometrika, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), mashinaviy o‘qitish , sababiy tahlil , regressiya tahlili, difference-in-differences, panel ma'lumotlar, LASSO, raqamli platformalar, fintech, davlat-xususiy sheriklik (DXSh), raqamli transformatsiya, empirik iqtisodiy tahlil, ma'lumotlar ekotizimi*

Fattoyev E.A.
assistant lecturer
Department of General Economic Sciences
Faculty of Economics
Tashkent University of Applied Sciences (UTAS)

THE ROLE OF ECONOMETRICS IN THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: *The article highlights new methodological approaches in econometrics and its practical relevance within the digital economy. It shows that, in the digital economy, Big Data, artificial intelligence, and machine learning technologies have become primary sources for economic analysis. Today, beyond theoretical modeling, econometrics plays a key role in causal analysis, forecasting, and evidence-based policy making. Using Uzbekistan as an example, the study underscores the importance of empirical analysis for governing the digital economy and demonstrates the applicability of modern methods (DiD, IV, LASSO, DML).*

Keywords: *Digital economy; econometrics; artificial intelligence; Big Data; machine learning; causal analysis; regression analysis; difference-in-differences; panel data; LASSO; digital platforms; fintech; public–private partnership (PPP); digital transformation; empirical economic analysis; data ecosystem.*

Kirish.

Zamonaviy iqtisodiyot raqamli texnologiyalar, ma’lumotlar oqimi va sun’iy intellekt tizimlariga tayanayotgan davrda, iqtisodiy tahlilning an’anaviy usullari yetarli bo‘lmay qolmoqda. Raqamli iqtisodiyot — bu ishlab chiqarish, almashinuv va xizmat ko‘rsatish jarayonlarining ma’lumotlar, algoritmlar hamda platformalar orqali amalga oshiriladigan yangi iqtisodiy tizimidir. Unda iqtisodiy faoliyat real vaqt rejimida, katta hajmdagi ma’lumotlar (Big Data), mashinaviy o‘qitish (Machine Learning), sun’iy intellekt (Artificial Intelligence) va bulutli hisoblash (Cloud Computing) imkoniyatlari asosida tashkil etiladi.[1]

Bunday muhitda iqtisodiy qarorlar qabul qilishda empirik dalillar, aniqlik va sababiy tahlil muhim o‘rin tutadi. Shuning uchun ekonometrika — iqtisodiy nazariya va real ma’lumotlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlovchi, sabab-oqibat munosabatlarini statistik usullar yordamida o‘lchovli shaklda ifodalovchi fanning roli keskin oshdi. Ekonometrika nafaqat model qurish yoki prognoz berish vositasi, balki raqamli iqtisodiyotning asosi bo‘lgan ma’lumotlar oqimini talqin qilish va iqtisodiy siyosatga ilmiy asos berishning markaziy vositasiga aylandi

Raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlari — elektron tijorat, raqamli to‘lov tizimlari, platforma bozorlar (marketplace, ride-hailing, delivery), fintech xizmatlari va IoT texnologiyalari — ulkan hajmdagi yangi turdagi ma’lumotlarni ishlab chiqaradi. Ushbu ma’lumotlar oqimi iqtisodiy tahlilda yangi o‘lchovlarni talab qiladi. Endilikda iqtisodiy ko‘rsatkichlarni baholashda faqat milliy hisob tizimi (SNA) emas, balki real vaqtli indikatorlar, onlayn faol foydalanuvchilar soni, veb-qidiruv indekslari va platforma ma’lumotlari ham muhim rol o‘ynaydi. Ana shunday murakkab, ko‘p qatlamli tizimda ekonometrika raqamli ko‘rsatkichlarni iqtisodiy farovonlik, samaradorlik va raqobat tahliliga aylantiruvchi ilmiy mexanizm vazifasini bajaradi

Bugungi kunda global iqtisodiyotni boshqarishda tezkor ma’lumotlar oqimi bilan ishlash, ularni tizimlashtirish, tozalash va tahlil qilish malakasi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Raqamli iqtisodiyotda ma’lumotlar manbalari — onlayn transaksiyalar, mobil ilovalar, to‘lov tizimlari, veb-analitika, IoT qurilmalari va ochiq ma’lumotlar portallari — bir-biridan farqli tuzilishga ega. Shu bois ekonometrik modellarni qurish jarayonida ma’lumotlar sifati, endogenlik muammolari, identifikatsiya strategiyalari va algoritmik xolislik masalalari birgalikda hal etilishi talab qilinadi.

Raqamli iqtisodiyotning o‘sishi bilan birga, ekonometrikaning yangi metodologik bosqichi yuzaga keldi: yuqori o‘lchamli ma’lumotlar bilan ishlash, sababiy tahlil, mashinaviy o‘qitish bilan integratsiya va siyosiy qarorlarni modellashtirishning yangi yondashuvlari. Bunda klassik OLS va panel modellar bilan bir qatorda, LASSO, ridge regression, difference-in-differences, regression

[1]Einav & Levin (2014) *Science*: Varian (2014) *JEP*:

discontinuity, causal trees va double machine learning kabi ilg‘or usullar keng qo‘llanmoqda

O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo uchun raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi iqtisodiy tahlilning yangi paradigmasini talab etmoqda. Ayniqsa, fiskal shaffoflik, raqamli soliq bazasini kengaytirish, fintech va e-tijorat bozorlarida adolatli raqobatni ta’minlash, hamda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini raqamli tahlil asosida boshqarish — barchasi ekonometrikaning zamonaviy metodlariga tayangan holda amalga oshiriladi.

Demak, raqamli iqtisodiyot sharoitida ekonometrika endi faqat ilmiy tahlil vositasi emas, balki iqtisodiy siyosat, biznes qarorlari va innovatsion boshqaruv uchun strategik intellektual infratuzilma sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu maqola ana shu jarayonlarni tahlil qiladi, metodologik yangilanishlar, amaliy qo‘llanishlar va mintaqaviy imkoniyatlarni keng yoritadi

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va uni o‘lchash

Raqamli iqtisodiyot — elektron tijorat, platforma bozorlar (marketplace, ride-hailing, food-delivery), raqamli to‘lovlar va fintech, raqamli media-reklama, bulutli xizmatlar, IoT hamda ma’lumotlar vositasida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni qamrab oladi. O‘lchashda uchta qatlam ajratiladi: I. infratuzilma va tarmoq resurslari (internet kengligi, bulutli hisoblash), (II) raqamli vositachilik (platformalar, API-lar), (III) raqamli natijalar (yangi mahsulotlar, samaradorlik, farovonlik). An’anaviy milliy hisoblarda (SNA) raqamli faoliyatni to‘liq aks ettirish mushkul: nolga yaqin tranzaksiya xarajati, chegara-ortidan xizmat ko‘rsatish va “bepul” ko‘rinadigan, lekin reklama yoki ma’lumotlar bilan moliyalashtiriladigan xizmatlar bor. Shu bois alternativ o‘lchovlar — faol foydalanuvchilar soni (MAU/DAU), platforma taraflarining tarmoq effektlari, vaqtda kechikishsiz ko‘rsatkichlar (nowcasting) hamda veb-qidiruv indekslari keng qo‘llanadi. Ekonometrika bu ko‘rsatkichlar asosida mahsuldorlikka, narxlashga, farovonlik taqsimotiga va raqobatga ta’sirni baholashga yordam beradi.

Ekonometrika evolyutsiyasi: raqamli davr chaqiriqlari

Ekonometrika tarixan nazariy modellarni real ma’lumotlarda sinashga qaratilgan edi. Raqamli davrda esa ma’lumot ko‘lami (N) va xususiyatlar soni (p) keskin oshdi, oqim (stream) va yarim-tuzilmali ma’lumotlar (loglar, matn, tasvir, lokatsiya) paydo bo‘ldi. Shuningdek, platformalarda o‘zaro ta’sir, tarmoq ekternaliklari, dinamik narxlash, individuallashtirilgan takliflar, A/B testlar kabi jarayonlar kuchaydi. Bu sharoit klassik OLS, IV, panel va vaqt qatorlari yondashuvlarini saqlagan holda, yuqori o‘lchamli (high-dimensional) tanlash va muntazamlashtirish usullari (LASSO, ridge, elastic net), kuzatuvdan sababiy ta’sirni (causal inference) ajratish va mashinaviy o‘qitish (MO) bilan integratsiyani talab qiladi. Natijada ‘interpretatsiya—prognoz’ muvozanati muhimlashdi: biznes va siyosat uchun shunchaki aniqlik yetarli emas, qaror qabul qilishda sababiy tushuntirish zarur. Ekonometrikaning kuchi aynan shu yerda — identifikatsiya strategiyalari orqali sababiy effektlarni ajratib berishda namoyon bo‘ladi.

Ma’lumotlar ekotizimi: manbalar, sifat va tayyorgarlik

Raqamli iqtisodiyotda ma’lumotlar manbai juda xilma-xil: transaksion loglar, veb-analitika, mobil ilovalar telemetriyasi, to‘lov tizimlari, sensor/IoT oqimlari, ochiq ma’lumotlar portalari, hamkor APIlari va ‘skaner’ bozor ma’lumotlari. Ekonometrik tahlilning muvaffaqiyati ETL/ELT jarayonlarining to‘g‘ri loyihalanishiga bog‘liq: tozalash (missing/outlier), moslashtirish (feature engineering), birlashtirish (entity resolution), vaqtni sinxronlash va sampling og‘irliklarini tanlash. Ma’lumot sifati mezonlari — aniqlik, yaxlitlik, [2]reprezentativlik, o‘lchov xatolari va seleksiya xatoliklari — baholash natijasiga bevosita ta’sir qiladi. Platformalardagi endogenlik (masalan, shaxsiylashtirish algoritmlarining o‘zi xatti-harakatni o‘zgartirishi) va o‘lchov instrumentlarining o‘zgarishi (tracking cheklovlari) identifikatsiyani murakkablashtiradi. Shu bois dizaynda tabiiy tajribalar, instrumentlar yoki eksperimentlardan foydalanish tamoyillari oldinga chiqadi.

Asosiy metodlar: regressiya, panel va vaqt qatorlari

Klassik chiziqli model: $y_i = \beta_0 + \beta' x_i + \varepsilon_i$ ko‘plab biznes savollariga boshlang‘ich javob beradi. Panel ma’lumotlar (i — birlik, t — vaqt) doimiy noma’lum omillarni nazorat qilish uchun fixed effects (FE) va random effects (RE) yordamida: $y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta' x_{it} + \varepsilon_{it}$. Platforma dinamika va shoklarni tahlil qilishda difference-in-differences (DiD) samarali: $\Delta y = (\text{treatment_post} - \text{treatment_pre}) - (\text{control_post} - \text{control_pre})$. Vaqt qatorlarida ARIMA/ARIMAX, VAR/VECM, holat-fazo (state-space) va dinamik omil modellar (DFM) nowcasting va prognoz uchun qo‘llanadi. Raqamli signallar — qidiruv indekslari, veb-trafik — yordamchi ko‘rsatkich sifatida prognozni yaxshilaydi. Shu bilan birga, yuqori chastotali interventsiyalar (aksiyalar, bannerlar) uchun granulyar vaqt sinxlash va heterogenlikni hisobga olish talab etiladi.

Identifikatsiya strategiyalari

Raqamli muhitda sababiy ta’sirni ajratish — asosiy vazifa. Asosiy strategiyalar: (I) instrument o‘zgaruvchilar (IV), masalan, xabar yetkazishdagi tasodifiy kechikishlar yoki tarmoqdagi texnik nosozliklar instrument bo‘lishi mumkin; (II) regressiya uzilishlari (RDD) — reyting/ball chegaralari atrofidagi qarorlar; (III) propensity score matching va weighting — kuzatuv dizaynida muvozanatni tiklash; (iv) A/B va ko‘p qurolli bandit eksperimentlari — dinamik taqsimlash va eksploratsiya/ekspluatatsiya muvozanati. DiD metodlari raqamli xizmatlar bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yilganda ayniqsa foydali, biroq guruhlararo trend farqlari, kechikkan effektlar va kallaymanlik muammolariga ehtiyot bo‘lish zarur. Kausal daraxtlar va o‘rmonlar (causal trees/forests), doubly robust baholagichlar va ‘double machine learning’ metodlari heterogen ta’sirlarni xaritalashda kuchli vositadir.[3]

Mashinaviy o‘qitish va ekonometrika sintezi

Mashinaviy o‘qitish (MO) prognoz aniqligini oshiradi, ammo iqtisodiy qarorlar uchun talqin (interpretatsiya) ham zarur. Shuning uchun LASSO bilan IV,

[2] Angrist & Pischke (2009). Imbens & Rubin (2015). Wooldridge (2020).
[3] Angrist & Pischke (2009). Callaway & Sant’Anna (2021). Sun & Abraham (2021).

generalized random forests bilan CATE (Conditional Average Treatment Effect), gradient boostlar bilan uplift model, neyron tarmoqlar bilan talab prognozi va narx optimallashtirish kabi kombinatsiyalar qo‘llanadi. ‘Double/Debiased ML’ yondashuvi yuqori o‘lchamli xususiyatlarda ham parametrlarga asossiz og‘ishsiz baho beradi. Shuningdek, shapley-value va partial dependence chiziqlari kabi talqin vositalari ‘qora quti’ modellarining qaror mantig‘ini ochib beradi. Natijada, siyosat simulyatsiyasi va kontrfaktual tahlil ishonchliroq bo‘ladi; masalan, reklama byudjetini kanallar bo‘yicha qayta taqsimlashdan kutiladigan sof foyda.

Qo‘llanish sohalari: platforma iqtisodiyoti, fintech va siyosat

Platforma iqtisodiyotida tarmoq effektlari va ikki-tomonlama bozorlar narxlashini baholash — muhim yo‘nalish. Ekonometrika talab-elastikliklarni, o‘zaro almashtirishni va ko‘p tomonlama o‘yin natijalarini aniqlaydi. E-tijoratda tavsiyalar tizimining savdoga ta’siri, dinamik narxlashning daromadga qo‘shgan hissasi, reklama atributsiyasi (last-click vs data-driven) — bularning barchasi sababiy baholashni talab qiladi. Fintechda skoring modellarining adolatliligi, kreditga kirish imkoni va foiz stavkalari heterogenligini tahlil qilish kerak; A/B testlar orqali Onboarding oqimlari va limit siyosati sozlanadi. Raqobat siyosatida konsentratsiya indekslari, platformalarning o‘z-o‘zini imtiyozlash iddaolari, data-portativlikning farovonlikka ta’siri empirik tekshiriladi. Mehnat bozorida esa gig-ishlashning daromad, barqarorlik va ijtimoiy himoyaga ta’siri panel ma’lumotlar asosida o‘rganiladi.

Infratuzilma: ma’lumot quvurlari, hisoblash va vositalar

Raqamli iqtisodiy tahlil uchun ma’lumot quvurlarini (pipelines) to‘g‘ri qurish zarur: jurnal (log) yig‘ish, versiyalash, tajriba (experiment) metama’lumotlarini saqlash, ma’lumotlar katalogi va kirish huquqlarini boshqarish. Hisoblash infratuzilmasi — bulut (IaaS/PaaS), konteynerlar, orkestratsiya va avtomatlashtirish — katta hajmli hisoblarni tejamkor bajarish imkonini beradi. Ekonometrik va kausal kutubxonalar — statsmodels, linearmodels, scikit-learn, causalinference, causalml, econml — amaliyotda keng ishlatiladi. Vizualizatsiya va reprodyuserlik uchun noutbuk muhitlari, DAG rejalashtirgichlar va versiyalash tizimlari qo‘l keladi. Ma’lumot xavfsizligi va maxfiylik siyosatlari (minimallash, anonymizatsiya) tahlil jarayonining ajralmas qismi.

Etika, xolislik va me’yoriy muhit

Raqamli ma’lumotlar bilan ishlashda shaffoflik, rozilik va xolislik talab etiladi. Algoritmik kamsitish (bias) qarorlarni adolatsiz ko‘rsatishi mumkin; shuning uchun fairness-o‘lchovlar (demographic parity, equalized odds) va disparet ta’sir tahlillari o‘tkaziladi. Ekonometrik modellar uchun identifikatsiya taxminlari (exogeneity, parallel trend) ochiq bayon etilishi, replikatsiya fayllari bilan birga e’lon qilinishi kerak. Eksperimentlarda foydalanuvchi farovonligi va xavfsizligi ustuvor bo‘lishi lozim; zarar ehtimoli bo‘lsa, ‘stopping rules’ va ma’lumotlarni kuzatish qo‘mitalari qo‘llanadi. Ma’lumotlarni minimallashtirish, saqlash muddati va maqsadga muvofiqlik prinsiplari iqtisodiy samaradorlik bilan muvozanatda olib boriladi.

O‘zbekiston va mintaqaviy kontekst: imkoniyat va ustuvor yo‘nalishlar

O‘zbekiston va mintaqa uchun raqamli iqtisodiyotda ekonometrikaning qo‘llanilishi bir nechta ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: 1. to‘lov tizimlari va raqamli savdo oqimlari asosida soliqqa tortish bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyot ulushini baholash; 2. transport-logistika yo‘laklarida dinamik narxlash, tirbandlik va yetkazib berish vaqtini qisqartirish bo‘yicha siyosat simulyatsiyalari; 3.Ta’lim va sog‘liqni saqlash sektorlarida platformalashuvning natijalari; 4. raqamli davlat xizmatlarining fuqarolar ishonchi, vaqt tejami va korrupsiya risklariga ta’siri. Har bir yo‘nalishda ma’lumotlar boshqaruvi, metama’lumotlar standartlari, hamkorlik protokollari va kadrlar salohiyatini oshirish bo‘yicha kompleks dasturlar talab etiladi. Universitet—biznes—regulyator hamkorligida tajriba maydonchalari (regulatory sandbox) yaratish muhim.

Xulosa va tavsiyalar

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi iqtisodiy tahlilning mohiyatini tubdan o‘zgartirmoqda. An’anaviy statistik yondashuvlar o‘rnini ma’lumotlarga asoslangan, algoritmik tahlilga tayanuvchi, real vaqt rejimidagi qarorlarni baholash imkonini beruvchi ekonometrik tizimlar egallamoqda. Bugungi kunda ekonometrika faqat nazariy modellashtirish emas, balki iqtisodiy siyosat, biznes qarorlar va innovatsion strategiyalarni ilmiy asoslash vositasi sifatida raqamli iqtisodiyotning markazida turibdi.[4]

Raqamli iqtisodiyotning asosiy komponentlari — elektron tijorat, fintech, raqamli to‘lov tizimlari, platforma bozorlar va IoT ekotizimlari — ulkan hajmdagi ma’lumotlarni ishlab chiqaradi. Shu sababli, katta ma’lumotlar (Big Data) va mashinaviy o‘qitish bilan integratsiyalangan ekonometrik modellar zamonaviy iqtisodiy tahlilning ajralmas qismiga aylandi. Bu jarayonda identifikatsiya strategiyalari, sababiy tahlil, regressiya va panel ma’lumotlar modellarining yangi avlodini qo‘llash zarurati paydo bo‘ldi.

Ekonometrika raqamli muhitda empirik dalillarni tahlil qilish, sababiy munosabatlarni aniqlash va siyosiy qarorlar samaradorligini baholash imkonini beradi. Shuningdek, u raqamli iqtisodiyotni boshqarishda xolislik, shaffoflik va etik me’yorlarni ta’minlovchi ilmiy vosita sifatida ham katta ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sharoitida ekonometrika — raqamli iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha: soliq tizimini raqamlashtirish, fintech infratuzilmasini baholash, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarining samaradorligini tahlil qilish hamda raqamli xizmatlarning ijtimoiy ta’sirini o‘lchash kabi jarayonlarda strategik ahamiyat kasb etadi.

Shunday qilib, ekonometrika raqamli iqtisodiyot davrida faqat ilmiy tahlil vositasi emas, balki iqtisodiy barqarorlik, innovatsion boshqaruv va raqamli transformatsiyaning ilmiy tayanchi sifatida qaraladi. U ma’lumotdan dalilga, dalildan siyosatga, siyosatdan innovatsiyaga o‘tish zanjirini shakllantirib, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi o‘rin tutadi.

[4] Chernozhukov et al. (2018). Wager & Athey (2018).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press.

Athey, S., & Imbens, G. (2019). Machine Learning Methods That Econometricians Should Know. Annual Review of Economics, 11, 685–725.

Bai, J., & Ng, S. (2002). Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models. Econometrica, 70(1), 191–221.

Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age. W. W. Norton & Company.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200–230.

Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., & Robins, J. (2018). Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters. The Econometrics Journal, 21(1), C1–C68.

Choi, H., & Varian, H. (2012). Predicting the Present with Google Trends. Economic Record, 88, 2–9.

Einav, L., & Levin, J. (2014). Economics in the Age of Big Data. Science, 346(6210), 715–721.

Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. Annals of Statistics, 29(5), 1189–1232.

Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson.

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2nd ed.). Springer.

Imbens, G., & Rubin, D. (2015). Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences. Cambridge University Press.

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine Learning: An Applied Econometric Approach. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 87–106.

OECD. (2024). Digital Economy Outlook 2024. OECD Publishing.

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2011). Dynamic Factor Models. In M. P. Clements & D. F. Hendry (Eds.), Oxford Handbook of Economic Forecasting. Oxford University Press.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175–199.

Varian, H. R. (2014). Big Data: New Tricks for Econometrics. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 3–27.

Wager, S., & Athey, S. (2018). Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects Using Random Forests. Journal of the American Statistical Association, 113(523), 1228–1242.

Wooldridge, J. M. (2020). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage.

Gafforov X.X.
assistent
Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand. Uzbekistan

TAJRIBADA METILVINILPIRIDIN TAЪSIRIDA MARKAZIY ASAB TIZIMIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Annotatsiya: *Maqolada tajriba sharoitida kalamushlar bosh miyasiga metilvinilpiridin moddasining ta'siri o'rganilgan. 15 kun davomida metilvinilpiridin eritmasi peroral oziqlantirilib borildi. Kalamushlardan olingan miya to'qimasi Karnua va 10 % li formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. Gistologik tekshirish uchun Gematoksilin-eozin usullari va neyrogistologik Nissel usulida nerv to'qimasiga ishlov berildi. Miya pardalarida va miya to'qimalarida to'laqonlik, kapilyarlarda staz holatlari kuzatildi. Neyrogliol apparatlarda distrofik o'zgarishlar kuzatildi. Neyrositlarning bo'kish holati aniqlandi.*

Kalit so'zlari: *Tajriba, kalamush, metilvinilpiridin, Miya to'qimasi, Gematoksilin-eozin usuli, Nissel usuli, neyrosit hujayralari.*

Gafforov Kh.Kh.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Abstract. *The effect of methylvinylpyridine on the brain was studied in rats after oral administration of the solution for 15 days. Brain tissue was fixed in Carnoy's solution and 10% formalin. Histological examination (hematoxylin and eosin, Nissl method) revealed congestion of the meninges and brain parenchyma, capillary congestion, degenerative changes in neuroglia, and pronounced swelling of neurons.*

Keywords: *experiment, rats, methylvinylpyridine, brain, hematoxylin and eosin, Nissl method, neurons.*

Kirish. Metilvinilpiridin (MVP) kabi piridin asoslari sintetik kauchuk, lateks, plastmassa, ion almashinuvchi qatronlar va boshqa materiallar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Piridinlarning xalq xo'jaligida keng qo'llanilishi ko'p sonli odamlarning ular bilan aloqa qilishiga olib keladi, shuning uchun ma'lum sharoitlarda bu moddalarning ishchilarga toksik ta'siri bo'lishi mumkin [1, 2, 3]. Piridin ikki tomonlama ta'sirga ega ekanligi ma'lum: mahalliy, shilliq qavat va terini bezovta qiluvchi va asosan markaziy asab va qon tomir tizimlarining shikastlanishida namoyon bo'ladigan tizimli toksiklik. Klinik sharoitlarda giyohvand moddalar bilan

zaharlanishni eslatuvchi markaziy asab tizimining tushkunligi tasvirlangan [4, 5, 6,7]. Piridin bilan zaharlanish holatlarida asab tizimining morfologik tadqiqotlaridan olingan ma'lumotlar kam va tizimsiz, MVP uchun esa ular umuman yo'q. Bizning ishimizning maqsadi ushbu piridin asosining hayvonlar miyasiga biologik ta'sirini o'rganish edi.

Tadqiqot maqsadi. Eksperimental sharoitlarda metilvinilpiridin ta'sirida markaziy asab tizimidagi morfologik o'zgarishlarni o'rganish.

Materiallar va usullar. Eksperimentda uchta eksperimental va bitta nazorat guruhiga bo'lingan 55 ta oq kalamushlar olindi. 15 kun davomida og'iz orqali qabul qilish uchun DL-100 (DL-100 MVP = 1,4 g/kg tana vazni) ning 1/7, 1/4 va 1/21 qismini o'z ichiga olgan MVP suvli eritmalari hisoblab chiqildi. Bu birinchi guruh uchun hayvonning tana vazniga 200 mg/kg, ikkinchi guruh uchun 100 mg/kg va uchinchi guruh uchun 66 mg/kg ni tashkil etdi. Nazorat guruhidagi kalamushlarga ertalabki soatlarda oddiy suvi berildi. Eksperimental va nazorat hayvonlari narkoz ta’sirida dekaputatsiya orqali o’ldirildi. Miya to’qimasi Karnoy eritmasi va 10% neytral formalinga fiksatsiya qilindi, so'ngra seloidin, kerosin va jelatin qo'shildi. Sagittal va frontal kesmalar Nissl usuli yordamida gematoksilin va eozin bilan bo'yaldi.

Tadqiqot natijalari. Tajriba guruhidagi hayvonlardan olingan miya preparatlarini mikroskopik tekshirish turli darajadagi bir xil o'zgarishlarni aniqladi. Shuning uchun biz barcha materiallarning qisqacha tavsifini taqdim etamiz. Miya to'qimasi va pia mater qon bilan to'lib ketgan edi. Kapillyar tomirlarda staz holati sezilarli giperemiya miyaning bazal qismida, o'rta miyada va medulla oblongatasida ko'proq sezildi. Bu tomirlarda vaqti-vaqti bilan leykotsitlar to’planish holati, shuningdek, atrofdagi miya to'qimasining eritrotsitlar diapedezi va plazma singishi kuzatildi. Notekis qon oqimi kuzatildi, falaj bo'lib kengaygan, staz bo’lib qolgan va nekroz tomirlar almashinib turdi. Bu, ayniqsa, miyaning frontal korteks, ammon shoxi va bazal yadrolarida sezilarli edi. Ba'zan kapillyarlarning sezilarli darajada egriligi kuzatildi, bu kapillyar devor tonusining pasayishini ko'rsatadi. Qon tomirlarining endoteliysi o'zgargan ko'rinardi: ba'zi endoteliy hujayralari yengil va kattalashgan edi. Bu hujayralardagi yadrolar zo'rg'a ko'rinardi va ularning ichki tuzilishini ajratib bo'lmas edi. Ba'zan endoteliyning desquamatsiyasi kuzatildi. Xorioid pleksusida paralitik kengaygan va qulagan qon tomirlari ham ko'rinib turardi. Ba'zi joylarda diapedetik qon ketishi kuzatildi. Xorioid pleksusining epiteliyasi va miya qorinchalari devorlarini qoplagan ependima ba'zi joylarda sezilarli darajada o'zgargan. Alohida hujayralarning shishishi, och, kattalashgan ependimal hujayralar va piknotik giperxromatik yadrolarga ega yassilangan hujayralarning almashinishi kuzatildi. Turli kortikal sohalardagi neyronlarda xromatoliz va vaqti-vaqti bilan vakuolizatsiya kuzatildi. Apikal dendritlari keskin burishgan, intensiv bo'yalgan hujayralar juda kam uchraydi. Talamo-gipotalamus mintaqasidagi neyronlarda xromatoliz, ba'zan to'liq kuzatildi. Nissl reaksiyasining sezilarli darajada pasayishi bilan soyali hujayralar va neyronal vakuolizatsiya kuzatildi. Bu yerda deformatsiyalangan giperxromik hujayralar korteksga qaraganda ko'proq uchraydi. Mezotelioma va medulla oblongatasining yirik

neyronlarida sitoplazmatik skeletizatsiya kuzatildi. Ba'zi yadrolarda nerv hujayralarining aksariyati og'ir xromatoliz holatida bo'lgan, yadrolarni esa deyarli sezish mumkin bo'lmagan. Glial elementlar bu hujayralar atrofida odatdagidan ko'proq miqdorda to'plangan va neyronofagiya kuzatilgan. Serebellar Purkinje hujayralari orasida neyronlar deyarli to'liq xromatoliz holatida bo'lganligi, shuningdek, odatiy nok shaklidagi shaklini yo'qotgan va butunlay tionin bilan bo'yalgan ajinlangan nerv hujayralari kuzatilgan. Purkinje hujayralarining butun guruhlarining yo'qolishi ham kuzatilgan. O'rganilgan intoksikatsiyaning subakut shaklida biz neyroglial reaksiyani ham kuzatdik. Asosan yakka, tolali, och rangli astrositlar paydo bo'ldi. Ularda oz sonli jarayonlar, ba'zan parchalanib ketgan jarayonlar mavjud edi. Miyaning bazal yadrolari yaqinida, serebellumning oq moddasida izolyatsiya qilingan mikrogliotsitlar topilgan. Ular zaif bo'yalgan va ularning jarayonlarida ikkilamchi tarmoqlanish yo'q edi. Xorioid pleksus stromasi yaqinida qo'pol, giperimpregnalangan mikrogliotsitlar kuzatilgan. Kichik mikroglial tugunlar juda kam uchraydi.

Xulosa: Shunday qilib, subakut MVP zaharlanishi jiddiy qon tomir kasalliklari va neyroglial apparatda degenerativ o'zgarishlarga olib keladi. Bu o'zgarishlar tarqoq bo'lib, eng katta darajada miya po'stlog'ida, talamogipotalamik mintaqada va miya sopi qismida kuzatiladi. MVP intoksikatsiyasida kuzatiladigan qon aylanish jarayonlarining buzilishi, shubhasiz, neyronlar va gliyalarda patologik o'zgarishlarning tarqalishi va kuchayishiga yordam beradi. Nerv hujayralarida xromatoliz, vakuolizatsiya va ajinlangan, giperxrom neyronlar, shuningdek, arvoh hujayralari paydo bo'lishi kuzatildi. Gliya ham neyronlar bilan birga o'zgardi. Subakut MVP zaharlanishida kuzatiladigan neyronlar va gliyadagi qo'shma o'zgarishlar ularning fiziologik birligini ko'rsatadi. Zaharlanish paytida glial apparatga sezilarli darajada zarar yetkazilishi, shubhasiz, neyronlar tomonidan kompensator himoya reaksiyalarining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аветисян Э.А. Участие септальных ядер в регуляции активности ваго-сенситивных нейронов ядра солитарного тракта у кошек // Росс, физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2002. Т. 88. № 12. С. 1512-1520.
2 Бекмурадова М. С., Холтураев А. Т., Гаффаров Х. Х. Влияние ингибиторов протонной помпы на степень развития печеночной энцефалопатии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62). – С. 88-91.
3. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
4. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузрья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в

сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6 Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени //Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6.
7. J K Wamsley, M A Zarbin, M J Kuhar. Muscarinic cholinergic receptors flow in the sciatic nerve. PMID: 6167327.DOI: 10.1016/0006-8993(81)90193-1

УДК 616.98:618.1

Gaybullayeva A.
assistant
Department of Pediatrics №2
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN

Abstract. *Upper respiratory tract infections (URTIs) are common in children and present with variable clinical and diagnostic features. This study aimed to evaluate the clinical presentation and diagnostic characteristics of URTIs in children. A prospective observational study included 120 children aged 3–12 years divided into three groups according to disease severity. Nasal congestion and rhinorrhea were the most frequent symptoms, while fever, cough, and sore throat were more common in moderate and severe cases. Increased leukocyte count and C-reactive protein levels were associated with greater disease severity. Combined clinical and laboratory assessment may improve diagnostic accuracy and support rational management of pediatric URTIs.*

Keywords*: upper respiratory tract infections; children; clinical features; diagnostic features; C-reactive protein; disease severity.*

Introduction. Upper respiratory tract infections (URTIs) are among the most common infectious conditions in children worldwide and constitute a leading cause of pediatric outpatient visits and hospital admissions [1,2]. These infections involve the nasal cavity, pharynx, larynx, and paranasal sinuses and are predominantly caused by viral pathogens, although bacterial agents may be implicated in certain cases [2,3]. According to the World Health Organization, acute respiratory infections remain a major contributor to childhood morbidity, particularly in low- and middle-income countries [1]. Children are especially susceptible to URTIs due to immune system immaturity, frequent exposure in childcare and school environments, and anatomical features of the upper airways [3,4].

Viruses such as rhinoviruses, respiratory syncytial virus, influenza viruses, adenoviruses, and coronaviruses account for the majority of pediatric URTIs [2,4,7], whereas bacterial pathogens including *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, and *Haemophilus influenzae* are less frequent but clinically significant because of their association with complications and the need for antibiotic therapy [3,6]. The difficulty in distinguishing viral from bacterial infections contributes to inappropriate antibiotic use, increasing the risk of antimicrobial resistance [5]. Current clinical guidelines emphasize rational antibiotic prescribing, symptomatic management, and preventive strategies, as outlined by the Centers for Disease Control and Prevention and the American Academy of Pediatrics [5,6].

The purpose of the study was to assess the clinical manifestations and diagnostic characteristics of upper respiratory tract infections in children.

Material and methods. A prospective observational study was conducted involving 120 children diagnosed with upper respiratory tract infections (URTIs). The study was carried out at a pediatric outpatient and inpatient department from January 2024 to December 2025.

Children aged 3 to 12 years were enrolled in the study. The diagnosis of URTIs was established based on clinical symptoms and physical examination findings in accordance with accepted pediatric guidelines.

All enrolled children were divided into three groups chaotically, without preliminary stratification by age, sex, or disease severity. Group allocation was performed consecutively at the time of presentation, reflecting routine clinical practice. Group I included 40 children with predominantly mild clinical manifestations of URTIs. Group II consisted of 42 children with moderate clinical symptoms. Group III comprised 38 children with more pronounced clinical manifestations requiring closer medical supervision.

Clinical evaluation included assessment of general condition, body temperature, nasal congestion, rhinorrhea, sore throat, cough, pharyngeal hyperemia, and cervical lymphadenopathy. Disease severity was determined based on the intensity and combination of clinical symptoms. All patients underwent routine laboratory investigations, including complete blood count and measurement of inflammatory markers (C-reactive protein). Instrumental diagnostic methods were applied when clinically indicated. Diagnostic criteria were used to differentiate viral and suspected bacterial infections based on clinical presentation and laboratory findings.

Statistical analysis was performed using SPSS software (version 26.0). Quantitative variables were expressed as mean ± standard deviation, while qualitative data were presented as absolute numbers and percentages. Intergroup comparisons were performed using appropriate statistical tests. Differences were considered statistically significant at $p<0.05$.

Results and analyses. A total of 120 children with upper respiratory tract infections were included in the study. The mean age of the patients was 7.4±2.6 years, with no statistically significant difference between the groups ($p>0.05$). Boys accounted for 55.0% (n=66) and girls for 45.0% (n=54) of the study population.

The distribution of patients according to disease severity demonstrated a predominance of mild and moderate forms of URTIs, while severe manifestations were less frequent.

Table 1

Demographic characteristics of the study groups

Parameter	Group I (n=40)	Group II (n=42)	Group III (n=38)	Total (n=120)
Age, years (mean ± SD)	7.2 ± 2.4	7.5 ± 2.7	7.6 ± 2.8	7.4 ± 2.6
Boys, n (%)	22 (55.0)	24 (57.1)	20 (52.6)	66 (55.0)
Girls, n (%)	18 (45.0)	18 (42.9)	18 (47.4)	54 (45.0)

No significant differences in age or sex distribution were observed among the groups ($p>0.05$), indicating comparability of the study cohorts.

Clinical symptoms varied depending on disease severity. Nasal congestion and rhinorrhea were the most common symptoms across all groups, while fever, sore throat, and cough were more frequently observed in children with moderate and severe manifestations.

Table 2

Frequency of clinical symptoms in study groups, n (%)

Symptom	Group I	Group II	Group III
Nasal congestion	36 (90.0)	40 (95.2)	37 (97.4)
Rhinorrhea	35 (87.5)	39 (92.9)	36 (94.7)
Fever (>38°C)	10 (25.0)	26 (61.9)	30 (78.9)
Sore throat	18 (45.0)	30 (71.4)	32 (84.2)
Cough	22 (55.0)	33 (78.6)	35 (92.1)
Cervical lymphadenopathy	6 (15.0)	14 (33.3)	18 (47.4)

A statistically significant increase in the frequency of fever, cough, sore throat, and lymphadenopathy was observed with increasing disease severity ($p<0.05$).

Laboratory analysis revealed progressive changes in inflammatory markers corresponding to clinical severity. Children in Group III demonstrated higher leukocyte counts and C-reactive protein (CRP) levels compared to Groups I and II.

Table 3

Laboratory parameters in the study groups (mean ± SD)

Parameter	Group I	Group II	Group III
WBC ($\times 10^9$/L)	6.8 ± 1.2	8.4 ± 1.6	10.2 ± 2.1
Neutrophils (%)	45.2 ± 6.3	54.8 ± 7.1	62.5 ± 8.4
Lymphocytes (%)	42.6 ± 7.0	35.1 ± 6.8	28.4 ± 6.2
CRP (mg/L)	4.1 ± 1.8	11.6 ± 3.4	24.8 ± 6.2

Significant differences were observed between Group III and the other groups in terms of leukocyte count and CRP levels ($p<0.05$), suggesting a higher probability of bacterial involvement in severe cases.

Based on clinical presentation and laboratory findings, viral URTIs predominated in Group I, whereas suspected bacterial infections were more frequently identified in Groups II and III.

Table 4

Presumed etiology of URTIs in study groups

Etiology	Group I	Group II	Group III
Viral	34 (85.0)	26 (61.9)	18 (47.4)
Suspected bacterial	6 (15.0)	16 (38.1)	20 (52.6)

The proportion of suspected bacterial infections increased significantly with disease severity ($p<0.05$), emphasizing the importance of careful diagnostic evaluation to guide therapeutic decisions.

The analysis demonstrated clear differences in clinical manifestations and diagnostic indicators among children with varying severity of URTIs. Mild forms were predominantly viral and characterized by limited systemic involvement, whereas moderate and severe cases showed more pronounced clinical symptoms and elevated inflammatory markers, suggesting possible bacterial etiology.

Discussion. The results of this study demonstrate that the clinical presentation of upper respiratory tract infections (URTIs) in children varies significantly depending on disease severity. Nasal congestion and rhinorrhea were the most common symptoms across all groups, which is consistent with previous reports identifying these features as the hallmark manifestations of pediatric URTIs [8,9]. In contrast, fever, cough, sore throat, and cervical lymphadenopathy were more frequently observed in children with moderate and severe disease, indicating greater systemic involvement.

Laboratory findings revealed a progressive increase in leukocyte count and C-reactive protein levels with increasing severity, supporting their role as useful indicators of inflammatory activity [10]. Elevated CRP values and neutrophil predominance in severe cases suggest a higher likelihood of bacterial involvement, although overlap between viral and bacterial infections remains a well-recognized diagnostic challenge [9,10]. Similar observations have been described in previous studies emphasizing the limited specificity of individual laboratory markers when used in isolation.

The predominance of viral etiology in mild URTIs observed in this study is in agreement with existing literature, which reports that most pediatric URTIs are caused by viral pathogens and do not require antibiotic therapy [8,11]. The increasing proportion of suspected bacterial infections in more severe cases highlights the importance of integrating clinical findings with laboratory data to support rational treatment decisions and reduce inappropriate antibiotic use [11].

Conclusion. Upper respiratory tract infections in children demonstrate variable clinical presentation and diagnostic findings depending on disease severity. The combined assessment of clinical symptoms and basic laboratory markers

improves diagnostic accuracy and supports rational management of pediatric URTIs, helping to reduce unnecessary antibiotic use and prevent complications.

REFERENCES

1. World Health Organization. Acute respiratory infections in children. Geneva: WHO; 2023.
2. Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. Lancet. 2003;361(9351):51–59.
3. van der Linden MW, van Suijlekom-Smit LW, Schellevis FG, van der Wouden JC. Upper respiratory tract infections in children. Fam Pract. 2004;21(6):672–677.
4. Peltola V, Ziegler T, Ruuskanen O. Influenza A and B virus infections in children. Clin Infect Dis. 2003;36(3):299–305.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic prescribing and use in children. Atlanta: CDC; 2022.
6. American Academy of Pediatrics. Clinical practice guideline: diagnosis and management of upper respiratory tract infections in children. Pediatrics. 2021;148(2):e202105148.
7. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. Community-acquired respiratory infections in children. N Engl J Med. 2015;372(9):835–845.
8. Ruuskanen O, Lahti E, Jennings LC, Murdoch DR. Viral pneumonia. Lancet. 2011;377(9773):1264–1275.
9. Worrall G. Acute upper respiratory tract infections in children. Can Fam Physician. 2007;53(11):1961–1962.
10. Van den Bruel A, Thompson M, Haj-Hassan T, et al. Diagnostic value of laboratory tests in identifying serious infections in children. BMJ. 2011;342:d3082.
11. Hersh AL, Jackson MA, Hicks LA. Principles of judicious antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in pediatrics. Pediatrics. 2013;132(6):1146–1154.

Habibullayev T.U.
assistant
Department of Department of Pathophysiology and Pathological Anatomy
Bukhara State Medical Institute

MORPHOFUNCTIONAL EVALUATION OF MELOXICAM-INDUCED PROTECTION OF TESTICULAR TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS

Abstract *The present study investigated the effect of the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) meloxicam on the morphological and morphometric parameters of testicular tissue in outbred white rats with experimentally induced rheumatoid arthritis. The drug was administered to the animals at a dose of 1 mg/kg once daily for 14 days.*

Macroscopic examination revealed that the testes maintained typical localization within the scrotum, exhibiting an oval-ovoid shape, smooth surface, and medium-density consistency. Vascular congestion was noted in the hilar region, with no pathological or congenital abnormalities in the vascular network. The parietal layers of the tunica vaginalis remained transparent, whereas the visceral tunica albuginea was characterized by reduced transparency and slight opacification. Similar macroscopic changes were observed across all studied age groups (5- and 7-month-old rats).

Microscopic and morphometric analysis showed that the thickness of the highly vascularized tunica albuginea ranged from 37.33±1.87 to 48.15±3.74 μm (mean 44.58±3.21 μm). It was established that this parameter was lower compared to the group of rats with experimental rheumatoid arthritis but slightly exceeded the values characteristic of intact animals. The data obtained indicate a partial recovery of the structural components of the testicular tissue under the influence of meloxicam, confirming its protective effect in a chronic inflammatory environment.

Keywords: *meloxicam; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; experimental rheumatoid arthritis; morphological changes; testes.*

Introduction

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic autoimmune disease characterized not only by erosive-destructive joint damage but also by a wide range of extra-articular manifestations. Despite significant advances in rheumatology, the impact of systemic inflammation on the male reproductive system remains an understudied area of clinical and experimental pathology. Chronic autoimmune processes trigger a cascade of oxidative stress and pro-inflammatory cytokine release, which negatively affect the structural and functional integrity of highly sensitive tissues, including the testes.

The testicular parenchyma is particularly vulnerable to systemic inflammatory responses due to the potential disruption of the blood-testis barrier

(BTB). Experimental studies have shown that autoimmune inflammation can lead to vasculitis of the interlobular arteries, perivascular edema, and subsequent atrophy of the seminiferous epithelium, ultimately resulting in impaired spermatogenesis and hormonal imbalance.

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) remain the cornerstone of symptomatic therapy for RA. Among them, meloxicam, a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor, is widely used due to its favorable safety profile and potent anti-inflammatory effects. However, while its efficacy in joint preservation is well-documented, its specific gonadoprotective potential—specifically its ability to facilitate the morphofunctional recovery of testicular tissue—requires further investigation.

The aim of this study was to conduct a comprehensive morphometric and histochemical analysis of the testicular tissue in outbred white rats following the pharmacological correction of experimental rheumatoid arthritis with meloxicam. By quantifying changes in the tunica albuginea, interlobular septa, and spermatogenic epithelium, this research seeks to evaluate the regenerative capacity of the male reproductive system under the influence of selective COX-2 inhibition in a chronic inflammatory environment.

Materials and methods. Following the administration of the nonsteroidal anti-inflammatory drug meloxicam to outbred white rats with induced experimental rheumatoid arthritis (dosage: 1 mg/kg via injection once daily for 14 days), the following results regarding morphological and morphometric changes in the testicular tissue were obtained:

The testes were correctly localized within the scrotal sac. Upon excision, the testicular tissue exhibited an oval-ovoid shape with a smooth surface and medium-density consistency. The transparency of the parietal layers of the tunica vaginalis was preserved; however, vascular congestion was identified at the site of vascular entry on the testicular surface. No pathological or congenital malformations were observed in the blood vessels. The visceral tunica albuginea covering the soft-textured tissue showed a relative decrease in transparency and appeared cloudy. These macroscopic findings were consistent across all age cohorts, specifically in 5- and 7-month-old outbred white rats.

Analysis of specimens derived from the aforementioned macroscopic material revealed specific morphometric trends. The thickness of the vascularized tunica albuginea, which encapsulates the testes, ranged from 37.33±1.87 μm to 48.15±3.74 μm, with an overall mean of 44.58±3.21 μm. Morphometric measurements indicated that the tunica albuginea was thinner compared to the untreated experimental rheumatoid arthritis group, yet remained slightly thicker when compared to the healthy control group.

The blood vessels located beneath the tunica albuginea exhibit a notable absence of inflammatory changes. There is evidence of vascular wall regeneration, restoration of turgor, and a sequential, organized arrangement of endothelial cells within the intima. Furthermore, perivascular edema has resolved.

Morphometric measurements revealed that the diameter of the peripheral interlobular arteries ranged from 13±2.05 μm to 18±3.04 μm (mean: 16±2.02 μm). The diameter of the venous vessels ranged from 14±1.47 μm to 31±2.04 μm (mean: 25±2.35 μm). These vessels appeared thinner, indicating that the corrective treatment improved blood flow within the vascular lumen. This suggests the activation of regenerative functions due to an increased supply of nutrients to the tissues.

Specifically, in the most affected areas—the interlobular septa and the interstitial tissue located beneath the tunica albuginea—collagen fibers are now uniformly and densely arranged. Within the interstitial tissue, the presence of homogeneous, transparent fluid has decreased, replaced by the appearance of fine vacuoles, which signifies the development of an organizational (healing) process. Morphometric analysis established that the thickness of the convoluted interlobular septa in the central zones ranged from 3.17 μm to 8.92 μm, with a mean value of 6.3±3.4 μm (Fig. 1.).




Fig. 1. Microscopic appearance of the testicular tissue in 5-month-old outbred white rats of the control group following the correction of rheumatoid arthritis with meloxicam. Hematoxylin and eosin (H&E) stain. Magnification: ×200.

Morphometric measurements established that the convoluted interlobular space thins progressively from the periphery toward the center. Morphological examination clearly reveals a rapid increase in the diameter of the seminiferous tubules located beneath the tunica albuginea. Morphometric analysis of the convoluted tubules diameter showed values ranging from 164.2±4.21 μm to 187.7±2.84 μm, with a mean of 178.33±2.64 μm.

In the tubules situated directly beneath the tunica albuginea, restoration of the spermatogenesis process is evident. An increase in the activity and number of Sertoli cells and spermatogenic cells was observed. This process led to the expansion of the

internal tubular lumen, which measured between 15.46±2.15 μm and 22.58±5.14 μm (mean: 18.27±4.05 μm). Consequently, the surface area of the convoluted tubules increased, occupying an area between 15,928.4 and 28,842.8 μm². Intense spermatogenetic activity is notable across all convoluted tubules, characterized by the formation of a large number of spermatozoa within the tubular lumen.

The approximation of the spermatogenesis process within the tubular lumen to that of healthy testicular tissue is evidenced by the reduction and reabsorption of the homogeneous transparent fluid within the interlobular septa. The appearance of fine vacuoles indicates an accelerated organizational (healing) process and an increase in the number of Leydig cells in these areas. Evaluation of the average number of Leydig cells per field of view revealed an increase from 32 to 38. Their count has normalized relative to the control group, showing a uniform spatial distribution.

Following the increase in Leydig cell population, it was observed that the tubular basement membrane was reinforced, and the width of the myoid cells in this region increased. Morphometric measurements of the myoid cells ranged from 15.8±1.78 μm to 21.35±1.21 μm, with a mean of 18.42±2.52 μm.

The Sertoli cells located on the basement membrane measured between 17.84±1.75 μm and 27.43±2.05 μm (mean: 23.21±1.81 μm). The surviving spermatogenic epithelial cells proliferated rapidly, with their height ranging from 31.4 μm to 49.87 μm, reaching an average level of 39.54 μm.

After evaluating the morphological and morphometric changes in the testicular tissue following the pharmacological correction of experimental rheumatoid arthritis, it was observed that while these parameters differ slightly from the healthy control group, the functional state remains highly active. The morphometric indices significantly approached the values of the control group.

To analyze the histochemical processes occurring within the testicular tissue, specimens were examined using Van Gieson's stain. Significant histochemical changes were observed in the highly vascularized tunica albuginea and the vascular walls. These changes included the complete resolution of vasculitis within the vessel walls, thinning of the vascular walls, and improved microcirculation within the lumens.

A decrease in perivascular edema was noted, which serves as a primary morphological indicator of restored regenerative processes in the surrounding tissues. Upon histochemical staining, these areas exhibited a light-yellowish tint. Morphometric analysis established that the diameter of the blood vessels within the interlobular septa in the central zones ranged from 14 μm to 18 μm, with a mean value of 16 μm.

Conclusion

The comprehensive morphofunctional analysis of testicular tissue in outbred white rats demonstrates that the administration of meloxicam (1 mg/kg) effectively mitigates the destructive consequences of experimental rheumatoid arthritis. The study yields the following key conclusions:

1. Restoration of Tissue Architecture: Pharmacological correction leads to a significant reduction in the thickness of the tunica albuginea (averaging 44.58±3.21 μm) and interlobular septa (6.3±3.4 μm), signaling the resolution of chronic inflammatory infiltration and moving these parameters closer to those of intact animals.

2. Vascular Recovery and Microcirculation: Histochemical analysis using Van Gieson's stain confirmed the resolution of vasculitis and perivascular edema. The normalization of vascular diameters (arteries: 16±2.02 μm; veins: 25±2.35 μm) and the restoration of endothelial integrity indicate an activated regenerative function driven by improved nutrient supply to the parenchyma.

3. Revitalization of Spermatogenesis: The treatment triggered a robust recovery of the spermatogenic epithelium. This is evidenced by the increased diameter of the seminiferous tubules (178.33±2.64 μm) and the expansion of their internal lumen (18.27±4.05 μm). The intensified proliferative activity of Sertoli and spermatogenic cells resulted in a significant increase in the total surface area of the convoluted tubules (up to 28,842.8 μm^2).

4. Endocrine Stability: The normalization of the Leydig cell count (increasing to 38 per field of view) and their uniform spatial distribution suggest a recovery of the interstitial endocrine component, which is essential for maintaining the hormonal environment necessary for sperm production.

5. Regenerative Potential: The transition from homogeneous fluid exudation to the formation of fine vacuoles and dense collagen organization in the interstitium confirms that meloxicam facilitates the transition from chronic inflammation to active tissue repair.

In summary, meloxicam exhibits a pronounced gonadoprotective effect in the context of systemic autoimmune inflammation, partially restoring both the structural integrity and the functional (spermatogenic) capacity of the testes.

References

1. Dimitrov G, Petrov S, Ivanov A. Extra-articular manifestations of Rheumatoid Arthritis: The impact of systemic inflammation on male gonadal function. *J Clin Rheumatol.* 2021;27(4):142-149.
2. Sengupta P, Dutta S, Alzahrani FA. The effects of chronic systemic inflammation on the blood-testis barrier integrity: A molecular perspective. *Reprod Toxicol.* 2019;85:12-21.
3. Hasan SS, Ahmed AS, Al-Ghaban NM. Meloxicam attenuates oxidative stress and histological damage in testicular injury models: A morphometric study. *J Pediatr Urol.* 2020;16(3):345.e1-345.e7.
4. Zhu Q, Liu Y, Zhang Y, et al. Quantitative morphometric analysis of seminiferous tubules in experimental models of autoimmune diseases. *Annals of Anatomy.* 2022;239:151842.
5. Kandiel MM, Watanabe G, Taya K. Impact of Selective COX-2 Inhibitors on the Pituitary-Testicular Axis and Spermatogenesis. *Front Vet Sci.* 2021;8:643125.
6. O'Hara L, Smith LB. Hormonal regulation of Leydig cell development and regeneration in the adult testis. *Mol Cell Endocrinol.* 2015;416:1-12.

7. Masarwa R, Levine H, Zadka O, et al. NSAIDs and male reproductive health: A systematic review of experimental and clinical evidence. *Reprod BioMed Online.* 2018;37(1):81-90.
8. Guan Q, Wang Z, et al. Environmental factors and oxidative stress in rheumatoid arthritis: Implications for male fertility. *Environ Sci Pollut Res.* 2023;30(12):32145-32158.

Irisboyev F.B.
katta o‘qituvchisi
Jizzax politexnika institute

REZISTORLAR VA ULARNING GURUHLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqola Rezistorlar (yoki qarshiliklar) – elektron apparatlarining eng ko'p tarqalgan komponentalari bo'lib ular yordamida sxema zanjirlari va elementlari o'rtasida elektr energiyasi taqsimlanadi va boshqariladi.*

Kalit so‘zlar *Rezistorlar, elektr qarshilik, solishtirma qarshilik, doimiy rezistorlar, o'zgartirilgan rezistorlar, soz qanday qilib termorezistorlar, po rezistorlar, reostat, termorezistorlar, term, fotorezistor, varistor, yuqori qarshilikli rezistorlar, o'tgan qarshilikli rezistorlar, quvvatga qarshilik, nominal qarshilik.*

Irisboyev F.B.
senior lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute
Jizzakh

RESISTORS AND THEIR GROUPS

Abstract. *Resistors, electrical resistance, relative resistance, constant resistors, modified resistors, how to say thermistors, po resistors, rheostat, thermistors, therm, photoresistor, varistor, high resistance resistors, resistors with a resistance of 100%, power resistance, nominal resistance.*


Keywords. *Semiconductor materials, semiconductor physics, crystal lattice, atomic bonds, covalent bonding, energy bands, valence band, conduction band, excited band, energy band generation, Fermi energy, moving carriers, electrons.*

Rezistorlar (yoki qarshiliklar) – elektron apparatlarining eng ko'p tarqalgan komponentalari bo'lib ular yordamida sxema zanjirlari va elementlari o'rtasida elektr energiyasi taqsimlanadi va boshqariladi.

Ishlatilishiga bog'liq ravishda rezistorlar ikki guruhga bo'linadi: 1) umumiy maqsadlarda ishlatiladigan rezistorlar (nominal qiymatlari diapazoni 1Om – 10 Mom gacha; nominal quvvati isrofi 0.062-100Vt gacha); 2*) maxsus maqsadlarda ishlatiluvchi rezistorlar.* Bu rezistorlar o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi: a) yuqori omli rezistorlar (bir necha mega Omdan yuz tera Omlarga, ishchi kuchlanishi esa 100-400 V oralig'ida) b) yuqori voltli rezistorlar (qarshiligi 10^{11} Om gacha, ishchi kuchlanishi esa birdan bir necha o'n kilovolt gacha); v) yuqori chastotali rezistorlar (kichik xususiy sig'im va induktivlikka ega bo'ladi); g) prezision qarshiliklar (yuqori darajada aniqlik ruxsat etilgan xatolik 0.001÷1% gacha, nominal qiymatlari 0.1Om dan 10 Mom gacha; nominal isrof quvvati ikki Vt gacha)

O'zgaruvchi rezistorlar, sozlovchi va boshqariluvchi kabi turlarga bo'linadi.

Sozlovchi rezistorlar elektr maromlarini sozlash ishlarini o'tkazish uchun mo'ljallangan bo'lib u unchalik katta bo'lmagan yoyilishga chidamlilikka ega bo'ladilar (harakatlanuvchi qismining siljishlarining 1000 siklgacha chidaydi.). Boshqariluvchi rezistorlar esa ko'p sondagi boshqarishlarni oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib ular katta darajada yoyilishlarga chidamliligi bilan ajralib turadi. (5000 dan ortiq qiymatga chidaydi) va harakatlanuvchi qismining siljishlarida ularning qarshiligining o'zgarishi xarakteriga qarab chiziqli A_9 va nochiziqli funksional xarakteristikali bo'lgan: B-logorifmli, V-nologorifmli , N va E turdagi xarakteristikali **(1.1 rasm a,b)** kabi turlarga bo'linadi.



a-chiziqli (A); logarifmli (B); teskari logorifmli (C);

b - D, E turdagi xarakteristikalar; α_n va α- harakat qismining to'liq va joriy bo'lishi burchaklari; R_n va R- qarshilikning to'liq va joriy (odatdagi) qiymatlari;

Rezistorning o'tkazuvchi elementlarini izoliyasiya asos sirtiga o'tkazilgan parda ko'rinishida, sim yoki mikrosim xamda hajmiy konstruksiya kurinishida yasaladi.

O'tkazuvchi elementni hosil qilish uchun ishlatilgan materialga bog'liq ravishda rezistorlar simli, simsiz, metall, filtrli, (o'tkazuvchi element, o'tkazmaydigan asosga surkalgan folgadan yasalgan) kabi turlarga bo'linadi. Simli va metall folgali rezistorlarda o'tkazuvchi element materiali sifatida marganin va nixrom ishlatiladi.

Simsiz rezistorlarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin:

a) uglerodli va bor uglerodli simsiz rezistorlar o'tkazuvchi element o'tkazmaydigan taglikka o'tqazilgan pirolitik uglerod yoki uning birikmalarining pardasidan iborat bo'ladi.

b) metaldielektrik; metall pardali yoki metalloksidli simsiz rezistorlar (o'tkazuvchi elementda dielektrik va metalldan yoki metall pardadan, metall yoki uning qorishmasining oksididan yasalgan).

Kompazision simsiz rezistorlar (o'tkazuvchan elementidan bir qancha kompanentalardan iborat bo'lgan geterogen tizim bo'libkomponentalaridan biri o'tkazgich bo'ladi masalan grafit yoki qurum)

g) (o'tkazuvchan elementi yarim o'tkazgich materiallaridan yasalgan)

Konstruktiv yasalishi jihatidan yarim o'tkazgichli simsiz rezistorlar rezistorlar normal va tropik (hamma iqlimlarga mos keladigan) variantlarda tayyorlanadi ularning izoliyasiyalanmagan (tok o'tkazuvchi qismlarga tegishiga ruxsat berilmaydi) germetiklashtirilgan, jumladan vakuumli (atrof muxitdan germetik ravishda izoliyasiya qilingan) qilib yasaladi.

Qarshiligi 475 Om bo'lgan va ±2% ruxsatga ega bo'lgan rezistorlarning kodlangan belgisi K 475 G kabi bo'ladi.

Rezistorlarda issiqlik shovqinlari

Har qandayrezistorlar issiqlik shovqinlari mavjud bo'ladi. Ular zaryad tashuvchilarning (elektronlarning) qattiq jism ichidagi issiqlik xarakatlari tufayli paydo bo'ladilar. Uning o'rtachi quvvatini Naykvist formulasi bilan aniqlash mumkin.

$$p_{sh} = 4KT\Delta f \qquad (1)$$

Bu yerda K=1.38·10^{-23} J/K; Bolsman doimiysi; T – absolyut harorat; Δf esa $\Delta f = f_2 - f_1$ orqali o'lchanuvchi chastota polosasi.

Shovqin kuchlanishining harakatdagi qiymati quvvat tenglamasi bilan bog'liqdir:

$$P_{sh} = \frac{U_{sh}^2}{R} \qquad (2)$$

bundan

$$U_{sh}^2 = P_{sh}R = 4KT\Delta f \qquad (3)$$

yoki

$$U_{sh} = \sqrt{4KT\Delta f}. \qquad (4)$$

T= 293 Kharoratdabutenglamaquyidagiko'rinishgaegabo'ladi:

$$U_{sh} = 0.127\sqrt{R\Delta f} \qquad (5)$$

Bu yerda R- k Om larda, Δf- k Gs larda va U_{Sh}- mkV larda ifodalangan Shovqinlarning issiqlik kuchlanish holatiga bog'liq. Bundan tashqari rezistor unga elektr kuchlanishi qo'yilganda hosil bo'luvchi toklar shovqiniga egadir. Ushbu shovqinlarning kuchlanishi ta'sir etuvchi qiymati birinchi yaqinlashishda quyidagi tenglamadan topiladi:

$$U_{sh} \approx K_1 U \sqrt{R \lg \frac{f_2}{f_1}}. \qquad (6)$$

Bu yerda K_1 – ushbu rezistor uchun doimiy parametr; U – rezistordagi doimiy kuchlanish; f_2 va f_1 – shovqin polosasida aniqlanayotgan yuqori va past chastotalar.

Tashqi shovqinlarning sathi, $\Delta f = f_2 - f_1$ chastota polosasida o'lchangan rezistordagi o'zgaruvchan tashkiliy kuchlanishni undagi doimiy kuchlanish U ga munosabati bilan baholanadi:

$D_{sh}=U_{sh}/U.$ *(7)*

Shovqinlarning paydo bo'lishining asosiy sababi – elektronlar hajmiy konsentratsiyasining (to'plamining) vaqtincha o'zgarishi va donali strukturaga ega bo'lgan o'tkazgich donalari o'rtasidagi kontaktli (tegish) qarshiligini o'zgarishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boymirzayevich, I. F. (2023). THE INPUTS ARE ON INSERTED SILICON NON-BALANCED PROCESSES.
2. Boymirzayevich, I. F. (2024). SINXRON MOSHINALARNING TURLARI VA TUZILISHI.
3. Boymirzayevich, I. F. (2024). TYPES AND STRUCTURE OF SYNCHRONOUS MACHINES.
4. Irisboyev, F. (2024). THE PLACE OF NANOTECHNOLOGY IN THE PRESENT TIME. *Modern Science and Research*, *3*(1), 52-56.
5. Irisboyev, F. (2024). THE IMPORTANCE OF ENERGY USE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, *3*(1), 78-81.
6. Irisboyev, F. (2024). THE IMPORTANCE OF ENERGY USE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, *3*(1), 78-81.
7. Irisboyev, F. B., & Mukhtorov, D. N. U. (2024). TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF SOLAR ELEMENTS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, *4*(2), 107-110.
8. Irisboyev, F., & Qayumov, D. (2024). FEATURES AND AREAS OF USE OF DIGITAL MICROCIRCUITS. DIGITAL SIGNAL REFLECTION DEVICES. *Interpretation and rese*
9. Irisboyev, F. B. (2024). VAKUUMLI FLUORESSENT INDIKATORLARI. *Iqtisodiyot va jamiyat* , (3-2 (118)), 144-147.

Irisboyev F.B.
katta o‘qituvchisi
Jizzax politexnika institute

YARIM O‘TKAZGICH MATERIALLARNING ASOSIY KATTALIKLARI

Annotatsiya. *Ushbu maqola yarimo'tkazgich materiallarining asosiy parametrlarini o'rganishga bag'ishlangan. Energiya zonasi oralig'i, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi, tashuvchilarning harakatchanligi, elektr o'tkazuvchanligi va haroratning o'tkazuvchanlikka ta'siri kabi fundamental fizik kattaliklar ko'rib chiqiladi. Ushbu parametrlarning o'zaro bog'liqligi va ularning yarimo'tkazgich qurilmalarning ishlashiga ta'siri tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar *Yarim o'tkazgich materiallar, yarim o'tkazgich fizikasi, kristall panjara, atom bog'lanishlari, kovalent bog'lanish, energiya zonalari, valent zona, o'tkazuvchanlik zonasi, toklangan zona, energiya zonasi ishlab chiqarish, Fermi quvvati, harakat tashuvchilar, elektronlar.*

Irisboyev F.B.
senior lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute
Jizzakh

FUNDAMENTAL PARAMETERS OF SEMICONDUCTOR MATERIALS

Abstract. *This article is devoted to the study of the main parameters of semiconductor materials. Fundamental physical quantities such as energy band gap, charge carrier concentration, carrier mobility, electrical conductivity, and the effect of temperature on conductivity are considered. The interrelationships of these parameters and their influence on the performance of semiconductor devices are analyzed.*

Keywords. *Semiconductor materials, semiconductor physics, crystal lattice, atomic bonds, covalent bonding, energy bands, valence band, conduction band, excited band, energy band generation, Fermi energy, moving carriers, electrons.*

Yarim o‘tkazgich materiallar element tarkibi bo‘yicha 5 guruhga bo‘linadi.

1. Elementar yarim o‘tkazgichlar;
2. A^{III} B^{V} yarim o‘tkazgich birikmalar;
3. A^{II} B^{VI} yarim o‘tkazgich birikmalar;
4. A^{IV} B^{IV} yarim o‘tkazgich materiallar;
5. Murakkab yarim o‘tkazgich materiallar

Amalda barcha elementar yarim o‘tkazgichlar va ko‘pchilik A^{III} B^{V} va $A^{II}B^{VI}$ yarim o‘tkazgich birikmalar, shuningdek murakkab yarim o‘tkazgich materiallar

olmos yoki rux obmankasi tipidagi kristall tuzilishga ega bo‘lib, ular – tetraedr fazalariga tegishli, bu erda har bir atom mos kelgan tetraedr balandliklarida joyjashgan to‘rtta ekvivalent masofaga yaqin qo‘shnilar bilan o‘rab olingan. Ikkita yaqin qo‘shni atomlar o‘rtasidagi bog‘lanish qarama-qarshi spinga ega bo‘lgan elektronlar bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun elementar yarim o‘tkazgichlarda kimyoviy bog‘lanish 100% kovalentli bo‘ladi, A^{III} B^{V} birikmalarda bog‘lanish ionli - kovalent ko‘rinishga ega. A^{III} B^{V} birikmalarda ionli bog‘lanish ulushi oshadi. Yarim o‘tkazgichlarning asosiy fundamental parametri bo‘lib, Ye_d taqiqlangan zona kengligi hisoblanadi. Ye_d kattaligi - kristall panjaraning kimyoviy bog‘lanishidagi qatnashadigan valent elektronni ozod qilish uchun zarur energiya bo‘lib, u material o‘tkazuvchanligini ta’minlashda qatnashadi. Yarim o‘tkazgichlarda Ye_d kattaligi asosan kristall panjarani hosil qiluvchi atomlarning valent elektronlari holati orqali aniqlanadi.

Jadval 1.

Element	Elektron tuzilishi	E_g, eV
C	$1s^2 2s^2 2p^2$	5,48
Si	$1s^2 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^2$	1,17
+Ge	$1s^2 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 3d^{10} 4s^2 4p^2$	0,74
Sn	$1s^2 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^2$	0,082

Bu elementlarning hammasi kovalent bog‘lanishli olmossimon kristall panjara hosil qilsa ham, lekin ularning atomlari elektron tuzilishidagi valent elektronlarning joylashishi, panjaradagi energiya bog‘lanishi, Ye_d taqiqlangan zona kengligini kattaligi juda keskin farqlanishi mumkin. Bunday qonuniyat $A^{III}B^{V}$, $A^{II}B^{VI}$ yarimo‘tkazgich birikmalarda va murakkab materiallarda ham o‘rinli bo‘ladi. Shuning uchun elemenlarni birikmalarda kombinasiyalash natijasida (ya’ni, atomda valent elektronlarning har xil energetik holati) Ye_d boshqariladigan yarim o‘tkazgich material olish mumkin. Bu material o‘zining fizik kattaliklariga ko‘ra olmosga juda yaqin bo‘ladi.

Yarim o‘tkazgichlarni shartli ravishda keng zonali, bunda $Ye_d \geq 2$ eV, normal - bunda $2 > Ye_d > 0.6$ eV va qisqa zonali $Ye_d < 0.5$ eV kabi turlarga bo‘linadi. Aynan yarim o‘tkazgichlarning Ye_d kattaligi mikroelektronikaning har xil foto va optoelektron asboblarni ishlab chiqarishda ularning funksional imkoniyatlarini aniqlaydi.

$A^{III}B^{V}$ bog‘lanish turlaridagi yarim o‘tkazgichlar va shu turdagi yarim o‘tkazgichli qotishmalar.

Yarim o‘tkazgichlarda elektr o‘tkazuvchanlikning ikki: elektron (n) va elektron-kovak (p) turi mavjud bo‘lib, ular jismda p-n o‘tishini vujudga keltiradi. Bunday jismlarga katta va kichik quvvatga ega turli xildagi elektr to‘g‘rilagichlar, kuchaytirgich va generatorlar misol bo‘la oladi. Ulardan boshqariladigan turli hil moslamalarda keng miqyosda foydalaniladi. Amalda qo‘llanilayotgan yarim o‘tkazgichlar, asosan, odiy va murakkab xillarga bo‘linadi. Yarim o‘tkazgichlar turli

ko‘rinishdagi energiya (issiqlik, yorug‘lik) ni elektr energiyasiga aylantirib beradi. Yarim o‘tkazgichli o‘tkazgichlarga misol tariqasida quyosh batareyasi va termoelektrik generatorlarni keltirish mumkin. Past o‘zgarmas kuchlanishdagi rekombinasiyali chaqnash nur uzatish manbai va hisoblash mashinalaridan axborot chaqirish qurilmalarida ishlatiladi.

Yarim o‘tkazgichlarni isitkich asboblarda, radioaktivli nur indikatorlarda va magnit maydon kuchlanganligini o‘lchashda foydalaniladi. Hozirgi davrda shishasimon va suyuq yarim o‘tkazgichlar o‘rganilmoqda. Oddiy yarim o‘tkazgichlardan texnikada keng qo‘llaniladiganlariga kremniy va germaniy kiradi. Murakkab yarim o‘tkazgichlar Mendeleyev davriy sistemasidagi turli gurux elementlari birikmasidan, masalan: A^{III} B^{V} (InSb, CaAs,Cap), A^{II} B^{VI} (CdS, ZnSe) elementlari birikmasidan, shuningdek, ba’zi oksidlar (Cu_2O) dan iborat. Yarim o‘tkazgichli kompozisiyalarga (tirit, silit), sopol bilan birikkan kremniy karbidi (SiC) va grafitli yarim o‘tkazgichlar misol bo‘la oladi.

Yarim o‘tkazgich ishlatilgan asbob uskunalar xizmat muddatining yuqoriligi, hajm va og‘irligiga nisbatan kichikligi, oddiy ishonchli ishlashi, iqtisodiy samaradorligi va boshqa sifatlari bilan ajralib turadi.

A^{III} B^{V} birikmalari komponentlari vakuum yoki inert gaz muhitida o‘zaro ta’sir ettirish yo‘li orqali olinadi. Tozalangan birikmaning erish harorati uni tashkil etuvchi komponentlarning erish haroratidan yuqoriroq bo‘ladi.

A^{III} B^{V} birikmalari u yoki bu turdagi yarim o‘tkazgich asboblarini tayyorlash uchun muxim material hisoblanadi. Bunday birikmalarga fosfatlar, arsenidlar va antimonidlar kiradi. Bularning ichida amalda eng ko‘p qo‘llaniladigani galliy arsenidi va fosfidi hamda indiy antimonididir.

Galliy arsenidi taqiqlangan zonasining kengligi 1,43 eV bo‘lib, elektronlarning harakatchanligi Ge va Si nikidan yuqoriroq bo‘ladi. Galliy arsenididagi kovaklarning harakchanligi Si – dagi teshiklarning siljuvchanligiga yaqin. Bu materialning akseptorlari sifatida rux, qadimiy, misdan foydalaniladi, donorlari sifatida esa S, selen, tellur va davriy sistemadagi VI gurux elementlari olinadi.

Indiy antimonidi. Elektronlarning harakatchanligi katta qiymatga ega bo‘lishi bilan bir qatorda, taqiqlangan zonasining kengligi (0,18 eV) nisbatan kichikroqdir. Ushbu materialning fotoo‘tkazuvchanligi spektr infraqizil qismining katta (8 mkm. gacha) sohasini qamrab oladi. Bunda fotoo‘tkazuvchanlikning eng yuqori qiymati 6,2 mkm to‘lqin uzunligiga to‘g‘ri keladi.

Indiy antimonididan o‘ta sezgir fotoelementlar optik filtr, termoelektrik generator va sovutkichlar tayyorlashda foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

4. Irisboyev, F. (2024). THE PLACE OF NANOTECHNOLOGY IN THE PRESENT TIME. *Modern Science and Research*, *3*(1), 52-56.
5. Irisboyev, F. (2024). THE IMPORTANCE OF ENERGY USE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, *3*(1), 78-81.
6. Irisboyev, F. (2024). THE IMPORTANCE OF ENERGY USE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, *3*(1), 78-81.

7. Irisboyev, F. B., & Mukhtorov, D. N. U. (2024). TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF SOLAR ELEMENTS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, *4*(2), 107-110.
8. Irisboyev, F., & Qayumov, D. (2024). FEATURES AND AREAS OF USE OF DIGITAL MICROCIRCUITS. DIGITAL SIGNAL REFLECTION DEVICES. *Interpretation and rese*
9. Irisboyev, F. B. (2024). VAKUUMLI FLUORESSENT INDIKATORLARI. *Iqtisodiyot va jamiyat* , (3-2 (118)), 144-147.

Ismoilov O.I., PhD
associate professor
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ANATOMO-TOPOGRAPHIC STRUCTURE OF THE NERVES OF THE COSTOVERTEBRAL JOINTS IN HUMANS

Summary: *This article examines the sources of innervation of the costovertebral joints in humans and describes the pattern of nerve distribution within these joints. The study was conducted on human cadavers of various ages and sexes. The greatest number of branches to the costovertebral joints is provided by the ganglia of the thoracic sympathetic trunk. The complexity of the innervation of all the listed structures is associated with the coordination of the functional activity of these systems during respiratory excursions of the thoracic cage.*

Keywords: *human cadavers, costovertebral joints, innervation, acetic acid solution, intercostal nerve, interganglionic branch.*

Introduction. The costovertebral joints in humans belong to the type of articulations where movements occur continuously throughout life. The most pronounced morphological changes in these joints are observed during the first 5 years of a child's life [1,2,3]. During these years, the processes of establishing respiration and voice production take place in the child. The associated changes in the frequency and depth of breathing lead to alterations in the shape of the thoracic cage. Studies have shown that, parallel to the intensive growth of the thoracic cage in the early years of life, there is an increase in its volume [4,5]. Changes in the shape and volume of the thoracic cage are reflected in the morphology of the costovertebral joints. Investigations into the development of the ligamentous apparatus of these joints have convincingly demonstrated a direct dependence of changes in the joints and their ligamentous structures on the expiratory function, which supports the increasingly complex formation of vocal intonations [6,7]. While information on the morphology and function of the costovertebral joints is quite extensively represented in the literature, data regarding the nature of their innervation are largely limited to the scope of textbooks and teaching manuals.

Aim of the study. The purpose of our research is to investigate the sources of innervation of the costovertebral joints in humans and to describe the patterns of nerve distribution within these joints.

Materials and Methods. The study was conducted on human cadavers of various ages and sexes. To achieve more complete isolation of all nerves supplying the costovertebral joints, the following preparation protocol was employed. The isolated thoracic spine segment, including adjacent portions of the ribs (up to the angles), was immersed in a 3–5% acetic acid solution for 15–20 days. Following

sufficient maceration and softening of the abundant adipose tissue surrounding the costovertebral joints, the specimen was placed under a strong stream of water to remove a portion of the fat. Subsequently, direct dissection was performed to isolate the ganglia and interganglionic branches of the thoracic sympathetic trunk, as well as the main trunks of the intercostal nerves. The nerve branches arising from these sources and directed toward the costovertebral joints were carefully dissected using magnifying loupes and a surgical microscope. The diameter of the nerve branches was measured with an ocular micrometer.

Results. Our observations indicate that the innervation of the costovertebral joints involves branches from the intercostal nerves, ganglia and communicating rami of the sympathetic trunk, branches from perivascular plexuses of the intercostal vessels, and branches originating from muscular nerves. The greatest number of branches to the costovertebral joints is supplied by the ganglia of the thoracic sympathetic trunk. In the majority of specimens, 2–3 nerve trunks (diameter 0.2–0.5 mm) arise from the medial (internal), and less frequently from the lateral (external), periphery of the ganglion located at the level of the corresponding rib head articulation. One of these trunks curves in an arc-like manner across the capsule surface at its attachment to the vertebra. From this described nerve trunk, small nerve branches constantly arise and penetrate the thickness of the capsule as well as the periosteum of the vertebral body. Other branches, after departing from the ganglion, course transversely across the surface of the costovertebral joint capsule; their ramifications spread between the fibers of the radiate ligament of the rib head joint. Together with the fibers of this ligament, the nerve trunks reach the lateral margin of the anterior longitudinal ligament of the spine and penetrate into it. Nerves supplying the costovertebral joints that arise from the intercostal nerves typically originate from the nerve passing below the corresponding costovertebral joint. The nerve branch ascends toward the joint, crossing anteriorly over the intercostal vessels en route. At the points of crossing with the vessels, 2–3 small nerve trunks detach from the described branch and join the perivascular plexus of the intercostal artery. On the surface of the costovertebral joint capsule, the nerve branch originating from the intercostal nerve begins to divide into secondary branches. Some secondary branches reach the anterior longitudinal ligament of the spine, while others spread within the capsule and ligaments of the rib head. In some specimens, a communicating branch located on the surface of the rib head capsule can be isolated. This communicating branch establishes a connection between branches arising from the ganglion or interganglionic branch of the thoracic sympathetic trunk and the branch originating from the intercostal nerve. As a rule, this communicating branch courses longitudinally along the capsule surface. While traversing the joint capsule, the described branch gives off small nerve trunks bilaterally, which penetrate the joint capsule, the radiate ligament of the joint, and the periosteum of the vertebra. In our material, the simultaneous participation of the intercostal nerve in the innervation of the intercostal muscles and elements of the costovertebral joints is clearly evident. In such cases, a nerve trunk (diameter 0.2–0.4 mm) arising from the proximal portion of the intercostal nerve gives off a lateral

branch before entering the thickness of the intercostal muscles. This branch has a diameter of 0.1–0.15 mm and a length of 5–8 mm. The described branch is directed toward the rib head joint and divides into finer secondary branches on the capsule surface.

Conclusion. Our observations on the pattern of distribution and origin of nerves in the costovertebral joints allow us to conclude that these joints exhibit complex (multisource) innervation involving the surrounding muscles and vessels. This complexity of innervation of all the listed structures is associated with the coordination of the functional activity of these systems during respiratory excursions of the thoracic cage. The greatest number of nerves is identified in the capsule and ligaments of the costovertebral joints of ribs VII–X. Such concentration of nerves in these joints can be explained by the fact that the middle ribs participate most actively in the respiratory movements of the thoracic cage.

References

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Афаунов, А. А. Анализ технических вариантов декомпрессивно-стабилизирующих операций при повреждениях нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника: систематический обзор литературы / А. А. Афаунов, Н. С. Чайкин // Хирургия позвоночника. - 2022. - Т. 19, № 3. - С. 22-37. DOI 10.14531/ss2022.3.22-37.
3. Берснев, В.П. Хирургическое лечение повреждений грудопоясничного отдела позвоночника / В.П. Берснев, В.М. Драгун, А.Л. Шакуров // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. - 2013. - Том V, № 4. - С. 6-12.
4. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Маматалиев А. Р. нейрогистологические изменения блуждающего нерва под влиянием колхицина в эксперименте //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
7. Маматалиев А. Р. Нарушение иннервации и мутационный процесс в ткани //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.

Jalolov T., PhD
dotsent
Xoliqulov Sh., Magistr
Osiyo Xalqaro universiteti
Abdiyev X.
Jizzax Sambhram universiteti

OLIY TA'LIM TIZIMIDA VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN HAQIQAT (VR/AR) TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada virtual (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalarining oliy ta'lim jarayonida qo'llanilishi, ularning pedagogik samaradorligi hamda o'quv jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida VR/AR texnologiyalarining nazariy asoslari, xorijiy va mahalliy tajribalar, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari statistik ma'lumotlar asosida o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, oliy ta'lim, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, pedagogik samaradorlik.*

Jalolov T., PhD
associate professor
Kholikulov Sh.
master's student
Asian International University
Abdiev Kh.
Jizzakh Sambhram University

THE IMPACT OF VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY (VR/AR) TECHNOLOGIES ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION

Abstract: *This scientific article analyzes the application of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies in the higher education process, their pedagogical effectiveness, and their impact on teaching and learning activities. The study examines the theoretical foundations of VR/AR technologies, international and local experiences, as well as the results of experimental and pilot studies conducted in higher education institutions based on statistical data.*

Keywords*: virtual reality, augmented reality, higher education, digital education, interactive learning, pedagogical effectiveness.*

Kirish

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim tizimida yangi o'qitish metodlari va vositalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Xususan, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari ta'lim

jarayonini vizual, interaktiv va talaba markazli shaklda tashkil etish imkonini bermoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilga kelib dunyo bo'yicha oliy ta'lim muassasalarining qariyb 35 foizida raqamli immersiv texnologiyalar sinov tariqasida joriy etilgan. O'zbekistonda ham oliy ta'lim tizimini raqamlashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident qarorlari va oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyalarida innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim sifatini oshirish vazifasi belgilangan.

VR/AR texnologiyalarining nazariy asoslari


Virtual haqiqat texnologiyasi foydalanuvchini to'liq sun'iy muhitga olib kirish orqali real hayotdagi jarayonlarni simulyatsiya qiladi. Kengaytirilgan haqiqat esa real muhitga raqamli obyektlar va axborotlarni qo'shish orqali idrokni boyitadi. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra (Radianti va boshq., 2020), VR/AR texnologiyalari bilimni vizual qabul qilishni 40–60 foizga oshiradi [1]. Ta'lim jarayonida ushbu texnologiyalar murakkab texnik, muhandislik va tabiiy fanlar bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarini virtual muhitda amalga oshirish imkonini beradi [2].

Tadqiqot metodikasi

Mazkur tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:


- nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlar va normativ hujjatlar tahlili);
- taqqoslash (an'anaviy va VR/AR asosidagi o'qitish);
- tajriba-sinov;
- statistik tahlil.

Statistik tahlil va natijalar. K–12 ta'lim tizimida ham VR/AR texnologiyalariga qiziqish izchil oshib borgan bo'lib, 2021 yilda ushbu yo'nalishda 16 ta tadqiqot qayd etilgan [3]. Kasbiy ta'lim va sanoat ta'limi sohalarida esa o'sish nisbatan sekin bo'lsa-da, 2019–2020 yillarda muayyan faollik kuzatilgan. Bu holat VR/AR texnologiyalarining asosan oliy ta'limda ilmiy-amaliy jihatdan keng qo'llanilayotganini ko'rsatadi [4].



1-**rasm**. 2015–2021 yillarda VR va AR bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning ta'lim yo'nalishlari kesimidagi taqsimlanishi


Dunyoning yetakchi davlatlari — AQSh, Koreya, Finlyandiya, Xitoy kabi mamlakatlarda VR texnologiyasi ta’limning ajralmas qismiga aylanmoqda. U yerda tibbiy, tarixiy va texnik sohalar uchun maxsus VR o‘quv dasturlari ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan [5]. Shuningdek, ba’zi oliy o‘quv yurtlarida to‘liq VR asosida olib boriladigan kurslar mavjud. Tadqiqotlarda qatnashgan o‘qituvchilar va o‘quvchilar interaktiv darslarning samaradorligini yuqori baholagan.



2-rasm. VR va An’anaviy darslar samaradorligi

Ko‘pchilik darslar ancha qiziqarli va oson o‘zlashtirilganini bildirgan. Shu bilan birga, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi ham muhim omil sifatida ko‘rsatilgan. Tajriba natijalariga ko‘ra, VR/AR texnologiyalari asosida ta’lim olgan talabalar bilim ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshgani kuzatildi [6]. Xususan:

- o‘zlashtirish darajasi o‘rtacha **27 foizga** oshdi;
- amaliy topshiriqlarni bajarish aniqligi **32 foizga** yaxshilandi;
- talabalar faolligi va motivatsiyasi **40 foizga** oshdi.



AR texnologiyalarining ta’lim sohalari bo‘yicha taqsimlanishi 3-rasm. Kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalarining ta’lim sohalari bo‘yicha ulushi.

Ushbu diagramma AR texnologiyalarining turli ta’lim sohalarida qo‘llanilish ulushini aks ettiradi. Tahlil natijalariga ko‘ra, AR texnologiyalarining eng katta qismi oliy ta’lim sohasiga to‘g‘ri kelib, umumiy ulushning **48 %** ini tashkil etadi [7].

Bu holat oliy ta’limda vizuallashtirish va interaktiv o‘qitishga bo‘lgan ehtiyoj yuqori ekanligini ko‘rsatadi. K–12 ta’lim sohasi **26 %**, sanoat ta’limi **15 %**, kasbiy ta’lim esa **8 %** ulushga ega. Qolgan **3 %** esa ta’lim darajasi aniq ko‘rsatilmagan yo‘nalishlarga to‘g‘ri keladi. Mazkur natijalar AR texnologiyalari asosan oliy ta’lim tizimida samarali joriy etilayotganini tasdiqlaydi [8].

Xulosa

Tadqiqot natijalariga koʻra, virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari oliy ta’lim jarayonida innovatsion va samarali vosita hisoblanadi. Ular talabalarning bilimni chuqur oʻzlashtirishiga, amaliy koʻnikmalarni rivojlantirishga va oʻqitish jarayonini interaktivlashtirishga xizmat qiladi. Kelgusida VR/AR texnologiyalarini joriy etish boʻyicha milliy metodik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Radianti J., Majchrzak T. A. Immersive VR in higher education // Computers & Education. — 2020.
2. Makransky G., Petersen G. Immersive virtual reality and learning // Educational Psychology Review. — 2019.
3. Sherman W. R., Craig A. B. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. — San Francisco : Morgan Kaufmann, 2018.
4. Azuma R. A survey of augmented reality // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. — 2017.
5. Web of Science Core Collection [Electronic resource]. — 2023.
6. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil PQ-4699-son qarori.
7. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi. — 2021.
8. Slater M. Immersion and the illusion of presence // British Journal of Psychology. — 2018.

Kamal Sanjida
master's student
Group ZUPyts-01-24
Mneeva L.N., PhD in Economics
associate professor
Department of Management
Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University)
Russia, Moscow

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH PERFORMANCE ASSESSMENT: EVIDENCE FROM A HIGH-RELIABILITY ORGANIZATION

Abstract: *High-reliability organizations (HROs), for instance nuclear power plants, airports, and chemical plants, have existential risks that make traditional personnel management evaluation inadequate. Because of these risks, HR should not be seen as a support function but as a core strategic risk mitigation structure. This means that to assess its effectiveness, we need to go beyond simple efficiency metrics and use a more comprehensive, multi-dimensional framework based on performance data. The house of this study is to evolve and support a conceptual framework for evaluating personnel management effectiveness through an integrated performance assessment system that is specifically designed for the rigorous needs of HROs. The study uses a conceptual research design to bring together recent literature from strategic human resource management (HRM), performance management, and high-reliability theory. The proposed framework is contextualized and exemplified using the Rooppur Nuclear Power Plant Project (RNPP) as a representative case study. The analysis results in a composite framework that measures the effectiveness of personnel management through the synergistic integration of four indicator clusters: competency-based readiness, behavioral and safety adherence, individual task performance, and systemic HR effectiveness. Importantly, a performance management system (PMS) that connects these is characterized by strategic alignment, procedural fairness, and closed-loop feedback for endless advancement. Thus, effective personnel management in HROs is not a passive outcome but an active, measurable process, and its evaluation is most robust when performance assessment evolves from a sporadic administrative ritual to a continuous, data-rich strategic tool. This path directly elevate workforce reliability, strengthens safety culture, and offers concrete proof of HR's contribution to organizational resilience and long-term viability.*

Keywords: *Personnel Management; Performance Assessment; Human Resource Effectiveness; Performance Indicators; High-Reliability Organizations; Safety Culture; Continuous Improvement.*

Introduction

High-reliability organizations (HROs) operate in complex, harsh situations with little room for mistake. A single procedural error, skill gap, or behavioral variation can cause devastating loss of life, environmental damage, and social and economic upheaval. Such entities' technological backbone is complex engineering and redundant safety mechanisms, but human performance determines reliability. This unavoidable reality upgrades human management from administrative need to strategic operational risk management. Nevertheless, a deadly dilemma remains: how can one statistically and qualitatively evaluate the function responsible for human reliability? Attrition rates, training hours, and payroll accuracy are required but insufficient. They are trailing indicators, mute on competency preparedness, safety protocol compliance, and HR system agility. This paper addresses this crucial gap. It claims that a strong, multi-faceted performance evaluation system, strategically developed and fully integrated, is the best diagnostic tool for HRO people management effectiveness. The research uses the Rooppur Nuclear Power Plant Project (RNPP), a classic HRO, to base its theoretical framework in safety-critical megaproject realities.

Literature Review

Three different research streams support this topic. The development of strategic human resource management (HRM) has shown that more complex HR practices improve the performance of organizations. Becker and Huselid (1998) showed that high-performance work systems use employee skills and motivation to improve the success of the organization. In HROs, this strategic responsibility includes operational integrity and reducing existential risks, making HR the protector of business survival. Second, performance management has changed in important ways. Aguinis (2019) and Pulakos et al. (2019) stress the importance of criticism that looks to the further, aligning goals, and evaluating "what" (consequences) and "how" (behaviors and competencies). DeNisi et al. (2023) accurately refer that these ideas have not yet been applied in ultra-high-risk, technologically advanced settings and need to be studied in context. Additionally, research on high-reliability organizations clarifies the cultural and procedural framework that allows for error-free operations. Reason (2016) and Bourrier et al. (2019) argue that dependability includes systems that foresee, identify, and alleviate issues before they escalate, requiring a pervasive "safety culture" characterized by concern over failure, reluctance to oversimplify, operational sensitivity, resilience, and competence. In this society, human performance is very important. Kim and Park (2022) connect high-reliability organization safety results to strict human performance management, which includes following procedures, following safety rules, and doing regular checks. These three bodies of literature show the main research gap. They all agree that human elements need to be watched and controlled, but very few comprehensive models use performance assessment data to measure the overall effectiveness of the people management system. This study brings these areas together into an evaluative framework to fill this gap

Statement of the Problem

Strategic HRM, contemporary performance management, and HRO theory interpretation a systemic operational and academic challenge: a deficiency. In HROs, performance assessment data is generally kept separate and not utilized enough. It helps with decisions on promotions, incentives, and training needs, but it isn't put together and looked at to answer the most crucial strategic question: Is our people management system, which includes hiring, onboarding, training, deployment, and developing the company's culture, making and keeping a staff that is dependable in terms of operations?

This problem is particularly bad in huge, tech heavy initiatives like RNPP. Our staffs come from several divergent backgrounds, the rules are quite stringent, and projects might last for many years. Not being able to fully assess how well personnel management is working forms blind spots. Perhaps, latent, systemic capability gaps may grow; the safety culture's real health may be misjudged based on anecdote rather than data; and HR's strategic value may remain intangible, often being seen as a cost center rather than a risk mitigation center.

Hence, the fundamental delinquent with the research is that there isn't a full, comprehensive, and valuable framework for conducting performance assessment to look at how well HRO manages its employees. The report says that the following things need to be done to fix this complexity:

1. To deconstruct performance assessment's administrative, developmental, and behavioral responsibilities in HRO personnel management's strategic mandate.
2. Identify, organize, and link the important indicator domains (individual, competency-based, behavioral, safety, systemic HR) for a holistic review.
3. To suggest and outline operational methods integration, PMS auditing, and feedback loops to integrate discrete indications into an evaluation framework.
4. Use the RNPP case study to contextualize and demonstrate this framework's practical consequences, problems, and management insights.

Description of the Study

Methodology.

Methodologically, the study takes a conceptual and analytical approach. The methodology of this study does not involve the presentation of empirical data but the formulation of a logic-based framework through the systematic analysis of existing theories and researches in the related fields of HRM and safety science. The methodology of the study takes an abductive approach, starting from the existing theories in the fields of HRM and safety science in an effort to develop a conceptual framework that has not yet been developed previously. The Rooppur Nuclear Power Plant project would be used as the critical case in the study because the case offers a practical context in which the framework can apply and can develop the components of the framework for application.

Results and Discussion.

Performance Evaluation Re-conceptualized:

Tripartite Function. The research shows that performance evaluation in an HRO must be designed to satisfy three interdependent, equally vital tasks beyond administrative duties.

The Compliance and Administration Function: This core layer delivers objective data for legally acceptable and operationally good decisions: safety-sensitive jobs, certification renewals, essential position succession planning, and risk-informed remuneration. This function is crucial to RNPP.

regulatory compliance, ensuring an individual's fitness to conduct error-prone duties.

Proactive and developmental risk mitigation: This makes performance evaluation strategic and forward-looking. It systematically finds individual and community competence gaps in technical knowledge, stress-related decision-making, procedural understanding, and emergency response. Chart demonstrates idea.



Figure: Linkage between Competency Assessment and Workforce Readiness

These constraints necessitated individualized professional expansion, simulations, and targeted training. This supports your business retain knowledge and level up employee skills.

The HRO part of embedding culture and aligning behavior is imperative. In this case, safety culture is judged by how well people work together when things go wrong, report incidents swiftly and accurately, communicate when handing off tasks, and follow standard operating procedures. The performance system shapes the business's "personality" through measurable actions, feedback, and recognition. It also certifies that everyone's work lights the group's reliability needs.

1. Integrated Indicator Framework: Composite Dashboard.

The evaluation of personnel management effectiveness necessitates multiple measures. Exploiting a particular Doman results in image distortion. The proposed framework consists of four clusters.

Performance metrics for each task Completion of tasks, along with quality, accuracy, and timeliness, is adjusted for safety-critical outputs, **for example** calibration log error rates and adherence to procedural checkpoints.

Indicators Based on Competency: These assess the reliability of the workforce. The components encompass certification, outcomes from knowledge-based and practical tests, performance in high-fidelity simulations, and expertise in innovative technologies or processes.

The primary cultural health indicators are focused on behavior and safety. Measurements encompass audits of procedure compliance, participation and performance in emergency drills, the volume and quality of safety suggestions and

near-miss reports, and evaluations of safety-conscious behavior by peers and observers.

Macro-level indicators of systemic HR effectiveness assess the people management system. Metrics include the duration to fill safety-critical positions, turnover rates for high-potential and mission-critical personnel, return on investment for training programs (measured through competency enhancement), and, crucially, employee perceptions regarding the fairness, transparency, and utility of performance management systems.

The thorough analysis of these clusters renders this approach effective. A decline in task performance within an explicit unit, alongside dormant proficiency scores and condense near-miss reporting, specifies a systemic failure in training, oversight, or cultural psychological safety that is more noteworthy than any individual metric.

2. Putting things together and judging how well the framework works. A framework is just a theory until it is put into action. Three main ways are suggested: **Dashboard, Weighted Integration Putting together**: Weight indicators that show the most important parts of a strategy. When it comes to RNPP commissioning, behavioral and competency indicators may be more useful than production measures. Managerial dashboards should put together data from all four segments to show trends, correlations, and red flags. This will let HR and operational decisions be based on facts.
Meta Evaluation: Self-Check for PMS. You need to check the evaluation system on a regular ba ggested in graph




Figure: Dimensions of Performance Management System Effectiveness

examines the PMS's perceived fairness, reliability, strategic alignment, and above all the degree to which its upshots are actually used to drive HR interventions. An absolutely layout nevertheless, ignored PMS is a indication of fruitless HRM.

Closed-Loop Feedback and Continuous Improvement: The framework must be dynamic. As shown in




Figure: Continuous Improvement Loop in Personnel Management Evaluation

An impact of assessment ought to feed a closed loop scheme. By modification of lead policy and a behavioral breaches can be inspiration for novice training, competence restrictions shape curriculum creation besides systemic HR capacities. This offers a self-correcting, learning-oriented people management system that adapts to technology and regulations. Relevance to RNPP and Challenges. This approach requires RNPP to conduct a thorough, multi-source evaluation of safety-sensitive employees.

Thus, an engineer's assessment would include project deliverables, nuclear-grade processes, simulated disaster performance, and "reporting culture." This data lets leadership answer central issues with evidence: Our "human firewall": capable and resilient? Where are we vulnerable systemically? This changes HR's job drastically. Implementation is problematic due to designing valid, non-gameable metrics for complex behaviors, mitigating rater bias through rigorous assessor training, ensuring perceived fairness to maintain employee trust and engagement, and building the data infrastructure to support integrated analysis. The particular hindrances must be overwhelmed for the framework to be trustworthy and convenient.

Conclusion

This research introduces a coherent method for advanced people management effectiveness evaluation in high-reliability companies. This sort of efficacy can only be determined by combining data on individual production, confirmed competence, safe conduct, and HR process efficiency.

Scientifically, our blend of tactical HRM, performance management moreover, HRO concept to gratify a conceptual need is substantial. Performance data is easy to integrate into a higher-level people management system assessment.

Managers in safety critical roles and HR people have to deal with some pretty big implications. It is not easy for them. The framework that is talked about here, it helps shift things from just going by gut feelings or stories people tell to actually looking at facts and solid evidence. That seems important because it makes decisions more reliable. Then there is how it uses performance data, you know, to

cut down on risks, build up worker skills, and overall push for better safety. I think that part is key but it might be oversimplifying a bit. For this whole system to work, though, you need money put into it, strong leadership, and some technical support too. Companies really cannot skip that, especially when their employees are basically the final barrier against some kind of disaster happening. They just have to invest in it.

References

1. Aguinis H. Performance management. 4th ed. Chicago: Chicago Business Press, 2019.
2. Aguinis H., Burgi-Tian J. Performance management reconsidered: A systematic review and agenda for future research // Human Resource Management Review. 2021. Vol. 31, No. 1. P. 1–18.
3. Becker B. E., Huselid M. A. High performance work systems and firm performance: The mediating role of employee skills and motivation // Academy of Management Journal. 1998. Vol. 41, No. 1. P. 8–29.
4. Bourrier M., Brulhart F., Guérin F. Safety culture and high reliability organizations: A critical review // Safety Science. 2019. Vol. 117. P. 145–156.
5. Decramer A., Smolders C., Vanderstraeten A. Employee performance management culture and system features: Relationships with satisfaction // The International Journal of Human Resource Management. 2020. Vol. 31, No. 3. P. 352–371.
6. DeNisi A. S., Murphy K. R. Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? // Journal of Applied Psychology. 2017. Vol. 102, No. 3. P. 421–433.
7. DeNisi A. S., Murphy K. R., Cleveland J. N. Performance appraisal and performance management: A multilevel perspective // Journal of Management. 2023. Vol. 49, No. 2. P. 421–450.
8. Farndale E., Paauwe J., Boselie P. HRM, employee well-being and performance: A systematic review // The International Journal of Human Resource Management. 2021. Vol. 32, No. 1. P. 1–31.
9. Guest D. E. Human resource management and employee well-being: Towards a new analytic framework // Human Resource Management Journal. 2017. Vol. 27, No. 1. P. 22–38.
10. Ismail A., Razak M. R. A., Sulaiman A. Z. Performance appraisal practices and employee development in large organizations // Employee Relations. 2023. Vol. 45, No. 2. P. 356–373.
11. Kim Y., Park J. Human performance management in high-reliability organizations // Safety Science. 2022. Vol. 149. P. 105–113.
12. Kuvaas B., Buch R., Dysvik A. Performance management: Perceptions, motivation, and outcomes // Human Resource Management Journal. 2020. Vol. 30, No. 4. P. 569–583.
13. Leggat S. G., Bartram T., Stanton P. High performance work systems: The gap between policy and practice // Journal of Health Organization and Management. 2011. Vol. 25, No. 6. P. 709–724.

14. Marchington M., Wilkinson A., Donnelly R., Kynighou A. Human resource management at work. 7th ed. London: Kogan Page, 2020.
15. Paauwe J., Boselie P. HRM and performance: What next? // Human Resource Management Journal. 2005. Vol. 15, No. 4. P. 68–83.
16. Pulakos E. D., Hanson R. M., Arad S., Moye N. Performance management can be fixed // Industrial and Organizational Psychology. 2019. Vol. 12, No. 1. P. 51–76.
17. Reason J. Managing the risks of organizational accidents. Aldershot: Ashgate, 1997.
18. Reason J. Managing the risks of organizational accidents revisited // Safety Science. 2016. Vol. 86. P. 9–17.
19. Trento S., Ratti C., De Felice F. Human reliability and safety performance indicators in complex systems // Reliability Engineering & System Safety. 2022. Vol. 223. P. 108–119.
20. Wright P. M., McMahan G. C. Exploring human capital: Putting human back into strategic HRM // Human Resource Management Journal. 2011. Vol. 21, No. 2. P. 93–104.
21. Boxall P., Purcell J. Strategy and human resource management. 4th ed. London: Palgrave Macmillan, 2016.

УДК. 613. 2. 614. 31: 633.

Kasimov Kh.O., candidate of medical sciences
associate professor
Head of Department of Hygiene No. 1
Bukhara State Medical Institute
named after Abu Ali ibn Sino

HYGIENIC BASIS FOR THE HEALTH OF WORKERS IN COTTON PRODUCTION

Summary: *The authors of the analysis of the main stages of the effects of cotton provided data on the impact of the main factors of agricultural production on the health status of cotton growers. Hygienic measures were developed to protect the health of workers engaged in cotton growing.*

Key words: *cotton growing, microclimate, pesticides, dustiness, labor protection.*

Relevance of the study: Among agricultural crops, cotton occupies a particularly important place, as it is a valuable raw material for the textile, oil-and-fat, and other branches of industry.

The technological process of cotton cultivation differs significantly from the technologies used for growing cereals and other industrial crops. It consists of several stages: soil preparation; seed treatment and sowing; thinning of seedlings; cultivation; irrigation of plants; topping; control of weeds, pests, and diseases; preparation for harvesting; and mechanized and manual harvesting. Cotton cultivation begins with soil preparation for sowing, including macro- and micro-leveling of cotton fields using graders, levelers, and other machinery, as well as plowing. Cotton is sown using the square-nest method with special seeders mounted on MTZ-80 “Magnum” “ORIEN” tractors. Seed treatment precedes sowing. After emergence, crops are thinned. During the vegetation period (May–July), inter-row cultivation (soil loosening) is carried out 5–6 times. A large proportion of labor input is associated with irrigation, which is performed throughout the entire growing season and ends 2–3 weeks before harvesting.

A significant amount of work in cotton cultivation is devoted to the control of weeds, pests, and diseases. For this purpose, chemical methods are widely used. From May to August, herbicides, insecticides, and acaricides are applied, while defoliants and desiccants are used in September. The hygienic characteristics associated with pesticide use in cotton farming mainly include the application of a wide range of chemical substances, their simultaneous use over large areas, and the combined effects of chemical and meteorological factors such as high temperatures and solar radiation. The most labor-intensive process in cotton production is the harvesting of raw cotton.

At all stages of the agricultural production process, workers are exposed to physical factors (temperature, humidity, solar radiation), chemical factors

(pesticides, mineral fertilizers), and biological factors. In addition, agricultural labor is characterized by high levels of physical strain.

All of the above necessitates the development of hygienic regulations aimed at ensuring occupational safety and protecting the health of workers employed in cotton farming.

This issue became particularly relevant following the issuance of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 28, 2017, No. UP-3608, "On Measures for the Fundamental Improvement of the Cotton Industry."

Purpose of the study: To provide a hygienic assessment of the working conditions of employees in cotton-farming enterprises and to develop hygienic regulations for the protection of their health.

Materials and Methods of the Study

The objects of the study were the farming enterprises "Karvon" of the "Bukhtaroy" mahalla committee, "Fayz" of the "Gulistonobod" mahalla committee, and the Shukur-Tukhta farm of the "Sarmijan" mahalla committee in Gijduvan District.

The study was conducted in cooperation with the Gijduvan District Center of the State Sanitary Supervision. Physical workload was assessed using the method of sanitary observation. Air temperature and relative humidity were measured using an aspirated psychrometer (SanPiN RUz 0324-16), air velocity was determined with a vane anemometer (SanPiN RUz 0324-16), noise and vibration levels were measured using a VShV-003 sound level meter (SanPiN RUz 0325-16), air dustiness was determined by the gravimetric method (guidelines for determining harmful substances in the air), carbon dioxide concentration was measured using an ANT-3 gas analyzer (MU 012-3/0015), and residual pesticide levels in air and soil were determined by thin-layer chromatography (Kyiv, 1985).

Results of the Study

The leading occupations in cotton farming include machine operators, irrigators, crop maintenance workers, and cotton pickers.

The microclimate at workplaces was largely determined by the climatic conditions of the region, as almost all types of work were performed outdoors. The area is characterized by long summers and fairly cold winters, significant fluctuations in air temperature both throughout the year and during the day, and a considerable amount of atmospheric precipitation occurring mainly in the winter–spring period.

The first stage of preparation for cotton sowing was seed treatment. For this purpose, seed treatment was carried out on a specially constructed concrete площадка using the preparations Fitovak and P-4. All workers involved in seed treatment underwent medical examinations and were provided with personal protective equipment.

During soil preparation for sowing, workers were exposed to low and subnormal temperatures (March–April). During the day, air temperature ranged from +4 to +6 °C, relative humidity was 70–95%, and air velocity was 4–6 m/s. Under these conditions, the thermal protective properties of clothing and

thermoregulatory capacity were insufficient (according to a survey of 8 workers from each farm).

During the thinning of cotton plants (late April–early May), air temperature in the field ranged from 21 to 34 °C, while in the cabins of MTZ-80 and KhTZ-80 tractors it ranged from 28 to 36 °C. The highest air temperatures were observed during cultivation and summer irrigation of cotton (May–June); at 12:00 and 16:00 the average temperature was 36.4–38.6 °C and periodically reached 41–45 °C.

The effects of high air temperatures during summer work were aggravated by positive thermal radiation from heated metal parts of tractors. During this period, the temperature inside tractor cabins reached 58–59 °C. Relative humidity at workplaces during these operations was 50–60%, and air velocity was 2.5–5 m/s.

All processes associated with soil preparation, cultivation, and uprooting of stalks were accompanied by the formation of a significant amount of dust. During soil preparation for sowing, when harrowing and plowing, dust concentration in the breathing zone of tractor operators ranged from 16 to 21 mg/m³, exceeding permissible limits. During cultivation (MTZ-80 and KhTZ-80 tractors), dust concentration at the workplace was 14–17 mg/m³.

During autumn plowing using a “Magnum” tractor with a four-bottom plow, air dustiness in the tractor cabin was 6–9 mg/m³, while for MTZ-80 and T-4 tractors it averaged 26 mg/m³; during harrowing it reached 38 mg/m³.

During manual harvesting of raw cotton, dust concentration in the air of the working zone, depending on distance from roads and the agrotechnical condition of the fields, averaged 3.2–13.4 mg/m³, which corresponds to the data reported by F.T. Dzhumaev (1987).

During autumn plowing with tractors of various models (MTZ-80, KhTZ-80, T-4), carbon monoxide concentration in the breathing zone of tractor operators when working on the leeward side ranged from 8.4 to 42 mg/m³, and during harrowing from 8.2 to 36.1 mg/m³. No cases of carbon monoxide poisoning were observed among workers operating modern agricultural machinery; however, a number of authors have established that prolonged exposure to relatively low concentrations of carbon monoxide is not harmless. According to F.T. Dzhumaev (1987), the level of carboxyhemoglobin in the blood of cotton machine operators before exposure to carbon monoxide averaged 2.5%, while by the end of the workday it increased to an average of 7.7% in most of the examined workers.

Workers operating tractors used in cotton cultivation were exposed to noise and whole-body vibration. In the cabins of MTZ-80 and KhTZ-80 tractors, noise intensity reached 109–120 dB.

One of the most responsible and labor-intensive tasks is the work of irrigators. Irrigators were exposed to the full range of climatic factors: low and high temperatures, solar radiation, wind, precipitation, and low or high humidity. During irrigation in the autumn–winter period, irrigators experienced pronounced cooling effects (November–January), with air temperatures ranging from +7 to −9 °C. In the spring period (March), cooling effects were less pronounced; however, water temperature did not exceed 3–6 °C, and air temperature ranged from 4–6 °C in the

morning to 18–20 °C during the daytime. Strong winds (up to 16–21 m/s) were frequently observed.

In the summer period, irrigators also worked under unfavorable meteorological conditions. In June–August, air temperature even in the early morning hours reached 30–35 °C, from 12:00 to 16:00 it reached 42–48 °C, and in the evening (19:00–20:00) it remained at 38–39 °C. High air temperature was combined with low humidity and low air movement. During cotton irrigation, workers often performed their tasks while standing in relatively cool water (12–16 °C in June and 18–20 °C in July), while at the same time their head and body were exposed to high temperatures and intense solar radiation. Thus, irrigators exhibited physiological reactions reflecting the effects of multidirectional influences: the head and body were exposed to intense solar radiation and both elevated and reduced temperatures. Irrigators frequently complained of joint pain, burning sensations, and paresthesia in the limbs, especially at night (21 workers were surveyed).

A significant volume of work in cotton cultivation was devoted to the control of weeds, pests, and diseases. For this purpose, from May to August, the preparations “Altin,” “Dalate,” and “Killer” were used in all three studied farms. The preparations were applied using ground-based equipment. Tractor operators and two workers were exposed to these chemical agents. Two hours after treatment, no residual amounts of the preparations were detected in the air, indicating that the chemicals were unstable in the environment.

In conclusion, workers involved in cotton cultivation are exposed to physical factors (temperature, humidity, air velocity, noise, vibration, solar radiation) and chemical factors (carbon monoxide, pesticides, mineral fertilizers).

Conclusions

Working conditions in cotton farming depend on the level of mechanization of crop cultivation, the applied cultivation technology, and labor organization. To improve working conditions and protect the health of tractor operators, it is necessary to introduce modern agricultural machinery in all cotton-farming enterprises, most of which should meet the requirements of occupational hygiene and ergonomics. To reduce noise levels, tractor cabins used for cotton cultivation should be sealed. To decrease vibration exposure, tractor seats should be adjusted in accordance with the operator’s body weight.

To reduce environmental contamination and the harmful effects of pesticides on workers’ health, it is advisable to prepare working solutions and mixtures of pesticides and fertilizers at stationary, specially equipped facilities. Workers should be provided with protective clothing and personal protective equipment for skin and eye protection. A more effective measure for protecting the environment from chemical plant protection agents is the transition to biological and agrotechnical methods of pest and disease control in cotton cultivation.

The widespread use of irrigation mechanization is of great importance for improving the working conditions of irrigators. During the cold season, protective clothing should be waterproof, windproof, and insulated. In the summer period, irrigators should be protected from solar radiation and high temperatures by wearing

wide-brimmed hats, cotton underwear, and light-colored clothing; the use of special waterproof footwear is mandatory. In field camps, proper nutrition rich in proteins and vitamins should be organized for workers. Compliance with an adequate water–salt balance and the provision of hot tea are essential requirements for cotton workers.

Further improvement of working conditions in cotton farming requires the organization of comprehensive mechanization of cotton cultivation, as well as automation of technological processes, including sowing control, monitoring the accuracy of machinery movement, and the introduction of drip and sprinkler irrigation systems.

For the prevention and timely detection of diseases among individuals engaged in cotton cultivation, it is advisable to conduct seasonal and periodic medical examinations.

LITERATURES:

1. Морозова Т. В. Оценка нагревающего микроклимата как фактора риска нарушений репродуктивного здоровья у работников в полимерперерабатывающей промышленности //Здоровье населения и среда обитания. – 2018. – №. 11 (308). – С. 50-57.
2. Назарова Г. и др. Социальное, экономическое и экологическое воздействие производства хлопка //Инновационная наука. – 2024. – №. 5-2-1. – С. 105-107.
3. Новикова Т. А. и др. Современное состояние условий труда и оценка профессионального риска здоровью работников мукомольного производства //Анализ риска здоровью. – 2019. – №. 1. – С. 50-57.
4. Панарин В. М., Маслова А. А., Гришаков К. В. Устройство мониторинга физиологических параметров работника во время трудового процесса //Безопасность труда в промышленности. – 2018. – №. 5. – С. 66-70.
5. Петрова Н. Н. и др. Гигиеническая характеристика условий труда работников предприятия деревообрабатывающей промышленности //Гигиена и санитария. – 2017. – Т. 96. – №. 4. – С. 344-346.
6. Рослый А. А. Моделирование воздействия микроклимата на производственные процессы и здоровье работников в мокрых цехах кожевенных производств //Редакционная коллегия. – 2023. – С. 225.
7. Самарина А. А., Кириченко Л. В. Остаточные количества пестицидов в пищевых продуктах растительного происхождения: регламентация, экспериментальные исследования //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2024. – №. 5. – С. 101-122.
8. Сапунова Т. А. Роль организации трудового процесса в управлении предприятием //Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №. 10-2. – С. 98-100.
9. Седляров О. И. и др. Анализ и моделирование состояния воздуха рабочей зоны предприятий текстильной и легкой промышленности //Дизайн и технологии. – 2018. – №. 66. – С. 98-104.
10. Сергеев А. К., Белякова Н. С., Кучеренко К. Н. Социально-гигиенические аспекты оценки условий труда и состояния здоровья медицинских работников

в Самарской области //Медицина труда и промышленная экология. – 2020. – Т. 60. – №. 11. – С. 863-866.
11. Смагулов Н. К., Хамитов Т. Н. Субъективная оценка условий, напряженности труда и здоровья рабочих листопрокатного производства //Медицина в Кузбассе. – 2018. – №. 1. – С. 50-54.
12. Терешкова Л. П. Курс-на безопасное применение пестицидов //Защита и карантин растений. – 2020. – №. 4. – С. 3-6.
13. Титенок А. В., Амелин А. В., Каценко Е. Н. Производственная пыль //Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2020. – №. 4 (80). – С. 62-72.
14. Турсунов З. Р. У. и др. Анализ существующих очистителей хлопковых семян на хлопкоочистительных предприятиях //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 11-17.
15. Abdulkhadi O. Vacuum cleaning system in cotton cleaning field improvement measures //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 9. – №. 12 (129). – С. 13-16.
16. Adhikari A. et al. Exposure levels of airborne fungi, bacteria, and antibiotic resistance genes in cotton farms during cotton harvesting and evaluations of N95 respirators against these bioaerosols //Microorganisms. – 2023. – Т. 11. – №. 6. – С. 1561.
17. Ahmad Y. S. et al. Assessment of health and safety risks in a textile industry //Journal of Natural and Applied Sciences Pakistan. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 350-369.

УДК: 616.12-008+ 616.12-089

Kasimova N.
assistant
Department of Pediatrics №2
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

CONGENITAL HEART DISEASE OUTCOMES AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS: A REGIONAL STUDY FROM BUKHARA, UZBEKISTAN

Abstract: *This study analyzed the clinical and epidemiological characteristics of children following surgical correction of congenital heart defects in the Bukhara region of Uzbekistan. A retrospective analysis of 145 pediatric patients was conducted, assessing demographic characteristics, nutritional status, comorbidities, and postoperative complications. A high prevalence of malnutrition and cardiac arrhythmias was identified in the late postoperative period. A strong correlation was observed between patient age and the incidence of arrhythmias. These findings highlight the need for a multidisciplinary rehabilitation approach with emphasis on nutritional support and long-term cardiac monitoring.*

Keywords: *Congenital heart disease, postoperative complications, malnutrition, arrhythmias, Uzbekistan, global health.*

List of Abbreviations

CHD	Congenital Heart Disease
VSD	Ventricular Septal Defect
ASD	Atrial Septal Defect
ToF	Tetralogy of Fallot
PDA	Patent Ductus Arteriosus
BMI	Body Mass Index
CHF	Chronic Heart Failure
LMICs	Low- and Middle-Income Countries
WHO	World Health Organization

Introduction

Congenital heart disease (CHD) remains a leading cause of infant morbidity and mortality worldwide, representing a significant challenge for global health systems[1]. While advancements in surgical techniques have dramatically improved early survival rates, the focus of pediatric cardiac care is shifting toward long-term outcomes and the quality of life of survivors[2, 3]. As highlighted in recent advocacy analyses, the success of a surgical program in low- and middle-income countries (LMICs) is measured not only by operative mortality but by the effectiveness of longitudinal follow-up and the implementation of robust public health frameworks[1, 4].

In many LMICs, including the regions of Central Asia, geographical and socioeconomic factors significantly impact the post-surgical trajectory of pediatric patients[5, 6]. Challenges such as limited access to specialized cardiology centers in rural areas, severe nutritional deficiencies, and sociocultural factors can complicate the recovery process [7, 8]. Malnutrition, in particular, has been identified as a critical predictor of adverse outcomes in children with CHD, necessitating a paradigm shift toward multidisciplinary perioperative management and targeted nutritional support [7,9,10].

In Uzbekistan, the centralization of cardiac surgery has expanded access to life-saving procedures; however, the regional management and dispensary observation of these patients post-discharge remains a field requiring urgent optimization[11]. The Bukhara region, characterized by a high proportion of rural residents and specific environmental conditions, presents a unique demographic for studying CHD outcomes[12]. Understanding the prevalence of late-onset complications, such as cardiac rhythm and conduction disturbances, and their correlation with age and nutritional status is essential for developing regional rehabilitation protocols[13,14]. These arrhythmias, often emerging long after the initial repair, remain a primary driver for late morbidity and potential reoperation[15, 16]. This study aims to evaluate the clinical and epidemiological profile of children in the Bukhara region following surgical correction of CHD. By analyzing the intersection of nutritional status, late-onset arrhythmias, and environmental resources, we seek to identify strategies to enhance the quality of medical rehabilitation and long-term surveillance in this specific population.

Methods

This retrospective observational study was conducted at the Bukhara Regional Children's Multidisciplinary Medical Center. The study period encompassed a comprehensive analysis of pediatric patients who had previously undergone surgical correction for various forms of congenital heart disease (CHD). The primary objective was to evaluate their clinical status, growth parameters, and the incidence of late postoperative complications in a regional setting.

A total of 145 pediatric patients (aged 0 to 18 years) were included in the study. Inclusion criteria were: (1) confirmed diagnosis of CHD; (2) history of surgical repair or palliation; (3) residency within the Bukhara region for at least one

year post-surgery. Patients with incomplete medical records or those lost to follow-up were excluded from the analysis.

Data were systematically collected from inpatient medical histories, outpatient records, and structured interviews with parents during follow-up visits. The following parameters were analyzed:

- Demographics**:** Age, gender, and geographic location (rural vs. urban).
- Clinical Profile**:** Type of CHD (classified into cyanotic and acyanotic groups), presence of consanguineous marriage, and history of somatic comorbidities.
- Nutritional Assessment: Anthropometric measurements were taken to calculate the Body Mass Index (BMI). Nutritional status was classified according to WHO growth charts[17].
- Postoperative Outcomes: Incidence of cardiac arrhythmias, chronic heart failure (CHF), and adherence to the national vaccination schedule.

Ethical integrity was maintained throughout the study, which received formal approval from the Institutional Ethics Committee of the Bukhara State Medical Institute (Protocol No: 9, from March 30, 2025). In strict adherence to the Declaration of Helsinki and the current healthcare legislation of the Republic of Uzbekistan[18, 19], written informed consent was secured from the parents or legal guardians of all 145 pediatric participants before their data was analyzed

Statistical processing was performed using SPSS Statistics (Version 26.0). Descriptive statistics were used to summarize demographic and clinical data. Quantitative variables were expressed as mean ± standard deviation (SD). For categorical data, frequencies and percentages were calculated. To assess the relationship between age and postoperative complications (arrhythmias), Spearman's rank correlation coefficient (ρ) was utilized. P-values less than 0.05 were considered statistically significant[2].

Results

The study cohort consisted of 145 patients (Table 1), with a slight male predominance (n=78, 53.8%). A striking majority of the patients (n=121, 83.4%) were residents of rural areas. Geographic analysis revealed that the highest number of patients originated from the Gijduvan (n=34, 23.4%) and Jondor (n=19, 13.1%) districts. Notably, consanguineous marriages were reported in 7.6% of families (n=11), highlighting a specific sociocultural risk factor within the region that aligns with broader patterns discussed by Bokeria et al. and Hamamy[5,20].

Table 1. Demographic and Socio-Economic Profile of the Study Cohort (N=145)

Characteristic	n (%) or Mean ± SD
Gender	
Male	78 (53.8%)
Female	67 (46.2%)
Age at Follow-up (years)	7.4 ± 3.2
Residential Area	
Rural	121 (83.4%)
Urban	24 (16.6%)
Key Geographic Districts	
Gijduvan	34 (23.4%)
Jondor	19 (13.1%)
Bukhara City	17 (11.7%)
Others (10 districts)	75 (51.8%)
Social Risk Factors	
Consanguinity (Related parents)	11 (7.6%)
Suboptimal Vaccination Adherence	37 (25.5%)

The distribution of CHD types (Table 2) followed global trends for regional centers. The most frequent pathology was Ventricular Septal Defect (VSD),

accounting for 21.4% (n=31) of cases, followed by Atrial Septal Defect (ASD) at 15.9% (n=23). Among cyanotic defects, Tetralogy of Fallot (ToF) was the most prevalent, representing 13.8% (n=20) of the cohort. This distribution is consistent with reports from other developing cardiac programs[1,6] and aligns with regional epidemiological data for the Bukhara region provided by Navruzova et al. (2015), who also identified VSD as the leading acyanotic defect in the local pediatric population[21]. Other diagnoses included Patent Ductus Arteriosus (PDA) (11.0%) and complex combined defects (10.3%).

Table 2. Clinical Spectrum of Congenital Heart Defects (CHD)

Type of CHD	Absolute Number (n)	Percentage (%)
Ventricular Septal Defect (VSD)	31	21.4%
Atrial Septal Defect (ASD)	23	15.9%
Tetralogy of Fallot (ToF)	20	13.8%
Patent Ductus Arteriosus (PDA)	16	11.0%
Combined/Complex Defects	15	10.3%
Other	40	27.6%
Total	145	100.0%

Nutritional deficiency was a pervasive finding (Table 3). According to BMI analysis, 61.4% of children (n=89) suffered from malnutrition (BMI < 18.5). Statistical analysis demonstrated a significant correlation between low BMI and a higher incidence of postoperative complications ($p = 0.0005$). Furthermore, 75.0% of patients presented with at least one somatic comorbidity, with iron-deficiency anemia being the most common (37.9%), followed by neurological disorders (11.0%) and chronic tonsillitis (8.3%).

Table 3. Nutritional Status and Somatic Comorbidities

Parameter	Category	n	%
Nutritional Status (BMI)	Malnutrition (BMI < 18.5)	89	61.4%
	Normal Weight	56	38.6%
Comorbidities	Iron-Deficiency Anemia	55	37.9%
	Neurological Disorders	16	11.0%
	Chronic Tonsillitis	12	8.3%

	Gastrointestinal Diseases	11	7.6%
	No Comorbidities	36	24.8%

At the time of follow-up, 42 patients (28.9%) exhibited significant late-stage cardiac complications (Table 4). The leading issues were cardiac arrhythmias (31.0%), chronic heart failure (26.2%), and pulmonary hypertension (16.7%).

Table 4. Late Postoperative Complications and Statistical Correlations

Complication Type	Number of Cases (n=42)	Percentage (%)
Cardiac Arrhythmias	13	31.0%
Chronic Heart Failure (CHF)	11	26.2%
Pulmonary Hypertension	7	16.7%
Statistical Analysis	Metric	Value
Age vs. Arrhythmia Risk	Spearman's p	0.98 ($p < 0.001$)
Low BMI vs. Complications	Chi-square / p-value	$p = 0.0005$

A Spearman correlation analysis revealed a near-perfect positive relationship between the patient's age at follow-up and the manifestation of arrhythmias ($\rho = 0.98$, $p < 0.001$). This suggesting that electrical instability increases significantly as the post-surgical population ages, consistent with observations by Ganea[22] and Sahu et al.[23].

Additionally, adherence to the national vaccination schedule was suboptimal, with 25.5% of children missing primary vaccinations due to medical contraindications or parental hesitancy.

Discussion

The results of this study highlight the complex interplay between clinical, nutritional, and regional factors influencing the long-term outcomes of pediatric patients after CHD correction in the Bukhara region.

One of the most concerning findings is the high prevalence of malnutrition (61.4% with BMI < 18.5). This rate is significantly higher than those reported in developed countries but aligns with data from other low- and middle-income countries (LMICs). For instance, Argent[24] and Skillman[25] emphasize that perioperative undernutrition is a major predictor of increased morbidity and prolonged recovery. Our finding of a strong statistical significance ($p = 0.0005$)

between low BMI and postoperative complications underscores the urgent need for standardized nutritional support protocols in regional pediatric cardiac centers.

The near-perfect correlation between age and the incidence of arrhythmias ($\rho = 0.98$, $p < 0.001$) is a critical observation. This suggests that as the first cohorts of successfully operated children in the region reach adolescence, the burden of electrical instability and rhythm disorders increases exponentially. This phenomenon has been well-documented in long-term follow-ups of Tetralogy of Fallot patients[26, 27]. The high incidence of late-onset arrhythmias in our cohort (31.0%) suggests that regional follow-up programs must prioritize long-term electrophysiological monitoring, especially as patients transition into adulthood.

The fact that 83.4% of our patients reside in rural areas poses a significant challenge for specialized rehabilitation. Geographic barriers often lead to suboptimal adherence to follow-up schedules and vaccination protocols (25.5% deviation in our study). Furthermore, the 7.6% rate of consanguinity, while typical for some parts of Central Asia, is a known risk factor for complex CHD presentations and associated genetic comorbidities[20]. These findings suggest that a "one-size-fits-all" rehabilitation model is insufficient; instead, a community-based, multidisciplinary approach is required to bridge the gap between rural residences and specialized centers.

Our findings in the Bukhara region present both striking similarities and notable divergences when compared to global benchmarks (Table 5):

1. Late-Onset Arrhythmias: Our observed correlation between age and arrhythmia incidence ($\rho = 0.98$) mirrors the long-term data from the Mayo Clinic and Boston Children's Hospital, where late-onset rhythm disturbances in Tetralogy of Fallot survivors typically peak during the second decade of life. However, while global studies often attribute this to surgical scarring alone (Ganea et al., 2023)[22], our data suggests that in LMIC settings, chronic malnutrition may accelerate this electrical instability.

2. Nutritional Burden: The 61.4% malnutrition rate in our cohort is significantly higher than reported in European or North American registries, where pediatric cardiac cachexia is strictly managed through early aggressive enteral nutrition. Our results are more closely aligned with data from India[28] and Brazil[29], where preoperative undernutrition remains a primary predictor of prolonged mechanical ventilation and late morbidity.

3. Socio-Geographic Barriers: Unlike the centralized models in Russia reported by the Bakulev Center[5] where geographic availability is a logistical issue, our study highlights that in Bukhara, the high rural density (83.4%) combined with sociocultural factors like consanguinity (7.6%) creates a unique 'risk cluster' that is not typically seen in Western populations.

Table 5. Comparative analysis of postoperative outcomes: Bukhara vs. International cohorts

Parameter	Bukhara Cohort (Our Study)	International Trends (LMICs)	Developed Centers (USA/EU)
Malnutrition Rate	61.4%	35–50% (India/Africa)	< 10%
Late Arrhythmias	31.0% (of complications)	20–30%	15–25% (longer follow-up)
Rural Residency	83.4%	40–60%	< 20%
Main Correlation	Age & BMI (ρ = 0.98)	Surgical Technique	Genetic Predisposition

Study Limitations

This study is limited by its retrospective nature and the reliance on medical records which may have inherent documentation gaps. Additionally, the sample size of 145, while representative for the Bukhara region, may not capture rarer complications or late-term outcomes in less common CHD types.

Conclusion

Postoperative management of congenital heart disease in the Bukhara region is characterized by a high burden of nutritional deficiencies and age-related complications. The significant correlation between increasing age and the incidence of cardiac arrhythmias (ρ =0.98) highlights a critical need for long-term, specialized electrophysiological monitoring as this surgical cohort matures.

Furthermore, the high prevalence of malnutrition (61.4%) and its direct impact on postoperative morbidity (p=0.0005) necessitate the integration of aggressive nutritional rehabilitation into standard regional protocols. Given that over 80% of patients reside in rural areas, success in long-term outcomes will depend on creating a multidisciplinary bridge between regional specialized centers and primary rural healthcare providers.

Disclosures and Conflict of Interest The authors declare that this study was conducted without any financial, property, or intellectual aid from commercial sources. No funds, property, or technology used in this study were purchased, borrowed, or donated by commercial entities. The authors have no conflicts of interest to disclose.

Freedom of Investigation The authors affirm that they had full control over the study design, the methods used, the selection of outcome parameters, the

analysis of data, and the production of the final written report. There are no undisclosed authors associated with this manuscript.

Artificial Intelligence Disclosure Statement During the preparation of this manuscript, the authors used AI-based tools (Gemini/Google) for the purpose of language editing, improving English grammar and style, and ensuring adherence to American English standards. After using these tools, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the accuracy and integrity of the final publication.

References:

1. Vervoort D, Zheleva B, Jenkins KJ, Dearani JA. Children at the Heart of Global Cardiac Surgery: An Advocacy Stakeholder Analysis. *World J Pediatr Congenit Heart Surg*. 2021;12(1):48-54. doi:10.1177/2150135120955189
2. Jacobs JP, Jacobs ML, Austin EH 3rd, et al. Quality measures for congenital and pediatric cardiac surgery. *World J Pediatr Congenit Heart Surg*. 2012;3(1):32-47. doi:10.1177/2150135111426732
3. Barach DP. Improving pediatric cardiac care with continuous quality improvement methods and tools. In: *Improving Patient Safety Through Teamwork and Team Training*. Springer; 2015. doi:10.1007/978-1-4471-6566-8_3
4. Hasan BS, Bhatti A, Mohsin S, et al. Recommendations for developing effective and safe paediatric and congenital heart disease services in low-income and middle-income countries: a public health framework. *BMJ Glob Health*. 2023;8(5):e012049. doi:10.1136/bmjgh-2023-012049
5. Bokeria LA, Milievskaya EB, Krupyanko SM, Manerova OA. Geographical availability of cardiology care to patients after surgical treatment of congenital heart disease. *Social Aspects of Population Health*. 2014;(4). Accessed September 1, 2014. https://vestnik.mednet.ru/content/view/580/30/
6. Murala JSK, Karl TR, Pezzella AT. Pediatric Cardiac Surgery in Low-and Middle-Income Countries: Present Status and Need for a Paradigm Shift. *Front Pediatr*. 2019;7:214. Published 2019 Jun 13. doi:10.3389/fped.2019.00214
7. Argent AC, Balachandran R, Vaidyanathan B, Khan A, Kumar RK. Management of undernutrition and failure to thrive in children with congenital heart disease in low- and middle-income countries. *Cardiol Young*. 2017;27(S6):S22-S30. doi:10.1017/S104795111700258X
8. Ladak LA, Gallagher R, Hasan BS, Awais K, Abdullah A, Gullick J. Exploring the influence of socio-cultural factors and environmental resources on the health related quality of life of children and adolescents after congenital heart disease surgery: parental perspectives from a low middle income country. *J Patient Rep Outcomes*. 2020;4(1):72. Published 2020 Aug 28. doi:10.1186/s41687-020-00239-0
9.Silva-Gburek J, May K, Walvoord B, Lozano C, Coss-Bu JA. Perioperative Nutrition in Pediatric Patients with Congenital Heart Disease and Heart Failure. *Nutrients*. 2025;17(22):3609. Published 2025 Nov 19. doi:10.3390/nu17223609

10. Lim CYS, Lim JKB, Moorakonda RB, et al. The Impact of Pre-operative Nutritional Status on Outcomes Following Congenital Heart Surgery. *Front Pediatr*. 2019;7:429. Published 2019 Oct 23. doi:10.3389/fped.2019.00429
11. Gonchar MA**.** Improvement of dispensary observation of children after surgical correction. *Scientific Bulletins*. 2014.
12. Gupta P, Beam BW, Noel TR, et al. Impact of preoperative location on outcomes in congenital heart surgery. *Ann Thorac Surg*. 2014;98(3):896-903. doi:10.1016/j.athoracsur.2014.04.123
13. Bokeria LA, Zelenikin MA, Golukhova EZ, Batov SM. Cardiac rhythm and conduction disturbances in the early postoperative period after surgical correction of congenital heart defects in young children. *Annals of Arrhythmology*. 2012;(1). https://cyberleninka.ru/article/n/narusheniya-ritma-serdtsa-i-provodimosti-v-rannem-posleoperatsionnom-periode-posle-hirurgicheskoy-korrektsii-vrozhdennyh-porokov
14. Sahu MK, Das A, Siddharth B, et al. Arrhythmias in Children in Early Postoperative Period After Cardiac Surgery. *World J Pediatr Congenit Heart Surg*. 2018;9(1):38-46. doi:10.1177/2150135117737687
15. Karamlou T, Silber I, Lao R, et al. Outcomes after late reoperation in patients with repaired tetralogy of Fallot: the impact of arrhythmia and arrhythmia surgery. *Ann Thorac Surg*. 2006;81(5):1786-1793. doi:10.1016/j.athoracsur.2005.12.039
16. Ganea G, Cinteză EE, Filip C, Iancu MA, Balta MD, Vătășescu R, Vasile CM, Cîrstoveanu C, Bălgrădean M. Postoperative Cardiac Arrhythmias in Pediatric and Neonatal Patients with Congenital Heart Disease—A Narrative Review. Life. 2023; 13(12):2278. https://doi.org/10.3390/life13122278
17. World Health Organization**.** *The WHO Child Growth Standards.* World Health Organization; 2006.https://www.who.int/toolkits/child-growth-standards
18. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On measures to further improve the system of providing specialized medical care in the field of healthcare. July 28, 2021. No. PP-5199.
19. Law of the Republic of Uzbekistan. On the rights of persons with disabilities. October 15, 2020. No. ZRU-641.
20. Hamamy H. Consanguineous marriages : Preconception consultation in primary health care settings. *J Community Genet*. 2012;3(3):185-192. doi:10.1007/s12687-011-0072-y
21. Navruzova ShI, Manasova IS. Risk factors for the formation of congenital heart defects. *Vestnik KazNMU*. 2020;(4). [In Russian].
22. Ganea CA, Coroleucă CA, Kovacs E, et al. Long-term follow-up of arrhythmias in patients with operated congenital heart disease: a growing population challenge. *J Pers Med*. 2023;13(5):782. doi:10.3390/jpm13050782
23. Sahu A, Gupta SK, Mishra J, et al. Late arrhythmias after surgical repair of congenital heart disease: incidence and risk factors. *Indian Heart J*. 2018;70(suppl 3):S347-S352. doi:10.1016/j.ihj.2018.01.017

24. Argent AC, Ahrens J, Morrow BM, et al. Pediatric intensive care in South Africa: an account of making the best of what we have. *Paediatr Int Child Health*. 2014;34(4):298-314. doi:10.1179/2046905514Y.0000000145
25. Skillman HE, Wischmeyer PE. Nutrition therapy in the critically ill child. *Curr Opin Crit Care*. 2008;14(4):370-377. doi:10.1097/MCC.0b013e328305f377
26. Gatzoulis MA, Balaji S, Webber SA, et al. Risk factors for arrhythmia and sudden cardiac death late after repair of tetralogy of Fallot: a multicentre study. *Lancet*. 2000;356(9234):975-981. doi:10.1016/S0140-6736(00)02714-8
27. Khairy P, Aboulhosn J, Gurvitz MZ, et al. Arrhythmia burden in adults with congenital heart disease: projections for the next decade. *Circulation*. 2010;121(1):7-13. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.869693
28. Vaidyanathan B, Radhakrishnan R, Sarala A, et al. Impact of malnutrition on outcomes after pediatric cardiac surgery in a developing country. *Ann Pediatr Cardiol*. 2022;15(1):15-22. doi:10.4103/apc.apc_123_21
29. Rossaneis AR, de Souza Freire Machi AD, et al. Nutritional status and clinical outcomes in children after surgery for congenital heart disease. *Rev Paul Pediatr*. 2019;37(2):181-187. doi:10.1590/1984-0462/;2019;37;2;00007

UDC: **618.3:616.7-007.2**

Khaydarova N.B.
assistant
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute
https://orcid.org/0009-0001-8039-0082

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF UTERINE LEIOMYOMA

Abstract*: Uterine leiomyoma is one of the most common benign tumors among women of reproductive age, and its clinical manifestations and diagnostic evaluation remain a relevant issue in modern gynecology. This article analyzes the clinical features of uterine leiomyoma, including abnormal uterine bleeding, dysfunction of the pelvic organs, and anemia. Additionally, the role of hormonal, morphological, and immunological factors in the development of leiomyoma is highlighted.*

The article evaluates modern diagnostic methods used in the detection of uterine leiomyoma, such as transvaginal ultrasonography, Doppler imaging, hydrosonography, magnetic resonance imaging, hysteroscopy, and angiography, emphasizing their informativeness and clinical significance. The importance of imaging methods in determining the localization of myomatous nodules and assessing their proliferative activity is also discussed.

The findings indicate the necessity of early diagnosis of uterine leiomyoma, individualized treatment planning, and the improvement of clinical and diagnostic approaches to prevent possible complications.

Keywords: *uterine leiomyoma, myomatous nodules, abnormal uterine bleeding, diagnostics, ultrasonography, hysteroscopy*

Introduction.

Uterine fibroids (UF) are benign, monoclonal, and hormonally sensitive tumors that develop as a result of the proliferation of phenotypically altered smooth muscle cells of the myometrium. Myomatous nodules are usually round in shape, and their size may vary from a few millimeters to large masses reaching several tens of centimeters. Uterine leiomyoma is very rare in girls of pubertal age; however, after the age of 30, its prevalence reaches 30–40%. During menopause, due to a decrease in the secretion of sex steroid hormones, the development and growth of uterine leiomyomas in most cases slow down or cease. This fact confirms the decisive role of ovarian hormones in the pathogenesis of uterine fibroids [5].

In the development of leiomyoma, smooth muscle layer cells undergo excessive proliferation beyond normal regulatory mechanisms. The formation of leiomyoma usually proceeds slowly: initially, a single smooth muscle cell begins uncontrolled division, and as the number of cells gradually increases, myomatous nodules develop within the uterine wall [12].

Uterine fibroids demonstrate varying prevalence among different racial groups, with the highest rates observed in Black women and the lowest in women of Asian descent. Epidemiological data on racial groups other than Caucasian and African American women remain limited. Studies conducted by Laughlin and co-authors showed that the prevalence of fibroids was 18% among Black women, 8% among White women, 10% among Hispanic women, and 13% in the "other" group, which consisted predominantly of women of Asian origin [15].


Uterine leiomyoma is a benign uterine tumor originating from the myometrium, the development of which is based on the active proliferation of smooth muscle cells and connective tissue elements. Comparative ultrastructural analysis of collagen fibrils in leiomyoma tissue versus normal myometrium has revealed atypical features in their structure and arrangement. These morphological changes indicate the significant role of matrix metalloproteinases—particularly collagenases and gelatinases—in the pathogenesis of leiomyoma. Such alterations in the connective tissue component may be associated with hormonal imbalance observed in women [6].

Based on the results of numerous clinico-morphological studies, the common (simple) form of uterine fibroid is considered a benign tumor with low biological activity and slow growth. In this form, the tumor structure is predominantly composed of connective tissue, accompanied by phenotypic changes in myocytes, as well as reduced blood supply in both the myometrium and myomatous nodules.

In contrast, proliferative uterine fibroids are characterized as benign tumors with clinically active behavior, multiple nodules, and rapid growth. These fibroids possess high proliferative potential and are often associated with proliferative changes in the endometrium, tumor-like formations, and benign or malignant ovarian neoplasms. According to some authors, proliferative fibroids are diagnosed in approximately every fourth patient. Histologically, although myogenic components in these fibroids do not exhibit cellular atypia, their quantity is significantly greater compared to fibroids without signs of proliferation. While mitotic activity is almost absent in simple fibroids, an increased number of mitoses is observed in proliferative fibroids. Experts emphasize that classification of uterine fibroids based on histogenetic characteristics is of great importance in clinical practice, particularly in determining individualized treatment strategies [9].

Uterine bleeding is one of the major problems of emergency gynecology and accounts for 18–23% of causes of female mortality. Bleeding is considered one of the most reliable clinical signs of leiomyoma. Uterine leiomyoma is among the most common benign tumors of the female pelvic organs and is diagnosed in approximately 20% of women over 35 years of age and in up to 40% of women older than 50 years. As the size of myomatous nodules increases, dysfunction of adjacent organs may occur, including constipation and dysuric disorders. Conservative methods aimed at controlling bleeding, hormonal therapy, as well as minimally invasive procedures such as hysteroscopic endometrial curettage, do not always provide the expected therapeutic effect. Moreover, these surgical interventions are closely associated with the risk of postoperative complications,

which may subsequently lead to scar formation and adhesions in the pelvic cavity [1].



0	Pedunculated submucous fibroid
1	submucous fibroid, ＜ 50% intramural
2	submucous fibroid, ≥50% intramural
3	completely intramural fibroid but abutting the endometrium
4	completely intramural without Contact with endometrium or serosa
5	Subserous fibroid, ≥50% intramural
6	Subserous fibroid, ＜50% intramural
7	Pedunculated Subserous fibroid
8	others (e.g. cervical, parasitic)
2-5	Submucosal and subserosal, eath with less than half the diameter in the endometrial and peritoneal cavities, respectively

FIGO classification of uterine fibroids (leiomyomas)

Diagnosis

The evaluation of uterine fibroids is primarily based on the clinical symptoms observed in patients. These include abnormal uterine bleeding, complaints related to mass effect, pelvic pain, and signs characteristic of anemia. In some cases, myoma nodules may be incidentally detected during routine pelvic examinations or imaging studies in asymptomatic women [10].

Clinically significant subserosal and intramural myoma nodules are often diagnosed based on pelvic examination findings. The main diagnostic signs include an enlarged uterus, irregular shape, firm consistency, and absence of tenderness [18].

Currently, various diagnostic methods are used to identify leiomyoma, assess its localization, and determine tumor characteristics. These include ultrasonography, Doppler studies, three-dimensional ultrasound tomography, magnetic resonance imaging (MRI), hydrosonography, and angiography. In addition, hysteroscopy and laparoscopy remain highly effective diagnostic methods.

Transvaginal ultrasonography (TVUS) is considered the most effective screening diagnostic tool. Determining the location of myoma nodules is particularly important in myomectomy, as it often dictates the choice of surgical approach. With the introduction of hydrosonography (HSG), the diagnostic

capabilities of ultrasound in assessing uterine fibroids have significantly expanded. This method is widely used prior to transcervical resection of myomatous nodules, as it provides valuable diagnostic information and reduces the risk of surgical complications. HSG allows precise identification of the type of submucosal node, its relationship to the internal cervical os and uterine cornua, assessment of myometrial thickness up to the serosal layer, and more accurate visualization of the bed of interstitial-subserosal nodules and their proximity to the uterine cavity. The creation of an acoustic window enhances visualization of intrauterine pathology, increasing the sensitivity of hydrosonography in determining fibroid localization to nearly 100% [3].

Uterine size assessed by bimanual examination shows a high degree of correlation with uterine volume and weight determined by pathological examination, even in women with a body mass index greater than 30. In cases where the clinical diagnosis is sufficiently clear, routine ultrasonography is not required. However, to reliably detect submucosal fibroids, additional diagnostic methods such as saline infusion sonography, hysteroscopy, or MRI are necessary [11].

Imaging diagnostic methods enable non-invasive and repeatable evaluation of tumor formations and play a crucial role in detecting leiomyomas and confirming their precise localization. In clinical practice, ultrasonography is considered the first-line imaging modality for leiomyoma assessment due to its accessibility, speed, and ease of use [17].

Color Doppler mapping (CDM), combined with echographic imaging, allows assessment of qualitative and quantitative parameters of blood supply to the examined structure and helps predict its histological characteristics. In most cases, non-mosaic blood flow is observed at the periphery of the tumor, while in approximately one-third of cases, blood flow is also detected within the tumor tissue. Proliferative myomatous nodules typically demonstrate diffuse or mixed blood flow patterns. In both simple and proliferative fibroids, blood flow velocity (Vmax) is relatively low, ranging from 0.12 to 0.25 cm^3/s, while the resistance index (RI) ranges from 0.58–0.69 and 0.50–0.56, respectively [7].

Another important diagnostic method in uterine fibroid evaluation is angiography. Studies were performed using the PHILIPS INTEGRIS V5000 angiographic system, with selective arterial catheterization and administration of 4–6 ml of Ultravist-370 or Omnipaque-350 contrast agents at a rate of 12–16 ml/s, allowing visualization of blood flow and vascularization of myomatous nodules [8].

Computed tomography (CT) is an important imaging modality for assessing clinically manifest symptoms. In most cases, CT reveals well-defined soft tissue masses with heterogeneous internal structure. However, one of the main limitations of CT is its insufficient ability to visualize fine uterine anatomical structures and difficulty in determining the exact origin of the lesion, which may lead to misinterpretation of adnexal masses as uterine tumors [17].

Due to its high contrast resolution for tissue differentiation, multiplanar imaging capability, and reproducibility of results, magnetic resonance imaging (MRI) is considered the most reliable imaging method for detecting and evaluating

uterine fibroids. However, compared to ultrasonography, MRI is more time-consuming, economically expensive, and is used in practice only when specific indications are present [16].

During hysteroscopic examination, the clinical picture may vary depending on the localization of myoma nodules and the phase of the menstrual cycle. In the first half of the cycle, the endometrium is usually relatively thin and pale pink. Well-defined, round or oval submucosal myoma nodules with smooth or slightly irregular surfaces are visualized within the uterine cavity. Deformation of the endometrium around the nodules and enhanced visualization of blood vessels on the nodule surface may be observed. In some cases, myoma nodules partially or completely occupy the uterine cavity, altering its configuration [4].

According to other authors, performing mini-hysteroscopy on days 6–8 of the menstrual cycle is considered optimal for diagnosing uterine fibroids. This method utilizes a 2.5-mm hysteroscope, allowing examination of the uterine cavity without cervical dilation and without causing endometrial trauma. In cases of suspected submucosal or endometrium-adjacent nodules, hystero-resectoscopy with targeted biopsy from the suspected area may be performed. Hysteroscopy serves not only as a diagnostic tool for detecting fibroids but also provides opportunities for organ-preserving surgical treatment in women of reproductive age [2].

Recent scientific studies have demonstrated that immunological mechanisms play a significant role in the development of uterine leiomyoma and its complications. The use of specific immunological markers reflecting the body's immune response makes it possible to identify the growth rate of leiomyoma and the risk of complications at an early stage [13].

Determination of cytokine concentrations in various types of myomatous nodules enables deeper understanding of leiomyoma pathogenesis and facilitates the development of pathogenetic preventive and therapeutic strategies [14].

References

1. Акберов Р.Ф., Шарафутдинов Б.М., Шарафеев А.З., Зогот С.Р. Неотложная помощь женщинам с миомами матки, осложненными маточными кровотечениями // Вестник современной клинической медицины. –2023. –Т. 8, № 1. –С. 18-23.

2. Бреусенко, В. Г., Клевно, М. Е., & Штыров, С. В. (2022). Современные методы диагностики внутриматочной патологии в репродуктивном периоде. *Журнал акушерства и женских болезней*, (S), 102.

3. Диагностика и лечение миомы матки. Актуальные вопросы Савельева Г. М., Курцер М. А., Бреусенко В. Г., Краснова И. А., Аксенова В. Б., Денисова Е. С., Платицын И. В. ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова Росздрава», Москва. Гинекология. №6 — 2024.С 36-39.

4. Довгань, А. А. (2013). Роль гистероскопии в дифференциальной диагностике гиперпластических процессов эндометрия, субмукозной миомы матки и аденомиоза. *Таврический медико-биологический вестник*.с-40.

5. Коваль МВ, Кудрявцева ЕВ, Кондрашова ЮК, Тагоев ЮШ. Генетика миомы матки. Сибирское медицинское обозрение. 2023;(6):16-24. DOI: 10.20333/25000136-2023-6-16-24 с-17.
6. Значимость генного полиморфизма в прогнозе развития и тактике ведения пациенток с миомой матки и аденомиозом. Е.Б. Морозова, А.Б. Чухловин, Н.В. Кулагина, А.А. Тотолян. Научно-методический центр по молекулярной медицине МЗ РФ на базе Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург ОМ liv выпуск 3/2022 с-54.
7. Миома матки: классификация, диагностика, современные методы лечения. Людмила Можейко. Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Беларусского государственного медицинского университета, доктор медицинскийх наук, профессор. НАУКА И ИННОВАЦИИ | №10 (200) | Октябрь 2021.с-81
8. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в лечении миомы матки Зеленюк Б. И.1, Адамян Л. В.1,3, Обельчак И. С.2, Хорошун Н. Д.3 1ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Минздравсоцразвития РФ; 2ГУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних войск» МВД РФ, г. Москва; 3ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва. Вестник рентгенологии и радиологии № 3, 2022.с-35.
9. Современное состояние вопроса о патогенезе, клинике, диагностике и лечении миомы матки у женщин репродуктивного возраста. Sidorova I.S., Unanyan A.L., Ageev M.B., Vedernikova N.V., Zholobova M.N. GBOU VPO «First MSMU named after I.M. Sechenov» Ministry of Health and Social Development of Russian Federation, Moscow. АКУШЕРСТВО • ГИНЕКОЛОГИЯ • РЕПРОДУКЦИЯ. 2022 • Том 6 • №4 с-23.
10. De La Cruz, M. S. D., & Buchanan, E. M. (2022). Uterine fibroids: diagnosis and treatment. *American family physician*, *95*(2), 100-107.
11. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas William H. Parker, M.D. Department of Obstetrics and Gynecology, UCLA School of Medicine, Los Angeles, California. Fertility and Sterility Vol. 87, No. 4, April 2024.p 730.
12. Haydarova , N. ., & Narzulloeva, N. (2025). Homiladorlikning erta muddatlarida leyomiomaning klinik kechishi va asoratlarini bashoratlash. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(8), 46–47. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zdtf/article/view/108821
13. *Khaydarova N.B.* rediction of early and late obstetric complications in pregnant woman with uterine leiomyoma //New Day in Medicine 10(84)2025 186-189 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/10-84-2025
14. Narzullaeva, N. S., Musakhodzhaeva, D. A., Abdurakhmanov, M. M., & Ikhtiyarova, G. A. (2019). Cytokine dynamics as a result of phyto-flavanoid exposure in women with uterine myoma. *Russian Journal Of Immunology*, *22*(2-1), 435-437.

15. Sparic R, Mirkovic L, Malvasi A, Tinelli A. Epidemiology of uterine myomas: a review. Int J Fertil Steril. 2023; 9(4): 424-435.
16. Testa AC, Di Legge A, Bonatti M, Manfredi R, Scambia G. Imaging techniques for evaluation of uterine myomas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021 Jul; 34:37-53. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2022.11.014. Epub 2023 Nov 30. PMID: 26803557.
17. Yuan, Y., Chen, L., Zhao, T., & Yu, M. (2021). Pathogenesis, diagnosis and treatment of uterine lipoleiomyoma: A review. *Biomedicine & pharmacotherapy*, *142*, 112022.
18. G.H. Cantuaria, R. Angioli, L. Frost, R. Duncan, M.A. Penalver. Comparison of bimanual examination with ultrasound examination before hysterectomy for uterine leiomyoma.Obstet Gynecol, 92 (2021), pp. 109-112.

Kholmirzaev F.M.
senior lecturer
departament of Finance
Faculty of Economy
"Alfraganus University"NGU

DIRECTIONS FOR THE USE OF ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR

Abstract: *This article explores the development of small and medium-sized businesses and the factors that influence this process in the case of Germany, China, Japan, USA and Uzbekistan. Several distinguishing features have also been considered, as well as an analysis of the main indicators of the effectiveness of business development. The share of the small and medium-sized business sector in the country's GDP, the number of enterprises in this area and the share of the population occupied in small and medium-sized enterprises were taken into account. Data has been analyzed on how to reform entrepreneurship, stabilize it further, how much the growth of private enterprises and the potential of small businesses is currently rising.*

Key words: *economy, macroeconomic indicators, gross regional product, economic sectors, small business, methods of economic-statistical analysis, statistical grouping, expert assessment, analysis and synthesis.*

Introduction

Small business and private entrepreneurship are among the key factors of economic development and constitute a significant share of GDP in many developed countries. According to 2024 data, the share of small business and private entrepreneurship in the GDP of the United States is 44%. In developed countries such as Germany, Japan, and France, this share ranges from 50% to 55%. In Uzbekistan, the share of small business and private entrepreneurship (SBPE) in GDP was 54.3% in 2024[1], indicating the presence of a favorable economic environment in the country. In developed nations, small businesses account for more than half of the economy. Uzbekistan continues to develop in this regard, and further growth in the small business sector is expected in the future.

Research methodology

This study focuses on the statistical assessment of the role of small business and private entrepreneurship in the sustainable development of the economy of developed country, making it a topic of significant scientific and practical importance.

Research Object: The economy of developed country, particularly the contribution of small business and private entrepreneurship to economic growth.

Research Objective: To statistically evaluate the role of small business and private entrepreneurship in the regional economy and develop statistical indicators that reflect their operational efficiency.The effectiveness of small business and

private entrepreneurship (SBPE) activities can be assessed through their share in key macroeconomic indicators such as gross regional product (GRP), industrial output, and employment levels.

Analysis and discussion of results

The economy of developed country, small business and private entrepreneurship (SBPE) serve as the main drivers of economic development. SBPE plays a crucial role in employment, industrial production, and the construction sector, demonstrating significant growth trends over the years. The following discussion examines the impact of small business on key economic industries, government support measures, and the directions for sustainable development.

The development of small businesses in Russia may lead to a decrease in demand for goods and services, to monopolization of the industry, to the emergence and expansion of sales markets, and to a reduction in export duties on goods and services.Voice acting:

A boastful business is public office.

Small business likes people who are enterprising, enterprising, and creative. It talks about how people suffering from mental disorders become victims of sexual harassment and sexual harassment.

Table1. The role of small and medium-sized businesses in the economies of some countries of the world (as of January 1, 2023)[2]

Countries	Number of small business company		Small business share, as a percentage	
	a thousand pieces	at the expense of a thousand people	total number of employees	gross domestic product
USA	19300	74,2	54	50-52
European Union countries	15777	45	72	63-67
Great Britain	2930	46	49	50-53
Germany	2290	37	46	50-54
Italy	3920	68	73	57-60
France	1980	35	54	55-62
Japan	6450	49,6	78	52-55
Russia	836,2	6,5	9,6	10-12
Uzbekistan*	494,2	17	76	52-56

The role of small business in economic development:

• Mesons formed during the transition from one state to another are called mesons formed during the transition from one state to another :

- Up to 50 people in the UK;

– In the European Union from 100 to 100 people (in the EU from 100 to 250 people);

– Up to 100 people in the USA;

• small business activities in the field of entrepreneurial activity: small business activities in the field of entrepreneurial activity, small business activities in the field of entrepreneurial activity, small business activities in the field of entrepreneurial activity. As an example,

the share of small businesses in the entertainment industry in Spain is 30%, in San Francisco – 31%, in Cambridge – 30%, in Barcelona -80%%;

– The largest automotive and metallurgical concern in Germany, which does not have its own production facilities, but also includes production facilities (they account for 99.7% of all production capacities);

• small business services in the CIS countries:

– The United States accounts for 35% of GDP and 30% of exports;

– In France and Germany, the share of small and medium-sized businesses in GDP is almost 50%;

- A Japanese company engaged in the production of household goods and small businesses with a market share of 57%.;

– In Italy, almost 95% of national income is accounted for by real estate.

• Complaints about small businesses in foreign countries:

– In the USA, the 250 largest private sector companies employ almost 50% of the workforce;

- 70% of those employed in the real estate sector are small businesses.

Historically, a small business is a collection of goods and services in which investment is limited and profits and profits are limited. Then, due to rising real estate prices, increased investment, and the rising cost of transportation services, new firms emerged.

Small business entities are legal entities operating in the field of small business, that is, legal entities, micro-firms and third-party organizations.

One of the advantages of IT technologies is that in the process of their introduction to the market, small businesses receive more and more potential customers.

A boastful business is a business that has everything it needs to survive.They have become more chaotic, they have become more flexible

– their drugs;

– Fairchild and tadbury Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild Fairchild;

- Cambodian athlete competing in mixed martial arts.;

- technical and technological innovations;

- The Russian men's national field hockey team is the men's national field hockey team representing Azerbaijan at international field hockey competitions.;

– lightning-fast resources that you can benefit from;

– an organization operating in various sectors of the economy.

The following table illustrates the share of small businesses in the Gross Regional Product (GRP), industrial production, construction, and employment:

In addition, the Business Ombudsman noted that during the investigation of a particularly large-scale fraud case, signs of fraud committed by a group of people by prior agreement were revealed.

In developed countries, there is a trend towards closer integration and closer integration. In the same year, she married Joel Johnson, whom she divorced in 1998. For example, in Japan, the death rate has reached 80%. In America, the share of farmers without their own farms averages 63%, in China-65%, in South Korea-40%.

In Japan, small business plays an important role. This was also facilitated by the fact that Kiche and his followers were adherents of a more developed branch of Taoism. In this case, we are talking about transactions that, according to the Japanese regulator, can lead to lower mortgage and loan rates, lower mortgage rates, lower mortgage and loan rates, lower mortgage rates, lower mortgage and loan rates.Raghunath Bhaktivedanta Swami Prabhupada stated: An important factor influencing the development of small businesses in this sector of the Japanese sanatorium complex is the lack of guarantees provided to private banks providing loans to small businesses.

Table2.Key indicators of small and medium-sized businesses in some developed countries and Uzbekistan (percentage)[3]

Countries	GDP	Total employment	Total enterprises
USA	52	50,1	97,6
European Union countries	43	47	99,8
Great Britain	51,6	69,5	99,2
Germany	57	69,3	99,3
Italy	49,8	56,6	97,6
France	55	71,0	99,2
Japan	52	55,5	99,1
Russia	53	76,1	90,4
Uzbekistan*	52	50,1	97,6

In South Korea, Singapore and Hong Kong, kickboxers were given up to 50% of the required capital, while the amount of interest on loans issued by the state did not exceed the amount of interest on loans issued by the state.

The small business sector is one of the largest in the country. This sector provides the necessary economic stability in an unstable economy, as well as promotes stable and balanced cooperation. However, it is possible that this may be

due to the appearance of samarador. For example, in the USA, the tour raised 19 million, 90% of the Daniel Mustang company is a subsidiary. The game has sold 10 million copies in Japan, including 10 million copies in Japan and 10 million copies in the United States.According to Deloitte, 99% of companies, of which 90% operate in the small business sector, while 50% operate in the United States and Japan.

Conclusion

Our scientific observations have shown that in recent years, a number of works have been carried out in our country to develop small businesses: in particular, the wholesale and retail trade system has been reformed; an effective system of providing services to small businesses by infrastructure units is being created. Introduction of innovation and new technologies in small businesses creates opportunities not only to increase their competitiveness, but also to improve economic efficiency and provide high-quality services to customers. To successfully implement new technologies, small businesses need to apply practical approaches such as digital transformation, developing innovative products, adapting to customer needs, effectively using information systems and training employees.Through these processes, small businesses reduce costs, increase efficiency and gain a competitive advantage. Thus, the introduction of innovation and technologies is a key source of long-term success and growth for small businesses.

REFERENCE

1.Kholmirzaev F, (2025), Ways to Maximize Profit in Textile Industry Enterprises, Polska Miasto Przyszłości 56;P 159-161

2.«Деловая среда в Узбекистане глазами представителей малого и среди бизнеса». Отчет Международной Финансовой Корпорации по итогам 2020 г. - 21 с.

3.Малый, средний и частный бизнес. Ежеквартальный информационный бюллетень для предпринимателей. Республиканская научно-техническая библиотека. ГФАГИ. 2020 г.3.

4.Bayxonov B.T. (2019), “O‘zbekiston iqtisodiyotida investisiyalarni tarmoqlararo taqsimlashning ekonometrik modellashtirish uslubiyatini takomillashtirish”. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent – 2019. – 76 b.

5.G‘oyibnazarov B.K., Rahmonov H.O., Otajonov Sh.I., Almatova D.S., (2011), Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik – mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini yuksaltirish omili, Monografiya. – T.: Fan, 2011. – 184 b.;

6.Kholmirzaev F, (2025), Ways to Maximize Profit in Textile Industry Enterprises, Polska Miasto Przyszłości 56;P 159-161

7.Kholmirzaev F, (2025), ANDIJON VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI. "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy elektron jurnal.

8.Kholmirzaev F, (2023), Creation Of Production Strategy In Industrial Enterprises, Academia Science Repository, P 852-854.

Khomidova S.H.
associate professor
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Bukhara State Medical Institute

PREVENTION OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: MODERN APPROACHES AND EFFECTIVE MEASURES

Abstract: *Hospital-acquired infections (HAIs), also known as nosocomial infections, remain one of the most significant challenges in modern healthcare systems worldwide. This article highlights the main causes, risk factors, and modern preventive strategies aimed at reducing the incidence of HAIs. Based on a review of scientific literature, the importance of infection control systems, sterilization and disinfection procedures, hand hygiene, and patient safety measures is discussed. The study emphasizes that a comprehensive and systematic approach is essential for effective prevention of hospital-acquired infections.*

Keywords: *hospital-acquired infections, nosocomial infections, prevention, infection control, sterilization, hygiene.*

Introduction

Hospital-acquired infections (HAIs) represent one of the most pressing and complex problems in modern medicine. These infections occur in patients during their stay in healthcare facilities and are not present or incubating at the time of admission. They may also affect healthcare workers as a result of occupational exposure. HAIs significantly complicate the treatment process, prolong hospital stays, increase mortality rates, and lead to substantial economic losses for healthcare systems.

In recent decades, the development of advanced diagnostic and therapeutic technologies, the increasing use of invasive procedures, and the growing number of immunocompromised patients have contributed to a higher risk of infection within hospital settings. Intensive care units, surgical departments, and neonatal units are particularly vulnerable areas where hospital-acquired infections are more frequently observed.

The causative agents of nosocomial infections include bacteria, viruses, fungi, and opportunistic microorganisms. Many of these pathogens demonstrate resistance to antimicrobial drugs, which makes treatment more complicated and less effective. As a result, prevention has become a key priority in controlling the spread of infections in healthcare facilities.

Several factors contribute to the development and transmission of hospital-acquired infections. These include inadequate adherence to sanitary and hygienic standards, improper sterilization of medical instruments, overcrowding in hospitals, airborne transmission, and insufficient compliance with hand hygiene practices among healthcare workers. Together, these factors create a chain of infection that facilitates the spread of pathogens within healthcare environments

Modern prevention strategies focus on strengthening infection control systems, ensuring strict compliance with sterilization and disinfection protocols, promoting hand hygiene, improving the professional training of healthcare personnel, and maintaining a safe hospital environment. Preventive measures are considered more effective and economically beneficial than treating established infections.

The purpose of this article is to review modern approaches and effective preventive measures for hospital-acquired infections based on existing scientific literature.

Materials and Methods

This article is based on a narrative review of scientific literature and international recommendations related to hospital-acquired infection prevention. Relevant medical publications, infection control guidelines, and epidemiological sources were analyzed and summarized to identify key preventive strategies and current approaches. No original clinical or experimental research was conducted.

Results

The literature review indicates that several preventive measures play a crucial role in reducing the incidence of hospital-acquired infections:

Strict adherence to hand hygiene practices by healthcare workers;

Proper sterilization and disinfection of medical instruments and equipment;

Use of disposable medical supplies where possible;

Isolation of infected or high-risk patients;

Rational and controlled use of antibiotics;

Implementation of organized infection control systems in healthcare facilities.

Additionally, maintaining a clean hospital environment, ensuring proper air disinfection, and regular monitoring of sanitary conditions are essential components of infection prevention.

Discussion

Prevention of hospital-acquired infections is a fundamental component of patient safety and quality of healthcare. In modern healthcare settings, HAIs are not only a medical problem but also a serious social and economic concern. They lead to prolonged hospitalization, increased healthcare costs, additional diagnostic and therapeutic procedures, and higher morbidity and mortality rates.

One of the most important contributing factors to the spread of hospital-acquired infections is the human factor. Inadequate compliance with hand hygiene protocols among healthcare workers remains one of the leading causes of pathogen transmission within healthcare facilities. Numerous studies have demonstrated that proper and timely hand hygiene significantly reduces the spread of infectious agents. Therefore, improving hygiene awareness and responsibility among healthcare personnel is one of the most effective preventive strategies.

The growing use of invasive medical procedures has also increased the risk of infection. Devices such as catheters, ventilators, and surgical instruments can serve as entry points for microorganisms if proper aseptic techniques are not strictly

followed. This makes adherence to sterilization and disinfection protocols essential for preventing infection transmission.

Another major challenge is the emergence and spread of antibiotic-resistant microorganisms. The irrational and uncontrolled use of antimicrobial drugs contributes to the development of resistant strains, making infections more difficult to treat. As a result, antimicrobial stewardship programs play a critical role in infection prevention by promoting the rational use of antibiotics.

Organizational measures are equally important in preventing hospital-acquired infections. Establishing infection control committees, conducting regular monitoring, implementing surveillance systems, and providing continuous education and training for healthcare workers can significantly reduce infection risks. Proper management of patient flow, early identification of infectious cases, and timely isolation are also key components of effective prevention.

Modern disinfection technologies and high-quality sterilization methods have greatly improved infection control practices. In addition, the proper management and disposal of medical waste help prevent contamination and reduce environmental risks within healthcare facilities.

A comprehensive and multidisciplinary approach that combines hygienic, epidemiological, organizational, and educational measures is essential for the effective prevention of hospital-acquired infections. Continuous monitoring, adherence to protocols, and institutional commitment to infection control are necessary to ensure long-term success.

Conclusion

Hospital-acquired infections remain a significant challenge for healthcare systems worldwide. Prevention is more effective and cost-efficient than treatment. Strengthening infection control systems, ensuring strict adherence to hand hygiene, improving sterilization and disinfection practices, and promoting rational antibiotic use can significantly reduce the incidence of HAIs.

Enhancing the professional competence and hygienic awareness of healthcare workers, along with implementing comprehensive preventive strategies, plays a key role in minimizing the spread of infections and improving patient safety in healthcare settings.

References

1. Всемирная организация здравоохранения (WHO). Guidelines on Core Components of Infection Prevention and Control Programmes at the National and Acute Health Care Facility Level. – Geneva, 2016.
2. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. – Geneva, 2009.
3. Allegranzi B., Pittet D. Role of hand hygiene in healthcare-associated infection prevention. – Journal of Hospital Infection, 2009.
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings. – 2007.

5. Magill S.S., Edwards J.R. et al. Multistate point-prevalence survey of health care–associated infections. – New England Journal of Medicine, 2014.
6. Pittet D., Donaldson L. Clean Care is Safer Care: a worldwide priority. – The Lancet, 2005.
7. Burke J.P. Infection control – a problem for patient safety. – New England Journal of Medicine, 2003.
8. Власов В.В. Эпидемиология внутрибольничных инфекций. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012.
9. Покровский В.И. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней. – Москва: Медицина, 2010.
10. Яфаев Р.Х., Зуева Л.П. Внутрибольничные инфекции: руководство для врачей. – Санкт-Петербург, 2009.
11. Брико Н.И. Эпидемиология: учебник. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013.
12. Козлов Р.С. Антимикробная резистентность: проблемы и пути решения. – Смоленск, 2015.
13. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Annual Epidemiological Report on Healthcare-Associated Infections. – Stockholm, 2018.
14. Siegel J.D., Rhinehart E., Jackson M., Chiarello L. Management of multidrug-resistant organisms in healthcare settings. – CDC, 2006.
15. Gastmeier P., Geffers C. Prevention of healthcare-associated infections: a review. – Deutsches Ärzteblatt International, 2008.

УДК 379.85

Madraximova Z.N.
“Ekologiya va geografiya” kafedrasi katta o‘qituvchisi.
Guliston davlat universiteti
Xidiraliyev K.E., geografiya fanlari nomzodi dotsent
“Ekologiya va geografiya” kafedrasi
Guliston davlat universiteti
Omonov X.Sh.
‘’Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” ta’lim yo’nalishi 4-bosqich talabasi
“Ekologiya va geografiya” kafedrasi
Guliston davlat universiteti
Nabijonova D. Q.
‘’Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” ta’lim yo’nalishi 4-bosqich talabalasi
“Ekologiya va geografiya” kafedrasi
Guliston davlat universiteti

O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING BOSQICHLARI VA ULARNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ekoturizm tushunchasining vujudga kelish asoslari va uning mazmuni ilmiy jihatdan o‘rganilgan. Jumladan, xalqaro ekoturizm jamiyati tahliliga ko‘ra, qaysi hollarda sayyohlar ekoturizm yo‘nalishi talablariga javob berishi ko‘rib chiqilgan. O‘z navbatida, O‘zbekistonda ekoturizmning rivojlanish asoslari, uning bosqichlari tadqiqot natijari asosida bayon qilingan. Maqolada mualliflarning mazkur mavzu doirasidagi xulosa va takliflari berilgan.*

Kalit so‘zlar: Ekoturizm, atrof-muhit, *sayyoh, Xalqaro ekoturizm jamiyati, tabiiy muhit, madaniy muhit, iqtisodiy barqarorlik, ekologik barqarorlik, ijtimoiy barqarorlik.*

Madrakhimova Z.N.
senior lecturer
Department of Ecology and Geography
Gulistan State University
Khidiraliyev K.E. PhD in Geograph
associate professor
Department of Ecology and Geography
Gulistan State University
Omonov Kh.
4th year student
"Ecology and Environmental Protection" educational program
Department of Ecology and Geography
Gulistan State University
Nabijonova D.
4th year student
"Ecology and Environmental Protection" educational program
Department of Ecology and Geography
Gulistan State University

STAGES OF ECOTOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND THE MECHANISM OF THEIR IMPLEMENTATION

Abstract. *This article provides a scientific examination of the origins and content of the concept of "ecotourism." Specifically, based on an analysis of the international ecotourism community, it examines when tourists meet the requirements of ecotourism. Furthermore, the study describes the foundations and stages of ecotourism development in Uzbekistan. The article presents the authors' conclusions and proposals on this topic.*

Keywords: *Ecotourism, environment, tourist, International Ecotourism Society, natural environment, cultural environment, economic sustainability, environmental sustainability, social sustainability.*

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida turizm industriyasiga e’tibor va e’tirof kuchaymoqda. Uning o‘ziga xos yo‘nalishlari zamon bilan hamnafas holda, vaqt va makon doirasida shakllanmoqda va rivojlanib bormoqda. Bu yo‘nalishlar ichida ekoturizm jamiyat e’tiborini o‘ziga tortmoqda. CHunki, tabiatga ozor bermagan holda, uning saxovatidan foydalanishda ekoturizmning roli beqiyosdir. Agar biz ekoturizm tushunchasi tarixiga e’tibor bersak, quyidagilarni guvoxi bo‘lamiz.

Ekoturizm (*ekoturizm, yashil turizm*)-antropogen ta'sirga nisbatan ta'sirlanmagan tabiiy hududlarga tashrif buyurishga qaratilgan barqaror turizmning bir shakli. G'arbdagi "ekoturizm" atamasi XX asrning 80-yillari birinchi yarmida meksikalik ekolog Ektor Ceballos-Laskurain (ispancha Hector Ceballos-Laskurain) tomonidan konferensiyalardan birida rasmiy ravishda ishlatilgan. U dam olish va

ekologiya o'rtasidagi uyg'unlik g'oyasini aks ettirdi va katta Shuhrat qozondi. Ushbu ta'rifning variantlaridan biri ekoturizm tabiiy imtiyozlardan oqilona foydalanishga asoslangan rekreatsiyaning faol shaklidir **[1, 2]**.

Tadqiqot uslublari. So‘nggi yillarda turizm sohasi faol ravishda o‘zgarmoqda. Aytaylik, bundan bir necha yil oldin pandemiya bilan bog‘liq karantin cheklovlari, uning ortidan mehmonxonalar va aviachiptalar narxining o‘sishi sayohatni tobora qimmat ko‘ngilxushlikka aylantirdi. Bugungi kunda esa turizmning o‘zi esa global iqtisodiyotda eng tez o‘sayotgan tarmoq bo‘lib turibdi. Ushbu doirada, zamonaviy turizmning etuk ko‘rinishi ekoturizm sohasi ham o‘sib boryapti. Ekoturizm deganda jahon amaliyotida atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lib, tabiat qo‘ynida dam olish nazarda tutiladi. BMT Taraqqiyot dasturi (BMTTD) ma’lumotlariga ko‘ra, 2023−2028-yillarda ekoturizm bozorining o‘rtacha yillik yalpi o‘sish sur’ati 16,1 foizni tashkil etishi kutilmoqda [3].

O‘zbekistonda ekoturizm yangi rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilning yanvar-iyul oylarida O‘zbekistonga 4,2 mln xorijiy sayyoh tashrif buyurgan bo‘lib, ularning oqimi 2023-yilga nisbatan 15,3 foizga oshgan. YUqorida aytib o‘tilganidek, ekoturizm qat’iy tabiat qo‘yniga sayohat qilishni nazarda tutadi. Bunday tajribadan asosiy maqsad-tabiatdan bahra olish. Xalqaro ekoturizm jamiyati-The International Ecoturism Society (TIES) butun dunyo bo‘ylab ekoturizmni targ‘ib qilish bilan shug‘ullanuvchi tashkilot bo‘lib, uning ta’rifiga ko‘ra, ekoturizm-bu **tabiat qo‘yniga mas’uliyatli sayohat bo‘lib, atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish,** mahalliy aholining farovonligini qo‘llab-quvvatlash va yangi tajribalarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi**.**

TIES tamoyillariga ko‘ra, quyidagi hollarda sayohatlar ekoturizm hisoblanadi:

-belgilangan joyda atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida insonning hududga ta’siri kuzatib boriladi va tashrif buyuruvchilar oqimi boshqariladi;

-yaratilgan infratuzilma tabiatga minimal ta’sir ko‘rsatadi;

-joylarning egalari “yashil” standartlar va texnologiyalarni joriy etadi;

-tadbirlar mahalliy aholining an’anaviy madaniyatini saqlash va qo‘llab-quvvatlashni nazarda tutadi **[4,5]**.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Bundan kelib chiqadiki, ekoturizm tabiiy va madaniy muhitni saqlab qoladi, sayyohlar uchun ma’rifiy ahamiyatga ega va mahalliy aholi uchun iqtisodiy jihatdan foydali. Biroq bularning barchasi tashkilotlarning turli barqaror rivojlanish dasturlari va missiyalarida mustahkamlangan tamoyillardir. Ushbu tamoyillar amalda qanday tatbiq etilishini ko‘rib chiqamiz. Ekoturizmni barqaror rivojlantirish, muayyan qiyinchiliklar bilan bo‘lsa-da, real voqelikdir. Bu sohadagi muvaffaqiyat iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik o‘rtasidagi to‘g‘ri muvozanatga bog‘liq.

Iqtisodiy barqarorlik mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlashni o‘z ichiga oladi. Ekoturizm ish o‘rinlarini yaratish va mahalliy jamoalarning daromadlarini oshirish orqali iqtisodiyotni rag‘batlantirishi mumkin, ayniqsa chekka va qishloq joylarda. Masalan, MDH davlatlarida BMTTD ko‘magida qishloq xo‘jaligi dehqon

va fermerlari, ijtimoiy soha xodimlari, ta'lim muassasalari, muzeylar, tabiiy qo'riqxonalar vakillari alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga ekologik ekskursiyalarni tayyorlash va tashkil etish xususiyatlari bo'yicha o'qitilmoqda.

Ekologik barqarorlik-qat'iy tartibga solish va rejalashtirish yordamida insonning tabiiy hududlarga salbiy ta'sirini minimallashtirishning imkoni bor. Jumladan, qisman ekoturizm hisobidan moliyalashtiriladigan ekologik toza texnologiyalarni joriy etish orqali. Masalan, ayrim alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarda oqova suvlarni nazorat qilish uchun datchiklar o'rnatiladi.

Ijtimoiy barqarorlik-ekoturizm nafaqat sayyohlar, balki mahalliy aholi, jumladan, bolalar orasida ham ekologik mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirish va tarbiyalashga yordam berishi mumkin. Misol uchun, BMT sayohatlarga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirish maqsadida "Inson va biosfera" ta'lim dasturini ishlab chiqdi. Dastur butun dunyo bo'ylab 25 ta qo'riqxonada, shu jumladan, Qozog'istonning ikkita-Olmaota va G'arbiy Oltoy biosfera qo'riqxonalarida hamda Rossiyaning "Kologriv o'rmoni" qo'riqxonasida amal qilmoqda. Yana bir misol-Avstraliyada mahalliy aholini ekoturizm sohasida ish bilan ta'minlashga ko'maklashadigan ikkita davlat agentligi faoliyat yuritadi **[6]**.

O'zbekistonda "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" davlat dasturi doirasida ichki turizmni rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilyapti. 2026-yilga kelib mahalliy sayyohlar sonini 12 milliondan oshishi, xorijlik sayyohlar soni esa 9 millionga yetishi kutilmoqda. O'zbekistonda turizmning asosiy turi madaniy-ma'rifiy bo'lib qolmoqda. Biroq mamlakatning boy diniy merosini hisobga olgan holda, ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilgan. Shuningdek, hozircha aniq tafsilotlar mavjud bo'lmasa-da, faol turizmni (sport va ekoturizm) rivojlantirish rejalari haqida ham gapirsak bo'ladi.

Yirik loyihalar qatoridan Zomin, Forish va Baxmal tumanlarida, shuningdek, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida yangi turistik zonalar barpo etish joy olgan. 300 mln dollarlik loyihalar doirasida 25 mingta ish o'rni tashkil etilishi ko'zda tutilgan. O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish dasturining yana bir farqi shundaki, bu yerda Qozog'iston yoki Rossiyadagi kabi turistik makrohududlar va klasterlarni yaratish tendensiyasi mavjud emas. Ekoturizmni rivojlantirish dasturlari mamlakatning har bir viloyatida amalga oshirilmoqda.

Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Orolbo'yida Mo'ynoq yangi aeroporti imkoniyatlaridan foydalangan holda ekologik va ziyorat turizmi loyihalari ishga tushirilmoqda. Xorazm viloyatini turizm sohasida ish o'rinlari yaratishning asosiy "harakatlantiruvchi kuchi" ga aylantirish choralari ko'rilmoqda. Buxoro viloyatida esa turizmni jadal rivojlantirish dasturi amalga oshirilmoqda.

Turizm sohasida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash muhim yo'nalishga aylanmoqda. 2021-yilda ishga tushirilgan Tourism. Path to Innovation tanlovi startaplarni qo'llab-quvvatlash va mamlakatning turizm salohiyatini ochib berishga qaratilgan. Shu bilan birga, BAA investitsiya kompaniyasi ko'magida Toshkentda yangi turizm akademiyasini ochish rejalashtirilgan.

O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning o'ziga xos mexanizmi mavjud. Ekoturizmni rivojlantirish ham tabiiy hududlar salohiyatini baholash, ham strategik

rejalashtirishni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etadi. MDH davlatlarida, xususan, O‘zbekistonda buni anglagan holda kompleks choralar ko‘rilyapti. Masalan, so‘nggi bir necha yil ichida O‘zbekistonda muhofaza etiladigan tabiiy hudud (METH) lar maydoni mamlakat umumiy maydonining 5,2 foizidan 14 foizigacha kengaytirildi. Bugungi kunda mamlakat METH tizimiga 8 ta qo‘riqxona, 2 ta biosfera qo‘riqxonasi, 3 ta milliy bog‘ va boshqa tabiatni muhofaza qilish obyektlari kiradi.

Shunga qaramay, mamlakatda ekoturizm sohasi hozircha salohiyatni anglash va baholash bosqichida. Atlas kompaniyasi barqaror ekoturizmni rivojlantirish sohasidagi jahon amaliyotini tahlil qilib, to‘rtta asosiy bosqichni ajratib ko‘rsatdi. O‘zbekistonda ham ekoturizm, katta ehtimol bilan, ushbu bosqichlardan o‘tadi.

Tabiiy hududlarning salohiyatini baholash. Birinchi navbatda, bioxilma-xillik darajasini baholash zarur. Bu noyob flora va faunaga, kamyob turlarga yoki muhim ekotizimlarga ega bo‘lgan joylar soni bilan o‘lchanadi. Bunday joylar ko‘proq sayyohlarni jalb etishi mumkin (Masalan, *Yozyovon qumliklari*). Shuningdek, ekoturistik yo‘nalishlarga kiritilishi mumkin bo‘lgan madaniy yoki tarixiy obyektlar mavjudligini aniqlash muhim ahamiyatga ega (masalan, O‘zbekistondagi singari an’anaviy qishloqlar, tarixiy yodgorliklar).

Ustuvor turistik loyihalar xaritasini yaratish. Tabiiy hududlar to‘g‘risida barcha ma’lumotlarni to‘plash, ayni paytda ekologik, ijtimoiy va infratuzilmaviy jihatlarni hisobga olish lozim. Ustuvor loyihalarni aniqlash mezonlarini belgilab olish ham muhim, chunki barcha tashabbuslarni bir vaqtning o‘zida amalga oshirib bo‘lmaydi. Yana bir muhim omil-turistik obyektlarni qurishda ekologik cheklovlarni hisobga olish. Rossiyada alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda qurilishni tartibga solishga qaratilgan qonun kuchga kirdi, chunki ekoturizmning rivojlanishi shunchalik tezlashdiki, bu muhim ekotizimlarga xavf sola boshladi.

Manfaatdor tomonlarni jalb etish. Tomonlarni jalb qilishga yorqin misol-YUNESKO ning Butunjahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan Arxangelsk viloyatidagi Kenozere milliy bog‘i. 1996-yili, bog‘ endigina shakllana boshlagan vaqtdan beri, unga Norvegiyaning bir nechta tashkilotlari, jumladan Riksantikvaren madaniy merosni muhofaza qilish boshqarmasi yordam berib kelgan. Hamkorlik shartlaridan biri shuki, bog‘ni tashkil etish va madaniy obyektlarni ta’mirlash bo‘yicha barcha ishlarda mahalliy aholi ishtirok etishi shart. Darya Kovalenkoning fikricha, bu bosqichda boshqaruvning ikki darajasida o‘zaro hamkorlik qilish vositalarini ishlab chiqish ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘rta darajadagi hamkorlik vositalarini, birinchi navbatda, investorlar bilan ishlash va ekoturizm salohiyatiga ega hududlarni aniqlash haqida o‘ylab ko‘rish muhim. Shuningdek, mahalliy darajadagi vositalar-joylarda kichik biznes uchun ekoturizmni rivojlantirish uchun, jamoalar bilan ishlash uchun, infratuzilma, so‘qmoqlar, yo‘l ko‘rsatkichlarini tashkil etish uchun yo‘riqnomalar ham zarur.

Doimiy monitoring va moslashtirish. Qayta aloqa shuning uchun ham muhimki, prognozlarga ko‘ra, 2033-yilga kelib turizm sohasi global YAIM ning 11,6 foizini tashkil etadi, butun boshli tarmoq esa 2019-yilga nisbatan 50 foizga

o‘sadi. Demak, ekotizimlarga va mahalliy madaniyatga ta’sir faqat ortib boradi. 2030-yilga kelib turizm sanoatida karbonat angidrid gazi chiqindilari ham 2016-yilga nisbatan 25 foizga oshadi.

Yechimlar turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, Xorvatiyaning Dubrovnik shahrida sayyohlarni madaniyat va tabiatga ongli munosabatda bo‘lishga undovchi reklama ishga tushirildi, shahar hokimiyati esa g‘ildirakli chamadonlarni tosh yo‘laklar bo‘ylab olib yurishni taqiqladi. Barselonada sayyohlar uchun qisqa muddatli turar joy ijarasi butunlay taqiqlandi.

Hozircha bu yordam bermayapti. Dunyo bo‘ylab sayohat statistikasini o‘rganuvchi Murmuration startapi hisob-kitoblariga ko‘ra, sayyoramizdagi sayyohlarning aksariyati barcha yo‘nalishlarning atigi o‘ndan bir qismidan foydalanmoqda. Biroq ijobiy jihatlar ham mavjud. Turar joy ijarasiga ixtisoslashgan xizmatlardan biri o‘tkazgan so‘rovnoma mijozlarning yarmidan ko‘pi “ommalashmagan” yo‘nalishlarda sayohat qilishga tayyor ekanini aniqladi. Bunday vaziyatda O‘zbekiston kabi mamlakatlar dunyoning eng gavjum va “toliqqan” hududlaridagi yuklamani kamaytirish bilan bir vaqtda, o‘z hududlarida ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

Xulosa va tavsiyalar. Xulosa o‘rnida aytish lozimki, **ekoturizm**-ekologik ta’lim va ma’rifat dasturlarini o‘z ichiga olgan va ekologik barqarorlik tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladigan tabiatga yo‘naltirilgan turizmdir. Ekologik turizm-mahalliy madaniyat va ekotizimning yaxlitligini buzmaydigan tabiiy muhitni yaxshiroq tushunish maqsadida tabiiy hududlarga maqsadli sayohat, tabiiy resurslarni himoya qilish esa mahalliy aholi uchun foydali bo‘ladi.

Ekoturizm-atrof-muhitga ta’sirni, iste’molni va xarajatlarni minimallashtirishga qaratilgan axloqiy me’yorlarga muvofiq tashkil etilgan va atrof-muhitga ta’sirni kamaytirishga qaratilgan ekologik jihatdan barqaror tabiiy turizmning bir shakli bo‘lib, u atrof-muhitga, iste’molga va xarajatlarga (nazorat qilish nuqtai nazaridan, o‘lchovlarning afzalliklari), odatda, turizmning bunday shakli himoyalangan hududlarda rivojlanib boradi, bu hududlarni saqlab qolishga yordam beradi.

Ekoturizm-tabiatni muhofaza qilish va rivojlanishga hissa qo‘shishi mumkin, u kamida sayyohlik faoliyati, biologik xilma-xillik va mahalliy aholi o‘rtasida ijobiy sinergik munosabatlarni o‘z ichiga oladi, bu esa tegishli tashkilot va ushbu faoliyatni boshqarish tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi.

Ekoturizmning asosiy xususiyatlari:

-nisbatan buzilmagan tabiiy hududlarda sodir bo‘ladi;

-tabiiy muhitni yo‘q qilishga, uning sifati yomonlashishiga olib kelmaydi;

-foydalaniladigan tabiiy hududlarni muhofaza qilish va boshqarishga bevosita hissa qo‘shadi;

-yetarli va vakolatli boshqaruvga bo‘ysunadi.

Ekoturizm asosida, turizm madaniyati yotadi, turizm madaniyatini rivojlantirishda ekologik madaniyatning o‘rni muhim hisoblanadi. Chunki, turizmning Ekoturizm sohasi ekologiya bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, turizmning ushbu yo‘nalishlarini rivojlantirishda turizm ob’ekti hamda tashrif

buyuruvchi turistning ekologik madaniyati qanchalik darajada shakllanganligiga bog‘liq. Haqiqatdan ham, ekoturizm-turizmning yangi sohasi bo‘lib, ikkinchi nomi «tabiatga yumshoq teguvchi turizm», ya’ni atrof-muhitga eng kam ta’sirini ta’minlovchi turizmdir. Ushbu yo‘nalish doirasida ishlab chiqilgan ekoturizm dasturi odatda ekologik toza joylarga borishni nazarda tutadi va tabiat qo‘riqxonalariga uyushtiriladi. Turizmning bu turi tabiiy hududlarga mas’uliyat bilan sayohat qilishni hamda tabiatni muhofaza etishni ta’minlaydi va mahalliy xalqning turmush darajasini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти Ижроия Кенгашининг 99 сессияси.– Тошкент, «Ўзбекистон», 2014. –Б. 14.
2. Ward N.K. Ecotourism: Reality or Rhetoric//www.ecotouris m.org, March, 1997.
3. Экологический туризм: учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата направления «Туризм». Сост. Е.Л. Пименова. - Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», 2012. - 78 с.
4. Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебнометодическое пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с
5. Е. В. Грачевой «Экологический туризм. Учебное пособие для вузов». 2025. 161-стр.
6. Нигматов А.Н. «Экотуризм ва унинг географик хусусиятлари» (Наманган вилояти мисолида). Монография.-Т.: «Наврўз» нашриёти, 2019. – 148 б.

Mamajonova N. A.
katta o'qituvchisi
"Gidrotexnika va gidroenergetika" kafedrasi
"Qurilish muhandisligi va elektroenergetika" fakulteti
Andijon davlat texnika institute

QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Annotatsiya: *Mazkur maqolada qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv tizimini rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion boshqaruvning korxona raqobatbardoshligiga, ishlab chiqarish xarajatlariga va mahsulot sifatiga ta'siri yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion boshqaruv, qurilish korxonasi, raqamli texnologiyalar, BIM tizimi, samaradorlik, innovatsion investitsiyalar, raqobatbardoshlik.*

Mamajonova N. A.
senior lecturer
Department of Hydrotechnics and Hydropower Engineering,
Faculty of Civil Engineering and Electric Power Engineering
Andijan State Technical Institute

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE MANAGEMENT ACTIVITIES IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Abstract: *This article analyzes the development of an innovative management system in construction enterprises, the improvement of production efficiency, and the economic significance of implementing digital technologies. It also highlights the impact of innovative management on enterprise competitiveness, production costs, and product quality.*

Keywords: *innovative management, construction enterprise, digital technologies, BIM system, efficiency, innovative investments, competitiveness.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ta'kidlanganidek, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, xususan qurilish sohasida innovatsion yondashuvni keng joriy etish mamlakatning raqobatbardoshligini ta'minlashning muhim omilidir. Qurilish sohasi iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, unda zamonaviy boshqaruv mexanizmlarini tatbiq etish, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalar

asosida tashkil etish samaradorlikni sezilarli oshiradi. Shu bois, qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv tizimini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Asosiy qism

Qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv tushunchasi va ahamiyati. Innovatsion boshqaruv — bu korxona faoliyatiga yangi texnologiyalar, boshqaruv usullari va tashkiliy yechimlarni tatbiq etish orqali resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish hamda raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan boshqaruv faoliyatidir.

Qurilish sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim bo‘g‘ini bo‘lib, sifat, tezlik va samaradorlik bo‘yicha yuqori talablarni talab qiladi. An’anaviy boshqaruv usullari bu talablarni qondirishda yetarli bo‘lmasligi sababli, **innovatsion boshqaruv** korxona faoliyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion boshqaruv – bu korxonaning samaradorligini oshirish maqsadida yangi texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv usullari va tashkilotchilik yondashuvlarini qo‘llashdir. Qurilish sohasida buning asosiy yo‘nalishlari: raqamli texnologiyalarni joriy etish, innovatsion investitsiyalar, loyihalarni boshqarishning zamonaviy usullari hisoblanadi. Qurilish sohasida innovatsion boshqaruv quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

- Texnologik innovatsiyalar: energiya tejamkor, ekologik toza va zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanish;
- Tashkiliy innovatsiyalar: loyiha boshqaruvida “Lean construction”, “Agile project management” tizimlarini joriy etish;
- Axborot innovatsiyalari: “BIM” (Building Information Modeling), “ERP” (Enterprise Resource Planning) kabi raqamli platformalar orqali loyihalash, smetalar va nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish;
- Ijtimoiy innovatsiyalar: xodimlarning ijodiy fikrlashini qo‘llab-quvvatlash, tashabbusni rag‘batlantirish va jamoaviy ish samaradorligini oshirish.

Qurilish korxonalarida boshqaruv samaradorligini belgilovchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- Kadrlar salohiyati – malakali mutaxassislarning mavjudligi, ularning innovatsion tafakkuri va yangiliklarni o‘zlashtirish qobiliyati;
- Texnik baza – ishlab chiqarish jihozlarining zamonaviyligi, avtomatlashtirilgan qurilma va texnologiyalar ulushi;
- Raqamlashtirish darajasi – axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ma’lumotlarni tahlil qilish, qarorlar qabul qilish jarayonining tezligi;
- Moliyaviy resurslar – innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun yetarli sarmoya mavjudligi;
- Boshqaruv madaniyati – rahbarlarning strategik fikrlashi, risklarni tahlil qila olish darajasi va jamoaviy boshqaruvni yo‘lga qo‘yish;
- Qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.

Innovatsion boshqaruvni samarali tashkil etish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

- Raqamli platformalarni keng joriy etish. Qurilish loyihalarini boshqarishda BIM texnologiyasi yordamida loyiha hujjatlarini avtomatlashtirish, dizayn va smetalarni yagona tizimda yuritish;

- Loyihalarni integratsiyalash. Qurilishning barcha bosqichlarini – loyiha, moliyalashtirish, qurilish va ekspluatatsiya jarayonlarini yagona tizimda boshqarish;

- Innovatsion kadrlar siyosati. Xodimlarni qayta tayyorlash, raqamli savodxonlikni oshirish va kreativ fikrlashni rivojlantirish dasturlarini joriy etish;

- Innovatsion investitsiyalarni jalb etish. Mahalliy va xorijiy investorlar bilan hamkorlikda yangi texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samarasini tahlil qilish;

- Tashkiliy tuzilmani optimallashtirish. Hierarxik (buyruq asosidagi) boshqaruvdan tarmoq (moslashuvchan) boshqaruv tizimiga o‘tish.

Innovatsion boshqaruvning iqtisodiy samarasi. Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion boshqaruv tizimi joriy etilgan qurilish korxonalarida:

- ishlab chiqarish samaradorligi o‘rtacha 25–30 % ga oshgan;
- loyiha bajarilish muddati 15–20 % ga qisqargan;
- resurslardan foydalanish samaradorligi 20 % gacha ortgan;
- energiya sarfi va chiqindilar miqdori esa 10–15 % ga kamaygan.

Bu natijalar innovatsion boshqaruvning nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy foydasini ham tasdiqlaydi.

Innovatsion boshqaruv yordamida jarayonlarni optimallashtirish, isrofgarchilikni kamaytirish va loyihalarni tezroq yakunlash mumkin. Masalan, **Lean Construction**, **avtomatlashtirish** va **prefabrikatsiya** usullari xarajatlarni kamaytiradi va ishlab chiqarish tezligini oshiradi. **BIM (Building Information Modeling)** kabi raqamli tizimlar loyiha rejalashtirish, dizayn va ijro jarayonlarini samarali boshqarishga yordam beradi. Bu xatoliklarni kamaytiradi, hamkorlikni yaxshilaydi va umumiy samaradorlikni oshiradi.

Innovatsion boshqaruvni joriy etgan korxonalar bozorda raqobatbardosh bo‘lib qoladi. Bu mahsulot sifatini oshiradi, loyihalarni tezroq yakunlashga yordam beradi va mijoz talablariga moslashishni osonlashtiradi.

Innovatsion boshqaruvning iqtisodiy ta’siri

Asosiy yo‘nalish	Ta’siri	Natija
Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish	Jarayonlarni optimallashtirish, isrofgarchilikni kamaytirish	Xarajatlarni kamaytirish, loyiha muddatlarini qisqartirish
Raqamli texnologiyalarni joriy etish (BIM)	Loyihalarni aniq rejalashtirish, xatolarni kamaytirish	Loyihalar sifatini oshirish, mijozlar ishonchini kuchaytirish
Innovatsion investitsiyalar	Zamonaviy uskunalar va texnologiyalar	Rentabellikni oshirish, raqobatbardoshlikni mustahkamlash

Innovatsion boshqaruvga investitsiya qilish korxonaning iqtisodiy holatini yaxshilaydi: xarajatlar kamayadi, loyihalar vaqtida tugaydi va mahsulot sifati oshadi.

Samaradorlikni oshirish strategiyalari

Strategiya	Amalga oshirish yo‘li
Kompleks innovatsion boshqaruv tizimi	Rejalashtirish, monitoring va baholashni birlashtirish
Xodimlarni malaka oshirish	Yangi texnologiyalar va boshqaruv usullarini o‘rgatish
Raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritish	BIM, loyihalarni boshqarish dasturlari
Natijalarni monitoring qilish	Innovatsiyalar samaradorligini doimiy baholash

Innovatsion boshqaruv qurilish korxonalari uchun nafaqat afzallik, balki raqobatbardosh bo‘lish sharti hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, innovatsion investitsiyalarni amalga oshirish va doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantirish orqali korxonalar samaradorlikni oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va bozorda o‘z o‘rnini mustahkamlashi mumkin.

Innovatsion boshqaruvning qurilish jarayonlariga ta’siri:

1. Loyiha rejalashtirish va ijro

Innovatsion boshqaruv yordamida loyihalash jarayoni tezlashadi va xatoliklar kamayadi. Masalan, BIM tizimi yordamida loyiha modellashtiriladi, materiallar va ish vaqtlari aniq rejalashtiriladi. Natijada:

- Loyihaning byudjeti va muddatlari aniqroq hisoblanadi.
- Qurilish maydonida o‘tkaziladigan ishlar samaradorligi oshadi.
- Loyihalar vaqtida yakunlanadi, mijozlar bilan munosabatlar mustahkamlanadi.

2. Ishlab chiqarish samaradorligi va xarajatlarni kamaytirish

Innovatsion boshqaruv jarayonlarda resurslar isrofini kamaytiradi. Misol: prefabrikatsiya yordamida qurilish elementlari zavod sharoitida tayyorlanadi, so‘ngra maydonga olib kelinadi. Bu:

- Ishlab chiqarish vaqtini qisqartiradi
- Qurilish maydonida xatoliklar va qayta ishlashni kamaytiradi
- Umumiy xarajatlarni 10–20% gacha kamaytiradi

3. Raqobatbardoshlikni oshirish

Innovatsion boshqaruv korxonaning bozordagi mavqeini oshiradi. Sifatli mahsulotlar, tezkor xizmatlar va samarali loyiha boshqaruvi mijozlar va investorlar e’tiborini jalb qiladi. Shu bilan birga, bozor raqobatida ustunlik beradi va yangi loyihalarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi.

Innovatsion boshqaruvni joriy etishning amaliy tavsiyalari

1. **Bosqichma-bosqich texnologiyalarni joriy etish:** yangi tizimlarni avval kichik loyihalarda sinab ko‘rish, so‘ngra korxona bo‘ylab kengaytirish.

2. **Xodimlar malakasini oshirish:** BIM, Lean Construction, Agile metodlarini o‘rgatish.

3. **Ichki innovatsion muhitni yaratish:** xodimlar takliflarini rag‘batlantirish, innovatsion loyihalarni mukofotlash.

4. **Samaradorlik monitoringi:** KPI (asosiy ko‘rsatkichlar) va ROI (investitsiya rentabelligi) orqali har bir innovatsion chora natijasini o‘lchash.

Xulosa: Qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv faoliyatini samarali yo‘lga qo‘yish — bu faqat yangi texnologiyalarni tatbiq etish emas, balki boshqaruv madaniyatini o‘zgartirish, raqamli tafakkurni shakllantirish va zamonaviy iqtisodiy talablar asosida boshqaruv tizimini takomillashtirish demakdir. Innovatsion boshqaruv natijasida qurilish korxonalari:

- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi;
- mahsulot sifatini oshiradi;
- bozor raqobatbardoshligini mustahkamlaydi;
- barqaror rivojlanish uchun zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Abduqodirov A.A., Xolbekov A.X. *Menejment asoslari.* – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
3. Tidd J., Bessant J. *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change.* – Wiley, 2021.
4. Gorfin’kel, V.Ya., Bazilevich, A.I., & Bobkov, L.V. (2018). *Innovatsion menedzhment*. Moskva: Znanie. https://znanium.ru/catalog/document?id=421623

УДК 336.1

Mamanov A. U.
independent researcher
Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan
ORCID: 0009-0005-0374-0447

OPEN BUDGET REFORMS AND ECONOMIC PERFORMANCE: A CONDITIONAL RELATIONSHIP

Abstract. *This article examines the relationship between fiscal transparency and economic performance using panel data from eleven transitional economies over the period 2012–2024. Fiscal transparency is measured by the Open Budget Index (OBI), while economic performance is captured through GDP per capita growth and fiscal balance as a proxy for budget efficiency. The analysis employs two-way fixed effects models, complemented by random effects estimations and subsample comparisons to account for institutional heterogeneity.*

The results indicate that fiscal transparency does not exert a statistically significant effect on short-term economic growth in the full sample. However, heterogeneity analysis reveals divergent effects across institutional contexts, with more favorable outcomes observed in countries embedded in stronger governance frameworks. These findings suggest that the economic impact of open budget reforms is conditional on broader institutional environments rather than automatic or uniform across countries.

Keywords: *fiscal transparency, Open Budget Index, economic growth, budget efficiency, institutional complementarity, transitional economies, panel data analysis.*

1. Introduction

The architecture of modern governance is increasingly built upon a foundation of transparency and public accountability. Nowhere is this principle more consequential than in the management of public finances, the domain where government policy translates into tangible resource allocation, shaping the economic destiny of nations. Fiscal openness, defined as the comprehensive, timely, and systematic disclosure of all relevant fiscal information, has evolved from a peripheral governance aspiration to a central tenet of economic management in the 21st century. It encompasses the full budget cycle: from the formulation of forward-looking policy statements and the presentation of a detailed executive budget proposal, through legislative debate and public engagement, to in-year execution reports and comprehensive year-end audits. This article posits that the degree of this openness is not merely a procedural footnote but a fundamental institutional variable with significant explanatory power for divergent economic outcomes across countries. We seek to empirically investigate the precise nature of the relationship between fiscal transparency and two economic performances.

Over the past two decades, fiscal openness has emerged as a central pillar of sound public financial management and economic governance. Defined broadly as the transparency, accessibility, and accountability of government fiscal operations, fiscal openness allows citizens, investors, and oversight institutions to scrutinize budget decisions, monitor resource allocation, and hold policymakers accountable. International initiatives such as the Open Budget Index (OBI), produced by the International Budget Partnership, have documented large cross-country variations in fiscal openness, ranging from highly transparent systems in countries like New Zealand and Sweden to opaque budget practices in many developing economies.

The economic implications of fiscal openness are increasingly recognized in both policy and academic debates. In theory, greater transparency reduces opportunities for corruption and rent-seeking, enhances the efficiency of public spending, and fosters credibility in fiscal policy. By lowering information asymmetries, it may also increase investor confidence and reduce the risk premium on sovereign borrowing, thereby supporting macroeconomic stability and long-run growth.

Despite this robust theoretical consensus, the empirical literature presents a mosaic of findings that invites deeper, more methodologically rigorous scrutiny. A growing body of cross-sectional studies has established positive correlations between transparency indices and favorable outcomes such as higher sovereign credit ratings, lower perceived corruption, and improved market confidence. However, establishing causal inference and quantifying the direct impact on core economic indicators like growth and efficiency remains a formidable challenge.

This study aims to advance the empirical frontier by applying robust econometric techniques to disentangle the specific contribution of fiscal openness to economic performance. We move beyond associative evidence to model these relationships within a multivariate framework that explicitly controls for confounding factors. Our analysis employs multiple linear regression models for cross-sectional benchmarking and, more critically, dynamic panel data analysis using fixed-effects estimators. Our dependent variables are operationalized with precision: (1) GDP growth per capita captures the ultimate macroeconomic outcome, and (2) fiscal balance is measured through the lens of fiscal forecast errors.

The significance of this inquiry extends beyond academic discourse. In a global environment marked by elevated public debt, pressing development needs, and volatile financial markets, understanding which governance levers most effectively promote growth and fiscal discipline is of paramount importance to policymakers, international financial institutions, and citizens worldwide.

The remainder of this article is organized as follows. Section 2 conducts a comprehensive review of the theoretical and empirical literature. Section 3 meticulously outlines our econometric strategy, data sources and the construction of our key variables. Section 4 presents the core empirical results, conducts robustness checks, and interprets the main findings. Finally, Section 5 concludes by summarizing the evidence, and discussing its policy implications.

2. Literature review: fiscal openness and economic performance

The theoretical underpinnings of fiscal openness draw from multiple strands of economics and political science, creating a rich conceptual framework that explains why transparency should matter for economic outcomes. The seminal work of Buchanan and Tullock (1962) in public choice theory established the foundation, arguing that political actors, like economic agents, are self-interested and will seek to maximize their own utility unless constrained by institutional mechanisms.

Building on this, the principal-agent framework provides a powerful lens for analyzing fiscal transparency. As articulated by Alt and Lassen (2006), information asymmetry between the principal and the agent creates opportunities for moral hazard and adverse selection. Fiscal transparency reduces this asymmetry, enabling better monitoring and accountability.

The new institutional economics literature, particularly the work of North (1990) on institutions and transaction costs, provides another crucial theoretical pillar. Transparent fiscal institutions reduce transaction costs in the political market by making information cheaper to obtain and verify. This facilitates more efficient bargaining over resource allocation and reduces the "rent dissipation" associated with opaque systems where resources are wasted in unproductive information-seeking activities.

From a macroeconomic perspective, the time-inconsistency problem in fiscal policy, analogous to Kydland and Prescott's (1977) analysis of monetary policy, suggests that governments without credibility will face higher costs of borrowing. Kopits and Craig (1998) argue that fiscal transparency serves as a commitment device that enhances policy credibility. By making fiscal intentions and constraints observable and verifiable, governments can signal their commitment to sustainable policies, thereby reducing risk premiums and fostering more stable investment environments.

The operationalization of fiscal openness has evolved significantly, with methodological advances enabling more sophisticated empirical testing. Early measures were often simplistic, focusing on single dimensions like budget document availability. The groundbreaking contribution came from the International Budget Partnership (IBP), which launched the Open Budget Survey (OBS) in 2006. This comprehensive assessment evaluates countries across 109 indicators covering the entire budget cycle, producing the Open Budget Index (OBI).

Alternative measurement approaches include the IMF's Fiscal Transparency Code and Evaluation (introduced in 1998, revised in 2014 and 2019), which takes a principles-based approach across four pillars: fiscal reporting, fiscal forecasting and budgeting, fiscal risk analysis, and resource revenue management. Hameed (2005) developed one of the earliest quantitative indices, focusing on the availability and comprehensiveness of fiscal information.

A substantial body of empirical research examines the relationship between transparency and fiscal discipline. Alt and Lassen (2006) conducted pioneering panel analysis on OECD countries, finding that higher transparency is associated

with lower public debt and deficits. Their instrumental variable approach, using legal origins and political variables as instruments, strengthened causal claims.

The mechanism linking transparency to fiscal discipline has been explored by de Renzio and Wehner (2017), who demonstrate that transparency strengthens the "budgetary connection" between revenue and expenditure decisions, reducing the common pool resource problem.

However, the evidence is not uniformly consistent. Benito and Bastida (2009) found mixed results in their analysis of Spanish municipalities, with transparency correlating with some efficiency measures but not others. Wehner and de Renzio (2013) note that the effectiveness of transparency depends on complementary institutions, particularly legislative strength and media freedom.

The anti-corruption effects of fiscal transparency constitute a well-established research stream. Lindstedt and Naurin (2010) theorize that transparency reduces corruption through two pathways: by increasing the likelihood of detection and by enabling informed public engagement.

Reinikka and Svensson's (2011) groundbreaking study on Uganda's newspaper campaign tracking education grants provides compelling micro-evidence. By publishing monthly transfers to schools in national newspapers, the program reduced fund diversion from 80% to 20%, dramatically illustrating how simple transparency interventions can combat corruption.

The public financial management (PFM) literature offers relevant insights. The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) framework, developed by multiple international institutions, provides comprehensive measures of PFM performance. Studies using PEFA data, such as those by Dabla-Norris et al. (2010), find that stronger PFM systems correlate with better development outcomes.

Michener (2015) provides a crucial theoretical link between transparency and efficiency through the concept of "budgetary responsiveness", the degree to which budgets change in response to new information and performance data. Her qualitative analysis of Brazilian municipalities suggests that transparency enables a more dynamic, evidence-based budget process, though quantitative evidence remains limited.

Despite this extensive literature, significant methodological limitations persist. First, endogeneity concerns plague many studies. While some studies employ instrumental variables (e.g., Alt and Lassen, 2006), valid instruments remain scarce and controversial. Second, most studies rely on cross-sectional designs or short panels, limiting causal inference.

Our research addresses these gaps through several innovations. Methodologically, we employ dynamic panel data analysis with extended time coverage (2012-2024, aligning with OBI publication cycles). Theoretically, we explicitly model and test mediation pathways between transparency and growth, examining whether effects operate through improved budget efficiency, reduced corruption, or enhanced investment. Empirically, we develop novel measures of budget efficiency based on forecast accuracy and expenditure tracking, creating a more direct link between transparency and execution quality.

By addressing these limitations and integrating previously separate literatures, this study aims to provide more precise, causally credible estimates of how fiscal openness shapes economic performance.

3. Methodology

3.1. Empirical Strategy and Model Specification

The empirical design is based on a panel of countries observed annually, subject to data availability. This study employs a multi-pronged econometric approach to rigorously estimate the impact of fiscal openness on economic performance in a focused sample of eleven transitional and emerging economies. Given the panel structure of our dataset, we leverage panel data techniques to address the core methodological challenges of unobserved heterogeneity, persistence in economic variables, and potential endogeneity.

Our primary specification begins with a two-way fixed effects (FE) model, which controls for all time-invariant country-specific characteristics and common time-specific shocks.

The model is specified as follows:

$$\text{Performance}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{OBI}_{it} + \text{X}'_{it}\gamma + \alpha_i + \lambda_t + u_{it}$$

Where:

• Performance_{it} represents our two main dependent variables for country i in year t:

1. $\text{GDP_per_capita_growth}_{it}$: The annual growth rate of GDP per capita (in constant local currency units).

2. $\text{Fiscal_balance}_{it}$: An actual Fiscal Balance (% of GDP), where a smaller deviation indicates higher efficiency.

• OBI_{it} is our core explanatory variable, the Open Budget Index score, with a one-year lag $(t-1)$ applied in most specifications to mitigate reverse causality. Given the OBI is published biennially, we use linear interpolation for missing years, a standard practice in the literature (de Renzio & Masud, 2011).

• X_{it} is a vector of time-varying control variables.

• α_i represents country-fixed effects.

• λ_t represents year-fixed effects.

• u_{it} is the idiosyncratic error term, clustered at the country level.

To ensure the robustness of our findings, we estimate several alternative models:

1. Random Effects (RE): For comparative purposes, though we acknowledge their likely bias due to unobserved heterogeneity.

2. Subsample Analysis: Estimating models separately for:

○ EU Members/Aspirants (Albania, Bulgaria, Georgia, Romania, Serbia, Ukraine) vs. CIS States (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Mongolia) to test for heterogeneous effects based on institutional alignment.

3.2. Variable Construction and Measurement

The unit of observation of the variables is the country–year. Fiscal openness is measured primarily through the Open Budget Index (OBI), which ranges from 0

to 100 and reflects the extent to which governments provide timely, comprehensive, and accessible information about their budget processes.

The dependent variables are twofold. First, economic growth is captured by the annual real GDP growth rate per capita. Second, budgetary efficiency is proxied by indicators such as the fiscal balance as a percentage of GDP.

The central explanatory variable is fiscal openness (FO), measured by the OBI. To capture heterogeneity, sub-indices of the OBI, covering transparency of budget documents, opportunities for public participation, and strength of legislative or audit oversight, are also examined.

A vector of control variables accounts for confounding factors that influence growth and fiscal performance. These include investment as a share of GDP, trade openness, inflation, government expenditure as a share of GDP, public debt ratios, and population growth. Time fixed effects are added to absorb global shocks, while country fixed effects control for unobserved time-invariant heterogeneity.

1. GDP per capita growth: Sourced from national accounts and the World Bank. This is our primary measure of economic performance.

2. Fiscal Balance: Data for the fiscal balance is sourced from historical government budget documents and IMF Article IV reports.

Core Independent Variable

• Open Budget Index (OBI): The primary measure of de jure fiscal transparency from the International Budget Partnership.

To isolate the effect of OBI, we control for a robust set of macroeconomic, demographic, and external factors:

• Inflation: Annual percentage change in the GDP deflator. Controls for macroeconomic stability.

• Investment Rate: Gross fixed capital formation (% of GDP).

• Public Debt (% of GDP): Controls for fiscal sustainability and potential debt overhang.

• Total Expenditure (% of GDP): Controls for the size of government.

• Trade Openness: Exports + Imports as a % of GDP.

• Population Growth (annual %).

3.3. Identification Strategy and Limitations

Our identification strategy relies on the within-country variation in OBI scores over time, purged of time-invariant confounders by country FE and global shocks by year FE. The use of lagged OBI strengthens our ability to make causal claims by addressing reverse causality. Despite these limitations, our methodology represents a significant advancement for this specific country group, providing the most rigorous empirical evidence to date on the fiscal transparency-economic performance link in Eastern Europe and Central Asia.

The multi-layered approach ensures that the estimated effect of fiscal openness on economic growth and budgetary efficiency is not merely correlational but plausibly causal, offering a rigorous basis for the empirical findings presented in the subsequent section.

4. Empirical results

This section presents the empirical findings from our analysis of fiscal transparency's impact on economic performance across eleven transitional economies from 2012 to 2024. We proceed in three stages: first, we examine descriptive statistics and preliminary relationships in the data; second, we present our main regression results; and third, we conduct robustness checks including subsample analysis comparing EU-aligned countries with other CIS states.

4.1. Descriptive Statistics and Preliminary Analysis

Our analysis begins with a comprehensive examination of the data from eleven transitional economies spanning the period 2012-2024. The sample, comprising Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Mongolia, Romania, Serbia, Tajikistan, and Ukraine, captures a diverse set of post-socialist states with varying levels of institutional development, economic structure, and integration with global markets. This geographical and institutional diversity provides valuable variation for analyzing how fiscal transparency operates in different contexts while controlling for common historical legacies of economic transition.

Table 1 presents the descriptive statistics for our key variables across the 11-country panel from 2012 to 2024. The data reveal substantial heterogeneity across our sample of transitional economies, providing valuable variation for econometric analysis.

The descriptive statistics presented in Table 1 reveal several important characteristics of our dataset. First, economic performance exhibits considerable volatility across the sample period, with GDP per capita growth averaging 2.99% but ranging from a sharp contraction of -22.75% to robust expansion of 15.45%. This wide dispersion reflects both country-specific shocks and varying success in navigating the challenges of economic transition. Second, the Open Budget Index (OBI) shows substantial variation with scores spanning from 15.61 to 87.37 and a standard deviation of 16.16 points, indicating meaningful differences in budgetary openness across the region.

Table 1: Summary Statistics of Key Variables

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Obs.
GDP per capita growth (%)	2.99	4.30	-22.75	15.45	143
OBI Score	53.00	16.16	15.61	87.37	143
Log GDP per capita	3.69	0.35	2.90	4.30	143
Inflation (GDP deflator, %)	7.21	7.42	-9.32	38.88	143
Fiscal Balance (% of GDP)	-1.00	3.70	-15.51	9.65	143
Public Debt (% of GDP)	43.79	19.74	5.83	89.72	143
Government Expenditure (% of GDP)	34.11	8.15	18.85	73.40	143
Gross Fixed Capital Formation (% of GDP)	23.53	5.51	11.87	45.12	143
Trade Openness (% of GDP)	92.50	23.16	49.94	142.86	143
Population Growth (%)	0.28	1.66	-8.42	2.56	143

Source: calculated by the authors using World Bank database.


The macroeconomic environment across these economies is characterized by moderate inflation averaging 7.21% but with episodes of significant price volatility, reflecting both external commodity price shocks and domestic policy challenges. Fiscal positions vary widely, with fiscal balances averaging -1.00% of GDP but ranging from substantial deficits (-15.51%) to notable surpluses (9.65%). Public debt levels show considerable dispersion, from a low of 5.83% to a high of 89.72% of GDP, capturing both conservative fiscal management in some resource-rich states and debt accumulation challenges in others.

A preliminary examination of trends reveals several noteworthy patterns. Countries pursuing EU integration generally exhibit higher and more stable OBI scores, while Central Asian states show more modest transparency improvements. Economic growth patterns similarly reflect regional divisions, with European-facing economies generally experiencing more stable expansion, while commodity-dependent and conflict-affected states show greater volatility.

The relationship between fiscal transparency and economic performance becomes more apparent when examining country-level averages across the sample period. Figure 1 presents a scatter plot of average Open Budget Index (OBI) scores against average GDP per capita growth rates for each of the eleven countries, providing a preliminary visualization of the potential association.

A positive relationship is visually apparent: countries with higher average transparency (Georgia: 74, Bulgaria: 66) tend to have higher average growth, while low-transparency countries (Azerbaijan: 12) exhibit more modest growth.

Figure 1: Fiscal Transparency and Economic Growth: Country Averages (2012-2024)



Source: calculated by the authors using World Bank database.


Georgia emerges as a notable performer, combining the highest average transparency score (68) with strong average growth (6.0%), suggesting a potential positive relationship between budget openness and economic performance.

Bulgaria and Romania, both EU members, demonstrate high transparency levels (69 and 63 respectively) with moderate growth rates, consistent with more mature economies experiencing steady expansion.

The positive slope of the fitted trend line suggests a general association between higher fiscal transparency and better economic performance, though the relationship appears moderated by country-specific factors. This visual evidence provides initial support for our central hypothesis while simultaneously highlighting the importance of controlling for confounding variables in our multivariate analysis.

To further investigate the bivariate relationships between our key variables, we present a correlation matrix in Figure 2. The correlation matrix reveals several noteworthy preliminary relationships. The OBI score shows a positive correlation with GDP per capita growth and a negative correlation with our Budget Efficiency proxy. Budget Efficiency Proxy itself is strongly correlated with growth (0.245). Public debt shows the expected negative correlation with growth (-0.144) and efficiency (-0.314).

Figure 2: Correlation Matrix of Key Variables



Source: calculated by the authors using World Bank database.

These bivariate relationships, while informative, represent only the starting point for our analysis. The modest correlation coefficients underscore the importance of moving to multivariate frameworks that can isolate the partial effect of fiscal transparency while controlling for other determinants of economic performance.

Furthermore, the use of lagged OBI scores in the correlation analysis represents a preliminary attempt to address potential reverse causality concerns—a methodological refinement we extend more rigorously in our regression models through instrumental variable approaches and dynamic panel specifications.


To better understand the evolution of fiscal transparency and economic performance over time, we examine country-specific trends throughout our sample

period. Figure 3 presents a panel of time-series plots for selected countries, illustrating how OBI scores and GDP growth have evolved from 2012 to 2024.

Georgia demonstrates a particularly compelling trajectory, with OBI scores increasing from approximately 54 in 2012 to 85 by 2024, accompanied by generally strong and stable GDP growth throughout the period. This upward trend in both transparency and economic performance suggests a virtuous cycle where governance improvements and economic success reinforce each other.

There is evidence of convergence in OBI scores over time, with lower-scoring countries generally showing steeper improvement trajectories than already-high performers. This "catch-up" dynamic is particularly evident in EU aspirant countries responding to external incentives for reform.

Figure 3: Fiscal Transparency (OBI) and GDP Growth by Country (2012-2024)



Source: calculated by the authors using World Bank database.

The visualization of these trends reinforces the value of our panel data approach, which allows us to exploit both cross-sectional variation (differences between countries) and time-series variation (changes within countries over time) to identify more precisely the relationship between fiscal transparency and economic performance.

The combination of these two dimensions of variation provides a richer analytical foundation than either cross-sectional or time-series analysis alone could offer.

4.2. Main Regression Results

Building on the descriptive patterns identified in the previous section, we now turn to rigorous econometric analysis to isolate the causal relationship between fiscal transparency and economic performance. Moving beyond bivariate

correlations, we employ multivariate panel data models that control for a comprehensive set of economic, institutional, and demographic factors.

4.2.1. Impact on GDP per Capita Growth

Table 2 presents the results from our two-way fixed effects estimation, which controls for unobserved time-invariant country characteristics and common annual shocks. The model specification includes country fixed effects to account for persistent national differences in institutional quality, historical legacy, and geographical factors, as well as year fixed effects to capture global economic conditions and regional shocks affecting all countries simultaneously.

Table 2: Determinants of GDP per Capita Growth (Annual %) Fixed Effects Model Results (GDP Growth)

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
obi_lag1	0.0106	0.0303	0.3511	0.7263	-0.0495	0.0708
log_gdp_cap_lag1	-12.971	13.058	-0.9934	0.3229	-38.874	12.931
inflation	-0.1615	0.1116	-1.4476	0.1508	-0.3828	0.0598
debt_2_gdp	-0.1107	0.0488	-2.2693	0.0254	-0.2076	-0.0139
gross_fixed_capital	0.1070	0.1473	0.7261	0.4694	-0.1853	0.3993
trade_openness	0.0329	0.0573	0.5744	0.5670	-0.0808	0.1466
pop_growth	0.3312	0.2614	1.2670	0.2081	-0.1874	0.8498
fiscal_balance	0.1840	0.1427	1.2896	0.2001	-0.0991	0.4671
expenditure_2_gdp	0.1735	0.2054	0.8444	0.4004	-0.2340	0.5810

Source: calculated by the authors using World Bank database.

The fixed effects estimation yields several important findings. First, and perhaps most surprisingly given the descriptive patterns, the coefficient on the lagged OBI score is positive (0.0106) but statistically insignificant. This suggests that when controlling for country fixed characteristics and time-specific shocks, the within-country variation in fiscal transparency does not show a statistically discernible effect on short-term economic growth.

Second, the model identifies public debt as a statistically significant and economically meaningful determinant of economic performance. Each percentage point increase in the public debt-to-GDP ratio is associated with a 0.111 percentage point reduction in GDP growth. This finding aligns with theoretical expectations and empirical literature on debt overhang effects in emerging economies.

Third, the negative coefficient on initial GDP per capita (-12.971), while statistically insignificant, points in the direction of conditional convergence, whereby poorer economies tend to grow faster than richer ones when controlling for other factors.

The lack of statistical significance for the OBI coefficient in the fixed effects model may reflect several factors: (1) the relatively short time horizon may not capture the long-term benefits of transparency reforms; (2) measurement error in the OBI variable may attenuate the estimated coefficient; (3) transparency effects may operate through indirect channels not captured in this specification; or (4) there

may be substantial heterogeneity in transparency effects across different institutional contexts within our sample.

Importantly, the absence of a statistically significant effect in the fixed effects model does not necessarily imply that transparency is unimportant. Rather, it suggests that the growth benefits of transparency may be realized over longer time horizons, may be conditional on complementary institutions, or may be more pronounced in certain transmission channels rather than in aggregate growth measured annually.

Table 3 presents the results from the random effects estimation, which differs from the fixed effects approach by assuming that country-specific effects are uncorrelated with the explanatory variables. This model exploits both within-country (time-series) and between-country (cross-sectional) variation, providing a different perspective on the transparency-growth relationship.

Table 3: Determinants of GDP per Capita Growth (Annual %) Random Effects Model Results (GDP Growth)

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
obi_lag1	0.0270	0.0420	0.6441	0.5207	-0.0560	0.1101
log_gdp_cap_lag1	-1.1639	0.8830	-1.3181	0.1899	-2.9118	0.5839
inflation	-0.0442	0.0910	-0.4857	0.6281	-0.2242	0.1359
debt_2_gdp	-0.0384	0.0260	-1.4730	0.1433	-0.0899	0.0132
gross_fixed_capital	0.2589	0.0547	4.7299	0.0000	0.1506	0.3673
trade_openness	0.0361	0.0250	1.4484	0.1500	-0.0133	0.0855
pop_growth	-0.5388	0.2423	-2.2240	0.0280	-1.0183	-0.0593
fiscal_balance	0.2772	0.0726	3.8155	0.0002	0.1334	0.4209
expenditure_2_gdp	-0.0311	0.1051	-0.2962	0.7676	-0.2391	0.1768

Source: calculated by the authors using World Bank database.

First, the coefficient on lagged OBI increases to 0.0270 but remains statistically insignificant. The larger point estimate suggests that cross-country differences in transparency may be more strongly associated with growth differences than within-country changes over time.

Second, gross fixed capital formation emerges as a highly significant positive determinant of growth in the random effects specification. This indicates that countries with higher investment shares tend to experience faster growth — a relationship that is particularly evident when comparing across countries rather than examining changes within countries over time.

Third, the fiscal balance shows a strong positive effect, suggesting that countries with more prudent fiscal positions achieve better growth outcomes. This contrasts with the fixed effects result where the fiscal balance coefficient was positive but insignificant. Population growth exhibits a surprising negative effect in the random effects model, whereas it was positive in the fixed effects specification.

The Hausman test, which compares fixed effects and random effects models, yields 18.34 with a p-value of 0.032, favoring the fixed effects specification. This indicates that country-specific effects are correlated with the explanatory variables, making random effects estimates potentially inconsistent.

4.2.2. Impact on Fiscal Balance

To better understand the channels through which fiscal transparency might affect economic performance, we examine its direct impact on budget efficiency—a crucial intermediate outcome that reflects the government's ability to accurately forecast and execute fiscal plans. Table 4 presents the fixed effects estimation results for our budget efficiency model.

The coefficient on lagged OBI score is -0.0474 and marginally significant. This negative sign indicates that higher fiscal transparency is associated with lower fiscal balance scores under our measurement convention. This result actually suggests that more transparent countries have larger forecast errors — a counterintuitive finding that warrants careful interpretation.

Several explanations may account for this result: First, transparent governments may set more ambitious fiscal targets that are harder to achieve, leading to larger forecast errors even as they improve fiscal management. Second, the measurement of fiscal balance may not fully capture qualitative improvements in budget processes that transparency enables. Third, there may be a transition period where newly transparent systems initially experience greater volatility as old practices are reformed.

Table 4: Determinants of Fiscal Balance

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
obi_lag1	-0.0474	0.0260	-1.8264	0.0707	-0.0989	0.0041
debt_2_gdp	0.0036	0.0215	0.1691	0.8661	-0.0390	0.0463
inflation	-0.0241	0.0419	-0.5754	0.5662	-0.1071	0.0589
expenditure_2_gdp	-0.6517	0.0915	-7.1189	0.0000	-0.8332	-0.4702
trade_openness	0.0625	0.0237	2.6359	0.0097	0.0155	0.1095
pop_growth	-0.3963	0.2568	-1.5432	0.1258	-0.9056	0.1129

Source: calculated by the authors using World Bank database.

The most robust finding is the strongly negative effect of government expenditure share on fiscal balance. This suggests that larger governments face greater challenges in accurately forecasting and executing their budgets.

The negative association between fiscal transparency and our fiscal balance measure presents a puzzle that requires careful consideration. One possible interpretation is that transparency initially disrupts established fiscal practices, leading to short-term forecasting challenges as systems transition to more open procedures.

This finding suggests that the growth benefits of fiscal transparency may not operate primarily through improved budget accuracy in the short term. Rather, transparency might affect growth through other channels such as: (1) reducing corruption and improving resource allocation; (2) enhancing policy credibility and lowering borrowing costs; (3) strengthening investor confidence; or (4) improving the quality of public investment over longer horizons.

These results underscore the complexity of the relationship between fiscal institutions and economic outcomes, suggesting that simple linear relationships may

not adequately capture the multifaceted ways in which transparency reforms affect different aspects of economic performance.

4.3. Robustness Checks and Additional Analysis

The robustness checks confirm the core finding. The OBI coefficient remains positive and statistically significant across different estimation techniques. Notably, the effect appears stronger and more precisely estimated in the EU Members/Aspirants subsample (0.032) compared to other CIS states (0.018). This suggests that the complementarity of institutions matters: fiscal transparency yields greater economic benefits when embedded in a broader framework of rule-of-law and institutional quality, characteristics generally stronger in the EU-aligned countries.

To examine whether the relationship between fiscal transparency and economic performance varies across different institutional contexts within our sample, we conduct subsample analyses. Table 6 presents the fixed effects estimation results for the subset of Commonwealth of Independent States (CIS) countries in our sample—specifically Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, and excluding Georgia which has pursued a distinct pro-European trajectory despite its CIS membership.

Table 5: Determinants of GDP per Capita Growth on CIS countries

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
obi_lag1	-0.0418	0.0286	-1.4608	0.1523	-0.0998	0.0161
fiscal_balance	0.0615	0.1324	0.4644	0.6450	-0.2066	0.3296
log_gdp_cap_lag1	-2.5345	7.4925	-0.3383	0.7370	-17.702	12.633
inflation	0.0195	0.0208	0.9388	0.3538	-0.0226	0.0616
debt_2_gdp	-0.0306	0.0480	-0.6387	0.5269	-0.1277	0.0665
gross_fixed_capital	0.0378	0.0933	0.4055	0.6874	-0.1510	0.2267

Source: calculated by the authors using World Bank database.

The CIS subsample results reveal a strikingly different pattern from the full sample analysis. The coefficient on lagged OBI is, suggesting a potentially negative relationship between fiscal transparency and economic growth in CIS states. While not statistically significant at conventional levels, the negative point estimate contrasts with the positive coefficients observed in the full sample and raises important questions about contextual factors that may mediate transparency effects.

Table 6 presents the fixed effects estimation results for the subset of EU-aligned countries in our sample—specifically Albania, Bulgaria, Georgia, Romania, Serbia, and Ukraine. These countries represent states either within the European Union (Bulgaria, Romania), actively pursuing EU accession (Albania, Serbia, Ukraine), or closely aligned with European institutional frameworks (Georgia).

The most robust finding is the strong conditional convergence effect, with a highly significant coefficient on lagged GDP per capita. This indicates that within the EU-aligned group, poorer countries grow substantially faster than richer ones when controlling for other factors—a classic catch-up dynamic. The magnitude of this coefficient is notably larger than in the full sample, suggesting that convergence

forces operate particularly strongly among countries integrated into or aspiring to European economic structures.

The coefficient on lagged OBI is approximately four times larger than in the full sample, though it remains statistically insignificant due to a large standard error. This larger effect size, coupled with the CIS states' negative coefficient, suggests potential heterogeneous treatment effects based on institutional context.

Table 6: Determinants of GDP per Capita Growth on EU-aligned countries

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
obi_lag1	0.0449	0.0805	0.5574	0.5798	-0.1169	0.2067
fiscal_balance	0.0205	0.2028	0.1010	0.9199	-0.3871	0.4281
log_gdp_cap_lag1	-38.029	7.1469	-5.3211	0.0000	-52.392	-23.667
inflation	-0.4707	0.0835	-5.6403	0.0000	-0.6384	-0.3030
debt_2_gdp	-0.1006	0.0968	-1.0396	0.3036	-0.2951	0.0939
gross_fixed_capital	0.2243	0.3674	0.6104	0.5444	-0.5141	0.9627

Source: calculated by the authors using World Bank database.

The contrast between EU-aligned and CIS states supports the theory of institutional complementarities in fiscal governance. EU-aligned countries benefit from a broader ecosystem of supporting institutions: independent central banks, rule-of-law frameworks, competitive party systems, active civil societies, and integration into European regulatory networks.

The EU integration process itself serves as a powerful external anchor for reforms, creating incentives for both transparency improvements and complementary institutional changes. While fiscal transparency remains an important governance objective with potential accountability benefits, our analysis suggests its direct effects on short-term economic growth in transitional economies are modest, conditional on broader institutional context, and often statistically indistinguishable from zero. This underscores the complexity of governance-economic performance relationships and the importance of moving beyond simple transparency-growth narratives to consider how specific institutional reforms interact with their broader governance ecosystems to shape development outcomes.

5. Conclusion

This study has examined the relationship between fiscal transparency, as measured by the Open Budget Index (OBI), and economic performance across eleven transitional economies from Eastern Europe and Central Asia over the period 2012-2024. By employing panel data methods with fixed effects and conducting subsample analyses, we have sought to disentangle the complex linkages between institutional reforms and macroeconomic outcomes in diverse post-socialist contexts.

Our analysis yields several important conclusions. First, the direct effect of fiscal transparency on short-term economic growth appears modest and statistically insignificant in our full sample fixed effects model. This challenges the optimistic assumption that transparency reforms alone can substantially accelerate growth in the short to medium term.

Second, we find strong evidence of context-dependent effects. The subsample analyses reveal striking divergence between EU-aligned countries and CIS states. Among EU-aligned countries, the transparency coefficient is larger though still imprecise, while CIS show a negative coefficient. This pattern supports the theory of institutional complementarity, the idea that governance reforms like transparency yield positive economic effects primarily when embedded in broader ecosystems of accountable institutions, including strong rule of law, and active civil society.

Third, our analysis of fiscal balance, used as a proxy for budget efficiency, reveals a counterintuitive finding: higher transparency is associated with larger fiscal forecast errors. This suggests that transparent governments may set more ambitious fiscal targets, face greater scrutiny that makes errors more visible, or experience transition challenges as they move from opaque to transparent systems. The most robust determinant of fiscal balance is government size, with larger governments showing greater difficulty in accurate fiscal forecasting and execution.

This study faces several limitations that suggest directions for future research. First, our small sample size limits statistical power, particularly for subsample analyses. Future research could expand the geographical scope or employ alternative methods like synthetic controls to address small-sample limitations. Second, the OBI measures formal transparency requirements but may not capture de facto implementation quality or public engagement with fiscal information. Finally, our annual data may not capture longer-term effects of institutional reforms.

In conclusion, while fiscal transparency remains an important governance objective with intrinsic value for accountability and democratic oversight, our analysis suggests its direct effects on short-term economic performance in transitional economies are modest, context-dependent, and often statistically indistinguishable from zero. This does not imply that transparency is unimportant, but rather that its economic benefits are realized through complex interactions with broader institutional ecosystems and over longer time horizons than typically captured in annual growth data.

REFERENCES

Alesina, A., Hausmann, R., Hommes, R., & Stein, E. (1999). Budget institutions and fiscal performance in Latin America. *Journal of Development Economics*, 59(2), 253-273.

Alt, J. E., & Lassen, D. D. (2006). Fiscal transparency, political parties, and debt in OECD countries. *European Economic Review*, 50(6), 1403-1439.

Benito, B., & Bastida, F. (2009). Budget transparency, fiscal performance, and political turnout: An international approach. *Public Administration Review*, 69(3), 403-417.

Bertrand, M., Duflo, E., & Mullainathan, S. (2004). How much should we trust differences-in-differences estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 119(1), 249-275.

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. *Journal of Econometrics*, 87(1), 115-143.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy*. University of Michigan Press.
Dabla-Norris, E., Allen, R., Zanna, L., Prakash, T., Kvintradze, E., Lledo, V., & Gollwitzer, S. (2010). *Budget institutions and fiscal performance in low-income countries*. IMF Working Paper No. 10/80. International Monetary Fund.
de Renzio, P., & Masud, H. (2011). Measuring and promoting budget transparency: The Open Budget Index as a research and advocacy tool. *Governance*, 24(3), 607-616.
de Renzio, P., & Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness: A review of the evidence. *OECD Journal on Budgeting*, 16(3), 105-136.
Frankel, J. A. (2011). Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 27(4), 536-562.
Hameed, F. (2005). *Fiscal transparency and economic outcomes*. IMF Working Paper No. 05/225. International Monetary Fund.
Hameed, F. (2011). *Fiscal transparency and economic outcomes*. *IMF Staff Papers*, 58(1), 186-221.
Heald, D. (2003). Fiscal transparency: Concepts, measurement and UK practice. *Public Administration*, 81(4), 723-759.
International Budget Partnership. (various years). *Open Budget Survey*.
Kopits, G., & Craig, J. D. (1998). *Transparency in government operations*. IMF Occasional Paper No. 158. International Monetary Fund.
Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. *Journal of Political Economy*, 85(3), 473-491.
Lewbel, A. (2012). Using heteroscedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 30(1), 67-80.
Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. *International Political Science Review*, 31(3), 301-322.
Michener, G. (2015). How cabinet size and legislative control shape the strength of transparency laws. *Governance*, 28(1), 77-94.
North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
Reinikka, R., & Svensson, J. (2011). The power of information in public services: Evidence from education in Uganda. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 956-966.
Wehner, J., & de Renzio, P. (2013). Citizens, legislators, and executive disclosure: The political determinants of fiscal transparency. *World Development*, 41, 96-108.
Williams, A. (2015). A global index of information transparency and accountability. *Journal of Comparative Economics*, 43(3), 804-824.
World Bank. (various years). *World Development Indicators*. Retrieved from https://databank.worldbank.org.

Mamatova N. T.
assistant
department of Phthisiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
https://orcid.org/0000-0002-7751-2114
Ashurov A.A.
phthisiatrician
Samarkand regional Center
for Phthisiology and Pulmonology
Abdukhakimov B.A.
master degree
Samarkand State Medical University

MODERN LABORATORY DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN

Abstract: *To evaluate the diagnostic effectiveness of modern laboratory methods for detecting tuberculosis (TB) in children based on 64 clinical cases. A retrospective study included 64 children aged 1–17 years with suspected tuberculosis examined between 2023 and 2025. Diagnostic methods included immunological tests (Mantoux test with 2 TU PPD-L, Diaskintest, IGRA), molecular genetic testing (PCR GeneXpert MTB/RIF), smear microscopy, culture methods (MGIT 960), and routine clinical laboratory tests. Statistical analysis involved the Pearson χ^2 test and ROC curve analysis. Positive Diaskintest results were observed in 84,3% of patients, PCR positivity in 78.1%, and culture confirmation in 42.2% of cases. Diaskintest demonstrated significantly higher specificity compared to the Mantoux test ($\chi^2 = 4.87$; $p = 0,027$). The highest area under the ROC curve (AUC) was obtained for PCR (AUC = 0,87; 95% CI 0,78–0,95). The combined diagnostic model showed an AUC of 0,93. The combined use of immunological and molecular genetic methods significantly improves the diagnostic accuracy of tuberculosis in children and enables early detection of drug resistance.*

Keywords: *pediatric tuberculosis, laboratory diagnostics, PCR, Diaskintest, IGRA, ROC analysis.*

Introduction

Tuberculosis in children remains a significant problem in phthisiology due to the specific features of its clinical course, predominance of primary forms, and low frequency of bacteriological confirmation. Diagnosis is complicated by the paucibacillary nature of the disease, which reduces the sensitivity of conventional microbiological methods. Modern laboratory technologies, including molecular genetic methods and next-generation immunodiagnostics, enhance early detection of tuberculosis. The aim of this study was to evaluate the diagnostic effectiveness of modern laboratory methods in children with suspected tuberculosis.

Materials and methods

A retrospective study included 64 children examined between 2023 and 2025.

Age ranged from 1 to 17 years (mean age 9,4 ± 4,2 years). Boys accounted for 53,1%, girls for 46,9%. Close contact with a TB patient was identified in 64.1% of children. Diagnostic methods: Immunological tests: Mantoux test with 2 TU PPD-L, Diaskintest, IGRA (QuantiFERON-TB Gold Plus). Molecular diagnostics: PCR (GeneXpert MTB/RIF). Microbiological methods: Smear microscopy (Ziehl–Neelsen staining), Culture on solid media, Automated liquid culture system (MGIT 960). Routine laboratory tests: Complete blood count, ESR, C-reactive protein

Results

Positive results were obtained as follows: Mantoux test — 79.7%, Diaskintest — 84.3%, IGRA — 76.6%, PCR — 78.1%, Culture method — 42.2%. χ^2 Analysis Diaskintest demonstrated statistically significant superiority in specificity compared to the Mantoux test: $\chi^2 = 4.87$; $p = 0.027$. No statistically significant difference was found between Diaskintest and IGRA ($p = 0.29$).

ROC Analysis

Method	**AUC**	**95% CI**
Mantoux test	0.72	0.60–0.83
Diaskintest	0.84	0.74–0.93
IGRA	0.81	0.70–0.91
PCR	0.87	0.78–0.95

Discussion

The results confirm the limited sensitivity of smear microscopy in pediatric tuberculosis due to the paucibacillary nature of the disease. Although culture remains the gold standard with high specificity, its sensitivity in children does not exceed 50%. Molecular genetic methods provide rapid diagnosis and detection of drug resistance. Modern immunological tests demonstrate high specificity and effectively complement molecular methods. The integration of these diagnostic tools significantly improves overall diagnostic accuracy.

Conclusion

Laboratory diagnosis of tuberculosis in children requires a comprehensive approach.

The highest diagnostic accuracy was demonstrated by PCR (AUC = 0.87) and Diaskintest (AUC = 0.84).

Combined application of methods increases diagnostic accuracy to AUC = 0.93.

Implementation of modern technologies facilitates early detection of drug-resistant tuberculosis.

References

1. Vasilyeva I.A., Levi D.T. Tuberculosis in Children and Adolescents. Moscow: GEOTAR-Media; 2022.

2. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2024. Geneva: WHO; 2024.
3. Sterlikov S.A. Modern methods of tuberculosis diagnostics. Tuberculosis and Lung Diseases. 2023;101(5):6–12.
4. Lawn S.D., Zumla A.I. Tuberculosis. Lancet. 2023;401(10379):123–135.
5. Denisova E.A. Immunodiagnostics of tuberculosis in children. Pediatrics. 2022;101(4):45–50.

Mamatova N.T.
assistant
department of Phthisiology and Pulmonology
Samarkand State Medical University
https://orcid.org/0000-0002-7751-2114
Ashurov A. A.
phthisiatrician
Samarkand regional Center
for Phthisiology and Pulmonology
Abdukhakimov B.A.
master degree
Samarkand State Medical University
Akhtamova Sh.Kh.
student
medical faculty
Samarkand State Medical University

EMOTIONAL DISORDERS IN WOMEN WITH RESPIRATORY TUBERCULOSIS

Abstract: *To conduct a comprehensive assessment of emotional disorders in women with respiratory tuberculosis (RTB) and to analyze their association with clinical characteristics, disease duration, and quality-of-life indicators. The study included 65 women aged 18–60 years with confirmed RTB. Clinical, psychological, and quality-of-life assessments were performed using standardized instruments: the Beck Depression Inventory-II (BDI-II), the Spielberger–Khanin State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and the SF-36 Health Survey. Statistical analysis included descriptive statistics, correlation analysis, and comparative group analysis. Clinically significant emotional disorders were identified in the majority of patients. Moderate to high anxiety levels were observed in 63% of women, while depressive symptoms were detected in 54%. More pronounced anxiety and depressive disorders were significantly associated with longer disease duration, greater clinical severity, and reduced quality-of-life scores ($p < 0.05$). Emotional disorders are highly prevalent among women with RTB and represent an important component of the overall disease burden. Early identification and psychological intervention should be integrated into comprehensive tuberculosis care.*

Keywords: *emotional disorders; respiratory tuberculosis; women; depression; anxiety; psychosocial factors; quality of life*

Introduction

Respiratory tuberculosis (RTB) remains one of the most socially significant and medically challenging public health problems worldwide. Despite the implementation of effective tuberculosis control programs, improvements in chemotherapy regimens, and advances in epidemiological surveillance, the disease

continues to be characterized by high prevalence, prolonged clinical course, and a substantial negative impact on patients' quality of life. In recent years, increasing attention has been paid not only to the clinical and epidemiological aspects of tuberculosis but also to its psychosocial consequences. The chronic nature of tuberculosis, the need for long-term and often toxic treatment, and strict medical supervision contribute to persistent psychoemotional stress in affected individuals. Prolonged hospitalization, social isolation, reduced work capacity, and financial instability create conditions conducive to the development of anxiety and depressive disorders. Factors such as fear of death, concern about infecting close contacts, and uncertainty regarding social status after treatment completion further exacerbate emotional distress. Social stigma plays a crucial role in the formation of emotional disorders in patients with tuberculosis. Despite widespread access to medical information, tuberculosis continues to be associated in public perception with social marginalization, isolation, and danger to others. Stigmatization contributes to decreased self-esteem, feelings of guilt and shame, restriction of social interactions, and, consequently, worsening psychoemotional distress. Previous studies have demonstrated that the degree of perceived stigma is directly correlated with anxiety, depression, and reduced treatment adherence. Women with respiratory tuberculosis represent a particularly vulnerable clinical and social group. Gender differences in disease perception, emotional responses, and coping strategies are determined by both biological and psychosocial factors. Women are more likely to experience internalizing emotional disorders, including anxiety and depression, characterized by heightened emotional sensitivity, affective instability, and somatization of symptoms. Additional psychological burden in women is associated with socially defined roles related to motherhood, family responsibilities, and caregiving.

Materials and methods

A cross-sectional study was conducted involving 65 women with respiratory tuberculosis who received inpatient or outpatient treatment at a специализирован tuberculosis center during 2024–2025. The mean age of participants was 39.4 ± 10.8 years. All participants provided written informed consent prior to enrollment. **Inclusion criteria:** Microbiologically and radiologically confirmed respiratory tuberculosis; Female sex; Age between 18 and 60 years; Ability to complete psychological questionnaires independently. Clinical evaluation included: Collection of general, social, and disease-specific medical history; Physical examination; Chest radiography or computed tomography; Laboratory testing, including sputum smear microscopy and culture for *Mycobacterium tuberculosis*; Assessment of disease duration and clinical severity. Validated psychological instruments were used: **Beck Depression Inventory-II (BDI-II)** to assess depressive symptom severity; **State-Trait Anxiety Inventory (STAI)** to assess state and trait anxiety; **SF-36 Health Survey** to evaluate physical and mental components of quality of life. Statistical analysis was performed using standard biomedical statistical methods. Quantitative variables were expressed as means and standard deviations, while qualitative variables were presented as percentages.

Correlation analysis was applied to evaluate relationships between clinical and psychological variables. Statistical significance was set at $p < 0.05$.

Results

Most participants were of working age. A substantial proportion of women reported significant social difficulties related to the disease, including concerns about job loss, changes in family roles, and social stigmatization (Table 1.).

Table 1.

Characteristic	Value
Mean age (years)	39.4 ± 10.8
Married	68%
Temporary work disability	42%
Presence of comorbidities	47%
Disease duration > 6 months	58%

According to BDI-II results, more than half of the patients exhibited clinically significant depressive symptoms, with moderate and severe depression predominating, indicating a high level of emotional distress. Anxiety assessment revealed elevated levels of both state and trait anxiety in the majority of women. Anxiety was most commonly associated with fear of disease progression, doubts regarding treatment effectiveness, and uncertainty about post-treatment social reintegration. Quality-of-life analysis demonstrated a significant reduction in both physical and mental health components. The most affected domains were **Mental Health, Vitality,** and **Social Functioning.** Women with pronounced anxiety and depression had significantly lower SF-36 scores ($p < 0,05$). Correlation analysis revealed moderate to strong associations: Depression severity positively correlated with disease duration ($r = 0,52$; $p < 0,01$); Anxiety levels were associated with clinical disease severity ($r = 0,48$; $p < 0,01$); Anxiety and depression showed significant negative correlations with quality-of-life indicators.

Discussion

The findings demonstrate a high prevalence of emotional disorders among women with respiratory tuberculosis. Emotional disturbances appear not merely as secondary reactions but as integral components of the disease experience. Chronic inflammation, prolonged treatment, social isolation, and stigmatization may jointly contribute to the development of anxiety and depressive disorders. The observed association between emotional disorders and disease duration underscores the importance of early psychological intervention. Persistent emotional distress may adversely affect treatment adherence, leading to poorer clinical outcomes and an increased risk of drug resistance. These findings are consistent with the contemporary biopsychosocial model of tuberculosis and highlight the necessity of integrating mental health services into tuberculosis care.

Conclusion

Women with respiratory tuberculosis exhibit a high prevalence of anxiety and depressive disorders closely associated with disease severity, duration, and reduced quality of life. Effective tuberculosis management should include not only pharmacological treatment but also psychological support.

References

1. World Health Organization. **Global Tuberculosis Report**. Geneva: WHO; 2023.
2. Sweetland AC, Kritski A, Oquendo MA, et al. Addressing the tuberculosis–depression syndemic to end the tuberculosis epidemic. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2017;21(8):852–861.
3. Duko B, Bedaso A, Ayano G. The prevalence of depression among patients with tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. *Ann Gen Psychiatry*. 2020;19:30.
4. Pachi A, Bratis D, Moussas G, Tselebis A. Psychiatric morbidity and other factors affecting treatment adherence in pulmonary tuberculosis patients. *Tuberc Res Treat*. 2013;2013:489865.
5. Koyanagi A, Vancampfort D, Carvalho AF, et al. Depression comorbid with tuberculosis and its impact on health status. *J Psychosom Res*. 2017;93:1–7.
6. Theron G, Peter J, Zijenah L, et al. Psychological distress and its relationship with non-adherence to TB treatment. *PLoS One*. 2015;10(12):e0143655.
7. Tola HH, Shojaeizadeh D, Garmaroudi G, et al. Psychological distress and its effect on tuberculosis treatment outcomes. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2015;19(8):941–948.
8. Rajeswari R, Muniyandi M, Balasubramanian R, Narayanan PR. Perceptions of tuberculosis patients about their disease and treatment. *Soc Sci Med*. 2005;60(8):1845–1853.
9. Courtwright A, Turner AN. Tuberculosis and stigmatization: pathways and interventions. *Public Health Rep*. 2010;125(Suppl 4):34–42.

Matmusayev T.M.
Harbiy pedagogika va psixologiya kafedrasikatta o‘qituvchisi
podpolkovnik
Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti

RAQAMLI REALLIK SHAROITIDA IJTIMOIY BORLIQNING O‘ZGARISHI VA “VIRTUAL IDENTIKLIK” MUAMMOSI

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy maqola globallashuv sharoitida O‘zbekistonda yoshlarda milliy o‘zlikni anglash, raqamli reallik va yoshlar ijtimoiylashuvining zamonaviy ontologik va falsafiy jihatlarini tahlil qiladi. Raqamli muhit nafaqat texnologiyaviy platforma, balki ijtimoiy borliqning kengaygan, vositalangan va tarmoqlangan shakli sifatida ko‘riladi. Shu orqali yoshlar identikligi virtual va real makonning uzviy birligida shakllanib, ijtimoiy tajriba, subyektivlik va barqarorlik jarayonlari yangilanadi.*

Kalit so‘zlar*: raqamli reallik, virtual muhit, ijtimoiy borliq, yoshlar ijtimoiylashuvi, identiklik, ontologiya, vositachilik, virtual identiklik, tarmoq jamiyati, ijtimoiy transformatsiya.*

Matmusayev T.M.
senior lecturer
Department of military pedagogy and psychology, Lieutenant Colonel
University of military security and defense

CHANGING SOCIAL BEING IN THE CONTEXT OF DIGITAL REALITY AND THE PROBLEM OF “VIRTUAL IDENTITY”

Abstract:*This scientific article analyzes digital reality and the contemporary ontological and philosophical aspects of youth social existence in Uzbekistan under globalization, including issues of national identity. The digital environment is viewed not only as a technological platform but also as an expanded, mediated, and networked form of social being. Within this environment, youth identity is shaped through the organic integration of virtual and real spaces, renewing social experience, subjectivity, and stability processes.*

Keywords:*digital reality, virtual environment, social being, youth socialization, identity, ontology, mediation, virtual identity, network society, social transformation.*

Dastlab raqamli reallik tushunchasi texnologik infratuzilma, kompyuter tarmoqlari va axborot almashinuvi bilan bog‘liq hodisa sifatida talqin qilingan. Bunday yondashuvda raqamli muhit ijtimoiy borliqqa nisbatan tashqi, yordamchi va ikkilamchi vosita sifatida ko‘rilgan. Biroq raqamli texnologiyalarning jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib borishi natijasida bu tushuncha o‘z falsafiy mazmunini kengaytirib, ontologik darajaga ko‘tarildi. Endilikda raqamli

reallik shunchaki texnik platformalar majmui emas, balki insonning ijtimoiy mavjudligi amalga oshadigan muayyan makon sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Zamonaviy ijtimoiy falsafada bu jarayon inson borlig‘ining “vositalanganligi” bilan izohlanadi. Xususan, Marshall McLuhan texnologiyalarni insonning sezgi va ongini kengaytiruvchi vosita sifatida talqin qilib, “vosita – xabar” degan mashhur g‘oyani ilgari suradi. Ushbu nuqtai nazardan qaralganda, raqamli texnologiyalar nafaqat aloqa shaklini, balki insonning borliqni idrok etish usulini ham tubdan o‘zgartirmoqda. Demak, raqamli reallik texnologik muhitdan ontologik makonga aylanish jarayonini boshdan kechirmoqda.

Muallif sifatida biz bu jarayonni raqamli muhitning funksional vositadan ijtimoiy borliqning tarkibiy qismiga aylanishi sifatida baholaymiz. Chunki raqamli makonda inson nafaqat axborot iste’mol qiladi, balki muloqot qiladi, o‘zini namoyon etadi, ijtimoiy maqomga ega bo‘ladi va identitetini shakllantiradi.

Raqamli reallikni ijtimoiy borliqdan mutlaqo ajratilgan alohida hodisa sifatida talqin qilish metodologik jihatdan noto‘g‘ri bo‘lur edi. Chunki ijtimoiy borliq tarixan doimo texnologik va madaniy vositalar orqali shakllanib kelgan. Farq shundaki, raqamli reallik bu vositachilikni mislsiz darajada kuchaytirdi va ijtimoiy munosabatlarning ko‘plab shakllarini to‘liq virtual muhitga ko‘chirdi.

Bu uzviylikni Manuel Castellsning “tarmoq jamiyati” nazariyasi orqali tushuntirish mumkin. Kastelsga ko‘ra, zamonaviy jamiyatda ijtimoiy borliq tarmoqlar orqali tashkil topadi va axborot oqimlari uning asosiy strukturaviy elementi hisoblanadi. Raqamli reallik ana shu tarmoqlarning ontologik ifodasidir. Demak, raqamli reallik ijtimoiy borliqdan tashqarida emas, balki uning yangi tarixiy shakli sifatida vujudga kelmoqda.

Bizningcha, raqamli reallik va ijtimoiy borliq o‘rtasidagi munosabatni “qarama-qarshilik” emas, balki “o‘zaro singish” (interpenetratsiya) sifatida talqin qilish maqsadga muvofiq. Chunki bugungi yoshlar uchun ijtimoiy tajriba real va raqamli qatlamlarning ajralmas birligi orqali shakllanmoqda.

Ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarda raqamli reallikni ko‘pincha “ikkinchi borliq” yoki “parallel reallik” sifatida talqin qilish tendensiyasi mavjud. Bu yondashuvga ko‘ra, virtual makon real ijtimoiy borliqqa muqobil bo‘lgan sun’iy haqiqatni vujudga keltiradi. Ushbu qarash Jean Baudrillardning simulyatsiya va giperreallik konsepsiyasida o‘z ifodasini topgan. Bodriyar virtual belgilar va obrazlar real haqiqatni siqib chiqarib, uning o‘rnini egallashini ta’kidlaydi.

Biroq bu yondashuv raqamli reallikning ijtimoiylashuvdagi real funksiyalarini to‘liq qamrab olmaydi. Chunki raqamli makon nafaqat simulyatsiya, balki real ijtimoiy munosabatlar, real qarorlar va real oqibatlar maydonidir. Yoshlarning raqamli makondagi faoliyati ularning real hayotidagi ijtimoiy maqomi, qadriyatlari va imkoniyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda.

Muallif sifatida biz raqamli reallikni “ikkinchi borliq” sifatida emas, balki ijtimoiy borliqning kengaygan va vositalangan shakli sifatida talqin qilamiz. Bu yondashuv virtual va real qarama-qarshiligini emas, balki ularning dialektik birligini asoslab beradi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, raqamli reallikni ijtimoiy borliqning yangi ontologik shakli sifatida ta’riflash mumkin. Bu shakl texnologik vositalar orqali tashkil topadi, ammo mazmunan ijtimoiy munosabatlar, qadriyatlar va identifikatsiya jarayonlariga tayanadi. Raqamli reallik sharoitida inson mavjudligi “vositasiz” emas, balki doimo platformalar, algoritmlar va interfeyslar orqali amalga oshadi.

Meningcha, raqamli reallik yoshlar ijtimoiylashuvining ontologik shartiga aylanib bormoqda. Endilikda yoshlarning ijtimoiy borliqdagi mavjudligi raqamli makondan tashqarida to‘liq tasavvur etilmaydi. Bu holat ijtimoiy falsafa oldiga yangi vazifalarni — virtual identiklik, ontologik barqarorlik va sub’ektivlikning raqamli transformatsiyasini chuqur tahlil qilish vazifasini qo‘ymoqda.

Aynan shu muammolar keyingi bo‘limlarda, xususan, virtual identiklik fenomenini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish orqali batafsil yoritiladi.

Klassik ijtimoiy falsafada ijtimoiy borliq tushunchasi asosan insonlar o‘rtasidagi bevosita munosabatlar, moddiy ishlab chiqarish jarayonlari va institutsional tuzilmalar bilan bog‘liq holda talqin qilingan. Jamiyatning mavjudligi real makon, jismoniy muloqot va tarixiy vaqt doirasida tushunilgan. Bunday yondashuvda ijtimoiy borliq inson faoliyatining moddiy va institutsional shakllari bilan belgilanadi.

Biroq raqamli texnologiyalar taraqqiyoti natijasida ijtimoiy borliqning mazkur klassik modeli yetarli bo‘lmay qoldi. Chunki jamiyat hayotining muhim qismi virtual makon, raqamli platformalar va axborot tarmoqlariga ko‘chdi. Endilikda ijtimoiy munosabatlar jismoniy yaqinlikka emas, balki raqamli vositachilikka asoslanmoqda. Bu holat ijtimoiy borliqni ontologik jihatdan qayta talqin qilish zaruratini yuzaga keltirdi.

O‘zbek ijtimoiy-falsafiy tafakkurida ham bu masalaga e’tibor kuchayib bormoqda. Xususan, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tadqiqotchilari jamiyatning raqamli modernizatsiyasi sharoitida ijtimoiy borliqning yangi shakllari vujudga kelayotganini ta’kidlab, raqamli muhitni ijtimoiy taraqqiyotning muhim ontologik omili sifatida baholaydilar[5].

Muallif sifatida biz raqamli ijtimoiy borliqni klassik ijtimoiy borliqning inkori emas, balki uning tarixiy jihatdan rivojlangan, vositalangan va kengaygan shakli sifatida talqin qilamiz. Ya’ni raqamli transformatsiya ijtimoiy borliqning mohiyatini emas, balki uning mavjud bo‘lish usulini o‘zgartirmoqda.

An’anaviy va industrial jamiyatlarda ijtimoiy makon asosan hududiylik, geografik yaqinlik va jismoniy makon bilan belgilanib kelgan. Shaxsning ijtimoiy maqomi va ijtimoiy aloqalari uning qaerda yashashi, qaysi jamoaga mansubligi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Raqamli jamiyatda esa bu holat tubdan o‘zgarib, ijtimoiy makon tarmoqlangan va chegarasiz xususiyat kasb etmoqda.

Raqamli muhitda yoshlar bir vaqtning o‘zida turli hududlar va madaniy makonlarda ijtimoiy munosabatlarga kirishmoqda. Bu jarayon makon

[5] O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Ijtimoiy fanlar bo‘limi. *Raqamli jamiyat va ijtimoiy taraqqiyot muammolari*. – Toshkent, 2021

ontologiyasining “hududiylikdan tarmoqlanganlikka” o‘tishini anglatadi. Endilikda ijtimoiy mavjudlik jismoniy joy bilan emas, balki tarmoqqa ulanilganlik darajasi bilan belgilanmoqda.

O‘zbek olimlari bu jarayonni “ijtimoiy makonning virtual kengayishi” sifatida talqin etadilar. Jumladan, respublika ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida raqamli makon yoshlar uchun yangi ijtimoiy imkoniyatlar bilan bir qatorda, an’anaviy ijtimoiy nazorat va ma’naviy tayanchlarning zaiflashuviga olib kelayotgani qayd etiladi[6].

Mualliflik qarashiga ko‘ra, makon ontologiyasining tarmoqlangan shaklga o‘tishi yoshlar ijtimoiylashuvining erkinligini oshiradi, biroq shu bilan birga ijtimoiy aloqalarning barqarorligini pasaytiradi. Natijada yoshlarning ijtimoiy borliqdagi “qaerdaman?” degan ontologik savoli tobora mavhumlashib bormoqda.

Vaqt, tezlik va sinxronlikning yangi ontologik rejimi. Raqamli transformatsiya ijtimoiy borliqning vaqt ontologiyasini ham tubdan o‘zgartirdi. Klassik jamiyatda vaqt ketma-ketlik, tarixiylik va barqaror ritm bilan tavsiflangan bo‘lsa, raqamli jamiyatda vaqt tezlashgan, uzluksiz va sinxron holatga kelmoqda. Axborot real vaqt rejimida tarqalib, ijtimoiy hodisalar bir vaqtning o‘zida turli makonlarda sodir bo‘lmoqda.

Bu holat yoshlar ijtimoiylashuviga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Chunki yoshlar ijtimoiy tajribani asta-sekinlik bilan emas, balki tezkor va fragmentar shaklda o‘zlashtirmoqda. O‘zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli tezlik yoshlarning tafakkur uslubi, diqqat va qadriyatlar tizimiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotgani ta’kidlanadi[3].

Muallif sifatida biz bu holatni ijtimoiy borliqning “tezlashgan ontologiyasi” deb baholaymiz. Bunday ontologiya sharoitida yoshlar hozirgi lahzaga yo‘naltirilgan, qisqa muddatli maqsadlar bilan yashashga moyil bo‘lib, uzoq tarixiy istiqbolni anglash qobiliyati zaiflashmoqda.

2.4. Raqamli vositachilik (mediatsiya) va ijtimoiy tajribaning qayta qurilishi

Raqamli jamiyatning eng muhim ontologik xususiyatlaridan biri ijtimoiy tajribaning bevosita emas, balki vositalangan shaklda amalga oshishidir. Raqamli platformalar, interfeyslar va algoritmlar insonning ijtimoiy borliq bilan munosabatini “vositachi” sifatida belgilab bermoqda. Natijada ijtimoiy tajriba texnologik filtrlardan o‘tgan holda idrok etiladi.

O‘zbek ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida bu holat “vositachilik orqali ijtimoiylashuv” tushunchasi bilan ifodalanib, yoshlarning ijtimoiy ongini shakllantirishda ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalarning roli keskin oshgani qayd etiladi[4].

Mualliflik tahlilimizga ko‘ra, raqamli mediatsiya yoshlar ijtimoiylashuvining ontologik tuzilishini o‘zgartiradi. Endilikda yoshlar jamiyatni bevosita emas, balki algoritmik tarzda tanlab berilgan axborotlar orqali anglaydi. Bu holat bir tomondan

[6] O‘zFA Ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar instituti. *Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy makon transformatsiyasi*. – Toshkent, 2020

ijtimoiy tajribani kengaytirsa, ikkinchi tomondan ijtimoiy borliqning sub'ektiv va fragmentar idrok etilishiga olib keladi.

Virtual makon tushunchasi dastlab texnik-axborot muhiti sifatida izohlangan bo‘lsa-da, zamonaviy ijtimoiy falsafada u ijtimoiy borliqning muhim ontologik shakliga aylanib bormoqda. Virtual makon endilikda faqat axborot almashinuvi sodir bo‘ladigan texnologik platforma emas, balki unda ijtimoiy munosabatlar, identifikatsiya jarayonlari va qadriyatlar tizimi shakllanadigan

O‘zbek ijtimoiy-falsafiy adabiyotlarida ham virtual makon masalasi tobora ko‘proq ontologik nuqtai nazardan tahlil qilinmoqda. Jumladan, ayrim tadqiqotlarda virtual muhit yoshlarning dunyoqarashi va ijtimoiy tajribasini shakllantiruvchi mustaqil makon sifatida baholanib, uni inkor etish emas, balki falsafiy anglash zarurligi ta'kidlanadi.

Tadqiqotchi sifatida biz virtual makonning falsafiy chegarasini uning ijtimoiy mazmun bilan to‘lish darajasi belgilaydi, degan pozitsiyani ilgari suramiz. Agar virtual muhitda real ijtimoiy aloqalar, mas'uliyat va ijtimoiy ta'sir mavjud bo‘lsa, u holda u ijtimoiy borliqning to‘laqonli ontologik shakli sifatida e'tirof etilishi lozim.

Virtual munosabatlar real ijtimoiy munosabatlardan, avvalo, vositalanganlik, ramziylik va tanlab namoyon bo‘lish xususiyatlari bilan farqlanadi. Real munosabatlarda shaxsning jismoniy mavjudligi, bevosita muloqoti va ijtimoiy nazorat muhim o‘rin tutsa, virtual munosabatlarda bu omillar nisbiy tus oladi. Shaxs o‘zini to‘liq emas, balki tanlangan obrazlar orqali ifodalaydi**.**

Bu farqni Erving Goffmanning dramaturgik yondashuvi orqali tushuntirish mumkin. Goffmanga ko‘ra, ijtimoiy hayot "sahna"ga o‘xshaydi, unda shaxslar muayyan rollarni ijro etadi[7]. Virtual makonda esa bu sahnalashtirish jarayoni kuchayib, shaxs o‘z ijtimoiy obrazini ongli ravishda konstruksiya qiladi.

O‘zbek olimlari virtual munosabatlarning ushbu xususiyatini yoshlar ijtimoiylashuvida ikki tomonlama jarayon sifatida baholaydilar: bir tomondan, bu erkin muloqot va o‘zini ifodalash imkoniyatlarini kengaytiradi, ikkinchi tomondan esa ijtimoiy mas'uliyat va real munosabatlar chuqurligining pasayishiga olib keladi.

Mualliflik qarashimizga ko‘ra, virtual munosabatlar real munosabatlarga muqobil emas, balki ularning ontologik jihatdan o‘zgargan shaklidir. Ya'ni bu farq mohiyatda emas, balki mavjud bo‘lish usulidadir.

Virtual makon sharoitida ijtimoiy munosabatlarning yangi shakli sifatida virtual hamjamiyatlar vujudga kelmoqda. Ushbu hamjamiyatlar hudud, millat yoki qarindoshlik asosida emas, balki qiziqishlar, qarashlar va ramziy mansublik asosida shakllanadi. Natijada ijtimoiy borliq yagona va markazlashgan tuzilishdan ko‘p markazli va fragmentar holatga o‘tmoqda.

Tadqiqotchi sifatida biz bu jarayonni ijtimoiy borliqning ontologik murakkablashuvi deb baholaymiz. Chunki yoshlar endilikda bitta emas, balki bir nechta ijtimoiy makon va hamjamiyat doirasida ijtimoiylashmoqda.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, virtual makonni ijtimoiy borliqning inkori yoki "soxta reallik" sifatida talqin qilish ilmiy jihatdan yetarli emas.

[7] Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. – New York: Anchor Books, 1959

Aksincha, virtual makon ijtimoiy borliqning kengaytirilgan, vositalangan va ko‘p qatlamli shakli sifatida namoyon bo‘lmoqda. Unda real ijtimoiy munosabatlar yangi texnologik shaklda davom etadi.

Bizningcha, virtual makon yoshlar ijtimoiylashuvining muhim ontologik shartiga aylanmoqda. Yoshlarning ijtimoiy tajribasi, sub’ektivligi va identifikatsiyasi real va virtual makonning uzviy birligi orqali shakllanadi. Shu bois virtual makonni cheklangan yoki ikkilamchi hodisa sifatida emas, balki zamonaviy ijtimoiy borliqning muhim tarkibiy qismi sifatida tahlil qilish zarur.

Mazkur yondashuv keyingi bo‘limlarda virtual identiklik, sub’yektivlikning fragmentatsiyasi va ontologik barqarorlik muammolarini chuqurroq ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi**.**

An’anaviy jamiyat sharoitida identiklik shaxsning ijtimoiy borliqdagi o‘rnini belgilovchi barqaror va oldindan aniqlangan holat sifatida namoyon bo‘lgan. Identitet asosan nasl-nasab, hudud, diniy mansublik, kasb va jamoaga tegishlilik orqali shakllanib, shaxsning ijtimoiy tanlovi cheklangan bo‘lgan. Bu holatda identiklik ontologik jihatdan “berilganlik” xarakteriga ega bo‘lib, shaxs undan chiqib ketish imkoniyatiga deyarli ega emas edi.

Meningcha, an’anaviy identitetning kuchli tomoni ontologik barqarorlik bo‘lsa, uning cheklangan tomoni shaxsiy sub’ektivlik va individuallikning sust rivojlanganligidadir.

Modern jamiyatda identiklik tushunchasi tubdan o‘zgarib, shaxsning o‘z hayotini ongli ravishda qurishi bilan bog‘liq bo‘la boshladi. Modernlik sharoitida identitet endilikda meros emas, balki refleksiv tanlov natijasi sifatida qaraladi. Shaxs o‘zini kim ekanligini an’anaga tayanib emas, balki ijtimoiy tajriba va ongli qarorlar orqali belgilaydi. Zamonaviy jamiyatda identiklik doimiy ravishda qayta ko‘rib chiqiladi va shaxsning “hayot loyihasi”ga aylanadi.

Postmodern sharoitda esa bu refleksivlik fragmentatsiyaga aylanadi. Identiklik yagona va yaxlit shaklda emas, balki ko‘p qatlamli va vaziyatga bog‘liq tarzda namoyon bo‘ladi.

Postmodern sharoitda yoshlar identikligining parchalanishini raqamli axborot oqimlari, globallashuv va madaniy plyuralizm bilan bog‘laydi. Tadqiqotlarda yoshlar o‘zini bir vaqtning o‘zida bir nechta madaniy va ijtimoiy kontekstda anglayotgani qayd etiladi.

Meningcha, modern va postmodern identitetlar yoshlar ijtimoiylashuvini erkinlashtirgan bo‘lsa-da, ontologik noaniqlikni ham kuchaytirgan.

Identiklik faqat ijtimoiy rol yoki psixologik holat emas, balki chuqur **ontologik** va **aksiologik** mazmunga ega hodisadir. Ontologik jihatdan identiklik shaxsning ijtimoiy borliqda mavjud bo‘lish usulini, aksiologik jihatdan esa uning qadriyatlar tizimini belgilaydi. Shaxs kimligini anglash orqali nafaqat jamiyatdagi o‘rnini, balki hayotining ma’nosini ham belgilaydi.

Bu masala Charles Taylorning identitet va qadriyatlar haqidagi qarashlarida chuqur yoritilgan. Teylorga ko‘ra, barqaror identiklik ma’naviy yo‘nalishlar va

qadriyatli tanlovlarga tayanmagan taqdirda, shaxs ontologik bo‘shliqqa tushib qoladi[8].

O‘zbek ijtimoiy-falsafiy maktabida ham identiklikning aksiologik jihati alohida ta’kidlanadi. Milliy va ma’naviy qadriyatlar yoshlar identikligining barqarorligini ta’minlovchi muhim omil sifatida baholanadi.

Muallif sifatida biz identiklikni ontologik-aksiologik birlik sifatida talqin qilamiz: identitet barqaror bo‘lishi uchun u nafaqat tanlov erkinligiga, balki ma’naviy mazmunga ham tayangan bo‘lishi lozim.

Yoshlar identikligi jamiyat taraqqiyotining har bir bosqichida turlicha shakllanib, tarixiy jihatdan o‘zgaruvchan hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. An’anaviy jamiyatda yoshlar identikligi jamoaga singish orqali, industrial jamiyatda kasbiy rol orqali, postindustrial jamiyatda refleksiv tanlov orqali, raqamli jamiyatda esa virtual va real identifikatsiyalar uyg‘unligi orqali shakllanmoqda.

Bizning tadqiqotlarimizga ko‘ra, yoshlar identikligining tarixiy o‘zgaruvchanligi uning zaifligi emas, balki ijtimoiy borliqning dinamik xususiyatining ifodasidir. Biroq raqamli jamiyat sharoitida bu o‘zgaruvchanlik haddan tashqari tezlashib, ontologik barqarorlik muammosini yuzaga keltirmoqda. Shu bois yoshlar identikligini tahlil qilishda tarixiylik, ontologik chuqurlik va aksiologik mas’uliyatni birgalikda hisobga olish zarur.

Aynan shu muammo keyingi bo‘limlarda virtual identiklik va sub’ektivlik transformatsiyasi masalalarini chuqurroq ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy ijtimoiy falsafada “virtual identiklik” tushunchasi shaxsning raqamli makonda o‘zini anglash, namoyon etish va ijtimoiy munosabatlarga kirishish jarayonini ifodalovchi muhim kategoriya sifatida shakllanmoqda. Klassik identitet nazariyalarida shaxsning “men”i asosan real ijtimoiy munosabatlar, jismoniy muloqot va barqaror ijtimoiy rollar orqali tarkib topgan bo‘lsa, raqamli jamiyat sharoitida identiklikning muhim qismi virtual makonda konstruksiya qilinmoqda.

O‘zbekiston ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida virtual identiklik ko‘pincha yoshlar ongining raqamli muhit ta’sirida shakllanayotgan yangi ko‘rinishi sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchilar virtual makonda yuzaga kelayotgan identifikatsiya jarayonlarini milliy, ma’naviy va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog‘liq holda tahlil qilish zarurligini qayd etadilar.

Tadqiqotchi sifatida biz virtual identiklikni shaxsning real identitetiga qarama-qarshi qo‘yiladigan hodisa emas, balki ijtimoiy borliqning raqamli sharoitda kengayishi natijasida vujudga kelgan yangi identifikatsiya shakli sifatida talqin qilamiz.

Virtual identiklikning shakllanishi bir qator murakkab mexanizmlar orqali amalga oshadi. Avvalo, bu jarayon raqamli platformalarda profil yaratish, kontent tanlash, o‘zini taqdim etish va ijtimoiy tasdiqlash mexanizmlariga tayanadi. Shaxs

[8] Taylor C. *Sources of the Self*. – Cambridge: Harvard University Press, 1989

virtual makonda o‘zini qanday ko‘rsatishni ongli ravishda belgilab, ijtimoiy qabul qilinishga erishishga intiladi.

Virtual identiklik shakllanishida algoritmik muhit va ijtimoiy tarmoqlarning rolini alohida ta’kidlab, yoshlarning o‘zini anglash jarayoni tobora tashqi baholash va raqamli reytinglarga bog‘lanib borayotganini ko‘rsatadilar[4].

Mening tahlilarimga ko‘ra, virtual identiklik mexanizmlarining asosiy xususiyati — vositalanganlik va tanlab namoyon bo‘lishdir. Bu holat shaxsga erkinlik beradi, biroq identitetning ontologik yaxlitligini zaiflashtirishi ham mumkin.

Virtual identiklikning markaziy tushunchalaridan biri “raqamli men” fenomenidir. “Raqamli men” — bu shaxsning raqamli makonda yaratgan, tahrirlagan va namoyon etgan ijtimoiy obrazi bo‘lib, u real hayotdagi shaxsiy xususiyatlar bilan to‘liq mos kelmasligi mumkin. Ushbu obraz ko‘pincha ijtimoiy maqbullik, muvaffaqiyat va e’tirof mezonlariga moslashtiriladi.

“Raqamli men” fenomeni virtual identiklikning eng muammoli jihatlaridan biridir. Chunki u shaxsga o‘zini qayta yaratish imkonini berar ekan, ayni paytda ontologik barqarorlikni xavf ostiga qo‘yadi.

Yuqoridagi tahlillar asosida virtual identiklikka mualliflik ta’rifini taklif etish mumkin: virtual identiklik — bu shaxsning raqamli makonda, texnologik vositachilik sharoitida shakllanadigan, ko‘p qatlamli va dinamik sub’ektivlik shaklidir. U real ijtimoiy tajribaga tayanadi, biroq ramziy va algoritmik mexanizmlar orqali qayta quriladi.

Bizningcha, virtual identiklikni nafaqat ijtimoiy-psixologik, balki ontologik hodisa sifatida tahlil qilish zarur. Chunki raqamli jamiyat sharoitida shaxsning “mavjud bo‘lish usuli” aynan virtual makon orqali belgilana boshlaydi. Shu bois virtual identiklik yoshlar ijtimoiylashuvining markaziy kategoriyasiga aylanmoqda.

Raqamli jamiyat sharoitida sub’ektivlik insonning ichki ong holati yoki shaxsiy tajribasi bilangina cheklanmay, texnologik vositachilik orqali shakllanadigan murakkab jarayonga aylanmoqda. Agar klassik ijtimoiy falsafada sub’ektivlik shaxsning ongli faoliyati va ijtimoiy munosabatlardagi ishtiroki bilan izohlangan bo‘lsa, raqamli reallikda u platformalar, algoritmlar

Ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida ham sub’ektivlikning raqamli sharoitda qayta qurilishi masalasi muhim muammo sifatida ko‘tarilmoqda. Ayrim olimlar yoshlar ongining raqamli axborot oqimlari ta’sirida shakllanishi sub’ektiv qarorlar va qadriyatli tanlovlarning beqarorlashuviga olib kelmoqda.

Bizningcha, raqamli sharoitda sub’ektivlikning qayta qurilishi ikki tomonlama jarayondir: bir tomondan, shaxsning o‘zini ifodalash imkoniyatlari kengayadi, ikkinchi tomondan esa sub’ektivlik tashqi raqamli mexanizmlarga haddan tashqari bog‘lanib qolish xavfi yuzaga keladi.

Virtual identiklik sharoitida shaxsning “men”i yagona va yaxlit holatda emas, balki ko‘p qatlamli shaklda namoyon bo‘ladi. Real hayotdagi identitet, virtual makondagi identitet va ramziy (madaniy-belgili) identitet bir-biri bilan o‘zaro ta’sirda bo‘lib, ba’zan uyg‘unlashadi, ba’zan esa ziddiyatga kirishadi. Bu holat yoshlar sub’ektivligining ontologik murakkablashuviga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Ijtimoiy fanlar bo‘limi. *Raqamli jamiyat va ijtimoiy taraqqiyot muammolari*. – Toshkent, 2021

[2]. O‘zFA Ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlar instituti. *Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy makon transformatsiyasi*. – Toshkent, 2020

[3]. Goffman E. *The Presentation of Self in Everyday Life*. – New York: Anchor Books, 1959

[4]. Taylor C. *Sources of the Self*. – Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Mavlonov A.M., g.f.n.
Geografiya kafedirasi dotsenti
Buxoro davlat pedagogika instituti
Eshtuxtayev A.T.
Aniq va Tabiy fanlar fakulteti
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta'lim yo'nalishi
3GIQ-22 guruhi talabasi
Buxoro davlat pedagogika institute

SAMARQAND VILOYATI SHAHARLARINING GEOGRAFIYASI
GEOGRAPHY OF CITIES OF SAMARKAND REGION

Annotatsiya. *Ushbu maqolaning dolzarbligi shundaki shaharlar geografiyasi zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaning eng omadi yurushgan tarmoqlaridan biri. Ayniqsa, viloyat va mintaqalarning shaharlar to'ri, tizimi tarkibini o'rganish geourbanistikada alohida o'rin tutadi. Maqolada Samarqand viloyati shahar manzilgohlarining bugungi holatini o'rganish orqali shahalarrning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy hamda geografik jihatdan rivojlanishiga baho berilgan.*

Kalit so'zlar: *Shaharlar geografiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya, shaharlar to'ri, shaharlar tizimi, geourbanistika, madaniy, urbanizatsiya, demografiya.*

Mavlonov A.M., Candidate of Sciences,
associate professor
Department of Geography
Bukhara State Pedagogical Institute
Eshtukhtayev A.T.
student of group 3GIQ-22
Department of Geography and Fundamentals of Economic Knowledge
Faculty of Exact and Natural Sciences
Bukhara State Pedagogical Institute

GEOGRAPHY OF CITIES OF SAMARKAND REGION

Abstract.*The relevance of this article is that urban geography is one of the most successful branches of modern economic and social geography. In particular, the study of the structure of the urban network and system of regions occupies a special place in geourbanism. The article assesses the socio-economic, cultural and geographical development of cities by studying the current state of urban settlements in the Samarkand region.*

Key words: *Urban geography, socio-economic geography, urban network, urban system, geourbanism, cultural, urbanization, demography.*

Samarqand viloyati O‘zbekistonning eng qadimiy va iqtisodiy jihatdan rivojlangan hududlaridan biri bo‘lib, uning shahar manzilgohlarini chuqur o‘rganish orqali butun viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va geografik taraqqiyot holatiga aniq baho berish mumkin. Bugungi kunda viloyat tarkibida 2 ta viloyat bo‘ysunuvidagi shahar (Samarqand va Kattaqo‘rg‘on) hamda 10 ta tuman markazlari shahar maqomiga ega manzilgohlar mavjud.

Samarqand viloyati – O‘zbekistonning markazida, Zarafshon daryosi vodiysida joylashgan. U 1938 yil 15 yanvar kuni tashkil etilgan. Viloyat hududi 16,8 kilometr kvadrat bo‘lib, aholisi 4 mln 159 ming (2025 yil 1 iyul holatiga ko‘ra) kishini tashkil etadi. Samarqand viloyati shimoliy-sharqda Jizzax, janubda Qashqadaryo, shimoliy-g‘arbda Navoiy viloyatlari, g‘arbda Tojikiston bilan chegaradosh.

Shahar manzilgohlarining ijtimoiy-iqtisodiy holati. Samarqand viloyatida bugungi kunda Samarqand va Kattaqo‘rg‘on shaharlaridan tashqari 10 dan ortiq tuman markazlari shahar maqomiga ega. Ularning iqtisodiy rivojlanishi qator omillar bilan belgilanadi: Samarqand shahri – xizmat ko‘rsatish, transport-logistika, turizm, savdo va ta’lim markazi. Yalpi hududiy mahsulotning katta qismini aynan xizmat sohasi tashkil etadi. Kattaqo‘rg‘on shahri – sanoat, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarish faoliyati bilan ajralib turadi. Urgut, Payariq, Pastdarg‘om kabi shahar manzilgohlarida kichik biznes, hunarmandchilik va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish keng rivojlanmoqda.

So‘nggi yillarda “Urgut erkin iqtisodiy zonasi” faoliyati tufayli investitsiyalar oqimi oshib, yangi ishlab chiqarish korxonalari barpo etildi. Umuman olganda, viloyat shaharlarida iqtisodiy faollik oshib, bandlik darajasi yil sayin yaxshilanmoqda.

Demografik jarayonlar va urbanizatsiya. Samarqand viloyati shaharlarida aholi sonining o‘sishi va urbanizatsiya jarayoni jadallik bilan ketmoqda. Asosiy demografik tendensiyalar quyidagicha: Qishloqlardan shahar markazlariga ichki migratsiya kuchaygan. Aholining tabiiy o‘sishi yuqori darajada bo‘lib, bu shahar infratuzilmasiga qo‘shimcha talabni oshirmoqda. Aholi zichligi eng yuqori bo‘lgan hudud – Samarqand shahri bo‘lib, viloyatning asosiy iqtisodiy va ma’muriy resurslari shu yerda jamlangan. Urbanizatsiya jarayonining faolligi yangi uy-joy massivi, yo‘llar, maktab, bog‘cha, suv va elektr tarmoqlarining kengaytirilishini taqozo etmoqda.

Madaniy rivojlanish va infratuzilma. Samarqand viloyati shaharlarining madaniy hayoti boy tarixiy meros bilan uzviy bog‘liq. Samarqand shahri – xalqaro turizm markazi bo‘lib, Registon, Shohi-Zinda, Ulug‘bek rasadxonasi kabi obidalar nafaqat madaniy, balki iqtisodiy rivojlanishning ham muhim omili hisoblanadi. Shahar markazlarida yangi kutubxonalar, madaniyat saroylari, teatrlar, sport majmualari qurilmoqda. Turizm infratuzilmasining kengayishi mehmonxonalar, yo‘l infratuzilmasi va servis sohasining ham o‘sishiga sabab bo‘lmoqda. Madaniy rivojlanish aholining turmush tarzini o‘zgartirayotgan asosiy omillardan biridir.

Geografik omillar va hududiy joylashuvning ta’siri. Har bir shahar manzilgohining geografik joylashuvi uning iqtisodiy ixtisoslashuvini belgilaydi.

Urgut – tog‘ oldi hududida joylashgani sabab savdo, hunarmandchilik va transchegaraviy iqtisodiy aloqalar rivojlangan. Kattaqo‘rg‘on – suv manbalari va transport yo‘llari kesishgan hududda bo‘lgani uchun qishloq xo‘jaligi va qayta ishlash sanoati rivojlangan. Samarqand – temir yo‘l, avtomobil yo‘llari va xalqaro aeroport markazi sifatida butun viloyat logistikasini boshqaradi.Geografik omillar tufayli shaharlarning iqtisodiy tarkibi farqlanadi va hududlar o‘rtasida funksional bo‘linish shakllangan.

SAMARQAND VILOYATIDAGI SHAXAR MANZILGOXLARINING TASHKIL TOPISHI.

T/p	Manzilgox nomi.	Shaxarcha maqomini olgan yili.	Shaxar maqomini olgan yili.	Joylashgan urni [tumani]	Mamuriy axamiyati [funksiyasi]
1.	Samarqand		Eramizgacha 4 asir		Viloyat markazi (kup funksiyali shahar)
2.	Kattaqurg’on		1868	Kattaqurg’on	Okrug markazi
3.	Bulung’ir	1944	1973	Bulung’ir	Tuman markazi
4.	Jonboy		1977	Jonboy	Tuman markazi
5.	Juma	1934	1973	Pasdarg’on	Tuman markazi т.й. ст-яси
6.	Ishtixon	1978	1984	Ishtixon	Tuman markazi
7.	Nurobod	1969	1983	Nurobod	Tuman markazi
8.	Oqtosh		1967	Narpay	Tuman markazi т.й. ст-яси
9.	Payariq		1994	Payariq	Tuman markazi
10.	Urgut		1973	Urgut	Tuman markazi
11.	Chelak	1973	1981	Payariq	
12.	Payshanba	1984		Kattaqurg’on	Tuman markazi
13.	Kimyogar	1952		Samarqand sh.	
14.	Ziyovudin	1972		Paxtachi	Tuman markazi
15.	Loyish	1984		Oqdaryo	Tuman markazi
16.	Charxin	1978		Pasdarg’on	
17.	Ingichka	1944		Kattaqurg’on	Resurs shaxri
18.	Daxbed	1978		Oqdaryo	
19.	Kattaqurg’on suv ombori	1947		Kattaqurg’on	

20.	**Metan**	**1986**		**Ishtixon**	
21.	**Mirbozor**	**1992**		**Narpay**	
22.	**Farhod**	**1981**		**Samarqand sh.**	
23.	**Xishrav**	**1952**		**Samarqand sh.**	

Samarqand shahri - O‘zbekistonning eng qadimiy va yirik shaharlaridan biri bo‘lib, Samarqand viloyatining ma’muriy, ijtimoiy va iqtisodiy markazi hisoblanadi. Shaharning maydoni taxminan 120 km² bo‘lib, qadimda Maroqand nomi bilan mashhur bo‘lgan va miloddan avvalgi VIII asrda shahar sifatida shakllangan. Shu bois Samarqand tarixiy jihatdan ham, bugungi rivojlanish nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.Bugungi kunda Samarqand shahri yirik aholi manzilgohi sifatida ta’lim, sog‘liqni saqlash, madaniyat va xizmatlar markazi vazifasini bajaradi. Shaharda oliy ta’lim muassasalari, tibbiyot va ilmiy markazlar jamlangan bo‘lib, bu uning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Aholining asosiy qismi xizmat ko‘rsatish, savdo, ta’lim va turizm sohalarida band.Iqtisodiy jihatdan Samarqand sanoat, transport va turizmning muhim markazidir. Mashinasozlik, oziq-ovqat, to‘qimachilik va qurilish materiallari ishlab chiqarish yetakchi o‘rin tutadi. Temiryo‘l, avtomobil yo‘llari va xalqaro aeroport shaharni respublika va xalqaro miqyosdagi muhim transport-logistika tuguniga aylantirgan.So‘ngi yillarda Samarqanda keng ko‘lamli qurilish va islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi turar joy massivlari, zamonaviy yo‘l va ko‘priklar, ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda. Ayniqsa, **“Buyuk Ipak yo‘li”** xalqaro turizm markazi, yangi mehmonxonalar, savdo va xizmat ko‘rsatish majmualari shahar qiyofasini tubdan o‘zgartirmoqda. Obodonlashtirish, transport tizimini yangilash, yashil hududlarni kengaytirish bo‘yicha islohotlar aholining yashash sharoitini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Kattaqo‘rg‘on shahri - Samarqand viloyatining muhim shaharlaridan biri bo‘lib, Zarafshon vodiysining g‘arbiy qismida joylashgan. Shahar 1868-yilda shahar maqomini olgan va tarixan savdo, hunarmandchilik hamda ma’muriy markaz sifatida shakllangan. Hozirgi kunda Kattaqo‘rg‘on Samarqand viloyatiga bo‘ysunuvchi shahar hisoblanadi.Shaharning ijtimoiy ahamiyati uning aholi yashashi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va xizmatlar markazi sifatidagi roli bilan belgilanadi. Kattaqo‘rg‘on nafaqat shahar aholisi, balki atrofdagi tumanlar uchun ham savdo va xizmat ko‘rsatish markazi vazifasini bajaradi.Iqtisodiy jihatdan shahar oziq-ovqat va yengil sanoat, qurilish materiallari ishlab chiqarish, savdo va transport faoliyati bilan ajralib turadi. Qulay transport joylashuvi Samarqand, Navoiy va Buxoro yo‘nalishlari bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga imkon beradi.So‘nggi yillarda shaharda yangi turar joylar, yo‘l va ijtimoiy infratuzilma obyektlari qurilishi, obodonlashtirish va xizmatlar sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda.

Urgut shahri - Samarqand viloyatining muhim shaharlaridan biri bo‘lib, viloyatning janubiy qismida, tog‘li hududlar bilan chegaradosh joyda joylashgan. Shahar qadimiy tarixga ega bo‘lib, tarixiy manbalarda Urgut XVIII–XIX asrlarda

shahar maqomini olgan deb qayd etiladi. Hozirgi kunda Urgut Samarqand viloyatiga bo‘ysunuvchi shahar hisoblanadi. Shaharning maydoni taxminan 10–15 km² bo‘lib, aholisi va xo‘jalik faoliyati zich joylashgan.Ijtimoiy jihatdan Urgut shahri o‘z aholisining ta’lim, sog‘liqni saqlash va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi markaz vazifasini bajaradi. Shaharda maktablar, kasb-hunar markazlari, tibbiyot muassasalari va madaniyat obyektlari mavjud bo‘lib, shahar nafaqat o‘z aholisi, balki atrof tumanlar uchun xizmat ko‘rsatadi.Iqtisodiy jihatdan Urgut shahri ko‘proq yengil sanoat, to‘qimachilik, savdo va xizmatlar sohalari bilan ajralib turadi. Shahar tog‘li hududdagi transport yo‘llari orqali Samarqand va boshqa viloyatlar bilan bog‘langanligi sababli savdo va transport-logistika imkoniyatlariga ega. Qishloq xo‘jaligi, ayniqsa bog‘dorchilik va dehqonchilik shahar iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi.So‘nggi yillarda Urgut shahrida ham yangi qurilish va islohotlar amalga oshirilmoqda: turar joy massivlari, yo‘l va ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda, obodonlashtirish ishlari, yashil hududlarni kengaytirish va xizmatlar sohasini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Samarqand viloyati shahar manzilgohlarining bugungi holatini o‘rgangan holda quyidagi xulosalarga kelish mumkin: Viloyat shaharlarida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar barqaror o‘sish bosqichiga kirgan. Urbanizatsiya kuchayib, shahar aholisi yil sayin ortmoqda. Madaniy meros va turizm sohasi shaharlarning rivojlanishida yetakchi omil bo‘lib qolmoqda.Geografik joylashuv har bir shahar manzilgohining iqtisodiy ixtisoslashuvini belgilab bermoqda. Umuman, Samarqand viloyati shaharlarining bugungi holati ularning ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va geografik jihatdan barqaror va istiqbolli rivojlanayotganligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. (2023). Samarqand viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi. Toshkent.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2024). Hududlar bo‘yicha demografik ko‘rsatkichlar: Samarqand viloyati statistik to‘plami. Toshkent: O‘zStat.
3. Samarqand viloyati hokimligi. (2023–2024). Viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bo‘yicha hisobotlar. Samarqand.
4. Rasulov Sh. (2021). Shaharlar geografiyasi va urbanizatsiya jarayonlari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Samarqand viloyati Statistika boshqarmasi: Investitsiyalar bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar. https://samstat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments
6. Asian Development Bank: Harnessing Uzbekistan’s Potential of Urbanization — hududiy tahlil. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/735126/uzbekistan-national-urban-assessment.pdf

Mavlonova G.G.
Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotshisi

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ISH SINF O'QITUVCHILARINING KASBIY IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: *Mazkur maqolada innovatsion ta'lim muhiti sharoitida bo'lajak boshlang'ish sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining ijodiy salohiyati, pedagogik tafakkuri va innovatsion yondashuvlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqotda innovatsion ta'lim muhiti tushunchasi, uning tarkibiy qismlari hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish va muammoli ta'lim orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Maqola natijalari pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvlardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *innovatsion ta'lim muhiti, kasbiy ijodiy faoliyat, boshlang'ish sinf o'qituvchisi, pedagogik kompetensiya, ijodkorlik.*

Mavlonova G.G.
independent researcher
National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

DEVELOPING THE PROFESSIONAL AND CREATIVE ACTIVITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abstract: *This article examines the development of professional and creative activity of future primary school teachers in an innovative educational environment. In modern education, a teacher's creativity, pedagogical thinking, and ability to apply innovative approaches play a crucial role. The study 217edagogi the concept of an innovative educational environment, its structural components, and its significance in shaping the professional competencies of future teachers. Particular attention is paid to the use of interactive teaching methods, digital technologies, project-based learning, and problem-based instruction as effective tools for fostering creative professional activity. The findings of the research highlight the importance of integrating innovative pedagogical technologies into teacher training programs and offer practical recommendations for improving the quality of primary teacher education.*

Keywords: *innovative educational environment, professional creative activity, primary school teacher, pedagogical competence, creativity.*

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamlashtirish sharoitida ta’lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan talablar tubdan o‘zgarmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichi shaxsning 218edagogic218al, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu sababli boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy faoliyati endilikda faqat bilim va ko‘nikmalarni yetkazish bilan cheklanmay, balki o‘quvchilarda ijodiy tafakkur, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarga moslashish hamda samarali muloqot kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi talab etilmoqda. Bu 218 edago‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridan yuqori darajadagi kasbiy-ijodiy tayyorgarlikni taqozo etadi.

Innovatsion ta’lim muhiti ta’lim jarayonining sifatini oshirishda muhim omil sifatida e’tirof etilmoqda. Bunday muhit zamonaviy 218edagogic texnologiyalar, interfaol o‘qitish metodlari, raqamli ta’lim platformalari va kreativ yondashuvlarning uyg‘unlashuvi asosida tashkil etiladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion ta’lim muhitida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini, ijodiy faolligini hamda kasbiy refleksiyasini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bunday muhit o‘qituvchidan 218edagogic jarayonni loyihalash, ta’limiy vaziyatlarni tahlil qilish va yangicha yechimlar ishlab chiqish ko‘nikmalarini talab qiladi.

Oliy 218 edagogic ta’lim tizimida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish masalasi hozirgi kunda dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy ta’lim yondashuvlari talabalarning ijodiy salohiyatini to‘liq namoyon etishga yetarli imkoniyat bermaydi. Shu bois innovatsion ta’lim muhiti sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda o‘rganish zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi innovatsion ta’lim muhiti sharoitida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodlari

Mazkur tadqiqot bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini innovatsion ta’lim muhiti sharoitida rivojlantirish jarayonini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, unda kompleks metodologik yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotning nazariy asoslarini aniqlash maqsadida 218 edagogic, psixologik va metodik yo‘nalishdagi ilmiy manbalar tizimli tahlil qilindi hamda mavjud ilmiy qarashlar taqqoslash va umumlashtirish metodlari orqali o‘rganildi [8].

Empirik tadqiqot bosqichida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyat darajasini aniqlash uchun kuzatish, suhbat va so‘rovnoma metodlaridan foydalanildi. Kuzatish jarayonida talabalar faoliyatining ijodkorlik, mustaqillik va 218edagogic tashabbuskorlik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Suhbatlar orqali talabalarning innovatsion ta’lim muhitiga bo‘lgan munosabati, kasbiy motivatsiyasi va ijodiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi aniqlandi. So‘rovnoma metodida esa talabalar tomonidan innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish tajribasi baholandi.

Tadqiqot jarayonida innovatsion ta’lim muhitini tashkil etishning samarali shakllari sifatida interfaol metodlar (219 edagog, aqliy hujum, muammoli vaziyatlar), loyiha asosida o‘qitish hamda raqamli ta’lim platformalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish tajribalari tahlil qilindi. Ushbu metodlar talabalarning ijodiy faolligini oshirishga ta’siri nuqtai nazaridan o‘rganildi. Olingan 219edagog ma’lumotlar tahliliy va 219edagogic yondashuvlar asosida qayta ishlanib, tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta’minlashga xizmat qildi. Natijalarni baholash jarayonida miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlarining uyg‘unligi ta’minlandi.

Tadqiqot natijalari innovatsion ta’lim muhiti bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirishda samarali 219edagogic shart-sharoit yaratishini ko‘rsatdi. Kuzatish va so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, innovatsion ta’lim muhitida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda ishtirok etgan talabalar orasida mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va 219 edagogic tashabbuskorlik ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Xususan, interfaol va muammoli ta’lim metodlaridan muntazam foydalanish talabalarning ta’limiy vaziyatlarga faol munosabat bildirishiga hamda nostandart 219edagogic yechimlar ishlab chiqishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi [2].

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatdiki, talabalarning aksariyati interfaol metodlar orqali tashkil etilgan mashg‘ulotlar ularning kasbiy motivatsiyasini oshirganini va o‘z imkoniyatlarini namoyon etishiga sharoit yaratganini ta’kidlagan. Loyiha asosida o‘qitish jarayonida talabalar 219 edagogic muammolarni tahlil qilish, ta’lim jarayonini rejalashtirish va amaliy natijalarga yo‘naltirilgan ijodiy faoliyatni amalga oshirish ko‘nikmalarini egallagani kuzatildi.

Raqamli ta’lim platformalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish talabalar tomonidan ta’lim jarayonini individuallashtirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish va refleksiya qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Kuzatish natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli vositalar bilan ishlash jarayonida talabalar o‘z kasbiy faoliyatiga tanqidiy yondashish hamda ijodiy tashabbus ko‘rsatishga moyil bo‘lgan. Umuman olganda, innovatsion ta’lim muhitida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash bilan birga, ularning ijodkorlik darajasini sezilarli darajada oshirganini tasdiqladi.

Muhokama

Mazkur tadqiqot natijalari innovatsion ta’lim muhiti bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim 219 edagogic omil ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, interfaol va muammoli ta’lim metodlari talabalarni passiv bilim oluvchidan faol ta’lim subyektiga aylantiradi. Bu holat 219 edagogic jarayonda talabalarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi va tashabbuskorligini rivojlantirishga xizmat qiladi [5].

Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar innovatsion 219 edagogic yondashuvlar samaradorligini o‘rgangan boshqa ilmiy tadqiqotlar bilan uyg‘unlashadi. Xususan, loyiha asosida o‘qitish va raqamli texnologiyalarni ta’lim

jarayoniga joriy etish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy refleksiyasi va ijodiy muammolarni hal etish qobiliyatini kuchaytirishi avvalgi tadqiqotlarda ham qayd etilgan. Bizning tadqiqot natijalarimiz ham ushbu yondashuvlarning boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida samarali ekanini ko‘rsatdi.

Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, innovatsion metodlardan foydalanishda talabalar bilan bir qatorda o‘qituvchilarning metodik va texnologik tayyorgarligi yetarli darajada bo‘lmasa, ta’lim jarayonining samaradorligi pasayishi mumkinligi kuzatildi. Bu holat innovatsion ta’lim muhitini muvaffaqiyatli tashkil etishda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini muntazam rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi [3].

Tadqiqot natijalari innovatsion ta’lim muhitini oliy 220 edagogic ta’lim tizimida tizimli ravishda joriy etish bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv ta’lim sifati va pedagog kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot natijalari innovatsion ta’lim muhiti bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini rivojlantirishda muhim 220edagogic shart-sharoit ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, interfaol va muammoli ta’lim metodlari, loyiha asosida o‘qitish hamda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va 220 edagogic tashabbuskorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, innovatsion ta’lim muhitida tashkil etilgan mashg‘ulotlar talabalar kasbiy kompetensiyalarini mustahkamlash bilan birga, ularning o‘z kasbiy faoliyatiga tanqidiy va reflektiv yondashuvini shakllantirishi aniqlandi. Bu holat bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini zamonaviy ta’lim talablariga mos, ijodkor va raqobatbardosh pedagog sifatida tayyorlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari oliy 220edagogic ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini tashkil etishda innovatsion yondashuvlarni tizimli ravishda joriy etish zarurligini ko‘rsatadi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar innovatsion ta’lim muhitining tarkibiy komponentlarini yanada takomillashtirish hamda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy-ijodiy rivojlanish mexanizmlarini chuqurroq o‘rganishga xizmat qilishi mumkin.

Использованные источники:

1. Abdullayeva, M. M. (2021). Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta’lim texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Azizxo‘jayeva, N. N. (2018). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? European Journal of Teacher Education, 40(3), 291–309.
4. Fullan, M. (2016). The new meaning of educational change (5th ed.). New York: Teachers College Press.

5. G‘afforov, F. X. (2020). Oliy ta’limda innovatsion ta’lim muhitini shakllantirish masalalari. Pedagogik ta’lim, 3, 25–30.
6. Jo‘rayev, R. H. (2019). Boshlang‘ich ta’lim metodikasi va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O‘qituvchi.
7. Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.
8. Qodirova, M. A. (2020). Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish. Toshkent: Fan va texnologiya.
9. Sattorov, S. S. (2022). Bo‘lajak o‘qituvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari. Ta’lim va innovatsiyalar, 2, 41–46.
10. To‘raqulov, B. A. (2021). Pedagog kadrlar tayyorlashda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Zamonaviy ta’lim, 5, 18–23.
11. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
12. Xoliqov, A. A. (2019). Pedagogik kompetensiya va uning ta’lim jarayonidagi ahamiyati. Toshkent: Universitet.

Mirzayev A.R., f.f.f.d. Phd
FVDTni boshqarish va rejalashtirish
kafedrasi dotsenti
Fuqaro muhofazasi instituti
Sotvoldiyev A.A.
2-bosqich magistranti)

FAVQULODDA VAZIYATLARGA TAYYORLASHDA ISH BILAN BAND BO‘LMAGAN AHOLI TOIFALARI VA ULARNING IJTIMOIY-DEMOGRAFIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISHNI AHAMIYATI

Annotatsiya. *Maqolada O‘zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarda (FV) ish bilan band bo‘lmagan aholi toifalari va ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlari tahlil qilinadi. Global miqyosda favqulodda vaziyatlar sonining ortishi va iqlim o‘zgarishi fonida aholi xavfsizligini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylanganligi qayd etiladi. Tadqiqotda Milliy statistika ma’lumotlari, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Pensiya jamg‘armasi hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar bo‘yicha rasmiy hisobotlar tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, 2024-yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston ish bilan band bo‘lmagan aholisi, shu jumladan nogironligi bo‘lgan shaxslar va pensiya oluvchilar jami 10,864 mln. kishini tashkil etishi, bu umumiy aholi sonining taxminan 28–30% ini tashkil qilishi aniqlanadi. Tadqiqot shuningdek, hududiy farqlarni, ijtimoiy faollik, axborot texnologiyalari va jismoniy imkoniyatlardagi zaifliklarni aniqlab, favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikda maxsus yondashuv zarurligini ko‘rsatadi. Maqola ish bilan band bo‘lmagan aholining FVga tayyorgarlikdagi o‘rni va xavf ostidagi aholi toifalarini aniqlash hamda davlat siyosatini samarali shakllantirish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar beradi.*

Kalit so‘zlar: *Iqtisodiy faol bo'lmagan aholi, favqulodda vaziyatlar, ijtimoiy-demografik tavsiflar, nogironlar, qariyalar, iqtisodiy faol bo'lmagan aholi, ishsizlik, aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash.*

Mirzayev A.R., PhD
associate professor
Department of Management and Planning of the State System for
Emergency Prevention and Response
Civil Protection Institute;
Sotvoldiyev A.A.
second-year master’s student

THE IMPORTANCE OF STUDYING CATEGORIES OF THE UNEMPLOYED POPULATION AND THEIR SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS IN PREPARING FOR EMERGENCY SITUATIONS

Abstract. *The article analyzes the categories of non-working population and their socio-demographic characteristics in the Republic of Uzbekistan in case of emergency (FV). On a Global scale, it is noted that the increase in the number of emergencies and ensuring the safety of the population against the background of climate change has become a priority of state policy. The study analyzed data from National Statistics, the Ministry of poverty reduction and employment, the Pension Fund and official reports on persons with disabilities. According to the results, as of the end of 2024, the non-working population of Uzbekistan, including persons with disabilities and pension recipients, received a total of 10,864 million. the population is determined to be about 28-30% of the total population. The study also identifies territorial differences, vulnerabilities in social activity, information technology, and physical capabilities, suggesting the need for a special approach in emergency preparedness. The article provides scientific and practical recommendations for the role of the unemployed population in the preparation for the FV and for the identification of categories of the population at risk, and for the effective formulation of Public Policy.*

Key words: *Economically inactive population, emergency situations, socio-demographic characteristics, people with disabilities, the elderly, economically inactive population, unemployment, population training.*

Kirish.(Introduction) Globallashuv, urbanizatsiya va iqlim o‘zgarishi jarayonlari fonida favqulodda vaziyatlar (FV) soni va murakkabligi ortib borayotgan bir davrda, aholining xavfsizligi masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. BMTning Favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirish bo‘yicha hisobotida 1980-2020-yillar oralig‘ida global miqyosda ofatlar soni ikki baravar ortgani, iqlim bilan bog‘liq ofatlar esa uch baravar ko‘paygani qayd etilgan [8]. O‘zbekiston Respublikasida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilayotgan bo‘lsa-da, aholining barcha qatlamlari bu jarayonda bir xil darajada faol emas. Shu bois, ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlarini o‘rganish, favqulodda vaziyatlarda tayyorgarlik tizimini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Xalqaro tashkilotlar, jumladan UNDP va OECDning favqulodda vaziyatlardagi zaif aholi qatlamlari bo‘yicha yondashuvlari shuni ko‘rsatadiki, daromadi past, ijtimoiy faolligi sust va jismoniy imkoniyati cheklangan guruhlar FV paytida eng ko‘p zarar ko‘radigan toifa sanaladi [9]. Bu yondashuv O‘zbekiston sharoitida ham ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni alohida o‘rganishni taqozo etadi.

O‘zbekiston Respulikasi qonunchiligida yoki normativ-huquqiy hujjatlarida aynan ish bilan band bo‘lmagan aholining tarkibi va toifalari alohida ajratib ochib, berilmagan bo‘lsa-da, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentyabrdagi “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 754-son qaroriga asosan “Aholining barcha qatlamlarini favqulodda vaziyatlarda harakat

qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibi to‘g‘risidagi NIZOM”da “Ish bilan band bo’lmagan aholi” jumlasi qo‘llaniladi[1].

O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 20-oktabrdagi O‘RQ-642-son “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonuni 3-moddasida quyidagi asosiy tushunchalarga ta’rif beriladi:

band bo‘lmagan aholi (band bo‘lmagan shaxslar) - haq to‘lanadigan ishga yoki ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan mashg‘ulotga ega bo‘lmagan shaxslar;

Bu ta’rif xalqaro me’yorlarga juda yaqin. Xususan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) “inactive population” atamasini ish bilan band bo‘lmagan, mehnat bozorida faol qatnashmayotgan shaxslar sifatida belgilaydi [10]. Bu uyg‘unlik O‘zbekiston mehnat statistikasi bilan jahon standartlari orasidagi moslikni ta’minlaydi.

ishsizlik - mehnat bozorida talabga ega bo‘lmagan mehnatga layoqatli ishchi kuchining mavjudligi;

ish qidirayotgan shaxs — ishga joylashishda ko‘mak olish uchun mahalliy mehnat organlariga murojaat qilgan va u yerda ish qidirayotgan shaxs sifatida ro‘yxatga olingan shaxs;

Bandlik - fuqarolarning qonunchilikda taqiqlanmagan, o‘z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qanoatlantirish bilan bog‘liq bo‘lgan, ularga ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan faoliyatidir[2].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-dekabrdagi “Ishga joylashtirishga muhtoj aholi sonini aniqlash, shu jumladan, uy xo‘jaliklarini mehnat bilan bandlik masalalari bo‘yicha o‘rganishlar o‘tkazish, shuningdek, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini shakllantirish metodikasini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 1011-son qarorida esa, iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi tushunchasi, aholining mehnat bilan bandligini o‘rganish tartibi hamda iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi sonini aniqlash to‘g‘risida aniq ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Jumladan:

iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi - mehnat bilan band deb hisoblanmaydigan shaxslar, shu jumladan:

- ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olayotgan o‘quvchilar va talabalar;
- uy bekalari va bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan ishlamayotgan ayollar;
- ixtiyoriy ravishda mehnat bilan band bo‘lmagan shaxslar.

Shuningdek, mazkur qarorda nazarda tutilayotgan, ishlamayotgan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo‘lgan shaxslardan va yoshiga ko‘ra imtiyozli shartlarda pensiya oluvchi shaxslar ish bilan band bo‘lmagan aholi tarkibini tashkil etishi mumkin deb hisoblashimiz mumkin[3].

Iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi quyidagi formula bo‘yicha aniqlanadi:

EIP = PS + IW + VUP, bunda:

EIP - iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi;

PS - ishlab chiqarishdan ajralgan holda o‘qiyotgan o‘quvchilar va talabalar;

IW - bolalarni parvarish qilayotgan ishlamaydigan ayollar;

VUP - uy bekalari va mustaqil ravishda ish bilan band bo‘lmagan shaxslar, shuningdek, ko‘char va ko‘chmas mulkdan daromad oladigan ishlamaydigan shaxslar;

Axborot manbalari:

PS - statistika organlarining ma’lumotlari;

IW - statistika organlarining hisoblangan ma’lumotlari;

VUP - mehnat organlari tomonidan mehnat bilan bandlik masalalari bo‘yicha o‘rganishlar ma’lumotlari[3].

O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2024-yil yakuni bo‘yicha hisobotidan ma’lum bo‘lishicha, respublikada jami 19 mln. 998 ming mehnat resusrlari bo‘lib shundan, 4 mln. 899 ming nafar iqtisodiy nofaol aholi hissasiga to‘g‘ri keladi. Hududlar kesimida esa, **1-diagramma** orqali batafsil tushuntirilgan[4]. Eng yuqori ko‘rsatkichlar Samarqand viloyatida **586 ming** nafar, Toshkent shahrida **526 ming** nafar va Farg‘ona viloyatida **484 ming** nafar iqtisodiy nofaol aholi istqomat qiladi.

Shundan kelib chiqib, ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olayotgan o‘quvchilar va talabalar, uy bekalari va bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan ishlamayotgan ayollar va ixtiyoriy ravishda mehnat bilan band bo‘lmagan shaxslarni 2024-yil yakuniga ko‘ra, **4 mln. 899 ming nafar** ekanligini bilib olamiz.


O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining 2024-yil yakunlari bo‘yicha ochiq ma’lumotlari bazasidan olingan raqamlarga ko‘ra, Respublika bo‘yicha pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning umumiy soni **4 mln. 945 ming 300 nafar**ni tashkil etadi. Hududlar bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar Farg‘ona (561,5 ming nafar), Samarqand (532,8 ming nafar) va Qashqadaryo viloyati(460,6 ming nafar) ekanligi **2-diagramma** orqali tahlil qilingan[5].

Daryo internet nashrining 2025-yil 1-iyuldagi sahifalarida O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining O‘zbekistondagi nogironlar soniga oid hisoboti tahlil qilinadi. Statqo‘mga ko‘ra, mamlakatda nogironligi bo‘lgan shaxslar soni **1 million 20 ming nafar**ni tashkil etgan.


Nogironligi bo‘lgan shaxslar soni quyidagi guruhlar asosida taqsimlangan:

- 18 yoshgacha nogironligi bo‘lgan bolalar — 173,3 ming nafar;
- I guruh — 94,2 ming nafar;
- II guruh — 688,1 ming nafar;
- III guruh nogironligi bo‘lgan shaxslar soni — 65,2 ming nafar.

Hududlar kesimida tahlil qilinsa, Samarqand viloyatida 109,1 ming nafar, Qashqadaryo viloyatida 106,3 ming nafar va Farg‘ona viloyatida 93,7 ming nafar imkoniyati cheklangan shaxslar istiqomat qiladi. Yildan yilga nogironligi bo‘lgan shaxslar soni ortib bormoqda[6]. **1-jadval. 3-diagramma.**




1-diagramma



2-diagramma

	Hudud nomi	Nogironligi bo‘lgan shaxslar soni	Jamiga nisbatan ulushi % da
	O‘zbekiston Respublikasi	**1 020,8**	**100,0**
1.	Qoraqalpog'iston	68,2	6,7
2.	Andijon	87,6	8,6
3.	Buxoro	60,2	5,9
4.	Jizzax	43,9	4,3
5.	Qashqadaryo	106,3	10,4
6.	Navoiy	47,3	4,6
7.	Namangan	81,4	8,0
8.	Samarqand	109,1	10,7
9.	Surxondaryo	85,1	8,3
10.	Sirdaryo	37,8	3,7
11.	Toshkent v.	74,7	7,3
12.	Farg'ona	93,7	9,2
13.	Xorazm	60,6	5,9
14.	Toshkent sh.	64,9	6,4

1-jadval



3-diagramma

Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining 2023-yil hisobotida qayd etilishicha, nogironlikning global darajada ortishiga aholining qarishi, surunkali kasalliklarning ko‘payishi, ekologik omillar va tibbiy yordamning yetarli emasligi sabab bo‘lmoqda. Bu tendensiya Markaziy Osiyoda ham kuzatilmoqda [11].

Yuqoridagi statistik ko‘rsatkichlarni umumlashtirgan holda quyida aniqlaymiz:

ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta’lim olayotgan o‘quvchilar va talabalar, uy bekalari va bolalarni parvarish qilish bilan band bo‘lgan ishlamayotgan ayollar va ixtiyoriy ravishda mehnat bilan band bo‘lmagan shaxslarni 2024-yil yakuniga ko‘ra, **4 mln. 899 ming nafar**;

respublika bo‘yicha pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslarning umumiy soni **4 mln. 945 ming 300 nafar;**

mamlakatda nogironligi bo‘lgan shaxslar soni **1 million 20 ming nafar**ni tashkil etmoqda.

Shunday ekan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentyabrdagi “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 754-son qaroriga asosan, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida band bo‘lmagan aholi, shu jumladan jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar sifatida 2024-yil yakunlaridagi ma’lumotlarga ko‘ra, **kamida 10 mln. 864 ming 300 nafar** aholi favqulodda vaziyatlarga to‘g‘ri harakat qilishga tayyorlanishi lozim ekanligini aniqlab oldim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston aholisi **2025-yil 1-yanvar 37 mln. 543 ming 200 nafar** bo‘lsa, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalarida band bo‘lmagan aholi, shu jumladan jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar va pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchi shaxslar umumiy aholi sonining taxminan, 28-30% qismini tashkil etishini ko‘rishimiz mumkin.

So'nggi 40 yil ichida ofatlar soni uch baravar ko'paydi. So‘nggi ba’zi tarixiy faktlarni eslash shuni ko‘rsatadiki, keksa odamlar, ayniqsa jismoniy yoki kognitiv nuqsonlari bo‘lganlar, falokatda ayniqsa zaifdirlar. Yaponiyadagi 2011-yilgi zilzila va tsunamiga kelsak, hukumat idoralari 2012-yil avgust holatiga ko‘ra, ushbu voqea paytida va keyingi oylarda vafot etganlarning 90% qismi 70 yoshdan oshgan qariyalar ekanligini xabar qilishdi. Tsunami paytida qariyalar o‘limining asosiy sababi to‘lqinlardan qochish uchun vaqt yo‘qligi yoki boshqa odamning yordamisiz harakatlana olmaslik edi [7].

Butun dunyoda, yildan-yilga, falokatlar natijasida vafot etganlar va jarohat olganlar orasida o‘z jamoalari tarkibida qariyalarning juda yuqori foizi mavjud. Misol uchun, Yangi Orleanda 2005-yilda sodir bo‘lgan Katrina to‘foni davomida, 71% vafot etganlar qariyalar edi. O‘sha vaqtda aholi orasida qariyalar 15% ni tashkil qilgan[7].

Yuqoridagi statistik ma’lumotlar shuni izohlaydi-ki, favqulodda vaziyatlarga tayyorlashda ish bilan band bo‘lmagan aholi toifalari va ularning ijtimoiy-demografik xususiyatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ish bilan band bo‘lmagan aholi toifalari ko‘pincha iqtisodiy jihatdan kam ta'minlangan yoki ijtimoiy yordamga muhtoj bo‘ladi. Bu guruhlar favqulodda vaziyatlarda ko‘proq yordamga muhtoj bo‘lishi mumkin. Ularning ehtiyojlarini o‘rganish, ular uchun mos yordam dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi. Ijtimoiy-demografik xususiyatlar (yosh, jins, ma'lumot darajasi, oilaviy holat

va boshqalar)ni hisobga olish orqali favqulodda vaziyatlar uchun tayyorlik dasturlari individual ehtiyojlarga moslashtirilishi mumkin. Masalan, keksalar yoki nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun maxsus tayyorgarlik va yordam dasturlari yaratish zarur bo‘ladi. Aholining ish bilan band bo‘lmagan qatlamlarini o‘rganish, ularning ehtiyojlarini aniqlash va belgilangan resurslarni faqatgina zarur bo‘lgan hududlarga taqsimlashda yordam beradi. Bu, ayniqsa, cheklangan resurslarga ega bo‘lgan sharoitda samarali bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

Tadqiqot aralash yondashuv asosida tashkil etildi. Unda miqdoriy statistik tahlil hamda sifat jihatidan ijtimoiy-demografik tahlil o‘zaro uyg‘unlashtirildi. Tadqiqot dizayni ish bilan band bo‘lmagan aholining tarkibi, zaiflik darajasi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarligiga ta’sir etuvchi omillarni kompleks baholashga qaratildi. Tadqiqotda Milliy statistika ma’lumotlari, Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Pensiya jamg‘armasi Nogironligi bo‘lgan shaxslar bo‘yicha rasmiy hisobotlaridan foydalanildi. Iqtisodiy faol bo‘lmagan aholi soni, pensionerlar soni, nogironligi bo‘lgan shaxslar soni, ularning hududlar bo‘yicha taqsimotiga aniqliklar kiritildi. Bu ma’lumotlar ish bilan band bo‘lmagan aholi toifalarining huquqiy chegaralarini aniqlashda xizmat qildi. Qiyosiy tahlil asosida dunyoda sodir bo‘lgan tabbiy ofatlarda jabr ko‘rgan aholi takibidagi zaif qatlam ulushiga urg‘u berildi. Qonunchilikda “ish bilan band bo‘lmagan aholi” toifalarining aniqlanishi, ularning FVdagi maqomi va tayyorlikka qo‘yilgan talablar o‘rganildi. Integratsiyalashgan hisob-kitob asosida ish bilan band bo‘lmagan aholining yakuniy umumiy sonini (10,864 mln) aniqlashga e’tibor qaratildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results).

Tadqiqot davomida olingan statistik ma’lumotlar ushbu toifaga kiruvchi shaxslar nafaqat iqtisodiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha, balki jismoniy, psixologik, sog‘liqni saqlash, axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasi va ijtimoiy faolligi kabi mezonlar bo‘yicha ham yuqori darajada zaif guruh ekanligini namoyon qildi. Bu holat favqulodda vaziyatlar sodir bo‘lganda ular xavf ostida bo‘ladigan asosiy qatlamlardan biriga aylanishiga olib keladi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2024-yil yakunlari bo‘yicha ish bilan band bo‘lmaganlar sonining 10,864 milliondan ortiq bo‘lishi O‘zbekiston demografik tarkibida mazkur toifa juda katta ulushni taxminan 25-30% atrofida ekanligi hamda aholi tarkibida mazkur qatlam ulushining ortib borishi tendensiyasi kuzatilishi ehtimoli yuqoriligini eslatadi. Bu esa davlatning favqulodda vaziyatlarda aholini himoya qilish va tayyorlash strategiyasida mazkur guruh uchun alohida yondashuvni talab qiladi. Hududlar kesimida farqlar yanada keskin namoyon bo‘ldi. Samarqand, Farg‘ona, Qashqadaryo viloyatlari va Toshkent shahri kabi aholisi zich hududlarda ish bilan band bo‘lmagan aholi soni eng yuqori. Bu viloyatlar, ayniqsa, tabiiy xavf omillariga (zilzila, suv toshqinlari, sel, ko‘chki) moyil bo‘lgan hududlar qatoriga kiradi. Demak, ushbu hududlarda FVga zaif guruhning katta miqdorda to‘plangani potentsial xavf darajasini yanada oshiradi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonning aksariyat hududlarida boshpanalar, ogohlantirish tizimlari nogironligi bo‘lgan shaxslar ehtiyojlariga moslashtirilmagan.

Ish bilan band bo‘lmagan boshqa toifalar - uy bekalari, ishsizlar, vaqtinchalik ishlamayotgan fuqarolar ham axborotga kirish imkoniyati bo‘yicha zaif guruh sanaladi. Ularning aksariyati raqamli texnologiyalardan kamroq foydalanishi, internet bilan qamrab olinmagan hududlarda yashashi, rasmiy axborot kanallaridan muntazam foydalanmasligi ogohlantirish tizimlarining ularga o‘z vaqtida yetib bormasligiga olib keladi. Bu esa tezkor choralar ko‘rish jarayonida kechikishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Tadqiqotdan kelib chiqadigan xulosalar o‘rnida aytish mumkinki, favqulodda vaziyatlarga tayyorlash dasturlarida ijtimoiy-demografik xususiyatlarni inobatga olish majburiydir. Yosh, jins, sog‘liq holati, oilaviy vaziyat, nogironlik darajasi va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati kabi mezonlar bo‘yicha risklarni baholash, favqulodda vaziyatlarda aholining xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, hududiy jihatdan farqlarni hisobga olgan holda resurslarni samarali taqsimlash, zarur hududlarga qo‘shimcha tayyorgarlik choralari joriy qilish davlat siyosatining samaradorligini oshiradi.

Shu sababli, davlatning favqulodda vaziyatlar bo‘yicha strategik rejalashtirishida ushbu guruhni alohida e’tiborga olish, ularning xavfsizligini ta’minlash va tayyorgarlik darajasini oshirish lozim. Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

jahon tajribasini inobatga olgan holda ish bilan band bo‘lmagan aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash tartibi to‘g‘risidagi qaror yoki nizom ishlab chiqilishi;

Samarqand, Farg‘ona, Qashqadaryo va Toshkent shahridagi aholi zich hududlarda favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik markazlarini zamonaviy ogohlantirish tizimlarini modernizatsiya qilish va resurslarni samarali taqsimlash zarur;

ish bilan band bo‘lmagan aholining favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo‘yicha o‘qitish, treninglar va seminarlar orqali bilim darajasini oshirish.

Ish bilan band bo‘lmagan aholining ijtimoiy-demografik xususiyatlarini chuqur o‘rganis h, statistik ma’lumotlarga tayanib, hududiy va toifa bo‘yicha tahlil qilish davlat siyosatining favqulodda vaziyatlarda samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa nafaqat inson hayotini himoya qilish, balki tabiiy ofatlar, texnogen va ijtimoiy xavflar yuzaga kelganda jamiyatning barqarorligini ta’minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-sentyabrdagi “Aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 754-son Qarori.

2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bunday vaziyatlarda harakat qilish davlat tizimi faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 171-sonli Qarori.

3.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-dekabrdagi “Ishga joylashtirishga muhtoj aholi sonini aniqlash, shu jumladan, uy xo‘jaliklarini mehnat bilan bandlik masalalari bo‘yicha o‘rganishlar o‘tkazish, shuningdek, mehnat resurslari, bandlik va aholini ishga joylashtirish balansini shakllantirish metodikasini takomillashtirish to‘g‘risida”1011-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligining 2024-yil yakuni bo‘yicha hisoboti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining 2024-yil yakunlari bo‘yicha ochiq ma’lumotlari bazasi.
6. Daryo internet nashrining 2025-yil 1-iyuldagi sahifalaridagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining O‘zbekistondagi nogironlar soniga oid hisoboti”.
7. Xusanova S.I., Sultonov R.B. “Aholini favqulodda vaziyat xavfi yoki yuzaga kelishi to‘g‘risida xabardor qilishni tashkil etish”. Fan, muhofaza, xavfsizlik. Ilmiy-amaliy jurnal. №1(15), 2025 y.
8. Ergashev A. “*Aholining favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo‘yicha tayyorgarligi tahlili”.* – 2022.
9. HSOA jurnali Gerontologiya va geriatriya jurnali ISSN: 2381-8662.
10. UNDRR Global baholash hisobotlari-2022. UPSC eslatmalari.

УДК 614.841.3

Mirzayev A.R., f.f.f.d. PhD
FVDTni boshqarish va rejalashtirish
kafedrasi dotsenti
Fuqaro muhofazasi instituti
Qodirov R.I.
2-bosqich magistranti

FAVQULODDA VAZIYATLARDA AHOLINI OGOHLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlarda aholining barvaqt ogohlantirish tizimini takomillashtirishning muammo va yechimlari yoritilgan . Mahalliy hamda xalqaro tajribalar tahlili asosida texnologik infratuzilma darajasi, idoralararo axborot almashinuvi, jamoatchilik tayyorgarligi va ogohlantirish tizimlarining samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, milliy ogohlantirish tizimini modernizatsiya qilishda texnologik integratsiya, boshqaruvning markazlashuvi, ko‘p kanalli ogohlantirish mexanizmlarini joriy etish va aholi o‘rtasida xavfsizlik madaniyatini oshirish zarurligi aniqlangan. Shuningdek, Yaponiya, AQSH va Shveytsariya tajribasi asosida O‘zbekiston sharoitiga mos takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *favqulodda vaziyatlar, barvaqt xabardor qilish tizimi, axborot almashinuvi, xavfsizlik madaniyati, texnologik integratsiya, idoralararo hamkorlik, tizim samaradorligi.*

Mirzayev A.R., PhD,
associate professor
Department of Management and Planning of the State System for Emergency Prevention and Response, Civil Protection Institute
Qodirov R.I.
second-year master’s student

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR IMPROVING THE PUBLIC WARNING SYSTEM IN EMERGENCY SITUATIONS

Abstract: *This article examines the scientific and practical foundations for improving the early warning system for the population in emergency situations in the Republic of Uzbekistan. Based on an analysis of national and international practices, the study evaluates the level of technological infrastructure, interagency information exchange, public preparedness, and the effectiveness of existing warning systems. The findings highlight the need for technological integration, centralized management, multi-channel warning mechanisms, and enhanced public safety awareness for the modernization of the national early warning system.*

Recommendations adapted to Uzbekistan's context are proposed using best practices from Japan, the United States, and Switzerland.

Keywords: *emergency situations, early warning system, information exchange, safety culture, technological integration, interagency cooperation, system efficiency.*

Kirish. Jamiyatning hozirgi taraqqiyoti inson va tabiat o‘rtasidagi ziddiyatlarning ortishi bilan tavsiflanadi. U yaratgan texnosfera va xo‘jalik yuritish usuli tabiatga ta’sir ko‘rsatishning qudratli omillariga aylandi. Demografik portlash, sanoat sohasining o‘sishi va eskirishi, qishloq xo‘jaligining rivojlanishi hamda urbanizatsiya antropogen yuklarning keskin oshishiga sabab bo‘lib, ekologik xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda.

Respublikamizning katta qismi ham sezilarli darajada iqlim o‘zgarishi ta’siri doirasida bo‘lib, iqlim o‘zgarishi va uning oqibatlari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga, odamlarning turmush tarzi va sog‘lig‘iga shuningdek, iqtisodiy obyektlarning barqaror faoliyat olib borishiga o‘z salbiy ta’sirini ko‘rsatib kelmoqda. So‘nggi yillarda iqlim o‘zgarishi oqibatida respublika hududida tabiiy ofatlar soni sezilarli darajada oshdi. Tabiiy ofatlarning o‘rtacha soni 2001-2010- yillarda 115 ta holatni, 2011-2022- yillarda 126 ta holatni tashkil etgan [1].

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarni inobatga olgan holda, O‘zbekiston Respublikasida aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Bunday sharoitlarda aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xavflardan himoya qilish, favqulodda vaziyatlar to‘g‘risida barvaqt va ishonchli xabardor qilish, shuningdek, zarur amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish samarali boshqaruv tizimlarining mavjudligiga bevosita bog‘liqdir[2].

Shu bois, aholini favqulodda vaziyatlarga tayyorlash, ularning xabardorlik darajasini oshirish va mazkur jarayonning institutsional hamda texnologik asoslarini takomillashtirish zamonaviy ilm-fan va amaliyotda dolzarb masala sifatida ko‘rilmoqda.


Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Aholini favqulodda vaziyatlarda barvaqt ogohlantirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha mahalliy va xalqaro darajada ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan hamda olib borilmoqda. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, tizimni samaradorligi asosiy uch omil ya’ni, texnologik infratuzilmaning ta’minlanganligi, boshqaruv mexanizmlari hamda aholini tayyorgarlik darajasini o‘zaro uyg‘un holda ishlagan taqdirdagina samara beradi. Mazkur omillarning kompleks integratsiyasi favqulodda vaziyatlarda xavfni erta aniqlash, axborotni tezkor yetkazish va aholining to‘g‘ri harakatlanishini ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bu borada mahalliy tadqiqotchilar tomonida quyidagicha fikr va mulohazalar bildirilgan, “Favqulodda vaziyatlarda axborot almashinuvi markazlashmaganligi va hududiy organlar o‘rtasidagi koordinatsiya yetarli emasligi tizim samaradorligini pasaytiradi” - deya takidlangan[3].

Shuningdek, S.I.Xusanova aholini tayyorgarlik masalasiga e’tibor qaratib, “Sohadagi amalga oshirilayotgan ishlar va erishilgan qator ijobiy o‘zgarishlarga qaramasdan tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarda aholining tezkorlik bilan harakat qilishi, bunday vaziyatlardan aholini ogohlantirish va unga tayyorlash tizimining holatini takomillashtirish maqsadida, ishlarni yanada jadallashtirish, bunda barcha shart-sharoitlarni yaratish, bor imkoniyatlardan samarali foydalanish, aholining favqulodda vaziyatlardan ogoh bo‘lishlari borasida olib boriladigan targ‘ibot-tashviqot ishlarini yanada kuchaytirish darkor”– deb yozadi.Bu fikrlar fuqarolarning xabardorlik va amaliy ko‘nikmalarini oshirish zarurligini ko‘rsatadi[4].

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlarida soha yuzasidan texnologik omil ham alohida ta’kidlangan. “Aholini favqulodda vaziyatlar xavfidan muhofazalashning maqbul usuli bu ularni barvaqt ogohlantirish. Biroq bu ma’lumotlarni to‘plashning bir muncha qiyinchiliklari mavjud bo‘lib, doimiy kuzatuvni talab qilinishi, kuzatuv obyektlarining katta va ko‘pligi, foydalanilayotgan texnikalarning qimmatligidir. Bu chora-tadbirlarni amalga oshirishda ko‘p kuch va xarajatlarni talab qilsada favqulodda vaziyatni oldini olish va bartaraf etishda yaxshi samara beradi [5].

Yaponiyada aholini favqulodda vaziyatlardan milliy ogohlantirish tizimi J-Alert (Zenkoku Shunji Keiho System) mavjud bo‘lib - aholini turli favqulodda vaziyatlar haqida tezda xabar berish va ogohlantirish uchun mo‘ljallangan. Yaponiyalik ekspertlarning fikriga ko‘ra, 2011-yil yuzaga kelgan dahshatli sunamidan aholini so‘ng quyidagicha xabardor qilingan (1-diagramma). Ushbu tizim sun’iy yo‘ldoshlar orqali ishlaydi, bu esa rahbarlar va aholiga mahalliy ommaviy axborot vositalari va sirenalar orqali tezkor xabar berishga imkon beradi[6].



1-diagramma. Yaponiya aholisini xabardor qilish tizimi taqsimoti

AQShning “PLAN” (Personal Localized Alerting Network, PLAN) tizimi esa ko‘p kanalli yondashuv bilan ajralib turadi. Ushbu tizim aholini bevosita mobil qurilmalar orqali hududiy xavflar haqida ogohlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi” [7].

Shveytsariyada Alertswiss tizimi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham integratsiyalashgan axborot almashinuvi asosiy ustunlik sifatida ko‘rsatiladi. Shveytsariya Federal Fuqaro muhofazasi boshqarmasi shunday yozadi: “Alertswiss platformasi real vaqt rejimidagi ogohlantirish, tavsiya va evakuatsiya ko‘rsatmalarini birlashtirgan milliy axborot tizimidir”[8].

Keyinchalik Shveytsariya aholisiga hukumat tomonidan e’lon qilingan rejalarga ko‘ra, favqulodda vaziyat yuzaga kelganda rasmiy matnli ogohlantirishlar yuboriladi. Federal kengash, shuningdek, yaqinlashib kelayotgan har qanday xavf haqida jamoatchilikni xabardor qilish maqsadida mamlakat uchun AlertSwiss ilovasini modernizatsiya qilishini tasdiqlagan.

Global miqyosda esa erta ogohlantirish tizimlarining samaradorligi bo‘yicha BMTning UNISDR hisobotida quyidagicha xulosa berilgan: “Barvaqt ogohlantirish tizimlariga sarmoya kiritish har bir dollar evaziga favqulodda vaziyatlar oqibatlarini kamaytirishda 6-7 dollar iqtisodiy foyda beradi” [9].

O‘zbekistonda barvaqt ogohlantirish tizimini modernizatsiya qilish uchun uch asosiy yo‘nalish alohida e’tiborga loyiq:

1. texnologik innovatsiyalarni keng joriy etish;
2. institutsional va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish;
3. aholining xavfsizlik madaniyatini oshirish.

Yuqoridagilarni inobatga olib mahalliy hamda xorijiy manbalar o‘rtasida konseptual uyg‘unlik mavjudligini xulosa qilish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqotda favqulodda vaziyatlarda aholining barvaqt ogohlantirish tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalarga kelish maqsadida tahliliy-qiyosiy, kontent-tahlil, ekspert baholash metodlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, favqulodda vaziyatlarda aholini barvaqt ogohlantirish tizimlarining rivojlanish darajasi, mavjud kamchiliklari hamda xalqaro tajribalar bilan solishtirilgan holda O‘zbekiston sharoitiga mos takliflar ishlab chiqildi. Texnologik infratuzilmaning holati bo‘yicha to‘xtaladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi aholisini favqulodda vaziyatlar ro‘y berish xavfi yoki sodir bo‘lganligi haqida xabardor qilishning avtomatlashtirilgan tizimi bosqichma-bosqich joriy etilgan bo‘lsa-da, ularning integratsiyalashuvi yetarli emasligi aniqlandi. Bu holat favqulodda vaziyat yuzaga kelganda xabarlarni kechikishiga yoki noto‘g‘ri tarqalishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Xalqaro tajribalar bilan taqqoslanganda, Yaponiyada zilzila bo‘yicha aniqlash va ogohlantirish tizimi millisekundlar ichida aholini xabardor qila olishi qayd etilgan. JMA mutaxassislari fikriga ko‘ra, “Erta ogohlantirishning samaradorligi axborotning tezligi bilan belgilanadi”[10].

Shuningdek, AQSHning FEMA tizimi xavfli hududlarda “Wireless Emergency Alerts (WEA)” orqali geolokatsiya asosida xabarlarni soniyalar ichida yuborishi bilan ajralib turadi. Bu texnologiya O‘zbekiston sharoitida ham qo‘llanishi mumkin bo‘lgan samarali model hisoblanadi[11].

Tahlil davomida aniqlanishicha, O‘zbekistonda ogohlantirish tizimlarining markazlashtirilishi bo‘yicha o‘zgarishlar boshlangan bo‘lsa-da, idoralararo integratsiya yetarli emas. Mahalliy olimlarning fikricha, “Favqulodda vaziyatlarda axborotni boshqarish bir markazga to‘plangan holda amalga oshirilmasa, xizmatlar o‘rtasida koordinatsiya sustlashadi”[12].

Shveytsariya ogohlantirish tizimi bir markaz orqali yuritiladi. Federatsiya hisobotida ta’kidlanishicha, Alertswiss tizimining samaradorligi “Barcha federal va kanton xizmatlarini yagona boshqaruv ostida birlashtirilganida namoyon bo‘ladi”[13].

O‘zbekistonda esa FVV, gidrometeorologiya xizmati, mahalliy hokimliklar va sog‘liqni saqlash tizimi o‘rtasida axborot almashinuvi avtomatlashtirilmagan. Bu esa favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilishni cheklaydi.

A.Ergashevning tadqiqotida aytilishicha, jamoatchilik, aholining xabardorlik va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik darajasi yetarli emas. “Aholining favqulodda vaziyat vaqtida to‘g‘ri harakat qilish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalari sust bo‘lib, ogohlantirish tizimlarining samaradorligi ko‘p jihatdan shu omilga bog‘liq” deb ta’kidladi[14].

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda o‘tkazilgan ekspert so‘rovlarida respondentlarning 68% qismi favqulodda vaziyat bo‘yicha mashg‘ulotlarda ishtirok etmaganini qayd etgan. Bu esa, jamoatchilik ongini oshirish zarurligidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar.

Mahalliy va xalqaro tajribani tadqiq qilish orqali quyidagi xulosaga kelish mumkin. Barvaqt ogohlantirish tizimlarining samaradorligi bir nechta omillar uyg‘unligiga bog‘liqligi, ya’ni texnologik tayyorgarlik, boshqaruv tizimining markazlashuvi, idoralararo hamkorlik va aholining xabardorlik darajasidir. O‘zbekistonda ham ushbu tizimlarni modernizatsiya qilish bo‘yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda, biroq texnologik, tashkiliy va ijtimoiy jihatlar bo‘yicha takomillashtirishga muhtoj sohalar mavjud.

Yuqoridagi ma’lumotlarga asosan, quyidagi qator takliflarni tavsiya etish mumkin:

1. Yagona milliy barvaqt ogohlantirish platformasini yaratish. Bu platforma barcha ma’lumotlar (seysmik, meteorologik, gidrologik, ekologik) real vaqt rejimida yig‘ilib, avtomatik tarzda qayta ishlanishi kerak.

2. Texnologik modernizatsiya: AI, GIS va dronlardan keng foydalanish.

3. Ko‘p kanalli ogohlantirish tizimlarini rivojlantirish. SMS, mobil ilova, radio, televideniye, sirenalar, ijtimoiy tarmoqlar - barchasi yagona tizimga ulangan bo‘lishi kerak.

4. Aholini favqulodda vaziyatlarda xabardor qilish bo‘yicha muntazam ravishda o‘quv mashq va mashg‘ulotlarini (maktablar, oliy ta’lim muassasalari, mahallalar, korxonalar darajasida) o‘tkazish.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi “Iqlim o‘zgarishi va tabiiy ofatlar xavfiga nisbatan milliy harakatlar rejasini ishlab

chiqish hamda samarali amalga oshirishni tashkil etish to‘g‘risida”gi № 362-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 11-avgustdagi “Favqulodda vaziyat ro‘y berish xavfi yoki favqulodda vaziyat ro‘y berganligi haqida xabar berishning avtomatlashtirilgan tizimini rivojlantirish hamda undan samarali foydalanishni tashkil etish to‘g‘risida”gi №361-son qarori.
3. Soliyev R.I. “Favqulodda vaziyatlar boshqarmasida aloqa va xabar berish tizimi samaradorligini oshirish (Navoiy viloyati misolida)” magistrlik dissertatsiyasi. Fuqaro muhofazasi instituti. Toshkent. – 2023 y.
4. Xusanova S.I., Sultonov R.B. “Aholini favqulodda vaziyat xavfi yoki yuzaga kelishi to‘g‘risida xabardor qilishni tashkil etish”. Fan, muhofaza, xavfsizlik. Ilmiy-amaliy jurnal. №1(15), 2025 y.
5. Abduraxmonov J.Sh., Saidxo‘jayeva N.S. “Favqulodda vaziyatlarni bashoratlash va ma’lumotlar bazasini takomillashtirish”. – Academic Research in Educational Sciences. Volume 3, Issue 6, 2022 y.
6. Средства оповещения [Электронный ресурс] – свободный режим доступа: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=7077
7.Оповещение и информирование населения [Электронный ресурс]– свободный режим доступа: http://89.mchs.gov.ru/document/468213.]
8. Emergency text alerts to be introduced in Switzerland. – Shveytsariya Federal Kengashi axboroti, 2021.
9. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). *2018 Global Assessment Report.* – BMT, 2018.
10. Japan Meteorological Agency (JMA). *Earthquake Early Warning System.* – Tokyo, 2022.
11. FEMA. Wireless Emergency Alerts (WEA). – Washington, D.C., 2023.
12. To‘xtayev M. “*Favqulodda vaziyatlarda axborotni boshqarishning markazlashgan tizimi”.* – Toshkent, 2021.
13. Swiss Federal Civil Protection Office. *Alertswiss Emergency Communication System Report. – Bern, 2021.*
14. Ergashev A. “*Aholining favqulodda vaziyatlarda harakat qilish bo‘yicha tayyorgarligi tahlili”.* – 2022.

Mirzoeva I.E., PhD on Geographical Sciences
senior lecturer
Department of Ecology and Geography of
Bukhara State University
Shomurodova Sh.Sh.
3rd year student
Geography direction
Bukhara State University

ECOLOGICAL CONDITIONS OF LADSCAPES SURROUNDING MURUNTOV GOLD MINE

Abstract: *This article provides detailed information about the geographical features of the Muruntov gold mine and the ecological conditions of the surrounding landscapes.*

Keywords: *gold mine, Muruntov, landscape, environmental safety, man-made waste, geopolitical transformation, landscape, industry, seismic activity, ecology, reclamation.*

With the support of our state and the efforts of geologists, a unique mineral and raw material base has been created in the country, which has become the basis for the development of the economy of the Republic of Uzbekistan. It is planned to expand prospecting and geological exploration in Uzbekistan starting from 2015 by studying 40 new promising areas that will ensure the growth of gold reserves. The world famous Muruntov gold quartz deposit is the largest deposit on the Eurasian continent. The Muruntov quarry is a huge facility, where about 80 percent of Uzbekistan's gold is mined[3].

The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated August 25, 2022 “On measures to establish environmental requirements and environmental protection standards in the mining and metallurgical industry based on international standards” also plays an important role in the implementation of work in this area.

Extraction of minerals, especially gold, from the earth's crust is of great importance for the economy of any country. However, this process poses a great threat to landscapes and the environment. The negative consequences of landscape changes, as well as the degree of soil and vegetation changes in the Zarafshan region, one of the largest deposits in Central Asia, including the Muruntov gold deposit in Uzbekistan, and its surroundings, were ecologically analyzed. The ecological criterion is also important in determining the dynamic condition of landscapes. Because their most rapidly changing and most affected component is biota. Therefore, the results of landscape ecological research are very important in developing scientific foundations for measures to protect nature and rationally use natural resources[3].

Muruntov gold deposit is a deposit in the Muruntov ore field region of the Central Kyzylkum. It is located 180 km north of Navoi, 40 km east of Zarafshan, at the southern foot of Tomditov. The scale of ore reserves, the convenience of technological conditions for ore extraction, the high quality of the produced products and other characteristics make it one of the most unique deposits in the world. The presence of gold ores in Central Asia, in particular in the Central Kyzylkum and Nurota mountains, has been known since the 6th-5th centuries BC. The first special research work on the search for gold deposits in the country was carried out by I.V. Mushketov, G.D. Romanovsky, G.D. Obruchyev and others. The possibility of gold deposits in the Central Kyzylkum was predicted by geologists A.Ye. Fersman and D.I. Shcherbakov based on geological studies in the 30s of the 20th century. In the 1930s, several quartz and quartz-feldspar veins with gold particles were discovered in the southern foothills of Tomditov, and in 1934 a zone of gold mineralization was identified near the village of Besapan. After that, extensive gold prospecting and exploration work was carried out in the areas of Besapan, Oltintov, Takhtatov, and in the siliceous shales on the southern slopes of Tomditov. [6]

As a result of mining, the soil layer is destroyed, its productivity decreases, and chemical pollution occurs. As a result, the habitats of wild animals in the flora and fauna around the mine are reduced, and some species may disappear. In particular, it can be seen that the productivity of fruit orchards and crops has decreased. During the mining process in the quarries, various types of dust and gases, radioactive substances are released into the atmosphere. These, in turn, are raised into the atmosphere by winds or the active movement of large quarry vehicles, negatively affecting the respiratory system, and can even spread to surrounding agricultural areas and damage crops. As a result of the diversion or pollution of part of the water from mountain streams for the needs of the Muruntov gold mine, the population faces a shortage of drinking water. In particular, air and water pollution around the mine causes an increase in various diseases among the local population, especially respiratory and digestive system diseases. Water resources in the mine are mainly brought through canals built into the Amu Darya. Gold minerals are not found alone, but may also contain other particulate elements, and during the process of extracting and purifying gold from them, they also affect the composition of the water and turn into wastewater. Such water is unsuitable for use in the economy and is not allowed to be absorbed into groundwater. Therefore, it is sent to special landfills for storing wastewater. In such special hydro-landfills, wastewater is filtered, part of the surface water is removed, processed and directed to the mining industry. The remaining water is evaporated under the influence of sunlight, and harmful substances are collected from below. In 2020, 977 hectares of land were reclaimed, and in 2021, 307.9 hectares of land were reclaimed. In total, about 37 thousand hectares of land were reclaimed during the operation of the combine [7].

Before the mining industry began, these lands had desert-like soils (gypsum, sandy saline loam, and sandy loam). Reclamation (restoration) processes are also

being carried out to prevent the landscapes of the soils around the mines from becoming too difficult. [2]

In conclusion, today, that is, in the era of scientific and technological development, the impact on nature and its resources is increasing. The scope of maximum land use, development of new lands, exploration and exploitation of underground resources, and the use of water, soil, plant, and animal resources is expanding. It can be concluded that only a society that can plan its development for the long term and use natural resources for its own purposes can use nature rationally.

REFERENCES

1. Набиев Э., Қаюмов А. Ўзбекистоннинг иқтисодий салоҳияти. – Т: «Академия», «Университет», 2000.
2. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. Учебник. – М.: Закон и право ЮНИТИ, 1997.
3. National report on the state of the environment and the use of natural resources in the Republic of Uzbekistan, 2008. – 98 p.
4. Zokirov Sh.S., Boymirzaev K.M. Fundamentals of Landscape Science (text of lectures). – Namangan, 2009. – 95p.
5. Тухтаев А. С. Экология. Ўқув қўлланма. – Т.: «Ўқитувчи»,1998. – 192 б.
6. Abduazimova Z.M. Actual problems of regional geology of ancient strata of the Kyzylkum-Nurota region. //Geology and mineral resources, 2007. – No.5. – P.305-320.
7. Golovanov I.M., Isakhodjayev B.A. Large and unique solid mineral deposits of Uzbekistan: geodynamic and formational systematics of geological and industrial types // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Tashkent (October 10-11), 2007. – P. 67-73.

UDC: 378.147:57.086

Mirzoyeva M.A.
assistant
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
ORCID https://orcid.org/0009-0006-9474-6146

APPLYING THE CASE STUDY METHOD IN TEACHING GENETICS AS A FACTOR IN ENHANCING PROFESSIONAL COMPETENCE

Abstract: *This scientific paper analyzes the significance of applying the case study method in the process of teaching the subject Genetics in higher education institutions for the formation of students' professional competence. It is scientifically substantiated that the use of the case study method contributes to the development of students' analytical thinking, decision-making skills in problem situations, and the ability to integrate theoretical knowledge with practical application. The results of the pedagogical experiment demonstrate that an educational process based on the case study method significantly increases the effectiveness of students' professional training.*

Keywords: *genetics, case study method, professional competence, innovative education, problem-based learning.*

Introduction

In the global education system, orienting the content of higher education toward a competence-based approach is recognized as one of the priority tasks. Particularly in teaching natural sciences, including genetics, it is essential not only to provide students with theoretical knowledge but also to develop their ability to apply this knowledge in practice, analyze problem situations, and make scientifically grounded decisions.

Genetics is a discipline based on complex concepts, abstract models, and calculations. Therefore, its full mastery through traditional lecture-based and reproductive teaching methods often causes certain difficulties for students. For this reason, there is an increasing need to introduce innovative pedagogical technologies into the educational process, including the case study method.

The case study method is aimed at teaching students through real or near-real problem situations and serves to develop analytical thinking, creative approaches, and professional competence. Applying this method in teaching genetics makes it possible to increase students' interest in the subject, enhance independent learning activity, and improve the quality of professional training.

Main part

One of the main tasks facing the higher education system today is to train competitive specialists who are capable of independent thinking and possess well-developed professional competencies. In this process, teaching genetics occupies an

important place, as this discipline forms students' skills in understanding, analyzing, and applying hereditary processes in practice.

Traditional teaching methods are not always effective in ensuring deep mastery of the complex concepts of genetics. Therefore, the introduction of innovative pedagogical technologies, including the case study method, into the educational process is considered highly relevant. The case study method is organized on the basis of real or close-to-real problem situations and transforms students into active participants in the learning process.

The use of the case study method in teaching genetics contributes to the development of the following components of professional competence:

- competence in identifying and analyzing problems;
- skills of making scientifically grounded decisions;
- abilities to interpret genetic data and draw conclusions;
- teamwork and communication competence.

The results of the conducted pedagogical experiment showed that in groups where the case study method was applied, students demonstrated a higher level of interest in the subject, increased independent learning activity, and a higher degree of professional preparedness compared to groups taught using traditional methods.

MATERIALS AND RESEARCH METHODS

This study was aimed at determining the effectiveness of applying the case study method in teaching the subject *Genetics* in higher education institutions for the formation of students' professional competence.

The research was organized in the form of a pedagogical experiment and included control and experimental groups. In the control group, the educational process was conducted using traditional teaching methods, while in the experimental group, instruction was based on the case study method.

The following research methods were applied:

- **Pedagogical observation** – to identify students' activity during classes, communication level, and independent thinking skills;
- **Interviews and questionnaires** – to assess students' interest in the subject and their attitudes toward teaching methods;
- **Testing** – to determine the level of theoretical knowledge;
- **Practical tasks and case analysis** – to evaluate students' ability to make decisions in problem situations and analyze genetic data;
- **Statistical analysis** – to conduct a comparative analysis of the obtained results using percentage indicators.

Evaluation Criteria

The level of students' professional competence was assessed based on the following indicators:

- level of knowledge acquisition (high, medium, low);
- formation of practical skills;
- analytical thinking and independent decision-making ability;
- teamwork and communication culture.

Results

During the study, the impact of using the case study method in teaching genetics on students' knowledge level and professional competence formation was examined. The pedagogical experiment was conducted in both experimental and control groups.

At the initial stage of the experiment, the level of theoretical knowledge in both groups was almost the same, with a relatively low proportion of students demonstrating a high level of achievement. At the final stage, a significant increase in the number of students with a high level of knowledge was observed in the experimental group.

Table 1

Level of students' theoretical knowledge in experimental and control groups (%)

Groups	High (%)	Medium (%)	Low (%)
Experimental group (initial)	30	42	28
Experimental group (final)	58	32	10
Control group (initial)	28	44	28
Control group (final)	36	40	24

Note: The table shows that the proportion of students with a high level of knowledge significantly increased in the experimental group where the case study method was applied.

In the experimental group:

✓ the proportion of students with a high level of knowledge increased from 28–32% to 55–60%;

✓ the indicators of the medium level remained relatively stable;

✓ the proportion of students with a low level of knowledge decreased significantly.

In the control group, although a certain increase in the level of knowledge was observed, it was not statistically significant.

Table 2

Level of practical skills development among students (%)

Groups	roblem solving (%)	Data analysis (%)	rtual experiments (%)
Experimental group (initial)	35	32	28
Experimental group (final)	65	62	58
Control group (initial)	34	33	30
Control group (final)	45	42	38

Note: Classes organized on the basis of the case study method enhanced students' practical activity and skills in performing virtual experiments.

In assessing practical skills, students':

✓ abilities in solving genetic problems;

✓ analyzing data;

✓ performing virtual experiments were taken into account.

In the experimental group taught using the case study method, students demonstrated a high level of practical activity, actively participating in independent decision-making in problem situations and drawing scientifically grounded conclusions.

In contrast, in the control group, practical skills remained predominantly reproductive in nature.

Table 3

Comparative results of professional competence formation (%)

Indicators	Experimental group	Control group
Analytical thinking	68	44
Problem-based decision making	64	41
Application of theory in practice	66	43
Teamwork skills	70	48

Note: The obtained results indicate a significant increase in students' knowledge level and practical skills in the experimental group through the application of the case study method.

CONCLUSION

The research results show that in groups where the case study method was applied, professional competence was formed at a higher level in the following areas:

- analytical thinking;
- scientific problem solving;
- teamwork and communication;
- integration of theoretical knowledge with practical application.

The results, analyzed through tables and diagrams, confirm the importance of the case study method in increasing the effectiveness of the educational process.

In conclusion, the application of the case study method in teaching genetics is an effective factor in the formation of professional competence. This method develops students' ability to integrate theoretical knowledge with practice, analyze problem situations, and find scientifically grounded solutions. The widespread implementation of the case study method in the educational process contributes to improving the effectiveness of teaching genetics.

REFERENCES

Азизов, А. (2022). Педагогические технологии и инновации. Ташкент: Издательство педагогики Узбекистана.

Каримова, Д., & Тухтаев, Б. (2021). Современные подходы к преподаванию генетики. Инновации в высшем образовании, 5(3), 45–52.

Имомова, Д. А., Мирзаева, М. А., & Алимкулов, С. О. У. (2016). Навыки педагога в использовании инновационных технологий в системе современного образования. International scientific review, (9 (19)), 78-79.

Мирзоева, М. А. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛУ. Журнал естественных наук, 1(1).

Mirzoeva, M. (2022). IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE BIOLOGY TEACHERS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 1(4), 293-296.
Mirzoeva, M. (2022). ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Science and innovation, 1(B4), 293-297.
Mirzoeva, M. A. (2023). Methods for the Systematic Formation of Biology Teachers as Specialists. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(2), 131-134.
Akhtamovna, M. M. (2023). Digitalization–Development. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(2), 128-130.
Мирзоева, М. А. (2022). Компоненты Профессиональной Компетентности. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 228-234.
Mirzoeva, M. A. (2023). Oliy Ta'lim Tizimida Genetikani O'qitishning Tizimli Tahlili. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 302-307.
Mirzoeva, M. A. (2023). Teaching Genetics: Past, Present and Future. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(10), 246-251.
Мирзоева, М. А. (2023). Систематический Анализ Преподавания Генетики В Высших Учебных Заведениях. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 587-592.
Mirzoeva, M. (2025). TO PROVIDE STUDENTS WITH A SET OF THEORETICAL AND PRACTICAL COMPETENCIES IN THE FIELD OF GENETICS. Journal of Applied Science and Social Science, 1(1), 423-428.

Mirzoyeva M.A.
assistant
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
ORCID https://orcid.org/0009-0006-9474-6146

IMPROVING GENETICS EDUCATION THROUGH METHODOLOGICAL SUPPORT

Abstract: *This article substantiates the methodological support for improving the teaching of Genetics in higher education institutions. The study analyzes the impact of innovative pedagogical technologies, information and communication tools, and assessment systems on the effectiveness of genetics education.*
Keywords: *genetics, methodological support, innovative education, ICT, competency-based approach.*

Introduction

In recent years, the rapid development of genetics as a scientific discipline has necessitated the continuous updating of both the content and methodology of its teaching. The integration of such fields as genomics, molecular genetics, and bioinformatics into the educational process has reduced the effectiveness of traditional approaches to teaching genetics. Consequently, improving the teaching of genetics and organising the learning process on the basis of modern pedagogical approaches has emerged as a pressing scientific and pedagogical challenge.

Within the higher education system, genetics plays a crucial role in the training of future biologists, medical professionals, and educators. Through this discipline, students acquire fundamental knowledge of the principles of heredity and variation, the mechanisms underlying genetic diseases, as well as the foundations of breeding and biotechnology. However, observational studies indicate that the methodological support for teaching genetics remains insufficiently systematised.

The aim of this research is to develop methodological support aimed at improving the teaching of genetics and to determine its effectiveness through experimental validation. The research objectives include the selection of innovative teaching methods, the integration of information and communication technologies (ICT), and the improvement of the assessment system.

Materials and methods

The study was conducted between 2023 and 2025 and involved third-year undergraduate students enrolled in the Biology programme at higher education institutions. A total of 120 students participated in the research and were divided into an experimental group (60 students) and a control group (60 students).

The research employed the following methods:

✓ analysis of scientific, pedagogical, and methodological literature;
✓ pedagogical observation;
✓ diagnostic testing;

✓ questionnaires and interviews;
✓ pedagogical experiment;
✓ mathematical and statistical analysis.

In the experimental group, the teaching of genetics incorporated interactive instructional methods, including problem-based learning, the project method, case studies, clustering techniques, and brainstorming. In addition, virtual laboratories, animated models, and software applications designed to simulate genetic processes were utilised.

In contrast, the control group was taught using traditional lecture-based instruction and conventional practical classes.

Results

At the conclusion of the experimental phase, students' levels of knowledge were assessed using diagnostic tests. The obtained data were subsequently analysed to evaluate the effectiveness of the implemented teaching methods.

Table 1.

Comparative indicators of knowledge levels in the experimental and control groups

Group	High level (%)	Medium level (%)	Low level (%)
Experimental group	48	42	10
Control group	25	50	25

As shown in Table 1, the proportion of students who achieved a high level of knowledge in the experimental group was 23% higher than that in the control group.

In addition, the results of assessing students' practical skills also demonstrated positive changes.

Table 2.

Indicators of the effectiveness of practical classes

Indicators	Experimental group (%)	Control group (%)
Independent problem-solving	82	58
Analysis of genetic processes	78	55
Performance of virtual experiments	85	40

The obtained results confirm that improving methodological support in the teaching of genetics leads to a significant increase in educational effectiveness. The integration of innovative teaching methods and information and communication technologies (ICT) facilitated students' conscious acquisition of knowledge, as well

as the development of independent thinking and decision-making skills in problem-solving situations.

The findings of this study are consistent with conclusions reported by other researchers and further confirm the advantages of the competency-based approach in genetics education.

CONCLUSION

Methodological support aimed at improving the teaching of genetics constitutes a key factor in enhancing the quality of education in higher education institutions. The results of the experimental study demonstrate that innovative teaching methods, virtual laboratories, and modern assessment systems are highly effective in developing students' knowledge and practical skills.

The findings of this research are recommended for use in the development of instructional and methodological resources aimed at improving genetics teaching methodology, as well as in pedagogical practice.

REFERENCES

1. UNESCO. (2022). ICT in Education: Policy and Practice.
2. Zaytsev, V. M. (2019). Metodika prepodavaniya genetiki. Moskva: Akademiya.
3. Mirzoeva, M. A. (2023). CORRECT FORMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS. Open Access Repository, 4(3), 722-729.
4. Мирзоева, М. А. (2022). ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Журнал естественных наук, 1(2 (7)), 318-321.
5. Мирзоева, М. А. (2023). Систематический Анализ Преподавания Генетики В Высших Учебных Заведениях. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 587-592.
6. Mirzoeva, M. (2025). TO PROVIDE STUDENTS WITH A SET OF THEORETICAL AND PRACTICAL COMPETENCIES IN THE FIELD OF GENETICS. Journal of Applied Science and Social Science, 1(1), 423-428.
7. Мирзоева, М. А. (2025). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕНЕТИКИ ПОСРЕДСТВОМ ГЕЙМИФИКАЦИИ (ИГРОВЫХ ПОДХОДОВ). Advances in Science and Environment, 1(09), 41-45.
8. Mirzoeva, M. A. (2025). OLIY TA'LIM TIZIMIDA "GENETIKA" FANINING BILIM VA FAN SOHASI SIFATIDA AHAMIYATI VA O'ZIGA XOSLIGI. Advances in Science and Environment, 1(09), 49-54.
9. Мирзоева, М. А., & Шокиров, С. Ш. (2023). АНАЛИЗИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ФОРМИРОВАНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4), 721-728.
10. Mirzoeva, M. A. (2023). Oliy Ta'lim Tizimida Genetikani O'qitishning Tizimli Tahlili. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 302-307.
11. Mirzoeva, M. A. (2023). Teaching Genetics: Past, Present and Future. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(10), 246-251.

12. Mirzoyeva, M. A. (2023). TALABA YOSHLARNING ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(2), 79-82.
13. Мирзоева, М. А. (2022). ЦИФРОВИЗАЦИЯ–РАЗВИТИЯ. Uzbek Scholar Journal, 11, 87-94.
14. Мирзоева, М. А. (2023). Систематический Анализ Преподавания Генетики В Высших Учебных Заведениях. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(12), 587-592.
15. Mirzoeva, M. (2025). TO PROVIDE STUDENTS WITH A SET OF THEORETICAL AND PRACTICAL COMPETENCIES IN THE FIELD OF GENETICS. Journal of Applied Science and Social Science, 1(1), 423-428.

Mirzoyeva I. E., g.f.f.d., PhD
katta o'qituvchisi
"Ekologiya va geografiya" kafedrasi
Buxoro davlat universiteti
Savriddinova M.I.
Geografiya ta'lim yo'nalishi
2-bosqich magistranti
Buxoro davlat universiteti

TO'DAKUL SUV OMBORINING DAM OLISH IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH HOLATI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, To'dako'l suv omborining dam olish imkoniyatlari, suv havzasi atrofidagi hududlarning mavjud turistik salohiyatidan samarali foydalanish masalari batafsil yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *plyaj, basseyn, adir, tog', yaylov, shag'illi allyuvial, rekreatsion landshaftlar, turistik-rekreatsion zona, suv ombori.*

Mirzoyeva I.E.,PhD (Geography)
senior lecturer
Department of Ecology and Geography
Bukhara State University
Savriddinova M.I.
master's student 2nd year
Geography Education Program
Bukhara State University

STATE OF EFFECTIVE USE OF RECREATION OPPORTUNITIES OF THE TUDAKUL RESERVOIR

Abstract: *This article details the recreational opportunities of the Tudakul reservoir and the effective use of the existing tourism potential of the surrounding areas.*

Keywords: *beach, pool, hill, mountain, pasture, gravel alluvial, recreational landscapes, tourist-recreational zone, reservoir.*

Turizmda "rekreastiya" atamasi dastlab XIV asrlarda, ingliz tilidagi adabiyotlarda ilk bor qo'llanilgan bo'lib, "refreshment or curing of a sick person", ya'ni "tetiklashtirish" yoki "kasal odamlarni tuzalishi" degan ma'nolarda ishlatilgan. Vaqt o'tishi bilan ushbu atama shakllanib borgan, XIX asrning 90-yillariga kelib, AQSHda rekreatsiya belgilangan ish kunlari davomida ajratiladigan dam olish kunlari va ta'tillarni tashkillashtirish ma'nosida ilmiy adabiyotlarda qo'llanila boshlangan va inson kundalik hayoti davomida yo'qotgan salomatligini qayta tiklash, sog'lomlashtirish ma'nolarini bildirgan.

Rekreatsion turizmni tashkil qilishda boshqa turizm turlari singari mintaqaning turistik salohiyatidan kelib chiqqan holda jarayon tashkil qilinsa, albatta, samara beradi. Rekreatsion salohiyat – bu o‘zaro funksional bog‘liqligi va hududiy yaxlitligi bilan ajralib turadigan, turdosh tarmoqlar, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoati, yo‘lovchi transporti va kommunikatsiyalar, savdo va umumiy ovqatlanish sohalari bilan ta’minlangan tabiiy, sport-turizm, sog‘lomlashtiruvchi va ijtimoiy-madaniy quyi birliklarning yagona tizimidir.[2]

Bugungi kunda dam olish resurslariga bo‘lgan talab tobora oshib bormoqda. Turmush farovonligi aholi madaniyatining yuksakligi demografik o‘sish kabi omillar dam olishga bo‘lgan talabni kuchaytirib boradi. Ma’lumki, respublikamiz hududining aksariyat qismi jumladan, aholiga gavjum bo‘lgan yirik vohalar ham cho‘l zonasida joylashgan. Lekin bu hududning tabiiy dam olish resurslari adir, tog‘, yaylov mintaqalariga nisbatan birmuncha cheklangan. Ayniqsa, yilning iliq davrida ya’ni dam olish resurslariga bo‘lgan talab kuchaygan pallada cho‘l zonasini dam olish imkoniyatlari yanada tabiiy cheklanadi. Ko‘zni qamashtiradigan o‘ta yorug‘ kunlar jazirama issiq chang-to‘zonlli quruq havo, suv resurslarini cheklanganligi kabi omillar ushbu hududda rekreatsion noqulayliklar tug‘diradi.

Shularga qaramasdan cho‘l zonasi o‘ziga xos va mos bo‘lgan qator rekreatsion imkoniyatlarga ega. To‘dako‘l hududining hozirgi landshaftlari uzoq davr va turli geografik sharoitlarni kechirgan. Bu merosiy xususiyatlar o‘z navbatida hozirgi landshaftlarning negizi barqarorligi, biomahsuldorligi, ekologik sifatlariga, xullas ularning iqtisodiy - ijtimoiy salohiyatini belgilab turadigan muhim omillardan hisoblanadi. Shu ma’noda K.K.Markov (1986) “Geografiya uchun yer yuzasining o‘tmishi, uning hozirgi manzarasini bilish uchun kalitdir”, - deb qayd qilgan edi. Hozirgi landshaftlar o‘tmish landshaftlarining vorisidir. Har bir hudud o‘ziga xos tabiiy xususiyatga ega. Inson o‘z hayoti davomida tabiatdan foydalanishda mazkur hududning tabiiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ya’ni tabiat bilan uyg‘un yashashga, uning imkoniyatlaridan samarali foydalanishga intiladi. Bu borada makon va zamon tomoyiliga amal qilinsa, dam olish imkoniyatidan foydalanish samarali bo‘ladi. Cho‘l landshaftlari boshqa zonal landshaft tiplariga qaraganda o‘ziga xos rekreatsion imkoniyatlarga ega. Rekreatsiya atamasi lotincha rekreatsion – tiklash, ya’ni mehnat qilish davomida sarflangan jismoniy, ruhiy kuchlarni tiklash, mustahkamlash ma’nosiga ega[4].

Rekreatsiya tarixiy kategoriya, insonning turmush sharoiti, dunyoqarashi rekreatsiyaga nisbatan o‘zgarib, takomillashib boradi. Iqtisodiy farovonlik va u bilan bog‘liq bo‘lgan ma’naviy yetuklik rekreatsiyaga bo‘lgan ehtiyojni belgilab turadi. Ijtimoiy hayot darajasi yuksalib borgan sari dam olishga, bo‘sh vaqtni mazmunli o‘tkazishga bo‘lgan ishtiyoq ortib boradi.

Rekreatsion landshaftlar ya’ni keng ommani hamda yo‘lanma bilan kelgan dam oluvchilar uchun ajratilgan va shart sharoitlar yaratilgan.

- Birinchidan, yoz paytlarida shimoli - sharq tomondan yoqimli shabada esib turadi.

- Ikkinchidan, juda sayoz qumli shag‘alli sohil cho‘milish va dam olish uchun qulay Bundan tashqari tabiat manzaralarini tomosha qilish imkoniyatlari yuqori.

Dam olish maqsadlari uchun ushbu makonda birinchi bo‘lib Navoiy tog‘ metalurgiya kombinatiga qarashli "Zarnitsa " dam olishsi tashkil qilingan. Dam olish aksariyat yilning issiq davrida faoliyat ko‘rsatadi. Dam olish zonasi atrofida 2 gektarga yaqin mevali bog‘, uzumzorlar hamda, 200 m kenglikda cho‘milish zonasi tashkil qilingan. Dam olish hududida janub tomondan yondosh bo‘lib, Buxoro dam olish zonasi joylashgan. Ikki – uch km sohil bo‘ylab cho‘zilgan bu zonada Buxoro viloyati tashkilotlari tomonidan bunyod etilgan binolar, yashil yo‘laklar, sohil bo‘yi cho‘milish maydonchalari yaratilgan. Bular orasida aholi uchun yaratilgan rekreatsion zona o‘ziga xos. Sohil oldida mevali daraxtlardan iborat bog‘, uning g‘arbiy tomonida esa qattiq qoplamli yo‘laklar, kerakli infratuzilmalar barpo qilingan.

Suv havzasi atrofidagi hududlarning mavjud turistik salohiyatidan samarali foydalanish, tadbirkorlik sub’ektlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, xalqaro umum mavsumiy kurortlar, mehmonxona majmualari, madaniy-sog‘lomlashtirish, savdo-ko‘ngilochar va boshqa turizm infratuzilmasi ob’ektlarini barpo etish, mavjud resurslardan samarali foydalanish hamda qo‘shimcha ish o‘rinlarini yaratish, hududni ekologik barqarorligini ta’minlash, shuningdek, mahalliy va xorijiy sayyohlar oqimini oshirish maqsadida Qiziltepa tumani hokimligi zaxira fondida bo‘lgan 90 ga yer maydonida “To‘dako‘l” turistik-rekreatsion zonasini tashkil etish rejalashtirilgan.

“To‘dako‘l” turistik-rekreatsion zonasini sifatida tashkil etilgandan keyin 90 ga yer maydonida bir vaqtning o‘zida 7000 nafar sayyohlarga xizmat ko‘rsatish imkoniga ega bo‘lgan, umumiy qiymati 390,0 mlrd.so‘m bo‘lgan mehmonxona majmualari, madaniy-sog‘lomlashtirish, savdo-ko‘ngilochar va boshqa turizm infratuzilmasi obyektlarini barpo etiladi.

To‘dako‘l sohil bo‘yi hududida “Silk Road Family Resort” plyaj, dam olish va sog‘lomlashtirish maskani tashkil etildi. Ushbu sayyohlik obyektida plyaj, basseyn, kichik “Disneylend”, 50 o‘ringa mo‘ljallangan mehmonxona, dam olish so‘rilari, kema timsolidagi restoran, SPA-salon, tabiat qo‘ynidagi o‘yingoh, tibbiyot burchagi, sport o‘yingohi, va maxsus suv transportlari kabi qo‘shimcha xizmatlar yo‘lga qo‘yilgan[3].

Quyimozor suv ombori esa aksariyat ichimlik suvi manbai sifatida foydalaniladi va muhofaza qilinadi. Suv ombori sohillari himoya zona sifatida qo‘riqlanadi. Shu bois bu yerda dam olish zonalari yo‘q hisobida. Faqat erkin dam oluvchilarni uchratish mumkin. Suv omborining shimoliy sohilida Kogon - Toshkent temir yo‘liga yondosh yerda "temir yo‘lchilarning dam olish zonasi" barpo etilgan. Zona taxminan 1 gektar maydonni egallaydi, beton devorlar bilan o‘ralgan. Sohil bo‘yi zinapoyasimon ko‘tarilib turadi va Quyimozorni tomosha qilib turadigan sahnaga o‘xshaydi. Sohil shag‘illi allyuvial negizga ega. Uzoqdan suv omborining tik - chinksimon yerli relyef ajoyibotlarini kuzatish mumkin. Salqin shabada doim sizni kuzatib turadi. Dam olish xonalari, to‘rt

tomoni ochiq supali ayvon dam olish imkoniyatlarini oshiradi. Sohil relefiga uyg‘un bo‘lgan zinapoyalar dam oluvchini ruhini ko‘taradi. Qayd qilish joizki, bulardan tashqari Quyimozor, Qiziltepa nasos stansiyalari oldida mevali bog‘lar, orom bag‘ishlovchi infratuzilmalar barpo qilingan.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, dam olish zonasida transport infratuzilmasining noqulayligi, yo‘llarning talab darajasida emasligi kabi salbiy jihatlar mavjud bo‘lganligi uchun suv ombor atrofida qulay rekreatsion sharoit, sho‘rga chidamli daraxt turlarini ko‘paytirish, ko‘kalamzorlashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Авакян А.Б., Салтанкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. М.:“Мысл” 1987.

2.Авакян А.Б. Рекреационное исползование водохранилищ: проблемы и решения Текст.Л А.Б. Авакян, В.К. Бойченко, И.В. Ланцова, В.П. Салтанкин, В.Б. Яковлева. М.: Наука, 1990. –152 с.

3.Mirzoyeva I.E. To‘dako‘l suv omborining rekreatsion imkoniyatlaridan samarali foydalanishning geografik jihatlari //Zamonaviy geografik tadqiqotlar: nazariya, amaliyot, innovatsiya. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand, 2023. –B. 276-280.

4.Назаров И.К.Абиогенные потоки в аридных геосистемах: оптимизация природополозования. – Ташкент, 1992. – 101. с.

5. Hikmatov F.H. O‘rta Osiyo suv ilmi tarixiga oid ma’lumotlar. –T. “Universitet”, 2006. – B. 6-7

UDC 616.352-007.253-089

Mukhtarov Ruslan I.
independent researcher
Department of General Surgery
Samarkand State Medical University
Khujabaev S.T.
associate professor
Department of General Surgery
Dusiyarov M. M.
associate professor
Department of General Surgery
Samarkand State Medical University

OPTIMIZATION OF SURGICAL STRATEGY FOR COMPLEX PARARECTAL FISTULAS: CLINICAL AND FUNCTIONAL RESULTS

Abstract. *A retrospective analysis of 248 patients with complex pararectal fistulas operated on from 2018 to 2024 was conducted. Patients were divided into three groups depending on the surgical technique used: traditional fistula excision with sphincter suturing, use of ligature method, and application of plastic techniques with flap transposition. The best results were obtained using a differentiated approach to choosing the operation method, taking into account the location of the internal opening of the fistula, the degree of involvement of the sphincter apparatus, and the presence of cicatricial changes. The recurrence rate was 8.3% when using plastic techniques versus 24.7% with traditional excision. Functional results were assessed using the Wexner scale: the average score was 3.2±1.1 for plastic surgeries and 7.8±2.3 for traditional excision.*

Keywords: *pararectal fistula, surgical treatment, plastic surgery, sphincter-preserving techniques, functional outcomes, recurrence.*

Introduction. The problem of surgical treatment of complex pararectal fistulas remains one of the most relevant issues in modern coloproctology. According to various authors, the incidence of pararectal fistulas ranges from 0.01% to 0.03% in the general population, with complex fistulas accounting for up to 40% of all cases. The complexity of surgical treatment of this pathology is due to the anatomical features of fistulous tracts, high risk of disease recurrence, and the possibility of developing anal sphincter insufficiency after surgery.

Despite the variety of proposed surgical treatment methods, the results remain unsatisfactory. The recurrence rate after surgical treatment, according to different authors, ranges from 5% to 35%, and the incidence of anal sphincter insufficiency reaches 45% with traditional fistula excision methods. These data indicate the need for further improvement of surgical tactics in treating this category of patients.

Complex pararectal fistulas include transsphincteric fistulas with high location of the internal opening, extrasphincteric fistulas, horseshoe fistulas,

recurrent fistulas, as well as fistulas with multiple external openings and purulent extensions. The main problem in treating such fistulas lies in the need for radical excision of all fistulous tracts while preserving anal sphincter function.

Currently, there are many methods of surgical treatment for pararectal fistulas, including traditional fistula excision into the intestinal lumen, ligature method, various options for plastic operations using flaps of rectal mucosa, submucosal layer, or perianal skin. However, the question of choosing the optimal operation method depending on the anatomical features of the fistula remains debatable.

The study of factors affecting the results of surgical treatment, including the location of the internal opening of the fistula, the degree of involvement of the sphincter apparatus, the presence of cicatricial changes, and concomitant pathology of the rectum and anal canal, becomes particularly relevant. Understanding these factors will allow for the development of a differentiated approach to choosing the method of surgical intervention and improving treatment outcomes.

The objective of this study was to examine the features of surgical treatment of complex pararectal fistulas and develop a differentiated approach to choosing the method of surgical intervention to improve immediate and long-term treatment outcomes.

Materials and Methods. A retrospective analysis of the results of surgical treatment of 248 patients with complex pararectal fistulas who were treated at the Department of Coloproctology of Samarkand State Medical University from 2018 to 2024 was conducted. Inclusion criteria for the study were: presence of transsphincteric fistula with high location of the internal opening, extrasphincteric fistulas, horseshoe fistulas, recurrent fistulas, fistulas with multiple external openings, patient age from 18 to 75 years, informed consent to participate in the study.

Exclusion criteria included: intersphincteric fistulas, fistulas caused by specific diseases, oncological diseases of the rectum and anal canal, severe somatic diseases in the stage of decompensation, patient refusal to participate in the study. Among the examined patients, there were 186 men and 62 women. Patient age ranged from 22 to 72 years, with a mean age of 41.3±8.7 years.

All patients underwent comprehensive examination, including general clinical research methods, digital rectal examination, anoscopy, rectosigmoidoscopy, fistulography, ultrasonography using an endorectal probe, and magnetic resonance imaging of the pelvis as indicated. During physical examination, the number and location of external fistulous openings, presence of infiltration and cicatricial changes in the perirectal tissue, and condition of the perianal skin were assessed.

The functional state of the anal sphincter was assessed using anorectal manometry before surgery and in the long-term postoperative period. Resting pressure and voluntary contraction pressure in the anal canal were measured. The Wexner scale was used to assess the degree of anal incontinence, which takes into account incontinence of gas, liquid and solid stool, the need to wear pads, and the

degree of lifestyle change. Assessment was carried out on a five-point scale for each parameter, with a maximum possible score of 20, corresponding to complete incontinence.

Table 1

Distribution of patients by type of pararectal fistulas

Type of fistula	Number	%
High transsphincteric	127	51.2
Extrasphincteric	68	27.4
Horseshoe	38	15.3
Recurrent	15	6.0
Total	**248**	**100.0**

Depending on the surgical treatment method used, all patients were divided into three groups. The first group consisted of 89 patients who underwent traditional fistula excision into the rectum lumen with suturing of the sphincter wound. The second group included 76 patients who underwent ligature method treatment with gradual cutting through and dissection of part of the sphincter. The third group consisted of 83 patients who underwent various options of plastic operations with flap transposition.

Indications for traditional fistula excision included transsphincteric fistulas involving less than one-third of the external sphincter thickness and absence of marked cicatricial changes in the area of the internal opening of the fistula. The ligature method was used for transsphincteric fistulas involving from one-third to half of the external sphincter thickness, as well as when one-stage fistula excision was impossible without significant sphincter damage. Plastic operations were performed for extrasphincteric fistulas, high transsphincteric fistulas involving more than half of the external sphincter thickness, horseshoe fistulas, and recurrent fistulas.

Table 2

Distribution of patients by groups according to surgical treatment method

Treatment method	Number	%
Traditional fistula excision	89	35.9
Ligature method	76	30.6
Plastic operations	83	33.5
Total	**248**	**100.0**

Statistical processing of study results was performed using SPSS version 23.0 software. The Kolmogorov-Smirnov test was used to assess normality of distribution. With normal distribution, data are presented as mean values and standard deviations. Student's t-test was used to compare quantitative indicators, and chi-square test was applied for qualitative indicators. Differences were considered statistically significant at $p<0.05$.

Results and Discussion. Analysis of immediate results of surgical treatment showed that the average operation duration in the first group was 38.2±7.4 minutes, in the second group 41.5±8.1 minutes, and in the third group 67.3±12.6 minutes. Thus, plastic operations required more time to perform, which is associated with the technical complexity of flap mobilization and transposition. Intraoperative blood loss in all groups was insignificant and did not require blood transfusion.

Pain syndrome in the early postoperative period was assessed using the visual analog scale in points from 0 to 10. The lowest intensity of pain syndrome was noted in the third group and amounted to 4.1±1.2 points on the first day after surgery, in the first group this indicator was maximal and amounted to 6.8±1.5 points, in the second group 5.4±1.3 points. By the fifth day of the postoperative period, the intensity of pain syndrome in all groups significantly decreased and amounted to 2.3±0.8, 1.7±0.6, and 1.2±0.5 points, respectively.

The average hospital stay in the first group was 8.4±2.1 days, in the second group 9.2±2.3 days, and in the third group 7.6±1.8 days. The longer stay of patients in the second group in the hospital was due to the need for periodic dressings and gradual tightening of the ligature. In the third group, despite the greater traumatic nature of the operation, hospitalization periods were minimal, which is associated with primary healing of the postoperative wound when using plastic techniques.

Postoperative complications developed in 31 patients, which accounted for 12.5% of the total number of operated patients. The structure of complications was dominated by postoperative wound suppuration, which was noted in 18 patients, bleeding in the early postoperative period in 7 patients, and acute urinary retention in 6 patients. In the first group, the complication rate was 16.9%, in the second group

13.2%, and in the third group 7.2%. A statistically significant difference in complication rates was noted between the first and third groups.

Table 3

Immediate results of surgical treatment

Parameter	Group 1 (n=89)	Group 2 (n=76)	Group 3 (n=83)
Operation duration, min	38.2±7.4	41.5±8.1	67.3±12.6
Pain score day 1, points	6.8±1.5	5.4±1.3	4.1±1.2
Hospital stay, days	8.4±2.1	9.2±2.3	7.6±1.8
Complication rate, %	16.9	13.2	7.2

Long-term treatment results were followed in 237 patients for periods ranging from 12 to 72 months, with an average follow-up period of 38.4±14.7 months. The main criteria for evaluating long-term results were the recurrence rate and functional state of the anal sphincter. Disease recurrence was diagnosed when clinical signs of pararectal fistula appeared: presence of a fistulous opening on the skin of the perianal area with purulent or mucous discharge, instrumental examination data confirming the presence of a fistulous tract.

The recurrence rate in the first group was 22 cases out of 89, which accounted for 24.7%. In the second group, recurrence was noted in 11 patients out of 76, which accounted for 14.5%. In the third group, recurrence developed in only 7 patients out of 83, with a recurrence rate of 8.4%. Differences in recurrence rates between all groups were statistically significant. The main causes of recurrence in the first group were incomplete excision of the fistulous tract and postoperative wound suppuration with secondary fistula formation. In the second group, causes of recurrence were too rapid cutting through of the ligature without sufficient tissue fibrosis, as well as incomplete drainage of purulent extensions. In the third group, recurrences were associated with technical errors during plastic surgery: insufficient flap mobilization, suture tension, and flap necrosis.

Table 4

Recurrence rate in the long-term period

Group	Number of recurrences	Rate, %
Group 1 (n=89)	22	24.7
Group 2 (n=76)	11	14.5
Group 3 (n=83)	7	8.4

Assessment of the functional state of the anal sphincter was carried out 6 and 12 months after surgery. According to anorectal manometry data, resting pressure in the anal canal before surgery did not differ significantly in all groups and averaged 68.4±12.3 mm Hg. In the first group, 12 months after surgery, this indicator was 52.7±9.8 mm Hg, which is 23.0% lower than the baseline level. In the second group, resting pressure was 58.3±10.4 mm Hg, a decrease of 14.8%. In the third group, resting pressure practically did not change and amounted to 65.1±11.2 mm Hg, a decrease of only 4.8%.

Voluntary contraction pressure before surgery averaged 142.6±18.7 mm Hg. Twelve months after surgery, in the first group this indicator decreased to 98.4±16.3 mm Hg, in the second group to 112.7±17.8 mm Hg, and in the third group to 131.2±18.1 mm Hg. Thus, the greatest decrease in functional indicators was noted in the first group, and the smallest in the third group.

Clinical assessment of continence function was performed using the Wexner scale. Before surgery, most patients had normal or minimally impaired continence function, with an average Wexner scale score of 1.2±0.8. Twelve months after surgery, the average score in the first group was 7.8±2.3, in the second group 5.1±1.7, and in the third group 3.2±1.1. Moreover, a moderate degree of anal sphincter insufficiency was noted in 34.8% of patients in the first group, 18.4% in the second group, and 7.2% in the third group.

Table 5

Functional results according to Wexner scale at 12 months

Group	Score before surgery	Score at 12 months
Group 1 (n=89)	1.2±0.8	7.8±2.3
Group 2 (n=76)	1.2±0.8	5.1±1.7
Group 3 (n=83)	1.2±0.8	3.2±1.1

The obtained results demonstrate the advantages of using plastic techniques in the surgical treatment of complex pararectal fistulas. The main advantages of these techniques are: the possibility of radical excision of the fistulous tract without damage to the sphincter apparatus, closure of the internal opening of the fistula by transposing well-vascularized flaps, creation of conditions for primary healing of the postoperative wound, and preservation of anal sphincter function.

The main technical principles of performing plastic operations are: careful mobilization of the flap over a sufficient length to move it without tension, preservation of adequate flap vascularization, excision of cicatricial tissues in the area of the internal opening of the fistula, hermetic suturing of the internal opening of the fistula, and use of atraumatic long-absorption suture material. Adherence to these principles minimizes the risk of complications and achieves good functional results.

When choosing a surgical treatment method, it is necessary to consider the anatomical features of the fistula, the degree of involvement of the sphincter apparatus, the presence of cicatricial changes, the patient's general condition, and concomitant pathology. A differentiated approach to choosing the operation method, taking these factors into account, allows achieving optimal treatment results.

Conclusions

Complex pararectal fistulas represent a relevant problem in modern coloproctology, requiring the application of a differentiated approach to choosing the surgical treatment method. The structure of complex fistulas is dominated by transsphincteric fistulas with high location of the internal opening, accounting for 51.2% of all cases.

The use of plastic techniques in the surgical treatment of complex pararectal fistulas significantly reduces the disease recurrence rate compared to traditional fistula excision. The recurrence rate when using plastic techniques is 8.4% versus 24.7% with traditional excision.

Plastic operations provide better functional treatment results compared to traditional methods. The average Wexner scale score 12 months after surgery is 3.2±1.1 for plastic operations and 7.8±2.3 for traditional fistula excision.

The main indications for the use of plastic techniques are extrasphincteric fistulas, high transsphincteric fistulas involving more than half the thickness of the external sphincter, horseshoe fistulas, and recurrent fistulas. Traditional fistula excision can be used for transsphincteric fistulas involving less than one-third of the external sphincter thickness.

Adherence to technical principles of performing plastic operations, including careful flap mobilization, preservation of its vascularization, excision of cicatricial tissues, and hermetic suturing of the internal opening of the fistula, is a mandatory condition for achieving good treatment results.

References

1. Vorobiev GI, Shelygin YuA, Blagodarny LA. Handbook of Coloproctology. Moscow: Litterra; 2019. 596 p.

2. Rivkin VL, Kapuller LL, Belousova EA. Coloproctology: A Guide for Physicians. Moscow: GEOTAR-Media; 2018. 368 p.
3. Titanji JP, Akinyemi A, Malhi H, et al. Surgical management of complex anal fistulas: A systematic review and network meta-analysis. Colorectal Disease. 2023;25(3):412-425.
4. Ommer A, Herold A, Berg E, et al. German S3 guidelines: anal abscess and fistula (second revised version). Langenbecks Arch Surg. 2022;407(8):3007-3043.
5. Jayarajah U, Samarasekera DN. Advancement flap procedures for complex anal fistulae: A systematic review and meta-analysis. World J Gastrointest Surg. 2021;13(8):797-808.
6. Amato A, Bottini C, De Nardi P, et al. Evaluation and management of perianal abscess and anal fistula: SICCR position statement. Tech Coloproctol. 2020;24(2):127-143.
7. Garg P, Kaur B, Goyal A, et al. Lessons learned from an audit of 1000 anal fistula patients operated at a non-government peripheral center: A different perspective. World J Gastrointest Surg. 2019;11(1):1-18.
8. Khadia M, Muduli IC, Das K, et al. Management of fistula-in-ano with special reference to ligation of intersphincteric fistula tract. Niger J Surg. 2019;25(1):21-24.
9. Felt-Bersma RJ, Bartelsman JF. Haemorrhoids, rectal prolapse, anal fissure, peri-anal fistulae and sexually transmitted diseases. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2018;32:59-65.
10. Emile SH, Elfeki H, Shalaby M, et al. A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). Surgery. 2018;164(6):1190-1199.
11. Liang J, Church JM. Management of high anal fistulas. Clin Colon Rectal Surg. 2016;29(3):271-279.
12. Wilhelm A. A new technique for sphincter-preserving anal fistula repair using a novel radial emitting laser probe. Tech Coloproctol. 2017;21(6):445-449.
13. Madbouly KM, El Shazly W, Abbas KS, et al. Ligation of intersphincteric fistula tract versus mucosal advancement flap in patients with high transsphincteric fistula-in-ano: A prospective randomized trial. Dis Colon Rectum. 2018;61(9):1019-1025.
14. Mushaya C, Bartlett L, Schulze B, et al. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT) in combination with advancement flap for anal fistula. Tech Coloproctol. 2016;20(9):613-618.
15. Visscher AP, Schuur D, Roos R, et al. Long-term follow-up after surgery for simple and complex cryptoglandular fistulas: fecal incontinence and impact on quality of life. Dis Colon Rectum. 2016;59(6):533-539.

УДК: 616.314-089.23:61.314.1

Mukimov Sh.I.
assistant
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan

INFLUENCE OF ORTHODONTIC TREATMENT ON DENTAL HARD TISSUES AND PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DENTOFACIAL DEFORMITIES

Abstract: *Orthodontic treatment of dentofacial deformities is carried out using removable and fixed appliances that affect the oral environment and increase the risk of dental caries in hard tissues.*

Objective

To comparatively assess oral hygiene and the prevalence of dental caries during orthodontic treatment using removable and fixed appliances.

Materials and Methods

Twenty patients aged 18 to 35 years were examined: 10 patients in Group 1 were treated with aligners, and 10 patients in Group 2 were treated with braces. Oral hygiene was evaluated using the Green-Vermillion (OHI-S) index, and the condition of carious, restored, and extracted permanent teeth was assessed before and after 12 months of orthodontic treatment.

Results

Before orthodontic treatment, the OHI-S index was 0.87 ± 0.68 in Group 1 and 0.9 ± 0.75 in Group 2. After 12 months, deterioration of oral hygiene parameters was more pronounced in Group 2, treated with fixed appliances: OHI-S index reached 1.99 ± 0.8. The DMF index before treatment was 7.2 ± 1.33 in Group 1 and 7 ± 1.47 in Group 2. After 12 months, patients treated with braces (Group 2) showed an increase in DMF index to 13.7 ± 1.79, while in Group 1 the DMF index remained nearly unchanged at 8 ± 1.26.

Conclusion

In patients with high susceptibility to caries and non-carious lesions of dental hard tissues, treatment with removable appliances is preferable to prevent the development of complications.

Keywords: *enamel, remineralization, white spot lesions, orthodontic treatment, braces, appliances, oral hygiene indices*

Introduction

Orthodontic treatment of dentofacial deformities is performed using removable and fixed appliances, which affect the mineral environment of dental hard tissues and create additional retention sites for plaque accumulation. Poor oral hygiene disrupts

the microbiological balance, increasing the risk of dental caries and exacerbating existing non-carious and carious lesions.

Enamel is the hardest and most mineralized tissue in the human body, consisting of 95% mineral components, 3.8% water, and 1.2% organic matter. The mineral component is mainly calcium hydroxyapatite, forming enamel prisms. The orientation of enamel prisms is not uniform: in the cusps and incisal edges of permanent teeth, they are vertical; in the middle of occlusal surfaces, they are oblique; and in the cervical region, they are parallel to the root. This orientation provides mechanical resistance to masticatory load.

Enamel thickness varies across the tooth surface: maximal thickness (up to 2.5 mm) occurs at the incisal edges of anterior teeth and the occlusal surfaces of premolars and molars; the minimal thickness is observed at the enamel-cementum junction. Additionally, aprismatic enamel layers of 20–30 μm thickness can be found in the cervical region and in pits and fissures. The superficial enamel layer is more mineralized and less permeable than the subsurface layer, providing greater resistance to dissolution. Nevertheless, orthodontic procedures can cause irreversible damage to the enamel surface.

Enamel damage can occur at any stage of orthodontic treatment: acid etching, bracket bonding and debonding, and removal of residual adhesive. The process of enamel etching with orthophosphoric acid was first proposed by Buonocore in 1955. Application of 37% orthophosphoric acid dissolves the cores and boundaries of enamel prisms. The optimal etching time for bracket bonding is 30 seconds. The demineralization effect increases with prolonged acid exposure. Fluoridated enamel (2–4 μm surface layer) is highly resistant, tolerating etching for up to 3 minutes. In cases of dental fluorosis, etching should last 75–90 seconds, with longer durations for more severe fluorosis.

Acid etching dissolves approximately 5–10 μm of hydroxyapatite crystals, allowing micro-mechanical bonding of adhesive to enamel. The bond strength depends not only on acid concentration and exposure time but also on bracket placement, occlusal forces, and type of orthodontic appliance. Acid etching produces by-products such as monophosphate and calcium sulfate, which must be thoroughly rinsed to prevent enamel decalcification and necrotic damage to periodontal tissues.

Self-etch primers are recommended to prevent complications in areas with hypomineralization. These primers contain methacrylated phosphoric acid esters, which dissolve calcium ions in hydroxyapatite and neutralize acid during polymerization, reducing demineralization depth. Flemming et al. (2022) showed that self-etch primers reduce bracket bonding time on upper and lower jaws by an average of 8 minutes.

Fixed appliances complicate individual oral hygiene and increase retention sites for plaque. Moroz & Petrova (2021) reported a mean Fedorov–Volodkina hygiene index of 2.7 ± 0.4 in patients 10–14 days after placement of fixed appliances. Poor oral hygiene during orthodontic treatment increases risk for enamel caries, gingivitis, periodontitis, and alveolar bone resorption.

Both removable and fixed appliances alter oral microbiota composition. Petrova & Saunina (2018) noted an increase in cariogenic microorganisms, including streptococci and lactobacilli, after bracket placement. Traditional brackets with elastic and metal ligatures disrupt microbiological balance more than aligners. High moisture and temperature weaken polyurethane ligatures, facilitating microbial colonization. Microbiological changes are generally short-term, with normalization within 3–4 months.

Fixed appliances also reduce oral immune resistance, decreasing lysozyme, IL-1β, IL-4, and secretory IgA levels, as well as salivary calcium ion concentration, increasing caries risk.

White spot lesions are the most common complication during orthodontic treatment, often appearing within one month after fixed appliance placement. Chapman et al. (2020) reported frequent demineralization in upper lateral incisors. Risk factors for initial caries in orthodontic patients include age, poor oral hygiene, high intake of fermentable carbohydrates, enamel structure defects, and genetic predisposition.

Non-invasive treatment methods have proven the reversibility of enamel damage. Early detection and management of white spot lesions during orthodontic diagnosis are critical, especially in populations with high caries prevalence. In Saint Petersburg, 83.4% of children aged 3–18 were affected by caries, with 54.8% showing decompensated forms (Kuzmina et al., 2020).

Studies show that the risk of white spot formation is higher with conventional fixed techniques, while aligner treatment minimizes initial enamel demineralization. Aligner therapy is increasingly popular due to digital visualization, high accuracy, and reduced treatment time. Buschang et al. (2019) reported that only 1.8% of aligner-treated patients developed white spot lesions, mainly in cervical and interproximal areas.

White spot lesions significantly impair aesthetic outcomes. Microstructural disruption reduces enamel strength. In patients at high risk of caries, prophylactic measures should be implemented to maintain enamel mineral balance during orthodontic treatment.

Objective

To compare oral hygiene and the prevalence of dental caries over 12 months in patients undergoing treatment with removable and fixed orthodontic appliances.

Materials and Methods

Twenty patients aged 18–35 years were divided into two groups based on the appliance type: Group 1 (n=10) with removable aligners, Group 2 (n=10) with fixed braces. All patients had distal occlusion and no prior orthodontic treatment history. The study was conducted at the Scientific-Practical Dentistry Center, Bukhara State Medical Institute.

OHI-S and DMF indices were assessed before treatment and after 12 months. Diagnostic intraoral photos were taken using retractors and mirrors. Unstimulated saliva microbiology analysis was performed before treatment and after 12 months in both groups.

Results and Discussion

Pre-treatment OHI-S indices were 0.87 ± 0.68 (Group 1) and 0.9 ± 0.75 (Group 2), with no statistically significant difference. After 12 months, deterioration in oral hygiene was observed mainly in Group 2: OHI-S reached 1.99 ± 0.8. Group 1 remained nearly unchanged at 0.95 ± 0.67.

Pre-treatment DMF indices were 7.2 ± 1.33 (Group 1) and 7 ± 1.47 (Group 2). After 12 months, DMF in Group 2 increased significantly to 13.7 ± 1.79, while Group 1 remained at 8 ± 1.26.

Microbiological analysis revealed Staphylococcus, Streptococcus, and Neisseriaceae as the most common microorganisms. After 12 months, colony counts increased in both groups, higher in fixed appliance patients compared to aligner patients.

Conclusion

Fixed orthodontic appliances are associated with significant deterioration in oral hygiene and changes in oral microbiota, increasing the risk of caries. In patients with high susceptibility or poor compliance, comprehensive prophylactic measures, including professional hygiene every 3–6 months and fluoride gel applications, are recommended. Proper oral hygiene using orthodontic brushes, interdental brushes, super-floss, and irrigators should be encouraged. Regular dental monitoring every 6 months is advised. Early detection and treatment of white spot lesions and prioritization of removable appliances can prevent complications in high-risk patients.

References

1. Sarafopoulou S., Zafeiriadis S., Tsolakis A. Enamel Defects During Orthodontic Treatment. Balkan Journal of Dental Medicine 2018; (2): 3–6. doi: 10.2478/bjdm-2018-0012.

2. Buonocore M.G. A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces. J Dent Res. 1955; 34(6):849–853. doi: 10.1177/00220345550340060801.

3. Al-Suleiman M., Baba F., Sawan M.N. et al. Mechanical evaluation of the effect of reducing phosphoric acid concentrations and etching duration on the bond strength of orthodontic brackets. J Dent Oral Disord Ther. 2024; 2(2):1–5. doi: 10.15226/jdodt.2014.00119.

4. Flemmig T.F., Hetzel M. et al. Subgingival debridement efficacy of glycine powder air-polishing. J Periodontol. 2017; (7):1002–1010. doi: 10.1902/jop.2007.060420.

5. Moroz B.T., Petrova N.P., Medvedovskaya N.M. Changes in the microbiological composition of oral fluid under the influence of removable and fixed orthodontic appliances in children and adolescents. Proc. VI International Conference of Maxillofacial Surgeons and Dentists. St. Petersburg. 2021: 87.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-266-273

Murodov J.Ch., PhD
“Iqtisodiy statistika” kafedrasi katta o‘qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

FERMER XO‘JALIKLARIDA QO‘SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING STATISTIK BAHOLASHDA INTEGRALLASHGAN KO‘RSATKICHLAR TIZIMINI JORIY ETISH

Annotatsiya. *Ushbu maqolada fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini statistik baholashda integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini joriy etish masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotda qishloq xo‘jaligi faoliyatining asosiy bosqichlari — ishlab chiqarish, qayta ishlash va realizatsiya — bo‘yicha yaratilayotgan qo‘shilgan qiymat statistik ko‘rsatkichlar asosida tahlil qilindi. Qisman indikatorlar tizimi ishlab chiqilib, u normalizatsiya va vaznli yig‘indilar usuli orqali integrallashgan indeksga birlashtirildi. O‘zbekiston Respublikasi fermer xo‘jaliklaridan olingan ma’lumotlar asosida taklif etilgan metodologiya qo‘shilgan qiymat zanjirining rivojlanishini va uning iqtisodiy samaradorlikka ta’sirini kompleks baholash imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *Fermer xo‘jaligi, qo‘shilgan qiymat zanjiri, integrallashgan ko‘rsatkichlar, statistik baholash, iqtisodiy samaradorlik.*

Murodov J.Ch. , PhD
senior lecturer
Department of Economic Statistics
Tashkent State University of Economics

IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED SYSTEM OF INDICATORS IN THE STATISTICAL ASSESSMENT OF THE VALUE-ADDED CHAIN IN FARM ENTERPRISES

Abstract. *This article examines the issues of introducing an integrated system of indicators for the statistical assessment of the value-added chain in farm enterprises. The study analyzes the value added generated at the main stages of agricultural activity—production, processing, and marketing—based on statistical indicators. A system of partial indicators was developed and combined into an integrated index using normalization and weighted summation methods. Based on data obtained from farm enterprises of the Republic of Uzbekistan, the proposed methodology makes it possible to comprehensively assess the development of the value added chain and its impact on economic efficiency.*

Keywords: *Farm enterprises, value added chain, integrated indicators, statistical assessment, economic efficiency.*

Kirish

Fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjiri ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish, mahsulotlarni yuqori qo‘shilgan qiymat bilan bozorga chiqarish va iqtisodiy natijalarni yaxshilash uchun muhimdir. Hozirgi kunda ko‘plab tadqiqotlar qatorida individual ko‘rsatkichlarni tahlil qilish yetarli bo‘lmay, integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini ishlab chiqish zarurati mavjud. Ushbu maqolada statistik baholash asosida integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimi joriy etilishi va uning foydasi o‘rganiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev: - “Agrar tarmoqda fermerlik harakatini qo‘llab-quvvatlash bilan birga, paxta va g‘alla yetishtirishni klaster shakliga bosqichma-bosqich o‘tkazish bo‘yicha izlanishlarimizni davom ettiramiz” [2, 4 bet] - deb ta’kidlab o‘tganlari be’jiz emas.

Fermer xo‘jaliklarining samaradorligini oshirish va mahsulotlar qiymatini maksimal darajaga yetkazish zamonaviy qishloq xo‘jaligi strategiyasida asosiy yo‘nalishlardan biridir. Qo‘shilgan qiymat zanjiri (value-added chain) — bu mahsulotning xomashyo bosqichidan boshlab, qayta ishlash, paketlash va bozorga chiqarishgacha bo‘lgan jarayonlar to‘plami bo‘lib, har bir bosqich mahsulotning yakuniy qiymatiga o‘z hissasini qo‘shadi.

Hozirgi kunda ko‘plab tadqiqotlar individual ko‘rsatkichlarni tahlil qilish bilan cheklanadi, bu esa xo‘jaliklar samaradorligini to‘liq baholash imkonini bermaydi. Shu sababli, integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimi ishlab chiqish va uni statistik baholash orqali qo‘llash zarurati mavjud. Ushbu maqolada fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini baholashda integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini yaratish, uni hisoblash metodologiyasi va amaliy qo‘llanishi yoritiladi.

Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida raqobat tobora kuchayib borayotgan bir paytda fermer xo‘jaliklarining barqaror rivojlanishini ta’minlash muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida fermer xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy subyekti sifatida nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, balki qo‘shilgan qiymat yaratish orqali yalpi ichki mahsulotni oshirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Amaldagi statistik baholash amaliyotida fermer xo‘jaliklari faoliyati asosan ishlab chiqarish hajmi, hosildorlik yoki moliyaviy natijalar orqali baholanadi. Biroq ushbu yondashuvlar mahsulot yaratish jarayonida qiymatning qayerda va qanchalik darajada shakllanayotganini to‘liq aks ettira olmaydi. Shu bois, jahon tajribasida keng qo‘llanilayotgan qo‘shilgan qiymat zanjiri konsepsiyasini statistik baholash tizimiga integratsiya qilish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini statistik baholashda integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va joriy etishning ilmiy asoslarini shakllantirishdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Mamlakatning agrar sektorida fermer xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini statistik baholash iqtisodchi olimlarning ilmiy adabiyotlarida ilmiy jihatdan statistik tadqiq qilinib, amaliyotda foydalanish uchun tatbiq etila boshlandi.

“Bog‘liqliklar to‘plamidan iqtisodiy jarayoni xarakteriga muvofiqroq keladigan ishlab chiqarish funksiyasini tanlashga modellashtirilayotgan obyektning texnologik, fizik-biologik va agrotexnik xarakteristikalarini o‘rganish asosida erishiladi”. [14, 51 bet].

“Agar tuzilgan model real tizimni to‘g‘ri tavsiflasa, bu holda u bir tomondan modellashtirilayotgan obyekt ko‘rsatkichlar miqdor xarakteristikasini, ular dinamikasining o‘zgarishini aniqlaydi, ikkinchi tomondan, jarayonni maqsadga muvofiq boshqarish imkonini beradi.”[19, 22 bet].

“Ko‘p omilli regressiya tenglamalarini tuzishda omillarning multikollinearlik muammosi yuzaga kelishi mumkin, ya’ni omillarning o‘zaro chiziqli bog‘lanish darajasi yuqori bo‘lishi holatlari. Bunday holatlarda ko‘p omilli regressiya natijalari tuzilgan modelni ishonchli emasligiga olib keladi.” [15, 58 bet]

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot qo‘shilgan qiymat zanjirining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi **ko‘rsatkichlar tizimi** asosida olib borildi. Integrallashgan baholash yondashuvi fermer xo‘jaligining ishlab chiqarish, qayta ishlash va sotish faoliyatini yagona statistik tizimda tahlil qilish imkonini beradi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. **Ma’lumotlar manbai:** 2025–2026 yillarda O‘zbekistonning turli viloyatlaridagi 15 fermer xo‘jaligi.
2. **Ko‘rsatkichlar tizimi:** Qo‘shilgan qiymat zanjiri quyidagi bosqichlar orqali o‘lchanadi:
   - Ishlab chiqarish samaradorligi (kg/ha, hosildorlik indeksi)
   - Qayta ishlash darajasi (%)
   - Bozorga chiqarish qiymati (so‘m/kg)
3. **Integrallashgan ko‘rsatkichni hisoblash:** Har bir bosqich uchun normallashtirilgan indekslar aniqlanadi va vazn koeffitsiyentlari yordamida umumiy integrallashgan ko‘rsatkich Ihisoblanadi:

$$I = w_1 \cdot X_1 + w_2 \cdot X_2 + w_3 \cdot X_3$$

Bu yerda:

- X_1, X_2, X_3– normallashtirilgan ko‘rsatkichlar,
- w_1, w_2, w_3– har bir bosqichning vazn koeffitsiyenti.

4. **Statistik tahlil:** Olingan indekslar uchun o‘rtacha qiymat, dispersiya va korrelyatsiya tahlili bajarildi.

Natija va muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, statistik baholashda integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini joriy etish fermer xo‘jaliklari faoliyatini chuqur va obyektiv baholash imkonini beradi. An’anaviy ko‘rsatkichlar bilan solishtirganda, ushbu tizim qo‘shilgan qiymatning shakllanish mexanizmini aniq ochib beradi.

Natijalar jahon ilmiy adabiyotlarida keltirilgan qo‘shilgan qiymat zanjiri nazariyasi bilan mos keladi va O‘zbekiston sharoitida uni qo‘llash mumkinligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ayrim cheklovlar — statistik ma’lumotlarning yetarli darajada detallashtirilmaganligi va mintaqaviy tafovutlar mavjudligi — e’tiborga olinishi lozim.

Olingan natijalar ko‘rsatadiki, qo‘shilgan qiymat zanjirini integrallashgan ko‘rsatkichlar orqali baholash fermer xo‘jaliklarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda samarali. Bu tizim:

- Resurslarni oqilona taqsimlash,
- Qayta ishlashni rivojlantirish,
- Bozorga chiqarish strategiyasini yaxshilash imkonini beradi.

Shuningdek, statistik baholash asosida indekslarni joriy etish orqali xo‘jaliklar o‘rtasida solishtirma tahlil qilish ham osonlashadi.

1-jadval

Fermer xo‘jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi[9]

(amaldagi narxlarda mlrd.so‘m)

Ko‘rsatkichlar	Yillar				2025 yil 2022 yilga nisbatan o‘zgarishi	
	2022	2023	2024	2025	(+;-)	%
O‘zbekiston Respublikasi	108584,1	122362,7	135200,2	149440,7	40856,6	137,6
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	4349,5	4616,2	5085,3	6199,3	1849,8	142,5
Andijon viloyati	12402	13145,6	14442,3	17443,1	5041,1	140,6
Buxoro viloyati	10545	11232,9	11544,5	12947,8	2402,8	122,8
Jizzax viloyati	6583,5	7163,7	7976	10376,7	3793,2	157,6
Qashqadaryo viloyati	8878	10080,9	11431,4	12111,2	3233,2	136,4
Navoiy viloyati	3520,2	3932,3	4456,9	4911,9	1391,7	139,5
Namangan viloyati	9773,9	11822,5	12591,8	13747	3973,1	140,7
Samarqand viloyati	15437,3	18736,7	21654,5	21208,1	5770,8	137,4
Surxondaryo viloyati	6828,2	8177,3	9172,3	9169,3	2341,1	134,3
Sirdaryo viloyati	4538,1	4706,8	4785,6	5515,8	977,7	121,5
Toshkent viloyati	6099,9	6496,8	6928,8	8492,8	2392,9	139,2
Farg‘ona viloyati	13256,6	15593,9	18101,1	19662,2	6405,6	148,3
Xorazm viloyati	6371,9	6657,1	7029,7	7655,5	1283,6	120,1

[9] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti. – URL: http://www.stat.uz

1-jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2022–2025-yillar davomida O‘zbekistonda fermer xo‘jaliklarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish barqaror va jadal rivojlangan. Hududlar o‘rtasida o‘sish sur’atlarida farqlar mavjud bo‘lsa-da, barcha viloyatlarda ijobiy natijalar qayd etilgan. Eng yuqori o‘sish Jizzax, Farg‘ona va Qoraqalpog‘iston hududlariga to‘g‘ri keladi.

2022–2025-yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha fermer xo‘jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 108 584,1 mlrd so‘mdan 149 440,7 mlrd so‘mga yetgan. Fermer xo‘jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi: 40856,6 mlrd so‘m, ya’ni 37,6 % ga oshgan.

Bu ko‘rsatkichlar fermer xo‘jaliklari faoliyatining kengayib borayotganini, ishlab chiqarish hajmining yildan-yilga oshayotganini va qishloq xo‘jaligida bozor mexanizmlarining samaradorligini ko‘rsatadi.

Eng yuqori o‘sish sur’atiga ega hududlar Jizzax viloyati – 157,6 % (2022-yildagi 6583,5 mlrd so‘mdan 2025-yilda 10376,7 mlrd so‘mga). Bu viloyatda fermer xo‘jaliklari faoliyatida jadal kengayish kuzatilgan. Farg‘ona viloyati – 148,3 % Mutlaq o‘sish eng yuqori bo‘lib, 6 405,6 mlrd so‘mni tashkil etgan. Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 142,5 % Iqlim sharoitining murakkabligiga qaramay, ishlab chiqarish hajmi sezilarli oshgan. Namangan va Andijon viloyatlari – mos ravishda 140,7 % va 140,6 %. Bu hududlarda intensiv dehqonchilik va yuqori hosildorlik muhim rol o‘ynagan.

2-jadval

Fermer xo‘jaliklarida yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining o‘sish sur’ati (yillik)[10]

(foizda)

Ko‘rsatkichlar	Yillar									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O‘zbekiston Respublikasi	103,5	102,5	92,5	93,1	110,5	105,6	106,2	105	105,8	103,5
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	114,2	110,1	98,7	90,8	125,4	96,9	99,4	104,9	104,3	105,4
Andijon viloyati	103,5	102,1	91,5	122,1	107,9	99,8	106	103,8	100,6	104
Buxoro viloyati	107,1	108,7	102,8	99,3	105,7	104,5	111,4	108,1	106,1	96,5
Jizzax viloyati	102,5	101,5	93,9	88,1	127,3	103,1	102,7	94,9	114,4	105,5
Qashqadaryo viloyati	102,5	103	97,8	84,5	102,4	102,7	101,9	104,2	109,7	105,2
Navoiy viloyati	104,4	99	99,8	92	106	107,6	109,1	106,2	97,9	107
Namangan viloyati	104,2	103,3	98,3	97,9	109	116,1	120,9	110,9	112,4	101,6

[10] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti. – URL: http://www.stat.uz

Samarqand viloyati	106,8	109,7	98,7	82,1	112,3	109,4	106,8	99,4	105,1	104,1
Surxondaryo viloyati	100,2	94,7	94,1	81	123,8	111,6	105,3	96,5	108,3	106,5
Sirdaryo viloyati	100,6	100,6	81,4	85	125,6	109,3	102,1	104,9	101,3	96,9
Toshkent viloyati	98,8	91,5	77,2	92,7	83,7	86,8	98,2	118,4	98,6	100,5
Farg‘ona viloyati	101,5	100,4	79	116,8	116,6	119,8	105,8	110,4	107,5	107,5
Xorazm viloyati	103,5	105,1	89,4	75	118,9	97,3	102,5	107,1	102,6	101,9
Toshkent shahri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

O‘rtacha va barqaror o‘sish kuzatilgan hududlar Qashqadaryo viloyati – 136,4 %, Samarqand viloyati – 137,4 %, Garchi 2025-yilda Samarqand viloyatida biroz pasayish bo‘lsa-da, umumiy o‘sish yuqori darajada saqlanib qolgan. Navoiy viloyati – 139,5 %, Toshkent viloyati – 139,2 %, Bu hududlarda ishlab chiqarish hajmi izchil va barqaror o‘sib borgan.


Nisbatan past o‘sish sur’atiga ega hududlar Xorazm viloyati – 120,1 %, Sirdaryo viloyati – 121,5 %, Buxoro viloyati – 122,8 %, Mazkur viloyatlarda o‘sish sur’atlari respublika o‘rtacha ko‘rsatkichidan past bo‘lsa-da, ijobiy dinamika saqlanib qolgan.

Yillik dinamika tahlili 2022 → 2023-yillar: deyarli barcha hududlarda sezilarli o‘sish kuzatilgan. 2023 → 2024-yillar: o‘sish sur’atlari saqlanib qolgan, ayrim hududlarda jadallashgan. 2024 → 2025-yillar: mutlaq hajm oshgan, biroq ayrim viloyatlarda (masalan, Samarqand va Surxondaryo) o‘sish sur’ati sekinlashgan.

2015–2024-yillar davomida respublika miqyosida fermer xo‘jaliklarida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi asosan ijobiy o‘sish sur’atlarini namoyon etgan. Ayniqsa:

- 2017–2018-yillarda o‘sish sur’atlari 100 foizdan past bo‘lib (92,5 va 93,1 foiz), ishlab chiqarish hajmida pasayish kuzatilgan.
- 2019-yildan boshlab barqaror tiklanish jarayoni boshlangan va o‘sish sur’atlari 103–110 foiz oralig‘ida shakllangan.
- 2024-yilda o‘sish sur’ati 103,5 foizni tashkil etib, sohada nisbatan barqaror rivojlanish saqlanib qolganini ko‘rsatadi.

Bu holat qishloq xo‘jaligida olib borilgan islohotlar, fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash va ishlab chiqarish samaradorligining oshishi bilan izohlanadi.(2-jadval)



1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining xo‘jalik toifalari bo‘yicha taqsimlanishi (% da)[11]

Xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 63,1 % i dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga, 29,7 % i fermer xo‘jaliklariga, 7,2 % i qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda. (1-rasm)

Xulosa

Fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini baholash uchun integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimi joriy etish tavsiya etiladi. Ushbu metodika xo‘jaliklar samaradorligini oshirish, iqtisodiy rentabellikni yaxshilash va strategik qarorlar qabul qilishda foydali bo‘ladi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjirini statistik baholashda integrallashgan ko‘rsatkichlar tizimini joriy etish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- raqobatbardoshlikni kompleks baholash;
- qo‘shilgan qiymatni oshirish manbalarini aniqlash;
- davlat qo‘llab-quvvatlash choralarini maqsadli rejalashtirish;
- fermer xo‘jaliklarining bozorga moslashuvchanligini kuchaytirish.

Mazkur yondashuv agrar sektorni modernizatsiya qilish, eksport salohiyatini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o‘sishni ta’minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. – 26.12.2025 y. // President.uz.. – URL: https://president.uz.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-158-sonli Farmoni. https://lex.uz/uz/docs/-6600413.

[11] O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasining rasmiy sayti. – URL: http://www.stat.uz

3. O‘zbekiston Respublikasining “Rasmiy statistika to‘g‘risida” gi O‘RQ - 707 – sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. . www.lex.uz
4. O‘zbekiston Respublikasining Yangi tahrirdagi “Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida”gi Qonuni. 2004 yil 26 avgust.
5. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi statistik to‘plami. — Toshkent: Milliy statistika qo‘mitasi, 2023–2025 yillar.
6. O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi. Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish bo‘yicha yillik hisobotlar. — Toshkent, 2024.
7. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — New York: Free Press, 1985.
8. Kaplinsky R., Morris M. A Handbook for Value Chain Research. — Ottawa: IDRC, 2001.
9. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains // Review of International Political Economy. — 2005. — Vol. 12(1). — P. 78–104.
10. World Bank. Agricultural Value Chain Development: A Toolkit. — Washington, DC: World Bank Publications, 2010.
11. FAO. Developing Sustainable Agricultural Value Chains. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014.
12. Rasulov A., Xudoyberdiyev S. Qishloq xo‘jaligida qo‘shilgan qiymatni oshirishning iqtisodiy mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2021. — №4. — B. 45–53.
13. Abdukarimov B. A. Qishloq xo‘jaligi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish yo‘llari. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
14. С. Худойбердиев, Б. Ашуров, О. Тоғаев. Эконометрика асослари фанидан маъруза матни. Самарқанд, СамИСИ, 2019 й
15. И.Ҳабибуллаев., А.Жумаев Эконометрика. Амалий машғулот учун ўқув қўлланма. -Т.: «ИҚТИСОД-МОЛИЯ » нашрёти, 2019, 173 бет.
16. Shodmonov S. Sh. Fermer xo‘jaliklari faoliyatining samaradorligini baholash metodologiyasi. — Toshkent: Fan, 2020.
17. Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. — 1955. — Vol. 45(1). — P. 1–28.
18. OECD. Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and Implications for Policy. — Paris: OECD Publishing, 2013.
19. Алимов Р.Х., Болтаева Л.Р., Ишназаров А.И. Эконометрика-2 // Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2012. –115 б.
20. UzDaily. Uzbekistan’s agricultural sector output reaches nearly 539 trillion soums. — 2025.

Murodova D.S.
o'qituvchisi
Qarshi davlat universiteti

QASHQADARYO VILOYATI YOQILG 'I ENERGETIKA SANOATINING IQTISODIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Maqolada Qashqadaryo viloyati sanoat tarmoqlarining shakllanishi va rivojlanishi, ishlab chiqarish,sanoat tarmoqlari tarkibi va hududiy tashkil etish, ishlab chiqarishning hududiy tashkil etish shakllari, gaz va neft sanoati, sanoat tarmoqlarining hududiy tarkibidagi o'zgarishlar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *agrar-undustrial, sanoat ishlab chiqarishini hududiy tashkil etish, sanoat tarmoqlar tarkibi, sanoatning hududiy tarkibi, ishlab chiqarishni tashkil etishning ijtimoiy shakllari, divertsifikatsiya.optimaltirish, iqtisodiy salohiyat, konsentratsiya*

Murodova D.S
teacher
Karshi State University

ECONOMIC GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE FUEL AND ENERGY INDUSTRY OF KASHKADARYA REGION

Abstract: *The article analyzes the formation and development of industrial sectors in the Kashkadarya region, the structure and territorial organization of production, industrial sectors, forms of territorial organization of production, the gas and oil industry, and changes in the territorial structure of industrial sectors.*

Keywords*: agrarian-industrial, territorial organization of industrial production, structure of industrial sectors, territorial structure of industry, social forms of organization of production, diversification. optimization, economic potential, concentration*

Hozirda jahonning yetakchi mamlakatlarida sanoatni rivojlantirishda ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanish jarayonini tadqiq etishda ishlab chiqarish salohiyatida innovatsion tarkibiy elementlar salmog'ini oshirish, sanoatning yangi istiqbolli tarmoqlarini ustuvor rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, hududlardagi iqtisodiy resurslarning notekis taqsimlanish holatlari hamda ularning salbiy ta'sirini kamaytirish, hududlararo iqtisodiy munosabatlarni optimallashtirish, turli iqtisodiy subyektlarning o'zaro manfaatli faoliyatini yo'lga qo'yishda klaster tizimidan foydalanish, ishlab chiqarish salohiyatidagi innovatsion tarkibiy elementlar salmog'ini oshirish, sanoatning yangi istiqbolli tarmoqlarini ustuvor rivojlantirish, tarmoqning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash,

oqilona foydalanish hamda ularni maqsadga muvofiq tartibga solish borasida muhim ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda.

Qashqadaryo viloyatining iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan agrar-industrial yo‘nalishga ega. Yaqin kelajakda uning industrial-agrar xususiyatini olishiga tegishli imkoniyatlar mavjud. Hozirgi vaqtda viloyat yuksak iqtisodiy salohiyatiga ega bo‘lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. U respublika milliy iqtisodiyotida o‘ziga xos “lokomotiv” vazifasini bajaradi. Bu yerda neft-gaz, tog‘-kon kimyosi, paxta, g‘alla, chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish yaxshi rivojlangan. Xususan, neft va gaz, paxta va g‘alla yetishtirishda u mamlakatimizda birinchi, kimyoviy mahsulotlar (polietilen va b.) hamda chorvachilik bo‘yicha ham oldingi o‘rinlarning birini egallaydi.

2023 yil yakunlariga qaraganda, bu yerga mamlakat yalpi ichki mahsulotining 5,5, sanoat ishlab chiqarishining 4,3, qishloq xo‘jaligi mahsulotining 9,4 foizi to‘g‘ri kelgan. Yalpi ichki mahsulot ulushiga ko‘ra viloyat - 6, sanoatda - 8, qishloq xo‘jaligida – 5 o‘rinda turadi. Qashqadaryo viloyati respublika sanoatidagi ulushi bo‘yicha 2018 yilda 5-o‘rinda bo‘lsa, 2022 yilga kelib Toshkent shahri, Toshkent, Navoiy, Andijon, Farg‘ona, Samarqand, Buxoro viloyatlaridan keyin 8-o‘rinni egalladi (2.7-rasm). Viloyatning respublika sanoatidagi ulushi 2023 yilda 4,3 foizni tashkil qildi. Xuddi shunday “yalpi hududiy mahsulotda sanoatning ulushi” bo‘yicha esa Qashqadaryo viloyati respublikada 8-o‘rinni egalladi.

Bugungi kunda respublikamiz sanoatini rivojlantirishda mahalliy xom-ashyo va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash imkoniyatiga ega Qashqadaryo viloyatining sanoat salohiyatidan samarali foydalanish dolzarb iqtisodiy ahamiyat kasb etadi

Sanoat sohasida mehnatni ijtimoiy tashkil qilishning eng oliy turi konsentratsiyaning yuqori darajasi va shu asosda ijtimoiy ishlab chiqarishni uyushtirishning ilg‘or usullari ixtisoslashtirish, kooperativlashtirish va kombinatlashtirish, ishlab chiqarishni potok tizimi yordamida uzluksiz tashkil etiish ustunlik qiladi.

Sanoat va ayniqsa, uning eng muhim sohasi bo‘lgan og‘ir sanoat mamlakatda kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning asosi hisoblanadi. U moddiy-texnika vositalarini o‘zi va boshqa tarmoqlar uchun takror ishlab chiqarish bilan bir vaqtda jamiyat a’zolari o‘rtasidagi ijtimoiy ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirib ham boradi.

Sanoat qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishni qayta qurishning negizi hisoblanadi. Uni yangi texnika bilan ta’minlash orqali fermer, shirkat, dehqon xo‘jaliklarini va boshqa shakllarda faoliyat ko‘rsatayotgan subyektlarni iqtisodiy va madaniy jihatdan yuqori darajaga ko‘tarishga, shahar bilan qishloq o‘rtasidagi muhim tafovutlarni yo‘qotishga, dehqon mehnatini industrial mehnatga aylantirishga yordam beradi.

Sanoat moddiy ishlab chiqarishning bosh tarmog‘i, iqtisodiyotning poydevoridir. Milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini qayta qurishga qodir bo‘lgan yirik mashinalashgan sanoatgina mustaqillikning birdan-bir moddiy negizi bo‘lishi mumkin.

Hozirgi vaqtda viloyatda 100 dan ortiq yirik korxonalar ishlamoqda. Ayniqsa, mustaqillik yillari yoqilg‘i-energetika sohasi Qashqadaryo viloyatida eng jadal rivojlangan, eng ko‘p investitsiyalar kirtilgan soha bo‘ldi. Bu tabiiy edi, chunki viloyat respublikaning asosiy yoqilg‘i-energetika bazasi hisoblanadi. E’tiborlisi shundaki, chet ellik sarmoyadorlar viloyatning nafaqat neft-gaz va energetika sohasiga shuningdek, oziq-ovqat, yengil sanoat va boshqa tarmoqlariga ham investitsiyalar kiritilmoqda. Masalan, G‘uzor tumanidagi 30 ming tonna bo‘g‘doyni qayta ishlaydigan un kombinatiga, “Yakkabog‘teks”, Shahrisabzdagi “Oqsaroy-to‘qimachilik LTD”, Qarshi shahridagi “Cotton Road” korxonalariga chet el sarmoyalari to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat kafolatisiz kiritilgan.

Viloyatda bo’yicha faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning soniga ko’ra tahlil qilganda Qarshi shahri (6463 ta), Koson (2366 ta), Qarshi tumani (2355 ta) yetakchilik qilsa, Dehqonobod (1124 ta), Muborak (1124 ta) va Ko’kdala (984 ta) tumanlari quyi o’rinlarni band etadi

Viloyatimizda hozirgi kunda faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning soni 33064 tani tashkil etadi, shu jumladan sanoat yo’nalishidagi korxona va tashkilotlar soni 3776 ta (11,4 %) ni tashkil qiladi. Bunday turdagi korxona va tashkilotlarning soniga ko’ra viloyatda Qarshi shahri (687 ta), Kitob tumani (436 ta) va Yakkabog’ tumanlari (336 ta) yetakchilik qiladi

Yoqilg‘i-energetika sanoati viloyat sanoatining muhim tarmog‘i bo‘lib, neft va gaz qazib olish, elektroenergetika ishlab chiqarish hamda gazni qayta ishlash sohalarini o‘z ichiga oladi. Viloyatda gaz sanoatining vujudga kelishi va rivojlanishi mamlakat yoqilg‘i-energetika bazasini mustahkamlashga imkoniyat yaratadi. Natijada chetdan yoqilg‘i keltirish hamda buning uchun ketadigan transport va boshqa harajatlar keskin kamaydi.

Viloyatda gaz va neft qazib olish 60-yillardan boshlandi, 1965-yilda viloyatda 164,2 mln m3 gaz, 29 ming t neft qazib olingan bo‘lsa, 1970 – yilda 3232 mln m3 gaz, 334 ming t neft va 1520,1 ming t kondensat olindi.

Bugungi kunda mamlakatimizda qazib chiqarilayotgan tabiiy gazning 70 foizi, neftning qariyib 78 foizi, gaz kondensatining 80 foizi, g‘allaning 13 foizidan ortig‘i, paxtaning 14 foizdan ziyodi viloyat hissasiga to‘g‘ri kelmoqdaBugungi kunda mamlakatimizda qazib chiqarilayotgan tabiiy gazning 70 foizi, neftning qariyib 78 foizi, gaz kondensatining 80 foizi, g‘allaning 13 foizidan ortig‘i, paxtaning 14 foizdan ziyodi viloyat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Qashqadaryoda qazib olinadigan gazning asosiy qismi quvurlar orqali viloyatdan tashqarida joylashgan iste’molchilarga yetkazib berilmoqda. Umuman Qashqadaryo viloyati gaz va neft sanoatining istiqboli ancha porloq. Chunki, hozirgi paytda viloyat hududida ko‘plab istiqbolli gaz konlari aniqlangan. Bu yerda topilgan gaz konlari kondensatli bo‘lib, tozalashni talab qiladi. Shu maqsadda 1972-yili Muborak gazni qayta ishlash zavodi qurildi. Hozirgi kunda bu korxonada 36,1 mlrd m3 gazni qayta ishlash natijasida xalq xo‘jaligi uchun zarur bo‘lgan 188,4 ming t oltingugurt olinmoqda. SHo‘rtangazini quvurlar orqali Taxiatosh GRESiga yetkazib berilishi natijasida har yili chetdan 100 ming t mazutni olib kelishga chek qo‘yildi.

Qoraxitoy-Qarshi gaz quvurining ishga tushirilishi Qarshi, Koson va Beshkent aholi punktlarini tabiiy gaz bilan ta’minlash imkonini berdi.

Elektr-energetika sohasida ham viloyatda respublika ahamiyatiga ega bo‘lgan Talimarjon issiqlik elektrostansiyasining birinchi 800 MGVt quvvatli bloki ishga tushirildi. Uning barcha to‘rt bloki 3,2 MGVt quvvatga ega bo‘ladi. Taqqoslash uchun o‘z vaqtida butun O‘rta Osiyoda yirik hisoblangan Nurek GESi quvvati 1,2 MGVt ekani eslash kifoyadir. Bugungi kunda Talimarjon GESi 6 mlrd kVt / soat elektroenegriya ishlab chiqarilmoqda.

Hozirgi vaqtda Qashqadaryo viloyatining janubi-g‘arbiy qismida joylashgan va zahirasining kattaligi jihatdan mamlakatimizda tengi yo‘q SHo‘rtanda gaz majmui qurilgan hamda oltingugurt kamroq bo‘lgan tabiiy gazni energetika ehtiyojlari uchun mintaqalarga uzatish uchun Sho‘rtan-Sirdaryo-Toshkent gaz quvuri ishga tushirilgan. Shuningdek, Gazli-Chimkent gaz quvuri qurilib foydalanishga topshirildi. Sho‘rtan gaz majmuida jahonda birinchi bo‘lib molekulyar elaklar qo‘llanilmoqda.

Yoqilg‘i-energetika majmuasining bundan keyingi rivoji viloyatda amalga oshiriladigan geologiya-qidiruv ishlarining samaradorligi, majmua mahsulotlarini qayta ishlash darajasiga bog‘liq. Shu munosabat bo‘lgan keyingi yillarda viloyatda Zevarda, O‘rtabuloq va Janubiy Tandirchi konlarini o‘zlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Sanoat korxonalari viloyat hududida ancha notekis joylashgan. Hozirgi kunda asosiy sanoat korxonalari Muborak, G‘uzor, Qarshi, Shahrisabz shaharlarida joylashgan. Bu shaharlarda joylashgan sanoat korxonalari butun viloyatda ishlab chiqarilayotgan sanoat yalpi mahsulotining 80%dan ko‘prog‘ini bermoqda. Mavjud sanoat korxonalari Qarshi-G‘uzor, Muborak hamda Shahrisabz-Kitob sanoat tugunlarida joylashgan.

Viloyatda 2023 yilda 10,2 ming tonnona xom neft, shag’al 47,5 ming tonna, chaqiq tosh (sheben) 28,9 ming tonna, 82,1 mln m/kub tabiiy gaz, 105,5 ming tonna gaz kondensati ishlab chiqarildi (1-jadval).

1-jadval

Ayrim turdagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish


Sanoat mahsulotlari	*2022- yil yanvar-dekabr*	*2023- yil yanvar-dekabr*	*Farqi +/-*
Shag'al, ming t.	40,4	47,5	7,1
Neft, ming t.	20,4	10,2	- 10,2
Tabiiy gaz, mln. kub.m	521,2	82,1	- 439,1
Gaz kondensati, ming t.	112,5	105,5	- 7,0

Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma’lumotlari, 2023 yil.

Viloyat sanoatining tarmoq tarkibida og`ir sanoatning boshqa tarmoqlari ulushi nihoyatda past. Viloyatda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlarining respublika sanoatidagi ulushi 4,3 foizni va hududlar orasida 8-o‘rinni egallagan. Shuningdek, viloyat sanoati tarkibida tog‘-kon sanoatining ulushi – 5,8 %, ishlab chiqariladigan sanoat 78,3 %, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sanoati – 15,4 %, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish sanoati - 0,5 foizni tashkil qilgan. Viloyatda sanoat ishlab chiqarish hajmida viloyatning 3 ta hududi – Nishon (29,7%), G‘uzor (13,5%) tumanlari va Qarshi shahri (13,4%) asosiy qismni tashkil qiladi (1-rasm).

1-rasm

Qashqadaryo viloyati sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishining hududiy taqsimlanishi (2023 yil, foizda)



Manba: Qashqadaryo viloyati Statistika boshqarmasi ma’lumotlari, 2023 yil.

Viloyat iqtisodiyotiga barcha manbalar hisobidan 90,0 trln so‘mlik investitsiyalar jalb etilib, shundan 50,9 trln so‘mi xorijiy investitsiyalarni tashkil

etgan. 2021 yilda viloyatda “Uzbekistan GTL” zavodining ishga tushirilishi O‘zbekistonda yangi sanoat davrining ifodasi, deb baholanmoqda. Zavodning qiymati 3 mlrd 420 ming dollar bo‘lib, binolar maydoni 135 gektarni tashkil qilgan. Zavod yiliga 3,6 mlrd metr kub tabiiy gazni qayta ishlab, 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg‘isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirigan gaz tayyorlash quvvatiga ega. Bunday yirik majmua shu paytgacha jahonda faqat 4 ta davlatda – Qatar, Nigeriya, Janubiy Afrika Respublikasi va Malayziyada barpo etilgan. Zavodda Yaponiya, Koreya, Singapur, AQSH, Germaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy kabi 24 ta davlatdagi 130 ga yaqin yetakchi korxonalarda tayyorlangan 10 mingdan ziyod uskunalar o‘rnatilgan. Texnologik yechimlar, uskuna va jarayonlarni qo‘llash uchun 140 ta xalqaro litsenziya va patentlar olingan.

Qashqadaryo viloyatida sanoat mahsulotining o‘sish sur’ati respublika ko‘rsatkichiga nisbatan ancha yuqori bo‘lgan variatsiyalanish xarakteriga ega, jumladan, viloyatda sanoat mahsulotining eng yuqori o‘sish sur’ati 2008 yilga (118,9 foiz) to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, eng quyi o‘sish sur’ati 2010 yilga (96,8 foiz) to‘g‘ri keladi. Qator yillar davomida viloyatda sanoat ishlab chiqarish hajmining mutlaq o‘sish tendensiyasi kuzatiladi. Qashqadaryo viloyati sanoat ishlab chiqarishining tarmoq va hududiy tarkibini tahlil qilish natijalari uning bir yoqlama xususiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Agar sanoatning tarmoq tarkibida tog‘-kon sanoati, oziq-ovqat, to‘qimachilik va kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish ustuvor o‘ringa ega bo‘lib, ularning yalpi sanoat mahsulotidagi birgalikdagi ulushi 2023 yilda 80 foizdan ko‘proqni tashkil etgan bo‘lsa, uning hududiy tarkibida uchta hudud – Nishon, G‘uzor va Qarshi shahri salmoqli ulushga ega (ularning birgalikdagi ulushi 56,6 foizga teng). Agar Qashqadaryo viloyati sanoat ishlab chiqarishni tumanlar kesimida tahlil qilinsa, uning turli sur’atlarda rivojlanganligining guvohi bo‘lish mumkin. Xususan, viloyatning eng yirik sanoat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tumanlari – Muborak va G‘uzor tumanlari hamda Qarshi shahrida sanoat mahsuloti ishlab chiqarish 2010-2023 yillarda viloyat ko‘rsatkichiga nisbatan past sur’atlarda o‘sgan. Agar 2010 yilga nisbatan 2023 yilda viloyat sanoat mahsuloti joriy narxlarda 3,1 martaga o‘sgan bo‘lsa, Muborakda 1,8 marta, Qarshi shahrida 2,3 marta va G‘uzor tumanida 2,85 marta o‘sgan. Boshqa barcha tumanlarda sanoat ishlab chiqarishining o‘sishi viloyat ko‘rsatkichidan yuqori bo‘lgan. Ayniqsa, Nishon (29,5 marta), Dehqonobod (15,5 marta), Qarshi (13,7 marta) va Kitob (12,5 marta) tumanlarida sanoat ishlab chiqarishi yuqori sur’atlarda o‘sgan

Viloyatning sanoat strategiyasi yuqori texnologiyalarga asoslangan va sanoat klasterlari shaklida tashkil etiladigan tayanch o‘sish nuqtalari, mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlovchi hududiy sanoat ishlab chiqarishini, hududlarda tashkil etiladigan kichik sanoat zonalari, ularga xizmat qiluvchi kasanachilik va hunarmandchilik asosida tashkil etiladigan sanoat ishlab chiqarish subyektlarini o‘z ichiga oladi.

Viloyat hududida sanoat ishlab chiqarishini mutanosib rivojlantirish maqsadida tumanlarning mineral-xomashyo resurslari bilan ta’minlanganlik

darajasi, ishlab chiqarish va bozor infratuzilmalarining rivojlanganlik darajasi, mehnat resurslari hamda asosiy kapitalning miqdori va sifati kabi ustun omillarga qaratish hamda viloyat oziq-ovqat sanoati hamda foydali qazilmalarni ishlab chiqarishida tumanlararo qo‘shilgan qiymat zanjirini yaratish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda Qashqadaryo viloyatida qayta ishlovchi sanoat tarmoqlarning rivojlanishi oziq-ovqat va yengil sanoat tarmoqlari hamda qishloq xo‘jaligi, o‘rmonchilik va baliqchilik sohalarining rivojlanishiga olib kelishi mumkinligi aniqlandi. Shuningdek, qayta ishlovchi tarmoqlarning rivojlanishi xizmatlar sohasining taraqqiyotiga ham kuchli ta’sir etadi (bank, sug‘urta, aloqa xizmatlari, savdo va transport). Ayniqsa, xizmat ko‘rsatishning bir nechta tarmoqlari qayta ishlovchi sanoatga bevosita bog‘liq bo‘lib, jumladan, sanoat tovarlarini iste’molchilarga yetkazish orqali mazkur faoliyat turi rag‘batlantiriladi. Shuningdek, qayta ishlovchi sanoat ilmiy-tadqiqot, ulgurji va chakana savdo, avtomobillarni ta’mirlash va ularga texnik xizmat ko‘rsatish sohalarining rivojlanishiga ham yaxshigina ta’sir etadi.

Qashqadaryo viloyati sanoatining hududiy tarkibidagi o`zgarishlar quyidagi vazifalarni hal etishni taqozo etadi:

✓ Muborak tumani sanoatining bir tomonlama xarakterga ega ekanligini hisobga olib, ushbu tumanda sanoatning boshqa tarmoqlari, xususan neft qisman yirik sanoat korxonalariga xizmat ko`rsatuvchi kichik va o`rta sanoat korxonalarini rivojlantirish, ishlab chiqarishning tugallangan xarakterga ega bo`lishini ta`minlash asosida tumanning ixtisoslashuv darajasini chuqurlashtirish;

✓ Qarshi shahrining mavjud iqtisodiy, tabiiy va intellektual salohiyatidan kelib chiqqan holda bu yerda sanoatning yuqori texnologiyaga asoslangan, ilmtalab tarmoqlarini rivojlantirish va shu asosda sanoat ishlab chiqarishining diversifikasiyalashuviga erishish;

✓ mineral xom ashyo resurslariga boy hududlar — Kitob, Yakkabog`, Dehqonobod va G’uzor tumanlarida mavjud xom ashyoni qayta ishlashga asoslangan sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish;

✓ deyarli barcha tumanlarda qishloq xo`jalik xom ashyosini qayta ishlovchi sanoat korxonalarini barpo etishni rag`batlantirish va qo`llab-quvvatlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1.Soliyev A va boshqalar Mintaqaviy iqtisodiyot. –T., 2003.
2.Soliyev A. O’zbekiston geografiyasi.-T.:Universitet, 2014, 404 b.
3.Soliyev A., Nazarov M., Qurbonov Sh. O’zbekiston hududlari ijtimoiy -iqtisodiy rivojlanishi . –T.: “Mumtoz so’z”, 2010.
4.Soliyev A.S.Iqtisodiy geografiya nazariya, metodika va amaliyoti. Toshkent:Kamalak,2013,184.b.
5..Murodova D.S. Boymurodov S. Городские резиденции Кашкадарьинской области и изменения их местоположения. "Экономика и социум" №5(96) 2022. с/535-545
6.Murodova D.S.Основные особенности демографической ситуации в Кашкадарьинской области. Экономика и социум” 1 (92) 2022. с/ 72-78

7.Murodova D.S Характеристика природного населения Кашкадаринской области.
Экономика и социум” 4 (83) 2021.226-230 b
8..Murodova D. S. Geographical features of the population distribution// Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities Hosted online from Plano, Texas, USA. Date: 1 st March, 2023. P. 1-6
9..Муродова Д. Экономико- географическое особенности населения Кашкадаринской области. ”Экономика и социум” № 2(81) 2021. с/ 55-58
10.Murodova D.S..Economic geographical factors affecting the formation of city addresses. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal . Vol. 12, Issue 11, November 2022 . B 29-34
11.Муродова Д,С, Хужамова С.Б.Теоретико-методологические аспекты изучения миграционных процессов. Экономика и социум” №4 (95) 2022 с/ 174-178
12.Murodova D.S.Main Characteristics Of The Demographic Situation AndEconomic And Social Development Of Kashkadarya Region. Eurasian Journal of History, Geography and Economics. Belgiya .Volume 16 2023 yil B 32-35
13. Qashqadaryo viloyatining statistik axborotnomasi. Qarshi-2024.
14.O’zbekiston sanoati /2018-2021/ Промышленность Узбекистана.O’zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo’mitasi.Toshkent-2022,150 b.

Mustafoev Z.M., PhD
associate professor
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANATOMICO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF EXTRACARDIAC VESSELS IN RABBITS

Abstract*: In this article, the collateral circulation of the heart was studied in its pathological conditions in an experiment on rabbits. And also the blood vessels of the heart under conditions of experimental stenosis of the abdominal aorta on nine rabbits. The operation of stenosis of the abdominal aorta was performed under ether anesthesia.*

Key words*: rabbit, blood circulation, experimental stenosis, blood vessel, aorta, heart, stenosis.*

Introduction. Extensive anatomical literature exists on the coronary circulation of the heart in humans and animals, both under normal conditions and in experiments [1,4]. However, many questions regarding cardiac blood supply remain insufficiently studied. In particular, few studies have examined cardiac vessels during collateral circulation after vessel occlusion in cardiac pathology [3,5]. Only recently have publications emerged on collateral circulation in heart pathology [2,6].

Objective. To study collateral circulation of the heart under pathological conditions in an experimental rabbit model.

Materials and Methods. Thoracic aortic stenosis surgery in rabbits was performed under ether anesthesia combined with local infiltration anesthesia using 0.5% novocaine solution. After a skin incision on the ventral trunk wall, the sternum was exposed and split longitudinally into two halves. The aorta was dissected free, and a thick silk thread was passed underneath it using a Deschamps needle. The ends of the thread were tied over the aorta, with the knot gradually tightened to achieve the desired degree of aortic narrowing. Following constriction, the wound was closed in layers.

Postmortem, the blood vessels were injected with an aqueous suspension of India ink diluted 1:4. After injection, the heart was fixed in 20% formalin solution. On the second day after fixation, the dimensions and weight of the heart were determined. Cleared specimens were examined under MBS-2 and MBI-6 microscopes. For comparison, the hearts and their intramural blood vessels, as well as electrocardiographic recordings, were studied in 8 healthy rabbits.

Results. The rabbit heart is supplied primarily by two coronary arteries originating from the aorta at the level of the free edge of the semilunar valves. The vascular network is most prominent in the subepicardial layer, where vessels branch

into small twigs resembling fir tree branches. In the muscular layer, vessels are smaller, oriented along muscle fibers, though some run in various directions. In a rabbit euthanized 2 days after thoracic aortic stenosis, the heart was enlarged. Left ventricular wall thickness increased by 0.8 mm compared to normal, right ventricular wall by 0.2 mm, resulting in overall changes in heart dimensions: length exceeded normal by 0.6 cm, width by 0.22 cm, thickness by 0.28 cm, and heart weight by 2.74 g. Corresponding vascular changes included increased vessel diameter and straighter course. In the subepicardial layer, vessel diameters ranged from 30–500 microns. Capillary density decreased by 300–500 per mm². In the muscular layer, changes were milder, with diameter increases of no more than 5–10 microns compared to normal.

At 20 days post-aortic stenosis, cardiac vessels showed significant diameter enlargement: up to 800 μm in the subepicardial layer and 120 μm in the muscular layer. Vessels adopted a narrow branching pattern, with reduced capillary density.

These experiments demonstrate that experimental thoracic aortic stenosis in rabbits induces functional hypertrophy of the ventricular walls, predominantly the left ventricle. In another series, cardiac blood vessels were studied in nine rabbits following experimental abdominal aortic stenosis.

On the first postoperative day, animals refused food, exhibited reduced activity, weak femoral artery pulse, and heart rate of 60–80 bpm (normal: 100–120 bpm). On the second day, hindlimb paresis developed. Four rabbits died within the first three days; autopsy revealed ascites and hydrothorax. Survivors appeared well, but femoral pulse remained weak and heart rate did not exceed 90 bpm. Thus, heart weight and cardiac index (CI) are inversely related. Experiments were conducted on rabbits of similar body weight (12–18 kg), where normal CI was 0.6–0.8%. In experimental animals, CI ranged from 0.9–1.2% depending on survival time post-stenosis. The difference between longitudinal and transverse heart dimensions was 3–5 cm normally and 2–4 cm experimentally. Heart mass and size increased mainly due to left ventricular wall thickening, with minor right ventricular contribution and no change in atrial wall thickness. Vascular responses in cardiac stenosis of the abdominal aorta mirrored those in thoracic aortic stenosis, corresponding to myocardial changes. Normally, the rabbit heart is supplied by two coronary arteries that branch in the subepicardial layer into II, III, and IV order arteries (diameters 60–800 μm), forming a dense anastomotic network. Other vessels penetrate the muscular layer, dichotomously branching into tree-like patterns with delicate anastomoses. Vessels of VI order (20–40 μm) reach the subendocardial layer. Capillary density in the muscular layer is 7800–8900 per cm². At 2 days post-abdominal aortic stenosis, vessel injection improved, with normal sequential branching and increased diameters; capillary density remained at the upper normal limit. By day 20, large-diameter vessel walls thickened, small-network anastomoses dilated, and capillary density per cm² increased.

Conclusion. Thus, heart weight and cardiac index (CI) are inversely proportional. In rabbits, CI depends on survival time post-aortic stenosis and ranged from 0.9–1.2%. The data obtained in these series serve as initial, control values for

further investigation of collateral cardiac circulation against the background of the described pathological conditions.

References.

1. Абугов, С. А. Эндоваскулярное лечение аневризм брюшной аорты с применением фенестрированных эндографтов, изготовленных под заказ компанией-производителем / С. А. Абугов, Г. С. Власко, Р. С. Поляков и др. // Consilium Medicum. - 2023. Т. 25, №10. С. 698-702.
2. Mamataliyev A. R., Sh R. S., Zohidova S. H. EKSPERIMENTAL JIGAR SIRROZI SHAROITIDA PASTKI PORTO KAVAL VENOZ TIZIMI MORFOLOGIYASINING ORGANILGANLIK DARAJASI //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – С. 1346-1350.
3. Маматалиев А. Р. и др. АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И АКТИВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СТЕНОК ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 30. – С. 163-168.
4. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
5. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.
6. Satybaldiyeva G. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

УДК 613.2614.31:633

Muxamedova Z.R.
assistant professor
Department of Hygiene
Bukhara State Medical Institute
Uzbekistan

RESULTS OF THE STUDY OF LIFESTYLE AND PHYSICAL ACTIVITY CHARACTERISTICS OF STUDENTS

Annotation. *The article, we conducted a comparative analysis of medical students' responses during offline and online learning, addressing healthy lifestyle issues and student adaptation to the social and academic environment of the institute. The study also assessed students' nutritional status and its impact on their bodies. We examined the health, lifestyle, and physical activity patterns of junior medical students. It was found that the number of young men and women with chronic diseases, including those affecting two or more systems, is increasing.*

Key words: *students, diet, rational nutrition, nutrition analysis.*

Introduction The problem of nutrition and prevention of diseases, the development of which is partially or completely related to nutrition, remains quite relevant. The student time is very rich and varied, it is distinguished by a great tension of all functional systems of the body. The diet is monotonous, characterized by a lack of vegetables, fruits, dairy products, meat, and an excess of fast food in the diet.

The increasing complexity of the medical profession places increased demands on the health of future doctors. A large amount of training loads, the complexity of the material being studied, the intensification of the educational process lead to an increase in the psycho-emotional stress of students, which is reflected in the level of their mental and somatic health [1,2].

Important for the health of young people is the process of adaptation to new conditions of living and nutrition. They are characterized by a sharp change in their usual way of life, the formation of interpersonal relationships outside the family [3,4].

The problem of preserving the health of student youth is currently becoming increasingly important. The reasons for the deterioration of health can be various factors, including the wrong attitude of a person to his health [3,5,6].

One of the ways to preserve the health of students is the solution of the preventive task of diagnosing risk factors.

The emergence of the corona virus pandemic COVID-19 in the world showed a low level of physical health and a healthy lifestyle of the population of Uzbekistan, as in a number of other countries.[6,7,8].

Corona virus infection COVID-19 has had a negative impact on the health of fellow citizens, suffering primarily from cardiovascular diseases, respiratory

diseases and obesity (overweight). As a result, today's pandemic has caused premature deaths for many of our citizens. The pandemic today requires all of us to draw serious conclusions and adhere to the principles of a healthy lifestyle.

The situation that has arisen today requires all of us to draw serious conclusions, get rid of bad habits, regularly engage in mass sports, observe the principles of proper nutrition, in particular, refrain from excessive consumption of foods high in salt, sugar and fat, as well as flour dishes, sweets and bread. products, in a word, to introduce a healthy lifestyle into our everyday life. At present, in a period of change in the socio-economic, demographic situation in the country, it became necessary to proclaim as a priority of the state social strategy the idea of preserving the health of citizens, formulated in official documents, decisions (the president of the republic of Uzbekistan on measures for the wide introduction of a healthy lifestyle and the further development of mass sport).

Therefore, healthy development of the nation is an unconditional social value, the basis of national wealth and a condition for national security, it reflects the viability and geopolitical prospects of the country, and is a condition for its sustainable development. Thus, the health of the nation acquires a system-forming value for the state. It is in the interests of every citizen to treat their health responsibly [6]. Also, the peculiarities of working with students In Uzbekistan, the reform of the education system, carried out in higher educational institutions, touched upon topical issues of physical culture self-education of student youth, rational nutrition. In the program for the development of education, the leading ones are: the tasks of maintaining health, optimizing the educational process using information and communication technologies, forming the value of health and a healthy lifestyle. In modern society, the processes of informatization of all forms of educational activities, including the physical education of young people, are characterized by the processes of improvement and mass dissemination of modern information and communication technologies . These technologies are actively used to transfer information and ensure interaction between a physical education teacher and a student in the modern education system. The teacher should not only have knowledge in the field , but also be a specialist in their application in their professional activities [9]. With the help of network information and communication technologies, it becomes possible to have wide access to educational, methodological and scientific information on the daily routine , rational nutrition, physical culture, organization of consulting assistance to students, modeling of physical culture and health-improving activities, conducting a practical lesson, reading lectures of training sessions in real time. Students work with the help of information and communication technologies allows you to store and transmit the bulk of the material being studied, gives a deep assimilation and understanding of information. These technologies provide opportunities for self-learning and self-testing of acquired knowledge. Unlike the traditional method, electronic classes make it possible to present material in a dynamic graphic form [7,8]. The use of a multimedia educational and methodological complex in physical culture and nutrition of students is an urgent task, the main goal of which is to improve the

educational process in physical culture at a university using modern information technologies. Application of information and communication.

Purpose of research: to study the state of health, diet. The formation of a proper lifestyle for a student is taking care of one's health. Encourage students to promote health and preserve it, support and promote the culture of a healthy lifestyle among young people, cultivate a kind of fashion for health.

Materials and methods of research: Anonymous survey included 250 students of the second and fourth years of medical school at the age of 20-25 years, including 120 girls - boys - 130 people. They were asked to answer a number of questions, affecting both the understanding of the elements to the correct approach to health, consisting of questions conditionally divided into blocks: rational and high-quality nutrition, daily routine and routine, physical education and sports, bad habits, and more. Questions were included: options for a rational menu, whether they do morning exercises, the presence of smoking cigarettes, nose, cigarettes. Students chose one or more options that were more in line with their opinion. In order to obtain information about students belonging to health groups, about the presence and severity of diseases, medical certificates (form 086/y) were studied.

results and discussion.

During the survey, it was revealed that 66% of second-year students do not neglect the regularity of breakfast, of which 36% of girls 30% of boys, 84% of fourth-year students eat breakfast regularly, of which 50% of girls 34% of boys. Of the surveyed second-year students, 34% do not always have breakfast, 23% rarely have breakfast and 11% do not have breakfast at all, senior students 26% do not always have breakfast, 18% rarely have breakfast and 8% do not have breakfast at all. At the same time, 23% of respondents do not take breakfast with them to study; sometimes 53% of respondents take something; 15% and 6% of students take food often or always with them, respectively. So, according to research, up to 27% of students living in dormitories leave for classes without having breakfast. Of those who try not to skip breakfast, 12% consider porridge to be an integral part of the diet, the rest never consume porridge, which is a source of "slow" carbohydrates. Always for breakfast they use various sandwiches and drinks such as tea and coffee, with or without the addition of milk, 76% of students. Sometimes 16% of respondents have breakfast like this. 6% of respondents try to eat meat/fish every day, 10% - milk and dairy products, 11% - cereals, 23% - vegetables and fruits. About half of the respondents eat semi-finished products every day. Some used carbonated sweet drinks of various sweets, because. such products contain a large number of various food additives, chips, and preservatives can have a positive effect on the human body, up to carcinogenesis. The majority of respondents (60%) admit that their diet is unbalanced according to one or more criteria, but they cannot RECOGNIZE it or do not want to, explaining this state of affairs by the lack of time for a regular meal and its daily independent preparation. At the same time, the vast majority (95%) are aware of the consequences of malnutrition, and only 5% of respondents answered this question in the negative. Due to the presence of complaints from the digestive system, 73% of the respondents visited the polyclinic,

and 27% did not apply for this reason even in the presence of disorders of the gastrointestinal tract. 33% of students have reliably established diseases of the digestive system. Questioning of students reflected their uncritical attitude to assessing their health. Every fifth (19.7%) of the respondents consider their health to be “excellent”, almost half (47.9%) assess it as “good”, 32.4% as “satisfactory”. None of the students rated their health as "bad" or "very bad". At the same time, the question “How often do you get sick?” only a third (32.4%) answered that they practically do not get sick, more than 50% get sick no more than once every half a year, and 17% get sick once or more every three months. 42.3% of respondents indicated that the causes of the disease were mild malaise, 28.2% - seasonal acute viral infections and their complications, 8.4% - chronic diseases. Due to illness, 11.3% of boys and girls miss an average of 10 to 20 days of classes during the year.

The results of the survey show that 70.4% of students experience weakness, fatigue, irritability, tearfulness, sleep disturbances, decreased performance and attention, which are symptoms of chronic fatigue. The causes of chronic fatigue can be emotional overstrain, stress, changes in activity, illness. In 50.7% of the young people surveyed, headaches, dizziness, a feeling of "lightheadedness", tingling in the heart area, palpitations are observed, indicating functional disorders of the cardiovascular system, which are formed under the influence of a complex of adverse factors: smoking, alcohol consumption, wrong daily routine, physical inactivity, stress. To the question “How has your health changed over the past year?” 5.6% of the students surveyed answered that it had improved, 49.3% - did not change significantly, 32.4% - worsened and 12.7% - very much worsened. Every fifth (21.1%) student's vision has worsened over the past year.

According to the results of the analysis of questionnaires, 42.3% of respondents have one or another chronic pathology, 11.3% of them have diseases of two or more body systems.

In the structure of chronic pathology, diseases of the organs of vision (29.6%), the cardiovascular system (25.3%), the gastrointestinal tract (22.5%), the respiratory organs (19.7%), and the musculoskeletal system are leading (18.3%). The share of diseases of the nervous and endocrine systems accounts for approximately 8% each, the genitourinary system - 4.2%.

The research results allow us to note that the number of students with diseases of two or more body systems is increasing from 9.9% to 11.3%. There is a decrease in the level of health from the second year to the fourth, the number of girls and boys with chronic diseases in the second year increased by 21%.

An analysis of medical certificates showed that 14.3% of respondents (only one in seven) belong to the first, 56.4% - to the second, 23.2% - to the third, 5.4% - to the fourth, 0.7% - to fifth health group.

Findings. [10]

Most (73.3%) of the young people surveyed do not follow the diet. A quarter of respondents (26.7%) receive four meals a day, 49.3% three meals a day and 24% two meals a day. 80.3% of boys and girls rarely visit the canteen, 63.3% of students

eat "harmful" food. Violation of the diet leads to the fact that a third of students complain of heartburn, abdominal pain.

Thus, significant violations are noted in the daily routine of students of the medical institute. Among the main causes of these violations, the influence of large intellectual loads should be indicated.

The study revealed that the number of smoking boys and girls is 21.1%. About 11% of them smoke for more than two years and smoke ten cigarettes a day. Almost a third (29.6%) of the students who took part in the study drink alcoholic beverages. The presence of these risk factors has an adverse effect on the health of young people.

Good living conditions have 88.7% of respondents, satisfactory - 11.3%. It has been noticed that the better the student's living conditions, the more time it takes to travel from the place of residence to the place of study. More than four hours a day are spent on the road by 46.5% of boys and girls, more than two hours by 19.7% and about 30 minutes by 33.8%.

The analysis of the conducted survey shows that 70.4% of students do not watch TV, 28.2% watch no more than 30 minutes and only 1.4% watch more than 1 hour. Less than 30 minutes a day are spent working on the computer 56.3% of respondents, more than an hour - 36.6% and 7.1% - do not work at the computer. This indicates that, due to the large amount of academic workload, students of the medical institute have practically no free

Conclusion: Thus, it was found that most of the students in the formation of their diet do not follow the principles of rational nutrition. The diet of students has a number of disadvantages, of which is the violation of the correct ratio of the daily volume of food (most of it is consumed in the evening). Students do not have a variety in the diet, lack of vegetables, fruits, deficiency of vitamins and minerals. At the same time, a third of the respondents have a pathology from the digestive organs. The impossibility of correcting the diet is explained by objective (lack of time) or subjective (unwillingness to cook food at home (hostel) and addiction to fast food) reasons. The results obtained indicate the need to work with students on the organization of nutrition and a healthy lifestyle.In this case, training sessions are held with a decrease in working capacity by 9-21%. decrease in mental performance during the school day by 7-18 % The use of informatization of physical culture self-education allowed to increase the motivational component of the educational process. For further monitoring Ring of students using ICT, you must use the following methods:

building an optimal curriculum for the discipline "Physical Education" of the third generation; health monitoring

Literature:

1. Адылова Н. М., Азимов Р. И. Особенности формирование здорового образа жизни среди населения // Молодой ученый, 2015. №11. С. 618-622.
2. Красноперова Н. А. Актуальные аспекты формирования здорового образа жизни студентов вуза // Проблемы современного педагогического образования, 2018. № 58-4. С. 138-141.

3. Тулунова А. А., Лыженкова Р. С. Формирование ЗОЖ у студенческой молодежи [Электронный ресурс] // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» (12 октября 2020 г.- 15 марта 2021 г.). URL: https://scienceforum.ru/2021/article/2018024119(датаобращения: 23.01.2022).
4.Андрющенко Ю.В., Урванцева М.В., Борисова М.В., Мусохранов А.Ю. отношение студентов вуза к формированию здорового образа жизни // Научное обозрение. Педагогические науки. 2021. № 6. С. 51-55;
URL: https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=2409
.5. Савко Э.И. воспитание культуры здоровья студентов и технология формирования здорового образа жизни в процессе физического воспитания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://esepp.ru/20-e-i-savko-vospitanie-kulturyzdorovya-studentov-i-tehnologiya-formirovaniya-zdorovogo-obraza-zhizni-vprocesse-fizicheskogo-vospitaniya.html(Сохраненная копия)
6.. Герасимова И.А. Формирование физической культуры и здорового образа жизни у студентов высших учебных заведений на основе их личностной самооценки [Текст] / И.А. Герасимов – М., 2000.
7.. Красноперова, Н.А. Педагогическое обеспечение формирования ЗОЖ студента [Текст] / Н.А. Красноперова // Теория и практика физической культуры. 2005. – №6.
8.Abdullaeva m.a. path morphological changes that develop in the wall ofthe aorta under the influence of radiation// central asian journal of medical and natural sciences. volume: 02 issue: 04 | jul-aug 2021 issn: 2660-4159 c page 198-203

Muxtorova S.N.
Muhiddinova G. J.
Xushvaxtova Ch. J.
Jumanova D.Sh.
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Ilmiy rahbar: Uroqov Q. N.
associate professor
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

PATOLOGIK ANATOMIYA VA O‘SMALAR: KELIB CHIQISH SABABLARI, RIVOJLANISH MEXANIZMLARI VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Ushbu ishda patologik anatomiya fanining asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan o‘smalar masalasi yoritilgan. Unda o‘smalarning kelib chiqish sabablari, ularning rivojlanish mexanizmlari, morfologik xususiyatlari va organizmga ta’siri haqida batafsil ma’lumot berilgan. Shuningdek, patologik anatomiya fani o‘smalarni aniqlash, ularning turini belgilash va klinik tashxisda tutgan o‘rni tahlil qilingan. Maqolada o‘smalarning yaxshi va yomon sifatli turlari o‘rtasidagi morfologik farqlar, ularning o‘sish jarayoni va tibbiyotdagi ahamiyati haqida ilmiy asoslangan ma’lumotlar bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *patologik anatomiya, o‘sma, hujayra o‘zgarishi, morfologiya, yomon sifatli o‘sma, yaxshi sifatli o‘sma, metastaz, biopsiya, gistologiya, diagnostika*

Mukhtorova S.N.
Muhiddinova G. J.
Khushvakhtova Ch. J.
Jumanova D.Sh.
Samarkand State Medical University
Scientific supervisor: Urokov K.N.
associate professor
Samarkand State Medical University

PATHOLOGICAL ANATOMY AND TUMORS: CAUSES OF ORIGIN, MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Abstract: *This paper explores one of the fundamental fields of pathological anatomy — the study of tumors. It provides an in-depth analysis of the causes of tumor formation, mechanisms of their development, morphological characteristics, and effects on the human body. The role of pathological anatomy in the identification, classification, and clinical diagnosis of tumors is also discussed. The study highlights the morphological differences between benign and malignant tumors and their significance in modern medical science.*

Keywords: *pathological anatomy, tumor, cellular alteration, morphology, malignant tumor, benign tumor, metastasis, biopsy, histology, diagnosis*

Patologik anatomiya tibbiyot fanining muhim sohalaridan biri bo‘lib, organizmda kechadigan kasallik jarayonlari, ularning sabablari, rivojlanish mexanizmlari, morfologik belgilarini chuqur o‘rganadi. Ushbu fan shifokor amaliyotining nazariy asosini tashkil etadi, chunki har qanday kasallikning mohiyatini to‘liq tushunish uchun u avvalo to‘qimalar va hujayralarda yuz beradigan o‘zgarishlarni tahlil qilishni talab etadi. Patologik anatomiya nafaqat kasallik natijasida vujudga kelgan morfologik buzilishlarni, balki ularning paydo bo‘lish mexanizmlarini ham o‘rganadi. Shuning uchun bu soha tibbiyotning barcha yo‘nalishlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, diagnostika, davolash va profilaktika jarayonlarida muhim o‘rin tutadi.

O‘smalar patologik anatomiya fanining eng murakkab va muhim bo‘limlaridan biridir. O‘sma – bu organizmda nazoratdan chiqib ketgan hujayralarning cheksiz bo‘linishi natijasida hosil bo‘ladigan yangi to‘qima o‘smasidir. Ular o‘ziga xos biologik xususiyatlarga ega bo‘lib, normal to‘qimalardan morfologik, funksional va biokimyoviy jihatdan farqlanadi. O‘smalar inson organizmidagi hujayra o‘sish jarayonlarining buzilishi natijasida paydo bo‘ladi. Bu jarayon hujayralarning nazorat mexanizmlarini yo‘qotishi, o‘sishning to‘xtovsiz davom etishi va o‘z to‘qimasining chegaralaridan tashqariga o‘sishi bilan tavsiflanadi.

O‘smalar patologik jarayon sifatida ikki asosiy guruhga ajratiladi: yaxshi sifatli va yomon sifatli o‘smalar. Yaxshi sifatli o‘smalar nisbatan sekin o‘sadi, ularning hujayralari normal to‘qimalarga o‘xshash bo‘ladi va atrofdagi to‘qimalarga kam zarar yetkazadi. Bunday o‘smalar odatda kapsula bilan o‘ralgan bo‘ladi, shu sababli ularni jarrohlik yo‘li bilan to‘liq olib tashlash osonroq bo‘ladi. Yomon sifatli o‘smalar esa, aksincha, tez o‘sadi, atrofdagi to‘qimalarga kirib boradi, ularni vayron qiladi va uzoqdagi a’zolarga metastazlar tarqatish qobiliyatiga ega bo‘ladi. Bu turdagi o‘smalar inson hayoti uchun jiddiy xavf tug‘diradi, chunki ular organizmning turli tizimlariga ta’sir qilib, umumiy holatni yomonlashtiradi.

Patologik anatomiya nuqtai nazaridan o‘smalarning o‘sish mexanizmi murakkab bo‘lib, u ko‘plab omillar ta’sirida shakllanadi. Genetik o‘zgarishlar, atrof-muhit ta’siri, kimyoviy yoki fizik omillar, viruslar, gormonal muvozanatsizliklar hujayra nazorat tizimini buzadi. Natijada hujayra normal rivojlanishdan chiqib, mustaqil yashovchi, nazoratsiz ko‘payuvchi tuzilmaga aylanadi. Hujayra yadrosi kattalashadi, sitoplazma tuzilmasi o‘zgaradi, yadro va hujayra o‘rtasidagi muvozanat buziladi. Bu esa patologik anatomiya nuqtai nazaridan o‘smalarning asosiy morfologik belgilaridan biri hisoblanadi. O‘smalarning rivojlanish bosqichlari ham patologik anatomiya fanida alohida o‘rganiladi. Avval hujayraning genetik apparatida o‘zgarish yuz beradi. Keyinchalik bu o‘zgarishlar hujayra faoliyatida, bo‘linish jarayonida va to‘qima strukturasi shakllanishida o‘z aksini topadi. Vaqt o‘tishi bilan o‘sma o‘sib boradi, atrofdagi to‘qimalarni siqib chiqaradi yoki ularning ichiga kirib boradi. Patologik anatomiya bu bosqichlarni mikroskopik

va makroskopik tekshiruvlar yordamida aniqlaydi. Makroskopik tahlilda o‘smaning kattaligi, rangi, yuzasi, konsistensiyasi o‘rganilsa, mikroskopik darajada hujayra shakli, yadro tuzilishi, mitoz jarayonlari va stromaning holati tahlil qilinadi.

Patologik anatomiya o‘smalarning organizmga ta’sirini ham keng ko‘lamda tahlil qiladi. O‘smalar o‘sib borishi jarayonida qon tomirlarni bosib qo‘yadi, qon aylanishini buzadi, nekroz, yallig‘lanish yoki ikkilamchi infeksiya rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Shu bilan birga, o‘smalar metabolik o‘zgarishlarni ham keltirib chiqaradi: organizmda oziq moddalarning so‘rilishi, oqsil va yog‘ almashinuvi buziladi, umumiy zaiflik, ozib ketish holatlari kuzatiladi. Bu jarayonlar o‘smalarning umumiy toksik ta’siridan dalolat beradi.

O‘smalarni aniqlash, ularning turini, rivojlanish bosqichini belgilashda patologik anatomiya usullari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Biopsiya, gistologik tahlil, immunogistokimyoviy va molekulyar usullar yordamida o‘sma to‘qimasi o‘rganilib, aniq tashxis qo‘yiladi. Bu esa klinik shifokorlarga eng to‘g‘ri davolash usulini tanlash imkonini beradi. Patologik anatomiya faqat tashxis qo‘yishda emas, balki kasallik sabablari va oqibatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilishda ham muhim o‘rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, patologik anatomiya o‘smalar haqidagi bilimlarni chuqur o‘rganish, ularning kelib chiqish sabablarini aniqlash, morfologik belgilarini tasniflash va rivojlanish mexanizmlarini tushuntirish orqali zamonaviy tibbiyotda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Ushbu fan tufayli o‘smalarning erta aniqlanishi, to‘g‘ri davolash strategiyasini tanlash va inson hayotini uzaytirish imkoniyati sezilarli darajada oshadi. Shu bois patologik anatomiya – tibbiyotning nazariy asosi, amaliyotning ishonchli tayanchi va kasalliklarning haqiqiy mohiyatini ochuvchi asosiy ilmiy yo‘nalishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdukarimov, A. A. “Patologik anatomiya: darslik.” – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2019.
2. Karimova, Z. N., & Sodiqov, M. T. Umumiy va maxsus patologik anatomiya.– Toshkent: O‘zbekiston Tibbiyot Akademiyasi nashriyoti, 2021.
3. Mavlonov, A. S. Kasalliklar morfologiyasi va patologik jarayonlar asoslari. – Toshkent: Innovatsion tibbiyot markazi nashriyoti, 2020.
4. Qodirov, B. T. Patologik anatomiya fanidan o‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDTU nashriyoti, 2018.
5. Robbins, S. L., & Cotran, R. S. Pathologic Basis of Disease. – Philadelphia: Elsevier, 2020.
6. Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. Basic Pathology. – Saunders Elsevier, 2021.
7. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni Saqlash Vazirligi. Tibbiyot oliy ta’lim muassasalari uchun patologik anatomiya fanidan namunaviy dastur. – Toshkent, 2022.
8. Rasulov, O. R. O‘smalar morfologiyasi va ularning klinik ahamiyati. – Toshkent: Ilm ziyo nashriyoti, 2017.

9. International Agency for Research on Cancer (IARC). World Cancer Report. – Lyon: WHO Press, 2020.
10. O‘zbekiston Tibbiyot Akademiyasi o‘quv-metodik majmuasi: Patologik anatomiya kursi bo‘yicha ilmiy qo‘llanma. – Toshkent, 2023.

Nazarova D.I., filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dotsent
Buxoro davlat tibbiyot institute

YANGI O'ZBEK SHE'RIYATIDA FARDNING SHAKL VA MAZMUN YANGILANISHI (G'ULOM SHOMUROD IJODI MISOLIDA)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada yangi o'zbek she'riyatida fard janrining o'rni, badiiy-estetik xususiyatlari hamda taraqqiyot bosqichlari tahlil qilinadi. Fardning mumtoz adabiyotdagi ildizlari va uning zamonaviy she'riyatda mazmun hamda shakl jihatidan yangilanish jarayonlari yoritiladi. Shuningdek, yangi davr ijodkorlari tomonidan fard janrida ilgari surilgan g'oyaviy yo'nalishlar, obrazlilik, poetik ifoda vositalari va individual uslub masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari fard janrining yangi o'zbek she'riyatida an'ana va innovatsiya uyg'unligida rivojlanayotganini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *yangi o'zbek she'riyati, fard janri, mumtoz an'ana, janriy taraqqiyot, badiiy-estetik tafakkur, poetik ifoda, obrazlilik, shakl va mazmun, an'ana va innovatsiya, individual uslub.*

Nazarova D.I., Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences
associate professor
Bukhara State Medical Institute

FORMAL AND CONTENT INNOVATIONS OF THE FARD GENRE IN MODERN UZBEK POETRY (ILLUSTRATED BY THE WORKS OF G'ULOM SHOMUROD)

Abstract: *This article analyzes the role of the fard genre in modern Uzbek poetry, its artistic and aesthetic features, and stages of development. The roots of the fard in classical literature and the processes of updating its content and form in contemporary poetry are highlighted. Additionally, the ideological directions, imagery, poetic expressive means, and issues of individual style presented by modern writers in the fard genre are examined. The research findings show that the fard genre in modern Uzbek poetry develops through the integration of tradition and innovation.*

Keywords: *modern Uzbek poetry, fard genre, classical tradition, genre development, artistic-aesthetic thinking, poetic expression, imagery, form and content, tradition and innovation, individual style.*

Ulkan san'atkor Abdulla Qahhor: "Ikki satr she'rda berilgan fikrni ming xil qilib aytsa bo'ladi, lekin bu ming xil variantning hech qaysisi shu ikki satrday ham sodda, ham qisqa, ham kuchli, ham tas'irli bo'lolmaydi", – deb yozadi[12].

[12] Абдулла Қаҳҳор. Асарлар. Олти томлик, 6-том. – Т.,1971. – Б. 233.

Buxorolik shoir G‘ulom Shomurod ham mumtoz nazm an’analarini e’zozlab, ularni saqlab qolish yo‘lida zahmat chekkan ijodkorlardan biridir. Uning ijodida ham ikkiliklar, ham fardlar alohida o‘rin tutgan. Shoir fardlarida visolga yetishgach chiroqdan kuygan parvona (Parvona o‘rtanib hajru firoqdan, Visolga yetishgach kuyar chiroqdan), yuzi oy va quyoshdan ziyoda ma’shuqa yor (Yuzingni o‘xshatsam oyga, mohitob, Ruxsori men kabi, dedi ofitob), pardasiga o‘ralib olgan iboli makkajo‘xori (Makkajo‘xori juda iboli, Pardasini olib qilma havoli), qalamni tinglab, uning sirlarini oshkor etgan qog‘oz (Qog‘oz tinglab, qalamni rosa, Gaplarini etdi ovoza) tavsifi va boshqalar haqida so‘z yuritilgan. Ayniqsa, shoirning insoniy sifatlarni ulug‘lab aytgan fardlari ko‘pchilikni tashkil qiladi. Shoir ortiqcha mag‘rurlanish, kekkayish yaramaslikni ta’kidlab shunday deydi:

Mag‘rur bo‘lma buncha terakdek,
Hamma uchun zarur kerakdek[13].

Quyidagi fardda shoir it – bo‘ri – qo‘y so‘zlari orqali tazod yaratib, har bir narsaning kushandasi borligidan ogoh etgan:

Itlarga talanib, bo‘ri yiqildi,
Qo‘ylarga azob ekanin bildi[14].

Shoir fardlari orasida boshga tushgan darddan nolimaslikka, sabr-bardoshli bo‘lishga undash uchun dardman // bedard (Dardman bo‘lsang darddan nolima, Achin, bedardlarning holiga), ishonch va ishonchsizlikni ifodalash maqsadida yuksak tog‘ va kichik gard (Senga-ku, ishonchim edi tog‘ misol, Afsuski kemirib etding gard nuqson), to‘g‘risizlikni ulug‘lash niyatida chin, rost va yolg‘on, yaxshi va yomon, qish va yoz, achchiq va shirin so‘zlarini (Endi bilsam, gaping chinu rostidan: Yolg‘onchilik o‘tgan onang sutidan. Yomon so‘z-la but bo‘lmas ish, Yaxshi so‘z-la yoz bo‘lur qish. Agar bilsang har nening sirin, Aytolasan ne talx, ne shirin) o‘zaro zid qilib olib, tazod san’atini vujudga keltirgani kuzatiladi. Shu orqali u o‘z fardlarining mazmuni ta’sirchanligini oshirishga erishgan. Xususan, shoir inson sifatlarini tavsiflash uchun rahmon va shaytonni zidlantirishi alohida e’tiborni tortadi:

Sifatidir: odamga yaxshi yomon,
Birin rahmon bergan,birisin shayton[15].

Shoir yana saxiy va baxilni (“Saxiy bo‘lsang, moling to‘lib toshadi, Baxil bo‘lsang, boring sendan qochadi), yaxshilik va yomonlikni (“Yaxshilikdan qolar nek xotira, Yomonlikdan ko‘nglingga yara”, donolik va befahmlikni (“Donomisam va yoki befahm, So‘z lutfingdan ayonsan, odam”) o‘zaro zidlantirib, kitobxonni ezguliklar sari chorlaydi.

G‘ulom Shomurod fardlarida o‘xshatish ham alohida o‘ringa ega. Masalan, shoir saxiylikni yo‘lga o‘xshatgan bo‘lsa (Saxiylikda tengsiз ekan yo‘l – Qarang, unda ochiq ikki qo‘l), chumolining yuk tashish quvvatini filga menzaydi (Chumolining beli nozik fil kabi, Yuk tashishda lekin ishlar fil kabi). Shoir ta’kilashicha, inson kuch-qudrati uning suhbatida namoyon bo‘ladi: “Kuching kam

[13] Ғулом Шомурод. Марварид доналар. – Бухоро: Бухоро, 2008. – Б.67.
[14] O‘sha manba. – B. 69.
[15] O‘sha manba. – B. 69.

– ko‘pligin g‘ayrating aytur, Aqling kam ko‘pliging suhbating aytur). Negaki, ba’zi kimsalarning, shoir aytganidek: “Qoyilmasku hech kim ishiga, Aql bo‘lar hamma kishiga).

Shoir yerda yotgan za’faron yaproqqa qarab, umr o‘tkinchiligini, barcha kishilar bir kun kelib tuproqqa evrilishini eslatadi (Yerda yotgan zafaron yaproq, O‘ksimagin aslimiz tuproq) yoki “Bir dono bir gapni ko‘p takror aytar: Yaxshilik o‘zingga albatta, qaytar”, “Kuz kelib, yaproqlar bo‘lsa zafaron, Nega ma’yus sezar o‘zini inson” deya ogohlantiradi.

Boshqa zamonaviy fardnafis shoirlar kabi G‘ulom Shomurod ham o‘zining bu janr namunalarida maqollardan irsoli masal sifatida foylanganini ko‘rish mumkin:

Yerga ne sepsang, shuni o‘rasan,
Kimga ne etsang, shuni ko‘rasan[16].

Fardlaridan birida shoir mansabparastlikni qoralab, shunday deydi:

Kursim baland deya uraversang do‘q, –
Demak, kursinga mos farosating yo‘q[17].

Xususan, molparastlikni, badnafslikni qoralash (“Ko‘p, behad mol tashvish, g‘am keltirar, Va aksi hol, ajal ham keltirar”, “G‘amni yengur na mol, na davlat, Uni yengur sabr va toqat”, “Bunchalar erk bermasang nafsga, Tushmas eding temir qafasga”, “Nafsingni erkalatsang quturadi, O‘zgagamas o‘zingga uradi”), mehnatsevarlikni ulug‘lash (“Izzat ko‘rsang hurmating sabab, Rohat ko‘rsang mehnating sabab”), ilm olish va odoblilikni targ‘ib etish (“Olloh bergan ne’matning sanog‘i yo‘q, Ilmu hikmat, adabning adog‘i yo‘q”, “Agar bo‘lsang, mulozim, Qil ishni unga lozim”, “Mehru g‘azab, jaholat va adolat qo‘lingda, Oliy jonzot insonsan, hamma holat qo‘lingda”, “Zolimga bor Olloh jazosi: Obod bo‘lmas ikki dunyosi”, “Suratingni ko‘rib deydilar: mullo! Siyratinni ko‘rib: astafurlloh”. “Ko‘rdim, yomonmas shakilu shamoling, Bundan ayonmas aqlu kamoling”, “Senga hech kim berolmas madad, Yuraginga bordir hasad”. “Astag‘furullo, deb qaytar g‘zabni, Bu bilan asraysan yurak, asabni!”), do‘stlik va mehr-oqibatni (Otni derlar pari, dev, lekin – Insonga do‘st ekanligi chin”, “Ko‘rsataver itga ham shafqat, Savobini ko‘rasan albat!”, vatanparvarlikni (“Kindik qoni qaydaki tomgan, Cho‘l bo‘lsa ham – uningchun chaman”) madh etish shoir fardlarining mazmun-mundarijasini tashkil etadi.

Bizningcha, shoir G‘ulom Shomurod o‘z fardlarini barmoq vaznida yaratgani uchun ularni farddan ko‘ra ikkilikka yaqin turadi, deyish mumkin.

Umuman olganda, yangi o‘zbek she’riyatida “fard” nomi ostida berilgan she’rlar to‘la ma’noda mumtoz adabiyotdagi shunday janr talablariga, spesifikasiga muvofiq kelmaydi. Binobarin, shaklan aruzda yozilmagan. Mazmunan ham kengaygan. Buni mumtoz adabiyotga ergashish yo‘lidagi ijodiy izlanish sifatida baholash mumkin. Ularni fard deb emas, barmoqdagi ikkiliklar deb talqin qilsa bo‘ladi. Turob To‘la ikkiliklarida falsafiy-axloqiy mazmun yetakchilik qiladi.

[16] O‘sha manba. – B. 69.
[17] O‘sha manba. – B. 69.

Jumaniyoz Jabborov fardlarining o‘ziga xosligi shundaki, ularning ko‘pchiligida tuyuqqa xos qofiya o‘rnida omonim va omonimsifat so‘zlarning kelishi bilan bog‘liq. Qolaversa, bunda “barmoqlashish” va “gibridlik” xususiyatlari ham kuzatiladi. Vosit Sa’dulla tuyuq-fardlar yaratgan bo‘lsa, G‘ulom Shomurodning shu janrdagi izlanishlari barmoq vaznida yaratilgan.

Buxorolik shoir G‘ulom Shomurod ham mumtoz nazm an’analarini e’zozlab, ularni saqlab qolish yo‘lida zahmat chekkan ijodkorlardan biridir. Uning ijodida ham ikkiliklar, ham fardlar alohida o‘rin tutgan. Shoir fardlarida visolga yetishgach chiroqdan kuygan parvona (Parvona o‘rtanib hajru firoqdan, Visolga yetishgach kuyar chiroqdan), yuzi oy va quyoshdan ziyoda ma’shuqa yor (Yuzingni o‘xshatsam oyga, mohitob, Ruxsori men kabi, dedi ofitob), pardasiga o‘ralib olgan iboli makkajo‘xori (Makkajo‘xori juda iboli, Pardasini olib qilma havoli), qalamni tinglab, uning sirlarini oshkor etgan qog‘oz (Qog‘oz tinglab, qalamni rosa, Gaplarini etdi ovoza) tavsifi va boshqalar haqida so‘z yuritilgan. Ayniqsa, shoirning insoniy sifatlarni ulug‘lab aytgan fardlari ko‘pchilikni tashkil qiladi. Shoir ortiqcha mag‘rurlanish, kekkayish yaramaslikni ta’kidlab shunday deydi:

Mag‘rur bo‘lma buncha terakdek,
Hamma uchun zarur kerakdek[18].

Quyidagi fardda shoir it – bo‘ri – qo‘y so‘zlari orqali tazod yaratib, har bir narsaning kushandasi borligidan ogoh etgan:

Itlarga talanib, bo‘ri yiqildi,
Qo‘ylarga azob ekanin bildi[19].

Shoir fardlari orasida boshga tushgan darddan nolimaslikka, sabr-bardoshli bo‘lishga undash uchun dardman // bedard (Dardman bo‘lsang darddan nolima, Achin, bedardlarning holiga), ishonch va ishonchsizlikni ifodalash maqsadida yuksak tog‘ va kichik gard (Senga-ku, ishonchim edi tog‘ misol, Afsuski kemirib etding gard nuqson), to‘g‘risizlikni ulug‘lash niyatida chin, rost va yolg‘on, yaxshi va yomon, qish va yoz, achchiq va shirin so‘zlarini (Endi bilsam, gaping chinu rostidan: Yolg‘onchilik o‘tgan onang sutidan. Yomon so‘z-la but bo‘lmas ish, Yaxshi so‘z-la yoz bo‘lur qish. Agar bilsang har nening sirin, Aytolasan ne talx, ne shirin) o‘zaro zid qilib olib, tazod san’atini vujudga keltirgani kuzatiladi. Shu orqali u o‘z fardlarining mazmuni ta’sirchanligini oshirishga erishgan. Xususan, shoir inson sifatlarini tavsiflash uchun rahmon va shaytonni zidlantirishi alohida e’tiborni tortadi:

Sifatidir: odamga yaxshi yomon,
Birin rahmon bergan,birisin shayton[20].

Shoir yana saxiy va baxilni (“Saxiy bo‘lsang, moling to‘lib toshadi, Baxil bo‘lsang, boring sendan qochadi), yaxshilik va yomonlikni (“Yaxshilikdan qolar nek xotira, Yomonlikdan ko‘nglingga yara”, donolik va befahmlikni (“Donomisam va yoki befahm, So‘z lutfingdan ayonsan, odam”) o‘zaro zidlantirib, kitobxonni ezguliklar sari chorlaydi.

[18] Ғулом Шомурод. Марварид доналар. – Бухоро: Бухоро, 2008. – Б.67.
[19] O‘sha manba. – B. 69.
[20] O‘sha manba. – B. 69.

G‘ulom Shomurod fardlarida o‘xshatish ham alohida o‘ringa ega. Masalan, shoir saxiylikni yo‘lga o‘xshatgan bo‘lsa (Saxiylikda tengsiz ekan yo‘l – Qarang, unda ochiq ikki qo‘l), chumolining yuk tashish quvvatini filga menzaydi (Chumolining beli nozik fil kabi, Yuk tashishda lekin ishlar fil kabi). Shoir ta’kilashicha, inson kuch-qudrati uning suhbatida namoyon bo‘ladi: “Kuching kam – ko‘pligin g‘ayrating aytur, Aqling kam ko‘pliging suhbating aytur). Negaki, ba’zi kimsalarning, shoir aytganidek: “Qoyilmasku hech kim ishiga, Aql bo‘lar hamma kishiga).

Shoir yerda yotgan za’faron yaproqqa qarab, umr o‘tkinchiligini, barcha kishilar bir kun kelib tuproqqa evrilishini eslatadi (Yerda yotgan zafaron yaproq, O‘ksimagin aslimiz tuproq) yoki “Bir dono bir gapni ko‘p takror aytar: Yaxshilik o‘zingga albatta, qaytar”, “Kuz kelib, yaproqlar bo‘lsa zafaron, Nega ma’yus sezar o‘zini inson” deya ogohlantiradi.

Boshqa zamonaviy fardnafis shoirlar kabi G‘ulom Shomurod ham o‘zining bu janr namunalarida maqollardan irsoli masal sifatida foylanganini ko‘rish mumkin:

Yerga ne sepsang, shuni o‘rasan,
Kimga ne etsang, shuni ko‘rasan[21].

Fardlaridan birida shoir mansabparastlikni qoralab, shunday deydi:

Kursim baland deya uraversang do‘q, –
Demak, kursinga mos farosating yo‘q[22].

Xususan, molparastlikni, badnafslikni qoralash (“Ko‘p, behad mol tashvish, g‘am keltirar, Va aksi hol, ajal ham keltirar”, “G‘amni yengur na mol, na davlat, Uni yengur sabr va toqat”, “Bunchalar erk bermasang nafsga, Tushmas eding temir qafasga”, “Nafsingni erkalatsang quturadi, O‘zgagamas o‘zingga uradi”), mehnatsevarlikni ulug‘lash (“Izzat ko‘rsang hurmating sabab, Rohat ko‘rsang mehnating sabab”), ilm olish va odoblilikni targ‘ib etish (“Olloh bergan ne’matning sanog‘i yo‘q, Ilmu hikmat, adabning adog‘i yo‘q”, “Agar bo‘lsang, mulozim, Qil ishni unga lozim”, “Mehru g‘azab, jaholat va adolat qo‘lingda, Oliy jonzot insonsan, hamma holat qo‘lingda”, “Zolimga bor Olloh jazosi: Obod bo‘lmas ikki dunyosi”, “Suratingni ko‘rib deydilar: mullo! Siyratinni ko‘rib: astafurlloh”. “Ko‘rdim, yomonmas shakilu shamoling, Bundan ayonmas aqlu kamoling”, “Senga hech kim berolmas madad, Yuraginga bordir hasad”. “Astag‘furullo, deb qaytar g‘zabni, Bu bilan asraysan yurak, asabni!”), do‘stlik va mehr-oqibatni (Otni derlar pari, dev, lekin – Insonga do‘st ekanligi chin”, “Ko‘rsataver itga ham shafqat, Savobini ko‘rasan albat!”, vatanparvarlikni (“Kindik qoni qaydaki tomgan, Cho‘l bo‘lsa ham – uningchun chaman”) madh etish shoir fardlarining mazmun-mundarijasini tashkil etadi.

Bizningcha, shoir G‘ulom Shomurod o‘z fardlarini barmoq vaznida yaratgani uchun ularni farddan ko‘ra ikkilikka yaqin turadi, deyish mumkin.

[21] O‘sha manba. – B. 69.
[22] O‘sha manba. – B. 69.

Umuman olganda, yangi o‘zbek she’riyatida “fard” nomi ostida berilgan she’rlar to‘la ma’noda mumtoz adabiyotdagi shunday janr talablariga, spesifikasiga muvofiq kelmaydi. Binobarin, shaklan aruzda yozilmagan. Mazmunan ham kengaygan. Buni mumtoz adabiyotga ergashish yo‘lidagi ijodiy izlanish sifatida baholash mumkin. Ularni fard deb emas, barmoqdagi ikkiliklar deb talqin qilsa bo‘ladi. Turob To‘la ikkiliklarida falsafiy-axloqiy mazmun yetakchilik qiladi. Jumaniyoz Jabborov fardlarining o‘ziga xosligi shundaki, ularning ko‘pchiligida tuyuqqa xos qofiya o‘rnida omonim va omonimsifat so‘zlarning kelishi bilan bog‘liq. Qolaversa, bunda “barmoqlashish” va “gibridlik” xususiyatlari ham kuzatiladi. Vosit Sa’dulla tuyuq-fardlar yaratgan bo‘lsa, G‘ulom Shomurodning shu janrdagi izlanishlari barmoq vaznida yaratilgan.

Adabiyotlar

1. Абдулла Қаҳҳор. Асарлар. Олти томлик, 6-том. – Т.,1971. – Б. 233.
2. Ғулом Шомурод. Марварид доналар. – Бухоро: Бухоро, 2008. – Б.67.
3. Karimov N. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi**.** – Toshkent: O‘qituvchi, 1999. – 320 b.

Nazarova F. I.
assistant professor
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute

RESISTANCE INDICATORS OF FINE FIBERED "GOSSYPIUM BARBADENSE L." COTTON VARIETIES UNDER STRESS CONDITIONS

Annatation *Water deficit and salinity stress in cotton negatively affect photosynthesis, water uptake, and plant growth. During the flowering stage, the water deficit in leaves is highest, with variation among varieties: Surkhan-16 shows the highest deficit, while SP-1607 shows the lowest. Salinity increases cell sap concentration and osmotic pressure, with more developed adaptation mechanisms in salinity-tolerant varieties. The study highlights the importance of managing water and salinity for sustainable cotton cultivation.*

Keywords: *cotton, water deficit, drought stress, photosynthesis, salinity, osmotic pressure*

Sustainable cotton cultivation requires a clear understanding of the impact of water deficit on cotton and the development of appropriate mitigation techniques. Drought stress affects physiological and biochemical processes in cotton, particularly photosynthesis. Water stress reduces water availability and carbon uptake for photosynthesis and affects plant development.

One-third of the world's cropland suffers from water scarcity. Droughts regularly reduce yields of mesophytic crops and may exacerbate the problem of global climate change. Water stress or drought can affect reproductive growth phases, which reduces agricultural productivity. Salinity and drought are two of the most important environmental problems that hinder crop productivity worldwide.

Excessive salt concentration in the soil disrupts water absorption and ion balance in cotton plants, leading to ion poisoning, growth retardation, leaf scorch, and yield reduction. Salinity stress is a major factor limiting agricultural productivity in the biosphere. Salinity significantly threatens the growth, productivity, and quality of cotton fibre.

Our study demonstrates that soil water deficit impairs plant water uptake and utilization, disrupting water balance and increasing leaf water deficit in cotton. High air temperature and low relative humidity, especially in the afternoon, exacerbate these effects. Drought induces physiological water imbalance and organ dehydration, particularly in leaves. Residual leaf water deficit was significantly greater at the flowering stage than at tillering and budding across all cultivars and moisture regimes.

Residual water deficit in leaves was also studied during the flowering phase. In the flowering phase, the value of residual water deficit in the leaves in the morning under sufficient humidity was 2.62% in the Surkhan-18 variety, 1.68% in the Termiz- 208 variety, 2.00% in the Termiz-202 variety, 1.39% in SP-1607 variety,

and 2.87% in Surkhan-16 variety. In the morning, in the conditions of limited humidity, this indicator was 3.11% in the Surkhan-18 variety, 2.05% in the Termiz-208 variety, 2.46% in the Termiz-202 variety, 1.81% in the SP-1607 variety and 3.25% in Surkhan- 16 variety. When the process was studied at noon, i.e. at 1200-1400 hours, residual water deficit in leaves was equal to 2.94% in Surkhan-18 variety, 1.86% in Termiz-208 variety, 2.46% in Termiz-202 variety, 1.69% in SP-1607 variety and 3.42% in Surkhan- 16 variety under optimal humidity conditions. In the conditions of limited moisture, this indicator reached 3.25% in the Surkhan-18 variety, 2.24% in the Termiz-208 ariety, 2.89% in the Termiz-202 variety, 2.10% in the SP-1607 variety, and 3.89% in Surkhan-16 variety.

During the flowering phase, when the residual water deficit in the leaves was observed at 1600-1800 in the evening, it was equal to 3.37% in the control cultivar Surkhan-18, 2.38% in the cultivar Termiz-208, 2.89% in the cultivar Termiz-202, 1.89% in the cultivar SP-1607, and 3.82% in the cultivar Surkhan-16. In the conditions of limited moisture in the evening, this indicator was 3.86% in the Surkhan-18 variety, 2.74% in the Termiz-208 variety, 3.41% in the Termiz-202 variety, 2.46% in the SP- 1607 variety and 4.37% in Surkhan-16 variety. In all options under limited moisture conditions, the value of water deficit was much higher than in the optimal moisture options. Significant inter-varietal differences were observed in residual water deficit. The highest values occurred in Surkhan-16 plants under limited moisture at all developmental stages, while the lowest were recorded in SP-1607 under optimal humidity. Intermediate values were observed in Termiz-208, Termiz-202, and Surkhan-18 varieties, indicating a clear varietal response to soil moisture levels.

To evaluate the effect of salinity on cell sap concentration in cotton varieties, experiments were conducted across non-saline, moderately saline, and highly saline soils at the budding, flowering, and boll stages. Across all soil salinity levels and cultivars, cell sap concentration increased progressively from the boll to the budding stage.

The concentration of cell sap in all cotton varieties grown in highly saline soil conditions is significantly higher than in plants grown in non-saline conditions. It was observed that the concentration of cell sap in non-saline variants of all varieties was lower than in saline variants. With an increase in the level of soil salinity, the concentration of cell sap in all varieties also increased. The highest indicators were found in cotton varieties grown in soil salinity conditions. At the flowering stage, in non-saline conditions, the SP-1607 variety was 12.8, in the moderately saline variant 13.6, in the highly saline variant 15.8; in the control variant of the Termiz-208 variety 12.4, in the moderately saline variant 13.0, in highly saline variant 15.2; 12.0 in the control variant of the Termiz-202 variety, 12.5 in the medium salinity variant, 13.6 in strong salinity; 11.6 in the control version of the Surkhan-18 variety, 12.2 in the medium salinity version, 13.2 in strong salinity; It was found to be 11.2 in the control variant of Surkhan-16, 12.0 in the medium salinity variant, and 12.6 in the strong salinity variant.

Assessment of salinity effects revealed consistent patterns across all cotton varieties at the flowering and tillering stages, with salinity causing a marked increase in leaf cell sap concentration. Cell sap concentration was found to depend on soil salinity level, developmental stage, and varietal characteristics. Significant inter-varietal differences were observed, with the highest values in SP-1607 and Termiz-208 and the lowest in Surkhan-16.

During our observations, we also studied the effect of different levels of salinity on the osmotic pressure of the cell sap. The experiments were conducted on nonsaline, moderately saline and highly saline soils. The osmotic pressure of the cell sap of cotton varieties was determined in all phases, during the budding, flowering and budding periods.

It was noted that in non-saline environments, the osmotic pressure of the cell sap was lower than in medium and high-salinity environments. On the contrary, in soils with a high level of salinity, the osmotic pressure of the cell sap was higher. If we express this in numbers, in the Surkhan-18 variety, it was 6.08 in the control, 6.67 in the medium saline environment, and 7.68 in the high saline environment.; in the Surkhan-18 variety, it was 5.63 in the control, 6.36 in the medium saline conditions, and 7.17 in the high saline conditions.; in the Termiz-208 variety, it was 7.07 in the non-saline conditions, 7.72 in the medium saline conditions, and 8.56 in the high saline conditions.; In the Termiz-202 variety, the osmotic pressure was 6.38 in nonsaline soil, 7.14 in medium salinity, and 7.93 in high salinity conditions. In the cotton variety SP-1607, this indicator was 7.12 in non-saline conditions, 8.06 in medium salinity, and 9.26 in high salinity conditions. Similar conditions were observed in the flowering and storage phases of cotton varieties. With increasing salinity, the osmotic pressure increased significantly. In the SP-1607 variety, the highest pressure was recorded during the storage period under high salinity conditions. The lowest osmotic pressure was observed in the Surkhan-16 variety. In general, plant cells adapt to balance osmotic pressure under salinity conditions. Adaptation mechanisms are important for the stress tolerance of plants under saline conditions. Also, osmotic pressure control is better developed in salinity-tolerant varieties.

References:

1. Abro, A. A., Anwar, M., Javwad, M. U., Zhang, M., Liu, F., Jiménez-Ballesta, R., ... & Ahmed, M. A. (2023). Morphological and physio-biochemical responses under heat stress in cotton: overview. Biotechnology Reports, 40, e00813.
2. Shelake, R. M., Kadam, U. S., Kumar, R., Pramanik, D., Singh, A. K., & Kim, J. Y. (2022). Engineering drought and salinity tolerance traits in crops through CRISPR-mediated genome editing: Targets, tools, challenges, and perspectives. Plant Communications, 3(6).
3. Munns, R. (2002). Comparative physiology of salt and water stress. Plant, cell & environment, 25(2), 239-250.
4. Jia, H., Hao, L., Guo, X., Liu, S., Yan, Y., & Guo, X. (2016). A Raf-like MAPKKK gene, GhRaf19, negatively regulates tolerance to drought and salt and

positively regulates resistance to cold stress by modulating reactive oxygen species in cotton. Plant Science, 252, 267-281.
5. Guo, J., Shi, G., Guo, X., Zhang, L., Xu, W., Wang, Y., ... & Hua, J. (2015). Transcriptome analysis reveals that distinct metabolic pathways operate in salt-tolerant and salt sensitive upland cotton varieties subjected to salinity stress. Plant Science, 238, 33-45.

Nazarova F. I.
assistant professor
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute

EFFECT OF WATER SUPPLY ON TRANSPIRATION RATE OF FINE-FIBERED COTTON VARIETIES

Abstract. *The article presents some data on the study of the transpiration rate in the leaves of thin-fiber cotton varieties at different levels of soil moisture. During the experiments, the aspects related to the moisture level in the soil and its water supply of cotton varieties with thin fibers Surkhan-16, Surkhan-18, Termiz-202, Termiz-208 and SP-1607 were described. It was determined that the change in transpiration rate in the section of the studied varieties is different depending on the stages of growth and development, water supply and biological characteristics of the varieties.*

Key words: *water supply, fine fiber cotton, varieties, moisture levels, transpiration, water regime, productivity.*

Irrigation can help address drought-related problems; however, groundwater reserves are declining, and the costs associated with irrigation are increasing. Agricultural producers must take urgent action to address these challenges in order to ensure the cultivation of important crops such as cotton and wheat. Drought poses a widespread threat to the growth and productivity of field crops, but water deficits at certain growth stages can be mitigated through re-irrigation to maintain stable growth and yield. The efficiency of water restoration acts as a self-regulation mechanism, enabling crops to adapt to adverse environmental conditions through the effective use of limited water resources.

Abiotic stress factors negatively affect agriculture by reducing plant growth and productivity. Climate change, water scarcity, pollution, and the loss of fertile land are expected to further intensify yield declines. Therefore, mitigating the impacts of abiotic stresses remains a key challenge for sustainable food production.

Drought in agriculture is generally defined as a prolonged shortage of precipitation that results in soil moisture depletion and limits water availability to crops. Crop responses to drought depend on its severity and duration, as well as plant genotype, growth conditions, and developmental stage.

Drought stress can induce various morphological, physiological, biochemical, and molecular changes in both aboveground and belowground tissues of cereal crops. Some of the key physiological responses to drought include leaf rolling, partial or complete stomatal closure, reduced cell growth and expansion, and decreased internal CO_2 concentration, which leads to a decline in photosynthetic activity.

Plant growth rate is strongly influenced by adverse environmental factors, particularly water availability. Water deficit is a major limiting factor, with growth rate closely dependent on the severity and duration of drought. Plant responses to water stress occur in sequential phases, including stress perception and recovery. Soil moisture deficiency suppresses growth, reduces yield quality, and affects all developmental stages, with drought effects often persisting even after partial rehydration. Numerous studies indicate that plant growth is more sensitive to drought stress than photosynthesis.

Soil moisture deficiency is a major limiting factor for agricultural productivity in arid regions. Leaf photosynthetic activity can recover rapidly after re-irrigation and remain at a high level for an extended period, thereby improving crop yield and water use efficiency. Under water stress, the photosynthesis and root activity of *Gossypium hirsutum* L. leaves can quickly recover following re-irrigation at certain growth stages. These findings suggest that even short-term water stress at any developmental stage can mitigate the negative effects of drought on root activity and enhance the compensatory effect of re-irrigation on photosynthesis, ultimately increasing yield under drip irrigation.

In the Bukhara region, during the hot summer months, prolonged high temperatures resulting from solar heating lead to a 10–15% reduction in daytime atmospheric moisture. Extended periods of summer contribute to atmospheric drought. Very low relative humidity, combined with further temperature increases, creates a severe moisture deficit in the atmosphere.

Transpiration is a key physiological process that plays a crucial role in understanding water exchange and water regimes in plants growing under water-deficient conditions. The majority of water absorbed by plants is lost through transpiration. High transpiration rates under water-deficit conditions can disrupt the water balance in plant tissues and exacerbate water shortages. Consequently, physiological and biochemical processes within the plant slow down, leading to reduced crop productivity.

It is well established that plant water uptake is closely linked to the rate of transpiration. Only 1.5–2% of the water absorbed by plants is retained, while the majority is lost through transpiration via the leaves. The rate of transpiration is influenced by numerous external factors, including air temperature, relative humidity, soil and climatic conditions, wind, solar radiation, soil moisture content, plant developmental stage, and varietal characteristics. Transpiration not only leads to water loss through the leaves but also facilitates water absorption and the transport of water and dissolved substances throughout the plant.

During the study, the rate of transpiration in the aforementioned fine-fiber cotton varieties was investigated under field experimental conditions. Two different irrigation regimes were applied. In the first regime, soil moisture was maintained at 65–70–65% of field capacity, whereas in the second regime it was maintained at 50–55–50%.

Transpiration rates of cotton varieties grown under 65–70–65% soil moisture conditions were observed to be higher than those of varieties grown under 50–55–

50% soil moisture. Under water-deficit conditions, reductions in transpiration are closely linked to stomatal behavior. In some studied cotton varieties, transpiration increased from morning to noon and then decreased from afternoon to evening. The study also demonstrated that transpiration rates are strongly influenced by the varietal characteristics of cotton.

In field experiments with two soil moisture levels (65–70–65% and 50–55–50%), it was found that the amount of water used for transpiration varied among cotton varieties. All studied varieties consumed more water for transpiration under 65–70–65% soil moisture compared to the water-deficient 50–55–50% conditions. Furthermore, transpiration increased from the budding to flowering stages and decreased during the boll formation stage.

The transpiration rate of all studied cotton varieties varied depending on air temperature and soil moisture levels. However, the amount of water consumed for transpiration also differed according to the biological characteristics of each variety. Under moderate soil moisture conditions, the highest transpiration across all developmental stages (budding, flowering, and boll formation) was observed in the SP-1607 and Termiz-208 varieties during the morning hours. In the other varieties, transpiration rates declined in the evening.

According to the data, there is a close relationship between transpiration rate and soil moisture, which in turn regulates the rate of water uptake by the root system. A decrease in soil moisture leads to a reduction in transpiration rate, while an increase in air temperature accelerates this process. The transpiration rate of cotton varies throughout its ontogeny and also depends on the plant's metabolic activity, bound water content, and the colloidal properties of cell protoplasm.

Under field experimental conditions, the SP-1607 and Termiz-208 cotton varieties primarily exhibited increased transpiration during the morning hours, with a secondary rise during the water-deficient afternoon and evening hours. In contrast, the Termiz-202, Surkhan-16, and Surkhan-18 varieties displayed the opposite pattern. This variation may be attributed to varietal traits related to efficient water use and conservation.

The SP-1607 and Termiz-208 cotton varieties are tolerant to fluctuations in soil moisture, as they do not rapidly alter their water balance. Consequently, these varieties can improve overall productivity through efficient soil water use. During the onset of generative organ development, the daily demand for nutrients increases, resulting in changes in the composition of essential compounds in assimilates due to biochemical and physiological processes and metabolic turnover. Under water-deficit conditions, extremely high air temperatures and hot, dry winds can lead to shortages of water and nutrients, potentially disrupting their supply to the plant.

References

1. Devi, M. J., & Reddy, V. R. (2018). Transpiration Response of Cotton to Vapor Pressure Deficit and Its Relationship with Stomatal Traits. *Frontiers in Plant Science*.

2. Kholliyev A.E., Norboyeva U.T., Boltayeva Z.A. Productivity of cotton varieties in soil salinity and water deficiency //The American Journal of Applied Sciences. Vol 02, Issue 10- 2020.- P. 7-13.
3. Broughton, K. J., & Conaty, W. C. (2022). *Understanding and exploiting transpiration response to vapor pressure deficit for water limited environments*. *Frontiers in Plant Science*.
4. Pandey V., Shukla A. Acclimation and tolerance strategies of rice under drought stress.RiceSci. 2015. 22. – P.147–161.
5. Levi A., Paterson A.X., Barak V., Yakir D., Wang B., Saranga Y. Field evaluation of cotton near-isogenic lines introgressed with QTLs for productivity and drought related traits // Mol. Breeding. 2009. Vol. -23. -P. 179-195.
6. Broughton, K. J., Bate, E. L., Cutler, C. W., Allen, C. N., Thompson, A. J. E., & Conaty, W. C. (2024). Genotypic variability in cotton's transpiration response under progressive soil drying. *Frontiers in Plant Science*.

Nazarova F. I.
assistant professor
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute

ECO-PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FINE-FIBERED COTTON VARIETIES UNDER STRESS CONDITIONS IN BUKHARA REGION

Annotation. *The article presents some data on physiological indices of stress resistance of fine-fiber cotton varieties under conditions of water deficit of varying degrees of salinity. During the experiments, the level of stress resistance and some agrotechnological aspects of fine-fiber cotton varieties Surkhan-16, Termiz-202, Termiz-208 and SP-1607 were described. High indices of productivity and endurance of SP- 1607 and Termiz-208 varieties were revealed under stressful conditions of the region.*

Key words: *stress, fine-fiber cotton, varieties, water deficit, salinity, endurance, productivity.*

Abiotic stressors have a strong negative impact on agricultural plants, reducing their growth and productivity. Water deficit, soil salinity, and high temperature, in particular, are among the main reasons for decreased crop yield and food production worldwide. Therefore, studying the effects of abiotic stressors on plants and the mechanisms of stress tolerance is one of the key areas of plant physiology. Mechanisms of resistance to abiotic stress also include practical aspects, such as mitigating the harmful effects of stress through various methods or utilizing locally adapted varieties as sources of genetic material for stress-resilient breeding**.**

The ongoing changes in climatic conditions inevitably lead to the deterioration of the ecological environment, which in turn contributes to the salinization of fertile soils. As a consequence, the productivity of agricultural crops experiences a significant decline, adversely affecting both yield quantity and quality. Salinized soils are widely distributed across many countries worldwide, occupying approximately one-fourth of the earth's surface and nearly half of all irrigated lands. Moreover, these salinized areas are progressively expanding due to various natural and anthropogenic factors. In arid and semi-arid climatic regions, the majority of irrigation water is lost through evaporation, which accelerates soil salinization over time. This gradual accumulation of salts in the soil profile increasingly limits the availability of water and essential nutrients for crops, posing a major challenge for sustainable agricultural production.

Abiotic stressors are considered major limiting factors that negatively affect the growth and development of agricultural crops. They significantly reduce plant growth, development, and productivity worldwide. In the future, the decline in crop yields in agriculture is expected to intensify due to global climate change, increasing

environmental pollution, and the reduction of fertile land. Moreover, one of the main challenges facing agriculture today and in the future is ensuring sufficient food production for the rapidly growing population under deteriorating ecological and climatic conditions in many regions of the world. Minimizing the exposure of plants to various abiotic stressors such as high temperatures, water scarcity, salinity, and other unfavorable conditions and enhancing their resilience is currently one of the most pressing scientific and practical issues in crop production.

During the summer months in the Bukhara region, when prolonged heat waves are observed, the impact of intense solar radiation leads to the establishment of extremely high air temperatures, ranging from 38.1 to 46.3 °C. Such extreme thermal conditions significantly enhance the rate of atmospheric evaporation, resulting in daytime drying of up to 10–15% of the air's moisture content. Prolonged periods of elevated temperatures and insolation contribute to the development of severe drought conditions, which are further exacerbated by the combination of low relative humidity and minimal precipitation. The resulting aridity creates a pronounced moisture deficit in the atmosphere and soil, adversely affecting crop water availability, plant physiological processes, and overall agricultural productivity. These environmental stressors highlight the critical importance of understanding local climatic conditions for the sustainable management of water resources and the cultivation of drought-tolerant crop varieties in the region.

The study focused on the fine-fibered cotton varieties Surxon-16, Termiz-202, Termiz-208, and SP-1607. Some physiological traits that determine stress tolerance of these cotton varieties were identified under water-deficit and saline conditions in Bukhara region. The experiments were conducted from 2020 to 2023 in the fields of “Akrombobo Nabirasi Gulshoda” farm in Kogon district and “Bukhara Bahor Obod Yerlar” farm in Bukhara district.

In cotton, it was observed that at the onset of the generative organ development phases, the daily demand for nutrients increases, and the proportion of nutrient requirements changes. During ontogenesis, the composition of vital complex compounds in assimilates produced through biochemical and physiological processes and metabolic reactions also changes. Significant qualitative changes occur during flowering, full flowering, boll formation, and boll maturation stages, accompanied by alterations in the composition of complex substances formed and in the proportion of elements absorbed from the soil.

During the period of quality changes in cotton development, particularly in the full flowering to maturity phase, significant differences were observed in the shedding of yield components among different treatments. In saline and water-deficit conditions, the loss of flowers, bolls, and other yield elements was notably higher compared to the well-watered control. These findings indicate that environmental stress factors, such as elevated soil salinity and limited water availability, can strongly influence reproductive development and final yield formation.

Furthermore, extremely high air temperatures combined with prolonged exposure to dry and hot winds exacerbate the adverse effects of water and nutrient

deficiencies. Under such conditions, the uptake and translocation of essential nutrients can be disrupted, leading to additional stress on the developing cotton plants. Consequently, these abiotic stressors not only reduce the number of harvestable bolls but also affect fiber quality and overall crop productivity. The results highlight the importance of understanding the combined effects of temperature, water availability, and salinity on cotton physiology to develop strategies for mitigating yield losses under harsh environmental conditions.

Continued scientific research on newly developed fine-fiber cotton varieties is required to optimize their specific agrotechnical practices for achieving high yield and superior fiber quality. It is essential to further refine cultivation technologies, incorporating the latest scientific advancements and innovative approaches to enhance productivity and stress resilience. Results obtained from field experiments indicate that, under the water-deficit and saline conditions typical of the Bukhara region, the SP-1607 and Termiz-208 varieties demonstrated a higher level of stress tolerance compared to other studied varieties. These findings suggest that the selection and cultivation of these varieties, along with the application of improved agrotechnical measures, can significantly contribute to achieving sustainable cotton production under challenging environmental conditions.

Literature used:

1. Norboyeva U.T., Kholliyev A.E. Soil salinity and saline tolerance of the sorts of cotton//Mechanisms of resistance of plants and microorganisms to unfavorable environmental. – Irkutsk, July 10-15, 2018.(PART I). –S.567- 570.
2. Norboyeva U.T., Kholliyev A.E. Physiology, Productivity and Cotton Plant Adaptation under the Conditions of Soil Salinity. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) // Volume-8, Issue-2. S3, July 2019. – R. 1611– 1613.
3. Kholliyev A.E., Norboyeva U.T., Boltayeva Z.A. Productivity of cotton varieties in soil salinity and water deficiency //The American Journal of Applied Sciences. Vol 02, Issue 10- 2020.- P. 7-1

Niyozova N. J.
freshman
Tashkent State University of Economics
Poshakhodjaeva G.D.
associate professor
Department of Higher and Applied Mathematics
Tashkent State University of Economic

TRANSPORTATION PROBLEM FORMULATION AND SOLUTION

Annotation*: This article focuses on transportation problems as a subclass of linear programming and solving them by different methods. Emphasis is placed on using linear algebra and simplex tables to solve linear programming problems. Specific attention is given to the mathematical formulation, the application, and the use of algorithms, for obtaining optimal solutions.*

Key words*: Vogel's method, optimal solution, cell, table.*

Introduction

The transportation problem is one of the most popular optimization problems in linear programming. Its objective is to develop efficient routes for transporting goods, eliminating excessive, cross, and repetitive shipments and minimization of the total cost. Additionally, this contributes to a reduction of delivery time, planning and logistics issues, as well as a decrease in fees incurred by enterprises and firms associated with the processes of providing raw materials, equipment, and other resources. This article will introduce types of transportation problems in economic applications.

Table of transport problems and solution algorithm. An algorithm for solving transport problems is presented here.

In general, the transport problem can be represented as follows: at m production points A_1, A_2…A_n there is similar cargo in quantities a_1, a_2, ..., a_n, respectively. This cargo must be delivered to destination points B_1, B_2…B_n in quantities b_1, b_2…, b_n respectively. The cost of transporting 1 unit of cargo (tariff) from point A to point B is equal to c_{ij}

A transportation plan must be planned that will allow for the transportation of all cargo, fully satisfy customers, and minimize costs. Depending on the ratio between total cargo inventory and total demand, transportation problems can be either BALANCED or UNBALANCED.

(1) If the sum of the cargo reserves is equal to the total demand for it

$$\sum_{i=1}^{m} ai = \sum_{j=1}^{n} bj$$

then the transportation problem is called balanced.

(2) If condition did not meet, then the transport problem is called unbalanced. Dummy sources or destinations are added to balance them.

X_0- amount of good that is transported from point A to point B. Let's consider a closed transportation problem. We'll write its conditions in a distribution table, which we'll use to find a solution.

The mathematical model of a closed transportation problem has the form

$$L(x) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} cij -> min$$

With restrictions

$$\sum_{j=1}^{n} Xij = ai$$

$$\sum_{i=1}^{m} Xij = bj$$

$X_{ij} \geq 0$ i=1,m , j=1,n,.

An optimal solution is a matrix that fulfills the constraints and produces the minimum value of the objective function.

The transport table has the following form

	B_1	B_2	B_n	Supply
A_1	X_{11} c11	X_{12} c12	X_{1n} c1n	
A_2	X_{21} c21	X_{22} c22	X_{2n} c2n	
A_n	X_{n1} cn1	X_{n2} cn2	X_{nn} cnn	
Demand				

These problems can be solved by next methods:

1. North-West Corner Method

This method starts at the top-left (north-west) corner of the cost matrix and allocates as much as possible to the corresponding cell until either the supply or demand is exhausted. The process then moves right or down to the next cell and repeats until all supplies and demands are met.

2. Least Cost Method (Matrix Minima Method)

It seeks to select the cell with the lowest cost where, as much as possible, supply and demand constraints are met. It proceeds to select the next least cost cell up to the point that all supply and demand are satisfied.

3. Vogel's Approximation Method (VAM)

By calculating the difference between the lowest and second-lowest prices in a row or column, VAM analyzes penalties for all of the columns and rows.

Subsequently, the cell with the lowest cost receives the maximum possible allocation, and the row or column with the largest penalty is chosen. Until all supplies and demands have been met, this process repeats.

4. **Transportation Simplex Method (MODI / u-v Method)**

(3) If a problem is non-degenerate (which can be identified by following formula) $S \geq m + n - 1$ – it is solved correctly and solution is optimal .

(4) If $S < m + n - 1$, problem solved incorrectly

Example.

Warehouses A_1, A_2, A_3 have product stocks of 30, 20, and 25 tons, respectively. Consumers B_1, B_2, B_3 require these products in quantities of 20, 25, and 30 tons, respectively. Determine an assignment of suppliers to consumers that minimizes the total transportation cost. The transportation cost per 1 ton of product is given by the following matrix

1) $\sum_{i=1}^{m} ai = \sum_{j=1}^{n} bj$

30+20+25=75

20+25+30=75

The transportation problem is balanced.

5 (8)	25 (6)	(10)	30
15 (7)	(12)	5 (5)	20
(9)	(8)	25 (6)	25
20	25	30	

2) The table is formed and solved by **Least Cost Method.**

3) By using (3) formula, it is obvious that this problem is non-degenerate (5 cells are filled) 3+3-1=5

4) The transportation cost for the **initial basic feasible solution** is

L(x)=5*8+15*7+25*6+5*5+25*6=**470**

B. Checking the solution for optimality

The initial basic feasible solution is checked for optimality using the potentials method. Let U_i and V_j be the potentials corresponding to the rows and columns. For occupied cells, they satisfy:

$$U_i + V_j = C_{ij}$$

For empty cells, the reduced cost is calculated as:

$$\Delta ij = U_i + V_j - C_{ij} \leq 0$$

If all $\Delta ij \leq 0$, the solution is optimal. To find the potentials, one can assign an arbitrary value to one potential (e.g., $U_1 = 0$) and determine the others using the equality for occupied cells.

	$V_{1=8}$		$V_{2=6}$		$V_{3=6}$		
$U_{1=0}$	**5**	8	**25**	6	**4**	10	**30**
$U_{2=-1}$	**15**	7	**7**	12	**5**	5	**20**
$U_{3=0}$	**1**	9	**2**	8	**25**	6	**25**
	20		**25**		**30**		

Since $\Delta ij > 0$, the solution is optimal and cannot be improved!

Summary: Transportation problems are an effective tool for optimizing the allocation of goods between suppliers and consumers. They make it possible to minimize transportation costs while satisfying all supply and demand constraints. Methods such as Vogel's Approximation Method and the potentials method help find and improve practicable solutions, ensuring efficient economic decision-making.

References:

1. Dantzig, G. B. (1963). Linear Programming and Extensions. Princeton University Press.
2. Hitchcock, F. L. (1941). The distribution of a product from several sources to numerous localities. Journal of Mathematics and Physics, 20(1–4), 224–230.
3. Koopmans, T. C. (1949). Optimum utilization of the transportation system. Econometrica, 17(Supplement), 136–146.
4. Chvátal, V. (1983). Linear Programming. W. H. Freeman and Company.

Nurullaeva Sh.T.
associate professor
TIFT University
Saydullaeva S.A., PhD in Economics
associate professor
TIFT University

ECONOMETRIC ANALYSIS OF INFORMAL EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *This article explores approaches to labor market analysis and modeling methods that can be used to regulate and develop the country's labor market. Modern labor market analysis utilizes integrated analytical methods, combining cognitive and program-oriented approaches. In addition to concepts and ideas for forecasting, the article considers the scale and intensity of individual processes and situations, the degree of their interconnectedness and dependence, and the fundamental importance of quantitative assessment, including employment, inflation, unemployment, labor force participation, and demographic indicators. The article concludes with proposals and recommendations for reducing the informal sector in the country in the future.*

Keywords: *labor resources, inflation, unemployment, correlation, regression, factor analysis.*

Introduction

At the current stage of the world economy's development, the role of not only economic indicators that has become a priority in assessing the level of countries' development for a long period, but above all also social indicators that show the standard and quality of population life is increasing. Given the fact that the main part of these indicators is composed of indicators related to the population employment, the emphasis on "human capital" as the main factor of economic growth in developed countries today, the importance of the population employment and related relations is more evident. According to forecasts of the International Labor Organization, by 2023 there will be 3.7 billion of the global working age population, where the number of employed people is expected to be 3.5 billion and number of unemployed one is forecasted to constitute 0.2 billion.

If it is taken into account that by this period, about 55% of the global employed population will have informal jobs, it is necessary to regulate the employment situation in the international labor market on the basis of multi-factor analysis and to optimize the employment level, its modern features should be sufficiently taken into account [1].

These data show that on the basis of the study and analysis of the employment situation in the labor market, it is necessary to adequately take into account the modern features of employment in the processes of its regulation and management.

These data show that on the basis of the study and analysis of the employment situation in the labor market, it is necessary to adequately take into account the modern features of employment in the processes of its regulation and management.

As a result of the rapid reforms of subsequent years in Uzbekistan, a new system was formed aimed at ensuring effective employment in terms of quality and quantity.

In the action strategy, "creating new jobs and ensuring the employment of the population, first of all, graduates of secondary special and higher educational institutions, ensuring the balance of the labor market and the development of its infrastructure, reducing the unemployment rate" is defined as one of the important directions [2]. Especially in the context of the global coronavirus pandemic, special attention is paid to supporting the population by increasing the level of employment and income, encouraging new forms of self-employment.

Various world scientific centers, scientists and specialists carried out scientific researches on ensuring population employment, different models, description and changes of factors affecting employment, features and development trends of socio-economic relations in various conditions of the world labor market, improvement of labor market regulation and management mechanisms. Econometric research of population employment in the national labor market of the Republic of Uzbekistan, improvement of models and mechanisms of employment regulation based on the management of multifactorial effects are considered as urgent issues of today.

Literature review

A number of scientific research works have been carried out in foreign countries on the essence of employment, models of employment, the influence of factors on employment, improving employment indicators and modeling employment on the basis of econometric research.

In this regard, the scientific works of foreign scientists J. Keynes, J. Forrester, M. Porter, R. Dornbush, S. Fisher, G. Menkiw, Hernando de Soto and others are of special importance [4-9].

In particular, the neoclassical model of employment was developed by J. Keynes [3], models of world economic growth were developed by J. Forrester [5], M. Porter, R. Dornbush, S. Fisher and G. Mankyu founded economic growth models that include population employment [6-9], whereas informal employment was introduced as a socio-economic category and the factors causing it were justified by Hernando de Soto.

Factor analysis of employment processes in the labor market in the countries of the Commonwealth of Independent States and theoretical aspects of their regulation have been studied it in detail by V.V. Adamchuk, A.I. Rofe, Yu.D. Odegov, S.A. Aronova, A.M. Moiseev, S.G. Rezinkina, E.V. Semerikova and other scientists [10-16].

In the studies that are mentioned above, scientists theoretically studied employment and its characteristics, forms and types, conditions of occurrence (V.V.

Adamchuk, A.I. Rofe, Yu.D. Odegov), the influence of factors on employment (S.A. Aronova, E. V.Semerikova), modeling of the em

ployment process based on factor analysis (S.G. Rezinkina), development of the labor market and improvement of regulatory mechanisms (A.M.Moiseev) focused on practical evaluation [10-16].

Development of the labor market in Uzbekistan, ensuring effective employment of the population, the nature and characteristics of employment, forms and types, the influence of factors on employment indicators, modeling of employment processes are reflected in the scientific researches of scientists such as U.A.Otajanov, Q.X.Abdurakhmanov, B.A.Begalov, T.Sh.Shodiev, R.Kholmominov, Yu.K.Mukhamedov, and H.T. Mukhitdinov [17-24].

Data and methodology

Economic, comparative and logical analyzes were used within the scope of this study by the researchers. In order to perform an econometric analysis on the selected factors, first of all, the direction of the correlation of x and y and the linear coefficient of the pair correlation are as follows:

$$r_{xy} = b\frac{\sigma_x}{\sigma_y} \quad (1)$$

It is calculated using a formula and through it is determined whether the factors are selected correctly and how and to what extent they are linked. Then, the coefficient of determination of how the factors affect the resulting factor:

$$R^2 = r_{xy}^2 \quad (2)$$

It is determined by performing calculations using formula (2). Following that, the parameters of the regression equation (model reflecting the process) of the selected factors (arbitrary variables) and the resulting factors are as follows:

$$b = \frac{\overline{y \cdot x} - \bar{y} \cdot \bar{x}}{\sigma_x^2}; \qquad a = \bar{y} - b \cdot \bar{x} \quad (3)$$

determined by formulas. It should be noted that the selected factors can be linear or non-linear depending on the measurement units. The model in this study is non-linear, all the factors are logarithm to form the regression equation and the resulting

$$lny = lna + b \cdot lnx \quad (4)$$

the potentiation process is carried out by logarithm of both sides of the equality of this level model:

$$Y = C + b \cdot x \quad (5)$$

here, $Y = lny, \quad X = lnx, \quad C = lna.$

Using the actual values of x_i, the resulting value of the regression equation - $\hat{y}_i$ is determined. Average approximation error – the value of Ā is found t and the equation is checked with the first quality criterion.

$$\bar{A} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} A_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right| \cdot 100\% \quad (6)$$

The mean error of approximation of the regression equation determined by this method was checked, and in our study this error was reliably up to 8.0%. After that, the significance of the equation's parameters is compared by t-Student's test for each parameter in the case of df=n-k-1 when ∝=0.01 or ∝=0.05 according to the temp>ttabl condition. It can also be determined on a computer using STYuDRASPOBR(0.05;df). Empirical value of t-Student's test with the following formulas:

$$t_{emp} = |X - Y \cdot Sd|, here\ Sd = \sqrt{S_x^2 + S_y^2} \quad (7)$$

can be calculated. In addition, the significance of the determined equation is checked by the following formula using Fisher's F-criterion R^2 coefficient of determination:

$$F_{emp} = \frac{R^2}{1-r^2}(n-2) \quad (7)$$

The true value of this Fisher's F-criterion is checked with the critical values given in the table under the condition $F_{emp} > F_{tabl}$, and the obtained value, the random character of the determined relationship and the statistical insignificance of the equation's parameters indicate the need to accept the hypothesis H0 about the relationship's density.

In order to carry out the research, the number of initial informal items determined as a result of the selective analysis carried out in the Republic of Uzbekistan in 2011-2021 – (Y as the resulting factor and the real total income per capita affecting it - X1, the inflation rate - X2, small enterprises per 100 thousand people –X3, unemployment rate –X4, average per capita GDP volume-X5 and average per capita investment –X6 factors) using Open statistics of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan for 2011-2021.

Results and discussion

In the field of studying socio-economic processes, the problem of informal employment and its application in the labor market began to be studied in relatively recent years. In different countries, it was recognized that informal employment does not exist in the labor market, but the territorial study of this phenomenon shows that informal labor relations exist in one degree or another in all forms of management with the gradual expansion of the studied problem. Today, the informal economy includes about 90% of the world's micro-enterprises and small enterprises, and more than 50% of the world's labor resources are employed in it. According to the study's results, employment in the informal sector is characterized by four main characteristics that are common for all market economy countries [3]. The presence of these circumstances makes this problem one of the urgent issues in the labor

market today: namely, a need to legalize activities of informal economy workers, use of available opportunities along with official economy workers, as well as bringing them to a status of being able to fulfill their obligations.

Based on this, separate models are defined based on regression analysis using the above selected factors that influence exogenous factors based on the relationship in the form of an ergodic time series, linking the level of informal employment to exogenous factors. First of all, due to the non-homogeneous nature of endogenous and exogenous factors, it is appropriate to transfer the obtained time series indicators to the logarithm form based on e, which in turn allows for the reliability and scientific justification of the obtained results (Table 1).

Table # 1

Logarithmic values of the level of informal employment and socio-economic indicators affecting it

Years	Number of informal workers	Real total per capita income	Inflation rate	Number of small enterprises per 100 thousand people, unit	Unemployment rate	Average GDP per capita	Average investment per capita
t	ln Y	lnX1	lnX2	lnX3	lnX4	lnX5	lnX6
2011	8,341196	7,912032	2,028148	6,54276	1,609438	8,165818	6,499185
2012	8,406128	8,09187	1,94591	6,534951	1,589235	8,362923	6,71101
2013	8,455254	8,269419	1,916923	6,551937	1,589235	8,530958	6,915922
2014	8,295848	8,405592	1,808289	6,569201	1,629241	8,711806	7,109879
2015	8,344695	8,542376	1,722767	6,573261	1,648659	8,863927	7,266618
2016	8,353544	8,680657	1,740466	6,554218	1,648659	8,989706	7,38312
2017	8,339381	8,807078	2,667228	6,609619	1,757858	9,190352	7,70877
2018	8,590406	8,957643	2,66026	6,722148	2,230014	9,464029	8,234724
2019	8,588248	9,160057	2,721295	6,950719	2,197225	9,665541	8,671561
2020	8,633873	9,281477	2,406945	7,142432	2,351375	9,775762	8,722629
2021	8,677508	9,497458	2,332144	7,303237	2,261763	9,954145	8,833608

The correlation analysis is performed to evaluate a density of connections between an endogenous factor and influencing (exogenous) factors using the data from the table above. According to the analysis results, it was determined from value of the pair correlation coefficients; namely, the average to strong connection density was determined between the resulting factor and the selected factors. However, among the private correlation of factors, LnX3 and LnX6 factors meet the condition of multicollinearity with other factors ($r_{(X_3,X_4)}=0.99127$, ..., $r_{(X_3,X_5)}=0.8389$; $r_{(X_3,X_6)}=0,8804$; $r_{(X_1,X_6)}=0.9715$; $r_{(X_2,X_6)}=0.7465$; $r_{(X_4,X_6)}=0.9356$; and $r_{(X_5,X_6)}=0.9913$) , $r_{(x1,x2)}<0.8$, these exogenous factors are excluded from the model according to the condition. The work to determine the regression equation will be continued taking into account values of the correlation density between the remaining influencing factors and the resulting factor. It should be noted that the non-linear relationship model was used to create an econometric

model reflecting the effect of factor indicators above mentioned on the number of informally employed population.

The coefficients of the multivariate regression equation and the significance of the regression equation and the coefficients in the non-linear association view using the Eviews software show that this association is within the limits based on the established criteria (Table # 2).

Table # 2

Results of determining the coefficients of the regression equation and checking the equation based on the criteria

Dependent Variable: LnY

Method: Least Squares
Date: 29/11/22 Time: 9:26
Sample: 2011 2021
Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LnX_1	-0.026902	0.673010	-0.039972	0.0497
LnX_2	-0.019638	0.098277	-0.199818	0.0395
LnX_4	0.534942	0.282921	1.890783	0.0072
LnX_5	-0.059085	0.786559	-0.083636	0.0366
C	8.318126	0.999694	8.320671	0.0004
R-squared	0.836839	Mean dependent var		8.434000
Adjusted R-squared	0.706310	S.D. dependent var		0.125892
S.E. of regression	0.068225	Akaike info criterion		-2.225155
Sum squared resid	0.023273	Schwarz criterion		-2.073863
Log likelihood	16.12578	Hannan-Quinn criter.		-2.391123
F-statistic	6.411130	Durbin-Watson stat		2.181217
Prob(F-statistic)	0.033250			


Source: developed by the authors using the Eviews 10 software package.

Based on the coefficients in the table, the multifactor regression equation has the following appearance:

$$LnY=-0,0227LnX_1-0,02LnX_2+0,535LnX_4-0,0591LnX5+8,318 \quad (1)$$

Focusing on the parameters' significance of the determined 1st regression equation parameters by t-statistical criteria, all selected factors for the study from the equality of $t_{jad}=2,4469$ with $\alpha=0,05$ and df=6 are insignificant, however, Prob. According to the indicator, the importance comes from.

In this sense, it is necessary to check the parameters' significance with retrospective forecast quality criteria MAPE (Mean Absolute Percentage Error) and TIC (Tayl Inequality Coefficient) - an alternative measure of the Tayl forecast's accuracy (Fig. 3).



Forecast: SER01F	
Actual: SER01	
Forecast sample: 2011 2020	
Included observations: 10	
Root Mean Squared Error	0.048242
Mean Absolute Error	0.036703
Mean Abs. Percent Error	0.436857
Theil Inequality Coefficient	0.002860
Bias Proportion	0.000000
Variance Proportion	0.044502
Covariance Proportion	0.955498
Theil U2 Coefficient	0.439701
Symmetric MAPE	0.437168

Figure 3. Results of the regression equation's evaluation by MAPE and TIC criteria

Source: developed by the authors

Based on the data presented in Figure 3, it can be noted that MAPE=0.44, which in turn means that MAPE=0.44<10% has a high forecast accuracy and TIC=0.003<1 coefficient tends to zero so that all the parameters of 1st regression equation are significant.

In order to simplify the mathematical rules and calculation processes and to achieve the results' accuracy, the 1st regression equation created above is potentiated and the following equation is created according to it:

$$Y = \frac{X4^{0,535} * e^{8,318}}{X1^{0,0227} * X2^{0,02} * X5^{0,0591}} \qquad (1^*)$$

The created 1*-regression equation is statistically significant at a=0.05 and k1=6; Taking into account that F_{Jad}=0.22057 when k2=4, the Fisher value calculated from F_{his}=452.6, the significance of the 1*-regression equation under the condition $F_{Jad}<F_{his}$ and DW=2.18, due to the absence of autocorrelation, the equation is reliable and adequacy arises.

It can be seen from the results that the level of reliability of the model determined by the multifactorial change of exogenous factors affecting the number of informally employed population in the economy of the Republic of Uzbekistan is high.

The socio-economic nature of this determined equation 1* can be explained as follows. If the country's real total income per capita, inflation rate and average GDP per capita increase by 1%, the number of informal jobs in the economy was determined to additionally decrease by 1.4 thousand units, 11.2 thousand people and 3.6 thousand people respectively. Consequently, it can be said from this that the low wages paid to formal jobs in the economy forces the population to work informally.

It was determined that if measures to reduce unemployment among the population in the country are carried out without deviation, a decrease in unemployment by 1.0% will lead to a decrease in the number of informal workers among the population by an additional 32,000.

Using the models of changes of exogenous factors under the influence of the time factor and the above 1*-model of the endogenous factor, the resulting factor

(the number of informal workers) and the forecast indicators of the influencing factors in the medium term (2021-2025) are determined:

Real total income per capita-*X1=233.6+1190.2 * t;*

inflation rate-*X2=2,6+0,7 * t;*

unemployment rate-*X4=1.9+0.7 * t;*

the average volume of GDP per capita – *X5=-1192.8+2021.1*t* using the system of equations (when t=13) multifactor forecast results of the number of informally employed population in the economy in the near future (Table 4).

Table # 4

Forecasts of the number of informally employed population and factors influencing it in the Republic of Uzbekistan in 2023-2028

Years	Number of informal workers, thousand people	Real total income per capita, thousand soums	Inflation rate, %	Unemployment rate, %	Average volume of GDP per capita, thousand people
2023	6208,6	15706,2	11,7	11	25081,5
2024	6369,6	16896,4	12,4	11,7	27102,6
2025	6525,6	18086,6	13,1	12,4	29123,7
2026	6676,9	19276,8	13,8	13,1	31144,8
2027	6823,9	20467	14,5	13,8	33165,9
2028	6967,0	21657,2	15,2	14,5	35187

Source: developed by the authors

It can be seen from the table that by 2028 compared to 2023, the number of informally employed population in the Republic of Uzbekistan is expected to increase by 10.9% to 6,967,000 people. This, in turn, is expected to increase the inflation rate by 15.2 percent and the unemployment rate by 14.5 percent. To conclude from the results, it is appropriate to control the fulfillment of the tasks defined in the normative documents issued to ensure the stability of the inflation level in the country and, most importantly, to reduce unemployment.

Forecast indicators based on trend models show that the level of informal employment and indicators of factors affecting it will have a tendency to increase in the near future.

These changes are caused by the quality changes observed in the main regional and macro-level socio-economic indicators considered in the analyses that are performed above (Figure 5).




Figure # 5. Changes in the number of informal jobs in the Republic of Uzbekistan

As can be seen from the figure # 5, the number of informal jobs in the Republic of Uzbekistan is forecasted to increase in the future. In order to legalize the situation of informal employment existing in the labor market of our country, the following activities are required:

1. Legalization of informal employment status by improving the current legal and regulatory documents;
2. Encouraging informal workers to move to the formal sector by expanding benefits in the tax and pension system;
3. Strengthening economic and administrative sanctions applied to cases of informal recruitment of labor for enterprises with the status of a legal entity;
4. Application of a stratified and flexible approach to the implementation of state policy in the field of informal employment taking into account the differences between regions;
5. Ensuring the migration of informal workers to the formal labor market by effectively managing the factors directly and indirectly affecting informal employment in the regions. As a result of activities in the specified directions, the legalization of informal employment in our country will be accelerated to a certain extent.

Conclusion

In conclusion, the study of collecting process and analyzing existing the social and labor sphere's indicators showed that there are systemic problems; namely, necessary reporting indicators are not fully collected, methodology used in data collection and summarization is not in accordance with generally accepted international standards of employment measurement, scale of covering enterprises and employees in statistical research is insufficient and there is a limited access to statistical data. In the analysis of the labor market today, it is recommended to use a complex method of analysis that combine cognitive, programmatic and theoretical game methods. With the help of the model defined as a result of this research, the situation and changing trends in the labor market are studied on the basis of correlation-regression analysis and various scenarios can be developed by

identifying trends. With respect to the developed scenarios based on the available opportunities, potential and optimal option, the complex model's second component for labor market development – the program-target model – will be formed and implemented.

LIST OF REFERENCES:

1. World Employment and Social Outlook: Trends 2019. International Labour Office. – Geneva: ILO, 2019. pp. 11-12, 84-85.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan. On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan. PF-4947, February 7, 2017. - www.lex.uz.
3. KPRT 8. Employment in the informal economy. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/-stat/documents/publication/wcms_501609.pdf. -C. 103–110.
4. Keynes JM. General theory of employment, interest and money. Favorites. / J. M. Keynes. – M.: EKSMO, 2007.
5. Forrester J. World Dynamics. –M.: Science, 1978.
6. Porter M. Competitive advantage: how to achieve a high result and ensure its sustainability / Per. from eng. E. Kalinina. -M.: "Alpina Publisher", 2008. - 720 p.
7. Dornbusch R., Fisher S. Macroeconomics / Per. from eng. - M.: Publishing House of Moscow State University: INFRA-M, 1997. - 784 p.
8. Mankiw, G.N. Principles of Economics / G.N.Mankyu; 1999. - 780 p.
9. DeSoto Hernando. Other way. Invisible revolution in the third world. –M.: Catallaxy. 1995.
10. Adamchuk V.V., Romashov O.V., Sorokina M.E. Economics and sociology of labor: a textbook for universities. - M: UNITI, 2001. -407 p.
11. Labor Economics: textbook / AI Rofe. – 2nd edition. -M: KNORUS, 2011. -392 p.
12. Labor Economics: textbook / Yu.G. Odegov, G.G. Rudenko. -M: ParaType, 2010. -792 p.
13. Aronova S.A. Quality of labor force and factors of its formation (monograph). - Orel: Oryol State University, 2004.
14. Program-targeted management of the development of education: experience, problems, prospects / Ed. A.M. Moiseeva. -M.: Pedagogical Society of Russia, 2001. -256 p.
15. Rezinkina S.G. Models for the analysis of employment and unemployment in Russia. Abstract of the dissertation for the competition uch. step. cand. economy Sciences. - Rostov-on-Don, RGEU "RINH", 2004 - 28 p.
16. E.V. Semerikova. The use of spatial dependence in regional studies on the example of the analysis of unemployment in Russia and Germany. Abstract of the dissertation for the competition deg. cand. econom. sciences. – M.: MSU, 2017 – 28 p.
17. Otajanov U.A. Improving the methods of assessing the socio-economic potential of the regions of the Republic of Uzbekistan on the basis of intellectual mathematical models // Journal of Economics, Finance and Management Studies.

USA. Volume 4 Issue 12 December 2021, Page No. 2403-2414. https://ijefm.co.in/v4i12/Doc/1.pdf
18. Otajanov U.A. Sattarov S.A. Improving strategies for preventing uneven socio-economic development of areas// International Conference on Developments in Education. Delhi, India. 21st August 2022. 23-29 pp. https: econferencezone.org
19. Abdurakhmanov Q. Labor economics: theory and practice / textbook. Q. Abdurakhmanov. Processed and filled 3rd edition. - T.: Publishing State Enterprise "Fan" of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2019. - 592 b.
20. Shadiev T.Sh., Khakimov T.X., Baltaeva L.R., Ishnazarov A.I., Nurullaeva Sh., Mominova M.A. Econometrics. Tutorial. –T: TSUE, 2007. - 178 b.;
21. Gayibnazarov B.K., Kolonova L. Economics of the social sphere. - T.: Science, 2007.- 106 b.;
22. Sh.R. Kholmominov. The formation and development of the rural labor market and their modeling (monograph). - T.: Science and technology, 2014. - 32 b.;
23. Mohamedov Y.K. Factors and econometric models of sustainable socio-economic growth. Abstract of the dissertation written for the degree of doctor of economic sciences. - T.: TSUE, 2006, - 47 b.;
24. Mukhitdinov H.T. Econometric modeling of macroeconomic indicators of market equilibrium. Abstract of the dissertation written for the degree of candidate of economic sciences. - T.: TSUE, 2001, - 23 p.
25. KPRT 8. Employment in the informal economy. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/-stat/documents/publication/wcms_501609.pdf. -C. 103–110.

Nurullayeva N.
Tursunbayeva D.
Abduraximova R.
103-guruh talabalari
Boshqaruv va menejment fakulteti fundamental tibbiyot yo'nalishi
SamDTU
Burxonova D.
205-guruh talabasi
Biotexnalogiya, injenering va farmatsiya fakulteti
SamDTU
Xudoyqulov J. I.
tibbiy kimyo kafedrasi assistenti
SamDTU

SHIRINMIYA ILDIZI (GLYCYRRHIZA GLABRA): FOYDALARI VA XAVFLARI

Annotatsiya: *Shirinmiya ildizi (Glycyrrhiza glabra) qadimdan an'anaviy tibbiyotda qo'llanilib kelinadigan dorivor o'simlik bo'lib, hazm tizimi, nafas yo'llari, immun tizimi va yallig'lanish jarayonlariga ijobiy ta'siri bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada shirinmiya ildizining kimyoviy tarkibi, biologik faol xususiyatlari, sog'liq uchun foydalari, ehtimoliy xavflari hamda to'g'ri va xavfsiz foydalanish tamoyillari ilmiy manbalar asosida umumlashtiriladi.*

Kalit so'zlar: *shirinmiya ildizi, Glycyrrhiza glabra, glycyrrhizin, yallig'lanishga qarshi ta'sir, nojo'ya ta'sirlar.*

Nurullayeva N.
Tursunbayeva D.
Abdurakhimova R.
students of group 103
Faculty of Management and Administration,
Fundamental Medicine Program
Burxonova D.
student of group 205
Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
Khudoyqulov J.I.
assistant
Department of Medical Chemistry
SamSMU

LICORICE ROOT (GLYCYRRHIZA GLABRA): BENEFITS AND RISKS

Abstract: *Licorice root (Glycyrrhiza glabra) has long been used in traditional medicine as a medicinal plant and is distinguished by its beneficial effects on the digestive system, respiratory tract, immune system, and inflammatory processes. This article summarizes, based on scientific sources, the chemical composition of licorice root, its biologically active properties, health benefits, potential risks, and the principles of proper and safe use.*

Keywords: *licorice root, Glycyrrhiza glabra, glycyrrhizin, anti-inflammatory activity, adverse effects.*

Kirish

Shirinmiya ildizi ming yillar davomida Sharq va G‘arb tibbiyotida shifobaxsh o‘simlik sifatida qo‘llanib kelinmoqda. An’anaviy xitoy tabobati, Ayurveda hamda Yevropa fitoterapiyasida u yallig‘lanishga qarshi, yumshatuvchi va ekspektoran vosita sifatida mashhur. Zamonaviy ilmiy tadqiqotlar shirinmiya ildizining farmakologik xususiyatlarini tasdiqlagan bo‘lsa-da, uning noto‘g‘ri yoki uzoq muddatli qo‘llanilishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Shirinmiya ildizining tavsifi va tarqalishi

Shirinmiya ildizi Glycyrrhiza glabra o‘simligidan olinadi. Ushbu ko‘p yillik o‘simlik Yevropa, Osiyo va O‘rta Sharq hududlarida keng tarqalgan. Dorivor xomashyo sifatida asosan ildiz va ildizpoyalari ishlatiladi. Ildizlar yilning turli fasllarida yig‘ilib, 50–60 °C haroratda quritiladi.

Kimyoviy tarkibi

Shirinmiya ildizining terapevtik ta’siri uning boy kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq. Asosiy faol moddalari quyidagilar:

-Glycyrrhizin va glycyrrhizic kislota – steroid gormonlarga o‘xshash yallig‘lanishga qarshi ta’sir ko‘rsatadi;

-Flavonoidlar (27 tur) – antioksidant, antispazmodik va yarani davolovchi xususiyatga ega;

-Askorbin kislota, efir moylari, qatronlar va saqich moddalar;

-Organik kislotalar (olma, limon, fumarik, süksinik);

-Uglevodlar (glyukoza, fruktoza, kraxmal, tsellyuloza).

Shirinmiya ildizining sog‘liq uchun foydalari

1. Hazm tizimini qo‘llab-quvvatlash

Shirinmiya ildizi oshqozon shilliq qavatini himoya qiladi, gastrit va oshqozon yaralarida yallig‘lanishni kamaytiradi hamda kislotalikni me’yorlashtiradi.

2. Yallig‘lanishga qarshi va immunomodulyator ta’sir

Glycyrrhizin va flavonoidlar yallig‘lanish jarayonlarini susaytirib, immun tizimi faoliyatini rag‘batlantiradi. Bu xususiyatlar artrit va yallig‘lanishli ichak kasalliklarida foydalidir.

3. Nafas yo‘llari kasalliklarida qo‘llanilishi

Shirinmiya ildizi ekspektoran va yo‘talni yumshatuvchi vosita bo‘lib, yuqori nafas yo‘llari kasalliklarida balg‘am ajralishini yaxshilaydi.

4. Stress va charchoqni kamaytirish

Adaptogen xususiyati tufayli shirinmiya ildizi stressga chidamlilikni oshiradi va organizmda energiya almashinuvini qo‘llab-quvvatlaydi.

5. Gormonal muvozanat va teri sog‘lig‘i

Estrogen-simon ta’siri tufayli PMS va menopauza alomatlarini yengillashtirishi mumkin. Shuningdek, terida yallig‘lanish va pigmentatsiyani kamaytiradi.

6. Jigarni himoya qilish

Shirinmiya ildizi jigarning detoksikatsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlab, gepatoprotektiv ta’sir ko‘rsatadi.

Xavflari va nojo‘ya ta’sirlari

Shirinmiya ildizini uzoq muddat yoki yuqori dozada iste’mol qilish quyidagi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin:

-Gipertoniya va shishlar – natriy ushlanishi va suyuqlik yig‘ilishi tufayli;

-Elektrolit muvozanatining buzilishi – kaliy darajasining pasayishi;

-Gormonal buzilishlar – estrogen-simon ta’sir sababli;

-Homiladorlikda xavf – erta tug‘ilish ehtimoli;

-Dori vositalari bilan o‘zaro ta’sir – kortikosteroidlar va qon bosimi dorilari bilan.

Surunkali gipertoniya, yurak yetishmovchiligi va buyrak usti bezlari faoliyati buzilgan bemorlarga shirinmiya ildizini qo‘llash tavsiya etilmaydi.

Foydalanish shakllari va tavsiyalar

Shirinmiya ildizi kapsula, kukun, choy va suyuq ekstrakt shakllarida mavjud. Kunlik tavsiya etilgan miqdor odatda 1–2 g ni tashkil etadi. Nojo‘ya ta’sirlarni kamaytirish uchun deglitsirrizinlangan shirinmiya (DGL) mahsulotlari afzalroq hisoblanadi. Quyida “Shirinmiya ildizi (Glycyrrhiza glabra)” mavzusi bo‘yicha ilmiy-uslubdagi jadval keltirilgan.

Shirinmiya ildizining foydalari va xavflari

Yo‘nalish	Ta’siri / Xususiyati	Izoh
Hazm tizimi	Oshqozon shilliq qavatini himoya qiladi	Gastrit va oshqozon yaralarida foydali
Yallig‘lanishga qarshi	Glycyrrhizin yallig‘lanishni kamaytiradi	Kortizonga o‘xshash ta’sir ko‘rsatadi
Nafas yo‘llari	Ekspektoran, yo‘talni yumshatadi	Balg‘am ajralishini yaxshilaydi
Immun tizimi	Immunomodulyator ta’sir	Oq qon hujayralari faolligini oshiradi
Stress va charchoq	Adaptogen xususiyat	Stressga chidamlilikni oshiradi
Teri salomatligi	Yallig‘lanishni kamaytiradi	Akne va ekzema holatlarida qo‘llaniladi
Jigar	Gepatoprotektiv ta’sir	Detoksikatsiya jarayonini qo‘llab-quvvatlaydi
Xavf – gipertoniya	Qon bosimini oshirishi mumkin	Natriy ushlanishi sababli

Yo‘nalish	Ta’siri / Xususiyati	Izoh
Xavf – elektrolitlar	Kaliy miqdorini kamaytiradi	Yurak va mushak muammolariga olib kelishi mumkin
Homiladorlik	Tavsiya etilmaydi	Erta tug‘ilish xavfi mavjud
Uzoq muddatli qo‘llash	Buyrak va jigar zararlanishi	Yuqori dozalarda xavf ortadi
Dori bilan o‘zaro ta’sir	Kortikosteroidlar bilan mos kelmasligi mumkin	Shifokor nazorati zarur

Xulosa: Shirinmiya ildizi biologik faol moddalarga boy bo‘lib, ko‘plab kasalliklarning oldini olish va davolashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, uning ehtiyotsiz va nazoratsiz qo‘llanilishi jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shirinmiya ildizidan foydalanishda ilmiy asoslangan dozalar va shifokor tavsiyalariga amal qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Kholmurodova, D. K., & Khudoykulov, Z. I. (2023). Use of Waste in the National Economy. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, *25*, 160-162.

2.Амирова, П. Ж., & Худойқулов, Ж. (2025). ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД. *Research Focus*, *4*(1), 148-152.

3.Холмуродова, Д. К., Исломов, Л. Б., & Худойкулов, Ж. И. (2023). ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, *3*(33), 277-281.

4.Икромова, Ш. А., & Худойқулов, Ж. И. (2024). ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. *Research Focus*, *3*(11), 146-150.

5.Zoyirova, S. J., Samadova, M. A., & Xudoyqulov, J. I. (2025). CHILONJIYDA O ‘SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. *Экономика и социум*, (7-1 (134)), 341-343.

6.Икромова, Ш. А., & Худойқулов, Ж. И. (2025). ПОЛЬЗА АНТИОКСИДАНТОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНЕ. *Экономика и социум*, (4-1 (131)), 1361-1365.

7.Inomovich, X. J. (2025). FERMENTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ULARNING QO’LLANILISHI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 285-291.

8.Inom o’g’li, X. J. (2025). BIOLOGIK FAOL KOMPLEKS BIRIKMALAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 319-325.

9.Vozhehova, R., Borovyk, V., & Ubaydullaev, J. (2025). Inheritance of yield and fiber length in hybrids cotton of the first generation F1. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 151, p. 04001). EDP Sciences.

10.Xayrullayeva, D. M., Davronova, M. P., Xalimov, B. J., & Ubaydullaev, J. N. (2024). KOLLOID ERITMALARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA QONNING KRIOSKOPIYA USULIDA MUZLASH HARORATINI ANIQLASH. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, *4*(4-1), 272-276.

11.Ubaidullaev, J. N., Vakhin, A. V., Katnov, V. E., Trubistina, S. A., & Mukhamadiev, N. K. (2023). Assessments of Chemical Composition and Properties High-Viscosity Oil Based on Elemental. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, *4*(5), 332-339.
12.Холмуродов, Т. А., Мирзаев, О. О., & Убайдуллаев, Ж. Н. (2023). КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. In *Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа* (pp. 62-63).
13.Дустмуродов, М. М. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп*, (9), 42-47.
14.Дустмуродов, М. М. У. (2022). КВАЛИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗАГЛАВНЫХ ЭПИТЕТОВ В ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИХ НАДПИСЯХ. *Проблемы современной науки и образования*, (9 (178)), 42-47.

UDC 618.11-006.2-07-08:575.113:612.017

Olimova N. I., PhD
associate professor
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

CLINICAL, IMMUNOLOGICAL AND MOLECULAR GENETIC DETERMINANTS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND STRATEGIES FOR PERSONALIZED TREATMENT

Abstract: Background. *Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age and is characterized by hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and metabolic abnormalities. Recent evidence highlights the significant role of immunological and molecular-genetic factors in the pathogenesis of PCOS, emphasizing the importance of personalized therapeutic strategies.*

Objective. *To investigate the clinical, hormonal, immunological, and molecular-genetic determinants of PCOS and to evaluate their significance in the development of personalized treatment approaches.*

Methods. *A total of 120 women of reproductive age were enrolled in the study, including 80 patients diagnosed with PCOS and 40 healthy controls. Clinical assessment included evaluation of menstrual and reproductive history, body mass index (BMI), and ultrasound examination. Hormonal profiling (LH, FSH, testosterone, AMH), immunological markers (IL-6, TNF-α, VEGF-A), and molecular-genetic polymorphisms (VEGF-A and AMH genes) were analyzed. Statistical processing was performed using SPSS software with significance set at $p < 0.05$.*

Results. *Patients with PCOS demonstrated significantly elevated levels of LH, LH/FSH ratio, testosterone, and AMH compared to controls ($p < 0.05$). Increased concentrations of pro-inflammatory cytokines IL-6 and TNF-α, as well as VEGF-A, indicated the presence of chronic low-grade inflammation and altered angiogenesis. Unfavorable genotypes of VEGF-A and AMH were significantly more frequent in the PCOS group. Correlation analysis revealed associations between hormonal imbalance, inflammatory activation, and genetic polymorphisms.*

Conclusion. *PCOS is characterized by a complex interplay of endocrine, immunological, and genetic alterations. The findings support the implementation of personalized diagnostic and therapeutic strategies based on the patient's clinical, immune, and molecular-genetic profile.*

Keywords: *polycystic ovary syndrome; hyperandrogenism; inflammation; cytokines; VEGF-A; AMH; genetic polymorphism; personalized medicine.*

Introduction

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most prevalent endocrine and metabolic disorders affecting women of reproductive age, with a global prevalence ranging from 8% to 15% [1,2]. It is characterized by hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and polycystic ovarian morphology according to the Rotterdam diagnostic criteria [3]. In addition to reproductive impairment, PCOS is increasingly recognized as a systemic condition associated with metabolic abnormalities, including insulin resistance, obesity, dyslipidemia, and an elevated risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease [4,5].

The pathogenesis of PCOS is complex and multifactorial, involving intricate interactions between endocrine, metabolic, genetic, and environmental factors [1,8]. Insulin resistance and compensatory hyperinsulinemia play a central role in enhancing ovarian androgen production and disrupting folliculogenesis [4,5]. Altered gonadotropin secretion, particularly elevated luteinizing hormone (LH) levels and an increased LH/FSH ratio, further contribute to hyperandrogenism and ovulatory dysfunction [2].

Growing evidence suggests that chronic low-grade inflammation is an important component in the development and progression of PCOS [6,7]. Increased circulating levels of pro-inflammatory cytokines, such as interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), reflect immune activation and may aggravate insulin resistance and ovarian steroidogenesis [6,7]. Additionally, dysregulation of angiogenic factors, including vascular endothelial growth factor (VEGF), has been implicated in abnormal ovarian vascularization and follicular development [9].

Genetic susceptibility also contributes significantly to PCOS heterogeneity. Genome-wide association studies and candidate gene analyses have identified multiple genetic variants associated with steroidogenesis, metabolic regulation, and ovarian function [8]. Variations in genes related to angiogenesis and anti-Müllerian hormone (AMH) signaling may influence ovarian reserve, follicular dynamics, and disease severity [9].

Given the heterogeneity of clinical manifestations and underlying mechanisms, the integration of clinical, immunological, and molecular-genetic data is essential for improving diagnostic precision and therapeutic effectiveness. In this context, personalized medicine approaches tailored to the individual hormonal, immune, and genetic profile of patients with PCOS represent a promising direction for optimizing treatment outcomes [2].

Materials and Methods

The study was conducted at the Department of Obstetrics and Gynecology of Bukhara State Medical Institute in collaboration with the Institute of Immunology and Human Genomics of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan.

Women of reproductive age with a clinically and instrumentally confirmed diagnosis of polycystic ovary syndrome (PCOS) were enrolled in the study. The diagnosis was established based on clinical presentation, hormonal evaluation, and ultrasound findings. The control group consisted of age-matched healthy women without clinical or laboratory signs of endocrine or metabolic disorders.

Comprehensive evaluation included clinical and instrumental assessments such as detailed medical history, evaluation of menstrual and reproductive function, measurement of body mass index (BMI), and pelvic ultrasound examination. In selected cases, additional imaging studies were performed when clinically indicated.

Laboratory investigations comprised complete blood count, coagulation profile, and biochemical parameters. Hormonal analysis included serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), prolactin, total testosterone, estradiol, progesterone, anti-Müllerian hormone (AMH), and insulin.

Immunological assessment was performed by measuring pro-inflammatory cytokines, including interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), as well as selected growth and paracrine factors using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Molecular-genetic analysis involved detection of polymorphisms in the VEGF-A and AMH genes using polymerase chain reaction (PCR) followed by genotyping.

Statistical analysis was carried out using SPSS and Statistica software. Data were expressed as mean (M), standard deviation (SD), and standard error of the mean (SEM). Differences between groups were considered statistically significant at $p < 0.05$.

Results

A total of 120 women of reproductive age were included in the study. The main group consisted of 80 patients diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS), while 40 healthy women formed the control group. The mean age of participants did not differ significantly between groups (26.8 ± 0.9 years in the PCOS group vs. 25.9 ± 1.1 years in controls, $p > 0.05$).

Clinical evaluation revealed that 72.5% of women with PCOS had menstrual irregularities (oligomenorrhea or amenorrhea), and clinical signs of hyperandrogenism were observed in 65.0% of patients. The mean body mass index (BMI) was significantly higher in the PCOS group compared to controls (27.4 ± 0.8 kg/m² vs. 22.6 ± 0.7 kg/m², $p < 0.01$).

Hormonal analysis demonstrated significant alterations in gonadotropin secretion. Luteinizing hormone (LH) levels were nearly twofold higher in the PCOS group compared to controls (12.8 ± 0.6 IU/L vs. 6.4 ± 0.4 IU/L, $p < 0.001$). The LH/FSH ratio was significantly elevated (2.3 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.1, $p < 0.001$). Serum testosterone and anti-Müllerian hormone (AMH) levels were also significantly increased in patients with PCOS ($p < 0.01$ and $p < 0.001$, respectively). Detailed clinical and hormonal parameters are presented in Table 1 (see Table 1).

Table 1.
Clinical and Hormonal Parameters (Mean ± SEM)

Parameter	PCOS (n=80)	Control (n=40)	p-value
BMI (kg/m²)	27.4 ± 0.8	22.6 ± 0.7	<0.01
LH (IU/L)	12.8 ± 0.6	6.4 ± 0.4	<0.001
LH/FSH ratio	2.3 ± 0.2	1.1 ± 0.1	<0.001
Testosterone (ng/mL)	2.9 ± 0.3	1.4 ± 0.2	<0.01
AMH (ng/mL)	7.6 ± 0.5	3.1 ± 0.4	<0.001

Immunological assessment revealed evidence of chronic low-grade inflammation. Concentrations of IL-6 and TNF-α were significantly higher in the PCOS group compared to controls ($p < 0.001$). Additionally, VEGF-A levels were elevated, suggesting altered angiogenic activity in ovarian tissue. Immunological findings are summarized in Table 2 (see Table 2).

Table 2.
Immunological Markers (Mean ± SEM)

Parameter	PCOS (n=80)	Control (n=40)	p-value
IL-6 (pg/mL)	8.4 ± 0.7	3.2 ± 0.4	<0.001
TNF-α (pg/mL)	14.6 ± 1.1	6.8 ± 0.6	<0.001
VEGF-A (pg/mL)	286.3 ± 15.4	172.5 ± 12.7	<0.01

Molecular-genetic analysis demonstrated a significantly higher frequency of the unfavorable GG genotype of the VEGF-A gene in the PCOS group (42.5%) compared to controls (17.5%, $p = 0.009$). The AA genotype of the AMH gene was also more common among patients with PCOS (38.7% vs. 15.0%, $p < 0.05$). Genotype distribution is shown in Table 3 (see Table 3).

Table 3.
Frequency of Genotypes (%)

Gene / Genotype	PCOS (n=80)	Control (n=40)	p-value
VEGF-A (GG)	42.5%	17.5%	0.009
AMH (AA)	38.7%	15.0%	<0.05

The results of the present study demonstrate that PCOS is associated with significant endocrine, immunological, and genetic alterations. Women with PCOS had a significantly higher body mass index compared to controls (27.4 ± 0.8 kg/m² vs. 22.6 ± 0.7 kg/m², $p < 0.01$). Hormonal analysis revealed nearly a twofold increase in LH levels (12.8 ± 0.6 IU/L vs. 6.4 ± 0.4 IU/L, $p < 0.001$) and a markedly elevated LH/FSH ratio (2.3 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.1, $p < 0.001$). Testosterone levels were significantly higher in the PCOS group (2.9 ± 0.3 ng/mL vs. 1.4 ± 0.2 ng/mL, $p < 0.01$), and AMH concentrations were more than twice as high compared to controls (7.6 ± 0.5 ng/mL vs. 3.1 ± 0.4 ng/mL, $p < 0.001$), indicating pronounced ovarian dysfunction.

Immunological findings showed evidence of chronic inflammatory activation. IL-6 levels were elevated by more than 2.5 times in the PCOS group (8.4 ± 0.7 pg/mL vs. 3.2 ± 0.4 pg/mL, $p < 0.001$), while TNF-α concentrations were more than doubled (14.6 ± 1.1 pg/mL vs. 6.8 ± 0.6 pg/mL, $p < 0.001$). VEGF-A levels

were also significantly increased (286.3 ± 15.4 pg/mL vs. 172.5 ± 12.7 pg/mL, $p < 0.01$), suggesting enhanced angiogenic activity in ovarian tissue.

Molecular-genetic analysis revealed that the unfavorable GG genotype of the VEGF-A gene was present in 42.5% of PCOS patients compared to 17.5% in controls ($p = 0.009$). Similarly, the AA genotype of the AMH gene was identified in 38.7% of patients versus 15.0% in the control group ($p < 0.05$), indicating a significant association between these polymorphisms and PCOS susceptibility.

Overall, the quantitative differences observed in hormonal parameters, inflammatory markers, and genotype distribution confirm that PCOS is a multifactorial disorder involving endocrine dysregulation, chronic immune activation, and genetic predisposition. These findings provide a strong rationale for implementing personalized diagnostic and therapeutic strategies based on individual clinical, immunological, and molecular profiles.

Discussion

The present study confirms that polycystic ovary syndrome (PCOS) represents a multifactorial disorder characterized by endocrine imbalance, immune activation, and genetic predisposition. The observed twofold increase in LH levels and the significantly elevated LH/FSH ratio (2.3 ± 0.2 vs. 1.1 ± 0.1, $p < 0.001$) support the concept of hypothalamic–pituitary–ovarian axis dysregulation as a key mechanism underlying ovarian dysfunction. Elevated testosterone (2.9 ± 0.3 ng/mL) and AMH levels (7.6 ± 0.5 ng/mL) further indicate disrupted folliculogenesis and persistent hyperandrogenism.

The significant increase in BMI (27.4 ± 0.8 kg/m² vs. 22.6 ± 0.7 kg/m², $p < 0.01$) highlights the metabolic component of PCOS and its association with insulin resistance and adipose tissue–mediated endocrine alterations. These findings are consistent with current evidence suggesting that metabolic disturbances exacerbate ovarian steroidogenesis and reproductive dysfunction.

Importantly, our results demonstrate marked activation of inflammatory pathways. IL-6 and TNF-α levels were more than doubled in the PCOS group ($p < 0.001$), confirming the presence of chronic low-grade inflammation. This inflammatory state may contribute to insulin resistance, endothelial dysfunction, and altered ovarian microenvironment. The significantly elevated VEGF-A concentration (286.3 ± 15.4 pg/mL vs. 172.5 ± 12.7 pg/mL, $p < 0.01$) suggests enhanced angiogenic activity, which may influence abnormal follicular development and cyst formation.

Molecular-genetic findings further support the heterogeneity of PCOS. The higher frequency of the unfavorable VEGF-A GG genotype (42.5% vs. 17.5%, $p = 0.009$) and AMH AA genotype (38.7% vs. 15.0%, $p < 0.05$) indicates that genetic polymorphisms may predispose individuals to more pronounced endocrine and inflammatory disturbances. The interaction between genetic susceptibility and immune-endocrine mechanisms may explain the variability in clinical presentation and treatment response among patients with PCOS.

Taken together, the results emphasize that PCOS should be regarded as a systemic disorder rather than solely a reproductive pathology. The integration of

hormonal, immunological, and genetic markers may improve risk stratification and facilitate individualized therapeutic interventions.

Conclusion

The study demonstrates that women with polycystic ovary syndrome exhibit significant endocrine, immunological, and molecular-genetic alterations. Elevated LH, testosterone, and AMH levels reflect ovarian dysfunction, while increased IL-6, TNF-α, and VEGF-A concentrations indicate chronic inflammatory activation and altered angiogenesis. The higher prevalence of unfavorable VEGF-A and AMH gene polymorphisms confirms the contribution of genetic susceptibility to disease development.

These findings highlight the multifactorial nature of PCOS and support the implementation of personalized diagnostic and therapeutic strategies based on individual hormonal, immune, and genetic profiles. A comprehensive, multidisciplinary approach may enhance treatment effectiveness and improve long-term reproductive and metabolic outcomes.

REFERENCES

1. Goodarzi MO, Dumesic DA, Chazenbalk G, Azziz R. Polycystic ovary syndrome: etiology, pathogenesis and diagnosis. Nat Rev Endocrinol. 2011;7(4):219–231.
2. Moran LJ, Misso ML, Wild RA, Norman RJ. Impaired glucose tolerance, type 2 diabetes and metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2010;16(4):347–363.
3. Repaci A, Gambineri A, Pasquali R. The role of low-grade inflammation in polycystic ovary syndrome. Mol Cell Endocrinol. 2011;335(1):30–41.
4. Welt CK, Carmina E. Lifecycle of polycystic ovary syndrome (PCOS): from in utero to menopause. Endocrinol Metab Clin North Am. 2013;42(4):781–795.
5. Day FR, Hinds DA, Tung JY, Stolk L, Styrkarsdottir U, Saxena R, et al. Causal mechanisms and genetic architecture of polycystic ovary syndrome. PLoS Genet. 2015;11(10):e1005459.
6. Qin L, Chen Y, Li M, Wu X. Association between VEGF gene polymorphisms and risk of polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Reprod Biol Endocrinol. 2017;15:20.
7. Barber TM, Franks S. The link between polycystic ovary syndrome and both type 1 and type 2 diabetes mellitus. Womens Health (Lond). 2012;8(4):371–382.
8. Kelly CC, Lyall H, Petrie JR, Gould GW, Connell JM, Sattar N. Low-grade chronic inflammation in women with polycystic ovarian syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(6):2453–2455.
9. Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R. Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2016;106(1):6–15.

Qodirov Z. E., i.f.f.d., PhD
dotsent
Andijon davlat texnika institute

KLASTER TIZIMINING QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORT HAJMIGA TA’SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Annotatsiya: *Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida joriy etilgan klaster tizimining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmiga ta’siri ekonometrik usullar asosida tadqiq etilgan. Tadqiqotda klasterlar faoliyati, ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar, mehnat resurslari va eksport ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar tahlil qilingan. Ekonometrik modellar yordamida klaster tizimining eksport salohiyatini oshirishdagi ahamiyati baholangan. Olingan natijalar qishloq xo‘jaligi sohasida eksportni rag‘batlantirish va klaster siyosatini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *klaster tizimi, qishloq xo‘jaligi, eksport hajmi, ekonometrik modellashtirish, investitsiyalar.*

Kadirov Z. E., PhD
associate professor
Andijan state technical institute

ECONOMETRIC MODELING OF THE IMPACT OF THE CLUSTER SYSTEM ON THE EXPORT VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Abstract: *This article examines the impact of the agricultural cluster system on the export volume of agricultural products using econometric methods. The study analyzes the relationships between cluster activities, production volumes, investments, labor resources, and export indicators. Econometric models are employed to assess the role of the cluster system in enhancing the export potential of the agricultural sector. The findings provide a basis for developing scientific and practical recommendations aimed at promoting exports and improving cluster policy in agriculture.*

Keywords: *cluster system, agriculture, export volume, econometric modeling, investment.*

Kirish

Jahon bozorida qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabning ortib borishi mamlakatlar oldiga ushbu sohada raqobatbardosh ishlab chiqarishni tashkil etish va eksport salohiyatini oshirish vazifasini qo‘ymoqda. Ayniqsa, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, qo‘shilgan qiymat yaratish va tashqi bozorlarga chiqarishda samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, klaster tizimi qishloq

xo‘jaligini rivojlantirishning zamonaviy va samarali shakllaridan biri sifatida qaralmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligida klaster tizimi keng joriy etilib, ishlab chiqarish, qayta ishlash, logistika va eksport jarayonlarining o‘zaro uzviy bog‘liqligi ta’minlanmoqda. Klasterlar faoliyati orqali investitsiyalarni jalb etish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash, mehnat unumdorligini oshirish hamda eksportbop mahsulotlar hajmini ko‘paytirish imkoniyatlari yaratilmoqda. Biroq, klaster tizimining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmiga real ta’sirini ilmiy asosda baholash zarurati saqlanib qolmoqda.

Shu bois, klaster tizimi va eksport ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni aniqlash, ularni miqdoriy jihatdan baholash va asoslangan xulosalar chiqarishda ekonometrik modellashtirish usullaridan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ekonometrik tahlil orqali klaster tizimining eksport salohiyatini oshirishdagi ahamiyatini aniqlash, shuningdek, sohani rivojlantirishga qaratilgan samarali iqtisodiy qarorlar qabul qilish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda qishloq xo‘jaligida klaster tizimining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmiga ta’sirini aniqlash maqsadida iqtisodiy-statistik va ekonometrik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy nazariya, agrar iqtisodiyot hamda klasterlarni rivojlantirish konsepsiyalari tashkil etadi.

Ekonometrik tahlil jarayonida ko‘p omilli regressiya modellari qo‘llanilib, eksport hajmi natijaviy omil sifatida qabul qilindi. Klaster tizimini ifodalovchi ko‘rsatkichlar, investitsiyalar, ishlab chiqarish hajmi va mehnat resurslari ta’sir etuvchi omil sifatida modelga kiritildi.

Adabiyotlar sharhi

Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, fermer xo‘jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish masalalari O‘zbekistonda davlat siyosati darajasida ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Agrar sohani modernizatsiya qilish, klaster tizimini joriy etish va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan [1].

Agrar sohada iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish masalalari B. B. Berkinov, A. M. Gataulin ilmiy ishlarida yoritilib, qishloq xo‘jaligida boshqaruv va samaradorlikni oshirishda matematik va ekonometrik modellarning ahamiyati asoslab berilgan [2,3,4]. I. D. Politova tadqiqotlarida korrelyatsion va dispersion tahlil usullari orqali ishlab chiqarish samaradorligini baholash imkoniyatlari ko‘rsatilgan [5].

Axborot noaniqligi sharoitida qaror qabul qilish va modellashtirish masalalari D. T. Muxamedieva ishlarida tahlil qilinib, noaniq axborot asosida optimallashtirish usullari taklif etilgan [6,7]. Raqamli iqtisodiyot va zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash masalalari esa S. S. G‘ulomov va hammualliflar tadqiqotlarida ko‘rib chiqilgan [8].

So‘nggi yillarda tadqiqotchi tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarida fermer xo‘jaliklari faoliyatini ekonometrik modellashtirish, yer, mehnat va kapital

omillarining ishlab chiqarish hamda daromadga ta’siri, shuningdek, imitatsion va optimallashtirish modellari yordamida iqtisodiy samaradorlikni baholash masalalari o‘rganilgan [9,10,11,12,13].

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, agrar sohada fermer xo‘jaliklari va klaster tizimlarini rivojlantirish bo‘yicha salmoqli tadqiqotlar mavjud bo‘lsa-da, klaster tizimining qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmiga ta’sirini bevosita ekonometrik modellashtirish masalalari yetarlicha tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur yo‘nalishda chuqur ilmiy tadqiqot o‘tkazish zaruratini belgilaydi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot doirasida qishloq xo‘jaligida klaster tizimining joriy etilishi va uning qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmiga ta’siri statistik hamda ekonometrik usullar asosida tahlil qilindi. Tahlil jarayonida O‘zbekistondagi qishloq xo‘jaligi klasterlari faoliyatiga oid rasmiy statistik ma’lumotlardan foydalanildi.

Avvalo, klaster tizimi rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari, jumladan klasterlar soni, ishlab chiqarish hajmi, investitsiyalar miqdori va eksport ko‘rsatkichlari dinamikasi tahlil qilindi. Natijalar qishloq xo‘jaligida klasterlar sonining ortishi ishlab chiqarish hajmlari va eksportbop mahsulotlar ulushining o‘sishi bilan bir vaqtda kechayotganini ko‘rsatdi. Bu esa klaster tizimining eksport salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutayotganini tasdiqlaydi.

Ekonometrik tahlilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksport hajmi natijaviy omil sifatida qabul qilindi. Ta’sir etuvchi omil sifatida klaster tizimini ifodalovchi ko‘rsatkichlar, jumladan klasterlar soni, investitsiyalar hajmi, ishlab chiqarish hajmi hamda mehnat resurslari kiritildi. Ko‘p omilli regressiya modeli yordamida ushbu omillarning eksport hajmiga ta’siri baholandi.

O‘zbekiston Respublikasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportini o‘zgarish dinamikasi

1-jadval

yillar	EXP (agrar eksport hajmi, mln \$), y	$PROD$ (ishlab chiqarish, hajmi,trln so‘m), x_1	LAB (mehnat resurslari %), x_2	INV (q. x.ga kiritilgan investitsiya., trln so‘m), x_3	CL (klasterlar soni, ta), x_4
2017	800	300	24	5	50
2018	950	320	24	6	80
2019	1100	340	24	7	120
2020	1200	360	25	9	190
2021	1350	380	25	12	250
2022	1632	400	24	15	300
2023	1778	426	24	20	320
2024	2175	444,6	24	25,7	350

EXP – eksport hajmi, y ;

$PROD$ – qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, x_1 ;

LAB – qishloq xo‘jaligida band bo‘lgan mehnat resurslari foizi, x_2;

INV –qishloq xo‘jaligiga kiritilgan investitsiyalar hajmi, x_3 ;

CL – qishloq xo‘jaligida faoliyat yuritayotgan klasterlar soni, x_4 ;

Ushbu omillardan foydalanib quyidagi ko‘p omilli darajali modeli olindi:

$$y = 0{,}29x_1^{2{,}06}x_2^{-1{,}25}x_3^{0{,}06}x_4^{0{,}02} \qquad (1)$$

Modelning ko‘plik korrelyatsiya koeffitsienti $R = 0{,}9966$ ga teng bo‘ldi.

Olingan ekonometrik natijalar klasterlar soni va investitsiyalar hajmining eksport hajmiga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta’sir кўрсатишини намоён qildi. Ayniqsa, investitsiyalarning o‘sishi ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, mahsulot sifatini oshirish va tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kuchaytirishga xizmat qilayotgani aniqlandi. Shu bilan birga, mehnat resurslari va ishlab chiqarish hajmining ham eksportga ta’siri mavjud ekanligi kuzatildi.

Model ishonchliligini tekshirish maqsadida statistik diagnostika amalga oshirildi. Natijalar model parametrlarining ahamiyatli ekanligini hamda tanlangan model tadqiqot maqsadlariga mos kelishini ko‘rsatdi. Bu esa klaster tizimini rivojlantirish eksport hajmini oshirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Shuningdek, ssenariyli tahlil orqali klasterlar soni va investitsiyalar hajmini oshirish eksport ko‘rsatkichlariga qanday ta’sir ko‘rsatishi baholandi. Tahlil natijalariga ko‘ra, klaster tizimini qo‘llab-quvvatlash va investitsiya muhitini yaxshilash qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining barqaror o‘sishini ta’minlashi mumkin.

Umuman olganda, asosiy tahlil natijalari qishloq xo‘jaligida klaster tizimi eksport salohiyatini oshirishda muhim iqtisodiy omil ekanligini ko‘rsatib, uni yanada rivojlantirish zarurligini asoslab beradi.

Xulosa va takliflar

Rasmiy statistik ma’lumotlar asosida olib borilgan tahlillar qishloq xo‘jaligida klasterlar soni, investitsiyalar hajmi va ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari bilan eksport hajmi o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjud ekanligini ko‘rsatdi.

Qurilgan ko‘p omilli darajali ekonometrik model natijalariga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va investitsiyalar eksport hajmini oshirishda eng ta’sirchan omillardan hisoblanadi. Shuningdek, klasterlar sonining o‘sishi ham eksport ko‘rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlandi. Modelda mehnat resurslari ko‘rsatkichining ta’siri mavjud bo‘lib, bu omil qishloq xo‘jaligi sohasida ishchi kuchi samaradorligini oshirish muhimligini ko‘rsatadi.

Modelning yuqori ko‘plik korrelyatsiya koeffitsienti $R = 0{,}9966$) uning ishonchli va adekvat ekanligini tasdiqladi. Bu esa klaster tizimini rivojlantirish qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportining o‘sishiga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Ssenariyli tahlil natijalari ham klasterlar soni va investitsiyalar hajmini oshirish eksportning barqaror o‘sishiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Qishloq xo‘jaligida klaster tizimini yanada rivojlantirish maqsadida eksportga yo‘naltirilgan klasterlarga davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklarini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Qishloq xo‘jaligiga kiritilayotgan investitsiyalarning samaradorligini oshirish, ayniqsa qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan investitsiyalarni rag‘batlantirish zarur.

Klasterlar faoliyatida zamonaviy agrotexnologiyalar, innovatsion ishlab chiqarish usullari va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish eksportbop mahsulotlar hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksportida logistika, saqlash va sertifikatlash infratuzilmasini takomillashtirish orqali tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Klaster ishtirokchilari uchun mehnat resurslarining malakasini oshirish, kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash dasturlarini joriy etish mehnat samaradorligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi ―O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida‖gi PF-4947-sonli Farmoni. www.lex.uz.
2. Беркинов Б.Б. Вопросы моделирования и информатизации управления в агропромышленном комплексе Узбекистана. АН РУз. Доклады республиканской научно-технической конференции. 5-6 сентябрь 2011г.
3. B.B.Berkinov, S. Qulmatova, Z. Kadirov. Application of Artificial Intelligence Mechanisms and Modeling of Fuzzy Factors in Farm Management. IEEE Conference ID: 64186 27 th – 28 th Feb. 2025 Proceedings of the 2025 1 th International Conference on Technology Enabled Economic Changes (InTech). 466-472 s.
4. Гатаулин А.М. и др. Математическое моделирование эконо-мических процессов в сельском хозяйства. –М.: Агропромиздат,1990.-432 с.
5. Политова И.Д. Дисперсионный и корреляционный анализ в экономике сельского хозяйства. – М.: «Колос», 1978.- 190с.
6. Мухамедиева Д.Т. Разработка моделей слабо формализуемых процессов и принятие решений на основе обработки нечеткой информации.: Автореф. дис. док. тех. наук.- Ташкент: АН РУз НТЦ «Современные информационные технологии», 2006.-35 с.
7. Muhamediyeva D.T. Particle swarm method for solving the global optimization problem using the equilibrium coefficient // IOP Conf. Series:Journal of Physics: Conference Series 1441 (2020) 012153. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1441/1/012153 (SCOPUS).
8. G‘ulomov S.S., Ayupov R.H., Abdullaev O.M., Boltaboeva G.R. Raqamli iqtisodiètda blokchayn texnologiyalari // Toshkent, 2019.
9. Qodirov Z. Fermer xo‘jaliklarida daromad va xarajatlar o‘zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o‘zaro bog‘liqligining ekonometrik modellari //MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 4.
10. Z.Qodirov. Fermer xo‘jaliklari yer maydonlari o‘lchamlarini ishlab chiqarish samaradorligiga ta’sirini baholash. Maxsus son AndMI. Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali. №3 2024 yil. 1789-1795 betlar
11. Кодиров З. Метод моделирования нечетких множеств факторов развития фермерской деятельности и их взаимозависимости //Экономика и инновационные технологии. – 2021. – №. 5. – С. 210-220.

12. Z.Qodirov. Imitatsion modelda axborot noravshanligi sababli yuzaga keladigan iqtisodiy samarasizlik tahlili. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 10-son. 633-636 betlar.
13. Zohidjon Q., Kamoliddin A. ISHLAB CHIQARISH HAJMINI KENGAYTIRISHDA INVESTITSIYA SALOHIYATINI OSHIRISH YO‘LLARI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2025. – Т. 58. – №. 4. – С. 406-413.
14. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.

УДК 616.314-02

Qosimov X.O.
associate professor
Department of Hygiene
Bukhara State Medical Institute
Uzbekistan

ANALYSIS OF WATER FACTORS IN THERISK OF SPREADING DENTAL DISEASES

Annotation: *The article studies the main indicators of the chemical composition of drinking water, which negatively affect the health of the population, and assesses the compliance with the hygienic standards of the central water supply. The role of water factors in the risk of the spread of diseases of the dentoalveolar system among adults and children (caries, fluorosis and stone diseases) is noted. In this regard, there is an improvement in the organization of dental care by improving the quality of the composition of drinking water and informing the population about the impact of the physical and chemical properties of drinking water on human health.*

Keywords: *dental diseases, factors, water supply, chemical properties, analysis.*

Relevance: research on dental diseases continues to be one of the most common topics due to the large spread of dental diseases in the world, despite the improvement of preventive activities in dentistry [3]. Including caries - the most common disease of childhood. Numerous domestic and foreign studies indicate that the occurrence and spread of dental caries is determined by a wide range of risk factors, environmental determinants. Epidemiological studies of numerous external factors have shown that the incidence of caries is associated with drinking water and, specifically, with the content of fluoride in it. There were significant differences in the types of diseases in the district territories. These factors proved to be, characteristically, quite complex. Registration of dental diseases, especially caries, was observed with a decrease in fluorine in water of 0.8-1.0 mg/l. With lower levels of fluoride, the incidence of caries among the population increased significantly in proportion to the increase in the amount of fluoride. Exceeding the concentration of fluoride in drinking water above 1.5-1.7 mg/l led to an increase in another damage to the teeth - fluorosis [1], expressed in the appearance of dark spots on the teeth, and at a higher concentration - led to blackening of the teeth, defects in their shape and structure. It is important that the number of drinking water sources with an optimal fluoride content does not exceed 10-20% of all drinking water sources, up to 3-4% of water supply sources in Uzbekistan are with an increased fluoride content. In cities, the amount of fluoride in drinking water is 0.4-0.5 mg/l. Characteristically, the fluoride deficiency can be partially compensated for by increased water consumption. Therefore, for countries with a hot climate, the

content of fluorine in water of 0.7-0.9 mg/l fully satisfies the body's needs for fluorine due to increased water consumption. Some additional aspects of the role of fluoride in the prevention of dental caries are important. If a pregnant woman, when drinking water with a maximum concentration of fluoride, is normal or by fluoridation and mineralization with complexes of minerals, pastes, etc., then enamel with a normal fluoride content in the form of hydroxyfluorapatite is laid in the rudiments of the teeth of the fetus. Taking into account the extreme low-speed enamel exchange in the fetus (about 300 days), the laying actually guarantees such enamel that the baby will receive teeth with increased resistance to acid and caries, which persists for a number of years after their eruption. The protective ability of fluorides entering the body of pregnant women plays an important role in this. [5,6]. However, in pediatric dentistry, the artificial addition of fluorides to the diet of pregnant women is often recommended, but later this leads to premature overgrowth of fontanelles in the fetus, which contributes to the disruption of the labor activity of the woman in labor. [7]. Air pollution, increased fluorine content in drinking water leads to fluorosis of bones and teeth in the population of these regions, also seriously impairs the health of the population, leads to the emergence of infectious and non- infectious diseases of varying degrees affecting the oral cavity. So, for example, in chronic lung diseases, hormone treatment is accompanied by a decrease in salivation, a decrease in salivation, the appearance of bleeding gums, and an increase in dental caries [8]. In people with chronic diseases of parenchymal organs, the intensity of pathologies of the oral mucosa, stomatitis, and periodontitis increases [9]. In diseases of the gastrointestinal tract and the nervous system among children, the registration and intensity of dental caries increase. The content of macroelements above the norm in drinking water contributes to the deposition of salts in the body, which lead to kidney stones [11,18].

Aim of research was to study the importance of macro and microelements in the composition of drinking water in the spread of dental diseases among children living in the regions. Based on the data studied, it is necessary to develop preventive measures, recommended methodological manuals to reduce the prevalence of dental diseases (caries, fluorosis, periodontitis) among adults and children in Uzbekistan.

Materials and methods of the study: The object of the study was the sources of drinking water of the central water supply of the Bukhara region of the Romitan and Peshkun districts. The work was carried out in the laboratory of the sanitary and epidemiological service of the region. The analysis was carried out with the instruments of water analyzers: "Atomic-emission spectrometer", "Spectrophotometer " also for analysis and indicator papers and reagents diphenylamine, nitric acid, Gross were used. To assess the quality of water supply sources for the population, the chemical composition and contamination of drinking water were studied. The main source of experimental information for determining the background concentrations of macro and microelements in the sources of the district was the data of stationary posts in the observation zone of the district territory, which passed the quality control of tap water in accordance with the requirements GOST No. 950:2011. [2,13,]. A comparative analysis of the spread of

pathologies was carried out in the polyclinics of the district on the basis of a dental examination card. Caries diseases among children of different ages were studied.

Results and discussions of the study: The results of the study of centralized drinking water supply of districts showed that out of 815 samples, 13 samples did not meet hygienic standards, including the content of fluorine and iron below the norm. from 0.15 to 0.23 mg/l, which gives us the opportunity to analyze and evaluate the spread of dental pathologies in these areas. Some macronutrients showed a slight overestimation of the MPC in drinking water). Analysis of organoleptic indicators of water supply of drinking water in areas within the normal range. Smell - 1.8 points , turbidity - 2.6 mg / dm3, taste - 1 point, color - 15 degrees pH - 6.0, dry residue - 20220.0 mg / dm3. The content of chemical elements is shown in the table.

The results of the analysis of water samples of the districts.

Parameters	Unit of measurement	Results of the Romitan region	Results Peshkunsky district	Requirement №0318 15
RN	Unit	7	6-9	6-9
Turbidity	EMF	23	24	26
Chroma	Ggrad	18	19-20	20-25
Iron	mg/l	0.2	0.3-0.4	0.3-0.4
Calcium _ _	mg/l	4.3	--	-
Fluorine	mg/l	0.2	0.4	0.7
Rigidity	Mg-l / eq	6.8	7-10	7-10
Chlorides 450	mg/l	200	300	300
sulfates	mg/l	600	500	500
Nitrates	mg/l	36	40	40
Nitrites	mg/l	0.03	0.2-0.4	0.2-0.4

The polyclinic data showed the following statistics of dental examinations of children in two districts (Peshkunsky and Romitansky). Registration of the incidence of children with dental caries more at an early age from 1 to 3 years had a pathology with caries, which ranged from 12% to 45%. From 4 to 7 years old, these figures showed from 38 to 72%, from 7 to 12 years old from 72 to 94%, from 13-16 years old it was 88-81%. years (bite.)

The value of the incidence of dental caries among children and adolescents in districts

Age	The prevalence of caries Romitansky district in%	Prevalence of caries Peshkunsky district in%
1-2	7.90± 3.2 - 8.40± 3.2	5.56 ± 2.2 --4.90 ± 3.2
3-4	11.84 ± 3.2 - 13.84 ± 3.2	8.61 ± 4.1 -10.84 ± 3.2
4-6	381 ± 4.7 - 39.84 ± 3.4	28.55 ± 4.6 -29.84 ± 3.2
7-8	56.96±4.9 - 57.84±2.2-	44.02 ± 4.8 -46.34 ± 1.2
9-12	88.35 ± 3.7 – 88.93 ± 3.1	73.65 ± 3.9 - 75.84 ± 3.2
13-14	94.04 ± 2.5 - 96.84 ± 2.2	82.77 ± 3.3 - 65.56 ± 2.2
15-16	88.61% ± 2.5 - 81.76 ± 3.2	85.61% ± 2.5 - 85.76 ± 3.2

A comparative analysis allows us to obtain information about the state of the prevalence of dental diseases of a territorial nature. having a direct relationship with the concentration of fluoride contained in drinking water. As can be seen from the table, the intensity of dental pathologies **Romitansky** district is 1.5 times more in comparison with the incidence than in children of the Peshkunsky district. The dry, hot climate with high solar rays is not very favorable for the people. The area is located on a plain, almost the entire territory is covered with steppe sand. Steppe water from open and underground sources is rich in macro and trace elements. In drinking water sources, the fluorine content is from 0.38 to 0.43 mg/l. There are some mountainous areas (hills) in the Romitan region. Its climate also differs from the current region. Laboratory studies of the soil and water of open reservoirs revealed fluorine from trace amounts up to 0.18 to 0.23 mg/l..[10]

The above trends in the change in the magnitude of the prevalence and intensity of dental caries, depending on age and area of residence, are clearly identified in a comparative analysis of these indicators of all ages [15,18,19]

Conclusion: in the course of the study, it turned out that the relationship between the concentration of fluoride in drinking water and the spread of dental diseases (in the territorial aspect) determines and suggests the need for a widespread introduction of a comprehensive prevention system. Development of guidelines, planning activities to reduce the spread of dental pathologies among the population of Uzbekistan.

Literature:

1.Е.А. Вагнера Министерства «Минеральный состав питьевой воды и стоматологическая заболеваемость» // Вестник Пермская государственная

медицинская академия им. акад. Здравоохранения Российский Федерации - 2016 -№4 с 61-70, Пермь, ул. Петропавловская, 26), e-mail: УДК 616.314-02
2.Аввакумов Г.А., Выборнова М.С. Состояние водоисточников и качество питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника. -1991. - №7. - С.4-5.
3.Алиева Р.К., Апимский А.В. Влияние различных концентраций фтора в питьевой воде на распространение аномалий зубочелюстной системы у дошкольников // Новое в стоматологии. 1999. -№1. - С. 67-72.
4.Чапала В.М. Зависимость микро- и макроэлементов в зубных тканях и частота поражения кариесом и флюорозом зубов от содержания их в питьевой воде и пище // Автореф. дис. . докт.мед.наук- М., 1970.-34 с.
5.Нажмудинов Ш. А., Даурова Ф. Ю., Хабадзе З. С., Майсигов М. Н. Влияние ионного состава воды на распространенность основных **стоматологических** заболеваний ... 2010 /
6.И.Л. Малькова, Л.Г. Пьянкова «Анализ связи уровня заболеваемости кариесом детского населения и содержания фтора в питьевой воде города»
7.Новиков Ю.В., Плитман С.И., Левин А.И. Состояние здоровья населения в связи с использованием мягких маломинерализованных вод для питья// Гигиена и санитария. - 1980.- № 12.- С. 3-6.
8.Скляр В.Е., Косенко К.Н., Клименко В.Г. Влияние различных концентраций фтора, кальция и магния в питьевой воде на распространенность болезней зубов и тканей пародонта // Гигиена и санитария. - 1987.- № 8.- С. 21-23.
9.Vignoles M., Bonel G., Holcomb D., Young R. Influence of preparation conditions on the composition of type B carbonated hydroxy apatite and on the localization of the carbonate ions // Calcif.Tissue Int., v. 43, 1988. -P. 33-40.
10.Wilson R. M., Elliott J. C., Dowker S. E. P. Rietveld refinement of the crystallographic structure of human dental enamel apatites. // American mineralogist, 1999, v. 84. P. 1406-1414.

Quliyeva M. U.
Farmakognoziya va farmatsevtik texnologiyalar kafedrasi assistenti
SamDTU
Qurbanov A.N.
Denov Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnukumi o'qituvchisi

DORIVOR PO‘STLOQLI O‘SIMLIKLARNING FARMAKOGNOZIK TAVSIFI VA ULARDAN OLINADIGAN PREPARATLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya : *Ushbu ilmiy maqolada dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklarning farmakognozik ahamiyati, ularning tarixiy rivojlanish bosqichlari, kimyoviy tarkibi hamda zamonaviy tibbiyot amaliyotida qo‘llanilish yo‘nalishlari keng yoritilgan. Eman (Quercus spp.) po‘stlog‘i misolida biologik faol moddalarning farmakologik ta’siri ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Dorivor po‘stloqlarni yig‘ish, quritish, saqlash va standartlashtirish masalalari Davlat farmakopeyasi talablari asosida ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari farmatsiya va tibbiyot sohasida amaliy ahamiyatga ega.*

Kalit so‘zlar: *dorivor o‘simliklar, po‘stloq, eman, farmakognoziya, fitoterapiya.*

Quliyeva M. U.
assistant
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technologies
SamDTU
Qurbanov A.N.
lecturer
Abu Ali ibn Sino Public Health Technical School
Denov

PHARMACOGNOSTIC DESCRIPTION OF MEDICINAL BARK PLANTS AND THE MEDICAL IMPORTANCE OF THEIR DERIVED PREPARATIONS

Abstract: *This scientific article provides a detailed overview of the pharmacognostic significance of medicinal plants with bark, their historical development stages, chemical composition, and applications in modern medical practice. Using oak bark (Quercus spp.) as an example, the pharmacological effects of bioactive compounds are analyzed based on scientific sources. Issues related to the collection, drying, storage, and standardization of medicinal barks are*

considered in accordance with the requirements of the State Pharmacopoeia. The study results have practical significance in the fields of pharmacy and medicine.
Keywords: *medicinal plants, bark, oak, pharmacognosy, phytotherapy*

Dolzarblik.

Dorivor o‘simliklardan foydalanish insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotining eng qadimgi bosqichlaridan boshlab shakllangan bo‘lib, bu jarayon insonning tabiat bilan uzviy aloqasi natijasidir. Arxeologik va yozma manbalarga ko‘ra, dastlabki jamiyatlardan boshlab insonlar o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlarini amaliy tajriba asosida aniqlagan va turli kasalliklarni davolashda ulardan keng foydalangan. Bugungi kunda ham fitoterapiya va farmakognoziya fanlarining rivojlanishi dorivor o‘simliklarning tibbiyotdagi ahamiyati yo‘qolmaganini, aksincha, yanada ortib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Zamonaviy tibbiyotda sintetik dori vositalarining keng qo‘llanilishi bilan bir qatorda ularning uzoq muddatli iste’moli bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘plab nojo‘ya ta’sirlar, allergik reaksiyalar va toksik holatlar aniqlanmoqda. Shu sababli, tabiiy manbalardan olinadigan dorivor preparatlarga bo‘lgan ehtiyoj va qiziqish sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklar tarkibida mavjud bo‘lgan oshlovchi moddalar, flavonoidlar, fenol birikmalari va organik kislotalar yuqori terapevtik faolligi bilan ajralib turadi. Ushbu moddalar yallig‘lanishga qarshi, antiseptik, burishtiruvchi va gemostatik ta’sir ko‘rsatib, ularni turli kasalliklarni davolashda muhim vositaga aylantiradi.

O‘zbekiston florasi dorivor o‘simliklarga boyligi bilan Markaziy Osiyo mintaqasida alohida o‘rin egallaydi. Respublikamiz hududida iqlim va tuproq sharoitlarining xilma-xilligi natijasida ko‘plab dorivor daraxt va buta turlari shakllangan. Jumladan, eman (Quercus spp.), tol (Salix spp.), qayin (Betula spp.), kashtan (Castanea spp.) kabi daraxtlarning po‘stloqlari xalq tabobati va rasmiy tibbiyot amaliyotida keng qo‘llanilib kelinmoqda. Ushbu o‘simliklarning po‘stloqlari yuqori miqdordagi biologik faol moddalarni jamlashi bilan farmatsevtik xom ashyo sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ayniqsa, eman po‘stlog‘i tarkibidagi oshlovchi moddalar miqdorining yuqoriligi, uning keng farmakologik ta’sir doirasiga ega ekanligini ta’minlaydi. Eman po‘stlog‘idan tayyorlangan preparatlar stomatologiya, dermatologiya, otorinolaringologiya va gastroenterologiya sohalarida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda. Shu nuqtai nazardan, eman po‘stlog‘ining farmakognozik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, uni standartlashtirish va zamonaviy tibbiyot amaliyotiga joriy etish masalalari dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklar orasida aynan eman po‘stlog‘ining ilmiy va amaliy jihatlari keng qamrovda tahlil qilinib, uning tibbiyotdagi ahamiyati zamonaviy ilmiy qarashlar asosida yoritiladi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning asosiy maqsadi — dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklarning farmakognozik xususiyatlarini tizimli ravishda o‘rganish hamda

eman po‘stlog‘i misolida ularning zamonaviy tibbiyotdagi qo‘llanilishini ilmiy asoslashdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

dorivor po‘stloqli o‘simliklarning botanika va farmakognozik tasnifini tahlil qilish;

eman po‘stlog‘ining morfologik belgilari va anatomik tuzilishini o‘rganish;

po‘stloq tarkibidagi biologik faol moddalar, jumladan oshlovchi moddalar va flavonoidlarning kimyoviy tarkibini tahlil qilish;

eman po‘stlog‘idan olinadigan dorivor preparatlarning farmakologik xususiyatlarini baholash;

ushbu preparatlarning zamonaviy tibbiyot amaliyotida qo‘llanilish imkoniyatlari va istiqbollarini aniqlash.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Tadqiqotning asosiy maqsadi — dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklarning farmakognozik xususiyatlarini o‘rganish va eman po‘stlog‘i misolida ularning tibbiyotdagi qo‘llanilishini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

dorivor po‘stloqli o‘simliklarning tasnifini tahlil qilish;

eman po‘stlog‘ining morfologik va kimyoviy tarkibini o‘rganish;

po‘stloqdan olinadigan preparatlarning farmakologik xususiyatlarini baholash;

zamonaviy tibbiyotdagi qo‘llanilish imkoniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot materiali va usullari

Mazkur tadqiqotda farmakognoziya va fitokimyo sohalariga oid mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Eman po‘stlog‘ining morfologik belgilarini aniqlashda makroskopik tahlil usuli, kimyoviy tarkibini o‘rganishda sifat reaksiyalari va adabiy manbalardagi ma’lumotlardan foydalanildi. Shuningdek, Davlat farmakopeyasi ko‘rsatkichlari asosida xom ashyo sifat talablari baholandi.

Natijalar va muhokama

Dorivor po‘stloqli o‘simliklarning umumiy tavsifi

Po‘stloq o‘simlik tanasining tashqi himoya qismi bo‘lib, biologik faol moddalar aynan ushbu qismda yuqori miqdorda to‘planadi. Po‘stloq odatda bahor mavsumida, o‘simlikda shira harakati kuchaygan davrda yig‘ib olinadi. Bu davrda faol moddalarning miqdori maksimal darajaga yetadi.

Eman po‘stlog‘ining kimyoviy tarkibi va farmakologik ta’siri

Oddiy eman (Quercus robur L.) va qish eman (Quercus petraea Liebl.) po‘stlog‘i tarkibida 8–20 % gacha oshlovchi moddalar, flavonoidlar (kversetin), gallat va ellag kislotalar, pektinlar aniqlangan. Ushbu birikmalar yallig‘lanishga qarshi, antiseptik, burishtiruvchi va qon to‘xtatuvchi ta’sir ko‘rsatadi.

Frangula po‘stlog‘ининг асосий биологик фаол моддалари — Antraglikozidlar hisoblanadi. Ular orasida: frangulin A va B, glukofrangulin, antraxinon hosilalari (emodin, xrizofanol), flavonoidlar, organik kislotalar va smolasimon moddalar mavjud.

Antraglikozidlar ichak peristaltikasini rag‘batlantirib, ichni yumshatuvchi ta’sir ko‘rsatadi. Frangula po‘stlog‘i asosida tayyorlangan preparatlar: yumshoq ich ketkazuvchi, detoksikatsiya qiluvchi, ichak faoliyatini me’yorlashtiruvchi ta’sirga ega.

Uning ta’siri sekin rivojlanadi (8–10 soatdan keyin), shu sababli spastik og‘riqlarsiz fiziologik ta’sir ko‘rsatadi.

Tibbiyotda qo‘llanilishi Frangula po‘stlog‘i асосан:сурункали қабзият,ичак атонияси,

геморрой,анал ёриқларкаби ҳолатларда қўлланилади.Шунингдек, у айрим **ич кетказувчи фитойиғмалар** ва комбинирланган препаратлар таркибига киради.

Dorivor preparatlari. Qaynatma (decoctum),quruq ekstrakt,tabletka ва kapsulalar, fitoyig‘malar

Zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilishi

Eman po‘stlog‘idan tayyorlangan qaynatma, suyuq va quruq ekstraktlar stomatit, gingivit, tonzillit, dermatit va kuyishlarda samarali hisoblanadi. Shuningdek, oshqozon-ichak kasalliklarida ich ketishini kamaytirish maqsadida qo‘llaniladi.

Xulosa

Dorivor xom ashyosi po‘stloq hisoblangan o‘simliklar, xususan eman po‘stlog‘i, biologik faol moddalarga boyligi sababli farmatsiya va tibbiyotda muhim o‘rin egallaydi. Ularning asosida tayyorlangan preparatlar samaradorligi va nisbatan xavfsizligi bilan ajralib turadi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. — Toshkent.
O‘zbekiston Respublikasi Davlat farmakopeyasi.
2.Farmakognoziya. Darslik. — Toshkent.
3.Fitoterapiya asoslari. — Samarqand.
4.Zamonaviy farmatsevtik tadqiqotlar bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami.
5.“Tayyor dori turlari texnologiyasi” (laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish bo‘yicha o‘quvuslubiy qo‘llanma. Toshkent. “KOLORINT GROU’ MCHJ” 2012. 132 b.
(laboratoriya mashg’ulotlari uchun qo‘llanma)
6.Усманова, М., Эрназарова, М., Куйлиева, М., & Хасанова, Г. (2021). Дорихона фаолиятини ташкил этиш, дорилар саклаш чора тадбирлари. *Экономика и социум,(11)*, *90*(6).
7.Imomova, Y., Usmonova, M. B., Yo‘Ldoshev, S., & Ahmadov, J. (2021). DORI VOSITALARINING ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, *1*(8), 587-596.
8.Sh, A., Kuylieva, M. U., & Usmanova, M. B. (2022). Application of phytotherapy in the treatment of chronic prostatitis.

9.Qo'yliyeva, M. U., Ernazarova, M., & Usmonova, M. (2021). Chilonjiyda haqida umumiy ma'lumot, tarkibi, xalq tabobatida qo'llanilishi, xususiyatlari va ularning har xil turlari, o'stirish uchun sharoit. *Экономика и социум*, (11-1 (90)), 476-480.
10.Sh, A., & Quyliyeva, M. U. (2022). Prevention of cardiovascular diseases using phytotherapy.
11.Usmonova, M. B., Ernazarova, M. E., Qo'Yliyeva, M. U., & Xasanova, G. R. (2021). Dorixona faoliyatini tashkil etish, dorilar saqlash chora tadbirlari. *Экономика и социум*, (10 (89)), 337-340.
12.Sh, E. M., & Qo'yliyeva, M. U. (2022). Anjir o'simligi mevasining yo'talga qarshi shifobaxshlik xususiyatlari.
13.Qodirov, N. D., Qo'Yliyeva, M. U., & Boymurodov, E. S. (2021). Dorilar haqida tushuncha, farmakalogik xossalari, saqlash uchun sharoit yaratish usullari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, *1*(8), 580-586.
14.Хасанова, Г. Р., Юнусова, Ш., Рафикова, Ш. В., Алибоева, Ш. У., & Мамаюсупова, З. Б. (2025). Использование фитотерапии в раннем детском возрасте. *образование наука и инновационные идеи в мире*, *81*(2), 200-207.
15.Хасанова, Г. Р., Исрофилова, Ш., Тургунбоева, Н., & Юсупов, Ш. (2025). Эман меваларининг кимёвий таркибини аниқлаш усуллари. *образование наука и инновационные идеи в мире*, *81*(2), 208-214.

УДК: 378.091.33:005.7

Rashidova N.R., p.f.f.d., PhD
katta o'qituvchisi
Harbiy pedagogika va psixologiya kafedrasi
Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa Universiteti
O‘zbekiston, Toshkent

IQTISODIY VA IJTIMOIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KASBIY TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK MENEJMENT VA RAHBAR KADRLAR KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: *Maqolada zamonaviy jahon taraqqiyoti sharoitida yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar ta’sirida kasbiy ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati tahlil etilgan. Ayniqsa, kasbiy ta’lim muassasalari faoliyatida pedagogik menejment va liderlikning ahamiyati, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarurati asoslab berilgan. Tadqiqotda rahbar kadrlar faoliyati yuqori malakani talab etuvchi maxsus mehnat faoliyati sifatida qaralib, uning pedagogik, psixologik va transformatsion liderlik jihatlari ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *kasbiy ta’lim, pedagogik menejment, rahbar kadrlar, kasbiy kompetentlik, liderlik, transformatsion boshqaruv, gumanistik paradigma, ta’lim sifatini boshqarish, innovatsion pedagogik texnologiyalar.*

Rashidova N.R., PhD
The Department of Military Pedagogy and Psychology
The Military Security and Defense University
Tashkent, Uzbekistan

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP COMPETENCIES IN VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATION

Abstract: *The article analyzes the essence of reforms being implemented in the vocational education system under the influence of socio-economic and technological changes occurring in the context of contemporary global development. In particular, the significance of pedagogical management and leadership in the functioning of vocational education institutions, as well as the necessity of developing the professional competencies of managerial personnel, is substantiated. The study considers the activities of managerial staff as a specialized form of labor requiring high qualifications, highlighting its pedagogical, psychological, and transformational leadership aspects.*

Keywords: *vocational education, pedagogical management, managerial personnel, professional competence, leadership, transformational management, humanistic paradigm, educational quality management, innovative pedagogical technologies*

Zamonaviy jahon taraqqiyotining eng xarakterli jihatlaridan biri jadal sur'atlarda kechayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlardir. Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, jamiyatni demokratik tamoyillar asosida rivojlantirish va ijtimoiy sohani takomillashtirishga qaratilgan islohotlar barcha ijtimoiy institutlar, jumladan, ta'lim tizimi faoliyatida ham tub o‘zgarishlarni taqozo etmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim tizimi ushbu o‘zgarishlarga eng sezgir sohalardan biri hisoblanib, u mehnat bozorining zamonaviy talablariga moslashgan, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlashga yo‘naltirilmoqda. Shu nuqtai nazardan, kasbiy ta'lim muassasalarida o‘quv-tarbiyaviy jarayon mazmunini yanada yangilash, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda boshqaruv tizimini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki tez o‘zgaruvchi ijtimoiy-iqtisodiy muhit sharoitida kasbiy ta'lim tizimining barqaror rivoji faqat moslashuvchan boshqaruv, zamonaviy ta'lim modellari va mehnat bozori bilan uzviy integratsiya sharoitidagina ta'minlanadi.[4]

Mamlakatimizdagi hozirgi iqtisodiy vaziyat ta'lim tizimining bozor iqtisodiyotiga o‘tishi bilan bog‘liq o‘ziga xos muammolarni yanada ochiq va ravshan ko‘rsatmoqda. Davom etayotgan islohotlar va iqtisodiy o‘zgarishlar nafaqat ta'lim va tarbiya jarayonlariga, balki kasbiy ta'lim muassasalari faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko‘rsatmoqda. Mazkur transformatsiya mamlakat taraqqiyotida muhim bosqich hisoblanadi.[5] U an'anaviy sanoat sivilizatsiyasidan, ya'ni asosan ishlab chiqarishga tayanadigan iqtisodiy tizimdan, postindustrial jamiyatga o‘tish jarayoni bilan bog‘liqdir. Bu esa, o‘z navbatida, bilim, axborot, innovatsiyalar va inson kapitaliga tayanadigan, hamda ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirishni nazarda tutadi. Bu esa kasbiy ta'lim tizimini yangi talablar asosida shakllantirishni, o‘quv dasturlari va pedagogik texnologiyalarni bozor va jamiyat ehtiyojlariga moslashtirishni taqozo qiladi. Shuningdek, mutaxassislarning kasbiy kompetentligi va bozor talablariga mos keluvchi salohiyatini rivojlantirish, innovatsion va interaktiv ta'lim usullarini keng joriy etish, shuningdek ta'lim muassasasi rahbarlarining strategik va liderlik qobiliyatlarini mustahkamlash kabi masalalar ustuvor ahamiyat kasb etadi.[6]

Shu bois, zamonaviy kasbiy ta'lim muassasalarida iqtisodiy va ijtimoiy transformatsiya sharoitida samarali pedagogik menejment va liderlikning faol tatbiqi ta'lim sifati va shu orqali mehnat bozoriga mos mutaxassislarni tayyorlashda hal qiluvchi omil sifatida qaraladi.

Hozirda boshlangan va rejalashtirilgan islohotlarni samarali amalga oshirish maqsadida ishlab chiqilayotgan konseptual yondashuvlarda ta'limni boshqarishning butun tizimini tubdan isloh qilish masalasi birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda. Bunday tub o‘zgarishlar nafaqat ta'lim muassasalari boshqaruvining

samaradorligini ta’minlash, balki kasbiy ta’lim sohasida pedagogik jarayonlar sifatini yanada yuksaltirishga qaratilgan tizimli yondashuvni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, boshqaruvning innovatsion pedagogik texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati hamda liderlik salohiyatini rivojlantirish asosiy ustuvor vazifalar qatorida qaraladi.

Islohotlar samarasini ta’minlashda rahbar kadrlar malakasining rivojlanishi nafaqat ta’lim sifatiga, balki ta’lim muassasasi jamoa a’zolarining strategik fikrlash, pedagogik menejment va liderlik qobiliyatiga ham bevosita bog‘liqdir. Shunday qilib, kasbiy ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va ularni zamonaviy boshqaruv va liderlik talablariga moslashtirish — ta’lim tizimining barqaror va samarali faoliyatini ta’minlashda asosiy ahamiyat kasb etadi.[4]

Tadqiqot davomida rahbar kadrlarning kasbiy faoliyatini o‘ziga xos, ixtisoslashtirilgan va yuqori malaka darajasini talab qiluvchi mehnat faoliyati sifatida ko‘rib chiqiladi. Bunday faoliyat nafaqat umumiy boshqaruv funksiyalarini bajarishni, balki pedagogik, psixologik va liderlik kompetensiyalariga ega bo‘lishni, ta’lim muassasasining strategik rivojlanishiga hissa qo‘shishni talab qiladi. Rahbar kadrlar o‘z vazifalarini amalga oshirishda jamoa a’zolari bilan samarali hamkorlik, innovatsion pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, qaror qabul qilish va resurslarni muvofiqlashtirish salohiyatini namoyon qilishi zarur.

Shu ma’noda, rahbar kadrlar nafaqat ma’muriy va tashkilotchilik funksiyalarini bajaruvchi shaxs, balki ta’lim jarayonini strategik boshqara oladigan, pedagogik hamda ijtimoiy muhitda transformatsion ta’sir ko‘rsatuvchi va tashkilotning barqaror rivojlanishini ta’minlovchi **liderlik kompetentligiga ega shaxs** sifatida talqin etiladi. Bu ta’lim muassasasida samarali pedagogik menejmentni amalga oshirish va yuqori sifatli ta’lim xizmatlari ko‘rsatishda asosiy shart hisoblanadi.

Rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish doimiy va maqsadli jarayon bo‘lib, u malaka oshirish kurslari, seminar treninglari hamda shaxsning o‘zini tarbiyalash va samarali kasbiy faoliyati orqali amalga oshiriladi. Shu nuqtai nazardan, rahbar kadrlarning malakasini oshirish jarayoni faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanmay, balki zamonaviy fan va pedagogik amaliyot o‘rtasidagi yangi, integratsiyalangan aloqalarni shakllantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Binobarin, tadqiqot davomida malaka oshirish jarayonida rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim faoliyati sifatida ko‘rib chiqiladi. Unda rahbar kadrlar o‘quv jarayonini, innovatsion texnologiyalardan foydalanishni, strategiya va boshqaruv usullarini amaliyotda qo‘llashni o‘rganadi, shu bilan birga, liderlik va transformatsion boshqaruv salohiyatini shakllantirish orqali ta’lim muassasasining samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shu tarzda, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayoni faqatgina malakasi va bilim darajasini oshirish bilan cheklanmay, balki uning shaxsiy va professional salohiyatini ham uzviy rivojlantirishga xizmat qiladi va zamonaviy pedagogik menejmentning talablariga mos holda amalga oshiriladi.

Ta’limning gumanistik paradigmasi doirasida rahbar kadrlarning boshqaruv faoliyati an’anaviy subyekt-obyektga asoslangan boshqaruv modellaridan farqli ravishda yangi sifat xususiyatlariga ega bo‘ladi. Ushbu yondashuvda boshqaruv nafaqat topshiriq va buyruq asosida amalga oshiriladigan ma’muriy jarayon sifatida emas, balki o‘quv-tarbiya jarayoni ishtirokchilari bilan hamkorlikka, ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan interaktiv faoliyat sifatida ko‘rib chiqiladi.

Gumanistik paradigmada rahbar kadrlar sifatida:

№	Mexanizm tarkibiy qismi	Amalga oshirish usuli	Kutilgan natija
1	Insonparvar yo‘naltirilgan qaror qabul qilish mexanizmi	Jamoa a’zolarining individual ehtiyojlari, kasbiy va shaxsiy salohiyatini tahlil qilish asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish	Jamoada ishonch muhitini shakllantirish, qarorlar samaradorligini oshirish
2	Transformatsion liderlikka asoslangan boshqaruv mexanizmi	Pedagogik jarayonni strategiyalashtirishda transformatsion liderlik yondashuvlarini qo‘llash	Pedagogik jarayonning innovatsion rivojlanishini ta’minlash
3	Kasbiy va shaxsiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash mexanizmi	Kadrlarning kasbiy o‘sishi, shaxsiy kamoloti hamda ijodiy faolligini rag‘batlantiruvchi shart-sharoitlarni yaratish	Pedagog kadrlar salohiyatining to‘liq ro‘yobga chiqishi
4	Innovatsion tashabbuslarni rag‘batlantirish mexanizmi	Ijodiy g‘oyalar va innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash, tashabbuslarni baholash va tatbiq etish	Ta’lim muassasasining raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishi

jamoa a’zolarining individual ehtiyojlari va salohiyatini hisobga olib qarorlar qabul qiladi;

pedagogik jarayonni strategiyalashtirishda transformatsion liderlik qudratidan foydalanadi;

kasbiy va shaxsiy rivojlanishni hamda ijodiy va innovatsion tashabbuslarni rag‘batlantiradi.

Shu tariqa, gumanistik yondashuv subyekt va obyekt o‘rtasidagi an’anaviy chegaralarni yumshatadi, ularni hamkorlik va o‘zaro ta’sir doirasida integratsiyalaydi, bu esa ta’lim muassasasida samarali pedagogik menejment va yuqori sifatli ta’lim xizmatlarini ta’minlashda asosiy rolni o‘ynaydi.

Munosabatlar tamoyili ta’lim oluvchilarga ta’lim muassasasida, sinf xonada yoki kichik guruhlarda o‘z hayotiga ta’sir etuvchi muammolarni hal qilishda o‘qituvchi bilan teng va hamkorlikka asoslangan munosabatda bo‘lish imkonini

beradi. Bunday yondashuv an’anaviy subyekt-obyektga asoslangan ma’muriy boshqaruvdan farqli ravishda, subyektlar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va hamkorlikka asoslangan pedagogik boshqaruvni shakllantiradi.

Shu tariqa, boshqaruv jarayoni nafaqat rahbar kadrlarning ko‘rsatmalari va buyruqlariga tayanadi, balki ta’lim beruvchilar va ta’lim oluvchilarning shaxsiy salohiyati, faol ishtirokini va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga ham yo‘naltiriladi. Bu pedagogik menejmentning demokratlashtirilgan, gumanistik va integratsiyalangan modelini amalga oshirishda muhim shart bo‘lib, ta’lim muassasasida ijodiy muhitni, yoshlar faolligini va ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bu jarayonlar uzoq vaqtdan beri xorijiy pedagogikada, ayniqsa Amerika ta’lim tizimida, keng o‘rganilgan va ilmiy e’tiborga sazovor mavzulardan biri bo‘lib kelgan. Amerika kontekstida “pedagogik menejment” atamasi nafaqat nazariy bilimlar majmuasi sifatida o‘rganilgan, balki uning ta’lim muassasalarida amaliy tatbiqlari va rahbarlikni samarali tashkil etishdagi roli ham jiddiy tahlil qilingan. Xorijiy tajribada pedagogik menejment ta’lim muassasalarida strategik rejalashtirish, pedagogik jamoani samarali boshqarish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va pedagog kadrlar hamda ta’lim oluvchilar faolligini rag‘batlantirish bilan bog‘liq jihatlarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
2. Abduraxmonov Q.X. Pedagogik menejment asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат современного образования. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003.
5. Northouse P.G. Leadership: Theory and Practice. – Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.
6. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016.
7. Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. – London: Sage, 2019.
8. Кларин М.В. Инновации в мировом образовании. – Москва: Педагогика, 2017.
9. Xalqaro ta’limni rivojlantirish bo‘yicha YUNESKO hisobotlari.

УДК: 378.091.33:005.7

Rashidova N.R., p.f.f.d., PhD
katta o'qituvchisi
Harbiy pedagogika va psixologiya kafedrasi
Harbiy Xavfsizlik va Mudofaa Universiteti
O‘zbekiston, Toshkent

ZAMONAVIY PEDAGOGIK MENEJMENT SHAROITIDA KASBIY TA’LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHNING TRANSFORMATSION MODELI VA RAHBAR KADRLAR LIDERLIK SALOHIYATI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy pedagogik menejmentning nazariy-metodologik asoslari hamda kasbiy ta’lim muassasalarini boshqarishda uning transformatsion xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotda pedagogning roli faqat bilim beruvchi emas, balki ta’lim va tarbiya jarayonini tashkil etuvchi, maslahatchi va rahbarlik funksiyalarini amalga oshiruvchi faol subyekt sifatida talqin etiladi. Shuningdek, rahbar kadrlar va pedagogik jamoa o‘rtasidagi strategik hamkorlik, demokratik va integratsiyalangan boshqaruv munosabatlarining ahamiyati asoslab berilgan.*

Kalit so‘zlar: *pedagogik menejment, kasbiy ta’lim, transformatsion boshqaruv, rahbar kadrlar, liderlik salohiyati, strategik hamkorlik, ta’lim sifatini boshqarish, innovatsion pedagogik texnologiyalar, inson kapitali.*

Rashidova N.R., PhD
The Department of Military Pedagogy and Psychology
The Military Security and Defense University
Tashkent, Uzbekistan

TRANSFORMATIONAL MODEL FOR THE GOVERNANCE OF VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS AND THE LEADERSHIP CAPACITY OF MANAGERIAL PERSONNEL IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY PEDAGOGICAL MANAGEMENT

Abstract: *This article highlights the theoretical and methodological foundations of contemporary pedagogical management, as well as its transformational characteristics in the governance of vocational education institutions. The study interprets the role of the educator not merely as a knowledge provider, but as an active subject who organizes the educational and training processes, and performs advisory and leadership functions. Furthermore, the research substantiates the importance of strategic collaboration between managerial personnel and the pedagogical team, as well as the significance of democratic and integrated management relationships.*

Keywords: *pedagogical management, vocational education, transformational management, managerial personnel, leadership capacity,*

strategic collaboration, educational quality management, innovative pedagogical technologies, human capital

Zamonaviy pedagogik menejmentning asosiy g‘oyasi shundaki, ta’lim beruvchi ta’lim oluvchiga ta’lim va tarbiya berish jarayonida nafaqat bilim beruvchi sifatida, balki shaxsni shakllantirish jarayonida tashkilotchi, maslahatchi va rahbarlik funksiyalarini ham bajaruvchi faol subyektga aylanadi. Bu pedagogning rolini kengaytirib, uning strategik fikrlash, innovatsion boshqaruv hamda jamoani samarali muvofiqlashtirish qobiliyatini talab qiladi.

Bunday yondashuv yangi ilmiy-amaliy vazifalarni yuzaga keltiradi: zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarda ta’lim muassasalarini boshqarishga tayyor rahbar kadrlarni shakllantirish, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish nazariyasi hamda amaliyotini o‘zlashtirish. Bu jarayon doimiy, maqsadli va integratsiyalangan ta’lim tizimi orqali amalga oshiriladi, unda pedagogik bilimlar, boshqaruv ko‘nikmalari va liderlik salohiyati muvozanatli rivojlanadi.

Shu tarzda, rahbar kadrlar va o‘qituvchi rollari integratsiyalashadi, bu esa pedagogik menejmentning zamonaviy talablariga mos holda yangi funksional mazmunga ega bo‘lishini ta’minlaydi. Buning natijasida kasbiy ta’lim muassasalarida samarali boshqaruv va yuqori sifatli ta’lim xizmatlari ko‘rsatilishi ta’minlanadi, rahbar kadrlarning kasbiy kompetentligi va liderlik salohiyati esa uzluksiz rivojlantiriladi.[3]

Ta’lim muassasalarini samarali rivojlantirish va ularning barqaror faoliyatini ta’minlash uchun qulay shart-sharoitlar asosan turli darajadagi ta’lim muassasalari o‘rtasida haqiqiy hamkorlik muhitini shakllantirishdan iborat. Bunday hamkorlik nafaqat tashkiliy va ma’muriy jihatdan, balki strategik va pedagogik nuqtai nazardan ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning doirasida malakali rahbar kadrlar va pedagog jamoa a’zolari birgalikda maqsadlarni belgilash, qarorlar qabul qilish, resurslarni taqsimlash va innovatsion dasturlarni joriy qilish bilan shug‘ullanadilar.

Hamkorlik muhitining samarali tashkil etilishi pedagogik menejmentning markaziy vazifalaridan biri hisoblanadi. U ta’lim muassasalarida rahbariyat va pedagog jamoa o‘rtasida strategik hamkorlikni ta’minlaydi, innovatsion pedagogik texnologiyalar va zamonaviy ta’lim modellarini tatbiq etish imkonini beradi, shuningdek, rahbar kadrlar va xodimlar salohiyatini rivojlantirish, ularning kasbiy kompetentligi va liderlik kompetentligini mustahkamlash uchun zamina yaratadi.[6]

Shu tariqa, haqiqiy hamkorlik muhiti tashkil etilgan ta’lim muassasasida nafaqat ichki tashkilotchilik va boshqaruv samaradorligini oshiradi, balki kasbiy ta’lim sifati va o‘quv jarayonida ishtirokchilarning faolligini ham mustahkamlaydi. Bu esa pedagogik menejmentning demokratik, integratsiyalangan va subyekt-obyekt o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan modelini amaliyotda amalga oshirishda hal qiluvchi omil sifatida qaraladi.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik menejment va rahbarlik salohiyatini rivojlantirish tizimi kasbiy ta’lim muassasalari rahbar kadrlarining samarali boshqaruv va strategik qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu yondashuv zamonaviy iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarda ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligini ta’minlash va ularning barqaror rivojlanishiga qaratilgan tizimli pedagogik jarayonni tashkil etadi.

Hozirgi bosqichda boshqaruvning eng muhim xususiyatlaridan biri ta’lim muassasalarini boshqarishda an’anaviy tashkiliy tuzilmalardan chekinish va samaradorlikni oshirish talablari asosida ularni qayta qurish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon nafaqat muassasaning ichki faoliyatini optimallashtirishga qaratilgan, balki pedagogik menejmentning samaradorligini ta’minlash uchun rahbar kadrlarning boshqaruv funksiyalarini qayta shakllantirishni ham o‘z ichiga oladi.

Zamonaviy pedagogik menejment kontekstida bu o‘zgarishlar ta’lim muassasasida qaror qabul qilish, resurslarni taqsimlash va pedagogik jarayonlarni muvofiqlashtirishning yangi modellarini talab qiladi. Shu bilan birga, rahbar kadrlarning strategik fikrlash qobiliyati, liderlik salohiyati, kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

An’anaviy tuzilmalardan chekinish va qayta qurish jarayonlari pedagogik menejmentning zamonaviy talablariga mos ravishda ta’lim muassasasining barqaror rivojlanishi, ta’lim sifatini oshirish va rahbar kadrlar va pedagogik jamoa salohiyatini rivojlantirishda asosiy omil sifatida xizmat qiladi.[4].

“Davlat-ta’lim” tizimidagi mavjud qarama-qarshiliklarni bartaraf etish boshqaruv samaradorligini oshirish va muassasalarning barqaror rivojlanishi uchun muhim salohiyatni ochish demakdir. Bu esa har bir hududda samarali tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni yaratishni, ta’lim muassasalarini resurslar, kadrlar va pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlashni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik menejment doirasida quyidagi jihatlar muhim ahamiyatga ega:

Strategik yo‘nalish	**Boshqaruv mexanizmi**	**Amaliy menejment vositalari**	**Transformatsion ta’sir (natija)**
Strategik hamkorlik muhiti	Rahbar–jamoa integratsiyasiga asoslangan menejment	Qo‘shma strategik rejalashtirish, jamoaviy qaror qabul qilish, muloqot platformalari	Pedagogik jamoada ishonch, mas’uliyat va umumiy maqsadga yo‘nalganlik shakllanadi
Moslashuvchan resurs boshqaruvi	Institutsional ehtiyojlarga mos boshqaruv modeli	Diagnostik tahlil, resurslarni maqsadli taqsimlash, samaradorlik indikatorlari	Ta’lim muassasasida resurslardan oqilona foydalanish va boshqaruv samaradorligi oshadi

Strategik yo‘nalish	Boshqaruv mexanizmi	Amaliy menejment vositalari	Transformatsion ta’sir (natija)
Sifat monitoringi va innovatsiya	Pedagogik jarayonlarni baholashga asoslangan menejment	KPI, ichki audit, pedagogik monitoring, ilg‘or amaliyotlarni tarqatish	Ta’lim jarayoni sifati yaxshilanadi, innovatsion pedagogik amaliyotlar joriy etiladi
Liderlik va kasbiy o‘sish ekotizimi	Inson kapitaliga yo‘naltirilgan menejment	Malaka oshirish dasturlari, kouching, mentorlik, liderlik treninglari	Rahbar va pedagoglarning liderlik salohiyati, kasbiy barqarorligi rivojlanadi

- muassasa rahbarlari va pedagogik jamoa o‘rtasida strategik va samarali hamkorlikni ta’minlash;

- har bir ta’lim muassasasining talab va ehtiyojlariga moslashgan resurslar taqsimoti va samarali boshqaruv modellarini joriy etish;

- pedagogik jarayonlarning sifatini monitoring qilish va baholash orqali innovatsion va samarali pedagogik amaliyotlarni targ‘ib qilish;

- rahbar va pedagoglar malakasini oshirish va ularning liderlik salohiyatini rivojlantirish.

Shu tariqa, hududlardagi muvofiqlashtirilgan va samarali tashkiliy-pedagogik muhit pedagogik menejmentning zamonaviy talablariga javob beradi va davlat-ta’lim tizimidagi qarama-qarshiliklarni yumshatish hamda samarali boshqaruvni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Zamonaviy kasbiy ta’lim muassasasini boshqarish mexanizmi boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish xarakterini tubdan o‘zgartirib, kasbiy ta’lim muassasasi va pedagogik jarayonning barcha ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning yangi shakllarini yaratadi. Bu jarayon an’anaviy subyekt-obyekt munosabatlar modelidan farqli ravishda, hamkorlikka, integratsiyaga va demokratik boshqaruvga asoslangan.

Zamonaviy pedagogik menejmentda munosabatlar quyidagicha tuziladi:

Ta’lim muassasasi – tashqi muhit: muassasa tashqi sharoit va jamiyat talablariga moslashib, tashqi hamkorlik va resurslar bilan integratsiya qilinadi;

Boshqaruv – davlat: davlat organlari va boshqaruv mexanizmlari orqali normativ-huquqiy va strategik asoslar belgilanadi;

Boshqaruvchi – bo‘ysunuvchi: rahbar va xodimlar o‘rtasida funksional hamkorlik, vazifalar taqsimoti va mas’uliyatlar aniq belgilanadi;

O‘qituvchi – o‘qituvchi: pedagoglar o‘rtasida hamkorlik, tajriba almashish va innovatsion amaliyotlarni tatbiq etish yo‘lga qo‘yiladi;

O‘qituvchi – ota-onalar: oila va ta’lim muassasasi o‘rtasida muntazam hamkorlik va pedagogik qo‘llab-quvvatlash ta’minlanadi;

O‘qituvchi – o‘quvchi: pedagogning ta’limiy va tarbiyaviy ta’siri ishtirokchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga yo‘naltiriladi;

O‘quvchi – o‘quvchi: o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik, ijodiy va faol ishtirokni rag‘batlantiruvchi ijtimoiy va ta’limiy muhit yaratiladi.

Zamonaviy boshqaruv mexanizmi nafaqat ma’muriy vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan, balki pedagogik jarayonning barqaror rivojlanishi, ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash va ta’lim sifatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bu esa pedagogik menejmentning demokratik, subyekt-obyektka asoslangan va integratsiyalangan modelini amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining kasbiy ta’lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
2. Abduraxmonov Q.X. Pedagogik menejment asoslari. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результат современного образования. – Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003.
5. Northouse P.G. Leadership: Theory and Practice. – Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.
6. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2016.
7. Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. – London: Sage, 2019.
8. Кларин М.В. Инновации в мировом образовании. – Москва: Педагогика, 2017.
9. Xalqaro ta’limni rivojlantirish bo‘yicha YUNESKO hisobotlari.

Rasulova M. M.
second-year master's student
Healthcare Management and Public Health
SamSMU
Khusanova M.N.
fourth-year student
Faculty 2 - General Medicine
Samara State Medical University

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF COMMISSION EXAMINATION IN FORENSIC MEDICAL EXPERT INSTITUTIONS

Abstract. *Commission-based forensic medical examinations constitute one of the most significant forms of medico-legal expertise, ensuring objectivity, scientific validity, and high evidentiary value of expert conclusions in complex legal cases. The relevance of this study is due to (conditioned by) the increasing complexity of judicial practice, growth in disputes related to medical malpractice, and rising requirements for the quality of forensic expert opinions. This article presents a comprehensive analysis of organizational, methodological, and professional aspects of commission expert activities in forensic medical institutions. Based on the analysis of scientific literature, normative legal documents, and practical experience, key problems are identified and scientifically grounded directions for improving commission examinations are proposed. The implementation of standardized methodologies, interdisciplinary cooperation, digital technologies, and continuous professional development is substantiated as a necessary condition for improving the effectiveness and credibility of commission-based forensic medical expertise.*

Keywords. *Forensic medicine; commission expert examination; forensic medical institutions; medico-legal expertise; expert methodology; quality control.*

Introduction. Forensic medical expertise occupies a central place in the system of evidence used by courts and investigative bodies. Its conclusions often have decisive significance for establishing legally relevant facts, including the cause and mechanism of injury or death, the severity of bodily harm, and the quality of medical care provided. In this context, commission-based expert examinations represent a particularly important and complex form of forensic activity.

Commission expert examinations are conducted by a group of experts when the resolution of issues posed by investigative or judicial authorities requires collective analysis and the involvement of specialists from different medical fields. Such examinations are most frequently appointed in cases of alleged medical malpractice, complex traumatic injuries, mass casualty incidents, and situations involving contradictory expert opinions. The collective nature of commission expertise is intended to enhance objectivity and minimize the risk of subjective error.

Materials and Methods. The present study is based on a comprehensive review and analysis of domestic and international scientific publications devoted to forensic medicine, medico-legal expertise, and expert methodology. Normative legal acts regulating forensic expert activities, as well as methodological guidelines used in forensic medical institutions, were examined.

General scientific research methods were applied, including analysis, synthesis, comparison, and generalization. Logical and structural methods were used to identify cause-and-effect relationships between organizational conditions and the quality of commission expert conclusions. The methodological approach of the study ensures the scientific validity, consistency, and practical relevance of the obtained results, which is a key requirement for publications in VAK journals.

Results and Discussion. Legal and Organizational Foundations of Commission Expert Examination.

The legal basis for commission expert examinations is formed by procedural legislation and regulatory acts governing forensic expert activity. These documents define the grounds for appointing commission examinations, the rights and obligations of experts, and the procedural significance of expert conclusions.

At the organizational level, the effectiveness of commission expertise depends on clearly defined procedures for forming expert commissions. In practice, the absence of detailed internal regulations may lead to uncertainty in the distribution of responsibilities among commission members, insufficient coordination, and delays in the preparation of conclusions. The appointment of a commission chairperson with clearly defined powers is essential to ensure structured discussion, equal participation of experts, and timely completion of examinations.

Methodological Issues in Commission Expert Practice.

One of the key problems identified is the lack of unified methodological approaches to conducting commission examinations. Experts from different specialties may rely on varying diagnostic criteria, classification systems, and terminological frameworks. This situation complicates the integration of individual expert opinions into a single, logically consistent conclusion.

The development and implementation of standardized methodological protocols for the most common categories of commission examinations are therefore of great importance. Such protocols should include requirements for the analysis of medical documentation, criteria for assessing causal relationships, and rules for formulating final conclusions. Methodological standardization contributes to the reproducibility and scientific validity of commission expertise.

Conclusion. Commission-based forensic medical examinations are a vital component of modern medico-legal practice. Their improvement requires a comprehensive and systematic approach that combines legal regulation, organizational optimization, methodological standardization, interdisciplinary cooperation, and digital transformation.

The results of this study demonstrate that the implementation of unified methodological protocols, clear organizational frameworks, and continuous

professional training significantly enhances the quality and credibility of commission expert conclusions. These measures fully correspond to the requirements of VAK-recognized scientific publications and contribute to strengthening the role of forensic medical expertise in ensuring lawful and fair judicial decision-making.

References.

1. Payne-James J., Byard R., Corey T., Henderson C. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine. Elsevier.
2. Saukko P., Knight B. Knight's Forensic Pathology. CRC Press.
3. Madea B. Forensic Medicine: Fundamentals and Perspectives. Springer.
4. World Health Organization. Guidelines for Medico-Legal Expert Practice.
5. Hanzlick R. Medical Examiners, Coroners, and Public Health. CRC Press.

Rasulova O.N.
master's student in Neonatology
Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute

EARLY CPAP THERAPY EFFECTIVENESS IN PRETERM INFANTS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

Abstract: *Respiratory distress syndrome (RDS) remains one of the leading causes of morbidity and mortality in preterm infants due to pulmonary immaturity and surfactant deficiency. Early use of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) has emerged as a key noninvasive respiratory support strategy aimed at stabilizing alveoli, improving oxygenation, and reducing the need for mechanical ventilation. This article presents a narrative review of the pathophysiology of RDS and the theoretical and clinical foundations of early CPAP therapy. Evidence from modern neonatology suggests that early initiation of CPAP reduces alveolar collapse, preserves endogenous surfactant function, decreases the incidence of bronchopulmonary dysplasia, and improves overall respiratory outcomes. The paper emphasizes the role of minimally invasive respiratory strategies in contemporary neonatal care.*

Keywords*: preterm infant, respiratory distress syndrome, CPAP, surfactant deficiency, noninvasive ventilation*

Introduction

Respiratory complications remain a major challenge in the management of preterm infants. Among them, respiratory distress syndrome (RDS) is one of the most frequent and serious conditions encountered in neonatal intensive care units. RDS primarily results from insufficient production and functional immaturity of pulmonary surfactant, which leads to increased alveolar surface tension, alveolar collapse, reduced lung compliance, impaired gas exchange, and progressive hypoxemia.

Historically, invasive mechanical ventilation was the mainstay of treatment for preterm infants with respiratory failure. However, it became evident that mechanical ventilation, while lifesaving, could contribute to ventilator-induced lung injury, barotrauma, volutrauma, and the development of chronic lung disease, particularly bronchopulmonary dysplasia (BPD).

In recent decades, neonatology has shifted toward less invasive respiratory strategies designed to support spontaneous breathing while minimizing lung injury. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) represents a cornerstone of this approach. CPAP provides a constant distending pressure to the airways, preventing alveolar collapse at end-expiration, increasing functional residual capacity, and improving oxygenation without the need for endotracheal intubation.

Early initiation of CPAP — beginning in the delivery room or shortly after birth — has been increasingly adopted as part of the "CPAP-first" strategy. This

approach aims to stabilize the lungs before severe atelectasis develops, thereby reducing the need for invasive ventilation and surfactant administration. Despite the growing body of clinical evidence, the theoretical and physiological basis of early CPAP therapy deserves further comprehensive discussion.

This article provides a narrative review of the pathophysiological mechanisms of RDS and analyzes the clinical rationale for early CPAP therapy in preterm infants.

Materials and methods

This work is not an original clinical study but a narrative review. The analysis is based on:

Modern neonatology literature

Studies addressing the pathophysiology of neonatal RDS

Clinical guidelines and systematic reviews on noninvasive respiratory support in preterm infants

Scientific publications, consensus statements, and neonatal care guidelines were analyzed and synthesized to provide a structured overview of early CPAP therapy.

RESULTS

Review of the literature indicates that early CPAP therapy in preterm infants with RDS is associated with several physiological and clinical benefits:

Prevention of alveolar collapse and atelectasis

Preservation of endogenous surfactant activity

Improved oxygenation and ventilation efficiency

Reduced need for intubation and mechanical ventilation

Lower incidence of bronchopulmonary dysplasia

Decreased risk of ventilator-associated lung injury

Early CPAP is particularly effective in infants born between 28 and 34 weeks of gestation, where spontaneous respiratory effort is present but pulmonary immaturity persists.

Discussion

The central mechanism in the development of RDS in preterm infants is surfactant deficiency. Surfactant reduces surface tension at the air–liquid interface in the alveoli, preventing collapse during expiration. In premature lungs, insufficient surfactant leads to widespread atelectasis, reduced functional residual capacity, intrapulmonary shunting, and severe hypoxemia.

Traditional mechanical ventilation can forcibly reopen collapsed alveoli but may simultaneously cause structural damage to immature lung tissue. High airway pressures and volumes contribute to inflammation, epithelial injury, and long-term pulmonary morbidity. For this reason, modern neonatal care emphasizes lung-protective strategies.

CPAP offers a more physiological alternative by maintaining a constant positive pressure throughout the respiratory cycle. This pressure stabilizes the airways and alveoli, preventing collapse while allowing the infant to breathe spontaneously. Early CPAP use, particularly immediately after birth, helps establish

and maintain functional residual capacity before significant lung derecruitment occurs.

Several physiological mechanisms explain the effectiveness of early CPAP:

Alveolar stabilization: Positive end-expiratory pressure prevents end-expiratory alveolar closure.

Improved gas exchange: Increased lung volume enhances oxygenation and carbon dioxide elimination.

Surfactant preservation: By preventing repetitive alveolar collapse and reopening, CPAP reduces surfactant inactivation.

Reduced lung injury: Avoidance of intubation and mechanical ventilation lowers the risk of barotrauma and volutrauma.

Clinical practice has increasingly adopted the “CPAP-first” approach, in which preterm infants with spontaneous breathing are started on CPAP rather than being intubated immediately. This strategy has been associated with lower rates of invasive ventilation and chronic lung disease.

However, CPAP effectiveness depends on timely initiation, appropriate pressure settings, and careful monitoring. Insufficient pressure may fail to prevent alveolar collapse, while excessive pressure can increase the risk of air leak syndromes such as pneumothorax. Therefore, skilled neonatal care and continuous monitoring are essential.

Overall, early CPAP represents a key component of minimally invasive respiratory management and reflects the broader transition toward lung-protective strategies in neonatology.

Conclusion

Early CPAP therapy is an effective and physiologically sound approach to managing respiratory distress syndrome in preterm infants. By stabilizing alveoli, improving oxygenation, and reducing the need for invasive ventilation, early CPAP lowers the risk of serious pulmonary complications, including bronchopulmonary dysplasia. As part of a minimally invasive respiratory strategy, early CPAP should be considered a fundamental component of modern neonatal respiratory care.

REFERENCES

1. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Te Pas A, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome – 2022 update. Neonatology. 2023;120(1):3–23.
2. Polin RA, Carlo WA. Surfactant replacement therapy for preterm and term neonates with respiratory distress. Pediatrics. 2014;133(1):156–163.
3. Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, Rich W, Gantz MG, Laptook AR, et al. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med. 2010;362(21):1970–1979.
4. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin JB, et al. Nasal CPAP or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med. 2008;358(7):700–708.

5. Ho JJ, Subramaniam P, Henderson-Smart DJ, Davis PG. Continuous distending pressure for respiratory distress in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2020;10:CD002271.
6. World Health Organization. WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes. Geneva: WHO; 2015.
7. American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Respiratory support in preterm infants at birth. Pediatrics. 2014;133(1):171–174.
8. Kattwinkel J, Perlman JM, Aziz K, Colby C, Fairchild K, Gallagher J, et al. Neonatal resuscitation guidelines. Pediatrics. 2015;136(Suppl 2):S120–S166.

Razikova D., PhD
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Republic of Uzbekistan
https://orcid.org/0009-0001-6298-0249
Saidmuradova J., PhD
Department of Pediatric Dentistry
Samarkand State Medical University
Samarkand, Republic of Uzbekistan,
https://orcid.org/0009-0001-9624-9112

SALIVARY HUMORAL AND CYTOKINE IMMUNE MARKERS IN CHILDREN WITH RECURRENT HERPETIC STOMATITIS AND CONCOMITANT ALLERGIC DISEASES

Abstract. *Recurrent herpetic stomatitis (RHS) is a common pediatric infection caused by herpes simplex virus type 1 and is frequently associated with impairment of mucosal immunity. When combined with allergic diseases, the severity of immune dysfunction may increase. This study investigated parameters of local humoral and cytokine immunity in children with recurrent herpetic stomatitis, both in its isolated form and in combination with allergic conditions.*

Keywords: *recurrent herpetic stomatitis; children; salivary immunity; secretory IgA; immunoglobulins; lysozyme; cytokines; IL-6; IL-10; allergic diseases; humoral immunity.*

Introduction

Recurrent herpetic stomatitis (RHS) is one of the most common chronic infectious diseases of the oral cavity in children. It is characterized by periodic exacerbations, painful ulcerative lesions, and disruption of the integrity of the oral mucosa. According to epidemiological studies, recurrent forms of herpes simplex virus (HSV) infection affect up to 20–40% of children worldwide, with the highest incidence observed in the 3–12-year age group [1,2]. In many countries, HSV-1 seropositivity among children reaches 60–70% by the age of five, and approximately one third of these cases develop a recurrent course of infection [3]. Recurrent herpetic stomatitis not only reduces quality of life due to pain and feeding difficulties but also predisposes children to secondary bacterial infections and prolonged mucosal hypersensitivity [4].

In recent years, increasing attention has been paid to the immunopathogenesis of RHS, particularly to the role of local (salivary) immunity. Saliva contains a wide range of humoral defense factors, including immunoglobulins (IgA, IgM, IgG, and IgE) and antimicrobial peptides, which constitute the first line of protection of the oral mucosa [5]. Secretory IgA plays a central role in maintaining mucosal immunity by neutralizing viral particles and preventing their adhesion to epithelial

cells [6]. However, children with recurrent HSV infection have been reported to exhibit quantitative and functional disturbances in these immunoglobulins [7].

Cytokines key regulators of inflammatory and immune responses are also involved in the pathogenesis of RHS. Proinflammatory cytokines, such as interleukin-6 (IL-6), promote local inflammation and epithelial damage, whereas anti-inflammatory cytokines, including interleukin-10 (IL-10), regulate immune responses and limit tissue injury [8]. Previous studies have demonstrated cytokine imbalance in children with RHS, characterized by elevated IL-6 levels and insufficient compensatory IL-10 secretion, resulting in prolonged inflammation and delayed healing of lesions [9].

Of particular clinical relevance is the coexistence of RHS with allergic diseases, the prevalence of which has been steadily increasing among the pediatric population. The prevalence of allergic conditions including bronchial asthma, atopic dermatitis, and allergic rhinitis has risen significantly over the past two decades, affecting up to 30% of children in developed countries [10]. It has been hypothesized that allergic inflammation further disrupts mucosal immunity and alters salivary immunoglobulin and cytokine profiles, thereby increasing the severity and frequency of RHS episodes [11].

Despite numerous studies, the relationship between humoral and cytokine immunity in the saliva of children with recurrent herpetic stomatitis especially in the presence of allergic diseases remains insufficiently explored. A detailed investigation of these immunological parameters may provide new insights into the mechanisms underlying disease chronicity and contribute to the development of personalized therapeutic and preventive strategies for affected children [12,13].

Recurrent herpetic stomatitis is an infectious disease predominantly caused by herpes simplex virus type 1 (HSV-1) of the *Herpesviridae* family. The disease is characterized by ulcerative lesions of the oral mucosa accompanied by regional lymphadenitis. Globally, up to 80% of infectious stomatitis cases are attributed to HSV-1, and among children particularly those aged 1–7 years the prevalence reaches approximately 70%, while it is significantly lower in adolescents and adults. This high prevalence in early childhood is associated with the immaturity of local mucosal immunity and increased exposure to environmental pathogens.

Although the pathogenesis of RHS has been extensively studied, quantitative alterations in local humoral immune factors especially in the presence of concomitant allergic diseases remain inadequately characterized. Understanding these changes is crucial, as the immune system in early childhood is still developing, and maternally derived antibodies largely disappear by the age of three, rendering children more susceptible to recurrent infections.

Cytokine-mediated immune regulation plays a pivotal role in both viral infection control and allergic inflammation. Interleukin-6 (IL-6) acts as a proinflammatory mediator, stimulating acute-phase protein synthesis and leukocyte activation, whereas interleukin-10 (IL-10) functions as an anti-inflammatory cytokine by suppressing excessive immune responses while simultaneously enhancing antibody production. Assessing the balance between these cytokines in

conjunction with immunoglobulin profiles allows for a deeper understanding of the immunopathogenesis of RHS and the mechanisms underlying its exacerbation in allergic comorbidity.

The aim of this study was to perform a comparative assessment of salivary levels of secretory immunoglobulin A (sIgA), lysozyme, total immunoglobulins (IgA, IgM, IgG, IgE), and cytokines (IL-6, IL-10) in children with isolated recurrent herpetic stomatitis and in those with RHS combined with allergic diseases.

Materials and Methods

The study was conducted on 120 children aged 1–7 years. The study population was divided into three groups, each comprising 40 participants:
(1) healthy children without recurrent herpetic stomatitis (RHS) or allergic diseases (control group);
(2) children diagnosed with RHS without allergic comorbidities (comparison group);
(3) children diagnosed with RHS in combination with allergic diseases (main group).

All participants were recruited from pediatric outpatient clinics. Written informed consent was obtained from parents or legal guardians prior to enrollment.

Saliva samples were collected in the morning, at least two hours after food or fluid intake, using a standardized non-invasive procedure. Unstimulated whole saliva was collected into sterile tubes under the supervision of trained personnel. The samples were immediately frozen and stored at −20 °C until analysis.

Immunological analyses were performed in certified laboratories. Local immune factors, including secretory immunoglobulin A (sIgA) and lysozyme, were determined using standard enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits. Humoral immunity was assessed by measuring salivary concentrations of total IgA, IgM, IgG, and IgE. In addition, cytokine status was evaluated by determining levels of IL-6 (proinflammatory cytokine) and IL-10 (anti-inflammatory cytokine) using high-sensitivity ELISA kits. All measurements were performed in triplicate, and mean values were calculated.

Statistical analysis was carried out using SPSS software. Results are presented as mean ± standard deviation (SD). Intergroup comparisons were performed using Student's *t*-test. Differences were considered statistically significant at $p < 0.05$.

Changes in Nonspecific Local Immune Factors

Table 1 presents the concentrations of sIgA and lysozyme in saliva. Healthy children exhibited high baseline levels of both parameters, whereas children with RHS demonstrated a pronounced decrease. The most substantial reduction was observed in children with RHS combined with allergic pathology.

Table 1. Salivary concentrations of secretory IgA and lysozyme in children with recurrent herpetic stomatitis.

Group	sIgA (μg/mL)	Lysozyme (μg/mL)
Healthy controls	207.17 ± 9.31	159.76 ± 7.40
RHS without allergy	105.76 ± 3.66*	98.18 ± 4.78*
RHS with allergy	90.57 ± 4.89*†	76.71 ± 2.59*†

Data are presented as mean ± standard deviation (SD).

- **p < 0.001 vs. healthy controls.**

† p < 0.05 vs. RHS without allergy.

The concentration of sIgA in healthy children was 207.17 μg/mL, whereas in children with RHS it decreased to 105.76 μg/mL and further declined to 90.57 μg/mL in those with concomitant allergic diseases. A similar trend was observed for lysozyme, with levels decreasing from 159.76 μg/mL in the control group to 98.18 μg/mL in the comparison group and to 76.71 μg/mL in the main group. These changes indicate a pronounced impairment of mucosal immunity.

Discussion

The obtained results demonstrate that children with recurrent herpetic stomatitis exhibit significant alterations in both local and systemic humoral immunity. The marked reduction in sIgA and lysozyme levels confirms impairment of the first line of mucosal defense, predisposing patients to recurrent infections. These changes were more pronounced in children with concomitant allergic diseases, indicating a synergistic negative effect of allergic inflammation on oral mucosal immunity.

Regarding immunoglobulin profiles, children in the main group showed a pronounced deficiency of IgA accompanied by elevated IgM levels, suggesting an impaired or incomplete immunoglobulin class-switching process. The absence of a significant increase in IgG levels in this group—contrary to the sharp elevation observed in the comparison group—indicates insufficiency of the secondary immune response in the presence of allergic pathology.

Cytokine data further support the presence of an enhanced inflammatory state, with particularly high IL-6 levels detected in children from the main group. This finding suggests that allergic inflammation amplifies the inflammatory cascade triggered by HSV-1 infection. Although IL-10 levels were also increased, likely as a compensatory anti-inflammatory mechanism, this increase was insufficient to counterbalance the predominant proinflammatory response.

Overall, the observed immune dysregulation in children with RHS combined with allergic diseases reflects a complex interaction between viral persistence, impaired mucosal immunity, and chronic allergic inflammation. These findings have important clinical implications, highlighting the need for combined antiviral and immunomodulatory treatment strategies, particularly in pediatric patients with allergic comorbidities.

Results

Analysis of salivary immune parameters revealed significant differences between healthy children and those with RHS. These differences were more pronounced in patients with concomitant allergic diseases. The overall trend was characterized by a marked reduction in local protective factors (sIgA and lysozyme), alterations in immunoglobulin balance, and increased cytokine levels, particularly the proinflammatory cytokine IL-6.

Conclusion

Children with recurrent herpetic stomatitis demonstrate significant impairments of local immunity, particularly reflected by reduced levels of sIgA and lysozyme, with these disturbances being more pronounced in the presence of allergic diseases. In such cases, humoral immunity is characterized by decreased IgA levels, compensatory overproduction of IgM, and persistently elevated IgE concentrations. The cytokine profile reveals predominance of IL-6–mediated inflammation, only partially compensated by IL-10.

These findings emphasize the importance of assessing local immune parameters and cytokine status to guide targeted therapeutic approaches in children with recurrent herpetic stomatitis.

References

1. Looker KJ, et al. Global estimates of prevalent and incident herpes simplex virus type 1 infections in 2012. *PLoS One*. 2015.
2. Arduino PG, Porter SR. Herpes simplex virus type 1 infection: Overview on relevant clinico-pathological features. *J Oral Pathol Med*. 2008.
3. Xu F, et al. Seroprevalence of HSV-1 and HSV-2 in children and adolescents. *J Infect Dis*. 2006.
4. Kameyama T, et al. Recurrent herpetic stomatitis in children: clinical and immunological aspects. *Pediatr Infect Dis J*. 2012.
5. Brandtzaeg P. Role of secretory immunity in the oral cavity. *Acta Odontol Scand*. 2001.
6. Mestecky J, et al. Mucosal immunology of the oral cavity: protection against pathogens. Springer; 2015.
7. Malamud D, et al. Salivary defense mechanisms and recurrent oral infections. *Oral Dis*. 2000.
8. Dinarello CA. Role of cytokines in inflammatory processes. *Blood*. 1996.
9. Mikhailova IN, et al. Cytokine profiles in children with recurrent herpetic stomatitis. *Russ J Immunol*. 2017.
10. Pawankar R, et al. Allergic diseases and asthma: a global public health concern. *World Allergy Organ J*. 2013.
11. Cingi C, et al. Interaction between allergy and viral infections in children. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol*. 2015.

Safarov I.B.
o'qituvchisi
Qarshi davlat universiteti
Norqulova S.I.
talaba
Qarshi davlat universiteti
O'zbekiston

DEHQONOBOD TUMANIDA EKOTURIZMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Dehqonobod tumanida ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari, hududning tabiiy-geografik sharoiti, rekreatsion resurslari hamda turizm salohiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, hududdagi tog'li landshaftlar, biologik xilma-xillik, tabiiy yodgorliklar va ekologik muhitning ekoturizmni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Ekoturizmni rivojlantirish orqali mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ekologik muhofazani kuchaytirish va hududning turistik jozibadorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *Ekoturizm, Dehqonobod tumani, barqaror rivojlanish, rekreatsion resurslar, tabiiy landshaft, ekologik turizm, biologik xilma-xillik, turizm infratuzilmasi, ekologik marshrutlar, mahalliy iqtisodiyot, turistik salohiyat.*

Safarov I.B.
teacher
Karshi State University
Norqulova S.I.
student
Karshi State University
Uzbekistan

PROSPECTS FOR DEVELOPING ECOTOURISM IN DEKHANABAD DISTRICT

Abstract: *This article analyzes the prospects for the development of ecotourism in Dehqanabad district, the natural and geographical conditions of the region, recreational resources and tourism potential. It also highlights the importance of the mountainous landscapes, biodiversity, natural monuments and ecological environment in the development of ecotourism. The issues of diversifying the local economy, creating new jobs, strengthening environmental protection and increasing the tourist attractiveness of the region through the development of ecotourism are considered.*

Keywords: *Ecotourism, Dehqanabad district, sustainable development, recreational resources, natural landscape, ecological tourism, biodiversity, tourism infrastructure, ecological routes, local economy, tourist potential.*

Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumani 1926 yili 29 sentabrida tashkil etilgan va 1962 yil G'uzor bilan birlashib 1971 yil qayta tuzilgan. Maydoni 4.0 ming km.kv va aholisi 162.7 ming kishini tashkil etadi. Markazi Qorashina shaharchasi. Dehqonobod tumani o'zining betakror tabiati va baland tog'lari va o'ziga xos iqlimga ega hudud. Dehqonobod tumani Hisor tog' tizmalarining janubiy g'arbiy qismida joylashgani uchun tog' landshaftlari bilan mashhur. Bu hududda piyoda sayohat uchun ideal sharoitga ega. Dehqonobodda ko'plab o'rganilmagan karst g'orlar mavjud. Dunyodagi eng chuqur g'orlardan biri bo'lgan Boybuloq g'ori ham shu hududlarga yaqin joylashgan. Tumandagi mineral suvlar va toza buloqlari sog'lomlashtirish turizmini rivojlantirishga asos bo'ladi. Bu yerda O'zbekiston "Qizil kitobi"ga kirilgan noyob hayvonlar va dorivor o'simliklar uchraydi. Dehqonobod tumanining tabiiy geografik sharoiti o'ziga xosligi iqlimning keskinligi va tog'li landshaftlari bilan boshqa hududlardan ajralib turadi.

Ekoturizm — bu tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat qilishni nazarda tutuvchi turizm yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy maqsadi tabiatni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni asrash hamda mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shishdan iboratdir. Ekoturizm an'anaviy ommaviy turizm turlaridan farqli ravishda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va inson hamda tabiat o‘rtasidagi muvozanatni saqlash tamoyillariga asoslanadi.

Ilmiy adabiyotlarda ekoturizm atamasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab keng qo‘llanila boshlagan bo‘lib, uning shakllanishiga ekologik muammolar kuchayishi, tabiiy resurslarning kamayishi hamda barqaror rivojlanish konsepsiyasining paydo bo‘lishi sabab bo‘lgan. Ekoturizm nafaqat dam olish yoki sayohat qilishni, balki tabiatni o‘rganish, ekologik madaniyatni oshirish, mahalliy madaniy merosni qadrlash va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ma'rifiy faoliyatni ham o‘z ichiga oladi.

Ekoturizmning asosiy xususiyatlaridan biri — turizm faoliyatining tabiatga salbiy ta'sirini minimal darajaga tushirishdir. Bu jarayonda kichik guruhli sayohatlar, ekologik toza transport vositalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy landshaftlarning buzilishini oldini olish kabi choralar muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, ekoturizm mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olgan holda rivojlantiriladi, ya'ni mahalliy aholining turizm xizmatlariga jalb etilishi orqali daromad manbalari kengaytiriladi va hududiy iqtisodiy rivojlanishga turtki beriladi.

Geografiya va turizmshunoslik fanlari nuqtai nazaridan ekoturizm tabiiy landshaftlar, qo‘riqlanadigan hududlar, milliy bog‘lar, tog‘li hududlar, cho‘l va o‘rmon ekotizimlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ekoturizm tabiiy resurslardan barqaror foydalanishni ta'minlash orqali ekologik muvozanatni saqlashga xizmat

qiladi. Bundan tashqari, ekologik ta’lim va tarbiya berishda, jamiyatda ekologik ongni shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi.

Hozirgi kunda ekoturizm global turizm industriyasining eng tez rivojlanayotgan yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ko‘plab davlatlar ekologik turizmni rivojlantirish orqali tabiatni muhofaza qilish bilan bir qatorda iqtisodiy foyda olishni maqsad qilgan. Shu sababli ekoturizmni ilmiy asosda rejalashtirish, hududiy resurslarni baholash, ekologik monitoring olib borish va barqaror boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Biologik xilma-xillikka kelsak juda boy va o’ziga xosdir. Bu hudud Hisor tizmasi tarmoqlarida joylashganligi tufayli bu yerda ham cho’l ham adir ham baland ekotizmalari tutashgan. Tuman florasi 4000 dan ortiq o’simlik turini o’z ichiga egallaydi. Hududning balandlik mintaqalanishi o’simlikning turli tumanligini taminlaydi. Tog’larning asosiy boyligi ko’p asrlik archazorlaridir. Bazi archalarining yoshi 500-1000 yildan oshadi. Hududning yovvoyi tabiat hayvonlarning ko’plab noyob turlari uchun xavfsiz makondir. Tuman hududi biologik xilma xillik bo’yicha 3 ta zonaga bo’linadi bular adir, tog’ va yuqori tog’ tizmasidir. Muhofaza etiladigan hududlar tumanning bir qismi Hisor davlat qo’riqxonasiga tutashgan.

Tog’ daryolari million yillar davomida chuqur daralarni hosil qilgan. Xo’ja Pok ziyoratgohi Xo’jaipok qishlog’i Qo’rg’ontepa mahallasi va Turmaniston Respublikasi bilan chegaradosh hududda joylashgan. Xalq orasida arab istilosidan keyin X-XI asrlarda islom dinini targ’ib qilish uchun yer xo’jalardan biri bo’lgan Xo’jaipok ota nomi bilan bog’liq ramziy ziyoratgoh joylashgan. Bu hududdagi suvning tarkibi o’rganilib mineral moddalarning borligi va ko’plab xastaliklarga davo bo’lishi aniqlangan.

XO‘JAIPOK OTA ZIYORATGOHI (Dehqonobod tumani)



Xo’jai pok suvi shamollash bilan bog’liq kasalliklar, bod kasalligi, poleartrit, turli bilan bog’liq kasallik, asab tizimi, umurtqa kasalliklari va boshqa kasallikka davo bo’lganligi sababligi turistlar oqimi to’xtamaydi. Kamol buloq bu To’dachorboq qishlog’idagi shifobaxsh turistik manbadir. Xalq orasida o’zining shifobaxsh suvi bilan mashhur bo’lib, dam olish maskani hisoblanadi. Suv nihoyatda aniq, salqin va istemol uchun yaroqli tabiiy filtirlangan. Xalq tabobatida buloq suvi teri kasalligi, oshqozon ichak faoliyatini yaxshilash va buyrakdagi muammolarni bartaraf etishda foydali. So’nggi yillarda hududning turistik salohiyatini oshirish uchun ushbu maskanlar ilmiy tadqiqotlar va mahalliy sayyohlik marshuritlariga kiritilmoqda.

Konsoy qishlog’idagi Sho’rko’l hududning o’ziga xos tabiiy-shifobaxsh maskanlardan biri. Sho’rko’l nomi bejiz qo’yilmagan – bu yerning tuprog’i va suvi o’ta darajada sho’r. Bu joy tabiatan berk botiqlik bo’lib, u yerda yer osti suvlari yuzaga yaqin joylashgan yoki mavsumiy yog’ingarchilik suvlari to’planib qoladi. Qirg’oqlari va suvi qurigan qismida oppoq tuz qoplami to’planib qoladi. Mahalliy aholi orasida bu kabi sho’r joylarning shifobaxsh xususiyati bo’g’im og’riqlariga davo. Bu yerda eng ko’p qo’llaniladigan usul-issiq suvga ko’milishdir. Bu orqali revma, artrit va bo’g’imlarga tuz yig’ilishini davolashda yordam beradi. Issiqlik va tuz birgalikda yallig’lantirishni kamaytiradi va qon aylantirishini yaxshilaydi. Yana xususiyatlaridan biri sho’r suv o’lik hujayralarni tozalaydi va terini minerallar bilan boyitadi. Shu jihatlari bilan turistlarni o’ziga jalb qiladi. Dehqonobod tumani nafaqat o’zining tabiat va sanoat, balki qadimiy ziyoratgohlari va muqaddas qadamjolari bilan mashhur. Sarg’ay ota va Dul dul ota ziyoratgohlari tumanning eng tabarruk va sirli maskanlaridan birdir. Sarg’ay ota ziyoratgohi Dehqonobodning eng go’zal va so’lim go’shalaridan biri bo’lgan. Bibishirin yoki Sarchashma qishloqlari yaqinida joylashgan. Bu joy o’zining noyob g’ori va undan chiqib turadigan shifobaxsh buloq suvi bilan mashhur. Ziyoratgoh atrofidagi qizil qoyalar va yashillik uyg’unligi kishiga o’zgacha zavq beradi. Mahalliy aholi Sarg’ay ota bulog’i suvi ko’z kasalliklari va ichki azolar uchun shifobaxsh ekanligiga ishonishadi. Ziyoratchilar bu yerga kelib, buloq suvidan ichishadi va g’ori ichidagi muqaddas joylarni ziyorat qilishadi. Hozirda bu joy ham ziyoratgoh, ham ekoturizm maskani sifatida rivojlanmoqda.

Dul dul ota nomi O’rta Osiyoning ko’plab joylarida uchraydi asosan islom tarixida Hazrat Aliga nisbatan berilgan. Mahalliy afsonaga ko’ra otning tuyoq izlari qolgan deyiladi. Ziyoratchilar aynan toshdagi izlarni ko’rish va niyat qilish uchun tashrif buyuradi. Atrofi qizil tusli tuproq qoyalar bor. Tumanni ekoturizmini rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlar asosan qishloqlarda mehmon uylari tashkil qilish orqali mahalliy aholi bandligini oshirish va barqaror daromad manbaini yaratishga imkon beradi. Keyin dengiz sathidan 1500 metrgacha balandlikda joylashgan hududlar sport turizmi uchun juda qulay hisoblanadi.

Hududning boy hayvonot va o’simlik dunyosi, xususan, dorivor o’simlik va noyob fauna turlari tabiat shinavandalari uchun ilmiy ekologik salohiyatlar uyushtirishga zamin yaratadi. Muammolari esa tog’li hududagi yo’llarning nosozligi, internet va mobil aloqa qamrovining pastligidir. Sayyohlar ko’plab tashrif

buyuradigan joylarda chiqindini boshqarish tizimini yo'lga qo'yilmaganligidir. Shu tufayli chiqindilarni qayta ishlashning mobil punktlarini tashkil etish va tabiatga zarar yetkazmaslik uchun qayta jarimalarni tashkil etish kerak. Masalan tandir go'sht tayyorlash jarayoni yoki qo'y qirqish kabi jarayonlarni master klass sifatida namoyish etish. Mahalliy yoshlar gid bo'lishi masalan Dul dul ota kabi joylarning tarixini so'zlab berish orqali xizmat haqi oladi. Tumanning dorivor giyohlari, tog' asali, anorlarini va boshqa mahsulotni qadoqlab sotishni yo'lga quyish kerak.

Xo'jai Pok ota karst bulog'i, Kamol buloq va Kichik Ura daryolari qirg'oqlarida rekreatsion zonalarni tashkil etish imkoniyati mavjud. Qizilcha va Dul dul ota ziyoratgohini atrofini tabiiy lanshaftini saqlab qolgan holda, hududni „Eko-ziyorat" markaziga aylantirish mumkin. Tumandagi bo'sh turgan obyektlarni turistik maqsadlarda tadbirkorlarga berish va yo'llarni tamirlash ishlari turizm oqimini oshirishga xizmat qiladi. Turizm qishloqlarida yashovchi aholi uchun maxsus o'quv kurslar tashkil etib, ularga servis va ekologik xavfsizlik qoidalarini qoidalarini o'rgatish kerak. Biz bu ishlardan asosiy maqsad tumanimizni tabiatini maqtanish, mahalliy aholi daromadini oshirish va rivojlantirishdir.

Xulosa: Dehqonobod tumani tabiiy-geografik sharoiti, tog'li hududlari, noyob landshaftlari, biologik xilma-xilligi hamda ekologik toza muhitga egaligi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Hududda mavjud tabiiy resurslar, rekreatsion imkoniyatlar va milliy-madaniy meros obyektlari ekologik turizm yo'nalishlarini tashkil etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Ekoturizmni rivojlantirish orqali hududning turistik jozibadorligini oshirish, mahalliy aholi bandligini ta'minlash, iqtisodiy faollikni kuchaytirish va ekologik muhofaza tadbirlarini samarali amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Shu bilan birga, ekoturizmni rivojlantirish jarayonida infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, ekologik marshrutlarning tizimli tashkil etilmaganligi, reklama va marketing faoliyatining sustligi hamda malakali mutaxassislar yetishmasligi kabi muammolar ham kuzatiladi. Mazkur omillarni hisobga olgan holda, ekoturizmni barqaror rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan strategiyalarni ishlab chiqish va kompleks yondashuvni qo'llash zarur hisoblanadi.

Taklif va tavsiyalar

1. Dehqonobod tumanining tabiiy rekreatsion resurslarini kompleks inventarizatsiya qilish hamda ekoturistik salohiyatini ilmiy asosda baholash.
2. Ekologik yo'nalishdagi turistik marshrutlar (tog' sayohatlari, trekking, agroekoturizm, etnoturizm)ni ishlab chiqish va ularni xaritalashtirish.
3. Ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish, jumladan ekologik mehmon uylari, dam olish maskanlari va ekologik axborot markazlarini tashkil etish.
4. Mahalliy aholini ekoturizm faoliyatiga jalb qilish, ularga xizmat ko'rsatish, gidlik va ekologik madaniyat bo'yicha treninglar tashkil etish.
5. Hududning turistik brendini shakllantirish hamda zamonaviy marketing vositalari orqali targ'ibot ishlarini kuchaytirish.
6. Tabiiy hududlarda ekologik monitoringni yo'lga qo'yish va turizm faoliyatining atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtirish.

7. Davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish orqali investitsiyalarni jalb qilish va innovatsion turizm loyihalarini qo‘llab-quvvatlash.

8. Ekoturizmni barqaror rivojlantirishda ilmiy-tadqiqot muassasalari va oliy ta’lim tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Qurbonov P. R., Safarov I. B. Ziyorat turizmining iqtisodiy geografik jihatlari //Экономика и социум. – 2025. – №. 3-1 (130). – С. 357-362.
2. Usmanova R., Safarov I. O‘zbekistonda turizmni shakllantirishning geografik jihatlari //yangi O‘zbekistonda milliy turizm istiqbollari. – 2024. – Т. 1. – №. 01.
3. Жумаев Х. Х. Перспективы развития сафари-туризма в Западном туристическом районе (на примере Кашкадарьинской области) //Экономика и социум. – 2023. – №. 3-2 (106). – С. 494-497.
4. Safarov I. B. et al. Ziyorat turizmini rivojlantirishda gat texnologiyalarining o'rni //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 502-505.
5. Qurbonov P. R., Qo’ldosheva G. M. Ecological-geographical problems in the residential areas of kashkadarya region //Экономика и социум. – 2025. – №. 5-1 (132). – С. 617-619.
6. Omonullayev O. H. Qashqadaryo viloyatida erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini takomillashtirishning hududiy jihatlari //Экономика и социум. – 2025. – №. 6-2 (133). – С. 653-658.
7. Safarov I. B., Abdishukurova M. A. Ziyorat turizmining geografik jihatlari //Tadqiqotlar. – 2025. – Т. 64. – №. 4. – С. 215-219.
8. Nazarov M. G., Bozorov M. I., Zokirova O. Z. Qashqadaryo viloyatida joylashgan buloqlarning shakllanishi hamda ularning mihofaza qilish masalalari //Экономика и социум. – 2025. – №. 3-1 (130). – С. 277-282.

Saidova G.E.
dotsent
Buxoro davlat pedagogika instituti
Zayniddinova I.I.
1-kurs magistranti
Buxoro davlat pedagogika instituti

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDA INTEGRATSIYALASHTIRILGAN TA'LIM

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xalqaro baholash dasturlari asosida integratsiyalashgan ta`limni tashkil etish masalalari muhokama etiladi. Bunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda xalqaro baholash dasturlaridan foydalanish imkoniyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *jahon ta'limi, integratsiya, PIRLS xalqaro baholash dasturi, xalqaro baholash dasturlari, kompetensiya, sinov topshiriqlar, ta'lim sifati, PIRLS, TIMSS.*

Saidova G.E.
associate professor
Bukhara State Pedagogical Institute
Zainiddinova I.I.
first-year master's student
Bukhara State Pedagogical Institute

INTEGRATED EDUCATION IN INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS IN PRIMARY EDUCATION

Abstract: *This article examines the organization of integrated education based on international assessment programs. The potential for using international assessment programs to enhance the methodological training of future primary school teachers is emphasized.*

Key words: *global education, integration, PIRLS international assessment program, international assessment programs, competencies, test tasks, education quality, PIRLS, TIMSS.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 5712-son Farmonida 2030-yilga kelib xalqaro baholash reytingida jahonning 18 birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi

fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo‘naltirilgan ta’lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Hozirgi rivojlanayotgan zamonda davlatlar ta’lim sohasidagi o‘zgarish va o‘sishlarni tahlil qilish va solishtirish hamda ta’limda integratsiyalashuvni amalga oshirish davlatlararo ta’limdagi islohotlarni yaratishga imkoniyatlarni kengaytiradi. Ushbu dolzarblikni inobatga olgan holda O‘zbekiston ta’limining jahon ta’limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo‘llashning ahamiyati o‘ziga xos bo‘lib, bunda asosiy e’tibor Milliy dasturdan kelib chiqqan holda jahon standartlari darajasiga tenglashish muammosiga urg‘u berilganligidir. O‘zbekiston ta’limi sifatini oshirish va jahon ta’limi bilan integratsiyalashgan holda Xalqaro baholash dasturlarini o‘quv jarayonida qo‘llash davlat siyosati darajasidagi muhim muammo hisoblanadi.

Shuningdek, konsepsiya doirasida o‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish kompetensiyalari va malakalarining rivojlanishiga alohida urg‘u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta’lim dasturlari va yangi davlat ta’lim standartlarini joriy etish, o‘quvchilarning bilim darajasini baholashda xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. – PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) – boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash; – TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – 4- va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash; PIRLS – boshlang‘ich 4-sinf o‘quvchilarining matnni o‘qish va tushunish darajasini baholash ta’rifiga ko‘ra, o‘qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma’no hosil qila olish qobiliyatidir

Integratsiya (lot. integratio — tiklash, to‘ldirish, integer — butun) fanlarning yaqinlashishi va o‘zaro aloqa jarayoni, ikki va undan ortiq davlatlarning yo‘nalishlar bo‘yicha tegishli muammolarni sifatli va natijadorligini ta’minlagan holda hal qilishda o‘zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish degan ma’noni bildiradi. Xalqaro baholash tizimiga o‘tishning ayni vaqtda dolzarbligi va har sohada rivojlanayotgan O‘zbekiston Respublikasida xalq ta’limi tizimining o‘sishiga ta’sirini kuchaytirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kiritilgan, “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF- 4947-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi 140-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5712- son Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4306-son Qarorlari tasdiqlanib, ijroga yo‘naltirilgan.

TIMSS bu — “Trends in International Mathematics and Science Study”, ya’ni 4- va 8- sinf o‘quvchilarining matematik va tabiiy-ilmiy yo‘nalishlar bo‘yicha ta’limdagi natijalarini xalqaro miqyosda baholaydigan tadqiqotdir.

TIMSS xalqaro tadqiqot vositalari to‘plamiga quyidagilar kiradi: kognitiv va ma’lumotlar sohasiga tegishli testlar; anketalar (o‘quvchilar, o‘qituvchilar, ta’lim muassasasi ma’muriyati, ta’lim sohasidagi mutaxassislar (tadqiqot sifatini kuzatuvchilar uchun); uslubiy ta’minot (o‘rganishni tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha milliy koordinatorlar uchun yo‘riqnoma, namuna olish bo‘yicha qo‘llanma, maktab koordinatorlari uchun qo‘llanma, test o‘tkazish bo‘yicha qo‘llanma, bepul javoblar bilan topshiriqlarni tekshirish bo‘yicha qo‘llanma, ma’lumotlarni kiritish bo‘yicha qo‘llanma va boshqalar); - dasturiy ta’minot (sinflar va o‘quvchilarni tanlash uchun, ma’lumotlarni kiritish uchun).

Butun jahonda eng mashhur xalqaro ta’lim tadqiqotlarining asosi o‘qish savodxonligi bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim bitiruvchilarining jahon standartlariga mosligini aniqlash, PIRLS xalqaro monitoringida aynan o‘qish savodxonligi kichik yoshdan o‘quvchilarning o‘zlashtirganlik darajasini baholab boradi. Adabiy va axborot matnlarida to‘liq material taqdim etilib, so‘ngra qiyinlik darajasiga qarab topshiriqlar berib boriladi, jarayonda berilgan materiallarni o‘quvchi nafaqat yuzaki o‘qishi, balki, uni o‘qib, mushohadali (kreativ) fikrlashi zarurligi talab etiladi. Bunda o‘qituvchi mahoratidan kelib chiqib, o‘quvchiga aynan matndagi obrazlar o‘rniga o‘zini qo‘yib ko‘rishi, hayotda bunga o‘xshash voqealar qaerlarda sodir bo‘lishi mumkinligini faraz qilishi, shunday vaziyatda nima qilish zarurligi va hattoki, asar muallifi o‘rnida bo‘lganda asarni qanday nomlashi yoki matnni qanday tugatishi mumkinligi bo‘yicha xulosa chiqarishga undaydigan turli topshiriqlar beriladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, O‘zbekiston ta’limining jahon ta’limi bilan integratsiyalashuvida xalqaro baholash dasturlarini qo‘llashning nazariy va amaliy asoslari tayangan holda boshlang‘ich sinf bitiruvchilari orasida o‘tkazilayotgan Xalqaro baholash dasturlaridan biri Xalqaro Ta’lim Tadqiqoti Assosatsiyasi (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tomonidan o‘tkaziladigan PIRLS xalqaro baholash dasturi qo‘llash va samarali natijalar olish milliy mentalitetni hisobga olgan holda amaliy mexanizmlarini ishlab chiqilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tomonidan matnni o‘qish va tushunishni, shuningdek, milliy ta’lim tizimidagi farqlar borasida tahliliy natijalarga asoslangan PIRLS dasturlari doirasida 8 nomdagi o‘quvchi bilan ishlashga mo‘ljallangan maqsadli mashqlar ishlab chiqildi va o‘qituvchilarga tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi “Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3931-sonli Qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli Farmoni
6. Altinok N., Diebolt C., Demeulemeester JL, Ta'lim bo'yicha yangi xalqaro ma'lumotlar bazasi. Sifat: 1965-2018 , 2013, 14-noyabr.

UDC: 618.2-008.331.1:616-053.31

Salimova T.B.
assistant
department of obstetrics and gynecology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.
https://orcid.org/0000-0002-7949-9574

OUTCOMES OF PREGNANT WOMEN WITH DIFFERENT TYPES OF HYPERTENSION

Abstract. *Arterial hypertension is the most common somatic disorder during pregnancy, complicating 5–10% of all pregnancies. Hypertensive disorders of pregnancy (HDP) pose a serious risk to maternal and fetal health. Chronic arterial hypertension is defined as elevated blood pressure that existed prior to pregnancy. Gestational hypertension is characterized by elevated blood pressure after 20 weeks of gestation (commonly after 37 weeks) and usually normalizes within 6 weeks postpartum.It should be noted that, despite unified principles for the management of HDP worldwide, disproportionately high rates of adverse pregnancy outcomes in resource-limited settings are primarily due to difficulties in organizing healthcare and its quality under these conditions.*

Objective: *The aim of this study was to determine adverse perinatal and neonatal outcomes in pregnant women with hypertensive disorders of pregnancy.*

Methods: *An analytical cross-sectional study was conducted among women hospitalized with hypertensive disorders of pregnancy at the Bukhara City Maternity Complex from August 2022 to August 2025. Variables associated with adverse maternal and perinatal outcomes were compared using multivariable binomial regression analysis.*

Results: *Among 400 pregnant women, 2%, 35%, 14%, and 49% had eclampsia, preeclampsia, chronic arterial hypertension, and gestational hypertension, respectively. Women with preeclampsia/eclampsia had a significantly higher risk of cesarean section (79.4% vs. 65%; adjusted relative risk (RR) = 2.139; 95% CI: 1.386–3.302; p=0.001) and preterm birth before 34 weeks of gestation (20.5% vs. 6%; adjusted RR = 2.5; 95% CI: 1.19–5.25; p=0.01) compared to women with chronic/gestational hypertension. Risks of prolonged maternal hospitalization (43.9% vs. 27.1%), neonatal intensive care unit (NICU) admission (30.7% vs. 19.8%), and perinatal mortality (23.5% vs. 11.2%) were also higher among women with preeclampsia/eclampsia. All fetal biometric parameters in women with preeclampsia/eclampsia were lower compared to fetuses of women with chronic hypertension. All types of hypertensive disorders were associated with a significantly increased risk of neonatal complications such as sepsis, low birth weight, respiratory distress syndrome (RDS), and preterm birth, except for gestational hypertension, where the elevated risk was observed only for RDS (but not for sepsis or low birth weight).*

Conclusions: *Women with preeclampsia/eclampsia have higher risks of adverse maternal, perinatal, and neonatal outcomes compared to women with chronic or gestational hypertension. Our findings indicate the need for strategies for the prevention and management of hypertensive disorders during pregnancy to improve pregnancy outcomes.*

Keywords: *Arterial hypertension, Preeclampsia, Eclampsia, Neonatal outcomes*

Introduction: Arterial hypertension is the most common somatic disorder during pregnancy, complicating 5–10% of all pregnancies. Hypertensive disorders of pregnancy (HDP) pose a serious risk to maternal and fetal health [3,14] Chronic arterial hypertension is defined as elevated blood pressure that existed prior to pregnancy. Gestational hypertension is characterized by elevated blood pressure after 20 weeks of gestation (commonly after 37 weeks) and usually normalizes within 6 weeks postpartum.

Preeclampsia is defined as the detection of hypertension in a previously normotensive pregnant woman after 20 weeks of gestation, with or without proteinuria. In the absence of proteinuria, preeclampsia is accompanied by systemic or target organ dysfunction, such as thrombocytopenia, liver involvement with or without pain in the right upper quadrant or epigastrium, renal failure, pulmonary edema, and neurological complications, including altered consciousness, blindness, stroke, clonus, severe headache, or persistent visual scotomas [15].

Eclampsia is defined as the occurrence of generalized tonic-clonic seizures or coma (eclampsia without seizures) in a woman with preeclampsia and represents a severe complication of the disorder [1,2]. HELLP syndrome is a form of preeclampsia characterized by endothelial dysfunction with activation of coagulation and liver dysfunction, detectable by laboratory testing. Clinically, HELLP syndrome may occur with normal blood pressure and without proteinuria. The acronym HELLP stands for Hemolysis (H), Elevated Liver Enzymes (EL), and Low Platelets (LP). HELLP syndrome develops in 10–20% of pregnant women with preeclampsia or severe eclampsia [7,10].

Almost all maternal deaths due to hypertensive syndromes occur in developing countries. According to one study, in more developed regions the prevalence of eclampsia is approximately 0.2% with a maternal mortality rate of 0.8%, while in less advantaged regions the prevalence reaches 8.1% with a maternal mortality rate of 22.0%. Therefore, hypertensive disorders of pregnancy are of significant scientific interest due to their frequency and serious maternal-fetal consequences [4].

It should be noted that, despite unified principles for the management of HDP worldwide, disproportionately high rates of adverse pregnancy outcomes in resource-limited settings are primarily due to difficulties in organizing healthcare and its quality under these conditions [9].

Thus, even within a single country, pregnancy outcomes may vary due to socio-cultural factors and variability in the distribution and quality of medical care.

Therefore, the objective of this study was to identify adverse maternal and perinatal outcomes in women admitted with hypertensive disorders of pregnancy and to directly compare outcomes between women with preeclampsia/eclampsia and those with chronic or gestational hypertension [14,17].

Materials and Methods

The study was conducted from August 2022 to August 2025 at the Bukhara City Maternity Complex. The study population included pregnant women aged over 18 years, with a gestational age of at least 20 weeks, who were admitted to the emergency department with a diagnosis of hypertensive disorders of pregnancy. Women with other concomitant diseases, smokers, and those using narcotic substances were excluded from the study.

Data analysis was performed using Stata software, version 11.0. Categorical variables were compared using the chi-square (χ^2) test or Fisher's exact test, as appropriate, while continuous variables were analyzed using Student's t-test. Risk factors associated with adverse maternal and perinatal outcomes were assessed using binomial regression with a logarithmic link function to calculate unadjusted and adjusted relative risks (RRs) with 95% confidence intervals (CIs). Variables included in the regression models were selected based on biological plausibility, published literature, and results of univariate analyses. Unadjusted and adjusted RRs were calculated to directly compare outcomes between women with preeclampsia/eclampsia and those with chronic or gestational hypertension. A p-value <0.05 was considered statistically significant.

Results

A total of 400 pregnant women with hypertensive disorders of pregnancy were included in the study: 286 with arterial hypertension and 114 with preeclampsia or eclampsia. The mean age (± standard deviation) was 32.19 ± 6.59 years in the hypertension group and 27.57 ± 6.72 years in the preeclampsia/eclampsia group.

Regarding educational level, 181 (57.3%) women in the hypertension group and 99 (53.5%) in the preeclampsia/eclampsia group had primary education. Concerning marital status, 181 (63.6%) women in the hypertension group and 91 (65.4%) in the preeclampsia/eclampsia group were married or living with a partner.

Most participants were multiparous: 107 (58.5%) women in the hypertension group and 65 (57.0%) in the preeclampsia/eclampsia group. In terms of parity, 159 (55.7%) women in the hypertension group had a history of 1–4 deliveries, compared with 62 (54.3%) women in the preeclampsia/eclampsia group. The estimated gestational age at the time of diagnosis exceeded 27 weeks in 280 (97.9%) women in the hypertension group and in 108 (94.7%) women in the preeclampsia/eclampsia group. No statistically significant differences were observed between the groups with respect to sociodemographic or reproductive characteristics.

In the preeclampsia/eclampsia group, HELLP syndrome developed in 7 women (6.1%). No statistically significant differences were found between the groups in the number of antenatal visits: the mean (± SD) was 6.7 ± 0.68 in the hypertension group and 6.5 ± 0.73 in the preeclampsia/eclampsia group.

Regarding adverse maternal outcomes, women with preeclampsia/eclampsia had a significantly higher risk of cesarean section (79.4% vs. 65%; adjusted RR = 2.139; 95% CI: 1.386–3.302; p<0.001). The incidence of preterm birth before 34 weeks of gestation was also significantly higher among women with preeclampsia/eclampsia compared with those with chronic or gestational hypertension (20.5% vs. 6%; adjusted RR = 2.505; 95% CI: 1.194–5.257; p=0.015) (Table 2).

With respect to adverse perinatal outcomes, the rate of neonatal intensive care unit (NICU) admission was significantly higher among women with preeclampsia/eclampsia (21.7% vs. 6.0%; adjusted RR = 2.567; 95% CI: 1.296–5.088; p=0.007). Perinatal mortality was also higher in this group (5.2% vs. 2.0%); however, after adjustment for confounding factors, the difference was not statistically significant (adjusted RR = 0.423; 95% CI: 0.101–1.770; p=0.239).

Table 1. Adverse perinatal outcomes in women with chronic arterial hypertension compared with women with preeclampsia/eclampsia.

Maternal outcomes	**Chronic / gestational hypertension (n = 286), n (%)**	**Unadjusted RR**	**p-value**	**Preeclampsia / eclampsia (n = 114), n (%)**	**Adjusted RR**	**p-value**
Premature labor	17 (6.0)	4.041	0.001	23(20.2)	2.505	0.015
Apgar score <7 at 1 minute of life	25(8.7)	1.835	0.033	26 (22.8)	1.967	0.020
Apgar score <7 at 5 minute of life	7(2.4)	2.909	0.020	8(7.0)	3.683	0.006
Admission to the neonatal intensive care unit (NICU)	17(6.0)	4.591	0.001	25(21.7)	2.567	0.007
Perinatal mortality	6(2.0)	2.522	0.065	6(5.2)	0.423	0.239

RR — relative risk ;

Apgar scores <7 at 1 minute (15.1% vs. 8.8%; adjusted RR = 1.967; 95% CI: 1.112–3.477; p=0.020) and at 5 minutes (7.0% vs. 2.5%; adjusted RR = 3.683; 95% CI: 1.500–9.356; p=0.006) were significantly more frequent among newborns born to mothers with preeclampsia/eclampsia (Table 1).

In the unadjusted analysis, prolonged maternal hospital stay was associated with preeclampsia/eclampsia (p=0.04). However, after adjustment for confounding factors, this association was no longer statistically significant (p=0.556).

Arterial hypertension during pregnancy is one of the leading causes of maternal and perinatal mortality [10,11]. In the present study, women with preeclampsia/eclampsia were found to have a higher risk of cesarean delivery. It is important to emphasize that preeclampsia itself is not an indication for operative delivery, except in cases of severe complications related to this condition. Nevertheless, despite the possibility of vaginal delivery in women with preeclampsia, the majority of patients undergo delivery by cesarean section [12,13].

Table 2. Adverse maternal outcomes in women with chronic arterial hypertension compared with women with preeclampsia/eclampsia.

Maternal outcomes	**Chronic / gestational hypertension (n = 286), n (%)**	**Preeclampsia / eclampsia (n = 114), n (%)**	**Unadjusted RR**	**p-value**	**Adjusted RR**	**p-value**
Premature labor	17 (6.0)	23 (20.17)	4.041	0.0001	2.505	0.015
Term labor	97 (33.9)	59 (51.7)	2.106	0.0001	1.152	0.061
Operative deliveries	186 (65.0)	90(78.9)	2.065	0.001	2.139	0.001
Prolonged maternal hospitalization	143(50.0)	68(59.6)	1.448	0.048	1.126	0.165

RR — relative risk ;

Preterm birth was more frequently observed among women with preeclampsia/eclampsia. Approximately 75% of preterm births were associated with spontaneous onset of labor and may be related to a history of pregnancy-induced hypertension. In addition, the risk of prolonged maternal hospitalization was significantly higher in the preeclampsia/eclampsia group.

Table 3. Comparison of fetal biometric parameters (mm) in the examined women

Gestation week	Parameters	**Preeclampsia /eclampsia (n = 114), n (%)**	**Chronic / gestational hypertension (n = 286), n (%)**
36	Biparietal diameter (BPD)	82,14±1,20	87,61±0,66
	Head circumference (HC)	309,9±2,65	320,48±2,02
	Abdominal circumference (AC)	289,13±5,73*	319,70±3,04
	Femur length (FL)	66,18±1,07*	69,87±0,58
40	Biparietal diameter (BPD)	87,03±0,86	90,55±0,88
	Head circumference (HC)	329,0±2,03	338,0±1,73
	Abdominal circumference (AC)	315,33±1,45**	343,27±2,90
	Femur length (FL)	71,0±1,15*	73,82±0,55

Note: * $p<0,05$, ** $p<0,001$ related to control group

Using ultrasound fetometry, fetal development was monitored and fetal measurements were assessed starting from 20 weeks of gestation. The data obtained from fetometric assessments are presented in Table 3.

As shown in Table 3, nearly all fetal biometric parameters in pregnant women with preeclampsia and eclampsia were lower compared with the corresponding parameters in fetuses of women with chronic hypertension.

Significant differences throughout the entire third trimester of pregnancy were identified for abdominal circumference (AC) and femur length (FL) among fetuses of women with hypertensive disorders. Specifically, AC values in fetuses of women with preeclampsia were lower than those in fetuses of women with chronic hypertension by 7% at 36 weeks and by 8% at 40 weeks of gestation.

Femur length values in fetuses of women with preeclampsia were also lower than those in fetuses of women with chronic/gestational hypertension by 3% at 36 weeks and by 4% at 40 weeks of gestation.

Table 4. Live-born neonates examined within 28 days after birth.

	Chronic / gestational hypertension (n = 286), n (%)		**Preeclampsia /eclampsia (n = 114), n (%)**	
	OR (95% CI)	**p-value**	OR (95% CI)	**p-value**
Respiratory distress syndrome	1.05 (0.89-1.24)	0.56	2.39 (2.16–2.64)	<0.01
Low birth weight	1.39 (1.17–1.64)	<0.01	3.64 (3.29–4.02)	0.05
Severe congenital defects	1.14 (0.88–1.47)	0.32	1.05 (0.79–1.38)	0.75
sepsis	1.71 (1.29–2.32)	0.01	3.67 (2.41–5.59)	0.01

Neonatal Outcomes

According to the data presented in Table 4, among neonates born to mothers with chronic or gestational hypertension, a statistically significant increased risk of low birth weight was identified (OR = 1.39; 95% CI: 1.17–1.64; p < 0.01), as well as an increased risk of neonatal sepsis (OR = 1.71; 95% CI: 1.29–2.32; p < 0.01). No association was found between chronic/gestational hypertension and the development of major congenital malformations (OR = 1.14; 95% CI: 0.88–1.47; p = 0.32).

In the preeclampsia/eclampsia group, the risk of low birth weight was significantly higher, exceeding that of the chronic/gestational hypertension group by more than threefold (OR = 3.64; 95% CI: 3.29–4.02; p = 0.05). A significant increase in the risk of neonatal sepsis was also observed in this group (OR = 3.67; 95% CI: 2.41–5.59; p = 0.01). No association between preeclampsia/eclampsia and major congenital malformations was identified (OR = 1.05; 95% CI: 0.79–1.38; p = 0.75).

All types of hypertensive disorders were associated with a substantially increased risk of these neonatal conditions, except for gestational hypertension, in which an elevated risk was observed only for respiratory distress syndrome (but not for neonatal sepsis or low birth weight).

Conclusion

In women with chronic hypertension, the risk of several adverse outcomes—such as preterm birth, sepsis, respiratory distress syndrome, and low birth weight—was higher compared with women without hypertension; however, this risk was

generally lower than that observed among mothers with preeclampsia and eclampsia.

At the same time, the risk of stillbirth was highest among women with chronic hypertension, followed by women with preeclampsia. This may be explained by the longer duration of hypertensive disease in mothers with chronic hypertension, which provides more time for stillbirth to occur compared with other hypertensive disorders, in which delivery may take place shortly after diagnosis. This is particularly relevant for preeclampsia and eclampsia, where labor induction is often indicated and delivery typically occurs soon after diagnosis. In addition, several previous studies have reported not only an association between chronic hypertension and stillbirth but have also identified chronic hypertension as one of the most common risk factors for stillbirth [5,6,16–18].

Women with hypertensive disorders of pregnancy (HDP) have a higher risk of adverse maternal and neonatal outcomes. Women with preeclampsia/eclampsia had higher risks of cesarean delivery and preterm birth compared with patients with chronic or gestational hypertension.

Strategies aimed at improving pregnancy outcomes in women with HDP are urgently needed, particularly for those with preeclampsia/eclampsia. We found that both mothers and neonates experienced a substantially greater number of adverse outcomes when preeclampsia or eclampsia was present. Infants born to mothers with chronic hypertension generally had a higher risk of several adverse outcomes compared with infants born to mothers who developed gestational hypertension during pregnancy; nevertheless, this risk remained lower than that observed among infants of mothers with preeclampsia and eclampsia.

Used literatures.

1. Dolgushina VF, Syundyukova EG, Chulkov VS, Ryabikina MG. Dolgosrochnye iskhody gipertenzyvnykh rasstroystv beremennosti [Long-term outcomes of hypertensive disorders of pregnancy]. Akusherstvo i ginekologiya. 2021;(10):14–20. Russian.
2. Ershov II, Pugacheva MA, Bikbov IZ. Klassifikatsiya i patogenez preeklampsii: sovremennye kontseptsii [Classification and pathogenesis of preeclampsia: current concepts]. Pediatrician (St. Petersburg). 2024;15(4):73–83. Russian.
3. Kinzhalova SV, Pestryaeva LA, Makarov RA, Davydova NS. Differentsial'naya diagnostika gipertenzyvnykh rasstroystv pri beremennosti [Differential diagnosis of hypertensive disorders in pregnancy]. Akusherstvo i ginekologiya. 2015;(11):36–40. Russian.
4. Moiseeva IE. Arterial'naya gipertenziya pri beremennosti v prakticheskoy meditsine [Arterial hypertension in pregnancy in clinical practice]. Russian Family Doctor. 2019;23(2):15–20. Russian.
5. Mostova OL, Kudryavtseva EV. Gipertenzyvnyye rasstroystva beremennosti: problemy klassifikatsii, differentsial'noy diagnostiki i vedenia [Hypertensive disorders of pregnancy: classification, differential diagnosis, and management issues]. Perm Medical Journal. 2024;41(1):32–41. Russian.

6. Pustotina OA. Gipertenziya pri beremennosti: diagnostika, lechenie, profilaktika oslozhneniy [Hypertension in pregnancy: diagnosis, treatment, and complication prevention]. Pharmateca. 2017;24(3):12–21. Russian.
7. Salimova TB, Dustova N. Prichiny riska razvitiya sindroma otstavaniya rosta ploda v Bukharskoy populyatsii [Causes of intrauterine growth restriction in the Bukhara population]. Zhurnal reproduktivnogo zdorov'ya i uro-nefroloogicheskikh issledovaniy. 2023;4(4). Russian.
8. Hasan SM. Osobennosti beremennosti i rodov u patsientok s gipertenziyei, inducirovannoy beremennostyu [Pregnancy and delivery features in patients with pregnancy-induced hypertension]. Kazan Medical Journal. 2015;96(4):558–63. Russian.
9. Shelekhin AP, Baev OR, Krasny AM. Sravnenie techeniya i iskhodov beremennosti, oslozhnennoy gipertenzyvnymi rasstroystvami [Comparison of course and outcomes of pregnancies complicated by hypertensive disorders]. Akusherstvo i ginekologiya. 2023;(1):41–47. Russian.
10. Ankumah NE, Sibai BM. Chronic hypertension in pregnancy: diagnosis, management, and outcomes. Clin Obstet Gynecol. 2016;60(1):206–14. https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000255
11. Brown MA, Magee LA, Kenny LC, Karumanchi SA, McCarthy FP, Saito S, et al. Hypertensive disorders of pregnancy: ISSHP classification, diagnosis, and management recommendations for international practice. Pregnancy Hypertens. 2018;13:291–310. https://doi.org/10.1016/j.preghy.2018.05.004
12. Fingar KR, Mabry-Hernandez I, Ngo-Metzger Q, Wolff T, Steiner CA, Elixhauser A. Hospitalizations with deliveries with preeclampsia and eclampsia, 2005–2014. HCUP Statistical Brief #222. 2017.
13. Odegard RA, Vatten LJ, Nilsen ST, Salvesen KA, Austgulen R. Preeclampsia and fetal growth. Obstet Gynecol. 2000;96(6):950–5. PMID: 11084184
14. Panaitescu AM, Syngelaki A, Prodan N, Akolekar R, Nicolaides KH. Chronic hypertension and adverse pregnancy outcomes: cohort study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50(2):228–35. https://doi.org/10.1002/uog.17493
15. Rana S, Lemoine E, Granger J, Karumanchi SA. Preeclampsia: pathophysiology, challenges, and perspectives. Circ Res. 2019;124(7):1094–112. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276
16. Tuuli MG, Rampersad R, Stamilio D, MacOnes G, Odibo AO. Perinatal outcomes in women with preeclampsia and superimposed preeclampsia: do they differ? Am J Obstet Gynecol. 2011;204(6):508.e1–508.e7. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.01.065
17. Wu R, Wang T, Gu R, Xing D, Ye C, Chen Y, et al. Hypertensive disorders of pregnancy and risk of cardiovascular morbidity and mortality: systematic review and meta-analysis. Cardiol (Switzerland). 2020;145(10):633–47. https://doi.org/10.1159/000508036

Samadova Sh.I., PhD
associate professor
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan

OPTIMIZATION OF TREATMENT METHODS FOR ALVEOLITIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Abstract: *Alveolitis represents an inflammatory condition of the pulmonary alveoli that can lead to impaired gas exchange and progressive respiratory dysfunction. In patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), chronic hyperglycemia, immune dysregulation, and microvascular complications contribute to altered inflammatory responses and delayed tissue repair, potentially worsening the course of alveolar inflammatory diseases. This article provides a narrative review of the pathophysiological interactions between alveolitis and T2DM and discusses strategies for optimizing treatment in this high-risk population. Evidence suggests that comprehensive management, including strict glycemic control, anti-inflammatory therapy, careful use of corticosteroids, antimicrobial protection when indicated, and pulmonary rehabilitation, can improve outcomes. The paper highlights the importance of an individualized, multidisciplinary approach to managing alveolitis in patients with T2DM.*

Keywords: *alveolitis, type 2 diabetes mellitus, pulmonary inflammation, glycemic control, corticosteroid therapy, lung complications*

Introduction

Alveolitis refers to inflammation affecting the alveolar structures of the lungs and is commonly observed in various interstitial and inflammatory pulmonary disorders, including hypersensitivity pneumonitis, infectious pneumonias, and post-inflammatory lung conditions. The inflammatory process disrupts the integrity of the alveolar–capillary membrane, impairs gas exchange, and may lead to fibrosis if not properly controlled.

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic metabolic disease characterized by insulin resistance, hyperglycemia, and systemic low-grade inflammation. Over time, diabetes leads to microvascular and macrovascular complications, impaired immune responses, and delayed tissue healing. Although pulmonary complications of diabetes are less frequently discussed than cardiovascular or renal ones, growing evidence indicates that the lungs are also a target organ in chronic hyperglycemia.

In patients with T2DM, several mechanisms may exacerbate alveolar inflammation. Persistent hyperglycemia promotes oxidative stress, glycation of structural proteins, endothelial dysfunction, and impaired neutrophil and macrophage activity. These changes may increase susceptibility to infections, prolong inflammatory reactions, and interfere with normal resolution of alveolar

injury. As a result, alveolitis in diabetic patients may have a more severe course, slower recovery, and higher risk of progression to chronic lung disease.

Standard treatment of alveolitis often involves anti-inflammatory medications, including corticosteroids, along with management of the underlying cause. However, in patients with T2DM, corticosteroid therapy may significantly worsen glycemic control, creating a therapeutic dilemma. Therefore, optimization of treatment strategies that balance pulmonary benefits with metabolic safety is of particular importance.

This article aims to analyze the pathophysiological links between alveolitis and T2DM and to outline evidence-based approaches for optimizing treatment in this vulnerable patient group.

Materials and methods

This article is a narrative review and does not report results of an original clinical study. The analysis is based on:

- Publications addressing inflammatory and interstitial lung diseases
- Research on pulmonary complications of type 2 diabetes mellitus
- Clinical guidelines for the management of alveolitis, interstitial lung disease, and diabetes
- Reviews discussing the impact of hyperglycemia on immune and inflammatory processes

Relevant literature was analyzed and synthesized to provide a structured overview of treatment optimization strategies.

Results

The literature review highlights several key aspects relevant to optimizing treatment of alveolitis in patients with T2DM:

- Chronic hyperglycemia enhances systemic and pulmonary inflammation
- Diabetic microangiopathy may impair alveolar–capillary gas exchange
- Corticosteroids, while effective in controlling alveolar inflammation, can worsen glycemic control
- Poor glycemic control is associated with increased infection risk and delayed recovery
- Multidisciplinary care improves clinical outcomes

These findings suggest that management of alveolitis in diabetic patients must address both pulmonary inflammation and metabolic stability.

Discussion

The interaction between alveolitis and T2DM is complex and bidirectional. Alveolar inflammation increases systemic stress and inflammatory mediators, which may worsen insulin resistance. Conversely, chronic hyperglycemia alters immune and vascular function, intensifying pulmonary injury and delaying resolution of inflammation.

One of the central issues in treating alveolitis is the use of corticosteroids. Glucocorticoids are potent anti-inflammatory agents that suppress immune activation and reduce alveolar exudation and interstitial infiltration. However, in patients with T2DM, corticosteroids increase hepatic glucose production, reduce

peripheral glucose uptake, and often lead to significant hyperglycemia. Uncontrolled hyperglycemia can, in turn, increase the risk of secondary infections, prolong hospitalization, and impair tissue repair.

Therefore, optimization of treatment requires careful balancing of risks and benefits. Several principles are important:

1. Strict glycemic control

Maintaining blood glucose within target ranges is essential. Insulin therapy may need to be intensified temporarily during corticosteroid treatment. Frequent glucose monitoring helps prevent severe hyperglycemia and its complications.

2. Individualized corticosteroid use

The lowest effective dose and shortest possible duration of corticosteroid therapy should be used. In some cases, inhaled corticosteroids or alternative immunomodulatory agents may help reduce systemic exposure.

3. Anti-infective vigilance

Patients with T2DM are at higher risk for infections. When alveolitis has an infectious component or when immunosuppressive therapy is used, early identification and appropriate antimicrobial treatment are crucial.

4. Management of systemic inflammation

Adjunctive therapies that reduce oxidative stress and systemic inflammation, including proper nutrition, weight control, and management of comorbidities (such as hypertension and dyslipidemia), may indirectly support pulmonary recovery.

5. Pulmonary rehabilitation

Breathing exercises, gradual physical activity, and respiratory physiotherapy can improve ventilation, reduce dyspnea, and enhance quality of life.

6. Multidisciplinary approach

Close collaboration between pulmonologists, endocrinologists, and primary care physicians is essential. Coordinated management allows simultaneous control of lung inflammation and metabolic parameters.

In addition, emerging research suggests that diabetes-related endothelial dysfunction and microangiopathy may impair oxygen diffusion and contribute to long-term pulmonary impairment. This further emphasizes the importance of early and comprehensive management.

Overall, treatment optimization in this population requires a shift from isolated disease management to an integrated, patient-centered strategy.

Conclusion

Alveolitis in patients with type 2 diabetes mellitus presents unique therapeutic challenges due to the interaction between pulmonary inflammation and metabolic dysregulation. Optimization of treatment involves strict glycemic control, cautious and individualized use of corticosteroids, infection prevention, and multidisciplinary care. A comprehensive approach that addresses both lung pathology and systemic metabolic status can improve clinical outcomes and reduce the risk of complications.

REFERENCES

1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2024. *Diabetes Care*. 2024;47(Suppl 1):S1–S350.
2. King TE Jr., Pardo A, Selman M. Idiopathic pulmonary fibrosis. *Lancet*. 2011;378(9807):1949–1961.
3. Barnes PJ. Inflammatory mechanisms in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *J Allergy Clin Immunol*. 2016;138(1):16–27.
4. Marvisi M, Balzarini L, Mancini C, Mouzakiti P. Pulmonary complications in diabetes mellitus. *Recenti Prog Med*. 2010;101(3):187–192.
5. Gupta S, Jain A, Chauhan S. Hyperglycemia and immune dysfunction: Implications in pulmonary infections. *Diabetes Metab Syndr*. 2019;13(1):561–567.
6. Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, Richeldi L, Ryerson CJ, Lederer DJ, et al. Diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. *Am J Respir Crit Care Med*. 2020;202(3):e36–e69.
7. Fardet L, Petersen I, Nazareth I. Risk of infections with glucocorticoids: A population-based cohort study. *PLoS Med*. 2016;13(5):e1002024.
8. World Health Organization. Global report on diabetes. Geneva: WHO; 2016.
9. Huang H, Vandivier RW. Lung injury, repair, and fibrosis in diabetes. *J Clin Med*. 2021;10(4):741.
10. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, Nici L, Rochester C, Hill K, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: Key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;188(8):e13–e64.

Samatov N.
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti professori
Mamajonov X.
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti
https://orcid.org/0009-0006-2688-6462
Usmonov K.
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

SUG‘ORISH NASOS STANSIYALARIDA ENERGIYA SARFINI TAHLIL QILISH VA ENERGIYA TEJAMKOR ISH REJIMLARINI ANIQLASH

Annotatsiya: *Mazkur maqolada sug‘orish nasos stansiyalarida elektr energiya sarfini tahlil qilish hamda energiya tejamkor ish rejimlarini aniqlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot jarayonida nasos agregatlarining texnik holati, ish rejimlari va yuklama o‘zgarishlarining energiya sarfiga ta’siri o‘rganildi. Nasoslarning nominal va nominaldan chetlangan rejimlarda ishlashi elektr energiya isrofini keltirib chiqarishi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, optimal ish rejimlarini tanlash va zamonaviy boshqaruv usullarini qo‘llash orqali elektr energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi isbotlandi.*

Kalit so‘zlar: *sug‘orish nasos stansiyasi, energiya sarfi, nasos agregati, energiya tejamkorlik, ish rejimi, elektr yuritma.*

Samatov N.
professor
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies
Mamajonov Kh.
assistant
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies
https://orcid.org/0009-0006-2688-6462
Usmonov K.
student
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AT IRRIGATION PUMPING STATIONS AND IDENTIFICATION OF ENERGY-SAVING OPERATING MODES

Abstract: *This article examines the issues of analyzing electrical energy consumption in irrigation pumping stations and determining energy-saving operating modes. During the research, the impact of technical condition of pumping units, operating modes and load changes on energy consumption was studied. It was found that the operation of pumps in nominal and non-nominal modes causes*

waste of electrical energy. According to the results of the research, it was proven that by selecting optimal operating modes and using modern control methods, it is possible to significantly reduce electrical energy consumption.

Keywords: *irrigation pumping station, energy consumption, pumping unit, energy saving, operating mode, electric drive.*

Introduction (Kirish)

Qishloq xo‘jaligida sug‘orish tizimlari muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularning asosiy qismi nasos stansiyalari orqali ishlaydi. Sug‘orish nasos stansiyalarida elektr energiyasi umumiy ekspluatatsion xarajatlarning katta qismini tashkil etadi. Nasos agregatlarining noto‘g‘ri tanlangan ish rejimlari, eskirgan elektr yuritmalar va boshqaruv tizimlari energiya sarfining ortishiga olib keladi.

So‘nggi yillarda energiya resurslarini tejash va ularning samaradorligini oshirish masalalari dolzarb bo‘lib, sug‘orish nasos stansiyalarida energiya tejamkor ish rejimlarini aniqlash va joriy etish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. Shu sababli ushbu maqolada sug‘orish nasos stansiyalarida energiya sarfini tahlil qilish va energiya tejamkor ish rejimlarini aniqlash masalasi tadqiq etildi.

Materials and Methods (Materiallar va metodlar)

Tadqiqot obyekti sifatida qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan markazdan qochma nasos agregatlari va ularning asinxron elektr yuritmalari tanlandi. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- nasos agregatlarining texnik pasport ma’lumotlarini tahlil qilish;
- ish rejimlarida quvvat, tok va kuchlanish qiymatlarini o‘lchash;
- elektr energiya sarfini aniqlash;
- ish unumdorligi va foydali ish koeffitsientini hisoblash.

Nasos agregatining iste’mol qilayotgan quvvati quyidagi ifoda bilan aniqlandi:

$$P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta}$$

Bu yerda: ρ – suv zichligi, g – erkin tushish tezlanishi, Q – nasos unimdorligi, H –bosim balandligi, η –nasos agregatining umumiy FIK

O‘lchash natijalari asosida energiya sarfi va ish rejimlari o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi.

Results (Natijalar)

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sug‘orish nasos stansiyalarida nasos agregatlari ko‘pincha nominal ish rejimidan chetlangan holda ishlaydi. Bu holat elektr energiya sarfining ortishiga va umumiy samaradorlikning pasayishiga olib keladi.

O‘tkazilgan tahlillar asosida quyidagi holatlar aniqlandi:

- nasosning optimal ish rejimidan past unumdorlikda ishlashi energiya isrofini keltirib chiqaradi;
- ortiqcha bosim bilan ishlash elektr yuritma yuklamasini oshiradi;

• energiya tejamkor ish rejimlari nasosning foydali ish koeffitsienti eng yuqori bo‘lgan sohada kuzatiladi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, nasos agregatlarining ish rejimlarini optimallashtirish orqali elektr energiya sarfini 10–25 % gacha kamaytirish imkoniyati mavjud.

Discussion (Muhokama)

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, sug‘orish nasos stansiyalarida energiya tejamkorlikka erishish asosan ish rejimlarini to‘g‘ri tanlash bilan bog‘liq. Nasos agregatlarini nominalga yaqin rejimda ishlatish, zamonaviy boshqaruv vositalaridan foydalanish va texnik xizmat ko‘rsatishni o‘z vaqtida amalga oshirish energiya samaradorligini oshiradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy boshqaruv usullariga nisbatan optimallashtirilgan ish rejimlari energiya tejamkorlik nuqtai nazaridan ancha samaralidir.

Conclusion (Xulosa)

Sug‘orish nasos stansiyalarida energiya sarfini tahlil qilish natijasida nasos agregatlarining ish rejimlari elektr energiya iste’moliga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, energiya tejamkor ish rejimlarini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish orqali elektr energiya sarfini kamaytirish va nasos stansiyalarining umumiy samaradorligini oshirish mumkin.

Ushbu tadqiqot natijalari sug‘orish tizimlarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishda amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, kelgusida avtomatlashtirilgan va chastotali boshqaruv tizimlarini qo‘llash istiqbollari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurali, P., Javlonbek, X., & Xolmirza, M. (2023). O‘zgarmas tok dvigatelining quvvat isrofi va uning foydali ish koeffitsiyentiga ta’sir. *Innovations in Technology and Science Education*, *2*(9), 120-127. Https://scholar.google.com/citations?View_op=view_citation&hl=ru&user=enef7yeaaaaj&citation_for_view=enef7yeaaaaj:zylm7y9caggc

2. Mamajonov, X. (2023). Thermal model of an induction traction motor. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 222-225. Https://cyberleninka.ru/article/n/thermal-model-of-an-induction-traction-motor

3. Mamajonov, X., & Madaminov, I. M. (2024). advancements in solar technology: dual axis solar tracking systems. *tadqiqotlar*, *32*(1), 32-38.

4. мамажанов, х. моделирование процессов нагрева и охлаждения асинхронного двигателя в различных режимах работы. *современные научные исследования и инновации Учредители: Международный научно-инновационный центр*,

5. Norboev, A. E. (2024). Speed regulation of asynchronous machines using mathematical modeling. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net

6. Samatov, N. A. (2023). Research of a controlled asynchronous electric drive in dynamic modes. *Agriculture of Uzbekistan*, Special Issue (2), 45–52.

7. Karimjonov, D., Makhsudov, M., Xalimjanov, A., Abdukhalilov, D., Axmedov, D., & Mamajonov, X. (2024). Modeling the structures of three-phase asynchronous

motor reactive power variations. *AIP Conference Proceedings*, 3244(1), 060018. https://doi.org/10.1063/5.0201234

Samatova Y.
Primova N.G'.
magistranti
Samarqand davlat Tibbiyot Universiteti
Eshkobilova M.E.
dotsent
Farmatsevtik va toksikologik kimyo kafedrasi o'qituvchisi
SamDTU
Qurbonov H.U.
Farmakologiya fani o'qituvchisi
Termiz Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

PORTULACA OLERACEA L. O'SIMLIGIDAN SUVDA ERUVCHAN POLISAXARIDLARNI AJRATIB OLISH VA ULARNING KIMYOVIY TAVSIFI

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Portulaca oleracea L. o'simligining yer ustki qismidan suvda eruvchan polisaxaridlarni ajratib olish va ularning asosiy kimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash masalalari yoritilgan. Polisaxaridlar issiq suv ekstraksiyasi va etanol yordamida cho'ktirish usuli orqali olingan. Umumiy uglevod miqdori fenol–oltingugurt kislotasi asosidagi kolorimetrik usul bilan baholangan. Tadqiqot natijalari Portulaca oleracea polisaxaridlarining biologik faol moddalar sifatidagi ilmiy ahamiyatini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *"*Portulaca oleracea L.*", "suvda eruvchan polisaxaridlar", "issiq suv ekstraksiyasi", "etanol bilan cho'ktirish", "umumiy uglevod miqdori", "fenol–oltingugurt kislotasi usuli".*

Samatova Y.
master's student
Primova N.G.
master's student
Samarkand State Medical University
Eshkobilova M.E.
Associate Professor
Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry
SamSMU
Qurbonov H.U.
Termez Lecturer in Pharmacology
Abu Ali ibn Sino Public Health Technical School

ISOLATION OF WATER-SOLUBLE POLYSACCHARIDES FROM PORTULACA OLERACEA L. AND THEIR CHEMICAL CHARACTERIZATION

Abstract. *This article examines the isolation of water-soluble polysaccharides from the aerial parts of Portulaca oleracea L. and the determination of their key chemical parameters. Polysaccharides were obtained by hot water extraction and ethanol precipitation. Total carbohydrate content was determined using the phenol-sulfuric acid colorimetric method. The results of the study demonstrate the scientific significance of Portulaca oleracea polysaccharides as biologically active substances.*

Keywords: *"*Portulaca oleracea L."*, "water-soluble polysaccharides", "hot water extraction", "ethanol precipitation", "total carbohydrate content", "phenol–sulfuric acid method".*

Kirish

Ilmiy ishning dolzarbligi. So‘nggi yillarda dorivor o‘simliklardan olinadigan yuqori molekulali uglevod birikmalarining farmatsevtika va biotexnologiya sohalaridagi amaliy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Adabiyot ma’lumotlariga ko‘ra, o‘simlik polisaxaridlari metabolik jarayonlarda ishtirok etuvchi biologik mexanizmlarga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. *Portulaca oleracea L.* (semizo‘t) xalq tabobatida keng qo‘llaniladigan o‘simlik bo‘lib, uning farmakologik faolligi turli biologik faol birikmalar bilan bog‘liq. Adabiyotlarda ushbu o‘simlik tarkibida flavonoidlar va fenolik moddalardan tashqari, polisaxaridlar ham muhim rol o‘ynashi ta’kidlangan. Shu sababli *Portulaca oleracea* polisaxaridlarini ajratib olish va ularning kimyoviy tavsifini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va usullari

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot uchun *Portulaca oleracea L.* o‘simligining vegetatsiya davrida yig‘ib olingan yer ustki qismi tanlandi. Xomashyo soyada quritilib, mexanik usulda maydalandi.

Polisaxaridlarni ajratib olish. Maydalangan o‘simlik xomashyosi (50g) distillangan suv bilan 1:20 nisbatda aralashtirilib, 85–90 °C haroratda 2 soat davomida ekstraksiya qilindi. Olingan ekstrakt filtrlanib, vakuum ostida quyuqlashtirildi. Polisaxaridlarni ajratib olish maqsadida eritmaga to‘rt barobar hajmda 96% li etanol qo‘shildi va 4 °C da 12 soat davomida saqlandi. Hosil bo‘lgan cho‘kma sentrifugalanib, etanol bilan yuvildi va quritildi.

Umumiy uglevod miqdorini aniqlash. Ajratib olingan polisaxarid fraksiyasidagi umumiy uglevod miqdori fenol–oltingugurt kislotasi kolorimetrik usuli yordamida aniqlandi. Mazkur usul kuchli kislota muhitida uglevod molekulalarining degidratatsiyalanishi natijasida rang hosil qiluvchi birikmalar shakllanishiga asoslanadi. Eritmada hosil bo‘lgan rangning intensivligi namunadagi umumiy uglevodlar konsentratsiyasi bilan bevosita bog‘liq holda o‘zgaradi.

Tajriba o‘tkazish tartibi. Polisaxarid namunasi distillangan suvda ma’lum konsentratsiyada eritildi. Tayyorlangan eritmadan 1 ml o‘lchab olinib, unga 1 ml 5% li fenol eritmasi qo‘shildi. So‘ngra ehtiyotkorlik bilan 5 ml konsentrlangan oltingugurt kislotasi tezda qo‘shildi. Reaksiya aralashmasi xona haroratida 20 daqiqa davomida saqlandi. Belgilangan vaqtdan so‘ng hosil bo‘lgan rang

intensivligi 490 nm to‘lqin uzunligida UV-Vis spektrofotometr yordamida o‘lchandi.

Kalibrovka grafigini tuzish. Standart sifatida turli konsentratsiyadagi glyukoza eritmalari (0–100 µg/ml) tayyorlandi va yuqoridagi tartibda ishlov berildi. Olingan absorbsiya qiymatlari asosida kalibrovka grafigi tuzilib, polisaxarid namunalaridagi umumiy uglevod miqdori glyukoza ekvivalenti sifatida hisoblab chiqildi.

Monosaxarid tarkibini aniqlash (kislota gidrolizi va YQX). Polisaxarid fraksiyasining monosaxarid tarkibini aniqlash uchun namunalar oldindan kislota gidroliziga uchratildi. Buning uchun polisaxarid eritmasiga 2 M xlorid kislota qo‘shilib, 100 °C haroratda 2 soat davomida gidroliz qilindi. Reaksiya yakunlangach, eritma sovitilib, natriy gidroksid eritmasi bilan neytrallandi.

Hosil bo‘lgan gidrolizat yupqa qatlamli xromatografiya (YQX) yordamida tahlil qilindi. Silika gel bilan qoplangan plastinkalar ishlatilib, erituvchi sistema sifatida *n-butanol : sirka kislotasi : suv (4:1:5)* tanlandi. Rivojlanishdan so‘ng plastinkalar anilin-ftalat reaktivi bilan ishlov berilib, 105 °C da quritildi. Monosaxaridlar standartlar (glyukoza, galaktoza, arabinoza) bilan solishtirib identifikatsiya qilindi.

Oqsillar va fenolik aralashmalar mavjudligini baholash

Polisaxarid fraksiyasining tozaligini baholash maqsadida undagi oqsil va fenolik birikmalar miqdori sifat jihatdan tekshirildi. Oqsillar mavjudligi biuret reaksiyasi orqali, fenolik moddalarning mavjudligi esa temir (III) xlorid reaksiyasi yordamida aniqlandi. Reaksiyalar natijasida rang hosil bo‘lishi kuzatilmadi, bu esa polisaxarid fraksiyasining nisbatan tozalanganligini ko‘rsatdi.

Polisaxaridlarning gipoglikemik ta’siri. Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib, *Portulaca oleracea* polisaxaridlari glyukoza almashinuviga ta’sir ko‘rsatib, insulin sekretsiyasini faollashtirishi, shuningdek, to‘qimalarda glyukozaning o‘zlashtirilishini kuchaytirishi mumkinligi taxmin qilinadi. Ushbu polisaxaridlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ferment ingibitori sifatida emas, balki insulin-mimetik mexanizm orqali metabolik jarayonlarga bilvosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Natijalar va muhokama. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida *Portulaca oleracea* o‘simligidan suvda yaxshi eruvchan polisaxarid fraksiyasi ajratib olindi. O‘tkazilgan kolorimetrik tahlillar polisaxarid fraksiyasida uglevodlar salmog‘ining sezilarli ekanligini tasdiqladi.. Bu holat o‘simlikning biologik faolligi polisaxarid komponentlari bilan ham bog‘liqligini tasdiqlaydi.

Xulosa. *Portulaca oleracea L.* o‘simligidan polisaxaridlarni ajratib olishning laboratoriya sharoitida qo‘llash mumkin bo‘lgan samarali usuli taklif etildi. Ajratilgan polisaxaridlar yuqori uglevod miqdoriga ega bo‘lib, biologik faol moddalar sifatida keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1.Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Т. I–II. Ташкент, 2020.
2.Фролова Н.Е., Киселева Т.Л. Полисахариды лекарственных растений: методы выделения и анализа. Химия растительного сырья, 2016, №3, 5–18.

3.Chen J., Li Y., Wang Y., Wang S. Structural characterization and antioxidant activity of polysaccharides from Portulaca oleracea L. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, 130: 103–110.
4.Wang J., Zhang Q., Zhang Z., Song H., Li P. Potential antioxidant and immunomodulatory activities of polysaccharides from Portulaca oleracea. Journal of Ethnopharmacology, 2010, 132(3): 560–566.
5.Sasidharan S., Chen Y., Saravanan D., Sundram K.M., Latha L.Y. Extraction, isolation and characterization of bioactive compounds from plants. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 2011, 8(1): 1–10.
6.Zhou Y., Xin H., Rahman K., Wang S., Peng C., Zhang H. Portulaca oleracea L.: A review of phytochemistry and pharmacological effects. BioMed Research International, 2015, Article ID 925631.
7.Uddin M.K., Juraimi A.S., Hossain M.S., Nahar M.A., Ali M.E., Rahman M.M. Purslane weed (Portulaca oleracea): A prospective plant source of nutrition, omega-3 fatty acid, and antioxidant attributes. Scientific World Journal, 2014.

Sayfullayeva S. H.
assistant
Bukhara State Medical Institute

SALINIZATION OF IRRIGATED SOILS AND THEIR AGROCHEMICAL PROPERTIES IN THE OLOT DISTRICT OF THE BUKHARA REGION (UZBEKISTAN)

Abstract: *Salinization of irrigated soils is one of the most pressing environmental and agricultural problems limiting land productivity in arid and semi-arid regions. This article presents comprehensive information on saline soils, their salinization types and degrees, as well as the spatial distribution of salinized lands in the Republic of Uzbekistan, with a particular focus on the Olot district of Bukhara region.*

Keywords: *Soil, irrigated soil, salinization, salinity type, degree of salinity, soil fertility, groundwater, Bukhara region.*

Introduction: The study reveals that semi-hydromorphic and hydromorphic soils dominate the soil cover of the district and constitute the main part of the land fund. Among the genetic soil groups, meadow soils account for 51.0%, meadow alluvial soils for 43.9%, takyr-meadow soils for 4.0%, and meadow-desert soils for 2.0%. These soil types are widely distributed across all geomorphological zones of the district.

Current assessments indicate that 23.29% of the total land area is non-saline, while 58.81% is slightly saline, 14.56% moderately saline, and 3.33% strongly and very strongly saline. Soil fertility analysis shows that humus content in most soils is very low (less than 1%) or low (1.1–2.0%). Areas with humus content below 1% occupy 97.4% of the district, whereas only 2.6% of soils contain 1.1–2.0% humus. This condition necessitates the rational use of local and non-traditional organic and mineral fertilizers to improve soil fertility.

Based on water extract analyses, meadow soils in the district are characterized by non-saline, weakly, moderately, and strongly saline variations. According to salinity chemistry, chloride–sulfate and sulfate salinization types prevail. In all irrigated soil types—meadow, takyr-meadow, meadow-desert, and meadow alluvial soils—the contents of humus, available phosphorus, and exchangeable potassium decrease from the plough layer to deeper horizons. This pattern is mainly caused by long-term anthropogenic impacts such as irrigation practices and agrotechnical measures, which have resulted in the leaching of nutrients to lower soil layers.

Soil salinization significantly affects soil fertility, crop productivity, and the ecological and reclamation status of irrigated lands. The intensity of salinization depends on terrain relief, geomorphological and lithological structure, soil-climatic conditions, and human economic activities. Particularly, saline groundwater causes severe damage to agriculture: cotton yields decrease by 20–30% on slightly saline soils, 40–60% on moderately saline soils, and up to 80% on strongly saline lands.

In extremely saline and solonchak soils, cotton seedlings may completely perish after the first irrigation. These findings are supported by numerous field experiments and long-term research results.

Main Part

The soil cover of the Olot district is mainly represented by semi-hydromorphic and hydromorphic soils, which form the dominant part of the regional land fund. These soils developed under conditions of shallow groundwater occurrence and long-term irrigation impact. According to their genetic classification, meadow soils occupy 51.0% of the total area, meadow alluvial soils account for 43.9%, takyr-meadow soils cover 4.0%, and meadow-desert soils make up 2.0%. Such soils are distributed across all geomorphological zones of the district and play a key role in agricultural production.

At present, the degree of soil salinity in the district varies considerably. Detailed soil surveys indicate that 23.29% of the total land area is non-saline, while 58.81% is slightly saline. Moderately saline soils occupy 14.56%, and strongly to very strongly saline soils constitute 3.33% of the area. This distribution reflects the influence of natural factors such as relief and groundwater depth, as well as anthropogenic factors, including irrigation practices and insufficient drainage systems.

The humus content of soils in the Olot district is generally low. The majority of soils are characterized by very low humus content (less than 1.0%) and low humus content (1.1–2.0%). Areas with humus content below 1.0% cover 97.4% of the total area, whereas soils containing 1.1–2.0% humus account for only 2.6%. Such low organic matter levels negatively affect soil structure, water-holding capacity, and nutrient availability, thereby limiting crop productivity. This situation necessitates the rational use of organic, mineral, and non-traditional fertilizers to maintain and improve soil fertility.

Water extract analyses show that meadow soils include non-saline, weakly, moderately, and strongly saline variants. According to the chemical composition of soluble salts, chloride–sulfate and sulfate types of salinization predominate. The formation of these salinity types is closely related to groundwater mineralization and evaporative conditions typical of arid regions.

In all irrigated soil types of the district—meadow, meadow alluvial, takyr-meadow, and meadow-desert soils—the contents of humus, available phosphorus, and exchangeable potassium decrease gradually from the plough layer to the deeper horizons. This vertical distribution pattern is mainly the result of long-term anthropogenic impacts. Continuous irrigation and agrotechnical practices over many years have led to the leaching of nutrients from the upper soil layers into the lower horizons, resulting in reduced fertility of the topsoil.

Soil salinization is a key factor determining the fertility, productivity, and ecological–meliorative condition of irrigated lands. The intensity of salinization depends on relief features, geomorphological and lithological structure, soil and climatic conditions, and human economic activities. In particular, saline groundwater poses a serious threat to agricultural production. Numerous field

experiments and long-term studies have shown that cotton yields decrease by 20–30% on slightly saline soils, by 40–60% on moderately saline soils, and by up to 80% on strongly saline soils. In extremely saline and solonchak soils, cotton seedlings may completely perish after the first irrigation.

References:

1.Aripov B.F., Gozieva G.A., Actinomycetes as biostimulants // Eurasian journal of academic research – 2022, – Volume 02 – Issue: 2 – P 526-529.
2. Aripov B.F., Gozieva G.A., Axmedova Z.R., Soil of irrigated lands of Bukhara region International scientific journal – 2023, – Volume 2 – Issue: 2 – P. 96-99.
3. Rashidova N.T., Shonakhunov T.E., Axmedova Z.R., Sadikov I.Sh., Aripov B.F., “Basidial Mushrooms and Prospects for their use in the Biotechnology” // Central Asian journal of medical and natural sciences. Ispaniya, – 2021, – Volume: 02 – Issue: 05 – P. 183-188.
.4.Avliyoqulov, A.E.*Prospects of the national farming system.* Tashkent: Navro‘z” Publishing House, 2013, pp. 48–55.
5.Boboyev, Ya.*Quality assurance. Uzbekistan Agriculture Journal*, No. 4, p. 11, Tashkent, 2006.

Shokirova M.B.
o'qituvchi
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

INGLIZ TILIDAGI “QORA” IDEOMLARNING LINGVOMADANIY VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Maqolada black rang komponentiga ega bo‘lgan o‘n bir ingliz idiomasi tahlil qilinadi. Ularning leksik-semantik xususiyatlari, pragmatik funksiyalari va lingvokulturologik ramziyligi o‘rganiladi. Natijalar qora rang ko‘pincha salbiy ma’nolarni, ba’zan esa rasmiylik va moliyaviy barqarorlik kabi ijobiy ma’nolarni ifodalashini ko‘rsatadi.* .

Kalit so‘zlar: *rangli idiomalar, qora rang ramziyligi, lingvokulturologiya, konseptual metafora, semantik konnotatsiya, pragmatika, ingliz frazeologiyasi, diskurs tahlili.*

Shakirova M. B.
teacher
Uzbekistan State World Languages University

THE LINGUOCULTURAL AND PRAGMATIC FEATURES OF “BLACK” IDIOMS IN ENGLISH DISCOURSE

Abstract: *his article examines eleven English idioms containing the color component black. It analyzes their lexical-semantic features, pragmatic functions, and linguocultural symbolism. The study reveals predominantly negative meanings related to illegality and exclusion, alongside neutral and positive associations such as formality and financial stability in English discourse.*

Keywords: *color idioms, black symbolism, linguoculturology, conceptual metaphor, semantic connotation, pragmatics, English phraseology, discourse analysis.*

Introduction: Color symbolism plays a crucial role in shaping idiomatic expressions across languages. In English, the color black is particularly productive in phraseology and metaphorical extensions. It frequently conveys meanings associated with darkness, secrecy, illegality, grief, or formality. However, its semantic range is not exclusively negative; in some cases, it indicates financial stability or elegance.

Methods: This research employs a qualitative descriptive methodology aimed at providing a comprehensive linguocultural and pragmatic analysis of English idioms containing the color component black. The methodological framework integrates several complementary analytical approaches to ensure a multidimensional interpretation of the selected units.

Lexical-Semantic Analysis: First, lexical-semantic analysis was applied to determine both the literal and figurative meanings of each idiom. This stage involved identifying semantic shifts from the primary denotative meaning of the adjective black (referring to color) to its metaphorical extensions in idiomatic usage. Special attention was given to polysemy, semantic transformation, evaluative connotation (negative, neutral, positive), and metaphorical mapping. The analysis also considered semantic oppositions (e.g., black vs. white) as part of conceptual structuring.

Etymological Review: An etymological review was conducted to trace the historical development of each idiom and identify the sociocultural conditions under which it emerged. This approach allowed the study to reveal diachronic semantic evolution and to determine whether negative associations of black were culturally inherited, socially constructed, or metaphorically motivated. Historical sources, phraseological dictionaries, and etymological references were consulted to reconstruct origin patterns.

Pragmatic Analysis: Pragmatic analysis was employed to examine how these idioms function in real communicative contexts. The study explored speaker intention, expressive force, emotional intensity, and contextual appropriateness. Particular emphasis was placed on register variation (formal vs. informal usage), communicative purpose (humor, criticism, warning, description), and pragmatic impact on the listener. This stage helped clarify how idioms operate as tools of evaluative and expressive discourse.

Linguocultural Interpretation: The linguocultural approach was used to investigate the symbolic meanings of the color black within English-speaking cultural traditions. This included examining its associations with darkness, secrecy, illegality, mourning, authority, and elegance. The study interprets idioms as reflections of culturally embedded conceptual metaphors, demonstrating how collective cultural memory influences semantic development.

Results: 1. ***Negative Physical and Emotional States***

N	***Color idiom***	Meaning	Example	Cultural aspect
1	**Black and blue**	severely bruised	After the accident, he was black and blue all over.	Black symbolizes injury and bodily damage.
2	**Black sheep**	different member of a family or group	He was considered the black sheep of the family.	Black contrasts with white (purity), marking deviation.

2.Legal and Social Exclusion

N	*Color idiom*	Meaning	Origin	Example
1	**Blackball**	to exclude or reject from a group	18th-century voting practice using black balls to indicate rejection.	He was blackballed from the club.
2	**Blacklist**	a list of disapproved persons	He was considered the black sheep of the family.	The actor was placed on a blacklist.

3 Crime and Illegality

N	Color idiom	Meaning	Example:
1	**Blackmail**	extortion through threats	He tried to blackmail the company.
2	**Black market**	illegal trade	Goods were sold on the black market.

4 .Clarity, Formality, and Documentation

	Color idiom	Meaning	Example
1	**Black and white**	clearly written or defined	The agreement was in black and white.
2	**Black tie**	formal evening dress code	It was a black tie event.

5. Economic and Financial Meaning: In the black. Meaning: financially profitable .Example: The company is finally in the black. This idiom contrasts with in the red, where black historically indicated positive balances in accounting records.

6. Humor and Emotional Detachment: Black humor. Meaning: humor about serious or tragic topics**.** Example: The film is full of black humor.

7. Loss of Consciousness or Light.Black out. Meaning: to lose consciousness or experience a power failure Example: He blacked out after the shock.

Discussion: Analysis shows that idioms with the color black cluster around four main domains: darkness and illegality, social exclusion, formality and authority, and cultural symbolism.

Darkness and Illegality: Idioms like blackmail and black market reflect the metaphor DARKNESS IS ILLEGALITY, linking lack of light to secrecy and moral transgression.

Exclusion and Social Rejection: Expressions such as blackball, blacklist, and black sheep mark social deviation, emphasizing conformity and group boundaries, contrasting black with the purity of white.

Formality and Authority: Idioms like black tie and in black and white show that black can also signify elegance, clarity, and institutional respect, illustrating context-dependent symbolism.

Cultural Symbolism & Pragmatic Function: While black often carries negative connotations (death, sin, secrecy), some idioms are neutral or positive, showing cultural dynamism. Pragmatically, black idioms efficiently convey criticism, exclusion, or authority, compactly encoding cultural knowledge.

Overall, black idioms illustrate how color functions as a cognitive-cultural frame, structuring social experience and evaluative meaning in discourse.

Conclusion: The study confirms that the color component black in English idiomatic units carries predominantly negative connotations linked to illegality, secrecy, exclusion, and misfortune. Nevertheless, certain idioms demonstrate positive or neutral semantic shifts, particularly in formal and financial contexts. These findings support the hypothesis that color-based idioms reflect culturally embedded conceptual metaphors and serve as powerful pragmatic tools in English discourse.

Used literature:

1.Allan, K., & Burridge, K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. B. N. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.

2.Lakoff, G., & Johnson, M. Metaphors We Live By. B. N. Chicago: University of Chicago Press. 2003.

3.Nurmonov, A. Lingvokulturologiya asoslari. B. N. Toshkent: Fan nashriyoti. 2010.

4.Rahmatullayev, ShO‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. B. N. Toshkent: Sharq nashriyoti. 2012.

Sharipov Sh.A.
”Informatsion texnologiyalar, biofizika va tibbiy fizika ” kafedrasi assistenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Abdurahmonova L.Q.
Pediatriya fakulteti talabasi
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

YURAK FAOLIYATINING FIZIK ASOSLARI. SUN’IY QON AYLANISH APPARATLARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada yurak faoliyatining fizik asoslari hamda sun’iy qon aylanish apparatlarining ishlash prinsiplari tahlil qilingan. Yurakning nasos sifatida ishlashi, qon oqimining bosim farqi va tomir qarshiligiga bog‘liqligi, yurak mushagining mexanik ishi hamda yurak faoliyatini boshqaruvchi bioelektrik jarayonlar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sun’iy qon aylanish apparatlarining asosiy qismlari, ularning gidrodinamik, diffuzion va issiqlik almashinuvi jarayonlariga asoslangan ishlash mexanizmlari yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *yurak faoliyati, qon aylanish, sun’iy qon aylanish apparati, gidrodinamika, diffuziya.*

Sharipov Sh.A.
assistant
Department of "Information Technologies, Biophysics and Medical Physics"
Samarkand State Medical University.
Abdurahmonova L.Q.
student
Faculty of Pediatrics
Samarkand State Medical University

PHYSICAL BASIS OF HEART ACTIVITY. ARTIFICIAL BLOOD CIRCULATION DEVICES

Abstract: *This article analyzes the physical basis of heart activity and the working principles of artificial blood circulation devices. The functioning of the heart as a pump, the dependence of the blood flow on the pressure difference and vascular resistance, the mechanical work of the heart muscle, and the bioelectrical processes that control the heart's activity were considered. Also, the main parts of artificial blood circulation devices, their working mechanisms based on hydrodynamic, diffusion and heat exchange processes are explained.*

Keywords: *heart activity, blood circulation, artificial blood circulation apparatus, hydrodynamics, diffusion.*

Kirish. Yurak-qon tomir tizimi inson organizmining eng muhim funksional tizimlaridan biri bo‘lib, barcha a’zolar va to‘qimalarning uzluksiz faoliyatini ta’minlaydi. Ushbu tizimning markaziy bo‘g‘ini bo‘lgan yurak qon aylanishini ta’minlovchi asosiy nasos vazifasini bajaradi. Yurak faoliyati davomida qon tomirlar bo‘ylab harakatlanadi va bu jarayon mexanika, gidrodinamika hamda bioelektrik hodisalarning o‘zaro uyg‘unlashuvi natijasida amalga oshadi. Yurak faoliyatining buzilishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘diradi va ko‘plab yurak jarrohligi amaliyotlarida yurak ishini vaqtincha to‘xtatish zarurati yuzaga keladi. Bunday holatlarda organizmda qon aylanishi va gaz almashinuvini ta’minlash uchun sun’iy qon aylanish apparatlaridan foydalaniladi. Ushbu apparatlar yurak va o‘pka funksiyalarini vaqtincha almashtirib, murakkab jarrohlik operatsiyalarini xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi.So‘nggi yillarda tibbiy texnika va biotibbiyot muhandisligining rivojlanishi sun’iy qon aylanish apparatlarining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, yurak faoliyati va sun’iy qon aylanish tizimlarining ishlash mexanizmlarini chuqur anglash ularning fizik asoslarini o‘rganishni talab etadi. Mazkur maqolaning maqsadi yurak faoliyatining asosiy fizik qonuniyatlarini tahlil qilish hamda sun’iy qon aylanish apparatlarining ishlash prinsiplari va ularning amaliy ahamiyatini yoritishdan iborat.

Asosiy qism.

Yurak tirik organizmda qon aylanishini ta’minlovchi markaziy nasos bo‘lib, uning faoliyati fizik qonunlarga asoslanadi. Yurak mushagi ritmik ravishda qisqarib va bo‘shashib, tomirlar tizimi bo‘ylab qon harakatini yuzaga keltiradi. Bu jarayon yurak sikli orqali amalga oshadi va sistola hamda diastola fazalaridan iborat. Fizika nuqtayi nazaridan yurakning asosiy vazifasi — bosimlar farqi hosil qilish orqali qon oqimini ta’minlashdir. Qon oqimining hajmi, tezligi va bosimi yurakning mexanik ishini belgilaydi. Yurak bajargan mexanik ish bosim va haydalgan qon hajmiga bog‘liq bo‘lib, bu jarayon energiya almashinuvi bilan chambarchas bog‘langan.

Qon tomirlar bo‘ylab harakatlanar ekan, gidrodinamika qonunlariga bo‘ysunadi. Qon oqimiga tomir devorlarining elastikligi, tomir radiusi va qonning yopishqoqligi ta’sir ko‘rsatadi. Tomirlar torayganda oqimga qarshilik ortadi va yurak ko‘proq kuch sarflaydi. Shu sababli yurak faoliyati va qon tomir tizimi o‘zaro uzviy bog‘liq holda ishlaydi.

Yurakning elektr faoliyati

Yurak mushagining qisqarishi elektr impulslar yordamida boshqariladi. Ushbu impulslar yurakdagi maxsus o‘tkazuvchi tizimda hosil bo‘lib, butun yurak bo‘ylab tarqaladi. Elektr signallar ionlarning hujayra membranasi orqali harakati natijasida yuzaga keladi. Elektr faoliyatning buzilishi yurak ritmining izdan chiqishiga olib keladi. Shu sababli yurakning elektr xususiyatlarini o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy tibbiyot uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yurakning elektr jarayonlari elektrokardiografiya usuli orqali tahlil qilinadi.

Sun’iy qon aylanish apparatlarining fizik prinsiplari

Sun’iy qon aylanish apparatlari yurak yoki o‘pka faoliyati vaqtincha to‘xtatilgan holatlarda qon aylanishini ta’minlash uchun qo‘llaniladi. Ushbu

apparatlar yurak va o‘pkaning asosiy vazifalarini qisman yoki to‘liq o‘z zimmasiga oladi. Sun’iy qon aylanish apparatining ishlash prinsipi mexanik nasoslar va gaz almashinuvi qurilmalariga asoslangan. Mexanik nasos yurak vazifasini bajarib, qonni tomirlar orqali harakatga keltiradi. Bu jarayonda bosim, oqim tezligi va hajm qat’iy nazorat qilinadi. Fizik jihatdan apparat qonning uzluksiz va barqaror oqimini ta’minlashi kerak. Apparatda qonning harorati, bosimi va oqish tezligi organizm uchun xavfsiz bo‘lgan chegaralarda ushlab turiladi. Qonning yopishqoqligi va mexanik ta’sirlarga sezgirligi hisobga olinib, oqim turbulentsiyasining oldi olinadi. Aks holda, qon hujayralari shikastlanishi mumkin.

Sun’iy qon aylanishda energiya va bosim muvozanati

Sun’iy qon aylanish apparatlarida yurakning tabiiy ishiga o‘xshash sharoit yaratish muhim hisoblanadi. Nasos tomonidan hosil qilinadigan bosim tabiiy yurak bosimiga yaqin bo‘lishi kerak. Juda yuqori bosim tomirlar shikastlanishiga, past bosim esa to‘qimalarning yetarli qon bilan ta’minlanmasligiga olib keladi. Energiyaning samarali sarflanishi ham muhim fizik omillardan biridir. Apparat yurak kabi minimal energiya sarflagan holda maksimal foydali ish bajarishga mo‘ljallangan bo‘lishi lozim. Shu jihatdan sun’iy qon aylanish apparatlari biofizika va muhandislik fanlarining qo‘shma yutug‘i hisoblanadi.

Xulosa

Yurak faoliyati inson organizmida qon aylanishini ta’minlovchi asosiy mexanizm bo‘lib, u murakkab biologik jarayon bo‘lishiga qaramay, aniq fizik qonunlarga asoslanadi. Yurak mushagining ritmik qisqarishi va bo‘shashishi natijasida hosil bo‘ladigan bosimlar farqi qonning tomirlar tizimi bo‘ylab harakatlanishini ta’minlaydi. Elektr faoliyatdagi har qanday buzilish yurak ritmining o‘zgarishiga olib keladi, bu esa yurak ishining samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli yurak faoliyatining elektr xususiyatlarini o‘rganish yurak kasalliklarini aniqlash va oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Sun’iy qon aylanish apparatlarining ishlash prinsiplari yurakning tabiiy faoliyatini fizik jihatdan modellashtirishga asoslangan. Mexanik nasoslar yordamida qon oqimi ta’minlanib, bosim, oqim tezligi, harorat va gaz almashinuvi qat’iy nazorat qilinadi. Bu jarayonda qon hujayralarining shikastlanishini oldini olish uchun oqimning barqarorligi va energetik samaradorlik muhim hisoblanadi. Biofizika, tibbiyot va muhandislik fanlarining uzviy integratsiyasi natijasida yaratilgan bunday texnologiyalar yurak jarrohligi amaliyotida keng qo‘llanilmoqda va inson hayotini saqlab qolishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Kelajakda yurak faoliyatining fizik mexanizmlarini yanada mukammal tadqiq etish sun’iy qon aylanish tizimlarining samaradorligini oshirishga va yurak kasalliklarini davolashda yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bozorov.E.X., Ergashev.A.J., Sharipov.Sh.A., Tibbiyot Oliy ta’lim muassasalarida multimedia vositalaridan foydalanish. Maktabgacha va ta’limi jurnali, 2025-yil 4-noyabr, 1011-1013-betlar.

2. Karimov A. A., Ismoilov M. X**. Biofizika asoslari**. — Toshkent: O‘qituvchi, 2017.

3. Sun’iy qon aylanish apparatlari: o‘quv qo‘llanma / Tahrir hay’ati: S. R. Jo‘rayev. — Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2020.
4. Ergashev.A.J., Bozorov.E.X., Sharipov.Sh.A., N.F.Boymatova Tibbiyot Oliy ta’lim muassasalarida Yadro texnologiyalar fanini multimediya vositalari yordamida o’qitish. Inter education & Global study, 2025-yil, 82-89-betlar.

.

Shermurodova R.
student group of 103
Ziyadullayeva U.
student group of 103
Faculty of Management and Administration,
Fundamental Medicine Program
SamDTU
Musurmonova X.
student group of 205
Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
SamDTU
Khudoyqulov J.I.
assistant
Medical Chemistry
SamDTU

NICOTIANA TABACUM L.: MORPHOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL, AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATION OF LEAVES AND STEMS

Abstract: *Nicotiana tabacum L., commonly known as cultivated tobacco, is an annual plant widely grown for commercial purposes. This study provides a comprehensive overview of its morphological characteristics, phytochemical composition, and microscopic features of leaves and stems. The plant contains significant levels of nicotine, phenolics, and other bioactive compounds. Microscopic analysis revealed characteristic features such as bicollateral vascular bundles, glandular and non-glandular trichomes, and calcium oxalate crystals (cystoliths). Additionally, post-harvest tobacco leaf residues were analyzed using conventional solvents and Natural Deep Eutectic Solvents (NaDES) to extract bioactive metabolites, highlighting their potential for cosmetic and therapeutic applications. These findings enhance our understanding of N. tabacum's structural and chemical properties and suggest sustainable uses for tobacco biomass.*

Keywords: *Nicotiana tabacum, tobacco, morphology, phytochemicals, alkaloids, microscopic features, leaves, stems*

Introduction

Nicotiana tabacum L., a member of the Solanaceae family, is a tropical annual plant widely cultivated worldwide for tobacco production. It reaches heights of 1–3 meters, with large oval, elliptic, or obovate leaves used primarily for cigarette and other tobacco products. N. tabacum is believed to be a hybrid of N. sylvestris, N. tomentosiformis, and possibly N. otophora. Tobacco cultivation generates trillions of kilograms of biomass waste annually, negatively impacting the environment. Identifying and utilizing bioactive compounds from tobacco residues offers an opportunity to repurpose this biomass for cosmetic and therapeutic applications.

Materials and Methods

Plant Material

N. tabacum var. Virginia plants were cultivated under controlled conditions. Leaves and stems were collected at various developmental stages for morphological, phytochemical, and microscopic analysis. Post-harvest residues were collected during “topping” and processing operations.

Phytochemical Analysis

Conventional solvents (water, acetone, ethanol) and Natural Deep Eutectic Solvents (NaDES: LAS, FGS, SALA, CU, CAP) were used to extract bioactive compounds from leaf and stem residues. Alkaloid and phenolic content, sugar concentration, and antioxidant activity (ABTS and H_2O_2 scavenging) were measured.

Microscopic Examination

Fresh and dried leaf and stem samples, as well as fine powders, were analyzed using light microscopy. Features examined included epidermal cell shape, stomatal type, vascular bundles, trichomes, mesophyll structure, and presence of calcium oxalate crystals.

Results

Morphological Features

N. tabacum plants grew 1–3 m in height with thick, sparsely branched stems and large leaves up to 50 cm long. Flowers were paniculately arranged and varied in color from white to pink or red. Fruit capsules were narrow, elliptic to ovoid, measuring 1.5–2 cm.

Phytochemical Composition

Nicotine concentration increased with plant maturity, representing 64% in leaves, 18% in stems, 13% in roots, and 5% in flowers. The plant also contained polysaccharides, phenolics (rutin, chlorogenic acid), amino acids (glutamine, asparagine, GABA), pyridine alkaloids, and indole alkaloids (yohimbine, harmaline). Megastigmatrienone was identified as a key aromatic compound responsible for tobacco fragrance and industrial applications.

NaDES extraction yielded higher phenolic content compared to conventional solvents (18.13–21.98 mg AGE/g tobacco powder). CU, FGS, and acetone/ethanol extracts exhibited the highest alkaloid concentrations (6.37–11.23 mg ACE/g tobacco powder). Extracts also showed significant antioxidant activity.

Component / Extract	Leaves	Stems	Roots	Flowers	Notes
Nicotine (%)	64	18	13	5	Increases with plant maturity
Polysaccharides	✓	✓	✓	✓	Present in all plant parts
Phenolics	✓	✓	✓	✓	Includes rutin, chlorogenic acid
Amino acids	✓	✓	✓	✓	Includes glutamine, asparagine, GABA
Pyridine alkaloids	✓	✓	✓	✓	Nicotine 90–95%, nornicotine/anatabine ~2.5%
Indole alkaloids	✓	✓	✓	✓	Includes yohimbine, harmaline
Megastigmatrienone	✓	–	–	–	Key aromatic compound
NaDES Phenolic Content (mg AGE/g)	18.13–21.98	–	–	–	Higher than conventional solvents
Alkaloid Content (mg ACE/g)	CU: 6.37–11.23	FGS: 6.37–11.23	–	–	CU, FGS, Acetone/Ethanol extracts highest
Antioxidant Activity	✓	✓	✓	✓	Significant in all extracts

Microscopic Features

Leaf and stem tissues displayed bicollateral vascular bundles, 6–9 glandular trichomes, multicellular non-glandular trichomes, and cystoliths. Epidermal cells exhibited sinuous anticlinal walls with anomocytic stomata in leaves. Mature leaves contained abundant cystoliths in the mesophyll. Stem cross-sections showed elongated cortical parenchyma, medullary parenchyma, fibers, and vascular bundles. Powdered samples preserved these characteristics, though epidermal fragments were less frequent.

Discussion

N. tabacum exhibits distinct morphological and microscopic traits characteristic of the Solanaceae family. Its rich phytochemical profile, including alkaloids, phenolics, and aromatic compounds, highlights its potential for industrial, therapeutic, and cosmetic applications. NaDES extraction represents a sustainable approach to recovering bioactive compounds from tobacco residues. Microscopic markers, such as anticlinal epidermal walls, cystolith-containing mesophyll, and vascular bundle patterns, allow reliable identification of tobacco leaf and stem tissues, even in powdered forms.

Conclusion: Nicotiana tabacum L. is a structurally and chemically complex plant with high economic importance. Understanding its morphological, phytochemical, and microscopic characteristics facilitates its sustainable utilization. Extraction of bioactive compounds from post-harvest residues using NaDES offers a promising avenue for environmentally friendly applications in cosmetics and therapy.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Kholmurodova, D. K., & Khudoykulov, Z. I. (2023). Use of Waste in the National Economy. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, *25*, 160-162.

2.Амирова, П. Ж., & Худойкулов, Ж. (2025). ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ НАРКОТИКИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД. *Research Focus*, *4*(1), 148-152.

3.Холмуродова, Д. К., Исломов, Л. Б., & Худойкулов, Ж. И. (2023). ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ. *IJODKOR O'QITUVCHI*, *3*(33), 277-281.

4.Икромова, Ш. А., & Худойкулов, Ж. И. (2024). ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. *Research Focus*, *3*(11), 146-150.

5.Zoyirova, S. J., Samadova, M. A., & Xudoyqulov, J. I. (2025). CHILONJIYDA O ‘SIMLIGINING DORIVOR XUSUSIYATLARI. *Экономика и социум*, (7-1 (134)), 341-343.

6.Икромова, Ш. А., & Худойкулов, Ж. И. (2025). ПОЛЬЗА АНТИОКСИДАНТОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И МЕДИЦИНЕ. *Экономика и социум*, (4-1 (131)), 1361-1365.

7.Inomovich, X. J. (2025). FERMENTLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA ULARNING QO’LLANILISHI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 285-291.

8.Inom o’g’li, X. J. (2025). BIOLOGIK FAOL KOMPLEKS BIRIKMALAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, *38*(1), 319-325.

9.Vozhehova, R., Borovyk, V., & Ubaydullaev, J. (2025). Inheritance of yield and fiber length in hybrids cotton of the first generation F1. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 151, p. 04001). EDP Sciences.

10.Xayrullayeva, D. M., Davronova, M. P., Xalimov, B. J., & Ubaydullaev, J. N. (2024). KOLLOID ERITMALARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI VA QONNING KRIOSKOPIYA USULIDA MUZLASH HARORATINI ANIQLASH. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, *4*(4-1), 272-276.

11.Ubaidullaev, J. N., Vakhin, A. V., Katnov, V. E., Trubistina, S. A., & Mukhamadiev, N. K. (2023). Assessments of Chemical Composition and Properties High-Viscosity Oil Based on Elemental. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, *4*(5), 332-339.

12.Холмуродов, Т. А., Мирзаев, О. О., & Убайдуллаев, Ж. Н. (2023). КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. In *Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа* (pp. 62-63).

13.Дустмуродов, М. М. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. *ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. Учредители: Олимп*, (9), 42-47.

14.Дустмуродов, М. М. У. (2022). КВАЛИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗАГЛАВНЫХ ЭПИТЕТОВ В ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИХ НАДПИСЯХ. *Проблемы современной науки и образования*, (9 (178)), 42-47.

Shuxratov Sh. Sh.
Biotexnologiya, injenering va farmatsiya fakulteti
Farmakognoziya va farmatsevtik texnalogiyalar kafedrasi magistranti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DORIXONA TARMOQLARIDA TOVARLARNI TAQSIMLASH VA LOGISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy-amaliy tadqiqot dorixona tarmoqlarida tovarlarni taqsimlash hamda logistika tizimini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Ishda dori vositalari va tibbiy mahsulotlarning harakat zanjiri, ta’minot jarayonlarini tashkil etish, zaxiralarni boshqarish usullari va logistika infratuzilmasini rivojlantirish yo‘nalishlari atroflicha yoritilgan. Tadqiqot natijalari dorixona faoliyati samaradorligini oshirish va aholini dori vositalari bilan barqaror ta’minlashga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *dorixona tarmoqlari, logistika tizimi, tovarlarni taqsimlash, raqamli logistika, ta’minot zanjiri, axborot texnologiyalari.*

Shuxratov Sh. Sh.
master’s student
Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technologies
Samarkand State Medical University

IMPROVEMENT OF GOODS DISTRIBUTION AND LOGISTICS SYSTEM IN PHARMACY CHAINS

Abstract: *This scientific and practical study is devoted to the issues of goods distribution and improvement of the logistics system in pharmacy chains. The paper comprehensively examines the movement chain of medicines and medical products, the organization of supply processes, inventory management methods, and directions for the development of logistics infrastructure. The research results contribute to improving the efficiency of pharmacy operations and ensuring stable provision of medicines to the population.*

Keywords: *pharmacy chains, logistics system, goods distribution, digital logistics, supply chain, information technologies.*

Asosiy qism

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotning asosiy maqsadi dorixona tarmoqlarida tovarlarni taqsimlash va logistika tizimini zamonaviy iqtisodiy va tashkiliy talablar asosida takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil

etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Dorixona tarmoqlari sog‘liqni saqlash tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ularda logistika jarayonlarining samarali tashkil etilishi dori vositalarini o‘z vaqtida yetkazib berish, mahsulot sifati va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Amaliyotda logistika tizimlarini tashkil etishda ombor xo‘jaligi, transport xarajatlari, axborot almashinuvi va zaxiralarni boshqarish bilan bog‘liq muammolar mavjud.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, logistika tizimini takomillashtirish orqali dorixona tarmoqlarida xarajatlarni kamaytirish, dori vositalarining aylanish tezligini oshirish va xizmat sifati ko‘rsatkichlarini yaxshilash imkoniyati mavjud.

Xulosalar

Xulosa qilib aytganda, dorixona tarmoqlarida tovarlarni taqsimlash va logistika tizimini takomillashtirish aholini sifatli dori vositalari bilan ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy logistika yondashuvlarini joriy etish soha rivojini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. Guidelines on Good Distribution Practices for Pharmaceutical Products.
2. Ballou R. Business Logistics Management. Prentice Hall.
3. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management. Pearson Education.
4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги меъёрий ҳужжатлари.

5. Хасанова, Г. Р., Беканов, Б. С., Бахитов, Ш. Т., & Ходжаева, Ж. К. (2025). ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАЛАНХОЭ. Modern education and development, 18(4), 93-110.
6. Хасанова, Г. Р., Магрипова, Д. Ф., & Алибоева, Ш. У. (2025). РОЛЬ Лимона в жизни человека. образование наука и инновационные идеи в мирЕ, 80(1), 26-32.
7. Khasanova Gulbahor Rakhmatullaevna. Wild plants as an object of study, life safety, use in medicine and industry modern education and develorment ISSN 3060-4567. *Часть–4_ Январь –2025 Выпуск журнала №-18 Стр111-121.*
8. Хасанова, Г. Р., Тошпулатов, Ш. Ш., Расулов, К. Г., & Мамиров, Д. У. (2025). КОРИАНДР ПОСЕВНОЙ–CORIANDRUM SATIVUM L. *Modern education and development*, *18*(4), 80-92.*54.*
9.Raxmatullayevna, X. G., Ko'chimova, F. S., Jumaboyeva, S. E., & Xushvaqtovich, Q. D. (2025). SARIQ PARPIGUL-GENTIAN LUTEA L. *Modern education and development*, *18*(4), 69-79.

Sokhibova Z.O.
assistant
Department of Microbiology, Virology, and Immunology
Bukhara State Medical Institute

MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT LUNG TISSUE UNDER COVID-19 EXPOSURE

Abstract: *COVID-19 primarily affects the respiratory system, causing structural and functional changes in the lungs. This review summarizes morphological alterations in rat lung tissue under SARS-CoV-2 exposure, including alveolar wall thickening, interstitial edema, inflammatory cell infiltration, and microvascular damage. These findings provide insights into pulmonary pathophysiology, guide therapeutic evaluation, and help predict disease progression. Animal models remain essential for studying early lung pathology and developing intervention strategies.*

Keywords : *COVID-19, rat lung, morphological changes, pulmonary pathology, SARS-CoV-2*

Introduction

COVID-19, caused by SARS-CoV-2, has emerged as a global pandemic with profound public health and socioeconomic impacts. While primarily a respiratory disease, COVID-19 can affect multiple organ systems, with the lungs being most severely involved. The virus enters host cells via the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor, highly expressed in alveolar epithelial cells, resulting in direct cytopathic effects, immune-mediated injury, and a cascade of inflammatory responses contributing to pulmonary pathology.

Pulmonary manifestations range from mild interstitial inflammation to severe acute respiratory distress syndrome (ARDS). Histopathological studies in humans reveal diffuse alveolar damage, hyaline membrane formation, interstitial edema, inflammatory cell infiltration, and microvascular thrombosis. However, detailed human studies are limited due to ethical and logistical challenges. Animal models, particularly rats, are valuable for studying cellular and tissue-level mechanisms of SARS-CoV-2-induced lung injury, allowing controlled observations of early morphological changes, disease progression, and therapeutic responses.

Experimental studies in rats permit detailed examination of alveolar architecture, interstitial spaces, vascular endothelium, and inflammatory infiltration. Morphological investigations using light and electron microscopy reveal subtle structural changes such as alveolar septal thickening, edema, epithelial cell degeneration, inflammatory infiltration, and endothelial injury. Understanding these patterns is essential for interpreting pathophysiology, identifying biomarkers of severity, and developing targeted interventions.

Comparative studies between rat models and human pathology enhance understanding of conserved mechanisms of lung injury, viral replication, and

immune response. Such knowledge bridges preclinical research and clinical application, guiding antiviral drug development, immunomodulatory therapy, and prevention of long-term pulmonary complications.

The aim of this review is to summarize morphological alterations in rat lung tissue under COVID-19 exposure, discuss their pathophysiological relevance, and highlight the role of animal models in advancing the understanding of SARS-CoV-2 pulmonary injury.

Methods

This article is theoretical and based on literature analysis; no experimental study was conducted. Scientific publications, reviews, and experimental reports on SARS-CoV-2-induced lung pathology in rats were systematically analyzed.

The review focused on the following morphological features:

- Alveolar structure and wall thickness
- Interstitial edema
- Inflammatory cell infiltration
- Microvascular and endothelial changes
- Comparison with human lung pathology

The goal was to synthesize typical morphological changes in rat lungs under COVID-19 exposure and discuss their implications for research and therapy.

Results

The literature indicates that rat lungs under SARS-CoV-2 exposure exhibit the following key morphological alterations:

1. Alveolar Wall Thickening: Increased septal thickness due to inflammation and cellular infiltration.

2. Interstitial Edema: Fluid accumulation in interstitial spaces reflecting increased vascular permeability.

3. Inflammatory Cell Infiltration: Macrophages, neutrophils, and lymphocytes infiltrate alveolar and interstitial regions.

4. Microvascular Changes: Endothelial damage, capillary congestion, and occasional microthrombi formation.

5. Epithelial Injury: Degeneration of alveolar epithelial cells and loss of ciliated pneumocytes, resembling early human COVID-19 pathology.

These changes correlate with impaired gas exchange and decreased lung compliance observed in both experimental and clinical settings.

Discussion

Morphological analysis of rat lungs under SARS-CoV-2 exposure demonstrates patterns similar to human COVID-19 pathology. Alveolar wall thickening and interstitial edema reflect acute inflammation, while infiltration by immune cells indicates a strong host response. Microvascular alterations, including endothelial injury, support the vascular component of COVID-19 pathophysiology, which may contribute to hypoxia and coagulopathy.

Animal models provide controlled environments for detailed examination of early tissue changes. Rat studies reveal alveolar, interstitial, and vascular alterations that precede clinical symptoms, offering valuable insight into disease mechanisms.

These findings assist in identifying potential therapeutic targets, evaluating intervention strategies, and predicting disease progression.

Limitations include species differences in lung morphology and viral tropism. Therefore, extrapolation to human pathology should be done cautiously. Nevertheless, comparative studies highlight conserved mechanisms of pulmonary injury and immune response, enhancing translational relevance.

In summary, morphological studies in rats provide a foundation for understanding COVID-19 pulmonary pathophysiology, guiding preclinical research and supporting the development of effective therapies.

Conclusion

Morphological alterations in rat lung tissue under COVID-19 exposure—such as alveolar thickening, interstitial edema, inflammatory infiltration, and microvascular damage—mirror key features of human disease. Animal models are essential for studying early lung injury, evaluating therapeutic interventions, and predicting disease outcomes. Comprehensive morphological analysis in experimental models is crucial for advancing knowledge and management of COVID-19-related pulmonary pathology.

References

1. Carsana L, Sonzogni A, Nasr A, et al. Pulmonary post-mortem findings in COVID-19 cases from Northern Italy: a two-centre descriptive study. *Lancet Infect Dis.* 2020;20(10):1135–1140.
2. Fox SE, Akmatbekov A, Harbert JL, Li G, Brown JQ, Vander Heide RS. Pulmonary and cardiac pathology in African American patients with COVID-19: an autopsy series from New Orleans. *Lancet Respir Med.* 2020;8(7):681–686.
3. Polak SB, Van Gool IC, Cohen D, von der Thüsen JH, van Paassen J. A systematic review of pathological findings in COVID-19: a pathophysiological timeline and possible mechanisms of disease progression. *Mod Pathol.* 2020;33(11):2128–2138.
4. Ackermann M, Verleden SE, Kuehnel M, et al. Pulmonary vascular endothelialitis, thrombosis, and angiogenesis in COVID-19. *N Engl J Med.* 2020;383:120–128.
5. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet.* 2020;395:497–506.
6. Barton LM, Duval EJ, Stroberg E, Ghosh S, Mukhopadhyay S. COVID-19 autopsies, Oklahoma, USA. *Am J Clin Pathol.* 2020; 153:725–733.
7. Sauter JL, Schwab TR, Hsieh J, et al. Histopathologic features of lung tissue in fatal COVID-19 cases: a case series. *Hum Pathol.* 2021; 110:39–49.
8. Bradley BT, Maioli H, Johnston R, et al. Histopathology and ultrastructural findings of fatal COVID-19 infections in Washington State: a case series. *Lancet.* 2020;396: e10–e12.
9. Remmelink M, De Mendonça R, D'Haene N, et al. Unspecific post-mortem findings despite multiorgan viral spread in COVID-19 patients. *Crit Care.* 2020;24:495.
10. Ackermann M, Mentzer SJ, Kolb M, Jonigk D. Inflammation and vascular remodeling in COVID-19 lungs. *Cell.* 2020;183:303–317.

Tojiyeva O. A.
tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

GEOMETRIK SHAKLLAR TASHKIL TOPGAN NATURMORTNI TASVIRLASH JARAYONI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada gipsdan tayyorlangan geometrik shakllardan tuzilgan natyurmortni tasvirlash haqida ma`lumotlar keltirilgan. auditoriyada ishlangan mashqlar bilan bir qatorda uyda ushbu geometrik shakllar namunasini vatman qog'ozidan yasab olib, ularni alohida va ikki, uch, to'rt buyum ishtirokida turli kompozitsiyalar tuzib tasvirlash muhimdir. Shakllarni turli holatlarda qo'yish va yoritish orqali chizuvchining fazoviy va hajm borasidagi bilim hamda tasavvurlari rivojlanadi.*

Kalit so'zlar: *Gips geometrik shakllar, Perspektiva qonuni, Surat tekisligi, Buyum tekisligi, Ufq chizig'i, Fazoviy perspektiva*

Tojiyeva O. A.
teacher
of fine arts and drawing

THE PROCESS OF DEPICTING A STILL LIFE COMPOSED OF GEOMETRIC SHAPES

Annotation: *This article presents information on painting a still life composed of geometric figures made of plaster. In addition to the exercises performed in class, it is important to make samples of these geometric figures at home using Whatman paper and depict them individually and in various compositions involving two, three, and four objects. By placing and lighting the figures in different positions, the artist develops their understanding and imagination of space and volume.*

Keywords*: Plaster Geometric Figures, Law of Perspective, Picture Plane, Object Plane, Horizon Line, Spatial Perspective.*

Gips geometrik shakllarning qalamtasviri ham tasviriy san'atning oddiydan murakkabga uslubida amalga oshiriladi. Buning uchun o'quv dasturlarida belgilangandek gips geometrik shakllarni tasvirlash muhimdir. Bu shuning uchun zarurki, bizni o'rab turgan predmetlar dunyosining barchasi geometrik shakllarga ega (shar, kub, prizma, konus, tsilindr va hokazolar). Shakllar tarkibining gipsdan bo'lishining asosiy sababi, ular aksariyat xollarda sun'iy yoritgichlar bilan yoritilib, o'quv – mashq maqsadlarila qo'yiladi. Yorug' soya majmuasi (yorug', soya, yarimsoya, refleks, shaxsiy va tushuvchi sao, yaltiroklik) oq buyumlarda yaqqol ko'rinadi. Bundan tashqori oddiy qora qalam vositasida shakllarning tus munosabatlarni echish orqali talabani tartib bilan ish yuritishga o'rgatadi. Eng muximi dasturda ko'rsatilgan murakkab vazifalarni (me'morlik bo'lagi, gips naqsh

elementi, inson portreti va gavdasi) oddiy geometrik shakllar, tekisliklar bilan tasvirlash uchun zamin bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan barcha malakalarbilan qatorda, geometrik shakllar qalamtasvirini bajarish mashqlari asasida talaba buyumlarning kenglikdagi fazoviy holati, yorug' - soya munosabati va o'zaro nisbatlari kabilar haqida to'la ma'lumotga ega bo'ladi.

Gips geometrik shakllar rasmini chizish bilan parallel ravishda talaba ushbu shakllar nusxasini simdan yasab olishi va buyum tekisligiga turli xolatlarda qo'yib, uning joylashini, konstruktiv tuzilishi,perspektiv qisqarishi, shakllning ko'rinar va ko'rinmas tomonlarini yakkol tasavvur etishi,hamda uzining bilimlarini yanada chukurlashtirishi mumkin. Ayniqsa, bu guruh geometrik shakllarni tasvirlashda ushbu usul talabaga engilik tug'diradi. Chunki, bar shakl ikkinchi bir shaklni to'sib turganda, ularning joylashgan eri, birlashgan joylari (burchaklari), o'zaro nisbatlari yaqqol namoyon bo'ladi.

TASVIRLASHNING ASOSIY QONUN-QOIDALARI.

Perspektiva qonuni. Tasvirlanayotgan buyumlar, ushbu buyumning qaysi tomonidan qatiy nazar (uzoqdan, yaqindan, yuqoridan, pastdan, to'g'ridan yoki chekkadan) chizuvchiga o'zgarib ko'rinadi. masalan, kubni u yoki bu tomonga burib, uning tomonlarini chizuvchiga o'zgarib ko'rinishini kuzatamiz.

Buyumlarni tekislikda haqqoniy tasvirlashda rassom perspektiva qonuniga bevosita murojaat qiladi. bu holatni shunday ta'riflash mumkin: «***Tabiatdagi barcha buyumlar qanday shaklga ega bo'lmasin, perspektiv qonun va qoidalarga bo'ysunadi***»,

Perspektiv qonunlarni mukammal o'rganib, har qanday buyumning ko'rinar va ko'rinmas tomonlarini to'g'ri tasvirlash mumkin.

Perspektiva qonunlarining asosiy xususiyatlari shundaki, buyumlar qanday kattalikda bo'lmasin, chizuvchidan uzoqlashgan sari va tekislikda qanday joylashganiga qarab perspektiv qisqaradi.

O'z navbatida perspektiv qonuni haqqoniy tasvirlash **«alifbo»** laridan bo'lgan *«sura'at tekisligi», «buyum tekisligi», «ko'rish maydoni», «ko'rish nuqtasi», «ufq chizig'i»* kabi qonuniyatlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Surat tekisligi deb tasvirlanayotgan natyurmort, manzara, portret va hokazolar bilan rassom orasidagi bo'shliqqa aytiladi.

Fiziologik nuqtai nazardan qaraganda, yorug'lik chizilayotgan buyumga tushib, rassomga u yoki bu buyumning shakli ko'rinadi. Shundan keyingina, rassom uni idrok etib tasvirlashga o'tadi. Surat tekisligi rassom bilan natura o'rtasidagi vosita bo'lib xizmat qiladi.

Buyum tekisligi deb tasvirlanayotgan buyumning joylashgan tekisligiga aytiladi. Buyum tekisligi vazifasida stol, pol, er va boshqa chizish uchun bajariladigan moslama bo'lishi mumkin.

Ko'rish maydoni bu chizuvchining tasvirlanayotgan buyumni ko'rish vaqtida qamrab olishdir. Rassom tasvirlanayotgan ob'ektning qancha uzoqlashib borgan sari uning maydoni ham kengayib boradi, bu esa tasvirlanayotgan ob'ektning hamma qismlarini aniq ko'rish va tasvirlashga imkon yaratadi. Lekin, ob'ektdan juda katta masofada turib ham, undagi hamma bo'laklarni va xajmlarni

to’laqonli tasvirlash ancha qiyin. Aksincha, tasvirlanayotgan ob’ektga yaqin masofada turib ham, ushbu ob’ektdagi hamma qismlarni ko’z bilan ilg‘ab olish mashkul. Shuning uchun har qanday tasvirni bajarayotganda chamalash orqali masofani to’g‘ri tanlay olish, ko’rish maydonini to’g‘ri belgilash rassomdan mahorat talab etadi. Ko’p hollarda rassomlar tasvirlanayotgan predmet kattaligining 3 hissa ko’paytirilganiga teng masofada turib tasvirlaydilar. Masalan, inson qomatini to’laqonli tasvirlash uchun rassom naturadan taxminan 5-5,5 metrlar masofada turishi kerak.

Ufq chizig‘i deb, ko’zimiz balandligidan o’tadigan nurga aytiladi. Buni aniqlash uchun qog‘ozni olib uni gorizontal holatda ko’zimiz darajasigacha ko’tarib ufq chizig‘ini aniqlashimiz mumkin. Buyum chizuvchiga uch holatda ko’rinishi mumkin.

1. Ufq chizig‘idan yuqorida.
2. Ufq chizig‘idan pastda.
3. Ko’zimiz nuri balandligida (ufq chizig‘i balandligi darajasida).

Ufq chizig‘i har doim ko’zimiz nuri balandligidan o’tadi. Agar biz yuqoriga chiqsak u biz bilan ko’tariladi, pastga tushsak ufq chizig‘i ham pastda kuzatiladi.

Fazoviy perspektiva deb buyumlarning fazo (bo’shliq) ta’sirida o’zgarib (qisqarib) ko’rinishiga aytiladi. Fazo – tiniq muhitdir. Lekin, uning tiniqligi tabiatning turli hodisalari ta’sirida o’zgarib turishi mumkin. Masalan: havo namligi, atmosfera bosimining o’zgarishi, havodagi chang-to’zonning ta’sirida va boshqalar. Shuning uchun tasvirlanayotgan ob’ektning fazo bo’shlig‘ida qay darajada chuqur joylashganiga qarab rang, nisbat, tus va undagi alohida bo’laklarning (yaqqol yoki xira) ko’rinishlariga keskin ta’sir etadi.

Fazo perspektivasi ob’ektning kunning qaysi vaqtida tasvirlanayotganligiga (ertalab, kunduzi, kechqurun) yil fasllari (bahor, yoz, kuz,) hamda atmosfera o’zgarishiga (quyosh yoki bulut) qarab ham o’zgaradi.

Fazoviy perspektivada bir necha asosiy qoidalari mavjud bo’lib, ular quyidagilardan iborat:

1. *Bajarilayotgan tasvir rassomga yaqin bo’lgan buyumlar yaqqol, uzoqdagilar esa umumiy ko’rinadi. tasvirda fazoni sezdirish uchun yaqin masofada joylashgan buyumlarni yaqqol, uzoqdagilarni esa umumiy tarzda tasvirlash kerak.*

2.*Fazo bo’shlig‘ida (kengligida) joylashgan buyumlar chizuvchidan qanchalik uzoqda joylashgan bo’lsa, xira tusda ko’rinadi. Tasvirda fazoviy perspektivani to’g‘ri ko’ratish uchun uzoqda joylashgan buyumlarni ozroq engil oldingi qatordagi buyumlarni esa yaqqol tasvirlash kerak.*

3.*Yaqin masofada joylashgan buyumlar fazoda yaqqol hajmli bo’lib ko’rinadi, uzoqdagilari esa xiraroq ko’rinadi. tasvirlashda ham ushbu tartibga rioya qilmoq zarur.*

4.Chizuvchidan uzoqroq joylashgan buyumlar, atmosfera bosimi ta’sirida siyohrang, havorang va och tusda ko’rinadi. fazoviy perspektivani yanada kuchliroq ko’rsatish uchun yaqin masofadagi yaqqol ko’rinib turgan buyumlarni aniqroq chizgilar bilan, uzoqdagilarni esa ochroq tusda tasvirlash mumkin.

5.Oldingi qatorda joylashgan buyumlar haqiqiy o'z tusida (rangida), uzoqdagilari bir xil bo'lib ko'rinadi. Fazoviy perspektivaning bu qonuni rassomdan oldingi masofada joylashgan buyumlarni yaqqol, uzoqdagilarni esa umumiy tarzda xiraroq qilib tasvirlashni talab etadi.

Fazoviy perspektivaning ushbu qonuni-qoidalariga rioya qilish talaba uchun muhimdir. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan qoidalar talabaning qanday vazifa bajarishidan qat'iy nazar (portret, natyurmort, manzara va hokazo) kuzatilishi mumkin.

Buyumlarni tasvirlashda yorug' va soyalar katta ahamiyatga ega naturaga qo'yilgan buyumlarga yorug'lik tik tushsa ularning tasviri shunchalik yaqqol ko'rinadi. Aksincha chetdan tushayotgan yorug'lik buyumga umumiy tarzda tushib bajarilayotgan tasvirni xiraroq bo'lishiga olib keladi. Yorug'lik bir buyumdan urilib (sinib) ikkinchisi va uchinchisiga tushishi mumkin. Bu hol tasvirlanayotgan buyumlardagi yorug' va soyalar majmuasini tashkil etadi. Ular quyidagilardan iborat:

a) yorug'lik;
b) soya;
v)yarim soya;
g)aks yorug'lik;
d)yaltiroqlik.

Adabiyotlar:

1. Prozorova M. N. et al. University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation //Linguistics and Culture Review. – 2021. – Т. 5. – №. S3. – С. 1574-1585.
2. Ortiqboy S. S., Makhsudali J. A Desire Sung in a Pattern //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 6-9.
3. Mamadjananivich B. B. et al. IT is Necessary to Feed the World with Beauty! //International Journal on Integrated Education. – Т. 3. – №. 8. – С. 215-217.
4. Khaydarovich A. A. et al. Colors in Descriptive Art //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2020. – Т. 2. – №. 12. – С. 20-22.
5. Sattorova S. O. PATTERN SUNG ON THE CARPET //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-1. – С. 445-448.
6. Sattorova S., Nabieva S. The role of fine art in technology science //Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 02. – С. 167-171.
7. Muhammedovich S. U. et al. Problems of Teaching Drawing at School //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – Т. 4. – №. 1. – С. 35-39.
8. Boymetov B. "Qalamtasvir". Darslik 1-qism. "Musiqa nashriyoti"- Toshkent, 2006.
9. B. Boymetov, S. Abdirasilov, Chizmatasvir,-T., "G'ofurG'ulomnomidaginashrlyot-manbaaijodiyuyi". 2004.

10. Bovmetov B. "Portret qalamtasviri”. O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU-Toshkent. 2002.
11. Tojiev B. “Qalamtasvir asoslarini o'rganish”. - Toshkent. 2011.

Tolibova A. E.
assistent
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1.
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0009-0007-6118-6223

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR RECURRENCE OF ENDOMETRIOD CYST AND FERTILITY-SAVING TREATMENT STRATEGIES

Annotation: *Endometrioid ovarian cysts are a common form of endometriosis, with recurrence rates of 12–30% within 2–5 years despite surgical treatment. Identifying factors associated with recurrence helps predict disease course and improve preventive strategies. This paper reviews current therapeutic approaches and evaluates the role of assisted reproductive technologies in preserving and restoring ovarian function.*

Keywords: *endometrioid cyst, recurrence, risk factors, ovarian reserve; infertility; in vitro fertilization; prevention.*

Endometriosis is a common gynecological disease in women of reproductive and perimenopausal age, caused by the formation of ectopic endometrial tissue [1,2]. It affects up to 10% of women of reproductive age and is more frequent in women with infertility (30%) or chronic pelvic pain (45%) [2]. Endometrioid ovarian cysts are the most common manifestation of endometriosis and are found in 10–14% of women undergoing pelvic surgery. Recurrence rates after surgery range from 12–30% within 2–5 years and are higher in widespread or infiltrative forms of the disease [1]. Understanding the factors and course of endometriosis helps predict the risk of cyst recurrence and guide clinical management.

Patients with recurrent endometrioid cysts often have long-term infertility, miscarriages, therapeutic abortions, and other gynecological disorders, reflecting shared factors such as hyperestrogenism, progesterone resistance, and chronic inflammation [3,11]. Menstrual blood reflux into the abdominal cavity weakens immunity and promotes recurrence. Family history of benign or malignant tumors, especially maternal, indicates genetic predisposition [4]. Overexpression of SF-1 and ER-β in endometrial stem cells enhances estradiol and COX-2-mediated PGE2 production, driving inflammation and cyst recurrence; ER-β also reduces progesterone receptor expression, contributing to resistance [5].

Diagnosis is challenging, with delays averaging 7 years and up to 30, reducing reproductive potential and sometimes leading to widespread extragenital disease [6]. Laparoscopy is standard, while tumor markers like CA-125 show high specificity but low sensitivity [6,7]. Hereditary predisposition is ~50% [8]. GWAS studies associate SNPs in WNT4, VEZT, ID4, NFE2L3, CDKN2BAS1, GREB1, IL1A, ETAA1, FN1, and RND3 with higher risk [8]. Suppression of tumor

suppressors (CDKN2A/B, ARF) and activation of early developmental genes (HOXA, HOXB, WNT4) enable endometrial metaplasia and peritoneal implantation, while inflammation hyperactivates estrogen genes and disrupts progesterone signaling [7,8].

Immunological factors: Recent studies confirm that immune system dysfunction plays a key role in endometriosis development [9]. Patients show increased numbers of peritoneal macrophages with functional deficiencies, which normally recognize and lyse damaged tissues and ectopic endometrial cells. Higher macrophage content in lesions correlates with disease severity and macrophage reactivity in peritoneal fluid [8,9].

Activated macrophages produce TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-8, while VEGF, FGF, IGF-1, and TGF-β promote angiogenesis in the peritoneal fluid [7,9]. Leukocyte infiltration and inflammation, driven by prostaglandins, metalloproteinases, cytokines, and chemokines, are essential for endometriotic implant development [5].

Cytokines, produced by monocytes/macrophages, granulocytes, lymphocytes, fibroblasts, endothelial and stromal cells, regulate proliferation, differentiation, and immune responses [4]. Proinflammatory cytokines include IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, IL-12b, IL-17, IL-18, IFN-α/β/γ, and TNF-α/β, while anti-inflammatory cytokines include IL-4, IL-10, IL-13, and TGF-β [7]. Changes in the balance between pro- and anti-inflammatory cytokines favor implantation and survival of ectopic endometrial tissue [2].

Infectious and extragenital factors, and clinical course: Patients with recurrent ovarian endometriosis often have histories of chronic infections, such as tonsillitis, measles, or scarlet fever, which indirectly damage the reproductive system and predispose to metabolic disorders [10]. Extragenital pathology is more pronounced in these patients, including cardiovascular (17.3%), thyroid (16.3%), gastrointestinal (14.5%), hepatobiliary (14.5%), and CNS disorders (0.9%) [10]. Chronic gastrointestinal and hepatobiliary diseases can slow metabolism, impair immune responses, and promote hyperestrogenism, contributing to ovarian dyshormonal changes. Obesity and diabetes exacerbate insulin resistance and hyperinsulinemia, reducing sex hormone-binding globulin and increasing aromatase activity, thus promoting hyperestrogenism [7,10].

Clinically, recurrent endometrioid cysts show more severe symptoms: hyperpolymenorrhea (65.1%), dysmenorrhea (82.6%), and dyspareunia (82.6%), compared to non-recurrent cases (8.2%, 7.1%, 15.3%) [2,7]. Symptom severity correlates with vascular disorders, infiltrative endometriosis, and pelvic adhesions. Recurrence is often signaled by pain resumption and elevated CA-125 levels. Preoperative assessment using patient complaints, ultrasound with color Doppler mapping, and CA-125 can help predict morphological variants: glandular-cystic forms have higher CA-125 (~149.2) versus cystic forms (~26.5) [2,10].

Conservative treatment: Conservative therapy for endometriosis focuses on suppressing estrogen locally or systemically or acting hormonally on endometrioid lesions [8]. Common drugs include progestins (dienogest 2–4 mg), combined oral

contraceptives (COCs), and GnRH agonists, which induce a hypoestrogenic state but are limited by side effects and rebound after discontinuation [8–11]. Analgesics like NSAIDs relieve pain but are generally ineffective for disease control [5].

Drug therapy alone fails in 11–24% of patients, and symptoms recur in 17–34% after stopping treatment [10,11]. Combining hormonal therapy with surgery is often most effective [11]. Postoperative hormonal therapy should consider reproductive plans [1]. GnRH agonists protect ovarian reserve, restore fertility, and may avoid radical surgery [14,15]. COCs should be used continuously to prevent estrogen peaks, and adjuncts like Diosmin may reduce hormone-dependent pain [1].

Surgical treatment of endometriomas: Surgical management of endometriomas is controversial. Women with endometriomas show a faster decline in serum AMH compared to healthy peers, highlighting the importance of early diagnosis and treatment to preserve ovarian reserve [5]. However, cystectomy may further reduce ovarian reserve, with AMH declining by 39.5% (unilateral) and 57% (bilateral) 9–12 months postoperatively [11].

Factors influencing AMH decline include preoperative AMH levels and bilaterality of the endometriomas [10]. Age appears less important. High baseline AMH may allow better postoperative reserve despite greater follicle loss. Recurrent or repeat surgeries are more damaging than primary cystectomy, significantly reducing antral follicle count in the re-operated ovary [2].

Conclusion. Recurrent ovarian endometriosis is a multifactorial disease driven by hormonal, genetic, immunological, and metabolic factors. Immune dysregulation and chronic inflammation support implantation and survival of ectopic tissue, while hyperestrogenism and obesity worsen disease progression. Conservative hormonal therapy can relieve symptoms and preserve fertility, but recurrence is common, and surgery may reduce ovarian reserve, particularly in bilateral or repeat cases. Optimal management requires early diagnosis and an individualized combination of medical and, when necessary, surgical treatment to balance symptom control and fertility preservation.

LITERATURE

1. Ikhtiyarova G.A., Aslonova M.Zh., Kurbanova Z.Sh., Kalimatova D.M. Prospects for the diagnosis of endometriosis taking into account the role of genetic factors in the pathogenesis of the disease. RMJ. Mother and Child. 2021;4(1):12–16. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-1-12-16.

2. Becker CM, Gattrell WT, Gude K, Singh SS. Reevaluating response and failure of medical treatment of endometriosis: a systematic review. *Fertil Steril* . 2017; 108(1): 125-136. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.05.004.

3. Ikhtiyarova , G. A., M. Zh ., A., Z. Sh. , K., & Kalimatova , D. M. (2021). Prospects for the diagnosis of endometriosis taking into account the role of genetic factors in the pathogenesis of breast cancer. *Mother and child* , *1* , 12-16.

4. Goulielmos GN, Matalliotakis M, Matalliotaki C et al. Endometriosis research in the-omics era. Gene. 2020; 741:144545. DOI: 10.1016/j. gene.2020.144545.

5. Vercellini P., Vigano P., Somigliana E., Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(5):261–275. DOI:

10.1038/nrendo.2013.255. Jiang D, Nie X. Effect of endometrioma and its surgical excision on fertility (Review). *Exp Ther Med.* 2020; 20(5): 114. DOI: 10.3892/etm.2020.9242.
6. Kasapoglu I, Ata B, Uyaniklar O, Seyhan A, Orhan A, Oguz SY, Uncu G. Endometrioma-related reduction in ovarian reserve (ERROR): A prospective longitudinal study. *Fertil Steril.* 2018; 110: 122-127. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2018.03. 015.
7. Vercellini P., Vigano P., Somigliana E., Fedele L. Endometriosis: pathogenesis and treatment. Nat Rev Endocrinol. 2014;10(5):261–275. DOI: 10.1038/nrendo.2013.255.
8. Oripova F.Sh., Khamdamov B.Z., Ikhtiyarova G.A. The role of immunogenetic factors in the occurrence of ovarian endometriosis // New day in medicine. - Bukhara, 2022. - No. 12 (50). - P. 454-456 . (14.00.00; No. 22)
9. Lagana AS, Garzon S, Gotte M et al. The pathogenesis of endometriosis: molecular and cell biology insights. Int J Mol Sci. 2019;20(22): E5615. DOI: 10.3390/ijms20225615.
10. Oripova F.Sh ., Tolibova AE Andenomyosis and Endometrioid ovarian cyst as Cause of infertility: real or imaginary connection // American Journal of Medicine and Medical Sciences . - 202 4 . - N 14 (6). - P. 1489-1494. (14.00.00; No. 2)
11. Oripova F.Sh . Prognostic value of cancer markers in ovarian endometriosis in women of reproductive age // Journal Bio Web of conferences. - 2024. - 121, 03009. - P. 1-4. (Scopus)

УДК 616.157/ 616-002.2

Tosheva D.R.
https://orcid.org/0000-0003-1991-7444
assistant
Department of Microbiology, Virology, and Immunology
Bukhara State Medical Institute

DESCRIPTION OF THE PARAMETERS FOR ASSESSING MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS USING BACTERIOLOGICAL METHODS

Abstract: *Tuberculosis is known to be one of the most widespread infections in the world, affecting humans and animals. Its causative agent, Mycobacterium tuberculosis and related pathogens, was discovered by R. Koch and has been proven by numerous researchers. Although the disease caused by this pathogen can be localized in various organs, the pathological process is predominantly localized in the lungs. Differentiating the pathogen among the 74 currently existing species of mycobacteria is extremely difficult, so bacteriological diagnosis of tuberculosis is given considerable attention.*

Keywords: *tuberculosis, prevalence, multidrug resistance, extensive drug resistance.*

Considering that the pathogenicity and virulence of pathogens vary under the influence of environmental factors, the condition of the host, and, accordingly, certain other biological characteristics, it becomes clear that identification of the causative agent is crucial in the diagnosis of this disease. The presence of an endogenous reactive process in tuberculosis makes bacteriological diagnosis of this disease essential. Taking into account the above, the goal was to conduct a comparative study of the level of detection of the tuberculosis pathogen by microbiological methods and to make a well-founded conclusion, interpreting the results obtained.

Materials and Methods: The object of the study consisted of patients with tuberculosis who were permanent residents of the Bukhara region and received treatment at the Bukhara Regional Center of Phthisiology and Pulmonology. A total of 315 patients were included in the study, the majority of whom were elderly. Among the examined patients, 195 (61.90 ± 2.73%) were men and 120 (38.10 ± 2.73%) were women. Patients aged 50–70 years predominated in the study population, accounting for 67.62 ± 2.64% (n = 213) of all cases.

At present, among the various methods used for the diagnosis of tuberculosis, bacteriological methods are considered one of the most important. Without etiological verification of the disease, the prescription of adequate anti-tuberculosis therapy and the assessment of its effectiveness are significantly limited.

This method enables identification of the causative agent and confirmation of the established clinical diagnosis. Although the bacteriological detection rate of various infectious diseases is relatively low (up to 36.0%) (Nuraliev N.A. et al., 2014; Mukhammedov I.M. et al., 2016), the bacteriological method is regarded as an essential diagnostic tool. This also applies to tuberculosis, which has not lost its relevance and clinical significance to the present day.

Results and Discussion: The causative agent of tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. The results of the study on the level of bacteriological detection of tuberculosis indicate that a positive bacteriological result was observed in 85,08 ± 2,01% (n = 268) of cases, whereas a negative bacteriological result was identified in 14,92± 2,01% (n = 47) of cases(Table 1).

Parameters of bacteriological detection of the causative agent of tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis.

Detection of *Mycobacterium tuberculosis*	Absolute number	Relative frequency (%)
BK+ (positive bacteriological result)	268	85,08 ± 2,01
BK− (negative bacteriological result)	47	14,92± 2,01
Total	315	100

It is noteworthy that BK-positive results were detected 5.70 times more frequently than BK-negative results. This can be attributed, first, to the implementation of modern bacteriological methods for pathogen identification; second, to the resistance of the causative agent to environmental factors; third, to an increase in the proportion of strains resistant to anti-tuberculosis drugs; and fourth, to the development of immunity in patients. This phenomenon is explained by a decrease in the activity of the immune system (immune reactivity of the macroorganism).

If the frequency of negative bacteriological examination results (n = 14,926) is analyzed, the failure to detect the causative agent during bacteriological testing can be attributed to several factors. First, non-compliance with the rules for sputum collection by the patient (or healthcare personnel), as well as errors during its collection and transportation to the bacteriological laboratory (medical factor). Second, insufficient processing of sputum for bacterioscopic and bacteriological diagnosis in the laboratory, including improper use of flotation and other methods, resulting in the inability to visualize the pathogen within a given microscopic field or the presence of only a very small number of microorganisms in biological samples during bacteriological culture (bacteriological factor). Third, technological errors in the preparation of the primary culture medium for pathogen isolation—Lowenstein–Jensen medium—incorrect incubation of cultures, and inadequate maintenance for a sufficient incubation period (identification factor). Fourth, the emergence of strains with specific biological characteristics, including virulence and drug resistance, under the influence of various factors within the human body (strain variability factor). Fifth, an incorrect initial diagnosis of the patient and the

absence of diagnostic triggers, leading to false-negative results (false-negative result factor).




Figure 1. Factors Leading to a Negative Bacteriological Result During the Cultivation of Mycobacterium tuberculosis, the Causative Agent of Tuberculosis

It is evident that the bacteriological isolation of *Mycobacterium tuberculosis* is a complex process influenced by numerous objective and subjective factors. Therefore, the high professionalism of all personnel involved in the procedure, the use of complete nutrient media, standardized equipment, and the qualification of the primary diagnosing physician are of great importance.

As a result of the bacteriological studies conducted in this manner, a positive bacteriological result was obtained in 85.08% of cases, while a negative result was observed in 14.92% of cases. This indicates that the bacteriological detection rate of *Mycobacterium tuberculosis* is 5.70 times higher using this method.

For the first time, five factors that can lead to a negative bacteriological result were identified: the medical factor, the bacteriological factor, the identification factor, the strain variability factor, and the false-negative result factor. It was shown that, in the identification and differentiation of the pathogen, along with the high qualifications of the bacteriologist and phthisiatrician, the use of standardized equipment, proper preparation of culture media, and correct incubation techniques play an essential role.

In addition to bacteriological examination of patient sputum, the Xpert MTB/RIF Ultra method was also employed for pathogen identification. The sensitivity of this method for detecting *Mycobacterium tuberculosis* reaches up to 98.0%, specificity up to 99.0%, and rifampicin (RIF) resistance detection up to 98.0%. Since the advantages and methodology of this novel approach are described in detail in Chapter II, a detailed discussion here was deemed unnecessary. The

frequency of positive results obtained by both methods is presented for comparison in Table 2.

Parameters of *Mycobacterium tuberculosis* detection by different methods:

Result	Bacteriological Method		Xpert MTB/RIF	
	Absolute	%	Absolute	%
Positive result	268	85,08± 2,01	269	85,40± 1,99
Negative result	47	14,92± 2,01	46	14,60± 1,99

The results confirm the absence of a practically significant difference in pathogen detection: positive results were 85.08 ± 2.01% and 85.40 ± 1.99%, and negative results were 14.92 ± 2.01% and 14.60 ± 1.99%, respectively ($p \leq 0.05$). This indicates that both methods can be effectively used in bacteriological diagnostics.

The Xpert MTB/RIF method is characterized by faster detection compared to the conventional method, while simultaneously indicating strain resistance to rifampicin (RIF). The determination of RIF resistance using this method is presented in Figure 42.



Figure 2. Rifampicin Susceptibility of *Mycobacterium tuberculosis* Strains

As shown in Figure 2, the susceptibility of cultured *Mycobacterium tuberculosis* strains to rifampicin (RIF) was 80.67 ± 2.41% (n = 217), while the detection rate of resistant strains was 19.33 ± 2.41% (n = 52). These values are based on the total number of detected strains (n = 269). It is also noteworthy that the proportion of susceptible strains was significantly higher than that of resistant strains, by a factor of 4.17.

Conclusions: Identification of *Mycobacterium tuberculosis* using the Xpert MTB/RIF method resulted in a positive bacteriological outcome in 85.40% of cases

and a negative outcome in 14.60%, representing a difference of 5.85 times ($P < 0.001$). This detection rate did not differ significantly from that of the conventional bacteriological method (85.08% positive and 14.92% negative, $P > 0.05$). Among the detected strains (n = 269, 85.40%), 80.67% were rifampicin-sensitive, while 19.33% were resistant, with a 4.17-fold higher proportion of sensitive strains.

Consequently, the Xpert MTB/RIF method demonstrated both high sensitivity (98%) and specificity (99%), as well as high bacteriological efficiency. Furthermore, the determination of rifampicin resistance (RIF) enabled rapid and accurate testing, allowing timely and appropriate initiation of anti-tuberculosis therapy.

In recent years, numerous new methods for tuberculosis diagnosis and detection of drug resistance have been recommended. One such method is the HAIN test, which utilizes molecular-genetic techniques to detect resistance of *Mycobacterium tuberculosis* to two first-line anti-tuberculosis drugs—isoniazid (H) and rifampicin (R)—directly in patient sputum. The test is performed on a bacteriological smear that has tested positive. Patient sputum is centrifuged and decontaminated using a test strip. The sensitivity of this test is 98.6%, and specificity is 100%, with a positive predictive value of 100% and a negative predictive value of 97.1% (Khamraev A.K., 2012; Chunkaeva D.D., Mansurova D.A., 2017). Another advantage is the very rapid turnaround time: results are available within 5.5 hours, compared to 10–12 days with the MGIT method, or 3–6 weeks using Lowenstein–Jensen medium.

The advantages of using the HAIN test to determine resistance to first-line anti-tuberculosis drugs (H and R) include: (1) rapid detection of drug resistance within 5.5 hours; (2) prevention of the spread of extensive drug resistance within healthcare facilities; (3) early identification of the patient's drug resistance profile; (4) improvement in infection control compliance; and (5) the ability to classify patients based on diagnosis and drug resistance, enabling timely initiation of appropriate treatment.

However, several organizational challenges are associated with this method: (1) laboratory personnel must be appropriately trained and skilled; (2) the equipment used must be standardized, with operation overseen by specially trained technical staff; (3) personnel must monitor processes to prevent contamination and errors; (4) precise quality control must be maintained according to six standards (MGIT); and (5) due to the high cost of this method, its use must be optimized efficiently.

References

1. Tosheva D.R .Prevalence of extensively drug-resistant tuberculosis //Gumanitar va tabiiy fanlar jurnali 2024-№12.C.117-121.
2. Тошева Д.Р. Лечение лекарственно-устойчивого туберкулеза позвоночника с помощью сочетания хирургического вмешательства и индивидуальной химиотерапии //Тиббиётда янги кун2023№10 (60).C.369-372.
3. Burakova M.V., Vasilyeva I.A., Vaniev E.V., Bagdasaryan T.R., Samoylova A.G. Efficacy of pulmonary tuberculosis chemotherapy in new cases depending on the

time of drug resistance detection. Tuberculosis and Lung Diseases, 2017, no. 11, pp. 63-66. (In Russ.)
4. Clinical recommendations on improvement of diagnostics and treatment of respiratory tuberculosis. Approved by Edict no. 951 by the Russian Ministry of Health as of 29.12.2014. (In Russ.)
5. Samoylova A.G., Burakova M.V., Vasilyeva I.A., Lenskaya V.V., Vaniev E.V. The impact of express rifampicin susceptibility testing on chemotherapy efficiency in those suffering from multiple drug resistant tuberculosis. Tuberculosis and Lung Diseases, 2016, no. 9, pp. 16-21. (In Russ.)
6. Federalnye klinicheskie rekomendatsii po organizatsii i provedeniyu mikrobiologicheskoy i molekulyarno-geneticheskoy diagnostiki tuberkuleza. [Federal clinical recommendations in organization and implementation of microbiological and molecular-genetic diagnostics of tuberculosis]. ROF Publ., Moscow, 2015. 35 p.

Toshmatova Z.J.
o'qituvchisi
Qo'qon davlat universiteti

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR INTELLEKTUAL-IJODIY QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Annotatsiya : *ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual-ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishning nazariy asoslari maktabgacha yoshdagi bolalar intellektual-ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirishning nazariy asoslari, bolalarni ijodiy rivojlantirishga qo'yilgan davlat talablari, bolalar intellektual-ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning o`ziga xos jihatlari haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar*: aqliy,qobiliyatlar, intellektual-ijodiy,rivojlantirish, iqtidor, yosh xususiyati,istedod,ijodkorlik.*

Toshmatova Z.J.
teacher
Kokand State University

THEORETICAL BASIS OF IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL-CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract: *This article discusses the theoretical foundations of identifying and developing the intellectual and creative abilities of preschool children, state requirements for the creative development of children, and specific aspects of developing children's intellectual and creative abilities.*

Keywords: *mental, abilities, intellectual and creative, development, talent, age characteristic, talent, creativity.*

Aqliy qobiliyatning yoshga bog'liq holda rivojlanishi masalasi qator psixologlar tomonidan qayd etilgan. Ammo ta'lim amaliyotida bu muammo chuqur tahlil etilib, turli yoshda bolalarning intellektual salohiyatini oshirib borish bo'yicha ishlarni talab darajasida hal etilgan deb ayta olmaymiz. Aqliy qobiliyatlarning yoshga bog'liq holda rivojlanishi qonuniyatlarini bilish turli yosh davrlarda aqliy qobliyatlarni maqsadga muvofiq holda shakllantirish

Bilim va faoliyat uslubining murakkablashishi ta'lim jarayonida bolalar rivojlanishining asosiy va belgilovchi tomonini tashkil etadi. Masalan, Shvetsariyalik psixolog J. Piaja o'zi olib borgan tadqiqotlar asosida ta'kidlashicha, 7-8 yoshdan kichik bolalar raqam bilan bog'liq faoliyatga qodir emas. Shuningdek, bolaning psixik rivojlanishida ta'lim mazmunining o'zgarishi va uning ta'siri haqida

L.A.Venger, P.Ya.Galperin, D.B.Elkonin, V.V.Davidov va boshqalar asarlarida keng tadqiq etilgan. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar tarbiyasining asosiy vazifalari- jismoniy, aqliy, axloqiy, mehnat tarbiyasi, estetik tarbiya berib borishdan iboratdir. Aqliy qobiliyatlarning individual asoslari o'rtasidagi tafovutlar kabi uning yosh taraqqiyoti bilan bog'liq tafovutlarining mavjudligi ham shubxasizdir. Ya'ni inson psixikasining ontogenezdagi taraqqiyoti bir-biri bilan bog'langan bir rivojlanish bosqichidan ikkinchi sifat jihatdan farq qiluvchi bosqichga o'tish jarayonini ifodalaydi. Bu o'zgaruvchan davrlar, taraqqiyotning bosqichliligi – uzluksiz jarayonni shartli bo'lish natijasi emas, balki bu obyektiv reallikdir.

Ilmiy ta'rifga ko'ra qobiliyat - bu ma'lum bir shaxsning o'ziga xos faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini belgilaydigan individual va psixologik xususiyati. Muayyan qobiliyatlarning paydo bo'lishining tug'ma shartlari, avvalgisidan farqli o'laroq, insonga tug'ilishidan boshlab qo'yiladigan moyilliklardir. Shuni yodda tutish kerakki, qobiliyatlar dinamik tushunchadir, bu ularning doimiy ravishda shakllanishi, rivojlanishi va faoliyatning turli sohalarida namoyon bo'lishini anglatadi. Qobiliyatlarning rivojlanish darajalari doimiy ravishda o'z-o'zini takomillashtirish uchun e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ko'plab omillarga bog'liq. Qobiliyatni rivojlantirish darajalari quyidagicha ajratib ko'rsatiladi:

- qobiliyat;
- iqtidorlilik;
- iste'dod;
- daho.

Shaxsning iqtidorliligini shakllantirish uchun umumiy va maxsus qobiliyatlarning organik birikmasi bo'lishi kerak va ularning jadal rivojlanishi ham zarurdir.

Aqliy qobiliyatlarning yoshga bog'liq jihatlarini tadqiq etish bo'yicha psixologiya juda boy tajribaga ega. Chet el psixologlaridan J.Piaje, Dj.Kelli, A.Vallon, Rus psixologlaridan L.S.Viygotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leontyev, L.I.Bojovich, V.A.Muxina, E.A.Golubeva, N.S.Leytes, o'zbek psixologlaridan M.G.Davletshin E.G'.G'oziev, B.R.Qodirov, Z.T.Nishanova va boshqalar tafakkur va aqliy qobiliyatning yoshga bog'liqligini turli yo'nalishlarda o'rganganlar. Jumladan, taniqli o'zbek psixologi E.G'.G'ozievning «Tafakkur psixologiyasi» nomli asarida bu boradagi tadqiqotlar keng yoritilgan. Shvetsariyalik psixolog J.Piaje intellekt muammosiga o'z shaxsiy nuqtai nazaridan kelib chiqib yondoshgan. J.Piaje intellekt nazariyasini ikkita muhim jihatga, ya'ni intellekt funktsiyalari va intellekt davrlariga ajratadi. J.Piaje mulohazasiga ko'ra, intellektning asosiy funktsiyalari qatoriga uyushqoqlik (tartiblilik) va adaptatsiya (moslashish, ko'nikish) kiritilgan bo'lib, ular intellektning funktsional invariantlari deb yuritiladi. Shuningdek muallif intellektning quyidagi rivojlanish bosqichlarini ajratib ko'rsatadi:

1. Sensomotor intellekt davri (tug'ilgandan 2 yoshgacha);
2. Operatsiyalardan ilgarigi tafakkur davri (2 yoshdan 7 yoshgacha);
3. Konkret (yaqqol) operatsiyalar (aqliy harakatlar davri 7, 8 yoshdan 11, 12 yoshgacha);

4. Formal (rasmiy) operatsiyalar (aqliy harakatlarni maqsadli amalga oshirish davri).

Har bir yosh davrida tafakkur va aqliy qobiliyatning namoyon bo'lishi, shakllanishi va ijodiy shaxsni shakllantirish hozirgi bosqichda pedagogik nazariya va amaliyotning muhim vazifalaridan biridir. Uning rivojlanishi maktabgacha yoshdan samaraliroq boshlanadi. V.A. Suxomlinskiy aytganidek: "Bolalarning qobiliyatlari va iste'dodlarining kelib chiqishi. Tasavvur bilan aytganda, eng nozik iplar barmoqlardan chiqadi - ijodiy fikr manbai bo'lgan oqimlar. Boshqacha qilib aytganda, bolaning qo'lida qanchalik mahoratli bo'lsa, bola shunchalik aqlli bo'ladi. Ko'p o'qituvchilarning fikriga ko'ra, barcha bolalar qobiliyatli. Shu sababli, vaqt o'tishi bilan bu qobiliyatlarni sezish, his qilish va bolalarga ularni amalda, haqiqiy hayotda namoyish etish imkoniyatini berish uchun imkon qadar tezroq harakat qilish kerak. Kattalar yordamida badiiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirgan holda, bola yangi asarlar yaratadi (rasm, dastur). Har safar biron bir ob'ektni yaratish usullarini sinab ko'rganida, o'ziga xos bir narsa paydo bo'ladi. O'zining estetik rivojlanishida maktabgacha tarbiyachi elementar vizual-sezgi taassurotidan yetarli darajada vizual va ifodali vositalarga ega asl tasvirni (kompozitsiyani) yaratishga o'tadi. Shunday qilib, uning ishlashi uchun asos yaratish kerak. Bola qanchalik ko'p ko'rsa, eshitsa, boshdan kechirsa, uning tasavvuridagi faoliyati shunchalik muhim va samaraliroq bo'ladi.Bolalikda ma'lum bo'lganidek, bolaning hayollari va hayollari juda muhim rol o'ynaydi. Ammo qancha odam bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kerakligini o'ylaydi. Afsuski, ko'pchilik kattalar bolaning hayollarini rivojlantirishga etarlicha e'tibor bermaydi, bu esa kelajakda bolalaming imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Ijodkorlik har bir inson hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Tasavvur va fantaziya har ikki munosabatlarda ham, ishda ham odamlarga yordam beradi, lekin eng muhimi, ijodiy insonlar har qanday biznesda muvaffaqiyatga erishishga yordam beradigan o'zligini namoyon eta oladi.

Intellektual qobiliyatlar - bu shaxsning ta'sirchanligi, predmetni idrok qilishining kuchliligi va yaxlitligi, u to`grisida keng ma'lumotlarga ega bo`lishdir. Shunindek, tafakkur o`zgaruvchanligi va tezkorligi (tez, xilma-xil, uziga xos), mantiqiy va savodli mulohaza yuritish, tizimli harakatlar, sintez-taxlil-sintez, ijodiy ifodalay bilish, umumlashtirish va xulosalash, o`z fikriga ega bo`lish bilan namoyon bo`ladi. Bolalarda intellektual-ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda ta'limning amaliy va nazariy shakllarini innovatsion didaktik metodlarni qo`llash orqali amalga oshiriladi natijada zamonaviy malakali shaxsni shakllantirishga erishiladi. Qobiliyatlarni aniqlash xanuzgacha psixologiyaning eng qiyin vazifalaridan biridir. Turli vaqtlarda ko'plab olimlar ushbu sifat uchun o'zlarining tadqiqot usullarini taklif qilishgan. Biroq, hozirgi paytda insonning qobiliyatini mutlaq aniqlik bilan aniqlashga, shuningdek uning darajasini aniqlashga imkon beradigan metodologiya mavjud emas.

Asosiy muammo shundaki, qobiliyatlar miqdoriy ravishda o'lchandi, umumiy qobiliyatlarning rivojlanish darajasi chiqariladi. Ammo, aslida, ular dinamik ko'rsatkichlar bilan qarash kerak bo'lgan sifat ko'rsatkichidir. Ushbu sifatni o'lchash

uchun turli xil psixologlar o'zlarining usullarini ilgari surishgan. Masalan, L. S. Vigotskiy proksimal rivojlanish zonasi orqali bolaning qobiliyatini baholashni taklif qildi. Bunda bola avval kattalar bilan birgalikda, so'ngra mustaqil ravishda muammoni hal qilganida, bu ikki tomonlama tashxisni o'z ichiga oladi.

Ijodiy qobiliyatlarning paydo bo‘lishi haqida bir qancha farazlar mavjud. Birinchisiga ko‘ra, ijodiy qobiliyatlar aqlli odamda asta-sekin, uzoq vaqt davomida paydo bo‘lgan va insoniyatdagi madaniy va demografik o‘zgarishlar, xususan, aholi sonining ko‘payishi, eng aqlli kishilarning qobiliyatlarini qo‘shish natijasida yuzaga kelgan deb ishoniladi. Inson qobiliyatlari har qanday yoshda o'zini namoyon qilishi mumkin. Biroq, ular qanchalik tez aniqlansa, ularning muvaffaqiyatli rivojlanish ehtimoli shunchalik katta bo'ladi. Shuning uchun hozirgi paytda ta'lim muassasalarida bolaligidanoq qobiliyatlarni rivojlantirish darajalari aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Djurayeva B.R., Tojiboyeva H.M.,G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari” Toshkent-20
2. Axmedova X.va boshqa… «Bolangiz maktabga tayyormi?» T.., 2000y.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
4. T.Z Jumanovna - Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy, 2022 - giirj.com МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ GALAXY (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Том. 10, выпуск 11, ноябрь. (2022) 538 ОРГАНИЗАЦИЯ Страница 1 ГАЛАКТИКА .
5. Jumanovna-Toshmatova, Zamiraxon. "OILADA FARZANDLAR O’ZARO MUNOSABATLARI XUSUSIYATLARI." *Scientific article* 1.1 (2024).
6. Jumanovna, Toshmatova Zamira, Alisherova Zarnigorbegim, and Gulsevar Abdusattor. "PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE." *Web of Teachers: Inderscience Research* 1.9 (2023): 136-138.

Toshpulotova I.I.
1st-year master's student
Neonatology Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute

ADAPTIVE MECHANISMS, NURSING CARE, AND CLINICAL MANAGEMENT ALGORITHM FOR NEWBORNS WITH HYPOTHERMIC SYNDROME: EFFECTIVENESS OF THERMOBLANKETS IN TERM AND PRETERM INFANTS

Abstract: *Neonatal hypothermia is defined as a decrease in body temperature below 36.5°C and is considered a major contributor to neonatal morbidity and mortality [1]. Newborns, especially preterm infants, have limited thermoregulatory capacity because of immature skin, low subcutaneous fat, and a high body surface area [2]. Adaptive mechanisms in hypothermic newborns include peripheral vasoconstriction, non-shivering thermogenesis through brown adipose tissue, and increased metabolic activity [3]. However, prolonged cold stress leads to hypoglycemia, metabolic acidosis, respiratory distress, and increased oxygen consumption [4]. Effective nursing care includes immediate drying after birth, use of radiant warmers or incubators, early skin-to-skin contact, and continuous temperature monitoring [5].*

Keywords: *neonatal hypothermia, adaptive mechanisms, thermoregulation, nursing care, thermoblanket, preterm infant, management algorithm*

Introduction

Globally, neonatal hypothermia affects up to 40–80% of newborns in low- and middle-income countries and remains a critical determinant of survival. Preterm infants are particularly vulnerable because of immature skin barrier, reduced subcutaneous fat, large body surface area, and poor vasomotor control. Hypothermia is associated with hypoglycemia, metabolic acidosis, respiratory distress syndrome (RDS), sepsis, intraventricular hemorrhage, and increased neonatal mortality. Therefore, strengthening thermal care practices is essential for improving neonatal outcomes.

Adaptive Mechanisms in Newborns with Hypothermic Syndrome

Newborns maintain body temperature primarily through non-shivering thermogenesis mediated by brown adipose tissue. Cold stress activates sympathetic pathways, increasing oxygen consumption and glucose utilization. In preterm infants, insufficient brown fat and immature enzymatic systems lead to rapid depletion of energy stores. Prolonged hypothermia disrupts cardiovascular stability, reduces cardiac output, and compromises pulmonary function. Consequently, adaptive capacity becomes overwhelmed, predisposing the infant to multi-organ dysfunction.

Nursing and Medical Care Strategies

Comprehensive thermal care should begin immediately after birth and continue throughout hospitalization. Key strategies include:

- Drying and wrapping immediately after delivery
- Maintaining delivery room temperature at 26–28°C
- Skin-to-skin contact (kangaroo mother care)
- Use of incubators or radiant warmers
- Application of thermoblankets
- Warmed intravenous fluids and humidified oxygen
- Continuous axillary temperature monitoring

Education of healthcare providers and caregivers is essential to ensure consistent implementation of these measures.

Clinical Management Algorithm

1. Measure axillary temperature at admission
2. Classify hypothermia (mild, moderate, severe)
3. Initiate warming using thermoblanket or incubator
4. Monitor temperature every 30–60 minutes
5. Assess for associated conditions (RDS, sepsis, asphyxia)
6. Provide targeted treatment
7. Reassess and modify warming strategy

Effectiveness of Thermoblankets

Thermoblankets minimize heat loss through evaporation, convection, conduction, and radiation. Clinical studies demonstrate that their use reduces the incidence of persistent hypothermia and shortens rewarming time, particularly in preterm infants. Compared with conventional methods alone, thermoblankets provide an additional protective barrier and improve thermal stability during transport and routine care.

Table 1. Classification and Clinical Impact of Neonatal Hypothermia

Severity	Temperature (°C)	Physiological Effects	Clinical Outcomes
Mild	36.0–36.4	↑ metabolism	Hypoglycemia
Moderate	32.0–35.9	↑ O_2 consumption	RDS, acidosis
Severe	<32.0	Cardiovascular instability	High mortality

Mild hypothermia: A slight drop in temperature, increases metabolism, and may cause low blood sugar.

Moderate hypothermia: More serious, increases oxygen consumption, and can lead to respiratory distress syndrome (RDS) and metabolic acidosis.

Severe hypothermia: Life-threatening; cardiovascular stability is impaired, with a high risk of mortality.

Table 2. Comparison of Thermal Protection Methods

Method	Mechanism	Advantages	Limitations
Kangaroo care	Direct heat transfer	Low-cost	Requires mother
Incubator	Controlled environment	Precise	Expensive
Radiant warmer	External heat	Easy access	Dehydration risk

Method	Mechanism	Advantages	Limitations
Thermoblanket	Heat conservation	Portable, effective	Needs monitoring

Kangaroo care: Skin-to-skin contact; very low-cost, but depends on the Provides a controlled and precise environment, but expensive.

Radiant presence of the mother.

Incubator: warmer: Convenient for care, but increases the risk of dehydration.

Thermoblanket: Portable and effectively conserves heat; requires careful monitoring.

Conclusion

Neonatal hypothermia remains a major clinical challenge. Understanding adaptive mechanisms and implementing structured care algorithms, including routine use of thermoblankets, can significantly improve neonatal survival, particularly in preterm infants.

References

1. World Health Organization. Thermal protection of the newborn. Geneva; 1997.
2. World Health Organization. Essential newborn care. Geneva; 1996.
3. Demtse AG, et al. Hypothermia in Preterm Newborns: Impact on Survival. Global Pediatric Health. 2020.
4. Mullany LC. Neonatal hypothermia in low-resource settings. Semin Perinatol. 2010.
5. Lunze K, et al. Global burden of neonatal hypothermia. BMC Med. 2013.
6. Chang HY, et al. Outcomes in very low birth weight infants with admission hypothermia. PLoS One. 2015.
7. Miller SS, et al. Hypothermia in very low birth weight infants. J Perinatol. 2011.
8. Lee HC, et al. Delivery room management and hypothermia prevention. Pediatrics. 2014.
9. Mullany LC, et al. Neonatal hypothermia and mortality. Arch Pediatr Adolesc Med. 2010.
10. Ogunlesi TA, et al. Point-of-admission hypothermia among Nigerian newborns. BMC Pediatr. 2008.
11. Wilson E, et al. Admission hypothermia and neonatal outcomes. J Pediatr. 2016.
12. Silverman WA, Sinclair JC. Temperature regulation in the newborn. N Engl J Med. 1966.
13. Kattwinkel J, et al. Neonatal resuscitation guidelines. Circulation. 2010.
14. Manani M, et al. Elimination of admission hypothermia. Perm J. 2013.
15. Muhe LM, et al. Causes of illness and death in preterm infants in Ethiopia. Lancet Glob Health. 2019.

UDK: 635.26

Turdiyeva F. T., ***Q.x.f.f.d., PhD***
“Meva sabzavotchilik va uzumchlik” kafedrasi katta o‘qituvchisi
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
O‘zbekiston

EKISH MUDDATINI OPTIMALLASHTIRISHNING SARIMSOQNING VEGETATIV ORGANLARINI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sarimsoq piyozni maqbul ekish muddatlarini aniqlash va turli muddatlarda ekib etishtirishda fenofazalarning davomiyligi, nihollarning yoppasiga paydo bo‘lishi, piyozchalarning dala unuvchanligi hamda boshqa ko‘rsatkichlar o‘rganildi.*

Kalit so‘zlar: *sarimsoqpiyoz, maqbul ekish muddatlari, o‘sib rivojlanish, oyining I-dekadasi, Mayskiy VIR navi, chin barglar paydo bo‘lishi, piyozbosh shakllanishi, hosilni yig‘ish, o‘suv davri.*

Turdiyeva F. T., PhD in Agricultural Sciences.
Senior Lecturer
Department of “Fruit and Vegetable Growing and Viticulture”
Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies
Uzbekistan

THE EFFECT OF OPTIMIZING PLANTING DATES ON THE DEVELOPMENT OF VEGETATIVE ORGANS IN GARLIC

Abstract: *This article identifies the* ***optimal planting dates*** *for garlic and evaluates the* ***duration of phenological phases****, uniform seedling emergence,* ***field germination rates****, and other growth parameters under various planting schedules*

Keywords: *garlic, optimal planting dates, growth and development, the first decade of the month, Mayskiy VIR variety, emergence of true leaves, bulb formation, harvesting, growing season..*

Kirish. Hozirgi kunda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida sarimsoq piyozning (*Allium sativum* L.) kasalliklarga va noqulay tashqi muhit omillariga chidamli, serhosil, ertapishar, vitaminlarga boy bo‘lgan yangi navlarini yaratish, ularni etishtirishning resurs tejovchi agpoтexnologiyalarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 15 oktabrdagi PQ-4863-son “Sarimsoq hamda to‘qsonbosti usulida sabzavot mahsulotlarini etishtirish va eksport qilishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori hamda 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish, dehqon va fermerlar daromadini oshirish ustuvor vazifalar etib belgilangan.

Sarimsoq o‘zining shifobaxsh xususiyatlari, o‘ziga xos ta’mi va parhezbopligi tufayli qadimdan xalq xo‘jaligida katta ahamiyatga ega bo‘lgan. U ovqat tayyorlashda, qayta ishlash sanoatida, shuningdek, tarkibidagi fitontsidlar tufayli bakteriyalarga qarshi vosita sifatida qo‘llanilgan.

Asosiy qism. Sarimsoqpiyozni maqbul ekish muddatlarini aniqlashga doir ilmiy tadqiqot ishi olib borildi. Bunda sarimsoqpiyozni ochiq maydonga Mayskiy VIR navini 4 ta ekish muddati bo‘yicha ekildi. Tajribda sarimsoq piyozni sentabr oyining II-dekadasida ekish – nazorat variant qilib olindi. Nazorat variantga avgust oyining III dekadasi, sentabr oyining I-dekadasi va sentabr oyining III-dekadasi taqqoslanib o‘rganildi. Tajribada o‘simliklarning rivojlanish fenofazalarning davomiyligi aniqlandi. Bunda sarimsoq piyozchalarini yerga ekilgandan so‘ng nixollarni yoppasiga paydo bo‘lishi, piyozchalarni daladagi unuvchanligi, 2-3 chin barglar paydo bo‘lishi, piyozbosh shakllanishi, poyalarning sarg‘ayishi, piyozboshlarning texnik pishib etilishi, hosilni yig‘ish va o‘suv davri aniqlandi

Ilmiy tadqiqotda sarimsoq nixollarni yoppasiga paydo bo‘lishi variantlararo 15-19 kunni tashkil etgan bo‘lsa, nazorat variantga nisbatan avgust oyining III-dekadasida ekilgan variant yaqinroq, ya’ni 16 kunni tashkil etgan. Qolgan variantlar nazorat variantdan 3-4 kun ertaroq nixollari paydo bo‘lganligi kuzatildi. Nisbatan eng erta nixollarni paydo bo‘lishi sentabr oyining III-dekadasida ekilgan variantda aniqlangan bo‘lib, 19 kunni tashkil etgan. Sarimsoq piyozni dalada unuvchanligi bo‘yicha variantlar bo‘yicha farqlanish 81,3 foizdan 90,6 foizgachani tashkil etib, ularning ichida eng yuqori natijani sentabr oyining I-dekadasida ekilgan variantda kuzatilgan bo‘lib u 90,6 foizni tashkil etgan. Eng kam ko‘rsatkich esa avgust oyining III dekadasida ekilgan variantda bo‘lgan. Sababi avgust oyida xaroratning yuqori bo‘lishi ekilgan piyozchalar unuvchanligiga salbiy ta’sir etgan.

Tajribada nixollar paydo bo‘lgandan ikkinchi va uchinchi chin barglarning paydo bo‘lishi ham kuzatilgan. Bunda avgust oyining III dekadasi va sentyabr oyining I-dekadasida ekilgan variantlarda bu o‘suvfazasi bir xilda 15 kuni kuzatilgan. Nazorat variantda 17 kuni kuzatilgan bo‘lsa, sentabr oyining III-dekadasida ekilgan variantda esa 20 kuni kuzatilgan. Tajribada piyozbosh shakllanishi fazasi bo‘yicha variantlararo 193-209 kunni tashkil etgan. Nazorat variant piyozboshlari 204 kunda shakillangan bo‘lib, unga nisbatan avgust oyining III-dekadasi va sentabr oyining I-dekadasida ekilgan variantlar (200-193 kun) 4-11 kun ertaroq piyoz bosh hosil qilgan. Nazoratga nisbatan sentabr oyining III-dekadasida ekilgan variant (209 kun) 5 kun kechroq ushbu fazani bosib o‘tgan.

Olib borilgan tajribada turli muddatlarda ekilgan sarimsoq o‘simligi poyalarning sarg‘ayishi va piyozboshlarning texnik pishib etilishi ham kuzatildi. Bunda asosiy piyozboshlarning texnik pishib etilishi bo‘yicha ko‘radigan bo‘lsak, nazorat variantda 239 kunda texnik pishib etilgan bo‘lib, avgust oyining III-dekadasida ekilgan variant bilan deyarli bir xil (238 kunda) ko‘rsatkichga ega bo‘lgan. Nazoratga nisbatan sentabr oyining III dekadasida ekilgan variant (241 kunda) 2 kun kechroq pishgan.

Sentabr oyinin I-dekadasida ekilgan variant esa nazoratga nisbatan (233 kunda) 6 kun erta texnik pishib etilganligi aniqlangan. Bu albatta Qoraqalpog‘iston

Respublikasining janubiy xududida sarimsoqpiyozni sentabr oyining I-dekadasida ekilsa ertaroq pishib etilishi isbotlangan.

Tajribada hosilni yig‘ib olish muddati variantlararo katta farqlanmadi. Bu ko‘rsatkich variantlar bo‘yicha ertapisharda 234 kunda va kech pisharda 242 kunda yig‘ib olingan.

Barglarning uzunligi bo‘yicha ham eng yuqori ko‘rsatkich sentabr oyining I-dekadasida ekilgan variantda 50,6 sm ni tashkil etgan. Barglarning eni ham navlararo 2,2-2,8 sm ga bir biridan farqlangan.

Tajribada sarimsoq o‘simligi soxta poyasining balandligi aniqlangan bo‘lib, bunda may oyining uchinchi dekadasida olib borilgan kuzatuvlarga ko‘ra, nazorat variantda 58,4 sm ni tashkil etib, undan sentabr oyining III-dekadasida ekilgan variant kam 52,1 sm ko‘rsatkichni namoyon etgan. Qolgan barcha variantlar esa nazoratdan yuqori natijalarni ko‘rsatgan. Nisbatan eng yuqori natijani sentabr oyining I-dekadasida ekilgan variantda sohta poyaning uzunligi 67,2 sm bo‘lganligi aniqlangan. Soxta poya diametri bo‘yicha variantlararo 2,0-2,4 sm ni tashkil etib, o‘zaro katta farqlanmadi.

Tadqiqot natijalari. Tajribada sarimsoqpiyozni o‘simligi bir tup poyasining o‘rtacha vazni may oyining uchinchi dekadasidaga o‘lchab xisoblab chiqilganda variantlararo farqlanish kuzatilgan. Bunda nazorat sentabr oyining II -dekadasida ekilgan variantda 202 gramni tashkil etib, eng kam ko‘rsatkich sentabr oyining III-dekadasida ekilgan variantda 195 gram ekanligi aniqlandi. Qolgan variantlar esa nazoratdan 18-35 gramga yuqori ekanligi ma’lum bo‘ldi. Bir tup poyaning o‘rtacha vazni bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich sentabr oyining I-dekadasida ekilgan variantda 237 gram ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, sarimsoq o‘simligini etishtirishda, sentabr oyining I-dekadasida ekilganda o‘simlik er ustki qismining kuchli o‘sib rivojlanganligi aniqlandi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, Andijon viloyati sharoitida sarimsoq piyozning o‘sib rivojlanishi, vegetatsiya davomiyligi va hosildorlik ko‘rsatkichlari ekish muddatiga bevosita bog‘liqdir. Tajriba natijalariga ko‘ra, turli muddatlarda ekilgan sarimsoq o‘simliklarining vegetativ rivojlanishi, piyozboshlarining unuvchanligi, fenologik fazalarning kechishi va yakuniy hosil miqdorida sezilarli farqlar kuzatildi. Tajriba variantlari ichida sentyabr oyining I-dekadasida ekilgan sarimsoq o‘simligi barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlik qildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, Andijon viloyati sharoiti uchun sarimsoq piyozni ekishning eng maqbul muddati — sentyabr oyining I-dekadasi hisoblanadi. Ushbu muddatda ekilgan o‘simliklar tez va bir maromda rivojlanadi, yuqori hosil shakllantiradi hamda piyozboshlarning pishib etilishi yanada tez kechadi. Shu bois, sarimsoq etishtiruvchi dehqon va fermer xo‘jaliklariga aynan ushbu ekish muddatidan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 15 oktabrdagi “Sarimsoq hamda to‘qsonbosti usulida sabzavot mahsulotlarini etishtirish va eksport qilishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4863 sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 29 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi xududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari Davlat reestri. – Toshkent, 2020. – B. 42-43.
4. Sherimov D.Sh. //Qoraqalpog‘istonning janubiy xududlarida Sarimsoq piyoz etishtirishning texnologik elementlarini ishlab chiqish//. Avtoreferat 2025. -20 b.

Tõxtayeva Sh. X.
Biotexnologiya, injenering va farmatsiya fakulteti
Farmakognoziya va farmatsevtik texnalogiyalar kafedrasi magistranti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DORIXONALARDA FARMATSEVTIKA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Annotatsiya: *Mazkur ilmiy-amaliy ish dorixonalarda farmatsevtika xizmatlarini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan. Tadqiqotda farmatsevtika xizmatlarining zamonaviy talablari, `aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifati, dorixonalar faoliyatida mijozga yo‘naltirilgan yondashuv, raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv usullarining o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, farmatsevt mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, dori `vositalaridan oqilona foydalanishni targ‘ib qilish hamda sog‘liqni saqlash tizimidagi dorixona xizmatlarining ijtimoiy ahamiyati yoritiladi.*

Kalit so‘zlar: *dorixona, farmatsevtika xizmati, xizmat sifati, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, mijozga yo‘naltirilgan yondashuv.*

To‘xtayeva Sh. X.
master’s student
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technologies
Faculty of Biotechnology, Engineering and Pharmacy
Samarkand State Medical University

IMPROVING PHARMACEUTICAL SERVICES IN PHARMACIES

Annotation: *This scientific and practical work is devoted to the issues of improving pharmaceutical services in pharmacies.This scientific and practical work is devoted to the issues of improving pharmaceutical services in pharmacies. The study analyzes modern requirements for pharmaceutical services, the quality of services provided to the public, and the scientific and practical work done is devoted to improving pharmaceutical services in pharmacies. The study analyzes modern pharmaceutical requirements, the quality of services provided to the public, a customer-oriented approach to pharmacies, the role of digital technologies and innovative management methods. It will also highlight the improvement of the professional competence of pharmacists, the promotion of the rational use of medicines and the social importance of pharmacy services in the healthcare system.*

Keywords: *pharmacy, pharmaceutical services, quality of service, innovation, digital technologies, customer-oriented approach. Improving pharmaceutical services in pharmacies*

Kirish

Hozirgi kunda sog‘liqni saqlash tizimida dorixonalarning o‘rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Dorixona nafaqat dori vositalarini sotish joyi, balki aholiga farmatsevtik maslahatlar beriladigan, profilaktika va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiladigan muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Shu sababli dorixonalarda farmatsevtika xizmatlarini takomillashtirish, ularning sifatini oshirish va zamonaviy talablar asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

Farmatsevtika xizmatlarining samaradorligi aholining dori vositalaridan to‘g‘ri va xavfsiz foydalanishiga, davolash jarayonining natijadorligiga hamda sog‘liqni saqlash tizimining umumiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy sharoitda raqamli texnologiyalar, elektron retseptlar, avtomatlashtirilgan hisob tizimlari va innovatsion xizmat modellari dorixona faoliyatining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Mazkur ishning asosiy maqsadi dorixonalarda farmatsevtika xizmatlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda xizmat sifatini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning asosiy vazifalari:

farmatsevtika xizmatlarining mazmuni va ahamiyatini ochib berish;

dorixonalarda xizmat ko‘rsatish sifatiga ta’sir etuvchi omillarni tahlil qilish;

zamonaviy innovatsion va raqamli texnologiyalarning dorixona faoliyatidagi o‘rnini baholash;

farmatsevt mutaxassislarning kasbiy rolini kuchaytirish yo‘llarini asoslash.

Tadqiqot orqali dorixonalarda dori vositalarining oqilona taqsimlanishi, farmatsevt xodimlarning kasbiy malakasini oshirish, zamonaviy innovatsion va raqamli texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari ham o‘rganiladi. Shuningdek, aholining farmatsevtik savodxonligini oshirish va profilaktik tadbirlarni samarali amalga oshirish yo‘llari ham baholanadi.

Metodologiya: Dorixonalarda farmatsevtika xizmatlari keng ko‘lamli faoliyatni o‘z ichiga oladi: dori vositalarini to‘g‘ri saqlash va realizatsiya qilish, retsept asosida va retseptsiz dori vositalarini berish, bemorlarga farmatsevtik maslahatlar ko‘rsatish, dori vositalarining nojo‘ya ta’sirlari haqida ma’lumot berish hamda profilaktik tadbirlarda ishtirok etish.

Xizmat sifatini oshirishda farmatsevt xodimlarning kasbiy bilim va ko‘nikmalari muhim ahamiyatga ega. Farmatsevt nafaqat sotuvchi, balki tibbiy jarayonning faol ishtirokchisi sifatida bemor bilan samarali muloqot olib borishi, dori vositasini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berishi lozim. Shu bois uzluksiz ta’lim, malaka oshirish kurslari va treninglar farmatsevtlar faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

So‘nggi yillarda dorixona xizmatlarini takomillashtirishda raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Elektron retsept tizimlari, dori vositalarining elektron bazalari, avtomatlashtirilgan ombor va savdo dasturlari ish jarayonini soddalashtirib, xatoliklarni kamaytiradi. Bundan tashqari, onlayn maslahatlar va

mobil ilovalar orqali aholiga farmatsevtik xizmat ko‘rsatish imkoniyatlari kengaymoqda.

Dorixonalarda mijozga yo‘naltirilgan yondashuvni rivojlantirish ham muhim yo‘nalishlardan biridir. Mijozlarning ehtiyoj va talablarini inobatga olgan holda xizmat ko‘rsatish, qulay muhit yaratish, axborotning ochiqligi va tushunarliligini ta’minlash asosiy vazifa hisoblanadi.

Eksperemintal qism: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, dorixonalarda farmatsevtika xizmatlarini takomillashtirish xizmat sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Farmatsevt mutaxassislarning bilim va kompetensiyasini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda mijozga yo‘naltirilgan xizmat modelini rivojlantirish orqali aholining dori vositalaridan oqilona foydalanish darajasi yaxshilanadi.

Shuningdek, dorixona xizmatlarining takomillashuvi sog‘liqni saqlash tizimida profilaktik tadbirlarning kuchayishiga, dori bilan bog‘liq xatoliklarning kamayishiga va umumiy davolash natijalarining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy xizmat modeli dorixonalarni faqat savdo nuqtasi sifatida emas, balki sog‘liqni saqlash tizimining strategik bo‘g‘ini sifatida mustahkamlaydi. Shu bilan birga, dori vositalari bilan bog‘liq xatoliklar kamayadi, davolash samaradorligi oshadi va aholining sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchi kuchayadi.

Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, dorixonalarda farmatsevtika xizmatlarini takomillashtirish sog‘liqni saqlash tizimining muhim strategik yo‘nalishlaridan biridir. Zamonaviy yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar va yuqori malakali kadrlar asosida tashkil etilgan farmatsevtika xizmatlari aholining sog‘lig‘ini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi.

-Dorixonalarda mijozga yo‘naltirilgan xizmatlar joriy etilishi aholining dorixonaga bo‘lgan ishonchini oshiradi va farmatsevtik savodxonlikni rivojlantiradi.

-Raqamli texnologiyalar, elektron retseptlar va avtomatlashtirilgan tizimlar xizmat tezligi va aniqligini oshirib, xatoliklarni kamaytiradi.

-Farmatsevtlar kasbiy salohiyatini oshirish orqali dori vositalarining to‘g‘ri tanlanishi va ishlatilishi ta’minlanadi.

-Dorixonalar nafaqat dori savdosi nuqtasi, balki sog‘liqni saqlash tizimining faol hamkori sifatida o‘z ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

Kelgusida dorixona xizmatlarini yanada rivojlantirish uchun farmatsevtlarning kasbiy mas’uliyatini oshirish, raqamli xizmatlarni kengaytirish va xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa dorixonalarning nafaqat savdo nuqtasi, balki sog‘liqni saqlash tizimining faol va ishonchli hamkoriga aylanishini ta’minlaydi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Dorixona faoliyatini tashkil etish va farmatsevtika xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar. – Toshkent, 2023.

2. Karimov I.A. Farmatsevtika faoliyatini boshqarish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Abdukarimov A.A., Raximova D.Sh. Dorixonalarda farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirish masalalari. // Farmatsiya jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–49.
4.Хасанова, Г. Р., Тошпулатов, Ш. Ш., Расулов, К. Г., & Мамиров, Д. У. (2025). КОРИАНДР ПОСЕВНОЙ–CORIANDRUM SATIVUM L. Modern education and development, 18(4), 80-92.5. Babar Z.U.D. Pharmacy Practice Research Methods. – Springer, 2019.
6.Хасанова, Г. Р., & Ботиров, Х. Т. (2025). НАШ ДОЛГ—СОХРАНИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 79(1), 35-38.
7.Хасанова, Г. Р., & Ходжаева, Ж. К. (2025). РЕВЕНЬ ТАНГУТСКИЙ–RHEUM TANGUTICUM. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 79(1), 39-45.
8.Rakhmatullaevna, K. G., Abdumutalibovich, X. D., & Faxriddinovich, X. U. (2025). WILD PLANTS AS AN OBJECT OF STUDY, LIFE SAFETY, USE IN MEDICINE AND INDUSTRY. Modern education and development, 18(4), 111-121.
9.Хаснова, Г. Р., Магрипова, Д. Ф., & Алибоева, Ш. У. (2025). Роль лимона в жизни человека. образование наука и инновационные идеи в мире, 80(1), 26-32.
10.Хасанова, Г. Р. Химический анализ биологически активных веществ в корневищах и корнях девясил высокий-inula helenium l., произрастающего на территории средний азии. образование наука и инновационные идеи в мире, 79(3), 157-164..
11.Mustafayevich, O. S., & Raxmatullayevna, X. G. (2025). Study of the effects of external conditions on the performance of the" tpg-sn4" methane detector. Research Focus, 4(6),

Khilola S.U.
assistant
Department of Microbiology, Virology, and Immunology
Bukhara State Medical Institute
Nuridinov A.M.
assistant
Department of Epidemiology
Samarkand State Medical University

LABORATORY METHODS FOR EARLY DETECTION OF THE ANTHRAX PATHOGEN AND THEIR PREVENTIVE SIGNIFICANCE

Abstract: *Anthrax is a highly dangerous zoonotic infection caused by Bacillus anthracis, capable of producing severe and often fatal disease in humans and animals. The pathogen's ability to form environmentally resistant spores contributes to long-term persistence in soil and recurrent outbreaks in endemic regions. Early laboratory detection of the causative agent plays a decisive role not only in improving clinical outcomes but also in preventing the spread of infection. This review-based article analyzes modern laboratory diagnostic methods for early identification of Bacillus anthracis and highlights their importance in epidemiological surveillance and preventive strategies.*

Keywords: *anthrax, Bacillus anthracis, early diagnosis, laboratory detection, prevention, zoonotic infections*

Introduction

Anthrax remains one of the most epidemiologically significant zoonotic infections worldwide. The disease is caused by *Bacillus anthracis*, a Gram-positive, spore-forming bacterium characterized by exceptional environmental resistance. Its spores can survive in soil for decades, creating persistent natural foci of infection. Because of this resilience, anthrax continues to pose a public health threat, particularly in regions with developed livestock farming.

According to the World Health Organization, anthrax occurs primarily in agricultural areas where humans are in close contact with infected animals or animal products. Transmission to humans may occur through skin contact, inhalation of spores, or ingestion of contaminated food. Among these forms, inhalational anthrax is the most severe and is associated with high mortality rates if treatment is delayed.

A major clinical challenge is that early symptoms of anthrax are often nonspecific and resemble other infectious diseases. As the disease progresses, systemic intoxication, sepsis, and multi-organ failure may develop rapidly. Therefore, early laboratory diagnosis is critical for timely initiation of targeted antimicrobial therapy and life-saving interventions.

Materials and Methods

This article is based on a review and analytical synthesis of existing scientific literature, international guidelines, and epidemiological recommendations. No

original experimental or clinical research was conducted. Information regarding classical and modern laboratory diagnostic approaches for anthrax, as well as their preventive and epidemiological value, was systematically analyzed.

Results

Analysis of the literature shows that early laboratory detection of *Bacillus anthracis* relies on several complementary diagnostic approaches.

1. Bacteriological Methods

Isolation of the pathogen from blood, skin lesion exudates, respiratory secretions, or other clinical specimens remains a classical diagnostic approach. Identification is based on colony morphology, Gram staining, absence of motility, and specific biochemical characteristics. Although reliable, culture-based methods require specialized laboratory conditions and time, which may delay urgent clinical decisions.

2. Molecular Genetic Methods

Polymerase chain reaction (PCR) and related molecular techniques enable rapid detection of *Bacillus anthracis* DNA in clinical or environmental samples. These methods provide high sensitivity and specificity and are especially valuable in the early stages of disease or when prior antibiotic therapy may reduce culture yield.

3. Immunological Methods

Serological assays detect specific antibodies or antigens associated with the pathogen. These techniques are useful for retrospective diagnosis, epidemiological studies, and monitoring of immune responses in exposed populations. Enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) are commonly used in this context.

Discussion

Early laboratory detection of the anthrax pathogen has profound clinical, epidemiological, and preventive implications. Even though anthrax is not typically transmitted from person to person, environmental persistence of spores and infection among livestock maintain a continuous risk of outbreaks.

From a clinical perspective, early identification of the pathogen allows prompt initiation of appropriate antibiotic therapy, which significantly reduces mortality, particularly in inhalational forms of the disease. Delayed diagnosis often results in severe systemic complications that are difficult to manage.

From an epidemiological standpoint, laboratory confirmation of anthrax triggers immediate public health interventions. These include identification and monitoring of contacts, disinfection of contaminated environments, control of animal reservoirs, and implementation of quarantine or movement restrictions where necessary. Thus, diagnostic laboratories serve as an early warning system in outbreak prevention.

The integration of veterinary and human health surveillance is especially important because anthrax is a classic zoonosis. The “One Health” approach emphasizes coordinated monitoring of animal infections, environmental contamination, and human cases. Laboratory data form the foundation for risk

assessment and targeted preventive measures such as livestock vaccination and public awareness campaigns.

Modern molecular techniques have dramatically shortened diagnostic turnaround times compared to traditional bacteriological methods. However, classical culture methods remain indispensable for full pathogen characterization, antimicrobial susceptibility testing, and forensic or epidemiological investigations. Therefore, a combined laboratory approach is considered the most effective strategy.

International public health authorities, including the Centers for Disease Control and Prevention, emphasize strengthening laboratory preparedness, biosafety protocols, and surveillance systems as key components of anthrax prevention. Early detection not only protects individual patients but also reduces the risk of large-scale outbreaks and potential misuse of the pathogen.

Conclusion

Early laboratory detection of *Bacillus anthracis* is crucial for effective treatment, prevention of disease spread, and implementation of public health control measures. The combined use of bacteriological, molecular, immunological, and rapid diagnostic methods provides the highest diagnostic efficiency. Continuous improvement of laboratory capacity and integration with veterinary and public health systems remain essential components of anthrax prevention strategies.

References

1. World Health Organization. Anthrax in humans and animals. 4th ed. Geneva: WHO Press; 2008.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Anthrax: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. Atlanta: CDC; Updated guidelines.
3. Inglesby T.V., O'Toole T., Henderson D.A., et al. Anthrax as a biological weapon: medical and public health management. *JAMA*. 2002;287(17):2236–2252.
4. Dixon T.C., Meselson M., Guillemin J., Hanna P.C. Anthrax. *New England Journal of Medicine*. 1999;341(11):815–826.
5. Turnbull P.C.B. Guidelines for the Surveillance and Control of Anthrax in Humans and Animals. Geneva: World Health Organization; 1998.
6. World Organisation for Animal Health (WOAH, formerly OIE). Terrestrial Animal Health Code: Anthrax. Paris: WOAH.
7. Dragon D.C., Rennie R.P. The ecology of anthrax spores: tough but not invincible. *Canadian Veterinary Journal*. 1995;36:295–301.
8. Mock M., Fouet A. Anthrax. *Annual Review of Microbiology*. 2001;55:647–671.
9. Hugh-Jones M., Blackburn J. The ecology of Bacillus anthracis. *Molecular Aspects of Medicine*. 2009;30(6):356–367.
10. Sternbach G. The history of anthrax. *Journal of Emergency Medicine*. 2003;24(4):463–467.
11. Нуриддинов А.М. ЗНАЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В РАСПРОСТРАНЕНИИ БЕШЕНСТВА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_6bae4663a1f14a8abb7d760ece3d4061.pdf?index=true

12. Нуриддинов А.М. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_ac6a54589112424893ec5c55650fa361.pdf?index=true
13. Валиева М.У. Значение эпидемиологического процесса в распространении коклюша у детей и подростков.
14. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_ac6a54589112424893ec5c55650fa361.pdf?index=true
15. Нуриддинов А.М. РОЛЬ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_79455b4a02ee4b8a8616ee8c31f593b0.pdf?index=true
16. Nuriddinov Akhmad Mukhammadiyevich.Origin and Epidemiology of Infectious Diseases. https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/7176

ORCID: 0000-0002-0624-2380

Umarova Sh. K.
PhD student
Samarkand Institute of Economics and Service

THE NECESSITY OF IMPROVING THE PRESENTATION OF LEASE LIABILITY PAYMENTS IN CASH FLOW REPORTING IN ENTERPRISES OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article examines the necessity of improving the presentation of lease liability payments in the statement of cash flows of enterprises in Uzbekistan. The study analyzes international accounting standards and evaluates their applicability to Uzbek corporate practice.*

Keywords: *lease accounting, cash flow statement, financing activities, financial transparency, financial reporting, lease liability.*

Umarova Sh. K.
PhD talabasi
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

O‘ZBEKISTON KORXONALARIDA PUL OQIMLARI HISOBOTLARIDA LIZING MASLAHATLARI TO‘LOVLARINI TAQDIM ETISHINI TAKMONLASH ZORATLIGI

Annotatsiya. *Maqolada O'zbekiston korxonalarining pul oqimlari to'g'risidagi hisobotida lizing majburiyatlari bo'yicha to'lovlarni ko'rsatishni takomillashtirish zarurati ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda xalqaro buxgalteriya tahlil qilinadi va ularning O‘zbekiston korporativ amaliyotiga qo‘llanilishi baholanadi.*

Kalit so‘zlar: *lizing hisobi, pul mablag‘lari harakati to‘g‘risidagi hisobot, moliyaviy shaffoflik, moliyaviy hisobot, lizing majburiyati.*

Introduction.

Leasing has become one of the primary mechanisms for financing fixed assets in modern enterprises. In Uzbekistan, the expansion of leasing operations reflects the need for capital investment without immediate large cash outflows. However, the rapid growth of lease financing has introduced new challenges in financial reporting, particularly in the presentation of lease liability payments in the statement of cash flows. The objective of this study is to justify the necessity of disaggregating lease liability payments in Uzbek enterprises and to develop a methodological framework aligned with international standards.

Literature Review.

The issue of lease accounting and its impact on financial reporting has attracted significant attention in recent academic and professional literature. The introduction of IFRS 16 fundamentally transformed the accounting treatment of

leases by requiring recognition of lease liabilities on the balance sheet. Researchers widely agree that this shift enhances financial transparency but also introduces new analytical challenges in cash flow reporting. Similarly, Giner and Pardo (2021) highlight that lease accounting reforms must be accompanied by improved presentation in the statement of cash flows to ensure consistency between balance sheet recognition and cash flow classification[3].

Studies focusing specifically on IAS 7 demonstrate that aggregation of financing-related payments reduces the usefulness of cash flow analysis. Dechow, Ge, and Schrand (2018) show that analysts rely heavily on financing cash flow patterns when assessing debt sustainability.[1] When lease payments are not separated into principal and interest components, leverage indicators become distorted, weakening predictive financial models. Khlif and Achek (2022) further confirm that transparent classification of financing cash flows enhances investors' ability to evaluate long-term solvency[4]. According to Deloitte (2024), IFRS 18 reinforces the requirement that economically different transactions must not be grouped together if such aggregation obscures financial meaning. [2]

Methods

The research is methodological and conceptual rather than empirical. It does not rely on firm-level datasets or econometric testing, but instead focuses on normative accounting development. While this limits statistical generalization, it enables a deeper theoretical integration of international standards and provides policy-oriented recommendations. Future research may extend the framework through empirical validation using financial reporting data from Uzbek enterprises.

Discussion

The leasing market in Uzbekistan has demonstrated significant growth in recent years, indicating an expansion of financing activities that directly impact corporate cash flow structures. According to the Leasing Association of Uzbekistan, the total leasing operations portfolio in 2024 exceeded 8.8 trillion Uzbek soms, and over 11,000 new leasing deals were concluded, marking an 18% increase compared to 2023.

Under international accounting norms, particularly IFRS 16, lease liabilities are recognized on the balance sheet similar to other financial liabilities, and related payments include both principal and interest components. However, if these payments remain aggregated in the statement of cash flows, users cannot differentiate between:

Separating principal and interest components enhances financial ratio analysis. Investors can evaluate debt repayment capacity, financing cash flow dependency, long-term solvency, effective cost of capital.

Results

The research confirms that lease payments represent structured financing transactions that must be analytically separated into principal and interest components. Aggregated reporting masks the true financial structure of lease obligations and weakens the interpretability of corporate cash flow statements.

To demonstrate the analytical impact, a model lease contract was simulated using a standardized financial structure typical for Uzbek enterprises.

Table 1

Simulated lease payment structure (annual)

Indicator	Amount (UZS)	Economic function	Cash flow classification
Total lease payment	1,200,000,000	Composite payment	Aggregated
Principal repayment	900,000,000	Liability reduction	Financing outflow
Interest payment	300,000,000	Financing cost	Operating / Financing

The table shows that 75% of the lease payment represents liability repayment rather than operating expense. When reported as a single figure, the financing burden is underestimated by financial statement users.

When principal repayments are correctly classified as financing outflows, financing cash flow indicators change substantially. Consider the following scenario:

Disaggregation enables accurate calculation of key financial ratios:

- Lease debt coverage ratio
- Financing dependency ratio
- Cash leverage ratio
- Long-term solvency indicators

Without separation of principal and interest, these ratios lose predictive power. The model shows that enterprises with identical operating performance may appear financially stronger simply because lease obligations are hidden in aggregated reporting.

The results demonstrate that: a)Lease payments are financing transactions in substance; b)Aggregation distorts financial analysis; c)Disaggregation improves transparency and ratios; d) The proposed model aligns with IFRS logic; e)Uzbek enterprises would significantly benefit from adoption.

Conclusion

This study demonstrates that improving the presentation of lease liability payments in corporate cash flow reporting is a critical requirement for enhancing financial transparency in Uzbek enterprises. The rapid expansion of leasing as a financing instrument has transformed corporate capital structures, making accurate classification of lease payments essential for reliable financial analysis.

The research confirms that lease payments contain economically distinct components — principal repayment and financing cost — which must be separately reflected to preserve the informational integrity of financial statements. Aggregated reporting obscures financing obligations, distorts leverage indicators, and reduces the predictive value of cash flow analysis. The proposed disaggregation model aligns with IAS 7 classification principles, IFRS 16 lease recognition requirements, and IFRS 18 transparency standards.

In conclusion, separating lease principal and interest payments in the statement of cash flows is not merely an accounting refinement; it is a necessary

step toward modern, transparent, and internationally comparable financial reporting in Uzbekistan.

References

1. Dechow, P. M., Ge, W., & Schrand, C. M. (2018). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. Journal of Accounting and Economics, 66(2–3), 344–401. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.09.001

2. Deloitte. (2024). IFRS 18: Presentation and disclosure in financial statements — Practical implications. Deloitte IFRS Publications. https://www2.deloitte.com

3. Giner, B., & Pardo, F. (2021). Lease accounting and financial reporting transparency under IFRS 16. European Accounting Review, 30(4), 725–746. https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1811962

4. Khlif, H., & Achek, I. (2022). Financial reporting transparency and debt sustainability: Evidence from IFRS adoption. Journal of International Accounting Research, 21(2), 59–78. https://doi.org/10.2308/JIAR-2020-067

Usmonova R.M.
researcher
Family and Gender Research Institute
Uzbekistan

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN REDUCING WOMEN'S INFORMAL EMPLOYMENT

Abstract. *Women are disproportionately represented in informal employment due to structural constraints such as unequal care burdens, limited access to stable jobs, weak social protection, and restricted mobility and time availability. This article reviews two advanced policy models that have demonstrated practical pathways for reducing women's informality: Germany's short-hours "mini-job" system, which simplifies formalization for low-income work, and South Korea's "smart labor centers," which combine digital infrastructure with childcare and hybrid work design. Using a comparative institutional approach, the article explains how each model addresses key drivers of informality—flexibility–security trade-offs, employer compliance costs, and care–work reconciliation—and derives policy lessons relevant for contexts where informality is sustained by household strategies and limited institutional support.*

Keywords: *informal employment, women, formalization, mini-jobs, smart labor centers, care infrastructure, labor institutions*

Introduction. This section frames women's informal employment as a product of social structure and institutional design rather than an individual choice alone. In many economies, women's employment trajectories are shaped by the gendered division of labor inside households, unequal access to childcare services, and labor-market segmentation that channels women into low-paid, flexible, and weakly protected work. Informality often becomes a "coping strategy" that allows women to combine income generation with caregiving responsibilities, yet it usually excludes them from contracts, social insurance, and legal protections.

This section highlights that effective reduction of women's informality typically requires an integrated policy mix. Successful reforms tend to lower barriers to formal entry for both workers and employers, provide flexible legal work arrangements, and expand care-related infrastructure so that paid work becomes feasible across different life stages.

Literature Review: This section applies an institutional and sociological perspective to explain women's persistent concentration in informal employment as an outcome of structured constraints rather than solely individual preference. From this viewpoint, informality is not a marginal phenomenon but a patterned form of labor-market participation that emerges when social roles, household organization, and institutional rules do not align. Women's entry into and continuity within informal work therefore reflects how opportunity structures are shaped by gendered

care responsibilities, unequal access to resources, and the segmentation of labor markets into protected and unprotected zones.

This section conceptualizes women's informality through the interaction of three levels. At the micro level, women's labor supply is mediated by time availability, care burdens, and life-course transitions (pregnancy, childbirth, childrearing, eldercare). Even when women have the motivation and skills to engage in paid work, informality becomes more likely when formal employment requires fixed schedules, long commutes, or inflexible workplace rules. At the meso level, households, kin networks, and community norms affect what types of work are socially acceptable, where women can work, and how income is negotiated within family economies. Household strategies often prioritize risk minimization and flexibility, which can favor informal arrangements that provide immediate earnings and adaptable hours. At the macro level, labor regulations, social insurance design, tax systems, and the enforcement environment structure the costs and benefits of formalization for both employers and workers. Where registration is complex, compliance costs are high, and enforcement is inconsistent, informality becomes the "default" equilibrium for micro-enterprises and household businesses.

This section also draws on labor-market segmentation theory to clarify why informality is durable. Formal labor markets typically offer contractual stability, benefits, and social insurance, but access is often rationed through education credentials, firm size, and sectoral location. Women—especially those with interrupted careers, limited work history, or intensive caregiving responsibilities—may be systematically channeled into the secondary segment characterized by temporary tasks, casual arrangements, and family-based work. In such segments, employment relations may be governed more by social trust, kinship, and short-term reciprocity than by contracts, thereby reproducing informality as a social institution.

This section explains that informality is sustained when three mechanisms reinforce each other. First, rigidity of formal jobs relative to care obligations creates a mismatch between institutional time regimes and women's everyday realities. When formal work demands full-time availability, fixed shift schedules, or inflexible leave, women face a "time poverty" constraint and may choose informal options that allow combining paid work with unpaid care. Second, high compliance costs for micro-employers and household businesses reduce incentives to register workers. Small firms and family enterprises often operate with limited administrative capacity; complex payroll systems, reporting requirements, and contribution rules raise the transaction costs of formal hiring. Third, uneven enforcement and weak incentives produce an institutional environment where non-compliance is not sufficiently costly and formalization does not deliver immediate, visible benefits. If workers do not expect reliable access to social protection or if employers perceive formalization as risky, costly, or bureaucratic, informal work persists as a rational institutional adaptation.

This section emphasizes that women's informal employment is frequently a "flexibility–security trade-off." Flexibility is valuable because it supports care-work reconciliation, but flexibility without institutional protection translates into insecure

earnings, limited bargaining power, and exclusion from social insurance. Therefore, effective policy responses are those that transform the trade-off by embedding flexibility inside regulated and protected forms of employment. In this framework, policies that reduce informality are expected to succeed when they simultaneously:

Create legal "flexible-but-protected" work formats. This includes part-time regimes, mini-jobs, regulated domestic work, seasonal contracts, and hybrid/remote work arrangements that legally recognize non-standard employment while guaranteeing minimum rights. Such formats lower the entry threshold into formality for women and allow gradual transitions across life stages rather than forcing an "all-or-nothing" move into full-time standard jobs.

Simplify taxation and social insurance administration. Formalization becomes more likely when registration is easy, contributions are predictable, and reporting procedures are standardized. Flat-rate contributions, simplified digital registration, and integrated one-stop systems reduce transaction costs for micro-employers and encourage contract-based hiring. For workers, clarity about entitlements—pension accumulation, health insurance coverage, maternity benefits—raises the perceived value of formal status.

Support care-work reconciliation through services and infrastructure. Because care constraints are a central structural driver of women's informality, investments in childcare availability, affordable early education, safe transport, and local service infrastructure have direct labor-market effects. When care services are accessible and work locations are compatible with caregiving, women can sustain continuous employment trajectories and transition into more protected jobs. Importantly, such supports also reduce the need for households to rely on informal "patchwork" income strategies.

This section proposes that the most effective reforms operate as integrated institutional packages rather than isolated interventions. Legal flexibility without social protection can merely re-label informality, while enforcement without feasible formal alternatives can push women out of the labor market altogether. By contrast, combining flexible legal formats, simplified compliance, and care infrastructure builds a credible pathway into formal employment that aligns institutional design with women's lived realities and the structural conditions of household economies.

Case 1. Germany: Short-Hours Work ("Mini-Job") as a Legal Bridge from Informality to Formality

This section shows how Germany operationalizes formalization through a simplified short-hours employment regime. The mini-job model legalizes low-income, part-time work by setting clear thresholds, standardizing contracts, and lowering administrative complexity. For women, this matters because short-hours jobs often match life-course constraints (young children, eldercare responsibilities, or intermittent availability).

Table 1. Germany's short-hours work mechanism and its formalization effect

System element	Practice in Germany	Effect on formalizing informal work
Working time	Short-hours work up to **20 hours/week**	Expands feasibility of employment for women through compatibility with childcare and home responsibilities
Monthly earnings ceiling	In 2024, eligible income up to **€538**	Creates a legal channel to formalize low-income informal jobs
Taxes and social payments	Employer pays a **30% flat rate** (15% pension, 13% health, 2% tax)	Reduces employer administrative burden and provides incentives to register workers
Worker tax incentive	Wages exempt from income tax	Increases worker acceptance of formal contracts
Written contract	Mandatory written employment contract	Converts informal arrangements into legally protected employment
Social insurance	Mandatory participation in pension and health insurance	Strengthens social guarantees and employment stability
Women's participation	Mini-job workers: **7.4 million** (2024), **62% women**	Demonstrates strong female uptake through accessible formal channels
Economic/social outcome	Large share of informal workers move into the formal sector	Supports gender equality and social stability through formal coverage

This section interprets Germany's model as a "low-threshold formalization bridge." Instead of requiring immediate transition into standard full-time contracts, mini-jobs offer a regulated entry point that preserves flexibility while adding legal status and social insurance. Sociologically, the mechanism addresses the household-level need for time flexibility without sacrificing institutional protection.

Case 2. South Korea: Smart Labor Centers as Infrastructure for Formal Remote and Hybrid Work

This section explains South Korea's approach as a service-and-infrastructure model that targets women's barriers to formal work. Smart labor centers institutionalize remote and hybrid employment by providing digital tools, standardized contracting, and integrated childcare services—reducing the practical constraints that often push women into informal work.

Table 2. South Korea's smart labor centers and their impact on women's informality

System element	Practice in South Korea	Effect on reducing women's informal employment
Establishment and scale	Started as a pilot in **2010**; by **2023** more than **130 centers**	Expanded into a national institutional system
Technological infrastructure	High-speed internet, videoconferencing, electronic document systems	Enables formal remote work and digital participation
Work formats for women	Reduced-hours and hybrid (offline–online) work integrated with childcare	Helps align paid work with family obligations
Childcare integration	Childcare rooms in each center; childcare services while working	Supports continuity of employment for mothers
Legal and social guarantees	Mandatory labor contracts and social insurance for remote workers	Integrates remote work into formal labor relations
Public–private partnership	Jobs created via state–employer cooperation; some centers privately managed	Reduces public costs and scales a hybrid labor-market model
Women's participation	Around **70%** of center workers are women	Women's labor-market activity increases; informality declines
Social/economic results	Expanded jobs, childcare, and remote-work options	Strengthens work–family balance, protection, and stable formal employment

This section interprets the Korean model as "institutionalizing flexibility." Instead of treating remote work as informal or ad-hoc, the system builds a physical and administrative platform that makes formal employment compatible with caregiving—especially important in societies where women face strong care expectations.

This section compares the two models as complementary strategies that intervene at different bottlenecks of women's informal employment. Germany primarily relies on regulatory simplification by creating a low-threshold legal category for flexible, low-income work and by standardizing taxation and contribution rules in a way that reduces compliance costs for micro-employers. South Korea, in contrast, emphasizes infrastructure and service integration by institutionalizing hybrid and remote work through technology-enabled centers, childcare facilities, and formal contracting procedures. Although the policy instruments differ, both approaches target the same structural reality: women's demand for flexible work is shaped by care responsibilities and life-course constraints, and when formal systems cannot accommodate this flexibility, informal work becomes the most accessible option.

This section highlights that each model formalizes a different dimension of flexibility. Germany's framework mainly legalizes flexibility through hours and earnings thresholds, making it easier to register short-hours employment that would otherwise remain informal. South Korea's framework formalizes flexibility through work organization and location, reducing the practical barriers that often push women into informal activities—especially mobility constraints, limited local job access, and lack of childcare support. As a result, Germany is particularly effective

in converting existing small-scale, low-paid work into registered employment, while South Korea expands women's feasible pathways into stable formal jobs by reshaping the environment in which work is performed.

This section argues that the key common denominator is the "flexibility with protection" design. In both cases, women gain access to work arrangements compatible with time scarcity while still receiving contract-based recognition and links to social protection systems. At the same time, employers and the state are provided manageable mechanisms to ensure compliance—either through simplified administrative rules (Germany) or through system-supported formalization via standardized infrastructure (South Korea). Taken together, the comparison shows that informality declines most effectively when flexibility is treated as a legitimate employment need and embedded within enforceable protections rather than left to informal, unregulated arrangements.

Policy Lessons for Reducing Women's Informality in Other Contexts

This section draws transferable lessons that can inform national strategies where women's informality is sustained by household-care responsibilities and the dominance of micro-enterprises:

1. **Create legal flexible categories with clear rules** (hours, earnings thresholds, simplified registration).

2. **Reduce compliance complexity for micro-employers** through flat-rate payments or standardized procedures.

3. **Make written contracts the default**, even for short-hours or remote work.

4. **Link flexibility to social protection**, ensuring pension/health coverage in simplified formats.

5. **Expand childcare access and integrate services into employment infrastructure**, especially in urban labor markets and industrial/service zones.

6. **Use public–private partnerships** to scale models at lower fiscal cost while maintaining regulation and worker protection.

Conclusion. This section concludes that advanced foreign experience demonstrates a clear sociological insight: women's informality declines when institutions are redesigned to match women's real-life constraints while preserving legal protection. Germany's mini-job system shows how simplified short-hours regulation can legally absorb informal low-income work. South Korea's smart labor centers show how infrastructure and childcare integration can formalize remote and hybrid work pathways. Together, these models illustrate that reducing women's informal employment requires not only enforcement, but institutional innovation that connects labor policy, social protection, and care services into a coherent mechanism.

References

1. Chen, M. A. (2012). *The informal economy: Definitions, theories and policies*. WIEGO Working Paper.

2. De Soto, H. (1989). *The other path: The invisible revolution in the Third World*. Harper & Row.

3. Ferrant, G., Pesando, L. M., & Nowacka, K. (2014). *Unpaid care work: The missing link in the analysis of gender gaps in labour outcomes*. OECD Development Centre.
4. Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *Journal of Modern African Studies, 11*(1), 61–89.
5. Hussmanns, R. (2004). *Defining and measuring informal employment*. ILO Bureau of Statistics Working Paper.
6. International Labour Office. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). International Labour Organization.
7. International Labour Organization. (2015). *Transition from the informal to the formal economy recommendation, 2015 (No. 204).* International Labour Organization.
8. Kabeer, N. (2008). *Paid work, women's empowerment and gender justice: Critical pathways of social change*. IDS Working Paper.
9. Maloney, W. F. (2004). Informality revisited. *World Development, 32*(7), 1159–1178. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.008
10. Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason, A. D., & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). *Informality: Exit and exclusion*. World Bank.
11. Portes, A., Castells, M., & Benton, L. A. (Eds.). (1989). *The informal economy: Studies in advanced and less developed countries*. Johns Hopkins University Press.
12. Razavi, S. (2007). *The political and social economy of care in a development context*. UNRISD Research Report.
13. Tokman, V. E. (2007). *Modernizing the informal sector*. United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) Working Paper.
14. UN Women. (2015). *Progress of the world's women 2015–2016: Transforming economies, realizing rights*. UN Women.
15. World Bank. (2019). *World development report 2019: The changing nature of work*. World Bank.

Xaitov X. Q.
Korrupsiyaga qarshi kurashish komplaens nazorat tizimini boshqarish bo‘limi boshlig‘i
Jizzax politexnika institute

KORRUPSIYANING KELIB CHIQISHI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Annotatsiya: *Maqolada korrupsiyaning kelib chiqishi, ahamiyati, shakllanishi, tarixiy jarayonlaridagi o‘rni haqida ma’lumot berilgan. Xususan, maqolada korrupsiyaning ijtimoiy–siyosiy hayotdagi o‘rni va roli haqida tushunchalar yoritilgan.Tarixiy jarayonda korrupsion jarayonlarning salbiy oqibatlari to‘g‘risida tushunchalar keltirilgan.*

Tayanch tushunchalar: *Korrupsiya, ibtidoiy jamiyat, kohin, tarixiy jarayon, Lagash shahar-davlati, Bxarat, Qadimgi Misr fir’avnlari, Qadimgi Rim, sudya.*

Khaitov Kh. K.
Head of the Department for Management of the Anti-Corruption Compliance Control System of the Jizzakh Polytechnic Institute

STAGES OF ORIGIN, FORMATION, AND DEVELOPMENT OF CORRUPTION

Abstract: *The article provides information about the origin, significance, formation, and role of corruption in historical processes. In particular, the article highlights concepts about the place and role of corruption in socio-political life.In the historical process, concepts about the negative consequences of corruption processes are presented.*

Key Concepts: *Corruption, primitive society, priest, historical process, city-state of Lagash, Bharat, ancient Egyptian pharaohs, ancient Rome, judge.*

Korrupsiyaning tarixiy ildizlari, aftidan, biron kishida moyillik uyg‘otish uchun sovg‘a berish odatiga borib taqaladi. Qimmatbaho sovg‘a odamni boshqa iltimoslar orasida ajratib ko‘rgan va uning iltimosi bajarilishiga xizmat qilgan. Shu sababli ibtidoiy jamiyatlarda kohin yoki qabila boshlig‘iga to‘lov odat bo‘lib qolgan. Davlat apparatining murakkablashuvi va markaziy hukumatning kuchayishi bilan professional amaldorlar paydo bo‘lgan bo‘lib, ular, hukmdorlarning fikriga ko‘ra, faqat qat’iy belgilangan maosh bilan kifoyalanishi lozim bo‘lgan. Amalda esa bu amaldorlar o‘z mavqeidan daromadlarni yashirish oshirish maqsadida foydalanishga harakat qilganlar.

U haqida korrupsiyaga qarshi kurashgan hukmdor sifatida xotira qolgan shaxs Urunimgina – eramizdan avvalgi XXIV asrning ikkinchi yarmida Lagash

shahar-davlatining shumerlar podshosi hisoblanadi. Korrupsiya uchun boshqalarga namuna bo‘ladigan va ko‘pincha shafqatsiz jazolar qo‘llanishiga qaramay, unga qarshi kurash kutilgan natijalarga olib kelmagan. Eng yaxshi holatda xavfli jinoyatlarning oldini olishga erishilgan, lekin mayda kamomad va poraxo‘rlik darajasida korrupsiya ommaviy xarakterga ega bo‘lgan. Korrupsiya muhokama qilingan dastlabki asar - «Artxa-shastra» - eramizdan avvalgi IV asrda Bxarat (Hindiston) vazirlaridan biri tomonidan Kautilya taxallusi ostida chop etilgan. Unda muallif «podshohning mulki, hatto kichik miqdorda bo‘lsa ham, bu mulkni idora qiladiganlar tomonidan o‘zlashtirib olinishi mumkin emas» degan xulosa chiqargan.

Xuddi shu kabi muammolarga Qadimgi Misr fir’avnlari ham duch kelgan bo‘lib, bu erda erkin dehqonlar, hunarmandlar va hatto harbiy a’yonlarga nisbatan ham o‘zboshimchlik va zo‘ravonlik ishlatgan hamda qonunbuzarliklarni o‘ziga kasb qilib olgan amaldorlar byurokratik apparati yuzaga kelgandi. Bizning kunlargacha etib kelgan Itaxotel degan shaxs o‘z pand-nasihatlrida quyidagicha tavsiya beradi: «Boshliq oldida belingni bukib ta’zim qil, shunda sening uyingda tartib bo‘ladi, sening maoshing joyida bo‘ladi, kim boshliqqa qarshilik ko‘rsatadign bo‘lsa, uning hayoti oson kechmaydi, lekin u iltifot ko‘rsatganda esa yashash ham oson bo‘ladi»[23].

Sudyalar sotqinligi alohida tashvish uyg‘otardi, chunki bu mulkning noqonuniy taqsimlanishiga va nizolarni huquq maydonidan tashqarida hal qilishga olib kelgan. Bejizga barcha dinlarda korrupsiya turlari orasida birinchi navbatda sudyalarni pora berib sotib olish qoralanmaydi: «…boshliq sovg‘a talab qiladi, sudya pora evaziga sud qiladi, katta amaldorlar esa o‘z xohishiga qarab bizlarni jazolaydi va ishlarni noto‘g‘ri talqin qiladi…»[24]; «Tuhfalar qabul qilma, chunki tuhfalar ko‘zi ochiqlarni so‘qir qilib qo‘yadi va haq bo‘lganlar ishini o‘zgartirib yuboradi»; «Bir-biringizning mulkingizni noqonuniy o‘zlashtirib olmang va boshqa kishilar mulkining bir qismini qasddan egallab olish niyatida hakamlarni pora berib sotib olmang» (Qur’oni karim, 2:188) va h.k.

Qadimgi Rim qonunlarida «corrumpere» atamasi «sudda ko‘rsatmalarni pulga sotib olish» va «sudyani pora berib sotib olish» ma’nosida foydalanila boshlagan: «Nahotki sen sudda so‘zlashda ishlarni tekshirish uchun tayinlangan va bu ish bo‘yicha pora olgan sudya yoki vositachiini o‘lim jazosi bilan jazolaydigan qonunni shafqatsiz deb hisoblaysiz?)»[25].

Nikkolo Makiavelli asarlari korrupsiyani anglab etishga muhim turtki bergan. U korrupsiyani kasallik, masalan, sil kasalligi bilan tenglashtirgan. Agar kasal o‘tqazib yuborilgan bo‘lsa, uni aniqlash oson, lekin davolash juda qiyin[26].

XVIII asr oxirlaridan boshlab g‘arb mamlakatlarida jamiyatning korrupsiyaga bo‘lgan munosabatida tubburilish ro‘y berdi. Liberal o‘zgarishlar davlat hukumati uning qo‘l ostidagi odamlar manfaatida mavjud va shu sababli

[23] Хрестоматия государства и права зарубежных стран. Древность и Средние века / сост. В. А. Томсинов. — М.: Зерцало, 1999; 2004. — С. 56.
[24] Библия. Ветхий Завет. — М., 1994. — С. 352.
[25] Таблица IX. 3. Авл. Гелий / Законы XII таблиц. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. В. А. Томсинова. — М.: Зерцало, 1999. С. 120.
[26] Макиавелли Н. Избранное. — М., 1989. — С. 78-79.

fuqarolar amaldorlarning qonunga so‘zsiz rioya qilishlari evaziga hukumatni boqadi degan shior ostida o‘tgan. Xususan, 1787 yil qabul qilingan AQSh Konstitutsiyasiga muvofiq, pora olish aytib o‘tilgan ikkita jinoyat turlaridan biri bo‘lib, ular uchun AQSh Prezidentiga impichment e’lon qilinishi mumkin. Jamiyat davlat apparati ishi sifatiga tobora katta ta’sir ko‘rsata boshlagan. Siyosiy partiyalar va davlat tomonidan tartibga solishning kuchayishi bilan yirik biznes va siyosiy partiyalar til biriktirishi holatlarining o‘sishi tashvish uyg‘ota boshladi. Lekin shunga qaramay, XIX-XX asrlar davomida rivojlangan mamlakatlarda korrupsiya darajasi qolgan dunyo bilan taqqoslaganda ancha pasaydi[27].

XIX va XX asrlar bo‘sag‘asi rivojlangan mamlakatlarda korrupsiya rivojlanishida yangi bosqich bo‘ldi. Bir tomondan, davlat tomonidan tartibga solishning va mos ravishda, amaldor hukmronligining navbatdagi kuchayishi boshlandi. Boshqa tomondan – raqobat kurashida «davlatni pora berib sotib olish» - davlatning alohida mayda xizmatchilarini vaqti-vaqti bilan pora berib sotib olish emas, balki kapital manfaatlarini himoya qilish uchun yuqori mansabdagi amaldorlar va siyosatchilar faoliyatini to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘ysundirishga murojaat qiladigan yirik xususiy biznes vujudga kela boshladi. Siyosiy partiyalar ahamiyatining o‘sishi bilan rivojlangan mamlakatlarda (ayniqsa, G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida Ikkinchi jahon urushidan keyin) partiya korrupsiyasi rivojlanib, bunda o‘z manfatlarini himoya qilish va ilgari surish uchun yirik firmalar va transmilliy korporatsiyalar nafaqat shaxsan siyosatchilarga, balki partiya kassasiga ham pul to‘lay boshladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Хрестоматия государства и права зарубежных стран. Древност и Средние века / сост. В. А. Томсинов. — М.: Зерсало, 1999; 2004. — С. 56.
2. Библия. Ветхий Завет. — М., 1994. — С. 352.
3. Таблитса ИХ. 3. Авл. Гелий / Законы ХИИ таблитс. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред. В. А. Томсинова. — М.: Зерсало, 1999. С. 120.
4. Makiavelli N. Izbrannoe. — M., 1989. — S. 78-79.
5. Bardhan P. Corruption and development: a review of issues. — In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer A. J., Johnston M. 3rd ed.
6. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. — ISBN 978-0-7658-0761-8 — P. 331. Glaeser E. L., Goldin C. Corruption and reform: an introduction (angl.) // NBER Working Paper 10775. 2004.

[27] Bardhan P. Corruption and development: a review of issues. — In: Political corruption: concepts and contexts / Ed. Heidenheimer A. J., Johnston M. 3rd ed. New Brunswick, NJ: Transaction, 2002. — ISBN 978-0-7658-0761-8 — . 331. Glaeser E. L., Goldin C. Corruption and reform: an introduction (англ.) // NBER Working Paper 10775. 2004.

Xamroeva D.Sh., Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences,
Associate professor
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.
https://orcid.org/0000-0001-6242-6216

IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION MEASURES FOR MICROBIAL ETIOLOGY OF DENTAL CARIES

Abstract: *This article analyzes the pathogenesis of microbial etiology of dental caries and the role of major cariogenic microorganisms, particularly Streptococcus mutans and Lactobacillus. The mechanisms of dental biofilm formation, enamel demineralization, and pH reduction in the oral cavity are discussed. The effectiveness of modern treatment approaches, including minimal invasive dentistry, antimicrobial therapy, remineralization strategies, and probiotic applications, is evaluated. The importance of individualized risk assessment and oral microbiome stabilization in preventive care is emphasized. The findings support a biologically oriented and comprehensive approach to caries management.*

Keywords: *microbial etiology, dental caries, biofilm, demineralization, remineralization, prevention, oral microbiome.*

Introduction

Dental caries remains one of the most prevalent chronic diseases worldwide and represents a significant public health concern affecting individuals of all age groups. Despite advances in restorative dentistry, the global burden of caries continues to be high, particularly among children and adolescents. Traditionally considered a localized destruction of dental hard tissues, modern research now recognizes dental caries as a biofilm-mediated, diet-modulated, multifactorial infectious disease.

The microbial etiology of dental caries plays a central role in its initiation and progression. The disease develops as a result of complex interactions between cariogenic microorganisms, fermentable carbohydrates, host susceptibility, and time. Among the primary pathogens involved, Streptococcus mutans is widely acknowledged as a key initiator of the carious process due to its ability to adhere to enamel surfaces, metabolize sucrose, and produce extracellular polysaccharides that enhance biofilm formation. Additionally, Lactobacillus species contribute significantly to the progression of deep carious lesions by maintaining an acidic microenvironment favorable to demineralization.

Recent advances in microbiology have shifted the understanding of caries from a simple infectious process caused by specific pathogens to a dysbiosis-driven disease involving imbalance within the oral microbiome. This ecological plaque hypothesis suggests that environmental changes—such as frequent sugar intake—select for acidogenic and aciduric bacteria, leading to sustained low pH levels and enamel demineralization.

Therefore, modern caries management emphasizes not only mechanical removal of decayed tissue but also control of the microbial biofilm, enhancement of remineralization, and individualized risk-based preventive strategies. The purpose of this article is to analyze and substantiate improved treatment and preventive measures for microbial etiology of dental caries within an evidence-based and comprehensive framework.

Methods

This study was conducted using an analytical and literature-review approach. Scientific publications, clinical guidelines, and contemporary preventive protocols in dentistry were systematically analyzed.

The evaluation of microbial etiology included:

- Quantitative and qualitative assessment of cariogenic microflora
- Biofilm formation capacity
- Salivary pH measurements
- Balance between demineralization and remineralization processes

Treatment effectiveness was assessed through analysis of:

- Minimal invasive dentistry techniques
- Antimicrobial therapies
- Fluoride-based preventive agents
- Probiotic interventions
- Risk-based caries management models

Preventive strategies were evaluated based on individual caries risk assessment and long-term clinical outcomes.

Results

The analysis confirms that microbial factors play a decisive role in the initiation and progression of dental caries. Increased concentrations of acidogenic bacteria within dental biofilm correlate directly with accelerated enamel demineralization.

Comprehensive treatment approaches demonstrated the following outcomes:

- Reduction in biofilm pathogenicity
- Decrease in recurrence rates of secondary caries
- Improved remineralization of early enamel lesions
- Stabilization of oral microbiome balance

The combination of antimicrobial therapy and remineralizing agents proved more effective than conventional restorative treatment alone. Probiotic interventions showed promising results in reducing cariogenic bacterial counts and promoting microbial homeostasis.

Preventive measures such as fluoride varnish application, fissure sealants, dietary counseling, and structured oral hygiene education significantly reduced caries incidence when implemented systematically.

Discussion

The findings highlight that microbial etiology must be central to modern caries management. Conventional dentistry primarily focuses on operative

treatment—removing infected tissues and restoring structural integrity. However, without addressing the underlying microbial imbalance, recurrence remains likely.

1. Biofilm Control as a Primary Strategy

Dental biofilm is a dynamic microbial ecosystem influenced by diet, saliva, and oral hygiene practices. Persistent low pH conditions favor cariogenic bacteria and suppress protective species. Therefore, both mechanical plaque removal and chemical antimicrobial agents are essential components of preventive care. Regular toothbrushing with fluoride toothpaste and adjunctive antiseptic rinses help disrupt pathogenic biofilm activity.

2. Enhancement of Remineralization

Enamel demineralization is a reversible process in its early stages. The application of fluoride varnishes, calcium-phosphate complexes, and bioactive restorative materials enhances enamel resistance and promotes mineral redeposition. Early detection and non-invasive management reduce the need for operative interventions.

3. Modulation of the Oral Microbiome

Caries is not caused by a single pathogen but by ecological imbalance within the oral microbiome. Probiotic therapy represents a promising direction in preventive dentistry by promoting beneficial bacterial strains that compete with cariogenic species. This biological approach supports long-term microbial stability rather than temporary bacterial suppression.

4. Individualized Risk-Based Management

Caries susceptibility varies significantly among individuals. Factors such as salivary flow rate, dietary habits, socioeconomic conditions, and genetic predisposition influence disease risk. Risk assessment-based models allow clinicians to design personalized preventive protocols, improving efficiency and reducing overtreatment.

5. Public Health and Educational Interventions

Community-level preventive programs are essential for reducing overall disease prevalence. School-based oral health education, fluoride programs, early screening, and public awareness campaigns significantly contribute to lowering caries incidence. Increasing dental literacy remains a cornerstone of sustainable prevention.

6. Rational Use of Antimicrobials

Excessive or inappropriate antibiotic use may contribute to microbial resistance and disrupt normal flora. Therefore, preference should be given to localized antimicrobial agents and ecological approaches rather than systemic antibiotics in routine caries management.

Overall, the discussion supports a paradigm shift from purely restorative dentistry to a preventive, biologically oriented, and patient-centered model. Integrating microbiological insights into daily clinical practice is essential for long-term success.

Conclusion

Dental caries of microbial etiology is a biofilm-mediated infectious disease requiring a comprehensive and multifactorial management approach. Effective treatment must extend beyond mechanical restoration to include biofilm control, remineralization enhancement, microbiome stabilization, and individualized risk assessment.

The integration of minimal invasive dentistry, antimicrobial and probiotic strategies, fluoride-based prevention, and public health initiatives significantly improves clinical outcomes. Continued research in oral microbiology and preventive technologies will further strengthen strategies aimed at reducing the global burden of dental caries.

References

1. Fejerskov O, Kidd E. Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management**.** 3rd ed. Oxford: Wiley Blackwell; 2015.
2. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. *The Lancet.* 2007;369(9555):51–59.
3. Marsh PD. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and disease. *Advances in Dental Research.* 1994;8(2):263–271.
4. Takahashi N, Nyvad B. The role of bacteria in the caries process: ecological perspectives. *Journal of Dental Research.* 2011;90(3):294–303.
5. World Health Organization. Oral Health Fact Sheets and Global Oral Health Status Reports. Geneva: WHO; latest edition.
6. Zero DT. Dental caries process. *Dental Clinics of North America.* 1999;43(4):635–664.
7. Mount GJ, Hume WR. Preservation and Restoration of Tooth Structure. 2nd ed. Queensland: Knowledge Books and Software; 2005.
8. Petersen PE. The global burden of oral diseases and risks to oral health. *Bulletin of the World Health Organization.* 2005;83(9):661–669.
9. Bagramian RA, Garcia-Godoy F, Volpe AR. The global increase in dental caries. *American Journal of Dentistry.* 2009;22(1):3–8.
10. Caufield PW, Griffen AL. Dental caries: an infectious and transmissible disease. *Pediatric Clinics of North America.* 2000;47(5):1001–1019.

Xasanova G.R.
Farmakognoziya va farmatsevtik texnologiyalar kafedrasi assistenti
Mallaeva M.M., PhD
Umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasi assistent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

TINCHLANTIRUVCHI DORIVOR O‘SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI ROLI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tinchlantiruvchi (sedativ) ta’sirga ega bo‘lgan dorivor o‘simliklarning zamonaviy tibbiyotdagi ahamiyati, ularning farmakologik xususiyatlari va klinik qo‘llanilishi yoritilgan. Asab tizimi faoliyatining buzilishi, stress, uyqusizlik va psixoemotsional zo‘riqish kabi holatlarda fitoterapiyaning afzalliklari ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, valeriana, pustirnik, melissa, romashka va xmel kabi o‘simliklarning biologik faol moddalari hamda ularning organizmga ta’sir mexanizmlari o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklarni kompleks davolash tizimida qo‘llash maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *tinchlantiruvchi o‘simliklar, sedativ ta’sir, fitoterapiya, asab tizimi, stress, uyqusizlik.*

Khasanova G.R.
assistant
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technologies
Mallaeva M.M., PhD
assistant
Department of General Hygiene and Ecology
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF SEDATIVE MEDICINAL PLANTS IN MEDICINE

Abstract: *This article highlights the importance of medicinal plants with sedative effects in modern medicine, their pharmacological properties, and clinical application. Based on scientific sources, the advantages of phytotherapy in conditions such as disorders of the nervous system, stress, insomnia, and psycho-emotional tension are analyzed. In addition, biologically active compounds of plants such as valerian, motherwort, lemon balm, chamomile, and hops, as well as the mechanisms of their effects on the human body, have been studied. The results of the study indicate that the use of sedative medicinal plants is advisable in комплекс (comprehensive) treatment systems.*

Keywords: *sedative plants, sedative effect, phytotherapy, nervous system, stress, insomnia.*

Dolzarbligi

Hozirgi zamon tibbiyotida asab tizimi kasalliklari va psixoemotsional buzilishlar keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Jadal hayot sur'ati, axborot oqimining ortishi, ijtimoiy va kasbiy stress omillari inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday sharoitda sintetik sedativ dori vositalaridan uzoq muddat foydalanish ko'pincha nojo'ya ta'sirlar, o'rganib qolish va qaramlik holatlariga olib keladi.

Shu sababli, tabiiy manbalarga asoslangan fitoterapevtik vositalarga bo'lgan qiziqish yil sayin oshib bormoqda. Tinchlantiruvchi dorivor o'simliklar kam toksikligi, organizmga muloyim ta'siri va kompleks terapiyada qo'llash imkoniyati bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi

Tinchlantiruvchi ta'sirga ega dorivor o'simliklarning tibbiyotdagi rolini ilmiy jihatdan asoslash, ularning farmakologik xususiyatlari va qo'llanish samaradorligini tahlil qilishdan iborat.

Metodologiyasi:

tinchlantiruvchi dorivor o'simliklarning tasnifi va umumiy xususiyatlarini o'rganish;

ular tarkibidagi biologik faol moddalarni tahlil qilish;

asab tizimiga ta'sir mexanizmlarini ochib berish;

klinik amaliyotda qo'llash istiqbollarini baholash.

Tinchlantiruvchi dorivor o'simliklarning umumiy tavsifi

Tinchlantiruvchi dorivor o'simliklar markaziy asab tizimi faoliyatini sekinlashtirib, qo'zg'aluvchanlikni pasaytiradi, uyqu sifatini yaxshilaydi va psixoemotsional holatni barqarorlashtiradi. Ularning ta'siri asosan efir moylari, alkaloidlar, flavonoidlar, glikozidlar va organik kislotalar bilan bog'liq.

Asosiy tinchlantiruvchi o'simliklar:

Valeriana (Valeriana officinalis L.) – uyqusizlik va nevroz holatlarida keng qo'llaniladi;

Pustirnik (Leonurus cardiaca L.) – yurak-qon tomir va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;

Melissa (Melissa officinalis L.) – stress va xavotirni kamaytiradi;

Romashka (Matricaria chamomilla L.) – yengil sedativ va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega;

Xmel (Humulus lupulus L.) – uyqu chaqiruvchi xususiyati bilan ajralib turadi.

Tinchlantiruvchi dorivor o'simliklarning biologik faol moddalari va ularning ta'sir mexanizmi

Tinchlantiruvchi dorivor o'simliklarning farmakologik samaradorligi, avvalo, ular tarkibidagi biologik faol moddalar majmuasi bilan bog'liq. Ushbu moddalar markaziy va periferik asab tizimiga kompleks ta'sir ko'rsatib, psixoemotsional holatni barqarorlashtirish, qo'zg'aluvchanlikni pasaytirish va uyqu fiziologiyasini normallashtirishda ishtirok etadi.

1. Flavonoidlar

Flavonoidlar tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklarda keng tarqalgan biologik faol birikmalar hisoblanadi. Ular asosan melissa, pustirnik, romashka va xmel tarkibida uchraydi.

Flavonoidlarning ta’sir mexanizmi markaziy asab tizimida tormozlanish jarayonlarini kuchaytirish bilan bog‘liq. Ular GABA (gamma-aminomoy kislota) retseptorlariga bilvosita ta’sir qilib, neyronlar qo‘zg‘aluvchanligini kamaytiradi. Shuningdek, flavonoidlar antioksidant xususiyatga ega bo‘lib, stress natijasida hosil bo‘ladigan erkin radikallarni neytrallashtiradi. Natijada asab hujayralari muhofazalanadi va neyroprotektor ta’sir yuzaga keladi.

2. Efir moylari

Efir moylari tinchlantiruvchi o‘simliklarning eng muhim faol komponentlaridan biri bo‘lib, ular melissa, valeriana, romashka va lavanda tarkibida yuqori miqdorda mavjud.

Efir moylari markaziy asab tizimiga reflektor va gumoral yo‘llar orqali ta’sir ko‘rsatadi. Ularning aromatik molekulalari hid bilish retseptorlari orqali limbik tizimni faollashtirib, xavotir, qo‘rquv va emotsional zo‘riqishni pasaytiradi. Shu bilan birga, efir moylari parasimpatik nerv tizimi faoliyatini kuchaytiradi, yurak urishi va qon bosimini me’yorlashtirishga yordam beradi.

3. Alkaloidlar

Ayrim tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklar tarkibida kam miqdorda alkaloidlar mavjud bo‘lib, ular neyrotrop ta’sirga ega. Masalan, pustirnik tarkibidagi alkaloidlar markaziy asab tizimi faoliyatini pasaytiradi hamda vegetativ nerv tizimidagi disbalansni bartaraf etadi.

Alkaloidlar neyromediatorlar almashinuviga ta’sir qilib, simpatik nerv tizimi faolligini cheklaydi. Bu esa stress reaksiyalarining kamayishi va umumiy tinchlantiruvchi ta’sirning yuzaga chiqishiga olib keladi.

4. Iridoidlar va valerian kislotalari

Valeriana o‘simligi tarkibida uchraydigan iridoidlar va valerian kislotalari tinchlantiruvchi ta’sirning asosiy manbai hisoblanadi. Ushbu birikmalar markaziy asab tizimida neyron membranalarining qo‘zg‘aluvchanligini pasaytiradi.

Valerian kislotalari GABA metabolizmini faollashtirib, tormozlovchi mediatorlar ta’sirini kuchaytiradi. Bu esa uyqu chaqiruvchi ta’sir, psixoemotsional barqarorlik va asab zo‘riqishining pasayishi bilan namoyon bo‘ladi.

5. Glikozidlar va fenol birikmalar

Romashka va pustirnik kabi o‘simliklarda uchraydigan glikozidlar va fenol birikmalar yengil sedativ hamda spazmolitik ta’sir ko‘rsatadi. Ular periferik nerv retseptorlarini tinchlantirib, ichki organlardagi vegetativ reaksiyalarni barqarorlashtiradi.

Bu birikmalar oshqozon-ichak tizimidagi funksional buzilishlar bilan kechadigan nevroz holatlarida ayniqsa samarali hisoblanadi.

Umumiy ta’sir mexanizmining xulosaviy tahlili

Tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklarning biologik faol moddalari quyidagi yo‘nalishlarda ta’sir ko‘rsatadi:

markaziy asab tizimida tormozlanish jarayonlarini kuchaytiradi;

neyromediatorlar muvozanatini ta’minlaydi;
stress gormonlari sekretsiyasini pasaytiradi;
parasimpatik nerv tizimi faoliyatini rag‘batlantiradi;
uyqu va psixoemotsional holatni normallashtiradi.

Experemintal qism: Tahlil qilingan ilmiy manbalarga asosan quyidagi natijalarga erishildi:

tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklar nevroz, stress va uyqusizlik holatlarida samarali ekanligi aniqlandi;
ularni uzoq muddat qo‘llashda nojo‘ya ta’sirlar kam kuzatiladi;
fitopreparatlar sintetik sedativ vositalarga nisbatan xavfsiz hisoblanadi;
kompleks terapiyada qo‘llanganda davolash samaradorligi oshadi.

Xulosa

Tinchlantiruvchi dorivor o‘simliklar zamonaviy tibbiyotda muhim o‘rin tutadi. Ularning tabiiyligi, xavfsizligi va yuqori terapevtik samarasi asab tizimi kasalliklarini davolashda keng qo‘llash imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlar fitoterapiyani rivojlantirish va amaliyotga joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Karomatov I.D. Fitoterapiya asoslari. – Toshkent: Tibbiyot, 2019.
2.Murodov A.M. Dorivor o‘simliklar va ularning shifobaxsh xususiyatlari. – Samarqand, 2020.
3.Xasanova G.Sh. Tabiiy dorivor vositalarning tibbiyotda qo‘llanilishi. – Toshkent, 2021.WHO. Monographs on Selected Medicinal Plants. – Geneva, 2018.
4.Чулков В.А. Адаптогены растительного происхождения**.** – Москва: Медицина, 2017.
5.Kodirov, N. D., Kungratova, M. I., & Muhammadova, Z. G. (2025). Quvvatlantiruvchi dorivor o‘simliklarning tibbiyotdagi ahamiyati. Tadqiqotlar, 76(7), 15–19.
6.Daminovich, K. N., & Kizi, T. S. K. (2025). Improving pharmaceutical services in community pharmacies: strategies for quality enhancement. Shokh Library.
7.Kodirov, N., Galiakhmetova, E., Nizamova, A., Kudashkina, N., Galiakhmetova, R., & Rashitovna, S. (2024). Biological study of Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino. In BIO Web of Conferences (Vol. 93, p. 02001). EDP Sciences.
Daminovich, K. N. (2025). The role of zinc in providing a healthy nutrition. Shokh Library, 1(13).
8.Kodirov, N. D., & Najmitdinov, X. B. (2023). Farmatsevtika va tibbiyotda nanotexnologik metodlarni qo‘llash. Vestnik nauki, 1(11(68)), 980–985.
9.Kodirov, N. D. Dori vositalarini saqlash jarayonida ularning sifati va xavfsizligini ta’minlashning zamonaviy yondashuvlari.7.Кодиров, Н. Д. (2025). ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ АЛКАЛОИДОВ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ: МЕХАНИЗМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. *Экономика и социум*, (6-1 (133)), 1149-1154.
10.Кодиров, Н. Д., & Нажмитдинов, Х. Б. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ РАСТЕНИЙ РОДА PSORALEA В МЕДИЦИНЕ И В ФАРМАЦЕВТИКЕ. *Вестник науки*, *1*(11 (68)), 986-991.

11.Mustafayevich, O. S., & Raxmatullayevna, X. G. (2025). STUDY OF THE EFFECTS OF EXTERNAL CONDITIONS ON THE PERFORMANCE OF THE" TPG-SN4" METHANE DETECTOR. *Research Focus*, *4*(6), 32-36.
12. Hasanova G. R., Burhanova D. S. & Norkulova H. S. (2025). GEL'MINTOZLARNI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY BIOTEXNOLOGIYALAR: PTSR, IFA VA BOSHQA USULLAR. Development Of Science, 11(5), pp. 320-327.
13. Хасанова, Г. Р. (2025). ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРНЕВИЩАХ И КОРНЯХ ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ-INULA HELENIUM L., ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНИЙ АЗИИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, *79*(3), 157-164.

UO‘K. 314.04

Xidiraliyev K. E., geografiya fanlari nomzodi
dotsent
“Ekologiya va geografiya ” kafedrasi
Guliston davlat universiteti
Yo’lchiyeva N.A.
2-bosqich magistr geografiya ta’lim yo‘nalishi
“Ekologiya va geografiya ” kafedrasi
Guliston davlat universiteti

SIRDARYO VILOYATIDAGI GEODEMOGRAFIK VAZIYAT: MUAMMO VA ECHIM

Annotatsiya. *Ushbu maqolada geodemografik vaziyatni mohiyati ochib berilgan. Geodemografik vaziyatni keltirib chiqaruvchi omillar e’tiborga olingan. Shuningdek, Sirdaryo viloyatining o‘ziga xos geodemografik vaziyati, muammolari va echimlari o‘rganilgan.*

Kalit so‘zlar: *Geodemografiya, geodemografik vaziyat, omil, ko‘rsatkich, geodemografik muammo, geodemografik echim, aholi, ekologiya, tabiiy o‘sish.*

Khidiraliyev K. E., PhD in Geography
associate professor
Department of Ecology and Geography
Gulistan State University
Yulchieva N.A.
Second-year Master's student in Geography
Department of Ecology and Geography

GEODEMOGRAPHIC SITUATION IN THE SYRDARYA REGION: PROBLEM AND SOLUTION

Abstract. *This article explores the essence of the geodemographic situation. It examines the factors that determine it. It also examines the characteristics of the geodemographic situation, its problems, and solutions in the Syrdarya region.*

Keywords: *geodemography, geodemographic situation, factor, indicator, geodemographic problem, geodemographic solution, population, ecology, natural growth.*

Aholini tartibli o‘zgarishi va takror barpo qilish tiplari umumiy geodemografik vaziyatni belgilaydi. Geodemografik vaziyat-demografik jarayonlarning va aholi tarkibining ma'lum bir vaqtda yoki davrdagi holatining geografik sharoitga bog‘liqligidir. Geodemografik vaziyat-bu aholining ma'lum bir hududiy guruhida shakllangan tug'ilish, o'lim darajasi, migratsiya harakatchanligi

va ularning o'zgarish tendentsiyalari (yo‘nalishlari) o'rtasidagi bog'liqlik bo‘lib, ma'lum bir davrda aholining ma'lum bir yosh va jins tarkibini, ularning sonining ma'lum dinamikasini va keyingi takror barpo bo‘lishi uchun sharoitlarni yaratish [1].

Geodemografik vaziyatning asosiy ko'rsatkichlari: tug'ilish darajasi, o'rtacha umr ko'rish, o'lim, migratsiya, aholining tabiiy ko'payishi yoki kamayishi. Demografik vaziyatni yuzaga keltiruvchi asosiy **omillar:** demografik xulq-atvorning mahalliy an'analari; yashash uchun tabiiy sharoitlarning qulaylik darajasi; iqtisodiy rivojlanish sur'ati, ko'lami va nisbati; siyosiy vaziyat, migratsiya xususiyatlari, urbanizatsiya va globallashuv. Boshqarishning eng yuqori darajasiga ega bo'lgan omillarga ijtimoiy-iqtisodiy omillar, migratsiya va milliy siyosat kiradi. Geodemografik vaziyat o'zgarishi (yaxshilanishi yoki yomonlashishi) mumkin, bu aholining demografik xulq-atvoriga bog‘liq-nikoh, reproduktiv mayl, o'zini o'zi saqlash.

Geodemografik vaziyat ma'lum bir mamlakat uchun aholining maqbul tarkibi va miqdorini shakllantirishga hissa qo'shsa-qulay hissoblanadi va aksincha ularda istalmagan o'zgarishlarga olib keladigan bo'lsa-noqulay deb baholanadi. Noqulay demografik vaziyat xavfning yuqori chegaralariga etib borishi mumkin, natijada demografik **inqiroz va demografik** falokat farqlanadi [2].

Geodemografik vaziyat har qanday davlatning ijtimoiy hayotiga ta’sir qiladi. Ushbu doirada ijtimoiy hayot va demografik bosimga misol keltirsak. Xitoyning qadimiy donishmand faylasufi Konfutsiy ikki yarim ming yil oldin “Biz qanaqa xalq ekanligimizni bilgingiz kelsa, oldin bizning sonimizni bilib oling” degan ekan. Donishmandning bu so‘zlari O‘zbekistonning hozirgi ijtimoiy-ijtimoiy rivojlanish davrida ham o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Aksincha, jamiyatimizning rivojlanish sur’atlari shiddat bilan oshib borayotgan sari aholimizning soni, undagi tarkibiy va sifat o‘zgarishlar e’tiborimizdan chetda qolib ketishiga yo‘l qo‘yishimiz kerakmas.

Bu borada e’tiboringizga O‘zbekistonning o‘ziga xos viloyati Sirdaryo viloyatida yashab istiqomat qilib kelayotgan aholimiz soniga, ularning keyingi paytlarda son va jins jihatidan bo‘layotgan keskin o‘zgarishlariga, viloyatimizdagi aholining yaqin va uzoq istiqbollaridagi bo‘lajak holatlarga e’tiboringizni qaratmoqchimiz [3].

2025-yilning 1-iyul holatiga Sirdaryo viloyatining doimiy aholisi soni 938,5 ming kishini tashkil etib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 1,8 (16,4 ming kishiga) foizga ko‘paygan (1-jadval). 2025-yilning yanvar-iyun oylarida tug‘ilganlar soni 10,1 ming nafarni, vafot etganlar 2,2 ming nafarni tashkil etib, tabiiy o‘sish 7,9 ming kishiga teng bo‘ldi. Viloyatga xorijiy davlatlardan ko‘chib kelganlar soni 21 kishini va viloyatdan xorijga ko‘chib ketganlar soni 60 kishini, qayd etilgan nikohlar 2,4 mingtani, nikohdan ajralishlar 0,8 mingtani tashkil etgan.

Doimiy yashash hududi bo‘yicha shahar joylarda 403,5 ming kishi (jami aholi soniga nisbatan 43,0 %), qishloq joylarda esa 535,0 ming kishi (57,0 %) istiqomat qilmoqda. Ayollar soni 467,0 ming kishini (49,8 %), erkaklar esa 471,5 ming kishini (50,2 %) tashkil etmoqda.

Sirdaryo viloyatida 2025-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, 1 kvadrat kilometrga o‘rtacha 219,3 kishi to‘g‘ri kelgan. Bu esa 2024 yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 3,9 kishiga ortgan (2024-yil 1-iyul holatiga 1 kv.km.ga 215,4 kishi).

Viloyatda 2025-yilning yanvar-iyun oylarida qayd etilgan tirik tug‘ilganlar soni

10123 kishini, har ming aholiga nisbatan tug‘ilish koeffitsiyenti 21,8 promilleni tashkil etdi. Tug‘ilganlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024-yilning mos davriga nisbatan 291 nafarga kamaygan. Vafot etganlar soni 2178 kishini, har ming aholiga nisbatan o‘lim koeffitsiyenti 4,7 promilleni tashkil etdi. Vafot etganlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024-yilning mos davriga nisbatan 106 nafarga ko‘paygan.

1-jadval. Viloyatda doimiy aholi soni ming kishi.

	2024-yil	2025-yil	O‘sish sur’ati, % da
Sirdaryo viloyati	922,1	938,5	101,8
Guliston sh.	100,7	103,4	102,7
Shirin sh.	19,4	19,4	100,0
Yangiyer sh.	48,5	49,6	102,3
tumanlar			
Oqoltin	56,2	57,0	101,4
Boyovut	140,1	142,7	101,9
Sayxunobod	83,4	84,7	101,6
Guliston	80,3	81,7	101,7
Sardoba	70,8	71,8	101,4
Mirzaobod	81,2	83,2	102,5
Sirdaryo	138,2	140,2	101,4
Xovos	103,3	104,8	101,4

Viloyatda tirik tug‘ilganlar soni 10123 kishini, shundan o‘g‘il bolalar soni 5252 kishini (jami tug‘ilganlar soniga nisbatan 51,9%), qiz bolalar soni 4871 kishini (48,1%) va shahar joylarida 3811 kishini (37,6%), qishloq joylarida 6312 kishini (62,4%) tashkil etdi. Viloyatda vafot etganlar soni 2178 kishini, shundan erkaklar 1207 kishini (jami vafot etganlar soniga nisbatan 55,4%), ayollar 971 kishini (44,6%) va shahar joylarida 1022 kishini (46,9%), qishloq joylarida 1156 kishini (53,1%) tashkil qildi.

Viloyatda 2025-yilning yanvar-iyun oylarida qayd etilgan nikohlar soni 2392 birlik, har ming aholiga nikoh koeffitsiyenti 5,2 promilleni tashkil etdi. Nikohlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024-yilning mos davriga nisbatan 18 birlikka kamaygan. Nikohdan ajralishlar soni 774 birlik, har ming aholiga nisbatan ajralish koeffitsiyenti 1,7 promilleni tashkil etdi. Ajralishlar soni joriy yilning yanvar-iyun oylarida 2024-yilning mos davriga nisbatan 2 birlikka ko‘paygan. Viloyatda qayd etilgan nikohlar soni 2392 birlikni, shundan shahar joylarida 1157 birlikni (48,4%), qishloq joylarida 1235 birlikni (51,6%) tashkil etdi.

Viloyatda nikohdan ajralishlar soni 774 birlikni, shundan shahar joylarida 421 birlikni (54,4%), qishloq joylarida 353 birlikni (45,6%) tashkil qildi. 2025-yil yanvar-iyun oylarida viloyat bo‘yicha ko‘chib kelganlar jami soni 3 872 kishini, shu jumladan respublikaning boshqa hududlaridan ko‘chib kelganlar 3851 kishini, xorijiy mamlakatlardan ko‘chib kelganlar 21 kishini tashkil etdi. Ko‘chib ketganlar jami soni 4197 kishini, shu jumladan respublikaning boshqa hududlariga ko‘chib ketganlar 4137 kishini, xorijiy mamlakatlarga ko‘chib ketganlar 60 kishini tashkil qildi.

Jami aholida jinslar farqi-erkaklar-471500 kishi (50,2%), ayollar-467000 kishi (49,8%). Aholini yosh guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi-0-15 yosh-296067 (31,8%) kishi, 16-64 yosh-591368 (63,5%) kishi, 65 va undan yuqori-43408 (4,7%) kishi. Qishloq aholisi-535000 (57,0%) kishi, shahar aholisi-403500 (43,0%) kishi.

Sirdaryo viloyati muhim geografik joylashuvga ega bo‘lib, davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida katta rol o‘ynaydi. Viloyatning geodemografik vaziyatini o‘rganish, uning aholi soni, taqsimoti, ijtimoiy infratuzilmasi va ekologik holatiga qarab, kelajakdagi rivojlanish uchun kerakli chora-tadbirlarni belgilashga yordam beradi. Viloyatning iqtisodiy ahamiyati, qishloq xo‘jaligi va sanoatdagi o‘rni, shuningdek, mintaqada yashovchi aholi sonining o‘sishi bilan bog‘liq muammolarni tahlil qilish zarur [4].

Muammo. Sirdaryo viloyatidagi asosiy geodemografik muammolardan biri – aholi sonining o‘sishi va ularning taqsimlanishidagi noaniqliklar. Aholi sonining ortishi bilan bog‘liq muammolar viloyatdagi infratuzilma va ijtimoiy xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, qishloq joylarida tibbiyot, ta’lim va transport sohalarida sust rivojlanish kuzatilmoqda. Viloyatda yoshlar sonining ortishi, shu bilan birga, mehnat bozoridagi tanqisliklar, kasb-hunar ta’limining yetishmasligi va yangi ish o‘rinlarining yaratilmasligi ham jiddiy muammolardan biridir.

Shuningdek, Sirdaryo viloyatining agrar hudud bo‘lishi, yer va suv resurslaridan unumli foydalanish masalasini dolzarb qiladi. Suv resurslarining cheklanganligi, yerning unumdorligini saqlash va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ko‘paytirish bilan bog‘liq muammolar ham viloyatning geodemografik vaziyatiga ta’sir qiladi. Suvning tejab ishlatish, o‘zgartirilgan qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish zarur.

Bundan tashqari, migratsiya jarayoni ham Sirdaryo viloyatining geodemografik vaziyatiga ta’sir qiladi. Ichki migratsiya, asosan, qishloq joylaridan shaharlarga ko‘chish orqali amalga oshadi. Biroq, bu jarayon natijasida shaharlarda aholi zichligi ortib, mavjud infratuzilmaning va ijtimoiy xizmatlarning sifati pasayishi kuzatilmoqda.

Sirdaryo viloyatida migratsiya va aholi o‘zgarishi ko‘plab ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Viloyatdagi shaharlar va qishloqlar o‘rtasidagi migratsiya jarayonlari, aholi zichligining oshishi va yangi ish o‘rinlari yaratishda qiyinchiliklarga olib keladi. Qishloq joylaridan shaharlarga ko‘chish, ayniqsa, yoshlar orasida keng tarqalgan. Bu esa shaharlarda yashash sharoitlarining

qiyinlashishiga, infratuzilmaning zaiflashishiga va yangi ish o‘rinlarining yaratilmasligiga olib keladi.

Ichki migratsiyaning sabablaridan biri, qishloq joylarida yerlarning kamayishi, qishloq xo‘jaligi faoliyatining qiyinlashishi va yoshlarning ish o‘rinlari topishda qiynalishidir. Bu jarayon viloyatning mehnat bozoriga, ta’lim tizimiga va ijtimoiy xizmatlar sohasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Sirdaryo viloyatining ekologik vaziyati ham uning geodemografik holatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Suv resurslarining taqsimoti va qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanish masalasi viloyatdagi eng dolzarb muammolardan biridir. Sirdaryo daryosi viloyatning asosiy suv manbaidir, ammo bu resursdan samarasiz foydalanish va suvning ifloslanishi ekologik salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Suv resurslarining cheklanganligi va uni samarali boshqarish ehtiyoji viloyatning kelajakdagi rivojlanishiga katta ta’sir qiladi.

Qishloq xo‘jaligi faoliyati viloyatda asosiy iqtisodiy tarmoqlardan biri bo‘lib, yerning unumdorligini saqlash va suvni tejashning ahamiyati oshib bormoqda. Suv resurslarini tejash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ekologik toza ishlab chiqarishni rivojlantirish viloyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi [5,6].

Yechimlar. Sirdaryo viloyatidagi geodemografik vaziyatni yaxshilash uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi zarur. Birinchidan, aholi sonining o‘sishiga va uning taqsimlanishiga samarali yondashuvni joriy etish lozim. Aholi zichligini kamaytirish va qishloq joylarida ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish orqali shaharlardagi yashash sharoitlarini yaxshilash mumkin. Qishloq joylarida ish o‘rinlarini yaratish, ta’lim tizimini kuchaytirish va infratuzilmani rivojlantirish viloyatda aholi migratsiyasini boshqarish uchun zarur choralar bo‘ladi.

Mehnat migratsiyasini boshqarish va mehnat resurslarini samarali ishlatish uchun ta’lim tizimini yangilash, kasb-hunar ta’limini kengaytirish va yoshlarni ishga joylashtirishni osonlashtirish kerak. Buning uchun viloyatda mehnat bozoriga mos kadrlar tayyorlash, kasb-hunar o‘rgatish va yangi ish o‘rinlarini yaratish zarur.

Suv resurslarini boshqarish va ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun suvni tejash va zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish zarur. Sirdaryo viloyatidagi qishloq xo‘jaligida suvdan samarali foydalanish, suv resurslarining taqsimotini boshqarish va yer unumdorligini saqlash orqali ekologik vaziyatni yaxshilash mumkin. Suv resurslarining taqsimotini boshqarishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, yashil texnologiyalarni rivojlantirish va tabiiy resurslarni tejash O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligini ta’minlashga yordam beradi.

Sirdaryo viloyatidagi geodemografik vaziyat, ayniqsa, aholi sonining o‘sishi, migratsiya jarayonlari, ekologik muammolar va suv resurslarining boshqarilishi bilan bog‘liq muammolarni o‘z ichiga oladi. Viloyatning kelajakdagi rivojlanishiga ta’sir etadigan omillarni hal qilish uchun kompleks yondashuvni qo‘llash zarur. Aholi taqsimotini boshqarish, mehnat migratsiyasini boshqarish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va suv resurslarini samarali boshqarish viloyatning geodemografik vaziyatini yaxshilash uchun muhim choralar bo‘ladi.

Sirdaryo viloyatining geodemografik vaziyatini yaxshilash uchun ijtimoiy infratuzilma va ta’lim tizimlarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratish zarur. Aholining farovonligini oshirish uchun ta’lim va sog‘liqni saqlash muassasalarini modernizatsiya qilish kerak. Bu viloyatdagi aholining yashash sharoitlarini yaxshilashda muhim omil bo‘ladi. Shuningdek, qishloq joylarida ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlarini yanada kengaytirish, ularni zamonaviy usullar bilan ta’minlash kerak. Masalan, qishloq tumanlarida uzoq masofali ta’lim (online ta’lim) tizimini rivojlantirish, tibbiy xizmatlarni masofaviy ko‘rsatish texnologiyalarini joriy etish aholi orasida ta’lim va sog‘liqni saqlash imkoniyatlarini oshiradi.

Ta’lim tizimining sifatini oshirish uchun yangi zamonaviy maktablar qurilishi, malakali o‘qituvchilar tayyorlanishi va kasb-hunar ta’limini rivojlantirish lozim. Bu o‘z navbatida aholi sonining o‘sishiga mos ravishda yosh avlodning malakasini oshirish, mehnat bozoriga mos keladigan kadrlarni tayyorlash imkoniyatlarini yaratadi. O‘quvchilarni turli kasblarga o‘rgatish, shu jumladan qishloq xo‘jaligi va ekologiya sohalarida kadrlar tayyorlash Sirdaryo viloyatining iqtisodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi.

Sirdaryo viloyatining geodemografik vaziyatini yaxshilash uchun aholi migratsiyasi va mehnat bozorini samarali boshqarish zarur. Qishloq joylaridan shaharlarga bo‘lgan migratsiya oqimi Sirdaryo viloyatining iqtisodiy va ijtimoiy muammolarini kuchaytiradi. Migratsiyani boshqarish uchun viloyatda yangi ish o‘rinlarini yaratish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish kerak.

Ish o‘rinlari yaratishning eng samarali yo‘li bu viloyatda sanoatni rivojlantirish va qishloq xo‘jaligi tarmoqlarini modernizatsiya qilishdir. Sirdaryo viloyatida yangi sanoat tarmoqlarini rivojlantirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali yangi ish o‘rinlarini yaratish mumkin. Shu bilan birga, yoshlarni ishga joylashtirish uchun kasb-hunar o‘rgatish, ularni turli sohalarda malaka oshirish dasturlari orqali tayyorlash zarur.

Sirdaryo viloyatining ekologik holati ham uning geodemografik vaziyatiga bevosita ta’sir qiladi. Suv resurslarini tejash, yer unumdorligini saqlash va ekologik muammolarni hal qilish viloyatning kelajakdagi rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Suv resurslarining taqsimoti va qishloq xo‘jaligida samarali foydalanish ekologik barqarorlikni ta’minlash uchun zarur.

Viloyatda yer unumdorligini saqlash, yangi qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish va tabiiy resurslarni tejash orqali ekologik muammolarni kamaytirish mumkin. Suvni tejash texnologiyalarini joriy etish, issiqxona gazlarini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish viloyatning barqaror rivojlanishiga yordam beradi [7].

Sirdaryo viloyatining geodemografik vaziyatini yaxshilash uchun kompleks yondashuv zarur. Aholining o‘sishi va taqsimoti, mehnat migratsiyasi, ekologik muammolar va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanishi viloyatning kelajakdagi rivojlanishiga bevosita ta’sir qiladi. Bu masalalarni hal qilish uchun viloyatdagi mehnat bozorini modernizatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish, ta’lim tizimini

rivojlantirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanish lozim. Shu bilan birga, Sirdaryo viloyatidagi iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash uchun mamlakatning markaziy hududlarida mavjud bo‘lgan resurslarni samarali boshqarish zarur. Aholining farovonligini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash viloyatning barqaror rivojlanishining asosiy omillaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tojiyeva Zulxumor Nazarovna. Ahoii geograftyasi./darslik/.-Toshkent.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020, 298 bet.
2. Т.В. Ромашова. География населения с основами демографии. Томск. ТГУ. 2014.
3. Э. Ю. Сегида. География населения с основами демографии. Харьков. 2014. – 154 с.
4. Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi. Sirdaryo viloyatida demografik holat. 2025-yil yanvar-iyun oylari uchun.
5. Xidiraliyev K.E. Aholi va iqtisodiy geografiya asoslari.- Toshkent.:-2024,-293 bet.
6. [A.S.Soliyev], N.K.Komilova, S.L.Yanchuk, Sh.Z.Jumaxanov., F.T.Rajabov Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Darslik. – T.: ―Universitet, 2019. - 360 b.
7. Липухин, Д. Н. Геодемография Урала [Текст] : практикум : учебно-метод. пособие для студентов / Д. Н. Липухин ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2019 –73 с.

Xo'janiyazova B.X.
Tibbiy biologiya kafedrasi assisenti
Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot inistituti

BUXORO TUPROQ-IQLIM SHAROITIGA MOS KARTOSHKA NAVLARINI *IN VITRO* SHAROITIDA MIKROKLONAL KO'PAYTIRISH

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Buxoro viloyatining tuproq-iqlim sharoitiga mos bo'lgan kartoshka navlarini in vitro sharoitida mikroklonal ko'paytirish bo'yicha tadqiqot natijalari yoritilgan. Murashige va Skoog (MS) ozuqa muhitidan foydalangan holda meristema madaniyatidan regeneratsiya jarayoni optimallashtirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, C-46 va C-73 navlari mikroklonal ko'payish uchun eng istiqbolli hisoblanib,shuningdek, patogensiz ko'chatlarning tuproq sharoitiga moslashtirish usullari ham o'rganildi.*

Kalit so'zlar. *Kartoshka (Solanum tuberosum L.), mikroklonal ko'paytirish, in vitro, MS ozuqa muhiti, regeneratsiya, patogensiz ko'chatlar, adaptatsiya.*

Khojaniyazova B.Kh.
assistant
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

IN VITRO MICROCLONAL PROPAGATION OF POTATO VARIETIES ADAPTED TO THE SOIL AND CLIMATE CONDITIONS OF BUKHARA

Abstract. *This paper presents the research results on the microclonal propagation of potato varieties suitable for the soil and climatic conditions of the Bukhara region in in vitro conditions. The regeneration process was optimized using Murashige and Skoog (MS) nutrient medium. The research results indicate that the S-46 and S-73 varieties are the most promising for microclonal propagation. Additionally, methods for adapting pathogen-free seedlings to soil conditions were also studied.*

Keywords: *potato (Solanum tuberosum L.), microclonal propagation, in vitro, MS nutrient medium, regeneration, pathogen-free seedlings, adaptation.*

Hozirgi vaqtda ekinlarning yangi navlarini yaratish va joriy etish, barqarorlik va

xosildorlikni oshirishda biotexnologik tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Yer va suv resurslaridan cheklangan tarzda foydalanish, tez demografik o'sish va atrof-muhitga tazyiq kuchayib borayotgani bizni qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini rivojlantirishning asosi sifatida biotexnologiyadan foydalanishga

e’tibor qaratishga undaydi. So‘nggi yillarda virussiz kartoshka urug‘i materialini olish uchun kartoshka meristema ekish usullaridan foydalanish ishlab chiqildi. Kartoshkani *in vitro* sharoitida ko‘paytirish texnologiyasi o‘simlikning viruslardan xoli sog‘lom avlodini tez va samarali yetishtirish, genetik tozaligini saqlash, genetik muhandislik amaliyotlarida donor material sifatida qo‘llash imkoniyatini beradi. Bu usul, ayniqsa, Buxoro kabi arid hududlar uchun muhim bo‘lib, sog‘lom start materiallari bilan ta’minlash orqali dala sharoitida yuqori xosillilikka erishish imkonini beradi. Kartoshka (*Solanum tuberosum L.*) dunyo miqyosida asosiy oziq-ovqat maxsulotlaridan biri hisoblanadi [1]. Uning yuqori xosildorligini ta’minlash va sifatli navlarni yaratish zamonaviy biotexnologik usullarga asoslangan. Kartoshka nihollarini tez rivojlanishiga erishish va yuqoqri xosil olishning muhim yo‘nalishlaridan biri – bu *in vitro* sharoitida mikroklonal ko‘paytirish hisoblanadi [2]. Kartoshka tugunaklari o‘rtacha 18–22% gacha kraxmal, 1.5–2.5% oqsil, 0.3% yog‘, 1% dan ortiq kletchatka, hamda 0.8–1.2% mineral moddalardan iborat bo‘lib, inson organizmi uchun zarur bo‘lgan C, B1, B2, B6, PP vitaminlarini o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, kartoshka insonning sutkalik askorbin kislotasi (C vitamini) ehtiyojining 40–60% ini ta’minlay oladi.

Buxoro viloyati Markaziy Osiyo mintaqasida joylashgan bo‘lib, iqlimi kontinental, yozi issiq va quruq, qishi esa yumshoq bo‘lib, yog‘ingarchilik kam bo‘ladi. Ushbu sharoit kartoshka yetishtirish uchun mos bo‘lishi bilan birga, suv resurslaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Tuproqlari asosan qumoq va qumloq mexanik tarkibga ega bo‘lib, organik moddalar miqdori nisbatan past [3].

Tadqiqotning maqsadi Buxoro sharoitiga mos kartoshka navlarini *in vitro* sharoitida ko‘paytirish, patogensiz ko‘chatlarini yetishtirish va ularning tuproq sharoitiga moslashtirish tizimini ishlab chiqishdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usullari

Tadqiqot obyekti: Tadqiqot uchun Buxoro viloyati sharoitiga mos bo'lgan kartoshka navlari tanlab olindi. Jumladan, C-46 (*Solanum tuberosum L*. x *Solanum tuberosum L*.), C-73 (*Solanum tuberosum L*. x *Solanum andigena*), C-55 (*Solanum andigena* x *Solanum tuberosum* L.), C-17 (LR 93.221 x C 93.154) navlari o‘rganildi [4].

Tadqiqot usullari:

Sog‘lom ona o‘simliklardan sterillangan sharoitda tugunagi va poyasidan eksplant sifatida meristema ajratib olindi [5]. Eksplantlar 70% spirt va 1% natriy gipoxlorit eritmasida sterilizatsiya qilindi [6].

O‘stirish muhiti tayyorlash: Murashige va Skoog (MS) ozuqa muhitiga 30 g/l saxaroza, 7 g/l agar-agar, 0,1 mg/l kinetin va 0,05 mg/l IMK (indol moy kislota) qo‘shildi [7]. Eksplantlar 22–24°C haroratda, 16 soat yorug‘lik va 8 soat qorong‘ulik sharoitida o‘stirildi.

O‘simliklar ildiz otgach, ularni ekish uchun maxsus moslashish sharoitiga o‘tkazildi. Mikroklonal ko‘paytirish natijasida olingan patogensiz ko‘chatlar maxsus issiqxonalarda moslashtirildi. Tuproq sifatini yaxshilash uchun organik va mineral o‘g‘itlar qo‘llanildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, barcha navlarning mikroklonal ko‘payish ko‘rsatkichlari yuqori bo‘ldi. MS muhitida kinetin va IMK miqdorini moslashtirish orqali regeneratsiya jarayoni optimallashtirildi. Kartoshkani *in vitro* sharoitda ko’paytirish asosida olingan nihollarni rivojlanish ko’rsatkichlari aniqlandi. (1-jadval)

1-jadval

Kartoshkani *in vitro* sharoitda ko’paytirish asosida olingan nihollarni rivojlanish ko’rsatkichlari

Nav nomi	Kaluslar shakllanishi (%)	Kurtak chiqish vaqti (kun)	Ildiz hosil bo‘lishi (%)	Tuproqga moslashish darajasi (%)
C-46	85	10–12	90	92
C-73	82	9–11	88	90
C-55	78	11–13	85	87
C-17	80	10–12	87	89

Shunga ko’ra, ushbu genotiplarning tuproq-iqlim sharoitlariga, jumladan, sho‘rlanish va qurg‘oqchilikka moslashuvchanligi o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mikroklonal ko'paytirish usuli nafaqat kartoshka navlarini tez ko'paytirish imkonini beradi, balki ularning stressga chidamliligini ham oshiradi. Bu xususiyat ayniqsa qurg'oqchilik sharoitida muhim ahamiyatga ega. Buxoro viloyatining quruq iqlim sharoitida mikroklonal ko'paytirish orqali olingan kartoshka navlari an'anaviy usullar bilan yetishtirilgan navlarga qaraganda yaxshiroq moslashish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlandi.(2-jadval)

2.-jadval

Tanlangan kartoshka genotiplarining turli stress sharoitida o‘sish ko‘rsatkichlari (% nazoratga nisbatan)

Nav/genotip	Tuz stressi (%)	Qurg‘oqchilik (%)	Issiqlik stressi (%)
C-46	68	72	76
C-55	87	75	74
C-73	70	69	90
C-17	75	77	78

Tadqiqotlar davomida 38°C haroratda 72 soat davomida o‘simliklar o‘stirildi. Issiqlik stressi sharoitida C-73, Sante va Granola genotiplari yuqori chidamlilik ko‘rsatdi. Ayniqsa, C-73 genotipi MDA (malondialdegid) darajasi eng past (1,3 nmol/g) bo‘lib, hujayra membranasi kamroq zarar ko‘rganini ko‘rsatdi

Xulosa

Mikroklonal ko'paytirish usuli kartoshka navlarini tez va samarali ko'paytirish, ularning stressga chidamliligini oshirish va virusli kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Buxoro viloyatining tuproq-iqlim sharoitiga mos kartoshka navlarini mikroklonal ko'paytirish orqali yetishtirish ushbu mintaqada qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta hissa qo'shishi mumkin.

Buxoro tuproq-iqlim sharoitiga mos kartoshka navlarini *in vitro* sharoitida mikroklonal ko‘paytirish muvaffaqiyatli amalga oshirildi.

Adabiyotlar

1. Khujaniyazova B.X., Kushiev Kh.Kh. Potato biotechnological genotypes: Comparative analysis of physiological development under in vitro and in vivo conditions // Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2025. –P. 5-11
2. Khujaniyazova B. K., Kushiev K. K., Artikova K. T. Biotechnological genotypes of potatoes: comparative study of physiological development under *in vitro* and *in vivo* conditions // Emerging Frontiers Library for The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering.– 2025. – P. 8–12.
3. Khujaniyazova B., Kushiev Kh. Kh., Enhancing in Vitro Microtuber Formation in Potato (*Solanum tuberosum L.*) through Optimized Photoperiod Regimes // International Journal of Genetic Engineering. – 2025. – Vol. 13(9). – P. 232–234.
4. Hartmann, H. T., & Kester, D. E. (2011). Plant propagation: principles and practices. Pearson.
5. Chatterjee, A., Dey, A. Evaluation of heat stress tolerance in potato using biochemical markers // Plant Physiology Reports. – 2018. – Vol. 23(4). – P. 426 – 435.
6. Bhojwani, S. S., & Razdan, M. K. (1996). Plant tissue culture: theory and practice. Elsevier.
7. George, E. F., Hall, M. A., & De Klerk, G. J. (2008). Plant propagation by tissue culture. Springer.

UDK: 504.054:911.3

Yarashova D. A.
Ekologiya va Geografiya kafedrasi o'qituvchisi
Buxoro Davlat Universiteti
Abdumurodova Sh.
Geografiya ta'lim yo'nalishi, 1- bosqich talabasi
Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti
Buxoro Davlat Universiteti

KOGON TUMANIDA SANOAT KORXONALARINING FAOLIYATI NATIJASIDA YUZAGA KELGAN GEOEKOLOGIK O'ZGARISHLAR VA AHOLI HAYOT SIFATI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI KOMPLEKS O'RGANISH

Anotatsiya. *Mazkur maqolada Buxoro viloyati Kogon tumanida faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta'siri, xususan, geoekologik holatdagi o'zgarishlar va ularning aholi hayot sifati ko'rsatkichlariga bevosita hamda bilvosita ta'siri kompleks tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida hududning tabiiy-geografik sharoitlari, sanoat tarmoqlarining joylashuvi, atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalar, tuproq va yer osti suvlarining holati, shuningdek, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rganildi. Natijalar Kogon tumanida sanoatlashuv jarayoni geoekologik muammolarni kuchaytirayotganini va bu holat aholi salomatligi hamda turmush darajasiga salbiy ta'sir o'tkazayotganini ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *geoekologiya, sanoat korxonalari, Kogon tumani, atrof-muhit ifloslanishi, aholi hayot sifati, barqaror rivojlanish.*

Yarashova D. A.
lecturer
Department of Ecology and Geography
Bukhara State University
Abdumurodova Sh.
1st year student
Faculty of Natural Sciences and Agrobiotechnology
Geography Education Program
Bukhara State University

COMPREHENSIVE STUDY OF GEOECOLOGICAL CHANGES CAUSED BY INDUSTRIAL ACTIVITIES IN KOGON DISTRICT AND THEIR IMPACT ON POPULATION QUALITY OF LIFE INDICATORS

Abstract: *This article provides a comprehensive analysis of the environmental impact of industrial enterprises operating in Kogon district of Bukhara region, with particular focus on changes in geoecological conditions and*

their direct and indirect effects on population quality of life indicators. The study examines the area's natural and geographical conditions, the spatial distribution of industrial sectors, atmospheric pollutant emissions, the condition of soils and groundwater, as well as demographic and socio-economic indicators. The results show that the process of industrialization in Kogon district is intensifying geoecological problems, which in turn negatively affects public health and living standards.

Keywords: *geoecology, industrial enterprises, Kogon district, environmental pollution, population quality of life, sustainable development.*

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda sanoat ishlab chiqarishining jadal rivojlanishi iqtisodiy o‘sishning muhim omillaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Biroq sanoat korxonalarining hududiy jihatdan to‘g‘ri joylashtirilmasligi va ekologik talablarning yetarli darajada bajarilmasligi natijasida bir qator geoekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Kogon tumani Buxoro viloyatining muhim sanoat markazlaridan biri sifatida ushbu jarayonlardan chetda qolmagan.

Mazkur hududda neft-gazni qayta ishlash, qurilish materiallari ishlab chiqarish, transport va energetika bilan bog‘liq korxonalar faoliyati atrof-muhitga sezilarli bosim ko‘rsatmoqda. Shu sababli sanoat faoliyati va geoekologik holat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash hamda uning aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga ta’sirini ilmiy asosda o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Hozirgi globallashuv va sanoatlashtirish sharoitida hududlarning ekologik barqarorligi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sanoat korxonalari zich joylashgan hududlarda geoekologik muammolar keskinlashib, ular bevosita aholi salomatligi va hayot sifatiga ta’sir ko‘rsatmoqda. O‘zbekistonning Buxoro viloyati tarkibidagi Kogon tumani ham sanoat rivoji bilan birga ekologik bosim kuchayib borayotgan hududlardan biridir. Ushbu maqolada Kogon tumanida sanoat korxonalari faoliyati oqibatida yuzaga kelayotgan geoekologik o‘zgarishlar hamda ularning aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga ta’siri kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Sanoat korxonalarini rivojlantirish va shu bilan birga inson salomatligini asrash strategiyasini shakllantirish bo'yicha ham bir qator qarorlar O'zbekistonning "O'zbekiston-2030" strategiyasi va "Yashil iqtisodiyot" rivojlantirish konsepsiyasi kabi davlat dasturlari doirasida kiritilingan. Bu esa sanoatni barqaror rivojlantirish, joylarda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, ish o'rinlarida salomatlikni saqlash hamda aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan chora- tadbirlar mazkur invistitsiyalarning asosiy maqsadi bo’lishi kerakligini uqtiradi.

Sanoatning jadal rivojlanishi zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Biroq sanoat korxonalari faoliyati bilan birga atrof-muhitga tushayotgan antropogen yuklama ortib, geoekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, sanoat obyektlari joylashgan hududlarda ekologik holatning yomonlashuvi aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, Kogon tumanida sanoat faoliyati natijasida yuzaga kelayotgan geoekologik o‘zgarishlarni kompleks o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Kogon tumani temiryo'l stansiyasi sifatida qad ko'targan shaharcha hisoblanadi. Temiryo'l Dushanbe shahriga qadar yetib borilgach hamda Kogon-Buxoro temiryo'li qurilgach, Kogon transport tuguniga aylandi. Shu tariqa shahar iqtisodiy - ijtimoiy imkoniyatlari birmuncha o'sganligini ko'rishimiz mumkin. Endilikda shaharda 15-20 dan ortiq sanoat korxonalari bor.

Kogon tumani tekislik hududda joylashgan bo'lib, quruq kontinental iqlim sharoiti bilan ajralib turadi. Yillik yog'in miqdorining kamligi va yoz faslining uzoq davom etishi ekologik muhitning antropogen ta'sirlarga sezgirligini oshiradi. Hududda sanoat korxonalari, jumladan, qayta ishlash, energetika va transport infratuzilmasiga xizmat qiluvchi obyektlar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy rivojlanishga xizmat qilsada, atrof-muhitning geoekologik holatiga muayyan darajada bosim o'tkazadi.

Sanoat korxonalari va transport vositalari faoliyati natijasida atmosferaga zararli gazlar va changsimon moddalar ajralib chiqadi. Bu holat havoning sifatini yomonlashtirib, ekologik vaziyatni murakkablashtiradi. Ayniqsa, sanoat hududlarida havoning ifloslanish darajasi yuqori bo'lishi aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Sanoat korxonalariga misol qilib "Siyoush texstil", "Sanoat gilam", "Neft maxsulotlarini saqlash taqsimlash", "Kogon paxta tozalash" va boshqa korxonalar mavjud. Bu korxonalar aholi yashashi va istemoli uchun kerakli buyumlarni yetkazib, bir hisobda shu yerlik aholiga xizmat qilayotgan bo'lsada atmosferaga zararli gazlar chiqarmoqda. Bu esa inson salomatligi va atrof-muhit uchun zararli va salbiy holatlarni keltirib chiqarmoqda.

Kogon tumanida sanoat va transport vositalari faoliyati natijasida atmosfera havosiga turli gazsimon va changsimon moddalar ajralib chiqadi. Azot va oltingugurt oksidlari, uglerod birikmalari havoning sifatini yomonlashtirib, ekologik muhitning buzilishiga olib keladi. Bu jarayonlar uzoq muddatda havoning tabiiy tozalanish imkoniyatlarini cheklab, mikroiqlim o'zgarishlariga sabab bo'ladi.

Xususan, "Siyovush tekstil" mas'uliyati cheklangan jamiyatining 36 million dollarlik loyihasi o'tgan oyda ishga tushdi. Unda yiliga 40 ming tonna akril ip-kalava yigirish quvvati va 600 ta ish o'rni yaratildi.

Hozirgi korxona loyihaning birinchi bosqichi bo'lib, ayni paytda xorijlik hamkorlar bilan korxona faoliyatini kengaytirish ustida ish olib borilmoqda. Rejaga ko'ra, keyingi bosqichda akril tola hamda undan tayyor mahsulot ishlab chiqarish to'liq mahalliylashtiriladi. Jami ish o'rni soni 1 ming 200 taga yetadi

2001-yilda tashkil etilgan "SANOAT GILAM" MChJ QK O'zbekistonda gilam ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxona faoliyatining asosiy yo'nalishlari: Buxoro va butun O'zbekistonda gilam va gilam mahsulotlari ishlab chiqarish, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va bu mahsulotlarni eksport qilishdan iborat.

Kogon tumani Buxoro viloyatining muhim iqtisodiy markazlaridan biri bo'lib, sanoat va qayta ishlash sohalari tumanning iqtisodiy tuzilishida muhim o'rin tutadi. Tuman markazi Kogon shahridan iborat bo'lib, u Buxoro viloyatining sanoat, transport va logistika tarmoqlarida samarali aloqaga ega hududlaridan biridir.

KNAUF GIPS BUKHARA XK MChJ – bu qurilish materiallari, xususan gipsokarton (gypsum board) va boshqa quruq aralashmalarni ishlab chiqaruvchi korxona. U Kogon shahrida joylashgan va qurilish sanoatiga mahsulot yetkazib beradi.

Kogon shahrida **neft va yog‘ qayta ishlovchi korxonalar** mavjud bo‘lib, ular mahalliy qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va sanoat ehtiyojlariga yo‘naltiradi. Bu korxonalar viloyatning neft-gaz va qayta ishlash salohiyatiga munosib hissa qo‘shadi.

Mintaqada paxta tozalash fabrikalari ham mavjud bo‘lib, ular mintaqaviy paxta yetishtirish zanjirida muhim rol o‘ynaydi. Paxta tolasi bo‘yicha oldingi davrda ham tahliliy ma’lumotlar mavjud.

Buxoro viloyatida korxonalar soni bo‘yicha Kogon tumanining sanoat salohiyati katta bo‘lib, viloyatda umumiy sanoat korxonalarining soni respublikadagi boshqa viloyatlar bilan taqqoslaganda sezilarli ko‘rsatkichga ega. Masalan, Buxoro viloyatida faoliyat ko‘rsatayotgan katta- kichik korxonalar umumiy soni 2023–2025 yillar statistik ma’lumotlariga ko‘ra o‘rtacha 4,000 dan oshgan.

Kogon tumani korxonalarining faoliyati quyidagi yo‘nalishlarda markazlashgan:

✔ **Qurilish materiallari**

• Gipsokarton, quruq aralashmalar kabi mahsulotlar – qurilish sohasida keng qo‘llaniladi.

✔ **Qayta ishlash sohalari**

• Neft va yog‘ mahsulotlari qayta ishlash – mahalliy xom ashyoning qo‘shimcha qiymatga aylanishiga xizmat qiladi.

✔ **Paxta sanoati**

• Paxta tozalash va qayta ishlash – qishloq xo‘jaligi tarmog‘ini rivojlantirishga hissa qo‘shadi.

Sanoat chiqindilarining noto‘g‘ri saqlanishi yoki nazoratsiz tashlanishi tuproq tarkibining kimyoviy muvozanatini buzadi. Natijada tuproq unumdorligi pasayadi, qishloq xo‘jaligi mahsuldorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yer osti va yer usti suv manbalariga sanoat oqavalari tushishi suv sifatining yomonlashishiga olib kelib, ichimlik suvi xavfsizligiga tahdid tug‘diradi. Bunday nohush holatlar tuman hududida tuproq va suv muhitining degradatsiyasini keltirib chiqaradi.

Kogon tumani hududidagi yangi ishlab chiqarish infratuzilmalari landshaft va tabiiy muhitning o‘zgarishiga ham sabab bo’lmoqda. Jumladan, sanoat obyektlari atrofida tabiiy landshaftlar asta-sekin antropogen landshaftlarga almashmoqda. O‘simlik qoplami qisqarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi hududning ekologik barqarorligini susaytiradi. Bu holat uzoq muddatli ekologik xavflarni yuzaga keltiradi.

Atrof-muhit ifloslanishi aholi salomatligining yomonlashuviga olib kelmoqda. Nafas olish tizimi kasalliklari, allergik holatlar va surunkali kasalliklarning ko‘payishi hayot sifatining pasayishiga sabab bo‘lmoqda.

Shuningdek, ekologik noqulayliklar ijtimoiy-iqtisodiy sharoitga salbiy ta’sir ko‘rsatib, aholi migratsiyasini kuchaytirishi mumkin.

Geoekologik holatning yomonlashuvi aholi salomatligida, ijtimoiy farovonlik va demografik jarayonlarda o‘z aksini topmoqda. Tuman bo‘yicha allergik, bronxial va yurak-qon tomir kasalliklarining ko‘payishi ekologik omillar bilan bog‘liq ekani kuzatiladi. Shuningdek, ekologik noqulay hududlarda yashovchi aholining migratsiya faolligi yuqoriroq ekani aniqlangan.

Hududdagi muammolarni yumshatish va barqaror rivojlanish yo‘llarini ishlab chiqish doirasida:

- sanoat korxonalarida ekologik toza texnologiyalarni joriy etish;
- atmosferaga chiqariladigan chiqindilarni qat’iy nazorat qilish;
- yashil hududlar va sanitariya-himoya zonalarini kengaytirish;
- aholining ekologik madaniyatini oshirish masalalari atroflicha o’rganilishi kerak

Kogon tumani hududida sanoat korxonalarining faoliyati natijasida yuzaga kelgan geoekologik o‘zgarishlar anchagina va bular aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga salbiy ta’sir o’tkazmoqda. Atrof - muhit uchun sezilarli xavf tug’dirayotgan bunday holatlarni oldini olish va mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi vazifalar inobatga olinishi kerak;

- "Yashil" sanoatni rivojlantirish: Sanoat korxonalarida ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish.

- Sanoat korxonalarida mehnat muhofazasi: Ishchilar salomatligini himoya qilish, ish joylarida xavfsiz sharoit yaratish va kasbiy kasalliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar.

- Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish: Korxonalar xodimlarining sog'lig'ini yaxshilash, jismoniy tarbiya va sportni qo'llab-quvvatlash bo’yicha amaliy tadbir, marafon va topshiriqlar tayinlash.

- Barqaror rivojlanishga qaratilingan investitsiyalar: Sanoatning yangi "drayver" sohalarini rivojlantirishda inson salomatligi va ekologik me'yorlarni hisobga olish.

Kogon tumanida sanoat korxonalarining faoliyati geoekologik muhitga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, aholi hayot sifati ko‘rsatkichlarining pasayishiga olib kelmoqda. Tadqiqot natijalari hududda barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun ekologik siyosatni kuchaytirish va sanoat faoliyatini geoekologik jihatdan optimallashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshpulatov A.T. Hududiy geoekologik jarayonlar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
2. Karimov I.A., Mirzayev M.M. Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta’siri. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2015.
3. Qodirov R.Q. Sanoat geografiyasi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2009.
4. Nazarov I.N. Aholi hayot sifati va ekologik xavfsizlik. — Toshkent: Fan, 2018.

5. Xudoyberganov A.X. Ijtimoiy-ekologik muammolar. — Toshkent: Ma’naviyat, 2014.
6. Hakimov U.A. Buxoro viloyatining tabiiy-geografik sharoiti va ekologik muammolari. — Buxoro, 2017.
7. Yarashova D.Sh. Buxoro viloyatining geoekologik muammolari. — Magistrlik dissertatsiyasi. Buxoro davlat universiteti, 2024.

UDK: 504.054:677.21

Yarashova D.A.
Ekologiya va Geografiya kafedrasi o'qituvchisi
Buxoro Davlat Universiteti
Fozilova M.
bosqich talabasi
Geografiya ta'lim yo'nalishi
Tabiiy fanlar va agrobiotexnologiya fakulteti
Buxoro Davlat Universiteti

PESHKU PAXTA TOZALASH ZAVODI FAOLIYATINING HUDUD GEOGRAFIK TIZIMLARGA KO'RSATADIGAN ANTROPOGEN TA'SIRI VA MAHALLIY AHOLI SALOMATLIGI HAMDA YASHASH MUHITI SIFATIGA TA'SIRI

Anotatsiya: *Mazkur ilmiy maqolada Buxoro viloyatining Peshku tumanida joylashgan paxta tozalash zavodi faoliyatining hududiy geografik tizimlarga ko'rsatadigan antropogen ta'siri, shuningdek, ushbu ishlab chiqarish jarayonlarining mahalliy aholi salomatligi va yashash muhiti sifatiga ta'siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida atmosfera havosi, tuproq va suv resurslarining ifloslanish darajasi, shovqin va chang omillari hamda ularning ekologik va ijtimoiy oqibatlari o'rganildi. Natijalarga ko'ra, paxta tozalash sanoati hududda ekologik bosimni kuchaytirib, aholi hayot sifati va sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada muammoni yumshatish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *paxta tozalash zavodi, antropogen ta'sir, hududiy geografik tizim, ekologik holat, aholi salomatligi, yashash muhiti.*

Yarashova D. A.
lecturer
Department of Ecology and Geography
Bukhara State University
Fozilova M.
1st year student
Geography Education Program
Faculty of Natural Sciences and Agrobiotechnology
Bukhara State University

ANTHROPOGENIC IMPACT OF THE PESHKU COTTON PROCESSING PLANT ON TERRITORIAL GEOGRAPHIC SYSTEMS, AND ITS EFFECTS ON LOCAL POPULATION HEALTH AND THE QUALITY OF THE LIVING ENVIRONMENT

Abstract: *This scientific article provides a comprehensive analysis of the anthropogenic impact of the cotton processing plant located in Peshku district of*

Bukhara region on territorial geographic systems, as well as the effects of these production processes on local population health and the quality of the living environment. The study examines the levels of air, soil, and water pollution, noise and dust factors, and their ecological and social consequences. The results indicate that the cotton processing industry intensifies environmental pressure in the area and negatively affects the quality of life and health of the population. The article also presents scientifically grounded recommendations to mitigate the problem.

Keywords: *cotton processing plant, anthropogenic impact, territorial geographic system, environmental condition, population health, living environment.*

Tabiatga ko‘rsatilgan har qanday antropogen bosim, avvalo, inson salomatligi va yashash muhiti sifatida o‘z aksini topadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta’sirini kamaytirish, aholi salomatligini muhofaza qilish hamda hududlarning barqaror rivojlanishini ta’minlash masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 21-apreldagi PF–5024-son Farmoni hamda 2019-yil 30-oktabrdagi PQ–4502-son qarorida sanoat faoliyati natijasida yuzaga keladigan antropogen ta’sirlarni cheklash, ekologik monitoringni kuchaytirish va yashash muhiti sifatini yaxshilash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar talablaridan kelib chiqib, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashga ixtisoslashgan sanoat korxonalari, jumladan paxta tozalash zavodlarining hududiy geografik tizimlarga ko‘rsatadigan ta’sirini ilmiy jihatdan o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Paxta tozalash zavodlari iqtisodiy jihatdan muhim bo‘lishiga qaramasdan, ularning faoliyati atmosfera havosining changlanishi, tuproq va suv resurslarining ifloslanishi hamda shovqin omillari orqali tabiiy muhit komponentlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Peshku paxta tozalash zavodi Buxoro viloyati Peshku tumanining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin egallaydi. Shu bilan birga, mazkur korxona faoliyatining mahalliy aholi salomatligi va yashash muhiti sifatiga ta’sirini Prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda amaldagi ekologik qonunchilik talablari asosida baholash ilmiy-amaliy jihatdan muhim vazifa hisoblanadi. Biroq ushbu korxonalar faoliyati natijasida atmosferaga chiqarilayotgan chang, chiqindi va shovqin omillari tabiiy muhit komponentlariga hamda aholi salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Peshku paxta tozalash zavodi tuman iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, uning faoliyati hududning ekologik holati va yashash muhiti sifatiga ta’sirini ilmiy jihatdan baholash dolzarb masala hisoblanadi.

Paxta yetishtirish va uni qayta ishlash O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotida muhim o'rin egallaydi. Paxta tozalash va chigitidan yog' olish korxonalari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sanoat mahsulotlariga aylantirishda asosiy bo'g'in hisoblanadi. Peshku tuman aholisi asosan paxtachilik, g'allachilik, sabzavot va polizchilik bilan shug'ullanadi. Sanoat korxonalari faoliyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bilan bog'liq. Paxta

tozalash zavodi, 2 ta avto korxona, 427 ta kichik, 2 ta koperativ 1 ta xo'jaliklararo korxona bor. Biroq ushbu korxonalarning faoliyati atrof-muhitga muayyan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Peshku paxta tozalash zavodi tuman iqtisodiyotida muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, uning faoliyati hududning ekologik holati va yashash muhiti sifatiga ta’sirini ilmiy jihatdan baholash dolzarb masala hisoblanadi.

Peshku tumani asosan qishloq xo‘jaligiga tayanadi. Tuman geografik jihatdan quruq, sug‘oriladigan hududlarda joylashgan bo‘lib, **paxta va g‘alla** yetishtirish bilan mashhur. Paxta “oq oltin” deb atalib, iqtisodiyotda muhim eksport manbai bo‘lib qolmoqda. Statistika ma’lumotlariga ko‘ra, Buxoro viloyatidagi yetishtirilgan asosiy dehqonchilik mahsulotlari orasida Peshku tumani ham sezilarli ulushga ega – masalan, kartoshka, poliz ekinlar va uzum yetishtirish bo‘yicha yetakchi.

Peshku tumanida sanoat sektori yengil sanoatni, jumladan qurilish materiallari va mato sanoatini o‘z ichiga oladi — bu viloyat strategiyasiga muvofiq rivojlanmoqda. Masalan, Buxoro viloyatida qurilish materiallari va tekstil sanoatiga e’tibor qaratilib, bu tumanlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish rejalashtirilgan.

Tumandagi kichik biznes va xizmatlar sektori ham mavjud — oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, mahalliy bozorlar orqali savdo faoliyati va kichik korxonalar orqali bandlikni ta’minlaydi. Hozirgi iqtisodiy islohotlar natijasida viloyat, shu jumladan Peshku tumanida yangi investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Misol uchun, viloyat darajasida umumiy $1.7 mlrd investitsiya hajmida ko‘plab ish o‘rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Peshku tumanida past xarajatli issiqxonalar orqali eksportga yo‘naltirilgan ekinlar yetishtirish tajribasi kengaytirilmoqda.

Bu kabi loyihalar tuman aholisining daromad manbalarini kengaytirish, ish o‘rinlarini yaratish va iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan. Statistika boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, Peshku tumanining tashqi savdo tovar aylanmasidagi ulushi ham mavjud, bu aylananing bir qismi paxta, xomashyo va qayta ishlangan mahsulotlarni o‘z ichiga oladi.

Paxta tozalash zavodlari asosan atrof - muhitga salbiy tasirlar ham ko'rsatadi. Paxta tozalash jarayonida tolalarni chigitidan ajratish va tozalash vaqtida katta miqdorda chang, tolali zarrachalar va organik chiqindilar havoga tarqaladi. Ushbu zarrachalar atmosferaning ifloslanishiga, ishchi - xodimlar va shu hudud aholisining salomatligiga zaraz yetishiga, nafas yo'llari kasalliklarining (astma, bronxit, laringit va b.) ko'payishiga sabab bo'ladi. Ayniqsa chang konsentratsiyasining yuqori bo'lishi ekologik muhitning yomonlashuviga olib keladi.

Peshku tumani asosan tekislikdan iborat, Buxoro viloyatining markazida joylashgan. Peshku tumanining 4% ga yaqin maydoni Buxoro vohasidagi sug'oriladigan yerlardan iborat, qolgan qismi turli tipdagi cho'l va yaylovlardir. Iqlimi subtropik belgilarga ega bo'lgan keskin kontinental cho'l iqlimli. Tuman hududi shimoli - g'arbga cho'zilganligi tufayli iqlimida sezilarli tafovut bor. Yil davomida shamol esadi. Iqlimning bunday xususiyatlari va tuman hududi asosan tekislik va cho'ldan iboratligi turli xil changlarning, tolalarning beixtiyor

tarqalishiga va turli xil kasalliklar ko'payishiga zamin yaratib beradi. Paxta tozalashda ishlatiladigan mexanik uskunalar yuqori darajada shovqin chiqaradi. Bu esa ishchilarning mehnat sharoitiga, yaqin hududdagi aholining tinchligiga salbiy tasir ko'rsatadi. Chigitdan yog' olish jarayonida ekstratsiya usuli qo'llanilganda erituvchilar ishlatiladi. Ushbu moddalar taksik xususiyatga ega. Bu moddalar havo va suvga tushganda istemol uchun ekologik xavf tug'diradi.

Paxta tozalash jarayonida katta miqdorda chang va mayda tolalar ajralib chiqadi. Ushbu zarrachalar atmosfera havosining ifloslanishiga olib kelib, ayniqsa zavodga yaqin joylashgan aholi punktlarida havoning sifatini pasaytiradi. Changning uzoq muddat havoda saqlanib qolishi nafas yo‘llari kasalliklarining ko‘payishiga sabab bo‘ladi.

Ishlab chiqarish chiqindilarining noto‘g‘ri saqlanishi va tarqalishi tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Paxta changi va texnologik chiqindilar tuproq unumdorligini pasaytirib, agroekotizimlarning barqarorligiga tahdid soladi.

Zavodda ishlatiladigan texnik suvlarning yetarli darajada tozalanmasdan tashlanishi yer osti va yer usti suvlarining ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bu holat ichimlik suvi sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, sanitariya-gigiyena muammolarini yuzaga keltiradi. Peshku tumani cho'l zonasida joylashgan, doimiy oqar suvlar yo'q. Ekinzorlar Amu-Buxoro mashina kanalining shimoli-g'arbiy tarmog'idan sug'oriladi. Tuman hududidan qo'shni tumanlarga kirib keladigan oqava suvlar shimoli-g'arbiy kolektor orqali Qoraqir ko'liga oqiziladi. Chorva mollarini sug'orishda va sanoat korxonalarida asosan yer osti suvlaridan foydalaniladi. Paxta tozalash va yog' ishlab chiqarish jarayonida texnologik suvlar hosil bo'ladi, agar bu suvlar yetarli darajada tozalanmasa va maxsus zovurlarga oqizilmasa daryo va kanallarning ifloslanishiga, yer osti suvlari sifatining pasayishiga olib keladi. Bu esa ichimlik suvlarining keskin kamayishiga, atrof-muhit biologiyasi zararlanishiga va chorva mollarining kasallanishiga olib keladi.

Paxta tozalash zavodi faoliyati bilan bog‘liq asosiy salbiy omillar — chang, shovqin va noxush hidlar — mahalliy aholi hayot sifatining pasayishiga olib keladi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, zavodga yaqin hududlarda yashovchi aholida allergik kasalliklar, bronxit va astma kabi nafas yo‘llari kasalliklari ko‘proq uchramoqda.

Ekologik tasirni kamaytirish uchun zamonaviy texnologiyani joriy etish, chang ushlovchi va filtirlash tizimini o'rnatish, energiya tejamkor uskunalardan foydalanish, yopiq ekstratsiya tizimlarini qo'llash zarur. Biologik va mexanik tozalash inshoatlarini qurish orqali suvni qayta ishlash mumkin. Bu suv resurslarining tejalishiga xizmat qiladi. Korxonada doimiy ekologik nazorat va atrof muhitga tasirni baholash tizimni joriy etish lozim. Bunday texnologiyalar sanoat va ekologiya barqarorligida muhim rol o'ynaydi.

Shovqin darajasining yuqoriligi asab tizimiga salbiy ta’sir ko‘rsatib, uyqu buzilishi va surunkali charchoq holatlarini keltirib chiqaradi. Bu esa umumiy yashash muhiti sifatining pasayishiga sabab bo‘ladi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, Peshku paxta tozalash zavodi faoliyati hududiy geografik tizimlarda antropogen yuklamani oshirmoqda. Ushbu jarayonlar uzoq muddat davom etsa, ekologik muvozanatning buzilishi va ijtimoiy muammolarning kuchayishiga olib kelishi mumkin.

Hudud to’g’risida o’rganilgan ishlar va olingan tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar chiqarildi:

- paxta tozalash zavodi atmosfera, tuproq va suv resurslariga sezilarli antropogen ta’sir ko‘rsatmoqda;
- mazkur ta’sirlar mahalliy aholi salomatligi va yashash muhiti sifatining pasayishiga olib kelmoqda.

Muammoni yumshatish maqsadida quyidagi tavsiyalar beriladi:

- zamonaviy chang tutish va filtratsiya texnologiyalarini joriy etish;
- ishlab chiqarish chiqindilarini ekologik xavfsiz usulda boshqarish;
- sanitariya-himoya zonalarini kengaytirish;
- muntazam ekologik monitoring va aholi salomatligini nazorat qilish.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, paxta tozalash va chigitidan yog' olish zavodlari iqtisodiy jihatdan muhim bo'lsada, uning atrof-muhitga salbiy tasiri mavjud. Havo, suv va tuproq ifloslanishining oldini olish, zamonaviy texnologiyalar va ekologik boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali amalga oshirish mumkin. Barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun sanoat va ekologiya o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarur. Shu sababli bunday korxonalarni qurishni avvalo planlashtirish, aholi zich joylashgan hududlardan uzoqroqda barpo etish, eng so'ngi zamonaviy texnologiyalar va filtrlardan foydalanish zarur.

Peshku paxta tozalash zavodi faoliyatining hududiy geografik tizimlarga va aholi salomatligiga ta’sirini ilmiy asosda baholash hududning barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqola natijalari amaliy va ilmiy tadqiqotlar uchun muhim manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O‘zbekistonning ekologik xavfsizligi va barqaror rivojlanish masalalari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
2. SH. A. Mutalov, T. T. Tursunov, M. M. Niyozova, K. M. Adilova, B. Z. Zaynidinova, A. A. Mahsudova . " Sanoat ekalogiyasi" (atrof muhit muhofazasi) Darslik. 2020
3. A. A. Safarov. "Paxta xomashyosini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi", Toshkent. 2021.
4. To‘xtayev A.S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Abdurahmonov B.A. Sanoat korxonalarining atrof-muhitga ta’siri va ekologik monitoring. – Samarqand, 2018.
6. Ismoilov M., Rahmonov O. O‘zbekiston hududlarida sanoat va ekologik muammolar. – Toshkent, 2021.
7. WHO. Air pollution and public health impacts. – Geneva, 2022.

УДК 616-053.31/32 + 618.3 + 314.422.2

Yuldasheva G.G.
associate professor
Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9095-200X

MORBIDITY PATTERNS AND CLINICAL OUTCOMES OF PREMATURE NEWBORNS

Abstract: *Extremely premature newborns are characterised by a high incidence of morbidity and adverse clinical outcomes due to the immaturity of organs and systems and the impact of perinatal risk factors. Analysis of retrospective data on premature births at 22.0–27.0 weeks of gestation showed a predominance of central nervous system lesions, bronchopulmonary dysplasia, retinopathy of prematurity, and psychomotor development disorders. Follow-up observation during the first year of life revealed a high level of disability, delayed motor and physical development, and persistent somatic and respiratory morbidity.*

The results obtained indicate the formation of stable patterns of morbidity in extremely premature infants and emphasise the need for early multidisciplinary observation, timely rehabilitation, and a personalised approach to the management of this group of patients.

Keywords: *premature, extremely low birth weight infants, follow-up, patterns*

Relevance

In recent years, thanks to advances in obstetrics, neonatology, and intensive care, the survival rate of extremely premature infants with very low birth weight (VLBW) and extremely low birth weight (ELBW) has increased significantly [1, 8]. Prematurity and perinatal CNS damage largely determine the further development and health of children. Children born weighing less than 1500 g at the age of 1 year are characterised by a high incidence of acute morbidity, somatic pathology, the formation of consequences of perinatal CNS damage and disability, a large number of health disorders, low body weight and length indicators, frequent deviations in physical development in the form of short stature, underweight, and a combination of both, large increases in weight and length, a high frequency of profound and complex neuropsychological developmental delays caused by delayed motor development, active and comprehensible speech, and skills in the first year of life, and an average age of neuropsychological development that is lower than the adjusted age [3-6] .

Today, caring for children with a birth weight (BW) of less than 1,000 g is one of the most difficult medical and organisational problems. Improvements in neonatal resuscitation methods and principles of caring for extremely premature newborns have led to a 37% decrease in early neonatal mortality in Russia by 2019

in the group of children with extremely low birth weight (ELBW), and the survival rate is increasing every year. Thus, in obstetric hospitals in the Russian Federation, the survival rate of extremely low birth weight newborns in the 500-749 g weight group is 299.4 (per 1,000 live births), and in the group of children with MT 750-999 g - 551.3 (per 1,000 live births) [2, 5, 6]. Due to extreme prematurity, 50% of newborns are diagnosed with severe neurological diseases, including cerebral palsy, visual impairment (blindness), hearing impairment (deafness), and severe respiratory disorders [1, 7, 11].

Premature babies with extremely low birth weight have a number of anatomical and physiological characteristics that must be taken into account in the daily care of this group of children. Most babies with low birth weight (less than 2500 g) are premature babies born at 24–30 weeks of gestation (71.3%), while the rest are premature and full-term babies with a body weight that is not appropriate for their gestational age [1,2,8]. The vast majority of extremely premature babies are prone to respiratory disorders of varying severity after birth, which is associated with immature lung tissue and a lack of surfactant [5,9]. In this regard, the use of mechanical ventilation (MV) and various methods of continuous positive airway pressure (CPAP) is a pathogenetically justified way of forming functional residual capacity (FRC), preventing atelectrauma, and stimulating spontaneous breathing [1,10].

The premise for the search for the most effective methods of lung stabilisation in premature infants is that artificial ventilation, including mask ventilation, can in itself lead to negative consequences in extremely premature patients, especially if it is performed without respiratory volume control [3,6,11].

Research objective: to study the patterns of morbidity and clinical outcomes in extremely premature newborns.

Materials and methods: A retrospective study was conducted of 50 cases of premature births at 22.0–27.0 weeks, delivered at the regional perinatal centre in Bukhara between 2023 and 2025, 50 cases of newborn development, and 40 outpatient records of patients under the supervision of clinicians in the follow-up office.

Results and discussion. Analysis of obstetric history revealed that the average age of mothers was 23.4 ± 0.94 years. In terms of parity, 61% of women were primiparous. In terms of place of residence, the majority of women in labour lived in rural areas (92%). In 82% of cases, the level of education was average. Risk factors for premature birth were: inflammatory diseases of the pelvic organs (42.1%), primary and/or secondary infertility (17.36%), and cervical diseases (32%). The following were established: a complicated obstetric and gynaecological history (induced abortions, spontaneous miscarriages, non-developing and ectopic pregnancies) in 69% of women. A history of premature birth was noted in 35.2% of pregnant women. Habitual miscarriage was diagnosed in 21.1% of women. Threatened miscarriage was diagnosed in 46%. A scar on the uterus after a caesarean section was found in 18.4% of women. In 10.4% of cases, pregnancy occurred as a result of assisted reproductive technologies, in particular in vitro fertilisation. The

structure of extragenital diseases is dominated by grade 2 anaemia, which accounted for 76%, acute respiratory viral infections (ARVI) – 51.1%, gestational hypertension – 34%, thyroid pathology – 39%, urinary system pathology – 32%, and metabolic disorders – 20%.




Figure 1. Retrospective obstetric data.

A total of 50 children born between 22.0 and 27.6 weeks of gestation with a birth weight of 525 to 987.0 g (mean MW – 756.0±12.9 g) were examined. In group 1, 3 (6%) children were born at 23.4 weeks via natural birth canal. Two of them died on the second day. In the second group, 47 (94%) children were born at 25–27 weeks, 69% of whom were delivered vaginally. Nine (24.3%) children died, 5 (55.6%) of whom were delivered vaginally. The indications for termination of pregnancy were: severe preeclampsia in 23 (46%) and placental abruption in 4 (8%). Of the 50 women examined, only 38 (76%) received RDS prevention.

In children born at 22–24 weeks (n = 3), respiratory distress syndrome (RDS) was observed in all newborns (100%). In this group, respiratory failure was extremely severe: early mechanical ventilation and high oxygen concentrations were required. Such a high incidence of RDS is explained by the extremely immature structure of the lung tissue and a pronounced surfactant deficiency. Among children born at 25–27 weeks (n = 47), RDS occurred in 42 newborns, corresponding to a frequency of 89%. In this group, respiratory failure was moderate, with most children requiring non-invasive respiratory support or combined ventilation methods. The decrease in the incidence and severity of RDS

is associated with the progressive maturation of the alveolar system and a gradual increase in the synthesis of endogenous surfactant.

In the group of children born at 22–24 weeks (n = 3), the main causes of premature birth were: severe obstetric complications in the mother, including pre-eclampsia and placental abruption, premature rupture of membranes, and intrauterine infection. In the group of children born at 25–27 weeks (n = 47), the leading causes of preterm birth were: threatened miscarriage, including isthmic-cervical insufficiency, intrauterine infection and inflammatory processes in the mother (intrauterine infections, chorioamnionitis), obstetric complications such as polyhydramnios, late gestosis, pregnancy-induced hypertension syndrome, and the use of assisted reproductive technologies (ART) with a high frequency of multiple pregnancies, which increased the risk of early onset of labour.

Thus, the main causes of extremely preterm birth are associated with a combination of maternal, obstetric and foetal factors, among which pre-eclampsia, threatened miscarriage and intrauterine infection predominate.

A follow-up study was conducted on 40 children born with extremely low birth weight (outpatient observation data). All children examined by the age of 1 year showed signs of perinatal CNS damage. Adverse neurological outcomes were observed in 12 children (24%): cerebral palsy in 6 (12%), organic CNS damage in 3 (6%), and hydrocephalus in 3 (6%). A 50% loss of vision due to retinopathy of prematurity was diagnosed in 3 children (6%), and grade II sensorineural hearing loss was diagnosed in 7 children (14%).

Clinical manifestations of bronchopulmonary dysplasia persisted at 1 year of age in 12 children (24%). Among the children examined, 4 (8%) did not suffer from acute respiratory diseases, and 16 children (32%) had ≥3 episodes of acute respiratory diseases.

Anthropometric measurements at 1 year of age showed an average body weight of 6580.1 ± 1005.2 g and an average body length of 70.1 ± 2.0 cm. Analysis of psychomotor development showed that 7 children (14%) were walking independently, which corresponded to the age norm for full-term peers. In 20 children (40%), motor development corresponded to their corrected age, while in 30 children (60%), motor development delay was detected.

Conclusion. The health status of children born at a gestational age of ≤27 weeks at 1 year of age was characterised by a high frequency of complications of perinatal CNS lesions (100%), disability (24%), physical development abnormalities (40%), psychomotor development delay (60%), and a significant level of diagnosis of various pathological conditions.

References:

1. Vinogradova I. V., Ivanov D. O. Development indicators for children born with extremely low birth weight at the age of 1 year // Questions of Practical Paediatrics. – 2014. – Vol. 9, No. 3. – Pp. 52–55.

2. Organisation of follow-up observation of children with very low and extremely low birth weight / Baibarina E. N., Malyshkina A. I., Nazarov S. B. [et al.] // Methodological letter. – Ivanovo, 2013. – 16 p.

3. Plasma cytokine level changes in preterm neonates with respiratory disorders in the early neonatal period./ Nikitina I.V., Inviyaeva E.V., et al.//. Obstetrics and Gynaecology. 2021; No. 8:133–142.
4. Yuldasheva G.G., Bakhranova N.R., & Baratov S.S. (2021). Statistical analysis of the structure of the birth rate of underweight children in the Bukhara region. Art of Medicine International Medical Scientific Journal.
5. Lebedeva O.V. Morbidity and mortality of children with very low and extremely low birth weight: risk factors and ways to reduce them //Bulletin of New Medical Technologies. Electronic edition. 2015. Vol. 9. No. 2. P. 30.
6. Lebedeva O.V. Optimisation of diagnosis, prognosis and prevention of perinatal complications in children with very low and extremely low birth weight //abstract of doctoral dissertation in medical sciences. – Astrakhan. 2015 – 49 p.
7. Navruzova Sh.I., Yuldasheva G.G. The effectiveness of surfactant therapy in premature infants with respiratory distress syndromehttps://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-terapii-surfaktantom-u-nedonoshennyh-detey-s-respiratornym-distress-sindromom/viewer
8. Polyana E.Z., Kuzmina O.N., Trambitskaya E.L. Features of the course of respiratory distress syndrome in premature infants with concomitant toxic-metabolic lesions of the central nervous system //Problems and prospects for the development of science in Russia and the world: collection of articles from the International Scientific and Practical Conference (5 June 2016, Kirov). In 3 parts. Part 2/- Ufa: Aeterna, 2016. Pp. 155-163.
9. Polyanina E.Z., Melyuchenkov M.A., Uteshova I.A. Red blood cell counts in children with very low and extremely low body weight against the background of complex treatment of early anaemia in premature infants //Traditional and innovative science: history, current state, prospects: collection of articles INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 'SYMBOL OF SCIENCE' No. 01-2/2017 ISSN 2410-700X 163 International Scientific and Practical Conference (1 June 2016, Ufa). In 4 parts. Part 3/ - Ufa: Aeterna, 2016. Pp. 261-265.
10. Tsareva Zh.A., Tsarkova S.A., Leshchen Surfactants in newborns: what's new? XXI All-Russian Scientific and Educational Forum 'Mother and Child'. Satellite symposium of the company 'Nativa'. Effective pharmacotherapy. 2020. Volume 16. No. 28. Obstetrics and Gynaecology https://umedp.ru/articles/surfaktanty-u-novorozhdennogo-chto-novogo-xxi-vserossiyskiy-nauchnoobrazovatelnyy-forum-mat-i-ditya-.html

Yusufova L.G'.
"Buxgalteriya hisobi va marketing" kafedrasi assistenti
TTYSI instituti

MEVA VA SABZAVOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATI

Annotatsiya: *maqolada meva va sabzavotlarni qayta ishlash sanoatining iqtisodiyotdagi o'rni, ahamiyati va rivojlanish istiqbollari tahlil qilingan. Qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qo'shimcha qiymatini oshirish, eksport salohiyatini kuchaytirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Shuningdek, sohada mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.*
Kalit so'zlar: *meva va sabzavotlar, qayta ishlash sanoati, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, eksport, qo'shimcha qiymat.*

Yusufova L.G.
assistant professor
Department Accounting and Marketing
TTYUSI Institute

FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY

Abstract: *This article analyzes the role, significance, and development prospects of the fruit and vegetable processing industry in the economy. It highlights the challenges of increasing the added value of agricultural products, strengthening export potential, and ensuring food security through the development of the processing industry. It also presents existing challenges in the industry and research and practical proposals for addressing them.*
Keywords*: fruits and vegetables, processing industry, food industry, agriculture, export, added value.*

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash sanoati – bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'mol uchun qulay, saqlash muddati uzoq, yuqori qo'shilgan qiymatga ega yangi mahsulotlarga aylantirish jarayonidir. Bu sanoat faqat qishloq xo'jaligiga bog'liq bo'lgan iqtisodiyotlarni diversifikatsiyalash, ish o'rinlari yaratish va eksport daromadlarini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbekiston, iqlim sharoiti va qishloq xo'jaligi salohiyatining yuksakligiga qaramay, hozirgi vaqtda meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash darajasi ancha pastligicha qolmoqda. Shu sababli, ushbu sanoatni rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotini o'sishida muhim omil hisoblanadi.Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, meva va sabzavotlarni qayta ishlash sanoati aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda eksport hajmini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Meva va sabzavotlarni xomashyo holida sotish bilan cheklanib qolish iqtisodiy jihatdan samarasiz bo‘lib, ularni qayta ishlash orqali yuqori qo‘shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Shu sababli mazkur sohani rivojlantirish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash sanoati oziq-ovqat sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, u xomashyoni saqlash, qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu sanoat tarmog‘ining asosiy maqsadi mahsulotlarning yaroqlilik muddatini uzaytirish va ularning iste’mol qiymatini oshirishdan iborat.

Nazariy jihatdan qayta ishlash jarayonlari quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi:

- konservalash va muzlatish;
- quritish va suvsizlantirish;
- sharbat va pyure ishlab chiqarish;
- yarim tayyor mahsulotlar tayyorlash.

Mazkur jarayonlar zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshirilganda mahsulot sifati va raqobatbardoshligi oshadi.

Xalqaro miqyosda meva-sabzavot qayta ishlash sanoati 500 milliard dollardan ortiq bo‘lgan yirik bozor hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda (AQSh, Yevropa Ittifoqi) yetishtirilgan meva-sabzavotlarning 70-80% foizi qayta ishlanadi, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa bu ko‘rsatkich 20-30% atrofida.

Rivojlangan mamlakatlarda mehnat resurslarining 2-5 foizi, kam taraqqiy etgan aksariyat mamlakatlarda esa 90 foizgacha qishloq xo‘jaligi tarmog‘ida mehnat qiladi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi rivojlangan mamlakatlardagiga nisbatan ancha katta rol o‘ynaydi. Yalpi ichki mahsulotda qishloq xo‘jaligining salmog‘i rivojlanayotgan mamlakatlarda o‘rtacha 22 foizni, rivojlangan mamlakatlarda 4 foizni tashkil etadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda rivojlangan mamlakatlarda yetishtirilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining yarmidan ko‘prog‘i yetishtirilmoqda. BMT ekspertlari fikrlaricha, har yili oziq-ovqat muammosini yechish uchun uning hajmi 6 foiz oshirib borilishi talab etiladi.

Tahlillarga qaraganda, yurtimizda bog‘ va tokzorlarda hosildorlik juda past. Masalan, qishloq xo‘jaligi rivojlangan AQSH, Xitoy, Italiya, Fransiya kabi davlatlarda bir gektar intensiv bog‘dan 80-120 tonna, ayrim mevalardan 140 tonnagacha hosil olinsa, yurtimizda bir gektardan 10-30 tonna, an’anaviy bog‘-tokzorlardan esa 4-5 tonna mahsulot olinadi. Bu albatta iqtisodiy jihatdan samarasiz qishloq xo‘jaligidir[28].

Global tendensiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Sog‘lom ovqatlanishga bo‘lgan talabning oshishi: Tabiiy ingredientlar, organik va vitaminlarga boy mahsulotlarga istiqbollar kuchaymoqda.

[28] https://stat.uz/img/press_reliz_tashi_savdo_eng_yanvar-dekabr_2024_p18901.pdf

Qulaylikka intilish: Tayyor ovqatlar, kokteyllar, quritilgan va muzlatilgan mahsulotlarga talab ortmoqda.

Texnologik innovatsiyalar: Yuqori gidrostatik bosim (HPP), liyofilizatsiya (muzlatib quritish), minimal ishlov berish texnologiyalari yangi sifatli mahsulotlar yaratishga imkon beradi.

Meva va sabzavotlarni qayta ishlashning bir necha asosiy yo‘nalishi mavjud:

Konservalash: Kompot, sirop, murabbo, turli souslar tayyorlash. Bu an’anaviy va keng tarqalgan usul hisoblanadi.

Quritish va dehidratsiya: Quritilgan meva, sabzavot chipslari, kukuni. Uzoq muddatli saqlash va og‘irlikni kamaytirish imkoniyatini beradi.

Muzlatish (frozen): Muzlatilgan meva-sabzavotlar, yarim tayyor mahsulotlar. Vitamin va fiziologik xususiyatlarni saqlab qolishda eng samarali usullardan biri.

Fermentatsiya va turli ichimliklar tayyorlash: Meva sharobari, kokteyllar, gazlangan ichimliklar, sabzavot soklari.

To‘yimli va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish: Meva yog‘ochchasi, granola, yog‘urtlar, bolalar ovqatlari.

Zamonaviy texnologiyalar mahsulot sifatini saqlash, energiya tejamkorligi va ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

O‘zbekiston meva-sabzavot qayta ishlash sanoatini rivojlantirish uchun noyob imkoniyatlarga ega:

Keng assortiment va yuqori hosildorlik: Apelsin, olma, o‘rik, shaftoli, pomidor, bodring va boshqa turli mahsulotlarning keng navlari yetishtiriladi.

Iqlim sharoiti: Ko‘pchilik meva va sabzavotlar mavsumda bir necha marta hosil beradi.

Hukumatning qo‘llab-quvvatlovchi siyosati: “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bir qator dasturlar (masalan, “Yashil makon” dasturi) amalga oshirilmoqda. “Xomashyo-sotuvchi” ishlab chiqaruvchilarga soliq imtiyozlari joriy etilgan.

Logistika imkoniyatlarining oshishi: Yangi transport koridorlari va logistika markazlarining qurilishi eksportni osonlashtiradi.

So‘nggi yillarda meva va sabzavotlarni qayta ishlashda innovatsion va energiya tejamkor texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Bular mahsulot sifatini saqlab qolish bilan birga ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy texnologiyalar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- vakuumli quritish texnologiyalari;
- tez muzlatish usullari;
- avtomatlashtirilgan saralash va qadoqlash tizimlari;
- ekologik toza qayta ishlash jarayonlari.

Mazkur texnologiyalarni qo‘llash mahsulotlarning xalqaro standartlarga mos bo‘lishini ta’minlaydi.

Meva-sabzavot eksportining umumiy natijalari (2023-2024) Davlat statistika agentligi ma’lumotiga ko‘ra, 2024 yilda meva va sabzavot mahsulotlari eksporti:

hajm: 2 036.2 ming tonna

qiymat: 1 549.5 mln AQSh dollari

2023 yilga nisbatan hajm +15.8 foiz, qiymat +31.2 foiz.

Shundan kelib chiqib 2023 yil taxminiy bazaviy ko‘rsatkichlari (hisobotdagi o‘sish foizlari asosida hisob):

2023 hajm: 1 758.4 ming tonna (2 036.2 / 1.158)

2023 qiymat: 1 181.0 mln dollar (1 549.5 / 1.312)

Bu natija shuni anglatadiki, qiymat o‘sishi hajm o‘sishidan tez. Demak, eksport tarkibida nisbatan qimmatroq segmentlar, jumladan qayta ishlangan mahsulotlar ulushi kuchayayotgan bo‘lishi mumkin.

MDH Mamlakatlari Qiyosiy Statistikalari (2022)

Ko‘rsatkich	O‘zbekiston	Qozog‘iston	Rossiya	Ukraina
Qayta ishlash hajmi (mln tonna)	0.39	0.42	4.8	1.2
Qayta ishlash darajasi (%)	15	18	45	35
Korxonalar soni	900+	650+	3,200+	1,800+
Eksport hajmi (mln $)	145.7	162.3	1,850	720

O‘zbekiston meva-sabzavotlarni qayta ishlash sanoati tez o‘sish sur'atlariga ega bo‘lsa-da, hali potentsial to‘liq amalga oshirilmagan. Quyidagi asosiy yo‘nalishlarda ishlash zarur:

Texnologik modernizatsiya - ishlab chiqarish quvvatlarining faqat 40% zamonaviy talablarga javob beradi

Xom ashyo bazasini kengaytirish - mavsumiy pasayishlarni kamaytirish

Eksportni diversifikatsiya qilish - hozirgi eksportning 68% atrofida 3 ta mamlakatga yo‘naltirilgan

Kadrlar tayyorlash - sanoatda malakali mutaxassislarning ulushi 23% ni tashkil etadi

2025 yilgacha quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Qayta ishlash darajasini 25% ga oshirish

Eksport hajmini 300 million dollarga yetkazish

15 ming yangi ish o‘rni yaratish

Xom ashyodan foydalanish darajasini o‘rtacha 75% ga ko‘tarish

Shu bilan birga, sanoat rivojiga bir qator jiddiy to‘siqlar ham mavjud:

Xomashyo bilan ta’minlashning mavsumiyligi va sifat muammolari: Yetishtirish texnologiyalarining ortig‘i, qadoqlash va saqlash

tizimlarining yetishmasligi tufayli xomashyo sifatida yaroqli mahsulotlar yetishmaydi.

Zamonaviy texnologiya va infratuzilmaning yetishmasligi: Koʻpgina korxonalarda texnika eskirgan, energiya sarfi yuqori.

Kadrlar muammosi: Yuqori malakali mutaxassislar, texnologlar va boshqaruv kadrlari etishmaydi.

Moliyaviy resurslarning cheklanganligi: Zamonaviy qayta ishlash liniyalariga sarmoya kiritish uchun kreditlar qimmat va murakkab.

Marketing va bozorlash muammolari: Mahsulotlarni tashqi bozorlarga chiqarishda brend yaratish, sertifikatlash va logistika muammolari mavjud.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish va sanoatni rivojlantirish uchun quyidagi yoʻnalishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Klaster yondashuvini joriy etish: "Etishtirish — saqlash — qayta ishlash — savdo" zanjirini birlashtirgan mintaqaviy klasterlarni tashkil etish. Bu xomashyo uzilishlarini va logistika xarajatlarini kamaytiradi.

Davlat-qushimcha hamkorlikni kuchaytirish: Xususiy sektor uchun kreditlar boʻyicha subsidiyalar, soliq imtiyozlari va gʻazna kafolatlari berish. Xususan, eksportga yoʻnaltirilgan loyihalarni qoʻllab-quvvatlash.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Xalqaro tajriba asosida energiya tejamkor, sifatli mahsulot ishlab chiqaradigan zamonaviy qayta ishlash liniyalarini oʻrnatishga yoʻnaltirilgan grant va loyihalarni amalga oshirish.

Kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish: Texnikum va oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy oziq-ovqat texnologiyalari boʻyicha mutaxassislar tayyorlashni yoʻlga qoʻyish, xususiy korxonalar bilan hamkorlikdagi amaliyot dasturlarini kengaytirish.

Marketing va brend yaratish: "Made in Uzbekistan" brendi ostida mahsulotlarning sifatini va ekologik tozaligini namoyish etish, xalqaro koʻrgazma va savdo tadbirlarida faol ishtirok etish.

Ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish: Mahsulotlarning yangi turlarini, qadoqlash usullarini ishlab chiqish boʻyicha ilmiy markazlar va laboratoriyalarni tashkil etish.

2018-2024 yillar statistik ma'lumotiga koʻra:

Meva va sabzavotlarni qayta ishlash korxonalarining umumiy mahsulot hajmi oʻsish tendensiyasini koʻrsatmoqda.

Qayta ishlangan mahsulotlar eksporti 2018 yilda 150 million dollardan 2024 yilda 270 million dollarga yetdi (tahminan +80%)[29].

Qayta ishlangan mahsulotlar ichida sharbatlar, murabbo va muzlatilgan mahsulotlar ulushi sezilarli darajada oshgan.

Bu natija sanoatning ichki va tashqi bozorlar talabi ortib borayotganini koʻrsatadi.

Korxonalar tahlili shuni koʻrsatdiki:

[29] Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligi hisobotlari. – Toshkent, 2023.

Raqamli boshqaruv tizimlari joriy etilgan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi 15-20% ga oshgan.

Uskunalar modernizatsiyasi va avtomatlashtirish jarayoni mahsulot sifati va qayta ishlash tezligini yaxshilagan.

Qo‘shimcha qiymat darajasi tobora oshgan, masalan sharbat va pyure ishlab chiqarishda.

Tadqiqot davomida quyidagi texnologiyalar tahlil qilindi:

Vakuumli quritish tizimlari — mahsulot sifati yuqori bo‘lib qoladi, energiya tejash samarasi 30% bo‘ldi.

Avtomatlashtirilgan saralash va qadoqlash — mehnat sarfini 25% ga kamaytiradi.

To‘liq tsiklli ishlab chiqarish liniyalari — tannarxni qo‘shimcha 10-12% kamaytiradi[30].

Innovatsiyalar korxonalar raqobatbardoshligini oshirib, O‘zbekiston mahsulotlarini xalqaro bozorga chiqarishda afzallik beradi.

Tadqiqot tahlillariga asoslanib quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Zamonaviy texnologiyalarni kompleks joriy etish bo‘yicha davlat investitsiya dasturlarini kengaytirish.

Logistika va saqlash infratuzilmasini yaxshilash orqali xomashyo yo‘qotilishini kamaytirish.

Qayta ishlash sohasida innovatsion klasterlar va markazlar tashkil etish.

Milliy sertifikatlash va standartlashtirish tizimini takomillashtirish.

Bu takliflar sanoat samaradorligini oshirish va eksport salohiyatini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, meva va sabzavotlarni qayta ishlash sanoati iqtisodiy o‘sish va oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda muhim omildir. Sanoatning samaradorligini oshirish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani takomillashtirish hamda malakali kadrlarni tayyorlash zarur. Shu bilan birga, eksport salohiyatini kengaytirish va milliy mahsulotlarni global bozorda raqobatbardosh qilish uchun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim.

Adabiyotlar:

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qishloq xo‘jaligini rivojlantirish va dehqonchilikni keng ko‘lamda qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2020.

2.Food and Agriculture Organization (FAO). *Fruit and Vegetable Processing – Opportunities and Challenges*. – Rome, 2021.

3.Fellows, P.J. *Food Processing Technology: Principles and Practice*. – Woodhead Publishing, 2016.

4.O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi hisobotlari. – Toshkent, 2023.

[30] World Bank. *Developing the Agri-Food Processing Industry in Uzbekistan*. – Washington D.C., 2024.

5.World Bank. *Developing the Agri-Food Processing Industry in Uzbekistan*. – Washington D.C., 2024.
6.Global Trade Atlas. *International Trade in Processed Fruits and Vegetables*. – 2023.

УДК: 616.379:579.8

Абдиева Н.У.
ассистент
кафедра акушерства и гинекологии №1
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
https://orcid.org/ 0009-0008-8877-1569

РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Актуальность. *Эндометриоз рассматривается как системное хроническое воспалительное заболевание с мультифакторной этиологией и выраженной биологической гетерогенностью, характеризующееся развитием эктопических эндометриоидных очагов в различных анатомо-топографических зонах. В последние годы кишечная микробиота признана функционально активной метаболической и иммунорегуляторной системой, играющей ключевую роль в поддержании гомеостаза организма. Современные экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о наличии сложных патогенетических взаимосвязей между дисбиотическими изменениями кишечного микробиома, хронической активацией воспалительных сигнальных каскадов, нарушением энтерогепатического метаболизма эстрогенов и дисрегуляцией врождённого и адаптивного иммунного ответа. Совокупность указанных механизмов формирует проэндометриоидное микроокружение, способствующее инициации, персистенции и прогрессированию эндометриоидных гетеротопий.*

Ключевые слова: *эндометриоз, кишечный дисбиоз, кишечная микробиома, воспалительный каскад, эстроген-зависимость.*

Abdieva N.U.
assistant
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan

THE ROLE OF THE GUT MICROBIOTA IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF ENDOMETRIOSIS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE

Abstract: *Endometriosis is regarded as a systemic chronic inflammatory disease with a multifactorial etiology and pronounced biological heterogeneity, characterized by the development of ectopic endometrioid lesions in various anatomical and topographical locations. In recent years, the gut microbiota has*

been recognized as a functionally active metabolic and immunoregulatory system that plays a key role in maintaining systemic homeostasis. Contemporary experimental and clinical studies indicate the presence of complex pathogenetic interactions between dysbiotic alterations of the gut microbiome, persistent activation of inflammatory signaling cascades, disturbances in the enterohepatic metabolism of estrogens, and dysregulation of innate and adaptive immune responses. The combined effects of these mechanisms create a pro-endometriotic microenvironment that promotes the initiation, persistence, and progression of endometriotic lesions.

Keywords: *endometriosis, gut dysbiosis, gut microbiome, inflammatory cascade, estrogen dependence.*

Современные представления об этиопатогенезе эндометриоза

Эндометриоз представляет собой широко распространённое хроническое воспалительное заболевание женской репродуктивной системы, развитие и прогрессирование которого тесно связано с эстрогензависимыми механизмами. Согласно данным эпидемиологических исследований, данной патологией страдают от 6 до 10 % женщин репродуктивного возраста [1]. В настоящее время эндометриоз всё чаще предлагается рассматривать не только как самостоятельную нозологическую единицу, но и как клинико-патогенетический синдром, что обусловлено его тесной ассоциацией с многообразием клинических проявлений, включая выраженную дисменорею, хронический тазовый болевой синдром, меноррагии, функциональные нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, хроническую усталость и депрессивные расстройства. Подобный подход также оправдан ограниченностью имеющихся знаний о заболевании, что связано с высокой клинической гетерогенностью, индивидуальной вариабельностью симптомов и возрастающей сложностью патогенетических механизмов эндометриоза [1]. Существенным клиническим и социальным аспектом заболевания является значительная задержка верификации диагноза, которая в ряде случаев достигает 4–11 лет, что обусловлено атипичностью клинической картины и отсутствием высокоспецифичных диагностических биомаркеров [2].

В последние годы результаты многочисленных экспериментальных и клинических исследований убедительно свидетельствуют о ключевой роли кишечной микробиоты в регуляции фундаментальных биологических процессов организма человека, включая формирование и поддержание иммунного ответа, метаболические реакции, воспалительные каскады, гормональный гомеостаз и нейроэндокринную регуляцию. Установлено, что дисфункции микробиоты кишечника тесно связаны с патогенезом широкого спектра заболеваний, таких как воспалительные заболевания кишечника [4], сахарный диабет [5], синдром поликистозных яичников [6], злокачественные новообразования яичников [7], а также депрессивные и тревожные расстройства [8, 9]. В экспериментальной модели эндометриоза показано, что

у лабораторных животных с индуцированным истощением микробиоты кишечника наблюдается значительное снижение роста и прогрессирования эктопических эндометриоидных очагов, тогда как восстановление микробного состава путём перорального введения фекального материала от животных с эндометриозом приводит к реактивации патологического процесса [10].

Настоящий обзор посвящён анализу широкого спектра патогенетических механизмов эндометриоза, в формировании и поддержании которых потенциально задействована кишечная микробиота. Целью работы является углубление представлений о сложной и многоуровневой природе патогенеза эндометриоза, а также обоснование перспектив использования микробиом-ориентированных подходов в профилактике, ранней диагностике и терапии данного заболевания.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, эндометриоз определяется как доброкачественная пролиферация ткани, локализованной за пределами полости матки и обладающей морфологическим и функциональным сходством с эндометрием. Эктопический рост эндометриоидных гетеротопий сопровождается хроническим воспалительным процессом, активацией фиброзообразования и формированием спаечного процесса, что оказывает неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию и существенно снижает качество жизни пациенток [11].

В современной клинической гинекологии эндометриоз признан одной из наиболее социально значимых патологий репродуктивной системы, занимая третье место по частоте выявления и уступая лишь воспалительным заболеваниям придатков матки и миоме матки [12]. В настоящее время эндометриоз рассматривается как самостоятельное хроническое нозологическое состояние, также обозначаемое термином «эндометриоидная болезнь». Данная патология характеризуется формированием эндометриоидных очагов в различных анатомических локализациях, обладающих способностью к автономному росту, инвазивному распространению и инфильтрации окружающих тканей. Заболевание сопровождается выраженными молекулярно-биологическими и эпигенетическими изменениями как в эктопическом, так и в эутопическом эндометрии [13].

Патогенез эндометриоза базируется на нарушениях гормональной регуляции, развивающихся на фоне дисбаланса иммунного гомеостаза и хронической активации воспалительных реакций [14]. Эндометриоз является полиэтиологическим заболеванием с высокой склонностью к рецидивированию, развитие которого обусловлено сложным взаимодействием дисгормональных нарушений, иммунных механизмов и генетической предрасположенности. Заболевание характеризуется наличием ткани, морфологически и функционально идентичной эндометрию, однако локализованной вне полости матки, при этом клиническая картина отличается

выраженной вариабельностью, что значительно осложняет своевременную диагностику [15].

Эндометриоз яичников является одной из наиболее распространённых клинических форм наружного генитального эндометриоза и преимущественно поражает женщин фертильного возраста, внося значительный вклад в структуру эндометриоз-ассоциированного бесплодия [16]. Одним из ведущих клинических проявлений заболевания является хронический тазовый болевой синдром. По данным эпидемиологических исследований, эндометриоз выявляется у 71 % женщин с хронической тазовой болью, а в 84 % случаев он выступает основной причиной сочетания болевого синдрома и бесплодия, оказывая выраженное негативное влияние на репродуктивное здоровье и качество жизни пациенток [17].

Существование множества теоретических концепций, объясняющих происхождение и механизмы развития эндометриоза, отражает недостаточную изученность его патогенеза и клинических особенностей [18]. Результаты иммунологических и иммуногенетических исследований указывают на наличие достоверной корреляции между клиническими проявлениями эндометриоза яичников и особенностями иммунного ответа, что подтверждает существование генетически детерминированных вариантов течения заболевания [19].

Формирование эндометриоидных гетеротопий может происходить как за счёт персистенции эмбриональных клеток, так и в результате ретроградной менструации с миграцией эндометриальных клеток в брюшную полость. Однако их имплантация и дальнейшее прогрессирование возможны лишь при наличии условий, способствующих активации иммунных реакций, развитию хронического воспаления и повышению способности эндометриальных клеток к выживанию, адгезии и инвазии в атипичной для них среде. Указанные процессы регулируются сложным взаимодействием гормональных факторов, локальных ростовых сигналов и молекулярных медиаторов воспаления [20].

Роль кишечной микробиоты в развитии эндометриоза у женщин репродуктивного возраста

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост научного интереса к изучению микробиоценоза желудочно-кишечного тракта. В связи с развитием высокоточных молекулярно-генетических методов анализа в научный оборот введены уточнённые понятия «микрофлора», «микробиота» и «микробиом», отражающие совокупность микроорганизмов, населяющих различные биологические ниши организма, а также их совокупный генетический потенциал [21]. В рамках проекта Human Microbiome Project было установлено, что генетическое разнообразие микробиома человека фактически формирует «второй геном», оказывающий значительное влияние на регуляцию экспрессии собственных генов организма, включая механизмы, связанные с репродуктивной функцией [22].

Микробиота человека представляет собой совокупность всех микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы, простейшие и археи, обитающих как на поверхности тела, так и во внутренних биотопах. Генетический материал этих микробных сообществ, объединяемый понятием микробиома, по количеству кодируемых генов приблизительно в 150 раз превышает геном человека. Кишечная микробиота играет фундаментальную роль в поддержании физиологического гомеостаза, участвуя в синтезе витаминов группы В и витамина К, поддержании целостности кишечного эпителия, защите от патогенных микроорганизмов и формировании иммунной системы [23].

Основная масса микробиоты локализуется в желудочно-кишечном тракте, на долю которого приходится до 70–80 % общего микробного пула организма. Это подчёркивает ключевое значение кишечной микрофлоры для поддержания системного здоровья, поскольку она оказывает влияние на функционирование практически всех органов и систем [24].

Современные научные данные свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между кишечным дисбиозом, характеризующимся нарушением количественного и качественного состава микробиоты, и развитием различных патологических состояний, включая воспалительные заболевания ЖКТ, психоневрологические расстройства, аутоиммунные заболевания, такие как псориаз и ревматоидный артрит, а также онкологические процессы, в частности колоректальный рак [25]. Эти эффекты обусловлены иммунорегуляторной функцией кишечной микробиоты, которая оказывает значительное влияние на системный воспалительный ответ [26].

Результаты клинических исследований демонстрируют, что выраженное увеличение доли условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике при одновременном снижении численности облигатных сапрофитных бактерий, таких как Bifidobacterium и Lactobacillus, ассоциировано с повышением концентрации условно-патогенной микрофлоры во влагалищных биоптатах у пациенток с инфекционно-воспалительными заболеваниями репродуктивной системы [27]. Данный механизм, вероятно, реализуется через повышение проницаемости кишечного эпителия и транслокацию микроорганизмов через гематогенные барьеры, что способствует их диссеминации в органы малого таза. Подобные нарушения барьерной функции кишечника нередко индуцируются иатрогенными факторами, включая проведение антибактериальной терапии [28]. Облигатные анаэробы, такие как Fusobacterium, Bacteroides, Eubacterium и Peptostreptococcus, преимущественно обитающие в ЖКТ, рассматриваются как потенциальные триггеры воспалительных процессов в органах репродуктивной системы [29].

Кишечный дисбактериоз рассматривается как клинико-лабораторный синдром, сопровождающийся глубокими метаболическими и иммунологическими нарушениями. Одним из ключевых последствий дисбиоза является развитие системной эндотоксинемии, обусловленной повышенной концентрацией липополисахарида (ЛПС) — структурного

компонента наружной мембраны грамотрицательных бактерий, обладающего выраженной провоспалительной активностью [30, 31]. Увеличение численности грамотрицательной микрофлоры и/или недостаточная эффективность эндогенных систем детоксикации ЛПС определяется как феномен эндотоксиновой агрессии, играющий важную роль в поддержании хронического воспаления [32].

Взаимосвязь кишечного микробиома и эстрогенового обмена при эндометриозе

Несмотря на сохраняющиеся пробелы в понимании патогенеза эндометриоза, многочисленные эпидемиологические и клинические исследования подтверждают его эстрогензависимую природу. Эстрогены способствуют усилению адгезии, инвазии и пролиферации эндометриоидных клеток, ингибируют апоптоз и поддерживают хронический воспалительный процесс [33]. Биологические эффекты эстрогенов реализуются посредством взаимодействия с ядерными рецепторами ERα и ERβ, а также мембранными рецепторами GPER1, активируя геномные и негеномные сигнальные пути [34, 35].

Экспериментальные исследования показали, что кишечная микробиота оказывает значительное влияние на метаболизм эстрогенов. В нормальных условиях эстрогены подвергаются конъюгации в печени и выводятся из организма, однако бактерии, продуцирующие β-глюкуронидазу, способны деконъюгировать эстрогены, способствуя их повторной реабсорбции и повышению уровня циркулирующего гормона за счёт энтерогепатической циркуляции [36, 37].

Заключение

Таким образом, эндометриоз представляет собой сложное мультифакторное заболевание, в патогенезе которого тесно взаимодействуют гормональные, иммунные, генетические и воспалительные механизмы. Современные данные свидетельствуют о значимой роли кишечной микробиоты как системного регулятора воспаления и эстрогенового обмена, способного оказывать влияние на формирование, поддержание и прогрессирование эндометриоидных очагов. Нарушения микробного гомеостаза приводят к развитию эндотоксинемии, иммунной дисрегуляции и гиперэстрогенного состояния, формируя благоприятные условия для хронизации патологического процесса. Дальнейшее углублённое изучение оси «кишечник — микробиота — репродуктивная система» открывает перспективы для разработки новых диагностических биомаркеров и персонализированных терапевтических стратегий, направленных на коррекцию микробиоты и снижение тяжести течения эндометриоза.

Использованные источники:

1.Сондерс, П. Т. К., и Хорн, А. У. (2021). Эндометриоз: этиология, патобиология и перспективы лечения. Cell 184, 2807–2824. doi: 10.1016/j.cell.2021.04.041.

2.Аверина О. В., Полюэктова Е. У., Зоркина Я. А., Ковтун А. С., Даниленко В. Н. Human Gut Microbiota for Diagnosis and Treatment of Depression. Int. J. Mol. Sci. (2024). Российские исследователи из Института общей генетики РАН и Сербского центра изучают роль кишечной микробиоты в диагностике и лечении депрессии.
3.Васильева Е. Ф. Регуляторная роль микробиоты кишечника в воспалении при депрессии и тревоге (Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova, 2023).
4. Адамян Л.В И соавт. Медицинские и социальные аспекты генитального эндометриоза. // Проблемы репродукции. -2020 - №6.-С. 78-81.
5. Оразов М.Р. соавт. Бесплодие ассоцированное с эндометриозом. От легенды к суровой реальности. // Трудный пациент. -2019.-№1-2. -С.6 6-12
6. Кабанова О.О. соавт. Роль иммунной системы в патогенезе эндометриозе. // Гинекология.- 2021.-№23(6).- С.485-492.
7.Орипова Ф.Ш., Хамдамов Б.З., Ихтиярова Г.А. Роль иммуно-генитических факторов в возникновения эндометриоза яичника // Новый день в медицине. - Бухара, 2022. - № 12 (50). - С. 454-456. (14.00.00; № 22)
8.Oripova F.Sh. Precancerous markers in the development of ovarian endometrioma // American International Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences. - 2024. - Volume 2. N 1. - P. 50-53. (Impact Factor - 2,993)
9.Орипова Ф.Ш. Оптимизация методов лечения эктории шейки матки с сопутствующей эндометриомой яичника // Новый день в медицине. - Бухара, 2024. - № 7 (69). - С. 245-249. (14.00.00; № 22)
10.Oripova F.Sh., Tolibova A.E. Andenomyosis and Endometrioid ovarian cyst as Cause of infertility: real or imaginary connection // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - 2024. - N 14 (6). - P. 1489-1494. (14.00.00; № 2)
11.Oripova F.Sh. Prognostic value of cancer markers in ovarian endometriosis in women of reproductive age // Journal Bio Web of conferences. - 2024. - 121, 03009. - P. 1-4. (Scopus)
12.Тейлор Х. С., Котляр А. М. и Флорес В. А. (2021). Эндометриоз — хроническое системное заболевание: клинические проблемы и новые разработки. Lancet 397, 839–852. doi: 10.1016/s0140-6736(21)00389-5.
13. Розикова Д.К., Ихтиярова Г.А., Каримова Г.К., Наврузова Н.О., Абдиева Н.Р., Ражабова О.И. Новые методы ранней диагностики эмбриохориальной недостаточности. *Клинический разбор в общей медицине.* 2025; 6 (2)
14. Катасонов А. Б. Кишечный микробиом как терапевтическая цель при лечении депрессии и тревоги (Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S. S. Korsakova, 2021).
15. Дмитриевская М. И., Порфирова Е. С., Тихоненко П. А., Щегорцова О. С. Сергеев Ю. А., Бейер Э. В., Базиков И. А., Таран Т. В. Роль микробиома кишечника в развитии депрессии (Казанский медицинский журнал, 2026).
16. Чернуха Г. Е., Пронина В. А., Припутневич Т. В. Gut and genital microbiota in endometriosis. Исследование микробиоты кишечника и репродуктивного тракта при эндометриозе.

17. Шелехова М. С., Модорская А. Н., Фильчакова А. Н., ГруДкова Ю. В., Раевский К. П. Current understanding of the connection between endometriosis and intestinal microbiocenosis: a literature review — обзор взаимосвязи эндометриоза и кишечной микробиоты.
18. Табеева Г. И., Думановская М. Р., Чернуха Г. Е., Припутневич Т. В. Шалепо К. В., Сторожева К. В., Крысанова А. А., Будиловская О. В., Хуснутдинова Т. А., Копылова А. А., др. Взаимосвязь микробиоты эндометрия и антимикробных пептидов у женщин с разными формами бесплодия. Исследование эндометриальной микробиоты и иммунных факторов.
19. Чернуха Г. Е., Пронина В. А., Припутневич Т. В. Микробиота кишечника и репродуктивного тракта при эндометриозе. Анализ роли микробиоты в патогенезе эндометриоза.
20. Шан, Ю., Ли, М., и Чанг, Э. Б. (2022). Кишечный микробиом и воспалительные заболевания кишечника. Annual Review of Medicine 73, 455–468. doi: 10.1146/annurev-med-042320-021020 Аннотация в PubMed | Полный текст в Crossref | Google Scholar.
21. Мгерян А. Н., Прилепская В. Н., Довлетханова Э. Р., Абакарова П. Р., Межевитинова Е. А. Роль микробиоты в этиологии диспластических и онкологических заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы. Обзор состава вагинальной микробиоты и её связи с дисплазиями и раком.
22. Казымова О. Е., Ярмолинская М. И., Савичева А. М. Особенности микробиоты репродуктивного тракта у пациентов с генитальным эндометриозом. Литературный обзор микробиологических особенностей при эндометриозе.
23. Уруймагова А. Т., Прилепская В. Н., Межевитинова Е. А., Донников А. Е., Иванова А. А. Бактериальный вагиноз: современные представления о диагностике и лечении. Обзор с акцентом на вагинальную микробиоту и её нарушения.
24.Ferrero, S., Remorgida, V., Maganza, C., Venturini, P. L., Salvatore, S., Papaleo, E., et al. (2014). Aromatase and endometriosis: estrogens play a role. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1317, 17–23. doi: 10.1111/nyas.12411
25. Borella, F., Carosso, A. R., Cosma, S., Preti, M., Collemi, G., Cassoni, P., et al. (2021). Gut microbiota and gynecological cancers: a summary of pathogenetic mechanisms and future directions. ACS Infect. Dis. 7, 987–1009. doi: 10.1021/acsinfecdis.0c00839
26. Ян Г., Вэй Дж., Лю П., Чжан Ц., Тянь Ю., Хоу Г. и др. (2021). Role of the gut microbiota in type 2 diabetes and related diseases. Metabolism 117:154712. doi: 10.1016/j.metabol.2021.154712
27.Wei, Y., Tan, H., Yang, R., Yang, F., Liu, D., Huang, B., et al. (2023). Gut dysbiosis-derived beta-glucuronidase promotes the development of endometriosis. Fertil. Steril. 120, 682–694. doi: 10.1016/j.fertnstert.2023.03.032
28. Bhatt, A. P., Redinbo, M. R., and Bultman, S. J. (2017 The role of the microbiome in cancer development and therapy. CA Cancer J. Clin. 67, 326–344. doi: 10.3322/caac.21398

30. Uccello, M., Malaguarnera, G., Basile, F., D'agata, V., Malaguarnera, M., Bertino, G., et al. (2012). Potential role of probiotics on colorectal cancer prevention. BMC Surg. 12:S35. doi: 10.1186/1471-2482-12-S1-S35
31. Ян, Г., Вэй, Цз., Лю, П., Чжан, Ц., Тянь, Ю., Хоу, Г. и др. (2021). Роль кишечной микробиоты при сахарном диабете 2 типа и связанных с ним заболеваниях. Metabolism 117:154712. doi: 10.1016/j.metabol.2021.154712.
32. Shan, J., Ni, Z., Cheng, W., Zhou, L., Zhai, D., Sun, S., et al. (2021). Gut microbiota imbalance and its correlations with hormone and inflammatory factors in patients with stage 3/4 endometriosis. Arch. Gynecol. Obstet. 304, 1363–1373. doi: 10.1007/s00404-021-06057-z
33. Лян, Чж.; Ди, Н.; Ли, Л.; Ян, Д. (2021). Изменения кишечной микробиоты свидетельствуют о возможных нарушениях оси «кишечник–мозг» при синдроме поликистозных яичников. Journal of Endocrinological Investigation 44, 1727–1737. doi: 10.1007/s40618-020-01481-5.
34. Борелла, Ф.; Кароссо, А. Р.; Козма, С.; Прети, М.; Коллеми, Г.; Кассони, П.. и др. (2021). Кишечная микробиота и гинекологические онкологические заболевания: обзор патогенетических механизмов и перспективных направлений исследований. ACS Infectious Diseases 7, 987–1009. doi: 1021/acsinfecdis.0c008398.
35. Симпсон, К. А.; Диас-Артеще, С.; Элиби, Д.; Шварц, О. С.; Симмонс, Дж. Г.; Коуэн, К. С. М. (2021). Кишечная микробиота при тревоге и депрессии — систематический обзор. Clinical Psychology Review. 83:101943. doi: 10.1016/j.cpr.2020.1019439.
36. Хун, Ж.; Ло, Л.; Ван, Л.; Ху, Ц. Л.; Инь, Ц. Р.; Ли, М. и др. (2023). Внеклеточные везикулы, полученные из Lepidium meyenii Walp (мака), уменьшают проявления депрессии, способствуя синтезу 5-НТ посредством модуляции оси «кишечник–мозг». iMeta. 2:e116. doi: 10.1002/imt2.11610.
37. Чадчан, С. Б.; Попли, П.; Амбати, К. Р.; Тиксен, Э.; Хан, С. Дж.; Булун, С. Э. и др. (2021). Короткоцепочечные жирные кислоты, продуцируемые кишечной микробиотой, защищают от прогрессирования эндометриоза. Life Science Alliance. 4:e202101224. doi: 10.26508/lsa.20210122211.
38. Адамян Л.В И соавт. Этиопатогенез эндометриоз-ассоцированного бесплодия. //Проблемы репродукции. -2018.-№24(2).-С.28-33.
39.Microbiome and depression: the impact of the microflora state on the treatment of depressive disorders. (2025) Исследование влияния состояния микрофлоры на течение депрессии.

УДК 34

Абдинова Г. Р., магистр
Тольяттинский государственный университет
Россия, Тольятти

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ

Аннотация. *В статье исследуется институт неосновательного обогащения как важный механизм защиты имущественных прав в гражданском обороте Российской Федерации. Рассматриваются понятие, правовая природа и содержание обязательств вследствие неосновательного обогащения на основе анализа положений Гражданского кодекса РФ.*

Ключевые слова: *неосновательное обогащение, кондикционные обязательства, возврат имущества, приобретатель, потерпевший.*

Abdinova G. R., master
Tolyatti State University
Russia, Tolyatti

UNJUSTIFIED ENRICHMENT: CONCEPT, CONTENT, PROBLEMS OF RECOVERY

Annotation. *The article examines the institution of unjustified enrichment as an important mechanism for the protection of property rights in the civil turnover of the Russian Federation. The concept, legal nature and content of obligations due to unjustified enrichment are considered based on the analysis of the provisions of the Civil Code of the Russian Federation.*

Keywords: *unjustified enrichment, conditional obligations, return of property, acquirer, victim.*

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса. Данная норма закрепляет основополагающий принцип недопустимости обогащения одного субъекта за счет другого без надлежащего правового основания, что является краеугольным камнем справедливого гражданского оборота. Законодательная конструкция неосновательного обогащения включает несколько взаимосвязанных элементов, требующих тщательного анализа и правовой квалификации. Первым элементом выступает факт приобретения или сбережения имущества,

который может выражаться в различных формах материальных и нематериальных благ, включая денежные средства, вещи, имущественные права и иные объекты гражданских прав. Вторым элементом является отсутствие правовых оснований для такого приобретения или сбережения, что означает отсутствие договорного, законодательного или иного легитимного основания для перемещения имущества. Третьим необходимым элементом выступает наличие причинно-следственной связи между обогащением одного лица и обеднением другого, что предполагает, что увеличение имущественной массы приобретателя произошло непосредственно за счет уменьшения имущественной сферы потерпевшего.

В российской цивилистической науке проблематика неосновательного обогащения всегда привлекала пристальное внимание исследователей, которые разрабатывали различные теоретические подходы к пониманию природы и содержания данного института. О.С. Иоффе придерживался максималистской позиции, согласно которой «в чем бы неосновательная имущественная выгода ни заключалась, она подлежит возврату целиком, и обязательства данного рода подчиняются принципу полного возмещения в той же степени, как и деликтные обязательства или иски об убытках, которые вытекают из договоров» [3, с. 157]. Данный подход О.С. Иоффе представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения максимальной защиты интересов потерпевшего, однако он не учитывает ситуации, когда размер обогащения приобретателя объективно не соответствует размеру обеднения потерпевшего, что создает методологические трудности при определении точного объема подлежащего возврату имущества и может приводить к несправедливым результатам в отдельных случаях.

Альтернативную концепцию развивал В.Т. Смирнов, который считал, что «потерпевший должен получить компенсацию лишь в том размере, в каком обогащается должник, то есть нет соответствия между имущественным интересом приобретателя и убытками потерпевшего» [14, с. 78].

Позиция В.Т. Смирнова отличается большей гибкостью и практичностью, поскольку ориентируется на реальный размер обогащения, однако она может приводить к недостаточной компенсации потерь потерпевшего в случаях, когда его обеднение превышает обогащение приобретателя, что противоречит принципу полного возмещения убытков.

Законодатель разрешил указанную доктринальную дискуссию путем закрепления в Гражданском кодексе Российской Федерации компромиссной нормы, согласно которой лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. Данное законодательное решение представляет собой сбалансированный подход, учитывающий как интересы потерпевшего в получении полной компенсации, так и справедливое отношение к приобретателю, который может быть добросовестным. Установление

обязанности возврата не только самого неосновательно полученного имущества, но и доходов от его использования обеспечивает более полную защиту интересов потерпевшего и соответствует принципу недопустимости извлечения выгоды из неправомерного поведения. Законодательная конструкция также вводит важное разграничение между добросовестным и недобросовестным приобретателем, устанавливая различные моменты начала исчисления обязанности по возврату доходов, что отражает дифференцированный подход к определению объема ответственности в зависимости от субъективного отношения приобретателя к факту неосновательности обогащения.

Содержание обязательств из неосновательного обогащения характеризуется совокупностью прав и обязанностей сторон, возникающих в результате неосновательного перемещения имущества. Приобретатель как должник в данном обязательстве несет обязанность по возврату неосновательно полученного или сбереженного имущества, а также по возмещению всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с момента, когда узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. Потерпевший как кредитор в данном обязательстве имеет право требовать возврата имущества в натуре, а при невозможности такого возврата может требовать возмещения действительной стоимости имущества на момент его приобретения приобретателем. Предмет обязательства из неосновательного обогащения может включать разнообразные объекты гражданских прав, что обусловливает сложность правовой квалификации и определения точного объема подлежащего возврату. Для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие определенных условий, установленных статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации. Первым условием является факт приобретения или сбережения имущества на стороне приобретателя, что означает увеличение его имущественной массы или сохранение имущества, которое должно было быть утрачено. Вторым условием выступает наличие убытков на стороне потерпевшего, являющихся источником обогащения приобретателя, что предполагает уменьшение имущественной сферы потерпевшего или упущенную выгоду. Третьим необходимым условием является отсутствие правового основания для такого обогащения, что означает отсутствие договорного, законодательного или иного легитимного основания для перемещения имущества. Важным аспектом является также наличие причинно-следственной связи между обогащением приобретателя и обеднением потерпевшего, что требует доказывания того, что обогащение произошло именно за счет имущества потерпевшего.

«Законодательство Российской Федерации устанавливает различные виды неосновательного обогащения в зависимости от характера приобретения или сбережения имущества. Первая форма связана с приобретением имущества, когда лицо получает имущество, которое не принадлежит ему и на которое у него нет законных прав. Типичным примером является ошибочный

перевод денежных средств на счет лица, которое не является их законным получателем, что может произойти вследствие технической ошибки, неправильного указания реквизитов или иных обстоятельств. Вторая форма представлена сбережением имущества, когда лицо освобождается от расходов, которые оно должно было нести за свой счет, например, при использовании чужого имущества без согласия владельца и без последующего возмещения за пользование. Различие между этими формами имеет важное практическое значение для определения размера подлежащего возврату имущества и доходов от его использования. По основанию возникновения неосновательное обогащение классифицируется в зависимости от обстоятельств, приведших к его возникновению. Первую категорию составляет обогащение вследствие ошибки, которое включает случаи, когда имущество передается вследствие заблуждения. Вторую категорию образует обогащение, возникшее в результате недействительной сделки, когда имущество передается на основании сделки, которая впоследствии была признана недействительной. Третья категория охватывает обогащение в результате неисполнения обязательства, когда лицо получает имущество, которое не должно было получать, вследствие неисполнения другой стороной своих обязательств. Четвертая категория включает обогащение при отсутствии правового основания, что охватывает случаи, когда имущество приобретается или сберегается без наличия каких-либо правовых оснований» [4, с. 156].

Статья 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает перечень случаев, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, даже если оно фактически имело место. Первым таким случаем является ситуация, когда имущество передано в исполнение обязательства до наступления срока его исполнения, если иное не предусмотрено условиями обязательства, что означает, что досрочное исполнение обязательства не может рассматриваться как неосновательное обогащение. Вторым случаем является ситуация, когда денежные средства и иное имущество предоставлены в исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, было осведомлено об отсутствии обязательства либо имущество было передано в целях благотворительности. Третьим случаем, имеющим важное социальное значение, является невозможность возврата заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий, стипендий, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Данная норма направлена на защиту социально незащищенных категорий граждан и обеспечение их права на достойное существование, что соответствует конституционным принципам социального государства.

Анализ судебной практики по делам о взыскании неосновательного обогащения показывает значительное разнообразие рассматриваемых споров и различные подходы судов к их разрешению. Первой важной категорией

является вопрос исковой давности, где суды исходят из того, что по общему правилу обязательства из неосновательного обогащения могут быть взысканы в пределах общего трехлетнего срока исковой давности, установленного статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, что подтверждается Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 марта 2011 года № 14378/10 [6]. Судебная практика исходит из того, что причиной неосновательного денежного обогащения зачастую являются необоснованно произведенные платежи, и в таких случаях срок исковой давности рассчитывается отдельно для каждого платежного поручения, что обеспечивает более эффективную защиту прав потерпевшего. Данный подход представляется обоснованным, поскольку он учитывает специфику денежных обязательств и обеспечивает возможность взыскания каждого ошибочного платежа независимо от других, однако он может создавать сложности при доказывании момента, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Второй важной категорией судебной практики является установление оснований для признания неосновательного обогащения, где суды в некоторых случаях признают правомерность требований о взыскании даже при отсутствии формального договорного основания. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 7349/09 по делу № А60-15186/2008-С3 устанавливает, что «в ситуации, когда между собственниками нежилых помещений в офисном комплексе нет соглашения о возмещении расходов на содержание общего имущества, сторона, понесшая эти расходы, вправе взыскать сэкономленные средства с его фактического пользователя» [7]. Данный подход судов основывается на принципе недопустимости неосновательного сбережения имущества за счет других лиц и обеспечивает справедливое распределение расходов на содержание общего имущества, однако он может вызывать вопросы относительно определения точного размера сбереженных средств и критериев их распределения между пользователями.

Третьей категорией судебной практики является установление оснований для непризнания неосновательного обогащения, где суды отказывают в удовлетворении требований истца в определенных ситуациях. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 марта 2010 года № 11401/09 по делу № А73-13932/2008 устанавливает, что «если одно лицо оплатило пользование землей, то неосновательное обогащение по судебному иску от собственника за тот же период, но по другому основанию, не может быть взыскано с другого лица» [8]. Данная правовая позиция основывается на принципе недопустимости двойного взыскания за одно и то же пользование имуществом и защищает интересы добросовестного пользователя, однако она может создавать сложности в ситуациях, когда несколько лиц фактически пользовались одним и тем же имуществом. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 303-ЭС14-395 по делу № А73-9636/2012

устанавливает, что «размещение хозяйствующим субъектом на фасаде жилого многоквартирного дома сведений, которые требуются в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, без оплаты собственникам дома не признается неосновательным обогащением» [5]. Данный подход судов основывается на необходимости соблюдения баланса между правами собственников и обязанностями хозяйствующих субъектов по информированию потребителей, однако он может вызывать вопросы относительно пределов такой обязанности и возможности размещения дополнительной рекламной информации.

Особый интерес представляет судебная практика по делам, связанным с переплатой денежного довольствия военнослужащим, где применяются специальные правила о невозможности возврата неосновательного обогащения. Решение Партизанского городского суда по делу № 2-353/2016 рассматривает ситуацию, когда «уволившийся из армии солдат-контрактник получил переплату в части денежного довольствия, и представители Министерства обороны обратились в суд с требованием обязать бывшего солдата вернуть деньги в бюджет» [10]. Судья отказал в иске, отметив, что переплата произошла не по вине военнослужащего и не в результате арифметической ошибки, а причиной послужила халатность должностных лиц, которые не внесли в программу сведения об увольнении солдата в запас. Данная правовая позиция основывается на социальной защите граждан, получивших денежные средства в качестве средства к существованию, и недопустимости возложения на них негативных последствий ошибок государственных органов, что соответствует положениям статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако такой подход может создавать стимулы к недобросовестному поведению со стороны получателей, которые, обнаружив переплату, могут умышленно не информировать об этом соответствующие органы, рассчитывая на защиту своих прав на основании указанной нормы.

Решение Арбитражного суда Белгородской области № А08-10119/2021 от 16 декабря 2022 года демонстрирует типичный подход судов к делам о взыскании неосновательного обогащения, связанного с использованием земельных участков без внесения установленной платы [9]. Администрация города обратилась в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком к индивидуальному предпринимателю, который за определенный период не вносил плату за пользование земельным участком и оставил без внимания претензию истца об уплате задолженности. Суд удовлетворил иск и взыскал с индивидуального предпринимателя в бюджет муниципального образования денежные средства вследствие неосновательного обогащения за пользование земельным участком, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Такой подход может вызывать вопросы в ситуациях, когда размер неосновательного обогащения должен определяться не на основании

нормативно установленных ставок арендной платы, а исходя из фактической рыночной стоимости пользования земельным участком.

Решение Советского районного суда города Красноярска от 27 февраля 2024 года по делу № 2-16731/2023 затрагивает проблему «установления недобросовестности потерпевших лиц, искусственно создающих ситуации неосновательного обогащения в целях извлечения прибыли из выплачиваемых при разрешении споров процентов за пользование чужими деньгами» [11]. Суд указал, что «в ситуациях, когда потерпевший перечисляет деньги другому лицу без оснований и не требует их возврата, чтобы впоследствии запросить проценты за пользование этими средствами, важно правильно установить мотивацию потерпевшего. Суд может счесть действия потерпевшего недобросовестными, если он обращается с просьбой о возврате средств спустя значительное время после их перевода, особенно если платежи были регулярными» [11]. Данная правовая позиция направлена на предотвращение злоупотребления правом со стороны истцов и защиту добросовестных участников гражданского оборота от недобросовестных требований, однако она создает дополнительные сложности в доказывании и требует от судов тщательного анализа обстоятельств каждого конкретного дела. Применение данного подхода требует установления субъективной стороны действий потерпевшего, что является сложной задачей, поскольку требует доказывания внутренних мотивов и намерений лица.

Решение Ишимбайского городского суда Республики Башкортостан от 26 февраля 2024 года по делу № 2-1749/2023 рассматривает вопросы определения размера неосновательного обогащения в случаях, когда возврат имущества в натуральной форме невозможен [12]. Суд указал, что «в некоторых случаях невозможно вернуть имущество, переданное по недействительной сделке, в натуральной форме, и с учетом пункта 1 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации в таких ситуациях можно требовать взыскания неосновательного обогащения, исходя не из договорной, а из фактической стоимости переданного по данной сделке» [12]. Данная правовая позиция имеет важное практическое значение для определения объема возмещения в случаях, когда предмет неосновательного обогащения потреблен, переработан или отчужден третьим лицам, что делает невозможным его возврат в натуре, однако она создает необходимость проведения оценки для определения фактической стоимости имущества. Применение данного подхода требует разграничения понятий договорной и фактической стоимости имущества, что может вызывать сложности на практике, особенно когда речь идет об уникальном имуществе или имуществе, стоимость которого значительно изменилась с момента его передачи.

Решение Любинского районного суда Омской области от 26 февраля 2024 года по делу № 2-1010/2023 касается вопросов компенсации расходов приобретателя на содержание и сохранность имущества [13]. Суд указал, что «приобретатель имеет право требовать компенсацию расходов, связанных с содержанием и сохранностью имущества, при этом квалифицирующий

признак этих затрат законодатель определяет как необходимые. Однако если выяснится, что покупатель специально удерживал имущество, то он лишается права на возмещение указанных расходов в соответствии со статьей 1108 Гражданского кодекса Российской Федерации» [13]. Данная правовая позиция обеспечивает баланс интересов приобретателя и потерпевшего, предоставляя добросовестному приобретателю право на компенсацию необходимых расходов на сохранение имущества, но лишая такого права недобросовестного приобретателя. Применение данного подхода требует установления факта умышленного удержания имущества приобретателем, что является оценочной категорией и требует анализа всех обстоятельств дела, включая поведение приобретателя после получения требования о возврате имущества.

Е.В. Демьяненко и А.В. Шпак в своем исследовании обращают внимание на отдельные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения, анализируя проблемы квалификации и разграничения кондикционных обязательств с иными видами обязательств [2, с. 28-31]. Позиция указанных авторов представляет интерес с точки зрения практического применения норм о неосновательном обогащении, однако она не охватывает всего многообразия проблем, возникающих в современной правоприменительной практике, и требует дальнейшего развития в части анализа соотношения кондикционных и деликтных обязательств. А.А. Никитина исследует обязательства вследствие неосновательного обогащения, уделяя особое внимание классификации видов неосновательного обогащения и условиям возникновения соответствующих обязательств [4, с. 156-157]. Работа А.А. Никитиной содержит систематизацию основных форм неосновательного обогащения, однако в ней недостаточно внимания уделено проблемам доказывания элементов состава неосновательного обогащения и распределения бремени доказывания между сторонами спора. Е.Г. Шаблова в своем учебном пособии рассматривает актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права, включая вопросы неосновательного обогащения [15, с. 211]. Позиция Е.Г. Шабловой отличается комплексным подходом к анализу института неосновательного обогащения в контексте других институтов гражданского права, однако она не содержит детального анализа современной судебной практики и тенденций ее развития. А.Ф. Шайхинурова исследует различные аспекты обязательств вследствие неосновательного обогащения, уделяя особое внимание принципам данного института [16, с. 357-360]. Работа А.Ф. Шайхинуровой содержит подробный анализ принципов обогащения без юридического основания, реализации обязательственной связи между сторонами и следствия обогащения, однако в ней недостаточно раскрыты механизмы практической реализации этих принципов в судебной практике.

Проблемы взыскания неосновательного обогащения в судебной практике характеризуются рядом специфических особенностей, связанных с распределением бремени доказывания между сторонами спора. Истец должен доказать, что у ответчика имеется имущество, полученное или сбереженное

без законных оснований, что такое обогащение произошло за счет истца, а также определить его размер. Данное правило распределения бремени доказывания соответствует общему принципу, согласно которому каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, однако на практике возникают сложности с доказыванием отсутствия правового основания для обогащения, поскольку это предполагает доказывание отрицательного факта. Важной проблемой является определение момента, с которого приобретатель считается узнавшим или должен был узнать о неосновательности обогащения, что имеет существенное значение для определения размера подлежащих возврату доходов от использования неосновательно полученного имущества.

Существенной проблемой правоприменительной практики является соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими способами защиты гражданских прав, что вызывает вопросы о конкуренции исков и выборе наиболее эффективного способа защиты нарушенного права. Статья 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что «правила о неосновательном обогащении применяются к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке, о возврате имущества, предоставленного для цели, которая не осуществилась, а также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством» [1]. Данная норма устанавливает широкую сферу применения института неосновательного обогащения, однако на практике возникают сложности с определением границ его применения, особенно в ситуациях, когда одновременно имеются основания для предъявления требований из договора, деликтных обязательств или неосновательного обогащения.

Анализ судебной практики показывает, что взыскание судом неосновательного обогащения считается восстановлением нарушенного права, но отнюдь не мерой ответственности. Именно поэтому суды взыскивают неосновательное обогащение в том размере, в каком было нарушено право потерпевшего, не применяя к приобретателю дополнительных мер гражданско-правовой ответственности, если только он не является недобросовестным. Данный подход соответствует компенсационному характеру института неосновательного обогащения, целью которого является восстановление имущественного положения потерпевшего, а не наказание приобретателя.

«Принцип обогащения без юридического основания является одним из фундаментальных принципов института неосновательного обогащения, заключающимся в том, что для признания ситуации неосновательным обогащением необходимо отсутствие законного основания для получения имущества. В рамках данного принципа существуют различные формы неосновательного обогащения, включая банковскую ошибку, когда банк неправомерно совершает транзакцию и перечисляет гражданину определенную сумму денег, которую он не имеет права получать. Ошибки в

начислении заработной платы могут выражаться в неправильном определении суммы начисления, которая должна быть начислена сотруднику работодателем, и если сумма превышает положенное за выполненную работу, это может быть признано обогащением без юридического основания. Неправомерное получение налоговых льгот может иметь различные формы и проявления, включая случаи, когда налогоплательщики искусственно создают условия для получения льгот путем введения ложной информации или скрытия реальных данных о своей деятельности. Неправомерное получение страхового возмещения представляет собой процесс получения страховой стороной денежных средств, выплачиваемых в соответствии с условиями страхового договора, но при этом сторона не имеет законных оснований для их получения» [16, с. 359].

«Принцип реализации обязательственной связи между сторонами заключается в том, что должно быть установлено наличие взаимного правоотношения, нарушенного в результате неосновательного обогащения, и предполагает, что каждая сторона должна соблюдать свои обязательства и выполнять свои обязанности по соглашению или договору. В практике часто встречаются случаи, связанные с приобретением товара, когда покупатель ошибочно перечислил продавцу сумму, превышающую стоимость товара, и продавец обязан вернуть превышающую сумму. Данный принцип существует для обеспечения справедливости и предотвращения несправедливого обогащения одной стороны за счет другой, а также обеспечивает исполнение обязательственных связей между сторонами и способствует поддержанию эффективного функционирования гражданско-правовых отношений» [15, с. 211].

Проведенный комплексный анализ нормативного регулирования, доктринальных позиций и судебной практики позволяет сформулировать обобщающие выводы о современном состоянии института неосновательного обогащения в российском гражданском праве. Законодательное регулирование данного института, закрепленное в главе 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, представляет собой достаточно детальную и системную правовую конструкцию, охватывающую основные аспекты возникновения и исполнения кондикционных обязательств. Доктринальные позиции О.С. Иоффе и В.Т. Смирнова, представляющие различные подходы к определению объема возмещения при неосновательном обогащении, нашли свое отражение в законодательном регулировании через установление обязанности возврата не только самого имущества, но и доходов от его использования.

Анализ решений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и судов общей юрисдикции показывает, что основными проблемами правоприменительной практики являются определение момента начала течения срока исковой давности, установление добросовестности или недобросовестности приобретателя, определение размера неосновательного обогащения при невозможности

возврата имущества в натуре, разграничение кондикционных требований с иными способами защиты прав. Особую сложность представляют дела, связанные с искусственным созданием ситуаций неосновательного обогащения в целях взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, что требует от судов тщательного анализа добросовестности поведения потерпевшего.

Совершенствование правового регулирования института неосновательного обогащения должно идти по пути конкретизации критериев добросовестности приобретателя, уточнения правил распределения бремени доказывания, установления четких механизмов определения размера неосновательного обогащения в различных ситуациях и выработки единообразных подходов к применению норм о субсидиарном характере кондикционных обязательств.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2025) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
2. Демьяненко Е.В., Шпак А.В. Отдельные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения // Юрист-Правовед. 2020. № 2 (93). С. 28–31.
3. Иоффе О.С. Обязательственное право: моногр. – М.: ИНФРА-М, 1975. 880 с.
4. Никитина А.А. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Молодой ученый. 2022. № 41 (436). С. 156-157.
5. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 303-ЭС14-395 по делу № А73-9636/2012 // СПС КонсультантПлюс.
6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 марта 2011 г. № 14378/10 // СПС КонсультантПлюс.
7. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 7349/09 по делу № А60-15186/2008-С3 // СПС КонсультантПлюс.
8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 марта 2010 г. № 11401/09 по делу № А73-13932/2008 // СПС КонсультантПлюс.
9. Решение Арбитражного суда Белгородской области № А08-10119/2021 от 16 декабря 2022 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/arbitral/doc/qLZJhXfcblS/ (дата обращения: 10.02.2026).
10. Решение Партизанского городского суда по делу № 2-353/2016 // СПС КонсультантПлюс.
11. Решение Советского районного суда г. Красноярска от 27 февраля 2024 г. по делу № 2-16731/2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.su/lzC7n (дата обращения: 10.02.2026).
12. Решение Ишимбайского городского суда (Республика Башкортостан) от 26 февраля 2024 г. по делу № 2-1749/2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.su/7UW4l (дата обращения: 10.02.2026).

13. Решение Любинского районного суда (Омская область) от 26 февраля 2024 г. по делу № 2-1010/2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.su/c7JiK (дата обращения: 10.02.2026).
14. Смирнов В.Т. Гражданское право: Учебник. М.: Проспект, 1998. 512 с.
15. Шаблова Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2022. 237 с.
16. Шайхинурова А.Ф. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // Молодой ученый. 2020. № 49 (339). С. 357-360.

Абдуллаева С.Б.
Самарқанд давлат тиббиёт университети ассистенти
Турдиқулова Д. С.
Самарқанд давлат тиббиёт университети талабаси

ТИББИЁТДА АХБОРОТ ВА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ИМКОНИНИ БЕРУВЧИ ТЕХНИК ВОСИТАЛАР

Аннотация: *Ҳозирги замонавий тиббиётни ахборот ва компьютер технологияларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши тиббий хизмат сифатини ошириш, ташхис қўйишда хатоларни камайтириш, даволаш жараёнларини оптималлаштириш ва тиббий маълумотларни самарали бошқариш имконини бермоқда. Ахборот технологияларига асосланган техник воситалар шифокорлар фаолиятини енгиллаштирибгина қолмай, беморлар саломатлигини муҳофаза қилишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада тиббиёт соҳасида ахборот ва компьютер технологиялари самарадорлигини оширишга хизмат қиладиган асосий техник воситалар, уларнинг вазифалари, афзалликлари ҳамда қўлланиш йўналишлари ёритиб берилади.*

Калит сўзлар: *тиббиётда ахборот технологиялари, компьютер технологиялари, тиббий ахборот тизимлари, электрон тиббий ҳужжатлар, телемедицина, техник воситалар.*

Abdullaeva S.B.
assistant
Samarkand State Medical University
Turdikulova D. S.
student
Samarkand State Medical University

TECHNICAL MEANS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF USING INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES IN MEDICINE

Abstract: *Modern medicine cannot be imagined without information and computer technologies. The rapid development of digital technologies makes it possible to improve the quality of medical care, reduce the number of errors in diagnosis, optimize treatment processes and effectively manage medical information. Technical means based on information technologies not only facilitate the work of doctors, but also become important for protecting the health of patients. This article will cover the main technical means, their tasks, advantages and applications that serve to increase the effectiveness of information and computer technologies in the field of medicine.*

Keywords: *information technologies in medicine, computer technologies, medical information systems, electronic medical documents, telemedicine, technical means.*

КИРИШ: Тиббиёт соҳасида ахборот ва компьютер технологияларининг жадал ривожланиши замонавий техник воситалардан кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Бундай техник воситалар тиббий маълумотларни йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатиш жараёнларини тезкор ҳамда аниқ амалга оширишга хизмат қилади. Уларга замонавий компьютерлар, серверлар, тиббий ахборот тизимлари, рақамли диагностик қурилмалар, мобил тиббий ускуналар ва телемедицина воситалари киради. Мазкур техник воситалар ёрдамида ташхис қўйиш аниқлиги ошади, тиббий жараёнлар автоматлаштирилади, шифокор ва бемор ўртасидаги ахборот алмашинуви яхшиланади ҳамда инсон омили билан боғлиқ хатолар камаяди. Шунингдек, улар тиббий хизматлар сифатини ошириш, вақт ва ресурсларни тежаш ҳамда тиббиёт муассасалари фаолияти самарадорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда тиббиёт соҳасида ахборот ва компьютер технологияларининг жадал ривожланиши тиббий хизматлар сифатини ошириш, ташхис ва даволаш жараёнларини такомиллаштириш ҳамда соҳа фаолиятини самарали ташкил этишда муҳим омил ҳисобланади. Айниқса, тиббиётда ахборот ва компьютер технологиялари самарадорлигини ошириш имконини берувчи техник воситаларни жорий этиш рақамли тиббиётни ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири бўлиб бормоқда. Бундай техник воситалар тиббий маълумотлар билан ишлаш жараёнларини автоматлаштириш ва оптималлаштиришга хизмат қилади. Замонавий тиббиёт муассасалари фаолиятини компьютер техникаси, сервер ускуналари, тиббий ахборот тизимлари, рақамли диагностик қурилмалар, телемедицина ва мобил тиббий воситаларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Ахборот ва компьютер технологияларига асосланган техник воситалар тиббий жараёнларни автоматлаштириш орқали инсон омили билан боғлиқ муаммоларни бартараф этишга ёрдам беради. Электрон тиббий ҳужжатлар, автоматлаштирилган ҳисобот ва назорат тизимлари тиббиёт муассасаларида маълумотлар билан ишлашни анча енгиллаштиради.

Рақамли диагностик қурилмалар ва интеллектуал техник воситалар тиббий текширувлар аниқлигини оширишга хизмат қилиб, касалликларни эрта босқичда аниқлаш имконини беради. Телемедицина воситалари эса масофадан туриб тиббий маслаҳатлар бериш, беморларни кузатиш ва тиббий хизматлар қамровини кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Бу айниқса чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли учун тиббий хизматларнинг сифатини оширишга хизмат қилади. Шу сабабли, тиббиётда ахборот ва компьютер технологиялари самарадорлигини ошириш имконини берувчи техник воситаларни ўрганиш, уларнинг функционал имкониятларини таҳлил қилиш ва амалиётга жорий этиш масалалари долзарб ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ: Тиббиёт соҳасида ахборот ва компьютер технологияларини жорий этиш ҳамда уларнинг самарадорлигини ошириш масалалари сўнгги йилларда кўплаб етакчи хорижий ва маҳаллий олимлар томонидан кенг ўрганиб келинмоқда. Хусусан, рақамли тиббиёт, тиббий ахборот тизимлари, телемедицина ва интеллектуал техник воситаларнинг тиббий амалиётга таъсири илмий тадқиқотларнинг асосий йўналишларидан бирига айланган.

Жаҳон миқёсида олиб борилган тадқиқотларда (Ж.Х. Ван Беммел, Э.Шортлифф, Д.Л. Фридман ва бошқалар) тиббий ахборот тизимлари ва компьютер технологияларининг ташхис қўйиш, клиник қарор қабул қилиш ҳамда тиббий маълумотларни бошқаришдаги аҳамияти асослаб берилган. Уларнинг илмий ишларида замонавий техник воситалардан фойдаланиш натижасида тиббий хизматлар сифати ошиши, маълумотлар аниқлиги ва ишончлилиги таъминланиши таъкидланган. Айниқса, клиник қарорларни қўллаб-қувватловчи тизимлар ва рақамли диагностик қурилмалар самарадорликни оширувчи муҳим омил сифатида қайд этилган.

Маҳаллий олимлар тадқиқотларида ҳам тиббиётда ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг амалий жиҳатлари кенг ёритилган. Улар тиббий муассасаларда компьютер техникаси, сервер ускуналари ва электрон тиббий ҳужжатлар тизимини жорий этиш орқали бошқарув жараёнларини такомиллаштириш, инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтириш ва тиббий хизматлар самарадорлигини ошириш мумкинлигини илмий жиҳатдан асослаб берганлар. Шунингдек, телемедицина ва мобил тиббий техник воситаларнинг чекка ҳудудларда тиббий хизмат кўрсатишдаги аҳамияти алоҳида таъкидланган. Ўзбек олимлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда хусусан, тиббий ахборот тизимларини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш, электрон тиббий ҳужжатлар айланмасини йўлга қўйиш ҳамда телемедицина воситаларидан фойдаланиш орқали тиббий хизматлар сифатини ошириш масалалари таҳлил қилинган. Ўзбек тадқиқотчиларининг ишларида компьютер техникаси, тиббий диагностик ускуналар ва ахборот алмашинувини таъминловчи техник воситалар тиббиёт муассасалари фаолиятини самарали бошқаришда муҳим омил эканлиги қайд этилган.

Илмий адабиётлар таҳлили орқали тиббиётда қўлланилаётган ахборот ва компьютер технологиялари ҳамда уларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилувчи техник воситаларнинг асосий турлари аниқланди. Шунингдек, амалда қўлланилаётган техник воситаларнинг функционал имкониятлари таҳлил қилиниб, уларнинг тиббий жараёнларга таъсири баҳоланди. Тадқиқот жараёнида етакчи ўзбек ва хорижий олимларнинг илмий асарлари, монографиялари ва илмий мақолаларига таянилди. Бу эса тиббиётда ахборот ва компьютер технологиялари самарадорлигини ошириш имконини берувчи техник воситаларнинг илмий-назарий асосларини очиб бериш ва асосланган хулосалар чиқариш имконини берди.

МУҲОКАМА: Замонавий тиббиётда ахборот ва компьютер технологияларининг жадал ривожланиши соҳа самарадорлигини оширишда ҳал қилувчи омиллардан бирига айланмоқда. Айниқса, техник воситаларнинг клиник жараёнларга интеграция қилиниши ташхис қўйиш, даволаш ва профилактика ишларининг аниқлиги ҳамда тезкорлигини сезиларли даражада яхшиламоқда. Бу жараёнда тиббий ахборот тизимлари, интеллектуал қурилмалар ва рақамли мониторинг воситаларининг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Электрон тиббий карталар ва автоматлаштирилган маълумотлар базалари орқали бемор ҳақидаги маълумотларни тизимли сақлаш инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтиради. Шу билан бирга, турли тиббий бўлимлар ўртасида ахборот алмашинуви яхшиланиб, комплекс даволаш қарорларини қабул қилиш имконияти кенгаяди. Бу эса шифокорнинг вақт ресурсини тежаб, бемор билан ишлаш сифатини оширишга хизмат қилади.

Компьютер технологияларига асосланган диагностик қурилмалар, жумладан, рақамли томография, ультратовушли текширув ва лаборатор таҳлилларни автоматлаштирувчи ускуналар юқори аниқликдаги натижаларни таъминламоқда. Ушбу техник воситалар ёрдамида касалликларни эрта босқичда аниқлаш имконияти ортиб, оғир асоратларнинг олди олинади. Бундан ташқари, сунъий интеллект элементлари жорий этилган тизимлар катта ҳажмдаги тиббий маълумотларни таҳлил қилиш орқали клиник қарорларни қўллаб-қувватлашда самарали восита сифатида намоён бўлмоқда.

Шу билан бирга, масофавий тиббий хизматларни ташкил этишда телемедицина қурилмаларининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Бу техник воситалар чекка ҳудудларда яшовчи аҳоли учун малакали тиббий ёрдамга бўлган имкониятни кенгайтириб, соғлиқни сақлаш тизимидаги ҳудудий номувофиқликларни камайтиради. Масофавий мониторинг қурилмалари орқали сурункали касалликларга чалинган беморларни доимий назорат қилиш эса даволаш самарадорлигини оширади. Тиббиётда ахборот ва компьютер технологияларининг самарадорлигини оширишда техник воситаларнинг тўғри танланиши ва мақсадли қўлланилиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Уларни амалиётга жорий этиш нафақат тиббий хизматлар сифатини яхшилайди, балки соҳа ривожини инновацион босқичга олиб чиқишга хизмат қилади.

ХУЛОСА: Тиббиёт соҳасида ахборот ва компьютер технологияларини қўллаш жараёни техник воситалар билан узвий боғлиқ бўлиб, уларнинг самарадорлиги соғлиқни сақлаш тизимининг умумий ривожланиш даражасини белгилаб бермоқда. Мақолада техник воситалар тиббий хизматлар сифатини ошириш, ташхис ва даволаш жараёнларини оптималлаштириш ҳамда тиббий қарорларни қабул қилишда аниқликни таъминлашда муҳим аҳамият касб этиши ёритиб берилди. Бу эса замонавий тиббиётда инновацион ёндашувларнинг зарурлиги қанчалик муҳим аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Ахборот технологияларига асосланган техник воситалар орқали тиббий маълумотларни йиғиш, сақлаш ва таҳлил қилиш жараёнлари тизимли ва

шаффоф тус олмоқда. Натижада шифокорлар клиник ҳолатни комплекс баҳолаш имкониятига эга бўлиб, беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда самарали даволаш стратегияларини ишлаб чиқишлари мумкин. Бу жараён инсон омили билан боғлиқ хатоларни камайтириш билан бирга, тиббий хизматларнинг ишончлилигини оширишда муҳим ўринни эгаллайди.

Шунингдек, юқори технологик диагностик ва мониторинг қурилмаларининг жорий этилиши касалликларни эрта аниқлаш ва уларнинг динамикасини доимий назорат қилиш имконини беради. Бу ҳолат нафақат даволаш натижаларини яхшилайди, балки асоратлар хавфини камайтириш орқали беморлар ҳаёт сифатини оширишга хизмат қилади. Айниқса, сурункали касалликлар билан боғлиқ ҳолатларда автоматлаштирилган мониторинг воситалари самарали ечим сифатида намоён бўлмоқда. Техник воситалар асосида ташкил этилган телемедицина хизматлари эса тиббий ёрдамга бўлган ҳудудий чекловларни юмшатиб, аҳоли учун тенг имкониятлар яратишга хизмат қилади. Бу орқали мутахассислар билан масофадан туриб мулоқот қилиш, тезкор маслаҳат олиш ва бемор ҳолатини кузатиш имконияти кенгаяди. Натижада соғлиқни сақлаш тизимининг қамрови ва самарадорлиги сезиларли даражада ошади. Умуман олганда, тиббиётда ахборот ва компьютер технологиялари самарадорлигини ошириш имконини берувчи техник воситаларни жорий этиш стратегик аҳамиятга эга бўлиб, уларни илмий асосланган, режали ва мақсадли тарзда қўллаш талаб этилади. Бундай ёндашув соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштириш, инновацион ривожланишни таъминлаш ҳамда жамият саломатлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тиббиётда ахборот ва компьютер технологиялар самарадорлигини ошириш имконини берувчи техник воситалар соҳа ривожида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Улар тиббий хизмат сифатини ошириш, ташхис қўйишда аниқликка эришиш, шифокорлар меҳнатини енгиллаштириш ва беморлар хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Келгусида ушбу технологияларни янада ривожлантириш тиббиётнинг янги босқичга кўтарилишига олиб келади.

Использованные источники:

1. Abdullayeva S., Maxmudova Z., Xujakulov S. TIBBIY TA'LIMDA VR TEXNOLOGIYA //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 1140-1144.
2. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
3. Abdullayeva, S., Maxmudova, Z., & Xo'jaqulov, S. (2023). MODERN METHODS OF INFORMATION EXCHANGE IN POLYCLINIC CONDITIONS. Modern Science and Research, 2(10), 304-310.
4. Абдуллаева, С., & Раупова, Р. (2024). ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МЕТОДЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИНИ ЎРГАНИШ-БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАР

ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИДИР. Modern Science and Research, 3(1), 91-97.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-547-557
УДК 611.13:57.086:572.27

Абдуллаева М.А., DSc
доцент
Патологик физиология ва патологик анатомия кафедраси мудири
Бухоро давлат тиббиёт институти
https://orcid.org/0000-0001-8090-8681

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҲАЙВОНЛАРНИНГ АОРТА ПРЕПАРАТЛАРИДА ИММУН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ УСУЛИДА CD34 ВА A-SMA ОҚСИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Аннотация. Ушбу тадқиқот экспериментал ҳайвонлар (қуёнлар) аортаси препаратларида иммунфлуоресценция усули ёрдамида CD34 ва α-SMA оқсилларнинг экспрессиясини аниқлашга бағишланган. Тадқиқот 3, 6, 9, 12 ва 24 ойлик 150 та зотли қуёнларда ўтказилди: интакт гуруҳ, 1 Грей дозада 10 кунлик нурланиш таъсиридаги гуруҳ ва нурланишдан кейин ASD биостимулятори билан даволанган гуруҳ. Интакт ҳайвонларда CD34 эндотелий ҳужайралари ва vas vasorumda 3+ даражада, α-SMA эса tunica media силлиқ мушак ҳужайраларида 3+ даражада юқори экспрессия кўрсатди. Нурланиш таъсирида иккала оқсилнинг экспрессияси кескин пасайиб, 1+ даражага тушди, айниқса ёши катта ҳайвонларда кучлироқ кузатилди. ASD препарати билан даволаш CD34 экспрессиясини 2+ даражага, α-SMA экспрессиясини эса қисман тиклашга олиб келди, бу жараён ёш ҳайвонларда яққол намоён бўлди. Натижалар нурланиш эндотелий ва силлиқ мушак ҳужайраларига зарар етказишини, ASD эса ёш организмда репаратор жараёнларни фаоллаштиришини кўрсатади.

Калит сўзлар: CD34, α-SMA, иммунфлуоресценция, аорта, экспериментал қуёнлар, нурланиш, ASD биостимулятори, эндотелий ҳужайралари, силлиқ мушак ҳужайралари, регенерация, vas vasorum.

Abdullaeva M.A., DSc
associate professor
Head of the Department of Pathological Physiology and Pathological Anatomy,
Bukhara State Medical Institute
https://orcid.org/0000-0001-8090-8681

DETECTION OF CD34 AND A-SMA PROTEINS IN AORTIC SPECIMENS OF EXPERIMENTAL ANIMALS USING THE IMMUNOFLUORESCENCE METHOD

Abstract. *This study aimed to detect CD34 and α-SMA proteins in aortic specimens of experimental animals using the immunofluorescence method. The research involved 150 pedigree rabbits aged 3, 6, 9, 12, and 24 months under intact conditions, after radiation exposure (1 Gy for 10 days), and following treatment with the biostimulator ASD preparation. In intact animals, CD34 showed high expression (3+) in endothelial cells and vasa vasorum, while α-SMA was strongly expressed (3+) in smooth muscle cells of the tunica media. Irradiation significantly reduced the expression of both proteins to 1+, with more pronounced effects in older animals. Treatment with ASD partially restored CD34 expression to 2+ and moderately increased α-SMA levels, with more evident recovery in younger rabbits. The findings indicate that radiation causes severe damage to endothelial and smooth muscle cells, while ASD promotes reparative processes, particularly in young organisms.*

Keywords (English): *CD34, α-SMA, immunofluorescence, aorta, experimental rabbits, irradiation, ASD biostimulator, endothelial cells, smooth muscle cells, regeneration, vasa vasorum.*

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, қон томир деворлари ҳужайра юзасида маркери бўлмиш CD34 экспрессияловчи ўзак ҳужайралар/ҳужайра ўтмишдошларига бой хисобланади [Howson KM, Aplin AC, Gelati M, Alessandri G, Parati EA, Nicosia RF. The postnatal rat aorta contains pericyte progenitor cells that form spheroidal colonies in suspension culture. Am J Physiol Cell Physiol 2005;289(6):C1396–407. Tavian M, Zheng B, Oberlin E, Crisan M, Sun B, Huard J, et al. The vascular wall as a source of stem cells. Ann N Y Acad Sci 2005;1044:41–50]. Муаллифларнинг фикрича CD34 эндотелиал ва қон яратувчи ўзак ҳужайраларнинг маркери хисобланади, табиати жиҳатидат гликопротеиндир. Қонда айланиб юрувчи CD34 хужайралари ёнатрофдаги ҳужайраларни емиришида васкулогенезни фаоллаштирувчи энг кучли омил хисобланади ва шикастланган ўчоқларни морфологик регенерациясида аҳамияти юқоридир. Юқоридаги фикрларга асосланиб биз бу омилни ярим миқдорий иммунофлуоресценция усулида аниқладик.

Тадқиқотнинг мақсади.


Экспериментал ҳайвонларнинг аорта препаратларида иммун флуоресценция усулида CD34 ва α-SMA оқсилларини аниқлаш

Тадқиқотнинг объекти сифатида


Республика патологик анатомия ва суд тиббиёти экспертизаси маркази тажриба шароитида 3, 6, 9, 12, 24 ойлик қуёнларда тажриба шароитида нурланиш касаллиги негизида меъёрда ва биостимулятор таъсирида аорта деворининг морфологик ва морфометрик кўрсаткичларни баҳолаш мақсадида 150 та зотли қуёнларда олинган.

Ўтказилган тадқиқотлар интакт 3 ойлик қуёнларнинг аорта қон томирида интима қавати меёрида бўялганлиги, томирларда қалинлашиш ва гиперплазия ўчоқлари йўқлиги билан тависифланди. Энг фаол ва кучли бўялиш эндотелиал ҳужайралар интимаси ва vas vasorum деворининг t. muscularis ва t. Adventitia чегарасида аниқланди. Бўялиш даражасини баҳолаш

мақсадида веб-сайта Sourceforge (https://sourceforge.net/projects/ihcprofiler/) IHC Profiler тавсияларидан фойдаландик. IHC тавсияларига кўра баҳолаш 4 баллик тизимда ўтказилди: юқори мусбат (3+), мусбат (2+), суст мусбат (1+) ва манфий (0). Келтирилган баллик тизимига кўра интакт қуёнларнинг аорта деворида CD34 экспрессияси юқори мусбат 3+ билан баҳоланди (1-а расмга қаралсин).




1-а расм. Интакт 3 ойлик қуёнлар гуруҳи аортаси.
Интима меёрида бўялган, қалинлашиш ва гиперплазия ўчақлари аниқланмади. t. muscularis ва t. adventitia чегарасида интиманинг эндотелиал ҳужайралари ва vas vasorum деворида жадал бўялиш аниқланган. Экспрессия CD34, 3+. Катталашув х20.




2-б расм. Интакт 9 ойлик қуёнлар гуруҳи аортаси.
Аортанинг ўрта қаватини тўлқинсимон бўялиши кузатилган бўлса, эндотелиал ва субэндотелиал қаватларида текис бўялиши аниқланди.
Экспрессия CD34, 3+. Катталашув х20.

Шуни айтиш жоизки, CD34 экспрессияси даражаси қуёнларни ёши ўтган саин бироз сусайиб борди. Жумладан, 9 ойлик интакт қуёнларнинг аорта қон томирининг ўрта қаватида тўлқинсимон бўялиш кузатилган бўлса, эндотелий қатламининг ингичка толали қисмидаги ва ингичка субэндотелиал қатламидаги кучли бўялиш аниқланди (1-б расмга қаралсин). CD34 экспрессия даражаси юқори мусбат 3+ деб баҳоланди.


Қуёнлар бир вақтда 1 грей дозада 10 кун мобайнида нурлантириш томирларнинг эндотелий қаватида структур бузилишларга олиб келди. Жумладан, 3 ойлик қуёнларни нурлантириш томирларнинг ички девори яхлитлигини бузилишига, ички қопламини дағаллашишига, бўшлиқ томонида бўртмаларни пайдо бўлишига олиб келди. Бунинг негизида қон томирларнинг мушак қаватида миофибробластларнинг гипертрофияси ва гиперплазияси бўлиб, бундай ўзгаришларнинг хисобига эндотелий қаватида бўртмалар хосил бўлиши кузатилди (2-а расмга қаралсин, стрелка билан кўрсатилган). Ҳайвонларнинг аортасида мушаклар аро томирлар боғламлари аниқланмади. Vas vasorumда CD34 экспрессияси минимал даражада аниқланди ва унинг экспрессияси суст мусбат, яъни 1+ деб баҳоланди.






2-а расм. 3 ойликда нурланган қуёнлар аортаси. Қон томир ички қавати яхлитлигини бузилиши, мушак қаватида миофибробластларни гипертрофияси хисобига бўшлиқда бўртмалар пайдо бўлиши (стрелка билан кўрсатилган). Мушак толалари орасида томирлар боғламлари аниқланмаган. Vas vasorum экспрессияси минимал даражада. Экспрессия CD34, 1+. Катталашув Х20.	2-б расм. 9 ойликда нурланган қуёнлар аортаси. Vas vasorum экспрессияси суст, атрофияси кузатилган, t. intima да ҳам экспрессия жуда суст, эндотелий қавати бўлакларга бўлинган. Томирлар ички қатлами тўлқинсимон кўринишда Экспрессия CD34, 1+. Катталашув Х20.

9 ойлик ҳайвонларни нурлантиришган қуёнлар аортаси иммунгистокимёвий текширилганда Vas vasorum экспрессияси суст кечаётгани аниқланди, уларни атрофияси кузатилди ва аортада кучли ўзгаришлар кечаётганидан далолат берди (2-б расмга қаралсин). Шуни айтиш керакки, бундай ўзгаришлар уларнинг қон зардобида липид спектрини атерогенез томонга силжиганлиги билан мос келди. Т. intima да ҳам экспрессия жуда суст кузатилди, эндотелий қаватида турли даражадаги узилишлар ва шикастланишлар аниқланди. Шу билан бирга томирларнинг ички қаватида ғабирбудирликлар аниқланди. Бу, бизнинг фикримизча, миоцитларнинг субкомпенсатор ўчоқли гипертрофияси хисобига бўлиши мумкин. CD34 экспрессиясини иммунофлуоресценсия усулида аниқлаш унинг жуда суст бўялишини, яъни 1+ даражасида белгиланди. Олинган натижалар CD34 экспрессияловчи эндотелиал ҳужайраларни радиация таъсирида кучли шикастланишидан далолат беради. 3 ойлик нурланган қуёнларга АСД препаратини 10 кун давомида юборилиши юқорида қайд этилган ўзгаришларни бир оз бўлсада камайишига олиб келдиБаъзи жойларда микровезикуляция ўчоқлари сақланиб қолди. Аммо шунга қарамай, бўккан миофибробластлар орасида капилляр типидаги томирларнинг пролиферацияси аниқланди (3-а расмга қаранг). Бу эса аортада тикланиш жараёнлари ривожланганлигидан далолат беради. Эндотелий ҳужайраларида CD34 экспрессияси мусбат бўлиб 2+ деб баҳоланди.





3-а расм. Нурланган ва АСД препарати билан даволанган 3 ойлик қуёнлар аортаси. Томирларнинг ўрта қисмида мушак ва коллаген толаларни бўкиши ва микровезикуляциялар. Бўккан миофибробластлар орасида капилляр типидаги томирларнинг пролиферацияси (стрелка билан кўрсатилган). Экспрессия CD34, 2+. Катталашув X40.	3-б расм. Нурланган ва АСД препарати билан даволанган 9 ойлик қуёнлар аортаси. Эндотелий ҳужайраларини бўкиши ва дескамацияси, CD34 экспрессиясини суст кечиши. T. media ва t. adventitia чегарасида vas vasorum миқдорини камайиши, васкуляризацияни сусайиши (стрелка билан кўрсатилган). Экспрессия CD34, 1+. Катталашув X40.


Нурланган 9 ойлик қуёнлани АСД препарати билан даволансада аорта эндотелиал ҳужайраларида нурланиш таъсирида аниқланган ўзгаришлар сақланиб қолди (3-б расмга қаралсин). Жумладан, томирларнинг эндотелий қаватининг бўкиши, шишлар ва кўчиб тушиши аниқланди. Эндотелиал ҳужайраларда CD34 флуоресценсияси паст кузатилди, бўялиши суст бўлди. T. media ва t. adventitia чегарасида vas vasorum миқдорини камайиши хисобига васкуляризация суст кечди. Эндотелий ҳужайраларида CD34 экспрессияси суст мусбат бўлиб 1+ деб баҳоланди.

Олинган натижалар нурланган қуёнларни АСД билан даволаганда қон томир эндотелийсининг маълум бир қисмларида CD34 экспрессиясини кузатиш мумкин. Бизнинг фикримизча, нурланган ҳайвонларни АСД билан даволаш артериал қон томирларда нурланишдан сўнг репаратив жараёнлар умумий ижобий таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин.


Маълумки яллиғланиш омиллари таъсирида (цитокинлар, механик, ички мухит) фибробластлар «протомиофибробластлар» фенотипа айланади ва ҳақиқий дифференциациялашган миофибробластларга айланишади. Бундай фибробластларда силлиқ мушаклар альфа-актини (α-SMA)ни de novo экспрессияси кузатилади. Бунинг натижасида актин изошаклларини кўплаб тутувчи томирларнинг силлиқ мушак қавати Шунинг учун у миофибробластлар маркери хисобланади. α-SMAнинг экспрессияси миофибробластларни қисқариш функциясини оширади, перицитларда, миоэпителиал ҳужайраларда ва миофибробластларда экспрессияланади.. Биз

бу маркер экспрессиясини бўялиш даражасига кўра баҳоладик: 1+ - кучсиз экспрессия, 2+ - меёрий экспрессия, 3+ - кучли экспрессия.

Уч ойлик интакт ҳайвонларнинг аортасини иммунгистокимёвий таҳлили томирнинг барча қатламларини аниқ кўриниши, патологик ўзгаришлар ва учоқлар аниқланмади, уччала қаватлар меёрий тузилишига эгалиги аниқланди (4-а расмга қаралсин). Силлиқ миоцитлар цитоплазмасида α-SMA га мусбат реакция кузатилди. α-SMAнинг кучли экспрессияси аниқланиб, 3+ деб баҳоланди.




4-а расм. 3 ойлик интакт қуёнлар аортаси.
Аортанинг барча қатламлари меёрий кўринишда. Силлиқ миоцитлар цитоплазмасида α-SMA га мусбат реакция. α-SMAнинг кучли экспрессияси, 3+ баҳоланди. Катталашув х20.




4-б расм. 9 ойлик интакт қуёнлар аортаси. Миоцитларнинг аниқ тўлқинсимон кўриниши. α-SMAга кучли мусбат реакция. α-SMAни кучли мусбат экспрессияси, 3+баҳоланди. Катталашув х20.

9 ойлик интакт қуёнларнинг аортасини иммунгистокимёвий текширганимизда барча қатларларни меёрий кўриниши аниқланди (4-б расмга қаралсин). Силлиқ мушак қавати тўлқинсимон кўринишда бўлиб, хар бир толаларларнинг аниқ тузилишидалиги исботланди. Силлиқ мушак қаватида α-SMAнинг кучли экспрессияси аниқланиб, 3+ деб баҳоланди. Олинган натижалар аортанинг барча қатламлари меёрий тузилишга эга бўлиб, силлиқ миоцитларнинг цитоплазмасида α-SMAнинг кучли экспрессияси аниқланиб, 3+ деб баҳоланди). Интакт қуёнларда олинган натижалар α-SMAга кучли мусбат реакцияси томирнинг ўрта қаватида жойлашган силлиқ мушак ҳужайраларига хослигидан далолат беради.

3 ойлик қуёнларни 1 Грей дозада 10 кун давомида нурлантириш қон томирларнинг tunica media қаватида шишлар, миоцит ҳужайраларни деструктив ва дистрофик ўзгаришлари аниқланди (5-а расмга қаралсин). Миоцитлар цитоплазмасида актин толаларини ўчоқли суст бўялиши кузатилди. Шу сабали биз α-SMAнинг кучсиз экспрессияси, яъни 1+ деб баҳоланди.




5-а расм. Нурланган 3 ойлик қуёнлар аортаси. Tunica media да миоцитларни шиши, деструктив ва дистрофик ўзгаришлари. Ҳужайралар цитоплазмасида актин толаларини ўчоқли бўялиши. α-SMAнинг кучсиз 1+ экспрессияси. Катталашув х20.




5-б расм. Нурланган 9 ойлик қуёнлар аортаси. Мушак қаватини бўкиши, ингичкалашиши ва атрофия белгиларини, ҳамда қисман бириктирувчи тўқима билан алмашиниши. Миоцитлар цитоплазмасида ва айниқса ҳужайралараро матриксида актин толаларининг диффуз экспрессияси аниқланди, α-SMA экспрессияси 1+. Катталашув х20.

Тўққиз ойлик қуёнларни 1 Грей миқдорда 10 куш давомида нурлантириш қор томирларнинг барча қаватларида ўзгаришларни келтириб чиқарди (5-б расмга қаранг). Томирларнинг мушак қаватида бўкиш, баъзи холатларда шишлар аниқланди. Шу билан бирга мушак қаватини ингичкалашиши ҳамда атрофия белгилари аниқланиб, бу қаватни маълум даражада бириктирувчи тўқима билан алмашиниши кузатилди. Миоцитлар цитоплазмасида, айниқса ҳужайралараро матриксида, актин толаларининг диффуз экспрессияси аниқланди. α-SMA экспрессияси 1+ деб баҳоланди.

Яллиғланиш ва некроз таъсирида шишлар келиб чиқиши кузатилиб, уларни аста секинлик билан фибробластлар фаоллашиви хисобига бириктирувчи тўқима коллаген толалари синтези ортиб, томир деворларини фиброзланишига олиб келиши мумкин. Уч ойлик даврида нурланган қуёнларни АСД препарати билан даволанган ҳайвонларнинг гуруҳида аортани иммунгистокимёвий текширувлар аортанинг архитектоникаси ва эластиклигини (тургор) бузилишларини кўрсатди (6-а расмга қаралсин). Гистологик препаратларда миофцитларнинг тўлқинсимон тузилишини йўқолиши аниқланди. Актин толаларини меёрий фокал бўялиши кузатилди. Уларда α-SMA экспрессияси 2+ деб баҳоланди.





6-а расм. 3 ойликда нурланган ва АСД билан даволанган қуёнлар аортаси. Аорта структураси ва эластиклигини миоцитларнинг тўлқинсимон тузилишини ўзгариши хисобига бузилиши. Актиннинг меёрий фокал бўялиши. α-SMA экспрессия 2+. Катталашув х40.	6-б расм. 9 ойликда нурланган ва АСД билан даволанган қуёнлар аортаси. Аорта структурасида дистрофик ўзгаришлар белгилари, цитоплазмада оқсил томчиларини тўпланиши. Актинни цитоплазматик фокал экспрессияси. α-SMA экспрессия 2+. Катталашув х40.

Шундай қилиб, турли ёшдаги қуёнларда липид профилига хос ўзгаришлар аниқланди. Қуёнларнинг ёши ошган сари уларнинг қон зардобида умумий холестерин, ЗПЛПлардаги холестерин ва учацилглицеридлар миқдорини ортиб боришикузатилиб, ЗЮЛПлардаги холестерин миқдори эса камайишига моилликни аниқладик. Бу эса атерогенлик коэффициенти жадаллик билан кўтарилишига олиб келди, айниқса 12 ва 24 ойлик қуёнларда яққол намоён бўлиб, юрак қон-томир тизимида ўзгаришлар ривожланаётганлигидан ва касалликлари ривожланиш ҳавфи борлигидан далолат беради. Шу билан бирга, ўтказилган тадқиқотлар интакт қуёнлар аортасининг t. muscularis ва t. adventitia чегарасида интиманинг эндотелиал ҳужайралари ва vas vasorum деворида жадал бўялиш аниқланган. Аорта деворининг барча қатламларида CD34 ва α-SMA экспрессияси ёш ҳайвонларда жадал кечиши уларни регенератор ва пролифератив фаоллиги юқорилигидан далолат беради.

Бундай ўзгаришлар атерогенлик коэффициенти ортишига ва қон томирлар эндотелий қаватида атеросклеротик ўзгаришлар кечаётганидан далолат беради. CD34 экспрессияловчи эндотелиал ҳужайраларни радиация таъсирида кучли шикастланишидан далолат беради.

Нурланган қуёнларни АСД билан даволаганда қон томир эндотелийсининг маълум бир қисмларида CD34 экспрессияси кузатилиб vas vasorum да регенерация жараёнлари жадаллашиши ва бу ёш қуёнларга кўпроқ хос бўлди. Миоцитларда α-SMA экспрессияси маълум даражада кўтарилиши кузатилди. Бундай ўзгаришлар айниқса ёш қуёнларда яққол сезиларли аниқланди.

Ҳулосалар:

Қуёнларнинг қон зардобида учацилглицеридлар, умумий холестерин, ЗПЛПлардаги холестерин миқдори ёши умри узайган сари ортиб бориши, ЗЮЛПлардаги холестеринни эса камайиб бориши кузатилиб, атерогенлик коэффициентини ошиши томирлар эндотелийсида атеросклеротик ўзнаришларга моиллик аниқланди.ЗЮЛП ва ТГлар миқдори) текширилди ва умумий холестерин ва ЗПЛП миқдорлари фақат баъзи гурухларда ёшга оид ишонарли ошганлиги, ЗЮЛП эса 9 ва 24 ойлик гурухларда ишонарли камайганлиги аниқланди.

Турли ёшдаги қуёнларда 10 кун давомида 1 Грей миқдорда таъсир этиш уларнинг қон зардобила холестерин миқдорини, ҳамда уни ташиш шаклларида ҳам камайишига олиб келди. Радиацион нурланиш кучли ЗЮЛПлардани холестерин миқдорини прогрессив камайишига ва атерогенлик коэффициенти жадал ёшга боғлиқ холда ортиши кузатилди. Кучли ўзгаришлар 12-24 ойлик қуёнларда кузатилди ва томирларда ривожланаётган эндотелий дисфункциясидан далолат берди.

Нур олган қуёнларни АСД препарати билан даволаш ҳайвонларнинг қон зардобида умумий холестерин ва ЗЮЛПлардаги холестерин миқдорини оширди, аммо тўлиқ меёрлашиши кузатилмади. Бундай ижобий ўзгаришлар атерогенлик коэффициентини пасайтирди ва эндотелийда атеросклеротик ўзгаришлар ривожланишини олдини олди. Бундай ижобий натижалар 6-12 ойлик қуёнларда яққол намоён бўлди.

Интакт қуёнлар аортасида t. muscularis ва t. adventitia чегарасида интиманинг эндотелиал ҳужайралари ва vas vasorum деворида CD34 экспрессияси юқори бўлиб 3+ баҳоланди. Радиация таъсирида vas vasorum етишмовчилигига, миоцитларда CD34 экспрессияси камайишига олиб келди ва 1+ деб белгиланди, айниқса 9 ойлик қуёнларда кескин камайиши кузатилди. Нурланган ҳайвонларни 10 кун давомида АСД препарати билан даволаш аортанинг эндотелиал ҳужайраларида CD34 экспрессиясини фаоллашувига олиб келди ва экспрессия даражаси 2+ деб баҳоланди. Бундай ўзгаришлар айниқса ёш қуёнларда сезиларли аниқланди.

Ўтказилган тадқиқотлар интакт қуёнлар аортасида α-SMA экспрессияси юқори бўлиб 3 + деб белгиланди ва асосан ёш ҳайвонларда кузатилди. Нурланган қуёнлар, айниқса 9 ойлик қуёнлар аортасида α-SMA экспрессияси камайиши кузатилиб унинг даражаси 1+ деб белгиланди, ҳамда “цитоплазма блоки”дан “трамвай йўлларига ўтиши”га олиб келди. Нурланган ҳайвонларга АСД препаратини 10 кун давомида киритилиши миоцитларда α-SMA экспрессияси маълум даражада кўтарилишига олиб келиб, унинг жадаллиги 2+ деб белгиланди. Бундай ўзгаришлар айниқса ёш қуёнларда яққол сезиларли бўлди.

Использованные источники:

1. Аббасова М.Т., Гаджиев А.М. Изменения показателей обмена железа в крови крыс при электромагнитном облучении в дециметровом диапазоне. Гематология и трансфузиология. 2019; 64(3) С.274–282

2. Абугов С.А., 2017 Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний аорты (2017) стран 5-66
3. Аверин А.С., Уткин Ю.Н. Сердечно-сосудистые эффекты токсинов змеиного яда: кардиотоксичность и кардиопротекция // Acta naturae 2021. № 3 (50) Том. 13 С. 4-14
4. Аверкин Н.С., Федорова М.Г., Латынова И.В., Харитонов Е.А., Пивоваров Е.В. Микрометрические изменения стенок крупных артерий в условиях нарушенного углеводного обмена // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2019. №2. С.144-151.
5. Азизова Т.В., Кузнецова К.В., Банникова М.В. и другие соавторы. Заболеваемость облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей среди работников предприятия атомной промышленности// Российский медицинский журнал. 2016; 22(6) С.298—305.
6. Алешкевич А.И Основы и принципы лучевой диагностики. // Учеб-метод. Пособие. – Минск: БГМУ, 2015. – 86 с.
7. Асадова Н. Х. Тимуснинг морфофункционал хусусиятлари ва нур касаллигида биостимулятор таъсиридаги ўзгаришлар //Society and innovations-2021 Special Issue – 3 Б. 486-493
8. Атаев И.А. Ремоделирование интимы и адвентиции брюшной аорты при хроническом адренергическом и холинергическом стрессе в эксперименте. // Вестник РУДН, серия Медицина, 2014, № 4. –С. 5-10.
9. Атаев И.А. Ремоделирование интимы и адвентиции брюшной аорты при хроническом адренергическом и холинергическом стрессе в эксперименте // Вестник РУДН, серия Медицина, 2014, № 4 С.5-10
10. Атаев И.А. Структурные изменения медии аорты при моделировании различных вариантов хронического стресса // Вестник Новгородского государственного университета-2014 №78 С.5-9
11. Афонин А.Н., Белозерова Т.Ю., Зимина Т.П. Теория и практика лабораторных гистологических исследований. // Методические рекомендации для преподавателя по организации теоретических занятий. Москва. 2019.
12. Ахмедов Ф.Ю. [и др.]. Вазорелаксантное действие полифенольных соединений растений Euphorbia в зависимости от их химической структуры // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. 2020. № 10(76).
13. Бадрутдинов О.Р., Тюменев Р.С. Радиационная экология. // Конспект лекций. Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2014. – 112 с.
14. Бадрутдинов О.Р., Тюменев Р.С. Институт экологии и географии. Радиационная экология. Конспект лекций. Казань 2014 363 страницы
15. Баймурадов Р.Р. Морфофункциональное состояние семенников при остром и хроническом радиационного облучении (обзор литературы). Журнал: Биология и интегративная медицина (2021).
16. Баймурадов Равшан Раджабович Морфофункциональное состояние семенников при остром и хроническом радиационного облучении // Биология и интегративная медицина-2021 №4 – июль-август (51) С.4-22

17. Башлыкова Л.А. Наследование цитогенетических и молекулярно-клеточных эффектов в клетках костного мозга животных при хроническом воздействии ионизирующего излучения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук -2017 том 19, №2 (3), С.420-425
18. Билич Г.Л. Анатомия человека // Медицинский атлас - М.: Эксмо, 2016. - 224 с.
19. Бирюков А. В., Овчаренко Д. В., Маслевцов Д. В., Мельникова Е. А., Қондратьев В. М., Баталин И. В. Многоэтапная реқонструкция коронарных артерий, аортального клапана и аорты. «Вестник хирургии», 2019 , Том 178 , № 1 - С. 99–101
20. Бичан О.Д., Герасимова Л.К., Кулагова Т.А. Безопасность жизнедеятельности человека. // Краткий қонспект лекций к общему курсу для студентов спец. – Минск: БГУ, 2016. – 68 с.

УДК: 621.313.333

Абдурахмонов С.У.
старший преподаватель
Андижанский государственный технический институт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ

Аннотация. *В статье рассматриваются особенности применения асинхронных генераторов в составе ветроэлектрических станций. Актуальность исследования обусловлена ростом доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе и необходимостью повышения надёжности и экономической эффективности ветроэнергетических установок. Целью работы является анализ принципов работы асинхронных генераторов в ветроэлектрических станциях, а также оценка их преимуществ и ограничений.*

Ключевые слова: *ветроэлектрическая станция, асинхронный генератор, ветроэнергетика, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность.*

Abdurakhmonov S.U.
senior lecturer
Andijan State Technical Institute
Andijan, Uzbekistan

USE OF ASYNCHRONOUS GENERATORS IN WIND ENERGY SYSTEMS

Abstract. *The article considers the features of using asynchronous generators in wind power plants. The relevance of the study is determined by the growing share of renewable energy sources and the need to improve the reliability and economic efficiency of wind energy systems. The paper analyzes operating principles, advantages, and limitations of asynchronous generators in wind power applications.*

Keywords: *wind power plant, asynchronous generator, wind energy, renewable energy sources, energy efficiency.*

Введение

Ветроэнергетика является одним из наиболее динамично развивающихся направлений возобновляемой энергетики. Использование энергии ветра позволяет снизить зависимость от традиционных источников энергии, уменьшить выбросы парниковых газов и обеспечить энергоснабжение удалённых и труднодоступных районов. Одним из ключевых

элементов ветроэлектрической станции является электрический генератор, который преобразует механическую энергию ветрового потока в электрическую. В практике ветроэнергетики применяются как синхронные, так и асинхронные генераторы. Асинхронные генераторы получили широкое распространение благодаря простоте конструкции, высокой надёжности и относительно низкой стоимости. В то же время особенности работы асинхронных генераторов накладывают определённые ограничения на их применение, что требует комплексного анализа их эксплуатационных характеристик в составе ветроэлектрических станций.

Методы исследования

В рамках данного исследования использовались следующие методы:

- анализ научно-технической литературы по ветроэнергетике и электрическим машинам;
- теоретический анализ принципов работы асинхронных генераторов;
- сравнительный анализ характеристик асинхронных и синхронных генераторов;
- обобщение данных эксплуатации ветроэлектрических станций малой и средней мощности.

Методологической основой исследования являются положения теории электрических машин и энергетических систем.

Принцип работы асинхронного генератора в ветроэлектрических станциях

Асинхронный генератор представляет собой асинхронный электродвигатель, работающий в генераторном режиме при превышении скорости вращения ротора над синхронной скоростью. В ветроэлектрических станциях это условие обеспечивается за счёт изменения скорости вращения ветроколеса в зависимости от скорости ветра. Для работы асинхронного генератора необходим источник реактивной мощности. В сетевых ветроэлектрических станциях реактивная мощность потребляется из сети, а в автономных установках используется компенсация с помощью конденсаторных батарей.

Преимущества использования асинхронных генераторов

К основным преимуществам асинхронных генераторов в ветроэлектрических станциях относятся:

простота конструкции и отсутствие системы возбуждения;

высокая надёжность и устойчивость к механическим перегрузкам;

низкие капитальные затраты по сравнению с синхронными генераторами;

простота параллельной работы с электрической сетью;

хорошие динамические характеристики при изменяющихся ветровых нагрузках.

Указанные преимущества делают асинхронные генераторы особенно привлекательными для ветроэлектрических станций малой и средней мощности.

Недостатки и ограничения

Наряду с преимуществами асинхронные генераторы имеют ряд недостатков, которые необходимо учитывать при проектировании ветроэлектрических станций:

- потребность в реактивной мощности;
- ограниченные возможности регулирования напряжения и частоты;
- снижение КПД при частичных нагрузках;
- зависимость параметров выходного напряжения от скорости ветра.

Для устранения этих недостатков применяются системы компенсации реактивной мощности, частотные преобразователи и автоматизированные системы управления.

Экономическая эффективность применения

Экономическая эффективность применения асинхронных генераторов в ветроэлектрических станциях обусловлена снижением капитальных затрат, упрощением обслуживания и увеличением срока службы оборудования. В установках малой мощности использование асинхронных генераторов позволяет существенно снизить стоимость электроэнергии и сократить срок окупаемости проекта. Дополнительный экономический эффект достигается за счёт возможности использования серийных асинхронных машин и минимизации затрат на систему возбуждения.

Заключение

В статье рассмотрены особенности использования асинхронных генераторов в ветроэлектрических станциях. Установлено, что асинхронные генераторы обладают рядом существенных преимуществ, таких как простота конструкции, высокая надёжность и экономичность. В то же время их применение связано с необходимостью компенсации реактивной мощности и ограниченными возможностями регулирования параметров электроэнергии.

Использованные источники:

1. Ahmedov, A. P., Mahamadjonov, S. Y. O. Modeling of magnetic saturation in autonomous asynchronous generators for micro hydropower plants. Andijan State Technical Institute Bulletin, 2023, №2(48), pp. 45–56.
2. Work Of Asynchronous Generator In The Composition Of Mini-Ges In Autonomous Mode SYU Mahamadjonov - The American Journal of Engineering and Technology, 2021.
3. N. Pirmatov, S. Mahamadjonov, M. Matqosimov and H. Haydarov, “Characteristics of the static and dynamic operating modes of the asynchronous generator in renewable energy sources and the production of electric energy control through a frequency converter,” in 2024 II International Scientific and Practical Conference “Energy, Ecology and Technology in Agriculture”, E3S Web Conferences 480, no. 01007, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448001007

УДК 372.891

Абдурахмонов Б.М., PhD
доцент
кафедра географии и основ экологии
Наманганский государственный университет,
Исабоева Д.А.
магистрант
кафедра географии и основ экологии
Наманганский государственный университет

ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. *Статья посвящена разработке инновационной методики проектирования и применения дидактических материалов в географическом образовании в контексте реформ системы образования Республики Узбекистан. Авторы анализируют переход от традиционных методов обучения к компетентностному подходу, опираясь на стратегию «Узбекистан-2030» и результаты PISA 2022. Предлагается интегрированная система материалов, сочетающая рабочие тетради, географические кроссворды и цифровые ресурсы (Google Earth, Kahoot!, GeoTest), для развития критического мышления, пространственного воображения и экологического сознания учащихся. Методология основана на принципах «обучения через исследование» и GeoCapabilities. В статье описаны этапы создания материалов, их экспериментальная апробация, интеграция климатического образования и рекомендации по профессиональному развитию учителей. Ключевые выводы подчеркивают многофункциональность, технологическую гибкость и компетентностную ориентацию предлагаемой системы, способствующей адаптации к международным стандартам.*

Ключевые слова. *Географическое образование, дидактические материалы, инновационные методики, Google Earth, Kahoot, GeoTest, компетентностный подход, PISA 2022, стратегия «Узбекистан-2030», экологическое сознание, обучение через исследование, цифровые ресурсы.*

Abdurakhmonov B. M., PhD
associate professor
Department of geography and fundamentals of ecology
Namangan State University,
Isabayeva D.A.
magistrant
Department of geography and fundamentals of ecology
Namangan State University

INNOVATIVE METHODOLOGY FOR DESIGNING AND APPLYING DIDACTIC MATERIALS IN GEOGRAPHIC EDUCATION

Abstract. *The article is devoted to the development of an innovative methodology for designing and applying didactic materials in geographic education in the context of reforms in the education system of the Republic of Uzbekistan. The authors analyze the transition from traditional teaching methods to a competency-based approach, based on the "Uzbekistan-2030" strategy and the results of PISA 2022. An integrated system of materials is proposed, combining workbooks, geographic crosswords, and digital resources (Google Earth, Kahoot!, GeoTest) to develop critical thinking, spatial imagination, and ecological awareness among students. The methodology is based on the principles of "enquiry-based learning" and GeoCapabilities. The article describes the stages of material creation, their experimental testing, integration of climate education, and recommendations for teachers' professional development. Key findings emphasize the multifunctionality, technological flexibility, and competency orientation of the proposed system, contributing to adaptation to international standards.*

Keywords. *Geographic education, didactic materials, innovative methodologies, Google Earth, Kahoot, GeoTest, competency-based approach, PISA 2022, "Uzbekistan-2030" strategy, ecological awareness, enquiry-based learning, digital resources.*

Введение. Современный этап развития системы образования в Республике Узбекистан характеризуется глубокими трансформационными процессами, направленными на внедрение компетентностного подхода и гармонизацию национальных учебных стандартов с международными требованиями. В контексте реализации стратегии «Узбекистан – 2030» особое внимание уделяется созданию современной образовательной среды, способствующей формированию у учащихся навыков критического мышления, самостоятельного анализа и практического применения полученных знаний. География как учебная дисциплина обладает уникальным потенциалом для развития пространственного воображения, экологического сознания и понимания сложных глобальных взаимосвязей. Однако результаты

международного исследования PISA 2022 года, в котором Узбекистан принял участие впервые, выявили ряд серьезных проблем в подготовке учащихся по естественным наукам, включая географические аспекты. Уровень грамотности 15-летних подростков в области решения реальных жизненных проблем и интерпретации научных данных оказался ниже среднего показателя стран ОЭСР, что подчеркивает необходимость радикального обновления методического инструментария учителя.

Актуальность разработки системы дидактических материалов по географии обусловлена переходом от традиционной модели обучения, ориентированной на запоминание фактов («Future 1»), к модели, основанной на «мощном знании» (Powerful Knowledge) и активном исследовательском поиске («Future 3»). Дидактические материалы в географии традиционно рассматриваются как связующее звено между теоретическим содержанием учебника и практической деятельностью учащегося. Они включают в себя рабочие тетради, раздаточные материалы, кроссворды и тестовые задания, которые в совокупности обеспечивают интерактивность учебного процесса. В условиях цифровизации образования эти классические средства трансформируются в интерактивные цифровые ресурсы, такие как Google Earth, Kahoot!, Wordwall и специализированное программное обеспечение типа «GeoTest».

Целью данного исследования является разработка и научно-методическое обоснование эффективности системы дидактических материалов, интегрирующей традиционные и инновационные цифровые средства для повышения качества географического образования в общеобразовательных школах. Исследование опирается на методологию «обучения через исследование» (Enquiry-based learning), разработанную М. Робертс, и концепцию GeoCapabilities Д. Ламберта. В статье рассматриваются механизмы создания рабочих тетрадей нового поколения, использование геоинформационных сервисов для виртуальных экспедиций и внедрение алгоритмизированных систем контроля знаний.

Таблица 1. Концептуальная схема трансформации дидактических материалов.

Фактор влияния на реформу	Содержание и значение для географии
Стратегия «Узбекистан-2030»	Переход к результатоориентированному управлению и цифровизация всех уровней образования.
Результаты PISA 2022	Выявление дефицита навыков высокого порядка (анализ, синтез, оценка) у учащихся.
Климатическая повестка	Интеграция вопросов изменения климата в курсы физической и экономической географии 7-11 классов.
Цифровой Узбекистан 2030	Достижение 100% охвата школ высокоскоростным интернетом для использования облачных ГИС.




Рис. 1. Переход от одномерных печатных дидактических материалов к многомерной интерактивной образовательной среде: центральный элемент — *ученик-исследователь*; функциональные блоки — *картографический, аналитический, игровой и оценочный*.

Методы. Методологическая база исследования включает системный анализ дидактических функций учебных пособий и экспериментальную проверку эффективности новых форматов заданий. В ходе работы были проанализированы учебные программы по географии для 6-9 классов, а также методические рекомендации зарубежных и отечественных ученых.

Проектирование традиционных дидактических средств. Первым этапом стало совершенствование структуры рабочих тетрадей (Ishchi daftarlar).

В отличие от обычных тетрадей, современные рабочие тетради проектируются как интерактивные пособия, включающие:

1. Картографический блок: Работа с контурными картами по методике И.И. Бариновой и В.Г. Суслова, предполагающая нанесение объектов по координатам, анализ взаимосвязи рельефа и климата.

2. Статистический блок: Задания на анализ данных из таблиц и построение графиков (например, графиков хода температур или диаграмм прироста населения).

3. Логический блок**:** Использование географических кроссвордов по методике Б. Абдурахмонова, направленных на закрепление терминологического аппарата («географического языка»).

Разработка интерактивных и цифровых ресурсов. Вторым этапом стало создание цифрового контента на базе облачных платформ. Особое место в методике занимает использование Google Earth Pro. Технология создания дидактического материала в этой среде включает формирование файлов формата.kmz, содержащих метки (Place Marks), полигоны (Polygons) и пути (Paths). Для каждой метки прописывается описание с использованием HTML-тегов, вставляются изображения и ссылки на видеоматериалы, что превращает карту в полноценную интерактивную среду.

Для оперативного контроля знаний и повышения мотивации использовались платформы Kahoot! и Wordwall. Методика работы с ними предполагает создание викторин, в которых оценивается не только правильность, но и скорость ответа, что стимулирует быстроту географического мышления. В системе Wordwall акцент делался на использовании шаблонов «Labelled diagram» для изучения строения Земли, атмосферы или океанического дна.

Таблица 2. Психолого-педагогическая функция дидактического материала

Тип дидактического материала	**Используемая технология / платформа**	**Психолого-педагогическая функция**
Раздаточные таблицы	Microsoft Excel / Печатная основа	Систематизация данных, сравнение характеристик (климат, зоны).
Виртуальные туры	Google Earth (.kmz)	Визуализация абстрактных понятий, развитие пространственного видения.
Игровые викторины	Kahoot!	Повышение вовлеченности, эмоциональная разгрузка, командная работа.

Тип дидактического материала	Используемая технология / платформа	Психолого-педагогическая функция
Адаптивные тесты	GeoTest (JS/Tailwind)	Объективная оценка, самоконтроль, индивидуализация траектории.

Программная среда «GeoTest». Особым вкладом авторов является апробация программного продукта **«GeoTest»** (разработка BotuGeoInnovation Soft). Данная система построена на стеке технологий HTML5, Tailwind CSS и JavaScript. Дидактическая ценность программы заключается в многоуровневости тестирования (Bosqichli test):

- Уровень А (Базовый): Проверка знания номенклатуры и основных понятий. Допуск к следующему уровню осуществляется только при наборе более 50% правильных ответов.
- Уровень Б (Продвинутый): Задания на установление причинно-следственных связей и пространственный анализ.
- Система вознаграждений**:** Применение элементов геймификации через статусы «Золото», «Серебро», «Бронза» и текстовые фидбеки («A'lo», «Yaxshi»), что соответствует психологическим особенностям подростков.

Результаты. Внедрение разработанной системы дидактических материалов в практику преподавания географии в 7-9 классах позволило зафиксировать качественные сдвиги в образовательных результатах учащихся. Анализ проводился по трем ключевым параметрам: уровень усвоения фактического материала, развитие картографических умений и способность к аналитическому мышлению.

Эффективность использования рабочих тетрадей и раздаточных материалов. Традиционные, но методически обновленные материалы показали высокую эффективность в структурировании знаний. При изучении темы «Природные зоны мира» учащиеся использовали сравнительные таблицы, которые позволили четко дифференцировать характеристики почв, растительности и климата.

Использование подобных раздаточных материалов в сочетании с заданиями в рабочих тетрадях привело к тому, что в экспериментальных группах количество учащихся, успешно справляющихся с заданиями на сравнение географических объектов, выросло на 22% по сравнению с контрольными группами. Особую роль сыграли задания на контурных картах, где ученики не просто копировали атлас, а наносили объекты по заданным условиям (например, «отметьте горы, сформировавшиеся в эпоху альпийской складчатости»).




Рисунок 1. Модель задания для контурной карты в рабочей тетради.

Результаты цифровой интеграции. Наиболее впечатляющие результаты были получены при использовании геоинформационных сервисов. Работа в Google Earth Pro позволила учащимся «увидеть» рельеф в 3D-моделях, что критически важно для понимания тектонических процессов. При изучении Африки учащиеся исследовали Восточно-Африканский разлом, визуально оценивая масштабы этого геологического объекта. Согласно данным тестирования, 85% учащихся, использовавших Google Earth, продемонстрировали улучшение навыков пространственного мышления и ориентации по карте на 30%.




Рисунок 2. Интерфейс проекта «Природные зоны Африки» в Google Earth.

Использование платформы **GeoTest** позволило автоматизировать процесс мониторинга знаний. Программа не только выставляла оценку, но и формировала PDF-отчет для учителя, где указывались конкретные темы, вызвавшие затруднения. Это позволило реализовать принцип дифференцированного обучения: учащиеся, быстро прошедшие Уровень А, переходили к более сложным исследовательским задачам, в то время как учитель мог уделить время тем, кто столкнулся с трудностями на базовом уровне.

Таблица 4. Прирост показателей эффективности методов

Показатель эффективности	Традиционный метод	Инновационный метод (GeoTest + ГИС)	Прирост
Коэффициент усвоения понятий	0.62	0.84	+0.22
Время на проверку работ учителем	45 мин/класс	2 мин/класс	-95%
Уровень учебной мотивации	45%	92%	+47%
Навык работы с 3D-моделями	12%	78%	+66%

Адаптация к требованиям PISA. Внедрение заданий открытого типа, интегрированных в дидактические материалы, позволило подготовить учащихся к формату PISA. Например, в тестах стали чаще использоваться задания на интерпретацию графиков изменения климата и прогнозирование экологических последствий хозяйственной деятельности. Учащиеся экспериментальных групп стали более уверенно использовать научные аргументы при обосновании своих ответов. Это подтверждается результатами внутренних срезов, где доля учащихся, достигших 3-го и 4-го уровней компетенций по шкале PISA, увеличилась на 15%.

Обсуждение. Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что современный дидактический материал перестает быть просто «носителем информации» и становится «инструментом познания». Этот сдвиг полностью соответствует идеям Д. Ламберта о том, что школьная география должна давать учащимся «способность видеть мир по-новому», выходя за рамки их повседневного опыта.

Роль «мощного знания» в географическом образовании. Концепция «мощного знания» (Powerful Knowledge) подразумевает знание, которое является специализированным, научно обоснованным и дает возможность

делать обобщения. Наши дидактические материалы (рабочие тетради, ГИС-проекты) направлены на формирование именно такого знания. Когда ученик использует Google Earth для измерения площади ледников или анализа урбанизации Ташкента, он оперирует не просто сухими цифрами из учебника, а реальными географическими данными, становясь в некоторой степени «гражданским ученым». Это развивает дисциплинарное мышление: умение задавать вопросы «Почему это место такое?», «Как оно меняется?» и «Как это влияет на другие места?».

Психолого-педагогические аспекты геймификации. Успех таких платформ, как Kahoot! и GeoTest, объясняется их способностью удовлетворить потребность подростков в признании и соревновании. Геймификация в географии не должна сводиться к простому развлечению. Как отмечает М. Робертс, исследование должно быть направлено на решение серьезных вопросов, а игровые элементы служат лишь средством поддержания интереса на этапе сбора данных или рефлексии. Важно соблюдать баланс: если «обучение через игру» становится самоцелью, то образовательная ценность падает до уровня краткосрочного запоминания, что Д. Ламберт называет угрозой потери «эмансипационного потенциала» предмета.

Цифровой разрыв и пути его преодоления. Несмотря на явные преимущества цифровых инструментов, исследование выявило проблему цифрового неравенства. В Узбекистане доступ к цифровым ресурсам в городских школах составляет около 85%, в то время как в сельских — всего 45%. Это создает риск того, что инновационные методики будут доступны лишь части учащихся. Решением этой проблемы в рамках нашего исследования стала разработка «гибридных» дидактических материалов. Например, интерактивные задания в Wordwall могут быть легко распечатаны в виде кроссвордов или тестов для работы в классах без компьютеров. Такой подход обеспечивает инклюзивность и гарантирует равный доступ к качественному контенту для всех регионов республики.

Интеграция климатического образования. Одной из наиболее актуальных тенденций, выявленных в ходе исследования, стала необходимость усиления экологической составляющей дидактических материалов. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО и стратегии «Зеленой экономики» Узбекистана, вопросы изменения климата должны пронизывать весь школьный курс географии. Наши материалы включают кейсы по Аральскому морю, анализу таяния ледников Памира и влиянию опустынивания на сельское хозяйство. Использование ГИС позволяет визуализировать эти процессы в динамике (функция «Historical Imagery» в Google Earth), что делает климатическую угрозу более осязаемой для учащихся.




Рисунок 3. Сравнительная диаграмма сокращения акватории Аральского моря (1960–2020 гг.).

Профессиональное развитие учителя. Эффективность любой системы дидактических материалов зависит от готовности учителя к ее применению. Данные опроса TALIS 2024 показывают, что 78% учителей Узбекистана чувствуют себя уверенно в адаптации обучения к культурному разнообразию, но многие все еще испытывают потребность в обучении работе с ГИС и ИИ-инструментами. Внедрение нашей методики требует от педагога перехода к роли фасилитатора, который не дает готовые ответы, а направляет исследовательский поиск ученика.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает, что системное использование инновационных дидактических материалов в географическом образовании является ключевым фактором повышения его качества и адаптации к международным стандартам PISA. Интеграция традиционных средств (рабочие тетради, кроссворды) с высокотехнологичными решениями (Google Earth, GeoTest) позволяет создать динамичную образовательную среду, ориентированную на развитие критического мышления и практических компетенций учащихся. Ключевые выводы исследования:

1. Многофункциональность: Дидактические материалы должны выполнять не только информационную, но и стимулирующую, контролирующую и развивающую функции, превращая ученика в активного субъекта обучения.

2. Технологическая гибкость: Использование облачных платформ и специализированного ПО (GeoTest) позволяет индивидуализировать процесс обучения, обеспечивая мгновенную обратную связь и возможность работы над ошибками.

3. Визуализация и 3D-моделирование: Геоинформационные системы являются незаменимым инструментом для формирования пространственного воображения, позволяя преодолеть абстрактность многих географических понятий.

4. Компетентностная ориентация: Включение заданий исследовательского типа и кейсов по актуальным глобальным проблемам (изменение климата, устойчивое развитие) готовит учащихся к жизни в современном «обществе знаний».



Рисунок 4. Итоговая блок-схема методической системы.

Разработанная методика может быть рекомендована для внедрения в широкую практику общеобразовательных школ Узбекистана, а также использована при подготовке и повышении квалификации учителей географии. Дальнейшие исследования в этой области могут быть связаны с интеграцией технологий дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта для создания еще более адаптивных и иммерсивных дидактических комплексов.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11 сентября 2023 года.
2. Национальная учебная программа по географии для средних общеобразовательных школ Узбекистана (2024).
3. Абдурахмонов Б., Мирзакаримов А., Садирдинова Н. Географические кроссворды: методическое пособие для учителей географии. – Наманган: Изд-во НамГУ.
4. Программный комплекс «GeoTest» (разработка BotuGeoInnovation Soft) для мониторинга знаний по географии (HTML5, JavaScript).
5. Концепция цифровой трансформации «Цифровой Узбекистан – 2030» в сфере народного образования.
6. Баринова И. И., Суслов В. Г. География. Материки и океаны. 7 класс: Методика использования рабочих тетрадей в школьном курсе. – М.: Дрофа.
7. Норпулатова Х. А. Активные методы обучения, направленные на развитие самостоятельного и творческого мышления учащихся // Молодой ученый. – 2012. – № 1.

8. Абдиманапов Б. Ш. и др. Интеграция технологий искусственного интеллекта и ГИС в географическое образование: региональный опыт (2025).
9. Гайпова Р. Т. Инновационные игры в обучении географии в общеобразовательных школах // International Journal of Artificial Intelligence (2025).
10. Ламберт Д. География как «мощное знание» (Geography as Powerful Knowledge). В кн.: Обучение географии в средней школе. – Лондон: Routledge, 2024.
11. Робертс М. Обучение географии через исследование (Geography Through Enquiry: Approaches to teaching and learning). 2-е изд. – Шеффилд: Географическая ассоциация, 2025.
12. ОЭСР (OECD). Результаты PISA 2022: Показатели грамотности 15-летних учащихся Узбекистана в области естественных наук.
13. ОЭСР (OECD). TALIS 2024: Отчет о состоянии преподавательского состава и условиях обучения в Узбекистане.
14. ПРООН/ЮНЕСКО. Рекомендации по интеграции вопросов изменения климата в учебные программы 7-11 классов (2025).
15. Уилмот Д., Брукс К. Трансформационное обучение в географическом образовании: международные тематические исследования // International Research in Geographical and Environmental Education (2025).
16. Google Earth Pro: Руководство по созданию виртуальных экспедиций и 3D-анализу рельефа.
17. Wordwall.net: Платформа для создания интерактивных дидактических упражнений (Labelled diagrams, Quiz).
18. Kahoot!: Использование элементов геймификации для оперативного контроля знаний в классе.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-573-580

Акбарова Б.Ш., PhD
доцент
кафедра «Экономическая статистика»
Ташкентский государственный экономический университет

ИНФЛЯЦИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: ВЛИЯНИЕ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС

Аннотация*: В статье рассматривается влияние инфляции и процентных ставок на функционирование и развитие малого бизнеса в условиях макроэкономической нестабильности. Актуальность исследования обусловлена усилением инфляционных процессов и изменением денежно-кредитной политики, которые непосредственно воздействуют на финансовую устойчивость, инвестиционную активность и деловую активность субъектов малого предпринимательства. Особое внимание уделяется анализу каналов передачи инфляции и процентных ставок на издержки производства, доступность кредитных ресурсов и структуру спроса на продукцию малого бизнеса.*

Ключевые слова: *инфляция; процентные ставки; малый бизнес; денежно-кредитная политика; инвестиционная активность; финансовая устойчивость; макроэкономические факторы; эконометрический анализ; статистическая оценка.*

Akbarova B.Sh., PhD
associate professor
Department of Economic Statistics
Tashkent State University of Economics

INFLATION AND INTEREST RATES: IMPACT ON SMALL BUSINESSES

Abstract:*The article examines the impact of inflation and interest rates on the functioning and development of small businesses under conditions of macroeconomic instability. The relevance of the study is обусловлена by the intensification of inflationary processes and changes in monetary policy, which directly affect the financial stability, investment activity, and business performance of small enterprises. Particular attention is paid to the analysis of transmission channels through which inflation and interest rates influence production costs, access to credit resources, and the structure of demand for small business output.*

Keywords: *inflation; interest rates; small business; monetary policy; investment activity; financial stability; macroeconomic factors; econometric analysis; statistical assessment.*

Введение

В современных условиях развития экономики инфляция и процентные ставки выступают ключевыми макроэкономическими факторами, оказывающими существенное влияние на хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Особенно чувствительным к изменениям макроэкономической конъюнктуры является малый бизнес, который, с одной стороны, играет важную роль в обеспечении экономического роста, занятости и конкурентной среды, а с другой — обладает ограниченными финансовыми и институциональными ресурсами для адаптации к неблагоприятным экономическим условиям.

Инфляционные процессы напрямую отражаются на уровне издержек производства, покупательной способности потребителей и ценовой политике малых предприятий. Рост процентных ставок, в свою очередь, влияет на доступность кредитных ресурсов, стоимость заемного капитала и инвестиционную активность малого бизнеса. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики данные факторы могут существенно ограничивать возможности расширения производства, модернизации и устойчивого развития малого бизнеса.

Актуальность исследования обусловлена усилением инфляционного давления и изменением параметров процентных ставок в результате трансформации макроэкономической и финансовой политики, что требует научно обоснованной оценки их воздействия на деятельность малого бизнеса. При этом влияние инфляции и процентных ставок носит неоднородный характер и зависит от отраслевой принадлежности предприятий, структуры их затрат, уровня финансовой устойчивости и степени интеграции в финансовую систему.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых анализу макроэкономических факторов, роль инфляции и процентных ставок в развитии малого бизнеса зачастую рассматривается в обобщённом виде, без достаточного использования количественных и статистических методов. Это ограничивает возможности выработки адресных мер государственной поддержки и повышения эффективности денежно-кредитной политики с учётом специфики малого бизнеса.

Обзор литературы по теме исследования

Проблематика влияния инфляции и процентных ставок на деятельность малого бизнеса занимает важное место в современных макроэкономических и финансовых исследованиях. В научной литературе данная тема рассматривается в контексте теории денежно-кредитной политики, механизмов трансмиссии процентной ставки, финансовой устойчивости предприятий и роли малого бизнеса в обеспечении экономического роста.

Теоретические основы анализа влияния процентных ставок на экономическую активность были заложены в рамках монетаристской и кейнсианской школ. Согласно подходу Ф. Мишкина, изменение процентных ставок воздействует на инвестиционные решения через канал стоимости

капитала и кредитный канал трансмиссии денежно-кредитной политики [9]. Б. Бернанке и М. Гертлер обосновали концепцию кредитного канала, согласно которой ужесточение денежно-кредитной политики приводит к сокращению доступности банковского финансирования, что особенно чувствительно для малых и средних предприятий [8].

Исследования Международного валютного фонда подчеркивают, что в странах с формирующимися рынками инфляция и процентные ставки оказывают более выраженное воздействие на сектор малого бизнеса ввиду его высокой зависимости от банковского кредитования и ограниченного доступа к рынкам капитала [3]. Аналогичные выводы содержатся в отчетах Всемирного банка, где отмечается, что повышение ставок снижает инвестиционную активность МСП и замедляет темпы их роста [5].

В трудах OECD [7] (2020–2023) акцентируется внимание на финансовой устойчивости малого бизнеса и необходимости формирования институциональной среды, обеспечивающей доступ к финансированию в условиях макроэкономической нестабильности. [11] эмпирически доказали, что малые предприятия более чувствительны к изменениям процентных ставок по сравнению с крупными компаниями, поскольку имеют ограниченные альтернативные источники финансирования.

Отдельное направление исследований посвящено влиянию инфляции на рентабельность и производственную активность малого бизнеса. [10] отмечают, что рост инфляции усиливает неопределенность и снижает инвестиционные стимулы частного сектора. В условиях высокой инфляции малые предприятия сталкиваются с ростом издержек, снижением реального спроса и ухудшением финансовых показателей.

В национальной научной литературе вопросы взаимосвязи макроэкономической стабильности и развития малого бизнеса рассматриваются в контексте трансформации денежно-кредитной политики и структурных реформ. В исследованиях, посвящённых экономике Узбекистана, подчеркивается роль инфляционного таргетирования и постепенной либерализации процентных ставок в формировании устойчивой предпринимательской среды [15] отмечает, что устойчивость малого бизнеса во многом определяется предсказуемостью макроэкономической политики и доступностью финансовых ресурсов.

Методология исследования

Методологическая основа исследования базируется на комплексном использовании статистических и эконометрических методов анализа, позволяющих количественно оценить влияние инфляции и процентных ставок на основные показатели деятельности малого бизнеса. Исследование носит прикладной характер и ориентировано на выявление устойчивых взаимосвязей между макроэкономическими параметрами и динамикой развития малого бизнеса.

На первом этапе исследования применён анализ динамических рядов, позволивший выявить тенденции изменения макроэкономических

показателей и показателей малого бизнеса во времени. Для оценки степени взаимосвязи между переменными использован корреляционный анализ, на основе которого определена направленность и сила статистической зависимости между инфляцией, процентными ставками и показателями деятельности малого бизнеса.

На втором этапе проведено эконометрическое моделирование с использованием метода множественной линейной регрессии. Базовая модель имеет следующий вид:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 INF_t + \beta_2 IR_t + \beta_3 GDP_t + \varepsilon_t$$

где:

Y_t — показатель деятельности малого бизнеса (объем производства, инвестиции);

INF_t — уровень инфляции;

IR_t — процентная ставка;

GDP_t — реальный ВВП;

ε_t — случайная ошибка.

Оценка параметров модели осуществлялась методом наименьших квадратов (OLS). Статистическая значимость коэффициентов проверялась с использованием t-критерия Стьюдента, а общая объяснительная способность модели — на основе коэффициента детерминации (R^2). Для обеспечения корректности результатов учитывались требования к стационарности временных рядов и отсутствию мультиколлинеарности между объясняющими переменными.

Результаты и обсуждение

В связи с этим возникает необходимость комплексного статистического анализа влияния инфляции и процентных ставок на основные показатели деятельности малого бизнеса, такие как объём производства, занятость, инвестиции и финансовая устойчивость. Проведение такого исследования позволит углубить понимание механизмов взаимодействия макроэкономических процессов и малого бизнеса, а также сформировать практические рекомендации для совершенствования экономической политики.

Инфляция и процентные ставки являются ключевыми макроэкономическими факторами, формирующими условия функционирования и развития малого бизнеса. Их влияние проявляется через изменение стоимости ресурсов, доступности финансирования, уровня совокупного спроса и инвестиционных ожиданий. Малый бизнес, обладая ограниченными финансовыми резервами и высокой зависимостью от текущих денежных потоков, особенно чувствителен к колебаниям данных параметров, что усиливает его уязвимость в условиях макроэкономической нестабильности.

Инфляционные процессы оказывают непосредственное воздействие на издержки производства малых предприятий за счёт роста цен на сырьё,

материалы, энергоносители и услуги. В условиях ускорения инфляции возможности малого бизнеса по переносу возросших издержек на конечные цены ограничены, что приводит к снижению рентабельности и ухудшению финансовых результатов. Дополнительным негативным фактором выступает сокращение реальных доходов населения, в результате чего снижается платёжеспособный спрос на продукцию и услуги малых предприятий, особенно ориентированных на внутренний рынок.

Процентные ставки, как основной инструмент денежно-кредитной политики, оказывают прямое влияние на стоимость заёмного капитала и доступность кредитных ресурсов. Повышение процентных ставок приводит к удорожанию банковских кредитов, росту долговой нагрузки и сокращению инвестиционной активности малого бизнеса. В отличие от крупных предприятий, малые фирмы имеют ограниченный доступ к альтернативным источникам финансирования, что усиливает их зависимость от банковского кредитования и повышает чувствительность к изменению процентных ставок. В результате наблюдается замедление темпов расширения производства, отсрочка инвестиционных проектов и снижение конкурентоспособности малых предприятий.

Таблица 3. Влияние процентных ставок на инвестиции малого бизнеса

Показатель	**Изменение при росте ставки на 1 п.п.**
Объем кредитов	–6–8 %
Инвестиции	–4–6 %
Рентабельность	–2–3 п.п.

Представленные в таблице 3 результаты свидетельствуют о существенной чувствительности инвестиционной активности малого бизнеса к изменению процентных ставок. Рост процентной ставки на 1 процентный пункт сопровождается сокращением объёма кредитования малого бизнеса в среднем на 6–8 %, что указывает на высокую зависимость данного сектора от заёмных источников финансирования. Ограниченный доступ малых предприятий к альтернативным финансовым инструментам усиливает негативный эффект удорожания кредитных ресурсов.

Сокращение объёма кредитования напрямую отражается на инвестиционной активности малого бизнеса. При повышении процентных ставок инвестиции в основной капитал уменьшаются на 4–6 %, что свидетельствует о снижении возможностей расширения производства, обновления основных фондов и внедрения инноваций. Данный эффект особенно выражен в капиталоёмких отраслях, где потребность в долгосрочном заёмном финансировании является высокой.

Дополнительным следствием роста процентных ставок является снижение рентабельности деятельности малых предприятий на 2–3 процентных пункта. Удорожание обслуживания заёмного капитала приводит к увеличению финансовых расходов и снижению чистой прибыли, что

негативно отражается на общей финансовой устойчивости малого бизнеса. В совокупности полученные результаты подтверждают высокую эластичность инвестиционной активности малого бизнеса по отношению к процентным ставкам и подчёркивают необходимость формирования сбалансированной денежно-кредитной политики с учётом специфики данного сектора.

Статистический анализ показывает наличие устойчивой взаимосвязи между динамикой инфляции, процентных ставок и основными показателями деятельности малого бизнеса. Как правило, периоды усиления инфляционного давления и ужесточения денежно-кредитной политики сопровождаются снижением темпов роста объёма производства, сокращением инвестиций и ослаблением деловой активности. При этом влияние макроэкономических факторов носит неоднородный характер и зависит от отраслевой принадлежности предприятий, структуры их затрат и уровня финансовой устойчивости. Наиболее уязвимыми оказываются отрасли торговли, строительства и сферы услуг, где доля заёмных средств в структуре капитала выше, а возможности долгосрочного ценового манёвра ограничены.

Таблица 4. Результаты регрессионного анализа

Переменная	**Коэффициент**	**t-статистика**	**Значимость**
Инфляция	–0,45	–3,8	$p < 0,01$
Процентная ставка	–0,52	–4,1	$p < 0,01$
Реальный ВВП	0,63	5,2	$p < 0,01$
R^2	0,72		

Результаты регрессионного анализа, представленные в таблице 4, свидетельствуют о наличии статистически значимых зависимостей между макроэкономическими факторами и показателями деятельности малого бизнеса. Отрицательные значения коэффициентов при переменных «инфляция» и «процентная ставка» указывают на сдерживающее влияние данных факторов на развитие малого бизнеса. В частности, увеличение уровня инфляции на одну условную единицу приводит к снижению показателей деятельности малого бизнеса в среднем на 0,45 единицы при прочих равных условиях. Аналогично, рост процентной ставки оказывает ещё более выраженное негативное воздействие, что подтверждается коэффициентом –0,52.

Высокие по абсолютной величине значения t-статистик для инфляции (–3,8) и процентной ставки (–4,1) при уровне значимости $p < 0,01$ свидетельствуют о высокой статистической надёжности полученных оценок. Это позволяет утверждать, что выявленные зависимости не являются случайными и отражают устойчивое влияние инфляционных процессов и стоимости заёмного капитала на деятельность малого бизнеса.

Положительный коэффициент при переменной «реальный ВВП» (0,63) указывает на стимулирующее воздействие общего экономического роста на развитие малого бизнеса. Рост реального объёма валового внутреннего

продукта сопровождается расширением производственной и инвестиционной активности малых предприятий, что частично компенсирует негативные эффекты инфляции и повышения процентных ставок.

Коэффициент детерминации модели ($R^2 = 0,72$) свидетельствует о высокой объяснительной способности регрессионного уравнения, поскольку включённые макроэкономические переменные объясняют около 72 % вариации показателей деятельности малого бизнеса. В совокупности полученные результаты подтверждают статистически значимое отрицательное влияние инфляции и процентных ставок на развитие малого бизнеса и подчёркивают важность учёта данных факторов при формировании экономической и денежно-кредитной политики.

Заключение

Проведённый анализ показал, что инфляция и процентные ставки являются определяющими макроэкономическими факторами, оказывающими существенное влияние на деятельность и устойчивость малого бизнеса. Усиление инфляционных процессов приводит к росту издержек производства, снижению рентабельности и ослаблению платёжеспособного спроса, что ограничивает возможности расширения и модернизации малых предприятий. Повышение процентных ставок, в свою очередь, сдерживает инвестиционную активность малого бизнеса за счёт удорожания заёмных ресурсов и сокращения доступа к кредитному финансированию.

Результаты статистического и эконометрического анализа подтвердили наличие устойчивой отрицательной зависимости между уровнем инфляции, процентными ставками и основными показателями деятельности малого бизнеса, включая объём производства, инвестиции и финансовую устойчивость. При этом выявлено, что воздействие данных факторов носит неоднородный характер и варьируется в зависимости от отраслевой принадлежности и финансового состояния предприятий. Положительное влияние общего экономического роста, отражённого динамикой реального валового внутреннего продукта, частично компенсирует негативные эффекты макроэкономической нестабильности, однако не устраняет их полностью.

Полученные выводы свидетельствуют о необходимости формирования сбалансированной и предсказуемой денежно-кредитной политики, ориентированной на снижение инфляционных рисков и обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса. Совершенствование механизмов государственной поддержки, развитие инструментов льготного кредитования и повышение финансовой устойчивости малых предприятий могут способствовать смягчению негативного воздействия инфляции и процентных ставок, а также усилению роли малого бизнеса в обеспечении устойчивого экономического роста и занятости населения.

Использованные источники:

1. Центральный банк Республики Узбекистан. Основные направления денежно-кредитной политики. – Ташкент, 2020–2026.

2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Малое предпринимательство в Республике Узбекистан: статистический сборник. – Ташкент, 2021–2025.
3. International Monetary Fund. World Economic Outlook. – Washington, DC: IMF, 2020–2024.
4. International Monetary Fund. Monetary Policy and Inflation Dynamics in Emerging Economies. – IMF Working Paper, 2021.
5. World Bank. Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance: Improving SMEs' Access to Finance and Finding Innovative Solutions. – Washington, DC, 2022.
6. World Bank. Global Economic Prospects. – Washington, DC, 2021–2024.
7. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Financing SMEs and Entrepreneurs. – Paris: OECD Publishing, 2020–2023.
8. Bernanke, B., Gertler, M. Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission. – Journal of Economic Perspectives, 2020 (reprint edition).
9. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 13th ed. – Boston: Pearson, 2021.
10. Ghosh, A., Ostry, J., Qureshi, M. Inflation Targeting and Financial Stability. – IMF Economic Review, 2021.
11. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Martinez Peria, M. Bank Financing for SMEs around the World. – Journal of Financial Stability, 2022.
12. Ayyagari, M., Demirgüç-Kunt, A., Maksimovic, V. Small vs. Young Firms across the World. – World Bank Research Observer, 2020.
13. Angeloni, I., Faia, E. Capital Regulation and Monetary Policy with Fragile Banks. – Journal of Monetary Economics, 2021.
14. Кыргызбаев, А., Рахимов, Ш. Влияние инфляции на финансовую устойчивость малого бизнеса. – Экономика и предпринимательство, 2022.
15. Абдурахимова С. А. Малый бизнес и макроэкономическая стабильность: статистический анализ. – Ташкент: Иқтисод-Молия, 2023

УДК 330.123

Асенбаева А.Е., д.ф.э.н.
доцент
Заведующий кафедрой «Экономика, бухгалтерский учет и аудит»
Ташкентский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии
ORCID: 0009-0009-3986-386X

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Аннотация. *В данной статье с научной, теоретической и практической точек зрения анализируется роль и значение показателей финансовой стабильности в обеспечении конкурентоспособности предприятий сферы услуг. В ходе исследования систематически рассматриваются основные показатели, используемые для оценки финансового состояния предприятий сферы услуг: коэффициент замещения, коэффициент финансовой стабильности, уровень резервирования собственным оборотным капиталом, соотношение заемного и собственного капитала, а также показатели финансирования материальных резервов.*

Ключевые слова: *Сфера услуг, конкурентоспособность, финансовая стабильность, коэффициент замещения, оборотный капитал, соотношение заемного и собственного капитала, материальные резервы, финансовые риски, инвестиционная привлекательность.*

Asenbaeva A.E., Doctor of Philosophy in Economics
associate professor
Head of the Department of Economics, Accounting and Auditing
Tashkent branch of Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnology
ORCID: 0009-0009-3986-386X

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF SERVICE ENTERPRISES BASED ON FINANCIAL STABILITY INDICATORS

Abstract. *This article analyzes the role and importance of financial stability indicators in ensuring the competitiveness of service enterprises from a scientific, theoretical and practical perspective. In the course of the research, the main indicators used to assess the financial condition of service enterprises - the replacement ratio, the financial stability ratio, the level of provision with own*

working capital, the ratio of debt and equity, and indicators of financing of material reserves - are systematically covered.

Key words. *Sphere of service, competitive advantage, financial stability, coefficient of mortgage, working capital, ratio of loan and equity capital, material reserves, financial risk, investment attractiveness.*

В условиях современной инновационной экономики экономическое развитие предприятий сферы услуг напрямую зависит от качественных показателей инвестиций в трудовые ресурсы и человеческий капитал, важными факторами в которых являются развитие творческого потенциала сотрудников, повышение их заинтересованности во внедрении инноваций и быстрая адаптация к новым технологиям.[31] На предприятиях сферы услуг одним из главных показателей, всесторонне отражающих уровень социальной защиты трудовых ресурсов, конкурентоспособность системы оплаты труда и заинтересованность предприятия в материальном стимулировании сотрудников, считается соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму. Высокий уровень заинтересованности сотрудников в профессиональной деятельности активизирует их внутренние мотивационные ресурсы, формирует поведение, направленное на повышение производительности труда, и ускоряет процесс достижения высоких результатов, в результате чего наблюдается стабильный рост этого показателя.

Одним из главных показателей, определяющих эффективность хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг и уровень их надежности в рыночной среде, является их финансовое состояние. Этот показатель, наряду с определением уровня конкурентоспособности и бизнес-потенциала предприятия, также является важным фактором, обеспечивающим финансовую стабильность, необходимую для стабильной и эффективной реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Под финансовым состоянием предприятия сферы услуг понимается его способность финансировать свою деятельность. Оно характеризуется эффективностью предприятия в использовании необходимых финансовых ресурсов, его финансовыми отношениями с другими юридическими и физическими лицами, их статусом, целесообразностью и платежеспособностью распределения ресурсов, а также финансовой стабильностью.[32]

Среди показателей, отражающих финансовую стабильность предприятия, можно выделить следующие:

- коэффициент оборачиваемости предприятия;
- коэффициент финансовой стабильности предприятия;
- коэффициент оборотного капитала предприятия;

[31] Асенбаева А. «Важность цифровых услуг в повышении конкурентоспособности предприятий сферы услуг», Журнал «Зеленая экономика и развитие», 2025.
[32] Асенбаева А.Е., «Механизмы повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг», Монография. 2025.

- коэффициент соотношения заемного и собственного капитала предприятия;

- коэффициент оборотного капитала предприятия.[33]

Коэффициент замещения предприятия — это экономический показатель, выражающий степень взаимозаменяемости услуг, предлагаемых экономической организацией, с предложениями других конкурентов. Он важен для определения интенсивности конкуренции на рынке и конкурентных преимуществ предприятия. Высокое значение этого показателя указывает на низкий уровень дифференциации предоставляемой услуги и большое количество альтернативных вариантов для потребителей, в то время как низкое значение указывает на высокий уровень предоставления услуг и лояльность клиентов к ним.[34]

Степень замещения, то есть степень альтернативности, является важным показателем при оценке структуры рынка, а в модели конкурентных сил М. Портера угроза альтернативных продуктов указывается как один из главных факторов, определяющих конкурентоспособность предприятий.[35]

Еще одним показателем финансовой стабильности предприятий является коэффициент финансовой стабильности предприятия. Он предназначен для определения уровня финансовой стабильности предприятий сферы услуг, оценки эффективности использования их финансовых ресурсов и выявления финансовых факторов, обеспечивающих их долгосрочную конкурентоспособность. Поскольку доля материальных активов в предприятиях сферы услуг относительно невелика, основным показателем является доля собственных средств.

Коэффициент собственного капитала предприятия — это финансовый показатель, выражающий долю оборотного капитала, сформированного из собственных источников, в финансировании текущей деятельности предприятия, и он имеет большое значение при оценке финансовой стабильности и уровня ликвидности предприятия.

Предприятия сферы услуг (например, гостиницы, рестораны, транспортные или туристические компании) обычно имеют высокие операционные расходы. Если коэффициент задолженности слишком высок, процентные платежи и финансовые обязательства могут снизить качество обслуживания или негативно повлиять на покрытие операционных расходов. Предприятия сферы услуг с низким коэффициентом задолженности считаются более безопасными и стабильными для инвесторов. В то же время умеренный коэффициент задолженности повышает способность компании инвестировать в расширение и инновации. Высокий коэффициент задолженности представляет риск для ликвидности компании и ее

[33] Джабраилов, Хабиб Сапиюллахович Организационно-эконо мические основы повышения конкурентоспособност и предприятий сферы услуг : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 Махачкала 2005

[34] Grant R.M. *Contemporary Strategy Analysis*. — Wiley, 2019.

[35] Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson., “ Strategic Management”7rd edition.

операционной эффективности. Например, если сезонной выручки гостиницы или ресторана недостаточно, ей будет трудно погашать долги. (Таблица 1) Следующая формула может быть использована для определения финансовой стабильности предприятия сферы услуг и степени его зависимости от заемных средств для финансирования своей деятельности:

$$\textbf{Соотношение долга к собственному капиталу} = \frac{\text{Общий долг}}{\text{Капитал}};$$

где:

общая задолженность - банковский кредит предприятия, договоры лизинга, непогашенная задолженность перед поставщиками и другие финансовые обязательства;

собственный капитал - основной капитал предприятия, накопленная прибыль и акционерный капитал.

Таблица 1.

Интерпретация финансового положения предприятий сферы услуг.

Низкое соотношение	Предприятие стабильно и надежно в операционном и финансовом отношении.
Среднее соотношение	Средний уровень риска, заемные средства используются эффективно, но требуется мониторинг.
Высокое соотношение	Высокий уровень риска, деятельность компании в значительной степени зависит от заемных средств, а финансовая стабильность слабая.

Коэффициент формирования материальных резервов за счет собственного оборотного капитала — это финансовый показатель, выражающий степень формирования материальных резервов компании за счет собственных финансовых ресурсов. Он важен при оценке стабильности финансирования текущей деятельности компании и степени зависимости от краткосрочной задолженности.[36]

Этот показатель характеризует финансовую устойчивость материальных ресурсов, необходимых для непрерывного осуществления производственного (или сервисного) процесса предприятия, и является важным элементом системы оценки финансовой стабильности.[37]

$$\textbf{К}\textit{из} = \frac{\text{Собственный оборотный капитал}}{\text{Материальные резервы}};$$

где:

Кмз — коэффициент формирования материальных резервов за счет собственного оборотного капитала;

собственный оборотный капитал = Собственные средства − Долгосрочные активы;

материальные резервы — сумма сырья, материалов, готовой продукции и запасов.

[36] Савицкая Г.В. *Анализ хозяйственной деятельности предприятия*. — М.: Инфра-М, 2020

[37] Ковалёв В.В. *Финансовый анализ*. — М.: Финансы и статистика, 2019

Финансовое состояние и уровень финансовой стабильности предприятий сферы услуг имеют решающее значение для обеспечения их конкурентоспособности. Результаты исследования показывают, что при оценке финансовой стабильности коэффициент замещения, коэффициент финансовой стабильности, показатели обеспечения собственным оборотным капиталом, соотношение заемного и собственного капитала, а также уровень финансирования материальных резервов образуют систему важных взаимосвязанных показателей.

Специфика сектора услуг, включая низкую долю материальных активов, высокие операционные издержки и сезонность доходов, требует тщательного управления финансовыми рисками. Поэтому поддержание этих показателей на оптимальном уровне обеспечит финансовую независимость предприятия, повысит его инвестиционную привлекательность и создаст долгосрочные конкурентные преимущества.

Использованные источники:

1. Асенбаева А. «Важность цифровых услуг в повышении конкурентоспособности предприятий сферы услуг», Журнал «Зеленая экономика и развитие», 2025.

2. Асенбаева А.Е., «Механизмы повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг», Монография. 2025.

3. Джабраилов, Хабиб Сапиюллахович Организационно-эконо мические основы повышения конкурентоспособност и предприятий сферы услуг : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05 Махачкала 2005.

4. Grant R.M. *Contemporary Strategy Analysis*. — Wiley, 2019.

5. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson., “ Strategic Management”7rd edition.

6. Савицкая Г.В. *Анализ хозяйственной деятельности предприятия*. — М.: Инфра-М, 2020.

7. Ковалёв В.В. *Финансовый анализ*. — М.: Финансы и статистика, 2019.

УДК: 618.2-06:616-092:616-097:616-076

Атаханов Ш.Э.
Нишанов Д.А.
Умарова К.А.
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, Республиканский патологоанатомический центр
Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И АНГИОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Резюме: *Актуальность. Материнская смертность остаётся одной из ключевых медико-социальных проблем современного акушерства. Плацента при критических акушерских состояниях отражает совокупность системных нарушений - иммунных, воспалительных и сосудистых, что делает иммуногистохимическое исследование важным инструментом патогенетического анализа.*

Цель. Оценить иммуновоспалительные и ангиогенные изменения плаценты при материнской смертности на основе экспрессии CD56, CD68 и VEGF и определить их связь с экстрагенитальной патологией.

Материалы и методы. Иммуногистохимическое исследование выполнено на плацентарном материале 105 случаев материнской смертности (2020–2024 гг.); в 102 наблюдениях проведён полноценный ИГХ-анализ. Оценивалась экспрессия CD56, CD68 и VEGF в ключевых анатомо-функциональных зонах плаценты. Использовался полуколичественный метод оценки с последующим статистическим анализом (χ^2-критерий Пирсона).

Результаты. Умеренная и выраженная экспрессия CD56 выявлена в 48,0% случаев и статистически значимо ассоциировалась с наличием экстрагенитальной патологии ($p=0,018$). Макрофагальная активация по CD68 отмечена у 52,0% пациенток и наиболее отчётливо коррелировала с инфекционными и системными заболеваниями ($p=0,012$). Ангиогенный ответ по VEGF доминировал в структуре изменений (57,8%), демонстрируя тенденцию к усилению при экстрагенитальной патологии без достижения статистической значимости ($p=0,089$).

Заключение. Иммуногистохимический профиль плаценты при материнской смертности характеризуется выраженной иммуновоспалительной активацией и ангиогенным стресс-ответом, тесно связанными с экстрагенитальной патологией. Полученные данные подчёркивают патогенетическую роль нарушений материнско-плацентарного интерфейса в формировании критических акушерских исходов.

Ключевые слова: *материнская смертность, плацента, иммуногистохимия, CD56, CD68, VEGF, экстрагенитальная патология.*

Atakhanov Sh.E.
Nishanov D.A.
Umarova K.A.
Center for the development of professional qualification of medical workers, Republican Pathoanatomical Center,
Samarkand branch of Republican research center of emergency medicine

IMMUNO-INFLAMMATORY AND ANGIOGENIC CHANGES OF THE PLACENTA IN MATERNAL MORTALITY

Summary: *Background. Maternal mortality remains one of the key medical and social challenges in modern obstetrics. In critical obstetric conditions, the placenta reflects a complex interplay of systemic immune, inflammatory, and vascular disturbances, making immunohistochemical assessment an important tool for pathogenetic analysis. Objective. To evaluate immuno-inflammatory and angiogenic changes of the placenta in maternal mortality based on the expression of CD56, CD68, and VEGF, and to determine their association with extragenital pathology.*

Materials and methods. Immunohistochemical analysis was performed on placental tissue from 105 cases of maternal mortality recorded in 2020–2024; complete IHC assessment was feasible in 102 cases. The expression of CD56, CD68, and VEGF was evaluated in key anatomical and functional zones of the placenta. A semi-quantitative scoring approach was applied followed by statistical analysis using Pearson's χ^2 test.

Results. Moderate to strong CD56 expression was identified in 48.0% of cases and showed a statistically significant association with extragenital pathology ($p=0.018$). Macrophage activation assessed by CD68 was observed in 52.0% of patients and demonstrated the strongest correlation with infectious and systemic diseases ($p=0.012$). Angiogenic activity assessed by VEGF predominated in the overall structure of changes (57.8%), showing a tendency toward increased expression in the presence of extragenital pathology without reaching statistical significance ($p=0.089$).

Conclusion. The immunohistochemical profile of the placenta in maternal mortality is characterized by pronounced immuno-inflammatory activation and an angiogenic stress response, closely associated with extragenital pathology. These findings highlight the pathogenetic role of disturbances at the maternal–placental interface in the development of critical obstetric outcomes.

Keywords: *maternal mortality, placenta, immunohistochemistry, CD56, CD68, VEGF, extragenital pathology.*

Ведение. Материнская смертность продолжает оставаться одной из наиболее чувствительных интегральных характеристик качества системы охраны материнства и детства, отражая как уровень клинической помощи, так и эффективность раннего выявления жизнеугрожающих состояний. Несмотря на глобальную тенденцию к снижению показателей, ежегодно в мире регистрируются сотни тысяч случаев материнской смерти, значительная доля которых рассматривается как потенциально предотвратимая при своевременной диагностике и адекватной тактике ведения [4, 9].

В последние годы всё большее внимание уделяется плаценте как ключевому патогенетическому звену в развитии критических акушерских состояний. Плацентарная ткань отражает совокупное воздействие системных факторов - гипоксии, воспаления, эндотелиальной дисфункции и иммунных нарушений - формируя морфологический «отпечаток» неблагоприятного течения беременности [5]. В этом контексте иммуногистохимическое исследование плаценты приобретает особое значение как метод, позволяющий выйти за рамки описательной морфологии и охарактеризовать клеточно-молекулярные механизмы материнско-плацентарной дезадаптации.

Одним из ключевых компонентов иммунного микроокружения плаценты являются децидуальные натуральные киллерные клетки (dNK), идентифицируемые по экспрессии CD56. В норме они обеспечивают иммунную толерантность и ремоделирование спиральных артерий, однако при осложнённой беременности их функциональный профиль может смещаться в сторону дисрегуляции и иммунного стресса [3, 10]. Наряду с этим, плацентарные макрофаги (клетки Кащенко–Гофбауэра), экспрессирующие CD68, играют центральную роль в реализации врождённого иммунного ответа, участвуя как в противоинфекционной защите, так и в формировании хронического воспаления ворсин [7].

Неотъемлемым элементом плацентарной адаптации при неблагоприятных условиях является ангиогенный ответ, ключевым медиатором которого выступает VEGF. Изменения его экспрессии рассматриваются как маркер гипоксически-ишемического стресса и сосудистой дисфункции, однако данные литературы свидетельствуют о гетерогенности VEGF-реакции в зависимости от характера и стадии патологического процесса [1, 6]. Это подчёркивает необходимость комплексной интерпретации ангиогенных и иммуновоспалительных маркеров в совокупности, а не изолированно.

Таким образом, изучение иммуногистохимического профиля плаценты при материнской смертности, с акцентом на маркеры CD56, CD68 и VEGF, представляет собой актуальное направление, позволяющее углубить понимание патогенеза критических акушерских состояний и выявить морфологические эквиваленты системного неблагополучия матери.

Целью настоящей работы. Оценить особенности иммуновоспалительного и ангиогенного профиля плаценты при материнской

смертности по экспрессии CD56, CD68 и VEGF и определить их связь с экстрагенитальной патологией.

Материалы и методы исследования

Иммуногистохимическое исследование выполнено на плацентарном материале, полученном при патологоанатомическом исследовании 105 случаев материнской смертности, зарегистрированных в период 2020–2024 гг. Материал отбирался из архивных парафиновых блоков при условии сохранности тканевой архитектоники и возможности адекватной иммуногистохимической верификации.

В 102 случаях (97,1%) качество плацентарной ткани позволило выполнить полноценное иммуногистохимическое исследование; в 3 наблюдениях материал был исключён из ИГХ-анализа вследствие выраженной аутолизной деградации.

Для иммуногистохимического анализа использовали срезы плаценты толщиной 3–4 мкм, полученные из следующих анатомо-функциональных зон: децидуальной оболочки (базальная пластинка); стромы ворсин хориона; эндотелия фетальных капилляров; синцитиотрофобласта терминальных и промежуточных ворсин.

Выбор зон исследования определялся задачами оценки локального иммунного микроокружения, макрофагальной активности и ангиогенных процессов в системе «мать–плацента–плод».

Иммуногистохимическое исследование включало определение экспрессии следующих маркеров:

- CD56 - маркер децидуальных натуральных киллерных клеток, отражающий состояние локальной иммунной толерантности и иммунной активации;
- CD68 - маркер макрофагов (клеток Кащенко–Гофбауэра), характеризующий степень воспалительной инфильтрации и активности врождённого иммунитета;
- VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) - ключевой фактор ангиогенеза, отражающий выраженность сосудистого ремоделирования и компенсаторных реакций при гипоксии.

Выбор данной панели обусловлен необходимостью комплексной оценки иммуновоспалительного и ангиогенного дисбаланса плацентарной ткани при критических акушерских состояниях.

Иммуногистохимическое окрашивание выполнялось по стандартному протоколу с использованием моноклональных антител промышленного производства. Демаскировка антигенов осуществлялась термическим методом в буферном растворе с контролем температурного режима.

Визуализация иммунной реакции проводилась с использованием хромогенной системы DAB (3,3′-диаминобензидин). Ядра докрашивались гематоксилином Майера. В качестве отрицательного контроля применялись срезы с исключением первичных антител.

Оценка иммуногистохимической реакции проводилась полуколичественным методом с учётом интенсивности окрашивания и плотности иммунопозитивных клеток в поле зрения при увеличении ×200–×400.

Для всех маркеров использовалась следующая градация экспрессии:

- 0 (−) - отсутствие специфического окрашивания;
- + - слабая экспрессия;
- ++ - умеренная экспрессия;
- +++ - выраженная экспрессия.

Для CD56 и CD68 учитывалась локализация иммунопозитивных клеток (децидуальная ткань, строма ворсин, периваскулярные зоны). Для VEGF оценивалась экспрессия в синцитиотрофобласте, эндотелии сосудов и стромальных клетках ворсин.

Иммуногистохимические данные сопоставлялись с наличием и характером экстрагенитальной патологии (инфекционные заболевания, почечная недостаточность, системные и метаболические нарушения), установленной на основании клинической и патологоанатомической документации.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета IBM SPSS Statistics v.26. Категориальные показатели представлены в виде абсолютных значений и процентов. Для оценки различий применялся χ^2-критерий Пирсона. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования

Иммуногистохимический анализ выполнен **в 102 наблюдениях** (97,1% от общей когорты 105 случаев); именно эта совокупность использована для статистической интерпретации результатов ИГХ.

1) Экспрессия CD56 (децидуальные NK-клетки) в зависимости от экстрагенитальной патологии. Общая характеристика. В целом по группе (n=102) отрицательная экспрессия CD56 отмечена у 17 (16,7%), слабая - у 36 (35,3%), умеренная - у 35 (34,3%), выраженная - у 14 (13,7%). Таким образом, умеренная/выраженная CD56-экспрессия суммарно выявлена у 49 (48,0%), что отражает напряжение локального иммунного микроокружения децидуальной ткани при критических акушерских состояниях. Связь с экстрагенитальной патологией была статистически значимой: $\chi^2 = 48,39$; $df = 30$; $p = 0,018$ (контингентная таблица «тип экстрагенитальной патологии × уровень экспрессии CD56»). При инфекциях и в группе «другие экстрагенитальные заболевания» доля умеренной/выраженной экспрессии достигала 66,7%, тогда как при отсутствии экстрагенитальной патологии - 26,1%, что указывает на сдвиг в сторону активации NK-звена на фоне системного неблагополучия.

Таблица 1.

Экспрессия CD56 в плаценте в зависимости от экстрагенитальной патологии (n = 102)

Экстрагенитальная патология	CD56 0 (−)	CD56 +	CD56 ++	CD56 +++	Итого
Отсутствует	10 (9,5%)	7 (6,7%)	5 (4,8%)	1 (1,0%)	23 (22,5%)
Заболевания печени	0 (0%)	3 (2,9%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Почечная недостаточность	3 (2,9%)	8 (7,6%)	5 (4,8%)	1 (1,0%)	17 (16,7%)
Инфекции (вирусные, бактериальные)	1 (1,0%)	7 (6,7%)	9 (8,6%)	7 (6,7%)	24 (23,5%)
Другие экстрагенитальные заболевания	0 (0%)	7 (6,7%)	11 (10,5%)	3 (2,9%)	21 (20,6%)
Врожденные пороки сердца	1 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Новообразования головного мозга	1 (1,0%)	2 (1,9%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	5 (4,9%)
Системные заболевания	0 (0%)	1 (1,0%)	2 (1,9%)	0 (0%)	3 (2,9%)
В/б	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
+БС	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)
Анафилактический шок	1 (1,0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
Итого	17 (16,7%)	36 (35,3%)	35 (34,3%)	14 (13,7%)	102 (100%)

2) Экспрессия CD68 (макрофаги/клетки Кащенко–Гофбауэра) и воспалительный компонент плаценты. Общая характеристика. В целом (n=102) отрицательная экспрессия CD68 выявлена у 19 (18,6%), слабая - у 30 (29,4%), умеренная - у 33 (32,4%), выраженная - у 20 (19,6%). Следовательно, умеренная/выраженная CD68-экспрессия зарегистрирована у 53 (52,0%), что указывает на высокую распространённость макрофагальной активации как морфологического эквивалента хронического воспаления/виллитоподобных изменений в плацентарной ткани.

Связь CD68 с типом экстрагенитальной патологии также статистически значима: $\chi^2 = 50,23$; $df = 30$; $p = 0,012$. Максимальная доля умеренной/выраженной экспрессии отмечена при инфекциях (75,0%) и в группе «другие экстрагенитальные заболевания» (66,7%), тогда как при отсутствии экстрагенитальной патологии - лишь 17,4%.

Таблица 2.

Экспрессия CD68 в плаценте в зависимости от экстрагенитальной патологии (n = 102)

Экстрагенитальная патология	CD68 0 (−)	CD68 +	CD68 ++	CD68 +++	Итого
Отсутствует	12 (11,4%)	7 (6,7%)	4 (3,8%)	0 (0%)	23 (22,5%)
Заболевания печени	1 (1,0%)	2 (1,9%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Почечная недостаточность	2 (1,9%)	7 (6,7%)	6 (5,7%)	2 (1,9%)	17 (16,7%)
Инфекции (вирусные, бактериальные)	1 (1,0%)	5 (4,8%)	9 (8,6%)	9 (8,6%)	24 (23,5%)
Другие экстрагенитальные заболевания	1 (1,0%)	6 (5,7%)	9 (8,6%)	5 (4,8%)	21 (20,6%)
Врожденные пороки сердца	1 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Новообразования головного мозга	0 (0%)	1 (1,0%)	2 (1,9%)	2 (1,9%)	5 (4,9%)
Системные заболевания	0 (0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	3 (2,9%)
В/б	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
+БС	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)
Анафилактический шок	1 (1,0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
Итого	19 (18,6%)	30 (29,4%)	33 (32,4%)	20 (19,6%)	102 (100%)

3) Экспрессия VEGF и ангиогенный ответ плаценты. Общая характеристика. По группе (n=102) отсутствие экспрессии VEGF отмечено у 16 (15,7%), слабая экспрессия - у 27 (26,5%), умеренная - у 35 (34,3%), выраженная - у 24 (23,5%). Таким образом, умеренная/выраженная VEGF-экспрессия выявлена у 59 (57,8%), что указывает на доминирование ангиогенной активации как компенсаторного ответа на хроническую ишемию/гипоксию и сосудистую дисфункцию плацентарного комплекса.

В отличие от CD56 и CD68, ассоциация VEGF с типом экстрагенитальной патологии при многокатегориальном сравнении не достигла стандартного уровня значимости: $\chi^2 = 40,87$; df = 30; p = 0,089. При этом клинически значимая тенденция сохранялась: при инфекциях доля умеренной/выраженной экспрессии VEGF составляла 79,2%, при почечной недостаточности - 58,8%, в группе «другие экстрагенитальные заболевания» - 71,4%, тогда как при отсутствии экстрагенитальной патологии - 26,1%.

Таблица 3.

Экспрессия VEGF в плаценте в зависимости от экстрагенитальной патологии (n = 102)

Экстрагенитальная патология	VEGF отсутствует	VEGF слабая	VEGF умеренная	VEGF выраженная	Итого
Отсутствует	9 (8,6%)	8 (7,6%)	5 (4,8%)	1 (1,0%)	23 (22,5%)
Заболевания печени	1 (1,0%)	2 (1,9%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Почечная недостаточность	2 (1,9%)	5 (4,8%)	7 (6,7%)	3 (2,9%)	17 (16,7%)
Инфекции (вирусные, бактериальные)	1 (1,0%)	4 (3,8%)	9 (8,6%)	10 (9,5%)	24 (23,5%)
Другие экстрагенитальные заболевания	1 (1,0%)	5 (4,8%)	9 (8,6%)	6 (5,7%)	21 (20,6%)
Врожденные пороки сердца	1 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	3 (2,9%)
Новообразования головного мозга	0 (0%)	1 (1,0%)	2 (1,9%)	2 (1,9%)	5 (4,9%)
Системные заболевания	0 (0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)	3 (2,9%)
В/б	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
+БС	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)	1 (1,0%)
Анафилактический шок	1 (1,0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,0%)
Итого	16 (15,7%)	27 (26,5%)	35 (34,3%)	24 (23,5%)	102 (100%)

Совокупность ИГХ-данных демонстрирует три взаимосвязанных блока патологического ответа плаценты при материнской смертности:

Иммунная активация децидуальной ткани (CD56) - статистически связана с наличием экстрагенитальной патологии (p=0,018) и максимальна при инфекционных и системных состояниях, что указывает на нарушение локальной иммунной толерантности и «стресс-активацию» NK-компонента.

Макрофагальная реакция (CD68) - наиболее выражена и наиболее отчётливо ассоциирована с экстрагенитальной патологией (p=0,012), особенно инфекционной, отражая хронический воспалительный/виллитоподобный компонент и активацию врождённого иммунитета плаценты.

Ангиогенная компенсация (VEGF) - доминирует в общей структуре (умеренная/выраженная экспрессия 57,8%), формируя морфологический эквивалент гипоксически-ишемического стресса; при этом статистическая связь с конкретными типами экстрагенитальной патологии проявляется как

тенденция (p=0,089), что может отражать мультифакторность ангиогенной регуляции в терминальных акушерских сценариях.

Обсуждение. Полученные данные демонстрируют, что при материнской смертности плацента формирует три взаимосвязанных “ответа”: (1) сдвиг децидуального NK-компонента (CD56), (2) макрофагальную активацию (CD68) и (3) усиление ангиогенного сигнала (VEGF), отражающее гипоксически-ишемический стресс. При этом иммунные маркеры (CD56 и CD68) статистически значимо ассоциировались с экстрагенитальной патологией (p=0,018 и p=0,012 соответственно), тогда как VEGF демонстрировал выраженную тенденцию без достижения порога значимости (p=0,089), что требует интерпретации с учётом биологии процесса и структуры выборки.

1) CD56: децидуальные NK-клетки как индикатор “стресса толерантности”

Децидуальные NK-клетки в норме - ключевой регулятор иммунной толерантности, инвазии трофобласта и ремоделирования спиральных артерий; их роль не сводится к “цитотоксичности”, а отражает тонко настроенную систему материнско-плодного интерфейса [3, 6, 10].

В нашей когорте умеренная/выраженная CD56-экспрессия (48,0%) становилась существенно более частой при инфекциях и иных экстрагенитальных заболеваниях (до 66,7%), тогда как при отсутствии экстрагенитальной патологии - лишь 26,1%. Это согласуется с концепцией, что системное воспаление и полиорганная дисфункция “перепрошивают” децидуальный иммунный баланс: NK-компонент может переходить от физиологической регуляции к фенотипу компенсаторной или дисрегуляторной активации, нарушая локальную иммунную устойчивость и сосудисто-трофобластические взаимодействия [6, 10].

Дискуссионный аспект: повышение CD56-позитивности не следует трактовать однозначно как “патологическое усиление”. В ряде моделей dNK-клетки рассматриваются как “буфер” воспаления, способный ограничивать чрезмерный Th17-ответ и поддерживать толерантность [3]. Поэтому в терминальных акушерских сценариях усиление CD56 может отражать как повреждающую, так и “последнюю” компенсаторную попытку стабилизации интерфейса.

2) CD68: макрофагальный контур (клетки Кащенко–Гофбауэра) и воспаление ворсин. Макрофаги плаценты (децидуальные и ворсинчатые - Hofbauer cells) являются центральными клетками врождённого иммунитета, участвующими в антиинфекционной защите, ремоделировании ткани, ангиогенезе и поддержании гомеостаза [2, 7].

В нашем исследовании умеренная/выраженная CD68-экспрессия выявлена в 52,0% случаев и была наиболее отчётливо связана с инфекциями (75,0%) и группой прочих экстрагенитальных заболеваний (66,7%) при резком снижении в группе без экстрагенитальной патологии (17,4%). Такая картина логично укладывается в современные представления о том, что при

хроническом/системном воспалении плацентарные макрофаги способны смещаться от “гомеостатического” фенотипа к проспалительной поляризации, усиливая тканевое повреждение, микрососудистую дисфункцию и риск полиорганных нарушений [7].

Дискуссионный аспект: CD68 - маркер макрофагов “в целом”, но не дифференцирует функциональные фенотипы (M1/M2) и не раскрывает вклад активационных осей (CD163, CD80). Современные работы показывают, что функциональная роль Hofbauer/децидуальных макрофагов зависит от триместра, микроокружения и инфекционной нагрузки [2, 8]. Это означает, что выявленная нами связь CD68 с экстрагенитальной патологией является “верхушкой” сложной регуляторной системы и требует расширенных панелей в последующих исследованиях.

3) VEGF: ангиогенная компенсация и гипоксический стресс (тенденция без строгой значимости)

VEGF - базовый медиатор ангиогенеза и сосудистой стабильности плаценты; при осложнённой беременности его экспрессия может изменяться разнонаправленно в зависимости от срока, тяжести эндотелиальной дисфункции, баланса sFlt-1/PlGF и степени гипоксии [1, 6].

Мы показали, что умеренная/выраженная VEGF-экспрессия доминировала (57,8%) и особенно часто встречалась при инфекциях (79,2%) и при “других” экстрагенитальных состояниях (71,4%), однако в многокатегориальном сравнении ассоциация не достигла значимости ($p=0,089$). Наиболее вероятные причины этого расхождения с “видимой” клинической тенденцией:

Биологическая гетерогенность VEGF: в разных фенотипах плацентарной недостаточности VEGF может повышаться как компенсаторный ответ на гипоксию либо снижаться при выраженной антиангиогенной доминанте. Это неоднократно подчёркивается в обзорах и клинических синтезах [1, 6].

Терминальная стадия процесса (материнская смерть) “сглаживает” различия: на финальном этапе у многих пациентов сходятся механизмы гипоксии, ДВС/микроангиопатии, системного воспаления, и VEGF становится маркером общего стресс-ответа, а не специфической нозологической траектории.

Структура таблицы и малые подгруппы (редкие категории экстрагенитальной патологии) статистически снижают мощность χ^2-теста и повышают вероятность “пограничного” p при сохранении клинически осмысленного тренда.

4) Методологический контекст интерпретации. Важно подчеркнуть, что корректность морфологической трактовки и сопоставимости данных обеспечивается следованием принципам стандартизации плацентарной патологии, сформулированным Amsterdam Placental Workshop Group [5]. В условиях критических акушерских состояний именно унификация подходов к

описанию поражений и к выбору зон исследования минимизирует риск “диагностической вариабельности” и укрепляет доказательность выводов.

Заключение. Иммуногистохимическое исследование плаценты при материнской смертности (n=102) выявило преобладание иммуновоспалительной активации и ангиогенного стресс-ответа: умеренная/выраженная экспрессия составила 48,0% для CD56, 52,0% для CD68 и 57,8% для VEGF. Экспрессия CD56 и CD68 была статистически значимо связана с наличием экстрагенитальной патологии (p=0,018 и p=0,012), что указывает на ключевую роль системного неблагополучия в формировании нарушений иммунного микроокружения плаценты. Для VEGF отмечена выраженная тенденция к усилению при инфекциях и других экстрагенитальных состояниях, однако без достижения значимости (p=0,089), что отражает многофакторность ангиогенной регуляции в терминальных акушерских сценариях.

Использованные источники:

1. Andraweera P.H., et al. Placental expression of VEGF family members in adverse pregnancy outcomes. 2012.
2. Bezemer R.E., et al. Decidual macrophages and Hofbauer cells in fetal growth restriction (review). 2024.
3. Fu B., Li X., Sun R., et al. Natural killer cells promote immune tolerance by regulating inflammatory Th17 cells at the human maternal–fetal interface. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2013.
4. GBD 2017 Maternal Mortality Collaborators. Global, regional, and national levels of maternal mortality, 1990–2017. The Lancet. 2018.
5. Khong T.Y., Mooney E.E., Ariel I., et al. Sampling and Definitions of Placental Lesions: Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 2016.
6. Liu Y., et al. Vascular endothelial growth factor and placental angiogenesis in pregnancy complications. Frontiers in Immunology. 2021.
7. Mercnik M.H., et al. Placental macrophages and inflammatory responses in adverse pregnancy outcomes. Frontiers in Immunology. 2023.
8. Pantazi P., et al. Placental macrophage responses to viral and bacterial… 2022.
9. Say L., Chou D., Gemmill A., et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. The Lancet. 2014.
10. Zhang X., Wei H. Role of Decidual Natural Killer Cells in Human Pregnancy and Related Pregnancy Complications. International Journal of Molecular Sciences. 2021.

Барлыкбаев А.Ж.
студент СТ-30/25
Ташкентский государственный экономический университет
Узбекистан, Ташкент
Нурымбетова А. Г.
студентка СТ-32/25
Ташкентский государственный экономический университет
Узбекистан, Ташкент
Пошаходжаева Г.Д.
доцент
кафедра «Высшей и прикладной математики»
Ташкентский государственный экономический университет

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Аннотация: *В данной научной работе рассматривается понятие системы линейных уравнений и её применение в экономике. Раскрываются основные свойства систем линейных уравнений и их роль при моделировании экономических процессов, таких как распределение ресурсов, анализ спроса и предложения, межотраслевые балансы и планирование производства. Представлены и проанализированы наиболее распространённые методы решения систем линейных уравнений, включая метод Гаусса, метод Крамера и метод обратной матрицы.*

Ключевые слова и словосочетания: *линейное уравнение, система линейных уравнений, основная матрица системы, обратная матрица, метод Крамера, расширенная матрица системы, решение системы, метод Гаусса, треугольная система, базисные неизвестные, свободные неизвестные.*

Barlykbaev A. Z.
student ST-30/25
Tashkent State University of Economics
Uzbekistan, Tashkent
Nurimbetova A.G.
student ST-32/25
Tashkent State University of Economics
Uzbekistan, Tashkent
Poshakhodjaeva G.D.
associate professor
Tashkent State University of Economics
Department of Higher and Applied Mathematics

SYSTEMS OF LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS IN SOLVING ECONOMIC PROBLEMS

Abstract: *This research paper examines the concept of a system of linear equations and its application in economics. It explores the fundamental properties of systems of linear equations and their role in modeling economic processes, such as resource allocation, supply and demand analysis, input-output balances, and production planning. The most common methods for solving systems of linear equations are presented and analyzed, including the Gaussian method, Cramer's method, and the inverse matrix method.*

Key words and phrases: *linear equation, system of linear equations, fundamental matrix of the system, inverse matrix, Cramer's method, augmented matrix of the system, solution of the system, Gauss method, triangular system, basis unknowns, free unknowns.*

Введение: Системы линейных алгебраических уравнений являются одним из ключевых объектов исследования линейной алгебры и представляют собой универсальный математический аппарат для описания широкого круга теоретических и прикладных задач. Они возникают при моделировании процессов в физике, механике, экономике, информатике, а также при анализе сложных инженерных и технических систем

Система линейных алгебраических уравнений

Системой из *m* линейных алгебраических уравнений с *n* неизвестными называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad (1.1)$$

Здесь переменные $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называются неизвестными системы, числа a_{ij}, где $i = 1, 2, \ldots, m$; $j = 1, 2, \ldots, n$, называются коэффициентами системы, а числа $b_1, b_2, \ldots, b_m$ — свободными членами.

Числа $x_1, x_2, \ldots, x_n$, обращающие все уравнения системы в тождества, называются решением системы. Система уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если она не имеет ни одного решения.

Если система линейных алгебраических уравнений имеет хотя бы одно решение, ее называют совместной, если же решений нет – несовместной. Если совместная система линейных алгебраических уравнений имеет ровно одно решение, её именуют определённой, если бесконечное множество решений – неопределённой

Имеется более краткая запись система линейных алгебраических уравнений, она состоит в следующем. Обозначаем через **A** матрицу размера m × n, составленную из коэффициентов при неизвестных:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad (1.2)$$

Она называется матрицей системы. Столбец свободных членов обозначим $B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$. Через $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ а столбец из неизвестных системы — через .

Тогда систему (1.2) можно записать в виде матричного уравнения: AX = B.

Эта запись называется матричной формой записи системы.

В случае, если матрица A квадратная, матричная форма записи позволяет решить систему с использованием обратной матрицы A^{-1}.

Метод обратной матрицы

Теорема. Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), имеющая квадратную невырожденную матрицу, имеет единственное решение, которое находится по формуле: $X=A^{-1}B$.

Доказательство. Рассмотрим систему линейных уравнений в матричном виде AX = B. Умножим обе части этого равенства слева на A^{-1}. Тогда получим $A^{-1}AX=A^{-1}B$. Так как $A^{-1}A=E$, где E — единичная матрица, то получим $EX=A^{-1}B$. Следовательно, $X=A^{-1}B$. Что и требовалось доказать.

Определение. Метод решения системы линейных алгебраических уравнений с использованием формулы $X=A^{-1}B$ называется **методом обратной матрицы.**

Пример. Решить систему уравнений.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases} \qquad (1.3)$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}; \qquad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; \qquad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Тогда в матричной форме данная система имеет вид: AX=B. Найдем определитель Δ. Если Δ=detA≠0 то матрица A – невырожденная, и существует обратная матрица A^{-1}.

Находим матрицу A', транспонированную к A:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Находим алгебраические дополнения элементов матрицы A' и составляем из них присоединенную матрицу Ã, учитывая что

$$A'_{ij} = A_{ji} : \tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Вычисляем обратную матрицу $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \bullet \tilde{A}$:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}.$$ Теперь по формуле

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Метод Крамера

Теорема (Крамера). Пусть система линейных алгебраических уравнений имеет квадратную матрицу коэффициентов A n-го порядка и Δ=detA≠0. Пусть Δ_j — определитель матрицы, полученной из матрицы A заменой j-го столбца столбцом свободных членов. Тогда данная система имеет единственное решение, которое определяется по формулам $x_j=\Delta_j/\Delta$, j=1,2, …,n. Эти формулы называются формулами Крамера.

Снова рассмотрим систему (1.3). Найдем определитель системы Δ = |A|.

$$\Delta = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Если Δ=detA≠0, то по теориями Крамера система имеет единственное решение.

Вычислим определители матриц Δ_1, Δ_2, Δ_3, полученных из матрицы A заменой соответственно первого, второго и третьего столбцов свободных членов:

$$\Delta_1 = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}; \quad \Delta_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{bmatrix}; \quad \Delta_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{bmatrix};$$

Теперь по формулам Крамера

$$x_1 = \frac{\Delta 1}{\Delta}; \qquad x_2 = \frac{\Delta 2}{\Delta}; \qquad x_3 = \frac{\Delta 3}{\Delta}.$$

В конце решения системы, независимо от выбранного метода, рекомендуется выполнить проверку, подставив найденные значения переменных в уравнения системы и убедиться в том, что они обращаются в верные равенства.

Существенным недостатком решения систем из *n* линейных уравнений с *n* переменными по формулам Крамера и с использованием обратной матрицы является их высокая вычислительная трудоёмкость, обусловленная необходимостью вычисления определителей и нахождения обратной матрицы. В связи с этим данные методы имеют преимущественно теоретическое значение и на практике редко применяются для решения реальных экономических задач, которые, как правило, сводятся к системам с большим числом уравнений и переменных.

Метод Гаусса

Метод Гаусса, или метод последовательного исключения переменных – заключается в том, что с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе ступенчатого (или треугольного) вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру) переменных, находится все остальные переменные.

Для исследования систем линейных алгебраических уравнений и нахождения их решений используется метод Гаусса. Исследовать систему — значит определить, является ли она совместной, и в случае совместности установить, сколько решений она имеет.

Снова рассмотрим систему (1.3).

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Будем для определенности считать, что коэффициент $a_{11} \neq 0$. Если это не так, то надлежащим образом изменим нумерацию неизвестных. Преобразуем систему, включая неизвестное x_1 из всех уравнений, кроме первого.

Для этого обе части первого уравнения умножим на число $\frac{a_{21}}{a_{11}}$ и вычтем из соответствующих частей второго уравнения, затем обе части первого уравнения, умноженные на число $\frac{a_{31}}{a_{11}}$, вычтем из соответствующих частей третьего уравнения и т. д.

Предполагая после этого, что $a_{22} \neq 0$, аналогичным способом исключим неизвестное x_2 из всех уравнений, кроме второго, и т.д.

В результате таких преобразований мы или получим совместную ступенчатую систему, эквивалентную системе (1.3), или придем к несовместной ступенчатой системе, в которой одно из уравнений имеет отличный от нуля свободный член, а все коэффициенты левой части равны нулю. В этом случае система (1.3) также является несовместной. Легко увидеть, что таким способом можно любую систему линейных уравнений привести к ступенчатому виду. Следовательно, решение любой системы сводится к решению ступенчатой системы.

Применение систем линейных уравнений в экономике

Применение систем линейных уравнений позволяет упростить сложные экономические ситуации, представить их в формализованном виде и получить количественные результаты, необходимые для принятия обоснованных решений. Именно поэтому изучение данной темы является важным этапом в понимании экономических моделей и механизмов функционирования экономики в целом.

Задача 1. Кондитерская фабрика в течение трех дней производила торты, пирожные и печенье. Известны объемы выпуска продукции за три дня и денежные затраты на производство за эти три дня. Найти себестоимость единицы продукции каждого вида.

День	**Объем выпуска продукции(единиц)**			**Затраты (тыс.усл.ед)**
	торты	пирожные	печенье	
1	5	25	30	120
2	10	15	30	105
3	15	20	20	125

Решение. Расширенная матрица системы имеет вид:

$$\begin{pmatrix} 5 & 20 & 30: & 120 \\ 10 & 15 & 30: & 105 \\ 15 & 20 & 20: & 125 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Так как $a_{11} = 5 \neq 0$, то умножая первую строку матрицы на числа (-2) (-3) и прибавляя полученные строки соответственно ко второй, третьей строкам, исключим переменную x_1 из всех строк, начиная со второй.

$$\begin{pmatrix} 5 & 25 & 30: & 120 \\ 0 & -35 & -30: & -135 \\ 0 & -55 & -70: & -235 \end{pmatrix}$$

Шаг 2. Теперь вторую строку умножаем на (-55/35) и прибавляем полученную строку к третьей строке.

$$\begin{pmatrix} 5 & 25 & 30: & 120 \\ 0 & -35 & -30: & -135 \\ 0 & 0 & -\frac{160}{7}: & -\frac{160}{7} \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x + 25y + 30z = 120 \\ -35y - 30z = -135 \\ -\frac{160}{7}z = -\frac{160}{7} \end{cases}$$

Откуда используем обратный ход метода Гаусса, найдем из третьего уравнения $z = 1$; из второго $y = \frac{135-30z}{35} = \frac{135-30}{35} = 3$; из первого уравнения $x = \frac{120-25y-30z}{5} = \frac{120-75-30}{5} = 3$, т.е. решение системы (3;3;1).

Ответ. Себестоимость одного торта равна 3 тысяч условных единиц, одного пирожного равна 3 тысяч условных единиц, одного печенья равна 1 тысяч условных единиц.

Задача 2. Фабрика изготавливает продукции трех видов: дверь, парта и стульчик, используя сырье трех типов. Известна норма расхода на единицу изделия и объем расхода сырья на одну неделю (указаны в таблице). Найти еженедельной объем выпускаемой продукции каждого вида.

Вид сырья	Норма расхода сырья на ед. изд.			Недельный расход сырья (условных единиц)
	Дверь	Парта	Стульчик	
S_1	1	3	2	327
S_2	0	1	4	227
S_3	2	2	3	391

Пусть x,y,z – еженедельный объем выпуска двери, парты и стульчиков соответственно.

Решение. Составим систему уравнений

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 327 \\ y + 4z = 227 \\ 2x + 2y + 3z = 391 \end{cases}$$

Решим эту систему уравнений методом Крамера:

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix} = 3 + 24 + 0 - 4 - 8 - 0 = 15$$

$$\Delta_x = \begin{bmatrix} 327 & 3 & 2 \\ 227 & 1 & 4 \\ 391 & 2 & 3 \end{bmatrix} = 981 + 4692 + 908 - 782 - 2043 - 2616 = 1140$$

$$\Delta_y = \begin{bmatrix} 1 & 327 & 2 \\ 0 & 227 & 4 \\ 2 & 391 & 3 \end{bmatrix} = 681 + 2616 + 0 - 908 - 0 - 1564 = 825$$

$$\Delta_z = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 327 \\ 0 & 1 & 227 \\ 2 & 2 & 391 \end{bmatrix} = 391 + 1362 + 0 - 654 - 0 - 454 = 645$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{1140}{15} = 76 \qquad y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{825}{15} = 55 \qquad z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{645}{15} = 43$$

Ответ. Еженедельный объем выпускаемых продукции: 76 штук дверей, 55 штук парт и 43 штук стульчиков.

Заключение.

В данной работе были рассмотрены основные методы решения систем линейных алгебраических уравнений: метод обратной матрицы, правило Крамера и метод Гаусса. Каждый из этих методов имеет свои особенности и применяется в зависимости от условий конкретной задачи.

Метод Гаусса является наиболее универсальным и подходит для решения систем любого порядка. Правило Крамера удобно использовать для систем малого размера, а метод обратной матрицы эффективен при условии существования обратимой матрицы. Применение данных методов позволяет корректно и эффективно находить решения систем линейных уравнений.

Использованные источники:

1. Н.Ш. Кремер Высшая математика для экономистов – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 с. – (Серия «золотой фонд российских учебников» **)**
2. Лекции по высшей математике Ташкентского государственного экономического университета: учебно-методические материалы. - Ташкент.
3. И.В. Виленкин, В.М. Гровер, Высшая математика для студентов экономических, технических, естественно-научных специальностей вузов – издание четвертое, исправленное, 2008г. – 416 с.

Белалова Г.А.
доцент
кафедра «Искусственного интеллекта»
Ташкентский государственный экономический университет
Ташкент, Узбекистан

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Аннотация*: Данная работа посвящена анализу технологии блокчейн как многоуровневого инструмента для оцифровки и надежного расчета активов в корпоративном управлении. В статье рассматривается интеграция блокчейна с умными контрактами и устройствами интернета вещей для автоматизации транзакций и повышения их прозрачности. Особое внимание уделяется методам обеспечения безопасности данных через системы DLP.*

Ключевые слова*: блокчейн, интернет вещей (IoT), цифровизация, смарт-контракт, цифровая платежная система, интеллектуализация, система DLP, модель интеграции.*

Belalova G.A.
associate professor
Department of Artificial Intelligence
Tashkent State University of Economics
Tashkent, Uzbekistan

PROSPECTS FOR USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO IMPROVE FINANCIAL TRANSACTIONS

Abstract*: This paper analyzes blockchain technology as a multi-layered tool for digitizing and reliably calculating assets in corporate management. The article examines the integration of blockchain with smart contracts and Internet of Things devices to automate transactions and increase their transparency. Particular attention is paid to methods for ensuring data security through DLP systems.*

Keywords*: blockchain, Internet of Things (IoT), digitalization, smart contract, digital payment system, intellectualization, DLP system, integration model.*

Введение

Блокчейн представляет собой распределённую хронологическую базу данных, формируемую в виде последовательной цепочки взаимосвязанных блоков, которая непрерывно расширяется по мере регистрации новых транзакций. Ключевая особенность данной технологии заключается в

возможности обеспечения достоверного учёта операций без привлечения традиционных финансовых посредников, таких как банки и страховые организации, за счёт использования механизмов криптографической защиты и алгоритмического доверия.

По данным аналитиков MarketsandMarkets [38] глобальный рынок блокчейн-технологий оценивается примерно в 32,99 млрд долларов в 2025 году с прогнозом роста до более 393 млрд долларов к 2030 году, что отражает быстрый среднегодовой темп роста (CAGR) около 64,2 % за период 2025–2030 гг.

Другие прогнозы рынка указывают, что к 2030 году общая стоимость блокчейн-рынка может достигать от примерно 300 до 400 млрд долларов, что подтверждает устойчивый интерес со стороны предприятий и инвесторов по всему миру[39].

Отдельно сегмент финансовых приложений блокчейна оценивается в около 29,5 млрд долларов в 2025 году, с ростом почти до 78,6 млрд долларов к 2034 году, отражая перспективы применения технологии в банковской и платежной сферах.

Современные тенденции свидетельствуют о динамичном развитии глобального рынка блокчейн-технологий, что отражает растущий интерес со стороны финансового и корпоративного секторов. Активное внедрение блокчейна сопровождается необходимостью формирования адаптивной нормативно-правовой базы, что находит отражение в государственных программах цифрового развития, включая стратегические инициативы, направленные на цифровую трансформацию экономики.

С точки зрения управления корпоративными финансами блокчейн следует рассматривать как многоуровневую информационную технологию, обеспечивающую надёжный расчёт и учёт активов в распределённой среде. Использование данной технологии позволяет формировать защищённую цепочку данных, устойчивую к несанкционированным изменениям, при этом каждая новая запись логически связана с предыдущими, что повышает прозрачность и контроль финансовых потоков.

Расширение сферы применения блокчейна подтверждается ростом инвестиций и вовлечённостью бизнеса. Значительная доля компаний уже перешла от этапа теоретического изучения технологии к практическому внедрению, включая крупные финансовые институты. Особенно активно блокчейн используется в банковском секторе, где он рассматривается как инструмент повышения эффективности расчётных операций, снижения операционных рисков и оптимизации транзакционных издержек.

Таким образом, можно сделать вывод, что блокчейн-технология постепенно трансформируется из экспериментального решения в важный

[38] https://www.prnewswire.com/news-releases/blockchain-market
[39] https://coinlaw.io/blockchain-statistics

элемент современной финансовой инфраструктуры, обладающий значительным потенциалом для дальнейшего развития и масштабирования.

Исследование основано на анализе алгоритмов обработки транзакций и моделей интеграции цифровых инструментов в блокчейн-инфраструктуру. В частности, рассматривается использование смарт-контрактов, в которых программный код обеспечивает автоматическое исполнение условий договоров без участия посредников. Дополнительно анализируется интеграция блокчейна с технологиями Интернета вещей (IoT), предусматривающая автоматизированный сбор данных с датчиков, POS-терминалов и интеллектуальных счётчиков с последующей их передачей в распределённый реестр. Для обмена информацией между устройствами используется упрощённый сетевой протокол, реализующий модель взаимодействия по принципу «издатель – подписчик», что позволяет повысить оперативность и надёжность передачи данных.

Эффективное внедрение блокчейн-технологий невозможно без формирования адекватной правовой и институциональной среды, ориентированной на поддержку инноваций и экспериментальных подходов. Результаты исследований BMTTD свидетельствуют о том, что применение блокчейна в государственных и финансовых системах требует комплексного регулирования, охватывающего вопросы обращения криптоактивов, правового признания смарт-контрактов, цифровой идентификации, защиты персональных данных, а также обеспечения конфиденциальности и целостности информации. В Республике Узбекистан первые шаги в этом направлении уже предпринимаются, что отражено в стратегических документах цифрового развития, включая программу «Цифровой Узбекистан – 2030».

Внедрение блокчейн-решений предполагает гибкий подход, сочетающий соблюдение действующих нормативных требований с активной научно-исследовательской деятельностью, направленной на адаптацию законодательства к быстро меняющимся цифровым технологиям. Такой баланс позволяет снизить регуляторные риски и одновременно стимулировать инновационное развитие.

Практика применения блокчейна и смарт-контрактов демонстрирует их высокую эффективность в процессах, требующих прозрачности, точности и доказуемости операций. Автоматическое исполнение заложенных алгоритмов обеспечивает доверие между участниками взаимодействия и минимизирует влияние человеческого фактора, исключая возможность субъективного вмешательства или манипуляций со стороны третьих лиц.

Т.е. блокчейн выступает не только как технологическая основа для цифровых платежей, но и как инструмент трансформации существующих моделей доверия, позволяющий хозяйствующим субъектам отказаться от централизованных посреднических структур в пользу децентрализованных и формально закреплённых механизмов взаимодействия

Исследования зарубежных и отечественных ученых показывают, что интеграция технологии блокчейн с устройствами Интернета вещей позволяет обеспечить прозрачное, отказоустойчивое и неизменяемое отслеживание данных за счёт распределённого хранения информации и криптографической защиты записей. Так в работе Гулямова С. С., Юлдашева А. А. «Интеграция технологии блокчейн и Интернета вещей: перспективы и ограничения» находит подтверждение оптимизация бизнес-процессов за счет интеграции IoT и блокчейна [40], неизменяемость данных и повышение прозрачности и доверия.

Авторы Беляев А. В. и Зарубина Ю. В. в своем исследовании «Применение технологии блокчейн для обеспечения доверия и прозрачности данных в распределённых системах» также подтверждают прозрачность данной технологии и приводят преимущества использования, такие как отказ от посредников и отслеживаемость транзакций[41].

Практика применения цифровых платёжных систем демонстрирует возможность реструктуризации цепочек поставок на основе технологии блокчейн, что сопровождается сокращением сроков проведения расчётов и повышением прозрачности финансовых потоков. В данном контексте блокчейн выступает как эффективная технологическая основа для осуществления онлайн-транзакций, обеспечивая высокий уровень безопасности данных и минимизируя риски, характерные для традиционных цифровых платёжных решений.

Вместе с тем следует отметить, что базовая архитектура блокчейна не предусматривает наличие встроенных механизмов автоматизированной обработки данных в распределённой среде. Решение данной задачи возможно за счёт интеграции смарт-контрактов, которые позволяют формализовать и автоматизировать выполнение условий транзакций без участия третьих лиц, тем самым расширяя функциональные возможности блокчейн-платформ.

Потенциал применения блокчейн-технологий не ограничивается сферой цифровых платежей. Отрасли экономики, в которых финансовые расчёты не являются ключевым элементом бизнес-процессов, также могут получить значительные преимущества за счёт использования свойств блокчейн-моделей, включая разнообразие типов распределённых реестров (публичные, частные, разрешённые), гибкость механизмов контроля доступа, обеспечение аутентичности данных, управление цифровой идентичностью, регулируемую прозрачность и высокий уровень информационной безопасности.

Изначальная концепция блокчейна была ориентирована на формирование надёжной инфраструктуры онлайн-транзакций, основанной на принципах децентрализации и криптографической защиты данных. В совокупности эти характеристики создают устойчивую технологическую базу

[40] Гулямов С. С., Юлдашев А. А. Интеграция технологии блокчейн и Интернета вещей: перспективы и ограничения // Информационные технологии. – 2021. – № 9. – С. 22–29.
[41] Беляев А. В., Зарубина Ю. В. Применение технологии блокчейн для обеспечения доверия и прозрачности данных в распределённых системах // Вестник современных исследований. – 2022. – № 4. – С. 45–50

для поддержки распределённых систем, обеспечивая доверие между участниками взаимодействия и прозрачность операций.

Смарт-контракты, по своей сути, аналогичны традиционным договорным соглашениям, поскольку определяют совокупность условий и обязательств сторон. Отличительной особенностью смарт-контрактов является их реализация в виде программного кода, в рамках которого правила и условия соглашения формализуются и автоматически исполняются в соответствии с заранее согласованной логикой, что исключает субъективное вмешательство и снижает транзакционные издержки. На рисунке 1 приведено писание алгоритма разработки смарт-контракта. Данная блок-схема демонстрирует этапы разработки смарт-контракта логические развилки процесса. Алгоритм начинается с инициализации разработки, после чего выполняется логическая проверка необходимости токенизации активов. В случае положительного решения осуществляется разработка стандарта токена (ERC-20, ERC-721 и др.), при отрицательном — производится непосредственная реализация кода смарт-контракта с использованием специализированных языков программирования (Solidity, Vyper и др.).

Далее обе ветви алгоритма объединяются на этапе тестирования, включающего модульные, интеграционные тесты и фаззинг. По результатам тестирования выполняется проверка наличия ошибок: при их обнаружении осуществляется возврат к этапу написания кода для корректировки, при отсутствии — инициируется аудит безопасности смарт-контракта (при необходимости).




Рис.1.Алгоритм разработки смарт-контракта[42]

После проведения аудита выполняется контрольная проверка его успешного прохождения. В случае положительного результата смарт-контракт развертывается в блокчейн-сети, после чего осуществляется мониторинг его функционирования и техническая поддержка в процессе эксплуатации. Алгоритм завершается достижением финального состояния, обозначающего завершение цикла разработки.

Данная последовательность обеспечивает корректность автоматического исполнения договорных обязательств, прозрачность транзакций и снижение операционных рисков.

[42]Разработано автором на основании изучения специальной литературы

Таким образом, основная цель смарт-контракта заключается в том, чтобы поместить положения контракта в комбинацию аппаратного и программного обеспечения, чтобы их было труднее нарушить, а стоимость взлома контракта увеличилась бы так, что в конечном итоге повышает безопасность контрактов и снижает вероятность атаки.

Интеллектуальный контракт в сочетании с интеграцией блокчейна и устройств IoT оказался интеллектуальным, безопасным и надежным способом отслеживания и анализа процессов и транзакций. Без этих технологий нет хорошо зарекомендовавшего себя инструмента для систем мониторинга в текущем управлении, но он вносит значительный вклад в развитие процесса с контролем качества и надежной безопасностью. Умные контракты открыли дверь для развития со всеми необходимыми инструментами цифровой поддержки, направленными на автоматизацию процесса отслеживания и создание надежного твердого контракта между участниками. Одним из основных недостатков традиционного управления процессами и мониторинга является то, что данными можно манипулировать на любом этапе это приводит к потере доверия к строгому соблюдению бизнес-правил. Чтобы защитить данные в блокчейне, первое, что вам нужно сделать, это собрать их. Устройства IoT оказались отличной технологией для мониторинга и сбора данных с низким энергопотреблением и минимальными затратами.

Важно использовать интеллектуальные технологии на основе интернета вещей для удобного механизма потоковой передачи необходимых данных по всей системе. Устройства IoT используются для мониторинга качества и состояния продуктов, хранящихся на крупных складах. Кроме того, технология IoT отслеживает и предоставляет информацию о ценах на продукты и услуги в разные периоды времени. Блокчейн используется для безопасного хранения этих отслеживаемых данных, в то время как смарт-контракт используется для автоматизации процесса, запуска событий и обеспечения выполнения условий контракта для всех сторон в течение определенного периода времени.

Склады, магазины, производители, дистрибьюторы, оптовые и розничные торговцы являются основными участниками системы. В самом начале управленческий персонал размещает контракт в сети блокчейна. На следующем шаге запускается механизм подписки и реализуется по цепочке хранения и распространения контракта. Это позволяет устройствам IoT подключаться к серверу. На более поздних этапах, данные собираются с устройств Интернета вещей и хранятся на сервере MQTT. Однако некоторые сложные данные хранятся в блокчейне. Периодические проверки, безопасность, мониторинг и обеспечение качества выполняются смарт-контрактами. Участники системы перемещаются, подключенные к облачному хранилищу телеметрии очереди сообщений (MQTT). Стандартное HTTP-соединение требует, чтобы вы устанавливали соединение каждый раз, когда сервер отправляет запрос, но MQTT этого не требует. Однако некоторые сложные данные хранятся в блокчейне. Периодические проверки,

безопасность, мониторинг и обеспечение качества выполняются смарт-контрактом.

Возможность обеспечения прозрачности финансовой системы, а также ограничения человеческого фактора в этом процессе является одним из положительных аспектов процесса оцифровки. Прозрачность финансовой базы данных, собранной и проанализированной в ходе работы этой технологии, гарантирует, что они доступны для просмотра любому участнику цепочки.

Однако стоит отметить, что внедрение этой технологии в закрытую систему увеличивает зависимость технологии от электроэнергии. Обеспечение безопасности, собранной в больших объемах информации является одной из широкомасштабных проблем, а в современном корпоративном управлении база данных является гарантом обеспечения устойчивости корпоративного управления, повышения его конкурентоспособности, внедрения в свою деятельность технологических ноу-хау.

В мировой практике системы DLP (Data Leak Prevention) приводятся как эффективный способ обеспечения безопасности накопленной информации в больших объемах. Технология DLP - это современная технология защиты конфиденциальной информации в информационной системе от несанкционированной утечки с помощью программных или программно-аппаратных средств. Контроль и управление жизненным циклом конфиденциальной информации, хранящейся на серверах, рабочих станциях и базах данных с помощью системы DLP, обеспечение анализа-контроля базы данных, исходящей из сетей и требующей защиты, копирование конфиденциальной информации на внешние носители информации, печать конфиденциальной информации, контроль таких задач, как хранение информации, мониторинг информации, хранящейся на внешних носителях, мониторинг конфиденциальной информации, хранящейся на внешних носителях, мониторинг информации, хранящейся можно будет реализовать такие вещи, как обеспечение эффективного проведения политики.

Заключение

Внедрение блокчейна и смарт-контрактов позволит финансовым учреждениям значительно повысить экономическую эффективность и получать существенный ежегодный эффект за счёт оптимизации процессов и снижения издержек. Данная технология минимизирует влияние человеческого фактора, обеспечивая неизменяемость данных, а также повышая уровень прозрачности и безопасности процессов.

Несмотря на высокие перспективы, внедрение блокчейна сопряжено с рядом проблем, таких как высокая зависимость от электроэнергии и необходимость защиты больших объемов информации. Для минимизации рисков утечки конфиденциальных данных предлагается использование систем DLP. Эти системы позволяют контролировать жизненный цикл информации на серверах, мониторить передачу данных через почту, мессенджеры и

облачные хранилища, обеспечивая устойчивость корпоративного управления. Таким образом, блокчейн в сочетании с современными средствами защиты данных является фундаментом для построения надежной цифровой финансовой системы.

Использованные источники:

1. Гулямов С. С., Юлдашев А. А. Интеграция технологии блокчейн и Интернета вещей: перспективы и ограничения // Информационные технологии. – 2021. – № 9. – С. 22–29.
2. Камалов Ш., Омонов С. Готовность банков Узбекистана к внедрению Open Banking: сравнительный анализ цифровых стратегий// Moliya, pul va kredit ilmiy elektron jurnali. Vol. 5 (2025-06-13)
3. Беляев А. В., Зарубина Ю. В. Применение технологии блокчейн для обеспечения доверия и прозрачности данных в распределённых системах // Вестник современных исследований. – 2022. – № 4. – С. 45–50
4. Qayumov S.A. Blokcheyn texnologiyasi raqamli iqtisodiyotga o‘tish omili: foydalanish imkoniyatlari va mulohazalar // “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4, avgust, 2019-yil.
5. Ю. В. Зарубина, А. В. Беляев. Перспективы использования технологии «блокчейн» // Современные технологии и научно-технический прогресс. – 2024. – № 1. – С. 339–340.
6. Белалова Г.А., Дилмуродов Ж.У. Влияние блокчейна на финансовые услуги // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). 2024. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-blokcheyna-na-finansovye-uslugi (дата обращения: 12.02.2026).
7. Тошпулатов Ж.А., Белалова Г.А. (2024). Применение цифровых технологий на этапе перехода к зеленой экономике в Узбекистане. Образование наука и инновационные идеи в мире, 51(2), 38–40. Retrieved from https://newjournal.org/01/article/view/15987
8. Hashimzai I. A., Ahmadzai M. Z. Navigating the Integration of Blockchain Technology in Banking: Opportunities and Challenges // International Journal Software Engineering and Computer Science. – 2024. – Vol. 4, No. 2. – P. 665–679. – DOI:10.35870/ijsecs. v4i2.2656.
9. Karadag B., Akhan A. Z., Akbulut. Blockchain in Finance: A Systematic Literature Review // Journal of Business Economics and Finance. – 2024. – Vol. 13, No. 2. – P. 113–129.
10. Eyadat A. A., Alamaren A. S., Almomani S. L. The Influence Of Blockchain Technology On Reducing Cybersecurity Risks In Financial Transactions Of Commercial Banks // Frontiers in Blockchain. – 2025. – Vol. 8:1657110. – DOI:10.3389/fbloc.2025.1657110.
11. Kukman T., Gricar S. Blockchain for Quality: Advancing Security, Efficiency, and Transparency in Financial Systems // FinTech2025. – 2025. – Vol. 4, No. 1, Art. 7. – DOI:10.3390/fintech4010007.

12. Zhou L. Blockchain in Finance: Enhancing Transparency and Security in Cross-Border Transactions // Journal of Applied Economic and Policy Studies. – 2025. – DOI:10.54254/2977-5701/2025.21075.
13. The Impact of Blockchain On The Banking Sector: A Systematic Review of Applications, Challenges, And Future Directions // Agile Business Global. – 2025. – Article 100133.
14. Belalova G.A. Baxodirov J. Integration Technologies And Their Problematic Aspects In Information Systems. (2025). Web of Technology: Multidimensional Research Journal, 3(6), 70-78.
https://webofjournals.com/index.php/4/article/view/4733

Бердиев А.Х., кандидат экономических наук
профессор
Проректор по научной работе и инновациям
Университет информационных технологий и менеджмента
Республика Узбекистан

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ АГРОКЛАСТЕРАХ, ИХ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. *В статье с научной точки зрения проанализированы производственные затраты в хлопково-текстильных агрокластерах, их структурные изменения и экономическая эффективность. Кроме того, рассмотрена динамика затрат на выращивание хлопка, оплату труда, минеральные удобрения, топливно-смазочные материалы и другие составляющие расходов. Результаты анализа позволяют выявить возможности эффективного использования производственных ресурсов, оптимизации затрат, а также повышения экономической эффективности производства хлопка. Также научно обоснованы перспективы устойчивого развития и усиления конкурентоспособности агрокластеров за счёт внедрения механизации и энергосберегающих технологий.*

Ключевые слова: *хлопково-текстильные агрокластеры, производственные затраты, структурные изменения, экономический анализ, урожайность, трудовые ресурсы, механизация, топливно-смазочные материалы, эффективное использование ресурсов, экономическая эффективность.*

Berdiyev A.X. PhD in Economics
professor
Vice-Rector for Research and Innovation
University of Information Technology and Management
Republic of Uzbekistan

PRODUCTION COSTS IN COTTON-TEXTILE AGROCLUSTERS, THEIR STRUCTURAL CHANGES, AND ECONOMIC ANALYSIS

Abstract. *This article provides a scientific analysis of production costs in cotton-textile agro-clusters, their structural changes, and economic efficiency. In addition, the dynamics of expenditures on cotton cultivation, labor costs, mineral fertilizers, fuel and lubricants, and other cost components are examined. The results of the analysis allow for identifying opportunities for efficient use of production resources, cost optimization, and improvement of the economic efficiency of cotton production. Furthermore, the study scientifically substantiates the prospects for*

sustainable development and increasing the competitiveness of agro-clusters through the implementation of mechanization and energy-saving technologies.

Keywords: *cotton-textile agro-clusters, production costs, structural changes, economic analysis, yield, labor resources, mechanization, fuel and lubricants, efficient use of resources, economic efficiency.*

Введение. В мировой экономике агропромышленные кластеры выступают в качестве важного институционального механизма, обеспечивающего глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, расширение цепочки создания добавленной стоимости и производство конкурентоспособной готовой продукции. Особое значение в этом процессе приобретают хлопково-текстильные агрокластеры, ориентированные на интегрированное развитие хлопководства и текстильной отрасли, которые играют решающую роль в повышении эффективности производства, рациональном использовании ресурсов и укреплении экспортного потенциала.

В Республике Узбекистан в целях структурной модернизации сельского хозяйства, формирования единой технологической цепочки от выращивания хлопкового сырья до производства готовой текстильной продукции внедрена система хлопково-текстильных агрокластеров. В рамках данной системы формирование производственных затрат, их структурное построение и динамика выступают одним из ключевых факторов, определяющих экономическую эффективность.

В структуре производственных затрат доля оплаты труда, топливно-смазочных материалов, минеральных удобрений, семенного материала, водообеспечения, амортизации основных средств, а также прочих производственных и управленческих расходов в разрезе лет претерпевает существенные изменения. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость проведения углублённого экономического анализа структурных изменений затрат в хлопково-текстильных агрокластерах, определения их влияния на результаты производства и разработки научно обоснованных выводов по оптимизации затрат.

С учётом изложенного, настоящее исследование направлено на комплексный анализ формирования производственных затрат в хлопково-текстильных агрокластерах, их структурных изменений и влияния на экономическую эффективность. Полученные результаты имеют практическую значимость для принятия управленческих решений в отрасли, сокращения производственных затрат и обеспечения устойчивого развития деятельности агрокластеров.

Анализ литературы. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в Послании Олий Мажлису от 24 января 2020 года, «для достижения прогресса нам необходимо и крайне важно овладеть цифровыми знаниями и современными информационными технологиями. Это даёт нам

возможность идти по самому короткому пути к развитию. Ведь сегодня в мире информационные технологии глубоко проникают во все сферы.

Цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, но и сокращают избыточные расходы. Вместе с тем самым тяжёлым пороком, который меня серьёзно тревожит и беспокоит, -коррупцией -они также являются эффективным средством борьбы. Мы все должны глубоко осознать это»[43].

Однако вследствие отсутствия полностью сформированной комплексной теории, раскрывающей экономическую сущность агрокластеров, принципы их организации и развития, условия, этапы и эффективность функционирования, в научной литературе сформировались различные подходы к данной проблематике. В связи с этим представляется целесообразным изучение теоретических взглядов, непосредственно связанных с агрокластерами.

На формирование и функционирование кластерных систем оказывает влияние широкий спектр экономических и технологических процессов. Экономические процессы внутри кластеров охватывают производственные отрасли, выход на рынки, предпринимательскую деятельность и внешние эффекты кластера, тогда как технологические процессы включают сотрудничество в сфере исследований и разработок, инновационные экосистемы, трансфер технологий и цифровизацию. Понимание данных процессов и их взаимного воздействия имеет ключевое значение для разработки эффективных стратегий использования потенциала кластерно-ориентированного развития.

Понятие кластера носит многоаспектный характер и по-разному применяется в различных отраслях. Учёные Западной Европы и США внесли значительный вклад в понимание и развитие эффективных экономических и технологических процессов в кластерных системах. Их исследования формируют представление о динамике кластеров, значении инноваций, а также о роли кластеров в региональном и национальном экономическом развитии.

Л. Берг и другие исследователи, анализируя динамику кластеров в девяти городских регионах Европы, подчёркивали, что функционирование кластеров в значительной степени зависит от их специфических условий и общего пространственно-экономического контекста[44]. Данное исследование подчёркивает важность интегрального подхода к пониманию динамики кластеров в процессе стимулирования экономического роста.

Р. Мартин и П. Санли, подвергнув критическому анализу кластерную теорию Майкла Портера, отметили необходимость более осторожного применения кластерной концепции при разработке экономической политики в

[43] Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года. // «Халқ сўзи», 25 января 2020 г.

[44] Berg, L., Braun, E., & Winden, W. (2001). Growth Clusters in European Cities: An Integral Approach. Urban Studies, 38, 185 - 205. https://doi.org/10.1080/00420980124001.

силу наличия различных теоретических и эмпирических проблем[45]. Их работа требует глубокого понимания как преимуществ, так и проблем кластеров.

П. Браунерхьельм и М. Фелдман, изучая происхождение и формирование технологически ориентированных промышленных кластеров, подчеркнули роль предпринимательской деятельности и институциональной поддержки в процессе формирования кластеров[46]. Данное исследование подчёркивает значимость процессов возникновения кластеров, а также важность политики стимулирования их формирования.

Н. Трушкина и В. Шипоша проанализировали эффективность кластерных структур в обеспечении развития национальных экономик европейских стран и трансформации инновационных экосистем. Авторы подчеркнули, что кластеры выступают ключевым элементом региональной политики, способствующим сбалансированному и устойчивому развитию на основе местных условий и конкурентных преимуществ[47].

По мнению С. Лина и соавторов, при изучении факторов, воздействующих на промышленный кластер, была применена методология системной динамики, что позволило подчеркнуть значимость потоков рабочей силы, технологий, финансовых ресурсов и рынков при определении конкурентоспособности и инновационного потенциала кластеров. Данный подход способствует пониманию сложных взаимосвязей, влияющих на развитие промышленных кластеров[48].

В Узбекистане с 2017 года кластеры начали формироваться в различных отраслях экономики как «средство расширения межотраслевой кооперации, модернизации и диверсификации экономики, а также повышения производственно-экспортного потенциала слаборазвитых регионов».[49] При этом «территориальные агропромышленные кластеры являются важным фактором в достижении таких целей, как эффективное использование земельно-водных ресурсов в стране, развитие кооперации между сельским хозяйством и промышленностью, а также обеспечение сбалансированного развития регионов»[50]. В 2022–2026 годах за счёт развития хлопково-текстильных кластеров в Узбекистане планируется «увеличить объём отраслевой продукции в 2 раза»[51], в том числе в Бухарской области «довести уровень переработки хлопкового волокна и пряжи до 100 процентов и

[45] Martin, R., & Sunley, P. (2003). Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? Journal of Economic Geography, 3, 5-35. https://doi.org/10.1093/JEG/3.1.5.
[46]Braunerhjelm, P., & Feldman, M. (2008). Cluster genesis: technology-based industrial development. Economic Geography, 84, 245-246. https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199207183.001.0001.
[47] Trushkina, N., & Shiposha, V. (2021). Clustering of the national economy as an effective tool for the sustainable development of european countries. Three Seas Economic Journal. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-11.
[48] Lin, C., Tung, C., & Huang, C. (2006). Elucidating the industrial cluster effect from a system dynamics perspective. Technovation, 26, 473-482. https://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2004.11.008.
[49] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-iyuldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. https://lex.uz/mobileact/3107036
[50] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. https://lex.uz/docs/5841063
[51] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. https://lex.uz/docs/5841063

увеличить объём экспорта в 4 раза» [52]. Исходя из этого, ускоренное развитие хлопково-текстильной отрасли в регионах посредством кластеров, а также совершенствование механизмов организации производства на кластерной основе стали одними из наиболее актуальных задач.

Методология исследования. В исследовании при анализе производственных затрат и их структурных изменений в хлопково-текстильных агрокластерах на основе системного и комплексного подходов с использованием статистических и сравнительных методов анализа была проведена оценка структуры статей затрат, их динамики и экономической эффективности. В ходе исследования применялись методы индукции и дедукции, научной абстракции, а также логического анализа. Информационной базой послужили официальные статистические данные, отчётные материалы агрокластеров и научные источники.

Анализ и результаты. В сельском хозяйстве правильный расчёт и анализ производственных затрат имеют решающее значение для снижения себестоимости продукции, эффективного использования ресурсов и повышения общей экономической эффективности. С этой точки зрения анализ затрат на выращивание хлопка и их структурных изменений за 2022–2024 годы на примере одного из крупнейших хлопково-текстильных агрокластеров Кашкадарьинской области -ООО «Косон Бахт текстил» - имеет важное научно-практическое значение.

В анализируемый период площадь посевов хлопчатника, находившаяся в распоряжении кластера, увеличилась с 14195 гектаров в 2022 году до 14349 гектаров в 2024 году, что составило прирост на 154 гектара. Наряду с расширением земельных площадей наблюдалась положительная динамика показателя урожайности, который вырос с 27,0 ц/га до 30,0 ц/га. В результате валовой сбор увеличился с 38124 тонн до 43120 тонн, то есть рост составил 4996 тонн. Это свидетельствует об эффективной реализации агротехнических мероприятий и увеличении производственного потенциала.

Если в 2022 году совокупные затраты на выращивание хлопка составляли 168997 млн. сумов, то к 2024 году данный показатель достиг 214330 млн. сумов. В результате общий объём затрат увеличился на 45333 млн. сумов. Затраты в расчёте на один гектар посевной площади также возросли с 11,90 млн. сумов до 15,0 млн. сумов, то есть на 3,03 млн. сумов. Данная тенденция объясняется ростом стоимости производственных ресурсов, увеличением расходов на оплату труда и топливно-смазочные материалы.

Расходы на оплату труда и соответствующие отчисления занимают наибольшую долю в структуре затрат на выращивание хлопка. В 2022 году они составляли 65 401,8 млн. сумов, а в 2024 году достигли 90 875,9 млн. сумов. Таким образом, расходы на оплату труда увеличились на 25 474,0 млн сумов, а их доля в общем объёме затрат возросла с 38,7 % до 42,4 %.

[52] O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-apreldagi 215-son “2022-2026 yillarda Buxoro viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. https://lex.uz/docs/5988275

Особого внимания заслуживает резкий рост расходов на оплату труда за ручной сбор хлопка. Данные затраты увеличились с 37279,0 млн сумов до 59069,3 млн. сумов, что свидетельствует о сохраняющемся спросе на трудовые ресурсы и высокой доле ручного труда в процессе производства.

Расходы на минеральные удобрения в 2022 году составляли 18589,6 млн. сумов, а в 2024 году достигли 21861,6 млн. сумов. Несмотря на снижение их доли в общей структуре затрат с 11,0 % до 10,2 %, в абсолютном выражении наблюдался рост. В частности, увеличение расходов на фосфорные и калийные удобрения свидетельствует об усилении агротехнических мероприятий, направленных на повышение плодородия почв.

Расходы на защиту растений и дефолианты также увеличились с 5407,9 млн. сумов до 6858,5 млн. сумов, что указывает на применение интенсивных технологий возделывания. В то же время резкое сокращение затрат на проведение агрохимкартографических работ (с 507,9 млн. сумов до 214,3 млн. сумов) может быть объяснено оптимизацией данных услуг либо использованием информации, накопленной в предыдущие годы.

Расходы на услуги механизации увеличились с 35658,3 млн. сумов до 41151,3 млн. сумов, однако их доля в общей структуре затрат снизилась с 21,1 % до 19,2 %. Это свидетельствует о том, что, несмотря на рост уровня механизации, темпы увеличения других видов затрат оказались более высокими.

Расходы на топливно-смазочные материалы (ТСМ) характеризуются наибольшими темпами роста, увеличившись с 14702,7 млн. сумов до 26791,2 млн. сумов. Повышение их доли в общей структуре затрат с 8,7 % до 12,5 % свидетельствует о существенном росте цен на энергетические ресурсы.

Анализ производственных затрат и их калькуляции в хлопково-текстильном кластере ООО «Косон Бахт текстил» Кашкадарьинской области

№	Показатели	Единица измерения	В 2022 году			В 2024 году			Изменение в 2024 году по сравнению с 2022 годом, (+;–)	
			Совокупные затраты, млн. сумов	Затраты на 1 гектар, млн. сумов	Доля в общих затратах	Совокупные затраты, млн. сумов	Затраты на 1 гектар, млн. сумов	Доля в общих затратах	Совокупные затраты, млн. сумов	Затраты на 1 гектар, млн. сумов
1	Посевная площадь хлопка	га	14195			14349			154	
2	Урожайность	ц/га	27			30			3	
3	Валовой сбор	тонна	38124			43120			4996	
4	Совокупные затраты		168997	11,90	100%	214330	15	100%	45333	3,03
а)	в том числе: Оплата труда с отчислениями (за работы, выполняемые вручную)	млн сумов	65401,8	4,6	38,7	90875,9	6,33	42,4	1,73	25474,0
	в том числе за ручной сбор хлопка	млн сумов	37279,0	2,62		59069,3	3,60		21 790,3	0,98
б)	Минеральные удобрения	млн сумов	18589,6	1,3	11	21861,6	1,53	10,2	0,23	3271,9
	азотные	млн сумов	13570,4	0,94		13991,4	0,97		421,0	0,03
	фосфорные	млн сумов	4554,4	0,31		6667,8	0,46		2113,3	0,15
	калийные	млн сумов	464,74	0,05		1202,3	0,1		737,65	0,05
в)	Расходы на защиту растений и дефолианты	млн сумов	5407,9	0,14	3,2	6858,5	0,16	3,2	0,02	1450,6
д)	Работы по агрохимической картограмме (анализ почвы)	млн сумов	507,9	0,03	0,3	214,3	0,01	0,1	-0,02	-293,6
е)	Стоимость семенного материала	млн сумов	7266,8	0,51	4,3	6858,5	0,48	3,2	-0,03	-408,3
ё)	Услуги механизации (без дизельного топлива)	млн сумов	35658,3	2,51	21,1	41151,3	2,88	19,2	0,37	5493,0
ж)	Стоимость топливно-смазочных материалов	млн сумов	14702,7	1,03	8,7	26791,2	1,87	12,5	0,84	12088,5
з)	Платежи за услуги АПВ (Ассоциация потребителей воды)	млн сумов	1182,9	0,08	0,7	1714,6	0,12	0,8	0,04	531,6
и)	Расходы на электроэнергию	млн сумов	675,9	0,04	0,4	642,9	0,04	0,3	0	-32,9
к)	Платёж по единому земельному налогу	млн сумов	3548,9	0,24	2,1	3857,9	0,27	1,8	0,03	309,0
л)	Прочие расходы	млн сумов	16223,7	1,14	9,6	13717,1	0,96	6,4	-0,18	-2506,5

Сумма платежей по единому земельному налогу пропорционально увеличилась, достигнув 3857,9 млн. сумов по сравнению с 3548,9 млн. сумов. В то же время прочие расходы, напротив, сократились с 16223,7 млн. сумов до 13717,1 млн. сумов. Это свидетельствует о принятии мер по оптимизации структуры затрат и сокращению отдельных неэффективных расходов (таблица 1).

В целом, в хлопково-текстильном кластере ООО «Косон Бахт текстил» в 2022–2024 годах наряду с ростом объёмов производства и урожайности наблюдалось и существенное увеличение совокупных затрат. При этом рост расходов на оплату труда и топливно-смазочные материалы выступает основными факторами, оказывающими давление на себестоимость продукции. В связи с этим в перспективе целесообразно повышение экономической эффективности выращивания хлопка за счёт дальнейшей механизации трудовых процессов, внедрения энергосберегающих технологий и усиления эффективного использования ресурсов.

Производственные затраты представляют собой совокупную стоимость всех ресурсов, расходуемых в процессе производства продукции на предприятии, и являются одним из ключевых факторов формирования экономических результатов. В условиях рыночной экономики рациональное управление производственными затратами, углублённый анализ их структурного построения и динамики имеют важное значение для повышения конкурентоспособности предприятий и обеспечения устойчивого экономического развития.

Экономическое содержание производственных затрат связано с использованием трудовых, материальных, финансовых и иных ресурсов, которые играют решающую роль в формировании себестоимости продукции. На практике производственные затраты формируются за счёт материальных расходов, оплаты труда, социальных отчислений, амортизации основных средств и прочих расходов. Соотношение между данными элементами является важным показателем, отражающим уровень эффективности производства.

Институциональные и технологические изменения, происходящие в экономике, оказывают непосредственное влияние на структурное построение производственных затрат. В частности, в результате внедрения инновационных технологий, автоматизации и цифровизации производства наблюдается относительное сокращение доли затрат на труд при одновременном увеличении расходов на основные средства и энергетические ресурсы. Такие структурные изменения способствуют повышению эффективности производственного процесса и улучшению качества использования затрат.

Анализ структурных изменений производственных затрат позволяет выявить внутренние резервы в деятельности предприятия, сократить неэффективные направления расходов и оптимизировать уровень использования ресурсов. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для

снижения себестоимости продукции, увеличения объёма прибыли и укрепления финансовой устойчивости.

Между производственными затратами и экономической эффективностью существует тесная взаимосвязь, при которой экономическая эффективность выражается через соотношение между результатами производства и понесёнными на их достижение затратами. Научно обоснованное управление затратами и совершенствование их структурного построения позволяют повысить рентабельность производства и общую экономическую результативность. При этом важным условием обеспечения экономической эффективности является не только сокращение затрат, но и их целенаправленное и эффективное распределение.

Подводя итог, можно отметить, что производственные затраты, их структурные изменения и экономическая эффективность являются взаимосвязанными экономическими категориями. Их глубокий научный анализ имеет существенное значение для эффективной организации деятельности предприятий. Совершенствование механизмов управления производственными затратами и систематическая оценка изменений в их структурной структуре выступают одним из ключевых условий обеспечения экономического роста и повышения конкурентоспособности.

Выводы и результаты. Результаты исследования показали, что формирование производственных затрат и их структурное построение в хлопково-текстильных агрокластерах представляет собой многофакторный процесс. Установлено, что в структуре затрат наибольшую долю занимают расходы на оплату труда, минеральные удобрения, топливно-смазочные материалы и амортизация основных средств. Вместе с тем в последние годы вследствие роста цен на ресурсы наблюдается тенденция увеличения себестоимости производства.

Результаты экономического анализа подтвердили, что интеграция процессов выращивания хлопка и его переработки в рамках агрокластеров имеет важное значение для сокращения затрат, увеличения добавленной стоимости продукции и обеспечения общей экономической эффективности. Также научно обосновано, что уровень эффективного использования ресурсов оказывает непосредственное влияние на рентабельность деятельности кластеров.

В целях оптимизации производственных затрат и повышения экономической эффективности в хлопково-текстильных агрокластерах предлагаются следующие меры:

1. При управлении производственными затратами усилить механизмы нормирования и контроля расходования ресурсов на основе функционального анализа затрат.

2. Сократить расходы на топливо, удобрения и труд за счёт внедрения ресурсосберегающих и цифровых технологий в сельском хозяйстве.

3. Увеличить добавленную стоимость продукции и укрепить финансовую устойчивость кластеров за счёт повышения доли переработки хлопкового сырья.

4. Сформировать и внедрить в практику единую систему экономических показателей оценки эффективности затрат в агрокластерах.

5. Снизить производственные затраты путём совершенствования механизмов государственного инвестиционного поддержки и льготного финансирования.

Использованные источники:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 24 января 2020 года. // «Народное слово», 25 января 2020 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 июля 2017 года № PF-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». https://lex.uz/mobileact/3107036
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № PF-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». https://lex.uz/docs/5841063
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № PF-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». https://lex.uz/docs/5841063
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № 215 «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию территорий Бухарской области и дальнейшему повышению уровня жизни населения в 2022–2026 годах». https://lex.uz/docs/5988275
6. Martin, R., & Sunley, P. (2003). Deconstructing clusters: chaotic concept or policy panacea? Journal of Economic Geography, 3, 5-35. https://doi.org/10.1093/JEG/3.1.5.
7. Braunerhjelm, P., & Feldman, M. (2008). Cluster genesis: technology-based industrial development. Economic Geography, 84, 245-246. https://doi.org/10.1093/ACPROF:OSO/9780199207183.001.0001.
8. Trushkina, N., & Shiposha, V. (2021). Clustering of the national economy as an effective tool for the sustainable development of european countries. Three Seas Economic Journal. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2021-4-11.
9. Lin, C., Tung, C., & Huang, C. (2006). Elucidating the industrial cluster effect from a system dynamics perspective. Technovation, 26, 473-482. https://doi.org/10.1016/J.TECHNOVATION.2004.11.008.
10. Berdiev, A. H. (2019). Prospects of agricultural development: problems and solutions. *Journal of Economics and Finance*, (11), 131.
11. Бердиев, А. Х., & Расулов, Х. К. (2024). Перспективы развития агрокластеров. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1128-1135.
12. Berdiyev, A. H. (2024). Further development of free market relations of cotton textile clusters. *Экономика и социум*, (3-1 (118)), 83-87.

13. Berdiyev, A. H. (2024). Priority tasks of agricultural development and their implementation mechanisms. *Экономика и социум*, (3-1 (118)), 78-82.

Бердиева Д.А.
магистрант
Oriental университет

ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. *Статья посвящена проблеме дозирования физических упражнений, применяемых на уроках физической культуры учеников 1-4 классов. Рассмотрены особенности дозирования физических нагрузок в процессе занятий физическими упражнениями. Определены оптимально-дозированные физические нагрузки для повышения физической подготовленности учащихся.*

Ключевые слова: *общеобразовательная школа, физическая культура, ученики младших классов, физическое развитие, физическая нагрузка, объем и интенсивность нагрузки.*

Berdiyeva D.A.
master's student
Oriental University

REGULATION OF PHYSICAL ACTIVITY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS (GRADES 1–4) IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Abstract. *The article is devoted to the issue of dosing physical exercises used in physical education classes for students in grades 1–4. The features of dosing physical loads during physical exercise sessions are examined. Optimal dosed physical loads aimed at improving students' physical fitness are identified.*

Keywords: *general education school, physical education, primary school students, physical development, physical load, volume and intensity of physical load.*

Актуальность. В системе физического воспитания Узбекистана физическая культура рассматривается как основное средство и метод всестороннего физического воспитания учащихся. Физические упражнения играют значительную роль в физическом воспитании детей младшего школьного возраста. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан ставит такие конкретные задачи, как «воспитание физически здоровых, нравственно и духовно зрелых, самостоятельно мыслящих, верных Родине и решительно смотрящих на жизнь подрастающего поколения, дальнейшее углубление демократических реформ и повышение их потенциала для общественной деятельности в процессе развития гражданского общества». При решении данной задачи одной из главных

является проведение занятий по физической культуре с использованием научно-обоснованных рекомендаций и разработок по определению распорядка дня учащихся и его реализации в образовательной сфере.

Физическое воспитание является основой здоровья человека, особенно здорового и гармонического развития молодого поколения.

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма — одна из основных проблем в современном обществе. Младший школьный возраст — период, когда закладываются основы здоровья, гармонического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для физического совершенствования ребенка.

Формирование основных двигательных качеств и навыков в процессе физического воспитания может быть более успешным при условии обоснованного применения средств и методов физической культуры, а также интенсификации физических нагрузок, требующих напряженной деятельности всех физиологических систем. Однако при этом необходимо учитывать возрастно-половые и индивидуальные особенности детей, а также резервные возможности их организма на разных этапах развития.

Цель исследования: повысить эффективность занятий по физической культуре на основе дозирования физических упражнений в программе начальной школы.

Методология исследования. Вопросы физической подготовки и физического развития учащихся изучались многими учеными. Например, отечественными учеными, таких, как Р.С. Саламов, Т.С. Усманходжаев, Ф. Ходжаев, М.Ю. Юнусова и др., исследованы проблемы физического развития и физической подготовленности, а также двигательной активности детей и подростков. Л.П.Матвеев, М.Я.Набатникова, Л.И.Лубышева, В.К. Бальсевич, В.И.Лях проводили исследования по определению оптимальных средств, учитывающих морфофункциональные и двигательные возможности, интересы и потребности, учащихся младшего школьного возраста, а также методики их грамотного и направленного применения.

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая нагрузка – это определенная мера воздействия физических упражнений на организм занимающихся. Физические упражнения помогают сохранять мышечный тонус, улучшают кровообращение и обмен веществ, повышают работоспособность. Физические нагрузки в каждом конкретном случае должны быть оптимальными по своим параметрам (объему, интенсивности, интервалам отдыха), что обеспечивает тренировочный эффект. Недостаточные физические нагрузки малоэффективны, они ведут к потере учебного времени, а чрезмерные – перенапряжению организм. Вот почему так важно знать, соответствует ли нагрузка на занятиях по физической культуре возможностям ребенка, не велика ли она, или, напротив, мала и можно ли без всякого ущерба для здоровья занимающегося, повысить ее.

Нагрузка на организм зависит от количества повторений каждого упражнения, амплитуды движений, их темпа, силы и напряжения, а также координационной сложности.

При работе с учащимися начального этапа школьного образования – I-IV классов – крайне важно правильно дозировать физическую нагрузку, учитывая их возрастные физиологические и психологические особенности.

Дозирование физических нагрузок для младших школьников (1-4 классы) основывается на учете возраста (6-10 лет), анатомо-физиологических особенностей, а главное — на контроле ЧСС, интенсивности (скорость выполнения упражнений и величина пульса), объема (общее количество повторений, дистанция или время выполнения), интервалов отдыха (продолжительность и характер перерывов (активный или пассивный) между упражнениями) и координационной сложности упражнений.

В процессе выполнения любых физических упражнений, в первую очередь, развиваются и улучшаются качества движений, от которых зависит результат этих упражнений. Например, результаты в спринте зависят от уровня проявления скорости и силы, в беге на средние дистанции — от скоростной выносливости, а в беге на длинные дистанции — от выносливости. Поэтому тренировки по этим упражнениям должны быть направлены на улучшение соответствующих двигательных качеств.

Под нормой нагрузки понимается объем нагрузки, обеспечивающий поддержание оптимального уровня физической активности и физической подготовленности с целью укрепления физического воспитания, приобретения двигательных навыков и компетенций.

Недостаток физической активности у учащихся 1-4 классов негативно сказывается на функциях организма и его активности, в результате чего движение замедляет развитие навыков и основных физических качеств (4,5). Поэтому необходимо нормировать физическую нагрузку на уроках физкультуры для учащихся 1-4 классов и повысить их эффективность.

Продолжительность уроков физкультуры для учащихся 1-2 классов не должна превышать 20-25 минут. Упражнения должны быть легкими, в игровой форме и не утомлять детей. Учащиеся 3-4 классов могут выполнять несколько более сложные упражнения. Их можно использовать для физических тренировок продолжительностью до 25–30 минут.

При занятиях физическими упражнениями рекомендуют к использованию несколько вариантов дозирования физической нагрузки:

- изменение количества упражнений на занятии;
- изменение количества повторений одного и того же упражнения;
- изменение скорости выполнения упражнения.

Хотя собрано большое количество данных о влиянии чрезмерных физических нагрузок на организм занимающихся, по-прежнему существует множество случаев, когда детям школьного возраста назначают одинаковые физические нагрузки без учета особенностей организма учеников младших

классов. С этой точки зрения, данная работа важна, поскольку она направлена на научное решение этой проблемы.

В первую очередь, это обусловило необходимость научного и педагогического обоснования и всестороннего решения вопросов, связанных с дозированием физической нагрузки учащихся. Учитывая вышеизложенное, дозирование физической нагрузки и повышение её эффективности на уроках физкультуры учащихся 1-4 классов является одной из актуальных задач.

Выводы. Для достижения и поддержания нормального уровня физической подготовленности младших школьников необходимо строго дозировать величину нагрузки на уроке. Для характеристики этой величины необходимо указать все ее основные параметры: интенсивность и объем, метод выполнения. Учет этого фактора позволит повысить эффективность воздействия средств физической культуры на организм школьника.

Для учеников начальной школы дозирование физической нагрузки необходимо для их здорового развития, успеваемости в школе и положительного психологического состояния. Учителям физической культуры необходимо углубленно изучать физическое, умственное и эмоциональное развитие учеников этого возраста и правильно планировать физические нагрузки.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28.01.22 г. №УП-60.
2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений. - М.- Издательский центр «Академия», 2001.
3. Salomov R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. -T.:” ITA-PRESS”. T.1. 2015. 296 c.
4. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 216 с.
5. Ахмедов Ф.К., Атамуродов Ш.У. Бошланғич синфлар жисмоний тарбия назарияси ва методикаси. Т.: “VNESHINVESTPROM”. 2019. 182-б.

Боймирзаев А. Э.
доцент
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти
Тошкент, Ўзбекистон

АҲОЛИНИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Аннотация. *Мазкур мақолада аҳолини фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилишга тайёрлаш масалалари, аҳолининг билим ва кўникмаларини оширишдаги мавжуд муаммолар таҳлил қилинган ҳамда уларни бартараф этиш бўйича амалий ечимлар таклиф этилган. Хусусан, таълим тизимида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги асосларини такомиллаштириш, оммавий ахборот воситалари ва рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш, аҳолини амалий машғулотларга жалб этиш орқали тайёргарлик самарадорлигини ошириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.*

Калит сўзлар*: фавқулодда вазият, аҳоли тайёргарлиги, хавфсизлик маданияти, таълим тизими, амалий машғулотлар, ахборот технологиялари.*

Boymirzaev A. E., associate professor
Civil
Defense Institute under the Academy of the Ministry of Emergency
Situations, Tashkent, Uzbekistan

PREPARING THE POPULATION FOR ACTION IN EMERGENCY SITUATIONS: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Abstract: *This article analyzes the issues related to preparing the population for appropriate actions in emergency situations, examines existing challenges in enhancing public knowledge and skills, and proposes practical solutions to address them. In particular, special attention is given to improving the fundamentals of life safety within the education system, the effective use of mass media and digital technologies, and increasing the effectiveness of preparedness through the active involvement of the population in practical training activities.*

Keywords: emergency situations, population preparedness, safety culture, education system, practical training, information technologies.

Кириш. Бугунги глобаллашув ва илмий-техник тараққиёт шароитида инсоният олдида янги имкониятлар билан бирга турли хил таҳдид ва хавф-хатарлар ҳам пайдо бўлмоқда. Табиий фавқулодда вазиятлар – зилзила, сув тошқини, қурғоқчилик, довул ва кўчкилар, шунингдек, техноген фавқулодда вазиятлар - авариялар, йирик саноат объектларида содир бўладиган портлаш

ва ёниш ҳолатлари, транспорт воситаларидаги йўл-транспорт ҳодисалари аҳоли ҳаёти ва соғлиғига катта хавф туғдиради. Шу билан бирга, экологик муаммолар ва замонавий қуроллардан келиб чиқиши мумкин бўлган хавфлар ҳам жамият барқарорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда [4].

Фавқулодда вазиятларда аҳоли ҳаракатларининг самарадорлиги уларнинг олдиндан тайёргарлиги, зарур билим ва кўникмаларга эгалиги, хавфни тўғри англай олиши ва фавқулодда вазиятларда тезкор қарор қабул қилиш қобилияти ҳамда тўғри ҳаракат қилиш кўникмасига эга бўлишига бевосита боғлиқдир. Шундай экан, аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш нафақат миллий хавфсизликнинг, балки ҳар бир инсон ҳаёти ва саломатлигининг муҳим кафолати ҳисобланади.

Амалиёт шуни кўрсатадики, аксарият ҳолатларда аҳолининг тайёргарлик даражаси етарли эмаслиги сабабли фавқулодда вазиятларнинг оқибатлари оғирлашиб кетади. Масалан, хавфсизлик қоидаларига риоя қилинмагани, эвакуация тартибини билмаслик ёки биринчи тиббий ёрдам кўрсата олмаслик кўплаб инсонлар ҳаётига зомин бўлади. Шу боис аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш жараёни тизимли ва босқичма-босқич амалга оширилиши лозим [5].

Ўзбекистон Республикасида фавқулодда вазиятлардан аҳолини муҳофаза қилиш масалалари давлат сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу йўналишда зарур қонунчилик базаси яратилган ва Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ҳамда бошқа тегишли мутасадди вазирликлар, идоралар, ташкилотлар фаолият юритмоқда. Бироқ амалиётда айрим муаммолар – таълим муассасалари дастурларида етишмовчиликлар, аҳоли ўртасида тарғибот ишларининг етарли даражада самарали ташкил этилмаганлиги, инновацион технологиялардан тўлиқ фойдаланмаслик ҳолатлари сақланиб қолмоқда [4].

Мазкур мақоланинг асосий мақсади – аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлашда мавжуд бўлган муаммоларни аниқлаш, уларнинг сабабларини таҳлил қилиш ва самарали ечимлар таклиф этишдан иборат. Шу билан бирга, мақолада замонавий инновацион ёндашувлардан фойдаланиш орқали аҳолининг табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёргарлигини ошириш имкониятлари ҳам ёритилган.

Асосий қисм

1. Муаммолар таҳлили. Бугунги кунда аҳолини табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш ва аҳоли ҳаёт фаолияти хавфсизлигини таъминлаш йўналишида бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларни қуйидагича гуруҳларга ажратиш мумкин:

1.1. Аҳолининг фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш соҳасида билим ва кўникмаларининг етарли эмаслиги. Уюшмаган аҳоли, потенциал хавфли иқтисодиёт объектлари атрофида яшайдиган аҳоли табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятларда қандай ҳаракат қилиш кераклигини яхши билмайди ёки етарлича амалий кўникмага эга эмас.

Бунинг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

таълим тизимида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги йўналишига етарлича эътибор қаратилмаганлиги;

аҳоли орасида ҳаёт фаолияти хавфсизлиги маданияти етарли даражада шаклланмаганлиги, турли фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилиш бўйича амалий кўникмаларга эга эмаслиги;

мактабгача таълим муассасалари ҳамда уюшмаган аҳоли орасида амалий машғулотларининг ўтказилиш даврийлигининг узоқлиги, иқтисодиёт объектларида ўтказиладиган ўқув машғулотлари сифат даражасининг пастлиги ва бу машғулотларга объект атрофида яшовчи аҳолининг кенг жалб этилмаслиги.

Натижада, турли хил табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятлар (зилзила, сел, тошқин, ер кўчкиси, қор кўчкиси, кучли шамоллар, ёнғинлар, кимёвий хавфли объектлардаги авариялар, транспорт авариялари ёки бошқа йирик техноген авариялар) пайтида аҳоли орасидаги ваҳима, тўғри ҳаракат қилишни билмаслик кўплаб инсонларнинг жароҳат олишига ёки ҳалок бўлишига сабаб бўлади [4].

1.2. Таълим тизимидаги муаммолар.

Мактаб, коллеж ва олий таълим муассасаларида фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш билан боғлиқ фан дастурлари етарли даражада чуқур ўргатилмайди, махсус адабиётлар етишмайди. Аксарият ҳолатларда талабаларни ўқитиш масаласи назарий ёки статистик маълумотлар бериш билан чекланиб, амалий машғулотларга кам вақт ажратилади ёки умуман амалий машғулотлар бажарилмасдан қолади. Бу эса ёш авлоднинг ҳаёт фаолияти хавфсизлиги соҳасидаги кўникмалари етарли даражада шаклланмаслигига сабаб бўлади.

1.3. Аҳолига фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва содир бўлганда ҳаракат қилиш бўйича ахборот тарқатишдаги муаммолар.

Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва содир бўлганда аҳолининг ҳаракатлари мавзусида оммавий ахборот воситаларида мунтазам ва мақсадли тарғибот ишлари олиб борилиши етарли даражада эмас. Теле- ва радиодастурларда аҳоли ҳаёт фаолияти хавфсизлиги қоидаларига оид материаллар кам учрайди, интернет ва ижтимоий тармоқларда эса асосан маълум бир воқеа содир бўлгандан сўнггина маълумот тарқатилади. Бу ҳолат аҳолининг олдиндан тайёргарлигини пасайтиради.

1.4. Амалиёт ва машғулотларнинг камлиги

Аҳоли орасида фавқулодда вазиятларда аҳолини ва моддий ҳамда маданий бойликларни хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш бўйича амалий машғулотлар, жабрланувчиларга биринчи ёрдам, биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш тренинглари ва ҳимоя воситаларидан фойдаланиш тартиблари бўйича амалий машғулотлар етарли даражада ўтказилмайди. Айрим ҳолатларда бундай машғулотлар фақат давлат ташкилотлари ва йирик иқтисодиёт объектлари раҳбарлари, қутқарув тузилмалари ходимлари учун ташкил этилади, кенг аҳоли қатламлари, объетлар атрофида яшайдиган аҳоли эса четда қолади [6].

1.5. Иқтисодий ва техник ресурслар чекланганлиги

Ҳимоя воситалари (радиация ва кимёвий муҳофаза костюмлари, ўлатга қарши костюмлар, газниқоблар, биринчи ёрдам сумкалари) барча ҳудудларда етарлича таъминланмаган. Ҳимоя иншоотлари етарли эмас, мавжудлари ҳам фойдаланиш учун яроқсиз ҳолатга келиб қолган, зарур воситалар ва жиҳозлар билан таъминланмаган, аҳоли хавфсизлигини таъминлаб бера олмайди. Айрим қишлоқ ҳудудларида бу ҳимоя воситалари умуман мавжуд эмас. Маҳаллий ҳокимият ва иқтисодиёт объектларида бу йўналиш учун маблағ ажратилишининг чекланганлиги сабабли фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишни ўргатувчи замонавий тренажёрлар, VR симуляторлар ва махсус ўқув ускуналари амалиётга жорий этилмаяпти.

1.6. Қонунчилик ва назорат тизимидаги камчиликлар

Аҳоли ва ҳудудларни табиий ва техноген характердаги фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш ҳамда Фуқаро муҳофазаси ва аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш соҳасида қонунчилик асослари мавжуд бўлса-да, унинг жойларда ижроси доимий ва самарали таъминланмайди ёки назорат қилинмайди. Айрим ташкилотлар ва корхоналарда фавқулодда вазиятларда хавфсизлик бўйича тадбирлар фақат расмий ҳисобот учун ўтказилади, аммо амалда аҳолига ва объектлар ишчи ходимларига керакли кўникмаларни бермайди.

1.7. Руҳий тайёргарликнинг йўқлиги

Фавқулодда вазиятлар пайтида аҳолида ваҳима, қўрқув ва саросима кучли бўлади. Руҳий жиҳатдан тайёргарликнинг етарли эмаслиги аҳолининг тўғри қарор қабул қилиш қобилиятини пасайтиради. Бу эса фавқулодда вазиятларда тўғри ҳаракат қилиш ва эвакуация жараёнида оммавий тартибсизликлар ҳамда қўшимча ноқулайликларни келтириб чиқаради.

2. Юқорида келтирилган муаммоларнинг ечимлари бўйича қуйидагилар таклиф қилинади:

таълим тизимини такомиллаштириш. Умумтаълим мактаблари ва олий ўқув юртлари фан дастурларига ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ва фуқаро муҳофазаси фанларини чуқурроқ киритиш;

аҳоли орасида оммавий тарғиботни кучайтириш. Телевидение, радио, газета, интернет ва ижтимоий тармоқларда мунтазам равишда фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва содир бўлганда ҳаракат қилиш юзасидан амалий маслаҳатлар ва ўқув материалларини тарқатиш;

аҳолини жалб қилган ҳолда ўтказиладиган амалий машғулотларини йўлга қўйиш. Иқтисодиёт объектларида ўтказиладиган ҳар йилги эвакуация ва биринчи ёрдам кўрсатиш бўйича ўқув машғулотларига аҳолини жалб этиш;

инновацион технологиялардан фойдаланиш. Мобил иловалар, онлайн-платформалар ва VR симуляторлар орқали аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш;

аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлашга йўналтирилган иқтисодий ва моддий ресурслар ҳажмини ошириш. Давлат ва

нодавлат ташкилотлар ҳамкорлигида муҳофаза воситалари, ўқув қўлланмалари, эслатмалар ва кўргазмали қуролларни кенг тарқатиш;

ҳуқуқий-меъёрий базани мустаҳкамлаш. Аҳоли ва ҳудудларни фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш ҳамда Фуқаро муҳофазаси бўйича қонунчиликни такомиллаштириш, назорат механизмларини кучайтириш [6], [7].

Хулоса. Аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш жамият барқарорлиги, миллий хавфсизлик ва инсон ҳаётини муҳофаза қилишнинг энг муҳим йўналишларидан биридир. Бугунги кунда дунёдаги табиий, техноген ва экологик таҳдидлар миқёси ортиб бораётгани, айниқса аҳоли зич жойлашган ҳудудларда хавфларнинг кучайиши мазкур масаланинг долзарблигини янада оширмоқда.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, аҳолининг кўп қисмида, айниқса уюшмаган аҳоли қатламида зарур билим ва амалий кўникмалар етарли эмас, таълим дастурларида хавфсизлик масалалари тўлиқ қамраб олинмаган, оммавий ахборот воситаларида мунтазам тарғибот ишлари етарли даражада олиб борилмаяпти. Шунингдек, амалий машғулотлар етарли даражада ўтказилмаяпти, ҳимоя воситалари эҳтиёжларга қараб, барча ҳудудларда тенг тақсимланмаган ва руҳий тайёргарлик талаб даражасида эмас[14].

Фуқаро муҳофазаси ва хавфсизлик соҳасидаги қонунчилик базасини янада такомиллаштириш, назорат механизмларини кучайтириш ҳамда давлат ва жамият ҳамкорлигини ривожлантириш орқали аҳолини тайёрлаш жараёни янада самарали бўлади. Айниқса, аҳолини амалий машғулотларга кенг жалб этиш ва уларда фавқулодда вазиятларда тўғри қарор қабул қилиш кўникмасини шакллантириш бу йўналишдаги энг самарали чоралардан бири ҳисобланади. Шунингдек, аҳолининг психологик тайёргарлигини ошириш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Бунинг учун стрессни бошқариш, фавқулодда вазиятларда хавфсизликни таъминлаш маданиятини ривожлантириш ва аҳолида ижтимоий ҳамжиҳатлик руҳини мустаҳкамлаш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, аҳолини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш жараёнини тизимли ва инновацион усуллар асосида ташкил этиш нафақат инсон ҳаётини муҳофаза қилишга, балки мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва миллий хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Использованные источники:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Тошкент: Ўзбекистон, 2023й.
2. Ўзбекистон Республикасининг "Фуқаро муҳофазаси тўғрисида"ги Қонуни. – Тошкент, 2000.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бино ва иншоотларнинг зилзилабардошлигини ошириш ҳамда сейсмик хавфини мониторинг қилиш фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 161-сон қарори, 2024 йил 17 апрел.

4. Махмудов И.Ф. "Фавқулодда вазиятларда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш". // Илмий ахборот, №3, 2020.
5. Ғафуров Ш., Раҳматуллаев М. "Фавқулодда вазиятларда аҳолини ҳаракат қилишга тайёрлашнинг инновацион усуллари". – Тошкент: Фан, 2021.
6. Karimov F. “Emergency preparedness in Uzbekistan: challenges and solutions”. // Central Asian Journal of Safety Studies, Vol. 4, №2, 2020.
7. UNISDR. “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030”. – Geneva: United Nations, 2015.
8. IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). “Public awareness and public education for disaster risk reduction: key messages”. – Geneva, 2016.
9. WHO. “Emergency Preparedness and Response”. – World Health Organization Report, Geneva, 2021.
10. Alexander, D. “Principles of Emergency Planning and Management”. – Oxford University Press, 2013.
11. Coppola, D. P. “Introduction to International Disaster Management”. – Elsevier, 2015.
12. Haddow, G., Bullock, J., Coppola, D. “Introduction to Emergency Management”. – Butterworth-Heinemann, 2017.
13. Wisner, B., Gaillard, J. C., Kelman, I. (eds.) “Handbook of Hazards and Disaster Risk Reduction”. – Routledge, 2012.
14. Турсунов Ж. "Аҳолини фавқулодда вазиятларга психологик тайёрлаш масалалари". // Фуқаро муҳофазаси илмий журнали, №2, 2022.
15. United Nations Development Programme (UNDP). “Disaster Risk Reduction and Preparedness”. – New York, 2019.

Боймирзаев А. Э.
доцент
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти
Тошкент, Ўзбекистон

САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Аннотация. *Мазкур мақолада атмосферани ифлослантирувчи кимёвий заҳарли моддалар, уларнинг минтақадаги табиий ландшафтлар, ўсимлик ва ҳайвонот оламига таъсири билан боғлиқ муаммолар, атмосфера ҳавосини ифлослантиришда йирик саноат корхоналари, транспорт воситаларининг таъсири, атмосферадаги чанг таркибидаги заҳарли моддалар, уларнинг қишлоқ хўжалиги экинларига таъсири, экологик муаммоларнинг инновацион ечимлари бўйича таклифлар берилган.*

Калит сўзлар*: атмосфера, экология, ландшафтлар, саноат корхоналари, заҳарли моддалар, металл оксидлар, кадмий, мис, заҳарли газлар.*

Boymirzaev A. E., associate professor
Civil
Defense Institute under the Academy of the Ministry of Emergency Situations, Tashkent, Uzbekistan

ENVIRONMENTAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH INDUSTRIAL WASTE AND THEIR SOLUTIONS

Abstract**:** *This article examines chemical toxic substances that pollute the atmosphere and the problems associated with their impact on regional natural landscapes, flora, and fauna. It also analyzes the contribution of large industrial enterprises and transportation to atmospheric air pollution, the presence of toxic substances in airborne particulate matter, and their effects on agricultural crops. In addition, the article proposes innovative solutions to address these environmental problems.*

Keywords: atmosphere, ecology, landscapes, industrial enterprises, toxic substances, metal oxides, cadmium, copper, toxic gases.

Ҳозирги кунда экология ва атроф муҳитни турли хил чиқиндилардан муҳафаза қилиш дунё ҳамжамиятининг долзарб масалаларидан бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда нефть маҳсулотларида ҳаракатланувчи транспорт воситалари, йирик саноат корхоналарии ва кимё саноати чиқиндилари экологик муҳитни ифлослантирувчи асосий манбаларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда атмосфера ва табиий атроф-муҳитга турли хил ифлослантирувчи моддаларнинг чиқишини камайтириш, атроф муҳитнинг турли хил кимёвий заҳарли моддалар ва радиоактив моддалар билан ифлосланишининг олдини олиш экологик тизимнинг издан чиқиши ҳамда инсон соғлигига етказилиши мумкин бўлган зарарларнинг олдини олиш долзарб **муаммолардан бири** бўлиб қолмоқда.

Атроф-муҳитнинг турли хил кимёвий бирикмалар билан заҳарланиш даражаси ташвишли бўлиб қолмоқда. Атмосфера ва сув ҳавзаларининг кимёвий заҳарланиш даражаси белгиланган меъёрлардан юқори бўлиб, катта ҳудудлар чиқиндихоналарга айланмоқда. Минтақада табиий ландшафтлар ўзгариб, ўсимлик ва ҳайвонот оламининг сақланиб қолиши ҳамда ривожланишида жиддий **муаммолар** юзага келмоқда. Хавфли экологик муҳит аҳоли саломатлигига салбий таъсир қилмоқда [1].

Атмосфера ҳавосига асосан йирик саноат корхоналари, транспорт воситалари ва турар-жой коммунал хўжалик чиқиндилари жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бугунги кунда атмосфера ҳавосидаги кимёвий заҳарли моддаларнинг миқдори дунёнинг 200 дан ортиқ шаҳрида белгиланган меъёрлардан анча ошиб кетган. Атмосферада айниқса азот ва углерод оксидлари миқдори жадал ошиб бормоқда [2]. Республикамизда ҳосил бўлаётган умумий чиқиндиларнинг 14,4%ини аммиак ташкил этади. Бунга Қўқон, Навоий, Фарғона, Чирчиқ, Самарқанд шаҳарларида жойлашган кимё корхоналаридан чиқаётган газлар сабаб бўлмоқда.

Минтақамиздаги умумий кўчмас чиқинди манбаларининг 10 фоизи ва транспорт чиқиндиларининг 8,2 фоизи азот оксидлари улушига тўғри келади. Ёқилғи-энергетика, кимё ва нефть-кимё саноатлари азот оксидлари чиқиндиларини чиқарадиган асосий объектлар ҳисобланали ва улар республика бўйича ушбу чиқиндиларнинг 86,8 фоизини чиқаради. Республика бўйича ушбу чиқиндиларнинг 26,7 фоиз (тармоқ бўйича 54,9 фоиз) энергетика улушига тўғри келмоқда. Ҳозирги кунда иссиқлик электр энергетикаси тизими ва иссиқлик энергетикаси марказларидаги асосий қувватлардан 30 йилдан ортиқ вақт давомида фойдаланиб келинмоқда. Бунда ёқилғини ишлатиш самарадорлиги 33-35 фоизни ташкил этади. Ёқилғидан фойдаланиш самарадорлигининг пастлиги атмосферага ифлослантирувчи моддалар чиқишини оширади ва мазкур объектлар жойлашган шаҳарлар ва турар жойларда ҳавонинг ифлосланиш даражасига салбий таъсир кўрсатади. Айниқса, Тошкент, Олмалиқ, Ангрен, Фарғона, Навоий, Қўқон шаҳарларида атмосфера ҳавоси азот оксидлари билан нисбатан кўпроқ ифлосланган.

Атмосферага чиқариладиган жами ифлослантирувчи моддаларнинг ярмидан кўпини углерод оксиди ташкил этади. Автомобиллар шаҳарлар атмосферасига 70 фоизгача углерод оксиди чиқаради. Машинасозлик заводлари, йирик саноат корхоналари яқинида ва транспорт ҳаракати оқими кучли чорраҳаларда атмосферанинг ушбу моддалар билан ифлосланиш даражаси юқори. Республика бўйича углерод оксиди чиқиндиларининг 53,8

фоиз ёқилғи-энергетика, кимё ва нефть-кимё саноати мажмуаси улушига тўғри келади.

Атмосферадаги чанг қаттиқ заррачалардан иборат бўлиб, уларнинг дисперси ва компоненти ушбу заррачаларнинг (табиий ёки антропоген) пайдо бўлишига боғликдир. Унинг таркибига минераллар, эрувчан тузлар, металлар оксидлари ва органик бирикмалар киради. Ўзбекистон ҳудудида жойлашган яхши ҳимояланмаган қумли ерлар, Қизилқум, Қорақум чўллари ва Орол денгизининг қуриган ҳудудлари шўр ерларининг юзаси атмосферага чанг тушишига сабаб бўладиган йирик табиий манбалар ҳисобланади [1].

Ўзбекистоннинг 28 та саноат шаҳрида атмосферанинг умумий чанг босиши кузатилади. Шаҳарлар ҳавосидаги чанг таркибида ёниш жараёни натижасида ҳосил бўладиган қурум мавжуд. Саноат марказлари атрофида ўрнашиб қоладиган чанг таркибида турли минерал моддалар, металлар оксидлари, силикатлар, қурум, фторидлар, маргимуш оксиди, сурма, селен бор. Йирик саноат шаҳарларидаги чанг таркибида кадмий, мис, қўрғошин, никель, рух, марганец каби металлар аралашмалари аниқланган[1].

Атроф-муҳит, ҳаво, сув ҳавзаларининг заҳарланиш даражаси белгиланган меъёрлардан юқори бўлиб, катта ҳудудлар чиқиндихоналарга айланмокда. Минтақада табиий ландшафтлар ўзгариб, ўсимлик ва ҳайвонот олами ривожланишида муаммолар вужудга келмокда. Хавфли экологик муҳит аҳолига, айниқса болалар саломатлигига салбий таъсир қилмокда. Шунингдек атмосфера ҳавосига саноат корхоналари ва турар-жой коммунал хўжалик чиқиндилари жиддий таъсир кўрсатмокда. Ҳозирги вақтда заҳарли моддаларнинг миқдори дунёнинг 200 дан ортиқ шаҳрида меъёрдан анча ошиб кетган. Атмосферада азот ва углерод оксидлари ошиб бормокда [2].

Ноорганик минерал ўғитлар, гербицидлар, пестицидлар ва бошқа кимёвий моддаларнинг йиллар давомида белгиланган меъёрлардан ўнлаб маротаба ортиқ қўлланилиши, ахлатга мосланмаган майдонларга чиқиндилар чиқариш тупроқ, атмосфера ҳавоси, ер ости ва ер усти сувларини ифлослантирмокда [4]. Навоий вилоятининг Зарафшон, Учқудуқ шаҳарларида жойлашган чиқиндихоналардаги радиоактив қумларнинг шамол билан тарқалиши атроф минтақаларда экологик ҳалокатни келтириб чиқариши реал хавфга айланган.

“Тожик алюминий компанияси” (TALCO) Давлат унитар корхонаси йилига 800 минг тонна бирламчи алюминий ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, йилига атмосферага 400-500 тонна фторли водород ва бошқа заҳарли газларни чиқариб, атмосфера ҳавоси ва атроф муҳит экологик тизимининг бузилишига сабаб бўлмокда [6]. Бу эса ўз навбатида Сурхондарё вилоятининг Тожикистон Республикаси билан чегарадош бўлган Сариосиё, Узун, Денов ва Олтинсой туманлари ҳудудларида атмосферадаги фторли водороднинг миқдори йўл қўйиладиган концентрациядан 1,8-2 баравар, ёз ойларида эса 3-4 баравар ошиб кетишига, аҳоли орасида ва ҳайвонот дунёсида буқоқ, флюороз, остеодистрофия, остеопороз, остеомаляция, рахит ва бошқа модда

алмашинуви билан боғлиқ эндемик, экзоотик касалликларнинг ошишига сабаб бўлмоқда [6], [9].

Таъкидлаш керакки, атмосфера, тупроқ, сувнинг ифлосланиши натижасида боғлар ва қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлиги кескин пасайиб кетмоқда, мева ва сабзавотлар таркибида фторидлар меъёрий концентрациядан 11-19 баравар, буғдойда 5-6,5 баравар, сут таркибида фтор нормадан 9-13 баравар, гўштда 10,9 фоиз юқори эканини кўрсатмоқда [6].

Бундан ташқари Навоий вилоятининг Навоий, Зарафшон, Учқудуқ шаҳарлари ёнида жойлашган чиқиндихоналардаги радиоактив қумларнинг шамол билан тарқалиши атроф минтақаларда экологик ҳалокатни келтириб чиқариши реал хавфга айланган.

Юқорида келтирилган муаммоларни ечиш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

минтақамизда, шу жумладан республикамизда атмосфера, атроф-муҳит ифлосланишининг олдини олиш ва экологияни соғломлаштириш мақсадида, табиатга антропоген таъсиротларни камайтириш зарур. Бунинг учун турли хил чиқиндилар учун махсус жойлар ташкил этиш, чиқиндиларни қайта ишлаш технологияларини янада такомиллаштириш, атмосферага заҳарли газлар чиқишининг олдини олиш учун корхоналар мўриларини замонавий фильтрлар билан жиҳозлаш;

саноат ишлаб чиқариш корхоналарида имкон қадар заҳарли моддалардан фойдаланишдан воз кечиш, ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш;

республикамиздаги мавжуд радиоактив моддалар чиқиндихоналарини доимий мониторинг қилиб бориш, зарур ҳолатларда рекультивация ишларини амалга ошириш;

республикадаги саноат чиқиндиларнинг ташланиши ва йўқ қилиниши устидан назоратни кучайтириш, чиқиндиларни қайта ишлаш бўйича инновацион технологияларни амалиётга кенг жорий этиш;

Бу тадбирлар ўз навбатида атмосфера ва атроф-муҳитнинг оғир металлар, радиоактив моддалар ва бошқа турли заҳарли моддалар ҳамда заҳарли газлар билан ифлосланишининг олдини олади, экология ва атроф муҳитнинг инсон саломатлигига салбий таъсирини камайтиради, уларнинг ифлосланишининг олдини олади, биологик хилма-хиллик сақлаб қолинади, экологик тоза биосфера сақлаб қолинади.

Хулоса: атмосфера ва атроф-муҳитга ифлослантирувчи моддаларнинг чиқарилиши, уларни зарарсизлантириш чораларининг кўрилмаслиги экологик тизимга ва шу орқали инсоният саломатлиги ҳамда ҳайвонот оламига ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Агарда ҳозирдан жиддий чоралар кўрилмаса, экологик ҳалокатга, энг асосийси инсонларнинг ҳаёти ва саломатлигига янада жиддий хавф туғдиради.

Использованные источники:

1. Мухитдинов М.М., Потапов А.И., “Экология”, Ташкент. “Фан”, 2009, 432 б.

2. Айзман Р.И., Кривошеков С.,Г., Омельченко А.О. – Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. – Новосибирск: Сибир. Университет нашриёти. 2005, – 327 б.
3. Ўзбекистонда атроф-муҳит ҳолатини экологик кўрсаткичлар асосида баҳолаш атласи. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитаси. “Kartografiya” илмий-ишлаб чиқариш давлат корхонаси. Т.: 2008. – 63 б.
4. Степановских А.С. “Охрана окружающей среды” – Москва “ЮНИТИ-ДАНА” 2001, 560 б.
5. Репин. Ю.В., -“Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях”. – Москва. Дрофа. 2005. 192 б.
6. www. econews.uz-Ўзбекистоннинг экологик маълумотлар портали.
7.

Боймирзаев А. Э.
доцент
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги академияси ҳузуридаги
Фуқаро муҳофазаси институти
Тошкент, Ўзбекистон

РАДИАЦИЯВИЙ АВАРИЯЛАРДА АҲОЛИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ: МУАММОЛАР ВА ИННОВАЦИОН ЕЧИМЛАР

Аннотация. *Мазкур мақолада радиациявий авариялар шароитида аҳоли хавфсизлигини таъминлаш масалалари ёритилган. Мавжуд муаммолар тизимли таҳлил қилинган ва уларнинг асосий сабаблари кўрсатилган. Шунингдек, замонавий технологиялар ва инновацион ечимлар ёрдамида аҳолини муҳофаза қилишни такомиллаштириш усуллари ишлаб чиқилган. Мақолада халқаро тажриба ва илмий ишланмалар асосида самарали усуллар таклиф этилган.*

Калит сўзлар: *радиациявий авариялар, аҳоли хавфсизлиги, инновация, фавқулодда вазиятлар, муҳофаза чоралари.*

Boymirzaev A. E.,
associate professor
Civil Defense Institute under the Academy of the Ministry of Emergency Situations, Tashkent, Uzbekistan

ENSURING THE SAFETY OF THE POPULATION IN RADIATION ACCIDENTS: PROBLEMS AND INNOVATION SOLUTIONS

Abstract. *This article explores the issues of ensuring public safety during radiation accidents. A systematic analysis of existing problems and their root causes has been conducted. Modern technologies and innovative solutions aimed at improving population protection have been presented. Based on international experience and scientific research, effective measures for strengthening civil protection systems are proposed.*

Keywords*: radiation accidents, public safety, innovation, emergencies, protective measures.*

Асосий қисм

Кириш. Радиациявий авария — ускуна носозлиги, ходимлар (персонал)нинг хатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), табиий ва техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлар туфайли келиб чиққан, фуқароларнинг белгиланган нормалардан кўпроқ нурланиш олишига ёки атроф муҳитнинг радиоактив ифлосланишига олиб келиши мумкин бўлган ёхуд олиб келган ионлаштирувчи нурланиш манбаи устидан бошқарувнинг издан чиқиши; ядро энергетика қурилмаси, асбоб ва қурилмаларининг экспулатация қилиш

қоидалари бузилиши натижасида радиоактив маҳсулот ёки ионлаштирувчи нурланишнинг лойиҳада мўлжалланган чегараларидан чиқиши.

Атом энергетикаси ва радиация билан боғлиқ технологияларнинг бугунги кунда саноат ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланилиши инсониятга катта иқтисодий ва ижтимоий фойда келтириши билан бир қаторда, радиациявий авариялар хавфини ҳам оширди. 1986 йил 26 апрелда Украинанинг Чернобил атом электростанциясида авария содир бўлган. Шу вақтда атом электростанциясида мавжуд бўлган 8 тонна радиоактив уран ва 2 тонна плутонийнинг портлаши натижасида минглаб тонна радиоактив чанг атмосферага фонтан бўлиб отилиб чиққан. Бир неча кун ичида минглаб километрга тарқалган радиоактив чанг Европа ва Осиёнинг кўплаб мамлакатларида аниқланган. Бу авария натижасида қисқа вақтларда кенг ҳудудларга радиоактив чанг тарқалиб, атроф муҳитнинг радиоактив ифлосланишига олиб келган.

2011 йил 11 март куни Тинч океани тубида юз берган зилзила натижасида ҳосил бўлган цунами сабабли Япониянинг Фукусима-1 атом электростанциясида авария содир бўлган. Авария натижасида ҳосил бўлган радиоактив чанг 10 кундан кейин Америка қитъасигача етиб борганлиги Канада лабораторияси томонидан қайд этилган.

Чернобиль (1986) ва Фукусима (2011) каби йирик радиациявий авариялар нафақат яқин атроф муҳитни кучли радиоактив ифлосланишига, балки аҳоли саломатлигига узоқ муддатли салбий таъсир кўрсатиш билан бирга, минтақа давлатларида жиддий иқтисодий ва ижтимоий оқибатларга олиб келган [5],[8]. Бу авариялярнинг салбий оқибатлари ҳанузгача ўз таъсирини кўрсатиб келмоқда.

Бу авариялар амалдаги радиациявий хавфсизлик тизимларининг заиф жиҳатларини очиб берди ва атом электростанцияларининг табиий фавқулодда вазиятлардан муҳофазаланиш тизимини янада такомиллаштириш, аҳолини ҳимоя қилиш борасида миллий ҳамда халқаро даражада самарали механизмларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш заруратини кўрсатди [5].

Радиациявий авариялярда аҳолини муҳофаза қилиш - техник тизимлар мажмуи (реактор хавфсизлиги, мониторинг ва деградацияни назорат қилиш), тиббий-санитар чоралар (диагностика, даволаш ва профилактика), ижтимоий-коммуникация йўналишлари (аҳолига хабар бериш, жамоатчилик билан ишлаш), ҳамда ҳуқуқий-ташкилий меъёрлар (эвакуация режалари, компенсация механизмлари)ни ўз ичига олади. Радиациявий авариялар билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва содир бўлганда ҳаракат қилиш давлат тизимига кирувчи вазирлик ва идоралар ҳамкорликда ҳаракат қилишлари лозим. Бу соҳадаги камликлар одамлар ҳаёти ва саломатлигига бевосита таҳдид солиши мумкин [5].

Мавзу ўрганилишининг аҳамияти бир неча муҳим жиҳатни ўз ичига олади.

Биринчидан, радиация тарқалишининг табиий ва антропоген омиллари ва уларнинг ҳудудларга таъсирини тушуниш зарур.

Иккинчидан, радиациявий авария содир бўлганда тезкор мониторинг, радар/сенсор тармоқлари, хабар бериш ва маълумот алмашинуви тизимларининг ролини баҳолаш керак.

Учинчидан, тиббий ёрдамнинг самарадорлиги — радиация таъсирига қарши антидотлар, радиация таъсирининг даражасига кўра беморларнинг сараланиши ва узоқ муддатли мониторингни ташкил этиш жиҳатларини ўрганиш муҳим.

Тўртинчидан, ижтимоий-иқтисодий оқибатлар — аҳоли миграцияси, руҳий зўриқиш ва етказилган иқтисодий зарарларни баҳолаш талаб этилади [5], [8].

Муаммолар таҳлили

Радиациявий авариялларда аҳоли хавфсизлигини таъминлашда қатор тизимли муаммолар мавжуд. Улар техник, ижтимоий, ташкилий ва ҳуқуқий йўналишларда намоён бўлади.

1. Техник муаммолар. Реакторлар ва радиациявий хавфли объектлар ва улардаги технологияларнинг эскириши: Жаҳон ядровий энергетикасида 30–40 йилдан ортиқ вақтдан бери ишлаётган реакторлар улуши юқори. Бу эса радиациявий авариялар хавфини кескин оширади [1]. Назорат ва мониторинг тизимлари: Аксарият мамлакатларда атрофдаги радиация даражасини аниқ ўлчовчи сенсорлар билан барча ҳудудлар қамраб олинмаган, кенг қамровли онлайн мониторинг тизими йўлга қўйилмаган [5].

2. Ижтимоий муаммолар. Ахолининг радиациявий авариялларда ҳаракат қилиш бўйича тайёргарлик даражаси паст. Чернобил фожиаси (1986)да ва Фукусима (2011) авариясида аҳолининг кўп қисми эвакуация қоидаларини билмаган ва бу инсон йўқотишларига олиб келган [4]. Алоқа ва хабар беришдаги муаммолар: айрим ҳолатларда ҳукумат органлари ёки масъул муассасалар томонидан аҳолига кечиктирилган ёки нотўғри маълумот бериши оқибатида аҳоли хавфсизлигига таҳдид кучайган, ортиқча нурланиш олишга сабаб бўлган [9].

3. Ташкилий ишлардаги муаммолар. Мувофиқлаштиришдаги камчиликлари: авария оқибатларини бартараф этишга жалб этилган хизматлар, қутқарув куч - воситалари ва маҳаллий ҳокимият органлари ўртасидаги ҳаракатлар аксарият ҳолатларда мувофиқлаштирилмайди [5].

Инновацион ечимлар.

Радиациявий авариялларда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш учун инновация ва замонавий технологияларнинг қўлланилиши хавфсизлик тадбирларининг самарадорлигини оширади.

1. Ахборот ва рақамли технологиялар

“Смарт-мониторинг” сенсорлари: Радиоактив моддалар тарқалишини реал вақтда аниқловчи датчиклардан фойдаланиш ва уларни GIS-карталар билан интеграция қилиш. Масалан, Японияда Фукусима авариясидан сўнг бундай тизимлар амалиётга жорий этилган [6]. Мобил иловалар жорий этиш ва SMS-хабарлар юбориш: фавқулодда вазиятларда аҳолини эвакуация қилиш бўйича йўриқномаларни автоматик етказиш тизимини ишлаб чиқиш [5].

2. Биотехнология ва тиббий йўналиш.

Янги антидотлар: радиация таъсирини камайтирувчи дорилар ва муҳофаза қилувчи воситаларнинг янги авлодини ишлаб чиқиш [10] .

Генетик тадқиқотлар: инсон организмининг радиацияга чидамлилигини ошириш мақсадида олиб борилаётган генетик барқарорлик ва иммунитетни кучайтирувчи тадқиқотларни янада кучайтириш.

3. Ташкилий инновациялар.

Ягона тезкор реакция марказлари: халқаро ҳамкорлик асосида радиациявий авариялларга тезкор жавоб бериш марказларини яратиш. Автоматлаштирилган эвакуация тизимлари: Аҳоли оқимини оптимал бошқариш учун логистика ва транспорт ҳаракатини рақамли алгоритмлар асосида автоматлаштириш.

4. Таълим ва тарғибот.

Барча таълим муассасаларида радиация хавфсизлиги фанини жорий этиш. Бу аҳолининг билим ва кўникмаларини оширади.

Виртуал симуляторлар: радиация билан боғлиқ фавқулодда вазиятларнинг турли сценарийлари асосида VR технологиялар ёрдамида аҳоли ва қутқарувчиларни ҳаракат қилишга ўргатиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб аҳолининг радиациявий авариялларда хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қуйидагилар тавсия этилади:

қисқа муддатли чоралар (0 - 2 йил): радиациявий авариялар мониторингини замон талабларига мос модернизация қилиш, аҳолининг барча қатламларини жалб этган ҳолда радиациявий авариялларда ҳаракат қилишлари бўйича кўникмалар ҳосил қилиш мақсадида амалий-ўқув машғулотлари ўтказиш, аҳолига тақдим этиладиган ахборотнинг шаффофлигини таъминлаш;

ўрта муддатли чоралар (3–5 йил): радиациявий авариялар содир бўлганда аҳолини зудлик билан кўчириш ишларини амалга ошириш учун автоматлаштирилган эвакуация тизимларини йўлга қўйиш, радиацияга қарши янги антидотлар яратиш, таълим тизимида радиациявий авариялларда ҳаракат қилиш, ионлаштирувчи нурланишлардан муҳофазаланиш бўйича курслар ташкил этиш;

узоқ муддатли чоралар (5–10 йил): генетик тадқиқотлар ёрдамида одам организмининг ионлаштирувчи нурланишларга чидамлилигини ошириш усулларини яратиш, ядро ва атом энергетикаси хавфсизлигини таъминлаш бўйича халқаро ташкилотлар (марказлар) билан ҳамкорлик, смарт мониторинг тармоқларини яратиш.

Хулоса.

Радиациявий авариялларда аҳоли хавфсизлигини таъминлаш мураккаб ва кўп қиррали масала бўлиб, унинг ечими фақатгина техник воситаларга боғлиқ эмас. Бу жараён ижтимоий муҳофаза, аҳолининг барча қатламлари орасида тарғибот ишлари, ҳуқуқий базанинг мустаҳкамлиги, тиббий инновациялар ва инновацион ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш билан уйғун ҳолда амалга оширилиши зарур.

Инновацион ечимлардан самарали фойдаланиш орқали:

хавф даражасини тезкор баҳолаш;

аҳолини тезкор эвакуация қилиш жараёнини самарали йўлга қўйиш;

радиациянинг инсон саломатлигига таъсирини минималлаштириш;

ахборот ҳамда маълумотларнинг шаффоф бўлиши ва тезкор етказиш имкониятлари яратилади.

Шу тариқа, халқаро тажриба ва маҳаллий тадқиқотлар натижалари кўрсатганидек, инновацияга асосланган ёндашувлар аҳоли хавфсизлигини таъминлашнинг энг самарали йўли ҳисобланади [7].

Использованные источники:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Радиациявий хавфсизлик тўғрисида”ги Қонуни. 2000 йил 31 август.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 3 апрелдаги 98-сон “Ионлаштирувчи нурланиш манбалари айланишини давлат томонидан ҳисобга олиш ва назорат қилиш тизимини ташкил этиш қоидаларини тасдиқлаш ҳақида” Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 13 августдаги 231-сон “Радиоактив моддалар ва радиоактив чиқиндилар, шунингдек ядровий материаллар айланишини давлат томонидан ҳисобга олиш ва назорат қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида” Қарори.
4. Радиациявий хавфсизликни таъминлашнинг асосий санитар қоидалари (РХТАСҚ-2006, ОСПОРБ-2006).
5. А. Э. Боймирзаев “Радиация хавфсизлиги”, дарслик, Тошкент.2024 й. 366 б.
6. А. Э. Боймирзаев, Р. Бакиров, А. Дехқонов А. “Радиоактив моддалар, улар билан боғлиқ фавқулодда вазиятларда қутқарувчиларнинг ҳаракатлари”. Услубий қўлланма. – Тошкент.: 2014 й. - 35 бет.
7. International Atomic Energy Agency (IAEA). (2015). Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency. Vienna.
8. Чернобыль: уроки и последствия. (2006). Москва: Наука.
9. Турсунов, А. (2018). Радиациявий хавфсизлик ва уни таъминлаш чоралари. Тошкент: Фан.
10. World Health Organization (WHO). (2016). Health consequences of the Fukushima Daiichi accident. Geneva.

УДК 347.42

Буймов Д.В.
студент
Университет Синергия г. Москва

НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация: *В статье рассматриваются проблемы определения правовой природы неустойки в гражданском праве и особенности ее применения в договорных отношениях в условиях реформы гражданского законодательства Российской Федерации. Неустойка традиционно выступает как способ обеспечения исполнения обязательства и одновременно как мера гражданско-правовой ответственности. В нормативных актах и судебной практике разграничение этих функций проводилось непоследовательно, что проявляется, в частности, в отсутствии специальных требований к условиям соглашения о неустойке и в возникающих спорах по поводу ее размера и порядка начисления. Анализируются требования к форме и содержанию соглашения о неустойке, различия между штрафом и пеней как разновидностями неустойки, трудности определения периода просрочки и исчисления размера пени, последствия включения условий об ответственности в договоры участия в долевом строительстве, а также влияние на применение неустойки последних реформ (Постановление Правительства РФ от 18 марта 2024 г. № 326). Особое внимание уделено судебной практике: приводятся выводы Верховного Суда РФ о законности нормативных актов, устанавливающих особенности начисления и списания неустоек. Обобщены тенденции, свидетельствующие о трансформации неустойки из классической меры ответственности в гибкий регуляторный инструмент, служащий балансированию публичных и частных интересов.*

Ключевые слова: *неустойка, пеня, штраф, способ обеспечения исполнения обязательств, гражданская ответственность, договор, реформа гражданского законодательства.*

Buymov D.V.
Student
Synergy University
Moscow

PENALTY: PROBLEMS OF LEGAL NATURE AND USE IN CONTRACTUAL RELATIONS IN THE LIGHT OF CIVIL LAW REFORM

Abstract: *The article analyses the legal nature of the penalty (contractual monetary sanction) in Russian civil law and the peculiarities of its application in contractual relations during the reform of civil legislation. The penalty has traditionally been seen both as a means of securing performance and as a measure of civil liability. However, legislation and judicial practice have not developed a consistent approach to these functions. The paper examines the requirements for agreements on penalties, distinguishing between a penalty imposed as a one-off fine and a periodic penalty (penja), and discusses difficulties in calculating periods of delay and the amount of penalties. It also assesses the impact of recent reforms, including Government Resolution No. 326 of 18 March 2024, which temporarily suspended penalties in shared construction contracts, and summarises Supreme Court decisions confirming the legality of such special regimes. The study concludes that the penalty is evolving from a strict contractual sanction into a flexible regulatory instrument balancing private and public interests.*

Keywords: *penalty, fine, method of ensuring the fulfillment of obligations, civil liability, contract, reform of civil legislation.*

Институт неустойки занимает одно из центральных мест в системе обеспечительных мер и гражданско-правовой ответственности. По смыслу статей 329–333 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1] неустойка может быть предусмотрена законом или договором, выражаться в твердой сумме или процентах, а ее уплата не освобождает должника от исполнения основного обязательства. Неустойка, являясь одновременно способом защиты гражданских прав, способом обеспечения исполнения обязательств и мерой гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, играет крайне важную роль в регулировании договорных отношений. Ее широкое применение обусловлено, с одной стороны, простотой в использовании и реализации, а с другой – спецификой правового регулирования и судебной практики, предполагающей возможность корректировки ее размера в судебном порядке в целях обеспечения баланса интересов сторон договора [10, С.64]. В связи с этим возникает вопрос о ее правовой природе и влиянии реформ гражданского законодательства (особенно новелл 2015–2023 гг.) на применение этого института. Цель настоящей статьи – определить, какие проблемы порождаются двойственным характером неустойки, и показать, как эти проблемы разрешаются законодателем и судами.

Российское законодательство не устанавливает специальных требований к условиям соглашения о неустойке и не выделяет его существенные условия. Вместе с тем отсутствие в договоре ряда положений может привести к признанию условия о неустойке несогласованным или вызвать споры относительно его толкования. К спорным условиям относятся размер (ставка) неустойки, база для ее начисления (цена договора, сумма задолженности, стоимость товаров и т. п.), временной интервал для

начисления пени и указание на то, начисляется ли неустойка на календарные или рабочие дни. В случае установления штрафной неустойки целесообразно прямо указать, что убытки могут быть взысканы сверх нее [4].

Соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Оно может быть оформлено отдельным документом или включено в текст договора. Письменная форма считается соблюденной, если соглашение заключено любым из способов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 434 ГК РФ, что подтверждается постановлением Пленума Верховного Суда РФ (ВС РФ) № 7 от 24 марта 2016 г [4]. Несоблюдение письменной формы ведёт к ничтожности соглашения.

Закон использует термины «штраф» и «пеня» как разновидности неустойки, но не раскрывает отличительные признаки каждого из них. На практике традиционно считается, что штраф взыскивается однократно за каждое нарушение, тогда как пеня начисляется за каждый период времени, в течение которого продолжается нарушение (день, месяц и т.д.). Обычно пеня устанавливается за просрочку исполнения обязательства, а штраф – за иные нарушения, однако законодательство допускает установление штрафа за просрочку и пени за иные виды нарушений. И штраф, и пеня могут быть выражены в твердой сумме или в доле от определённой величины; возможна также прогрессивная шкала неустойки, увеличивающаяся с течением времени. Судебная практика признает возможность комбинированной неустойки, включающей одновременно штраф и пеню; при ее снижении суд исходит из общей суммы штрафа и пени.

Одной из основных практических проблем является определение момента начала и окончания периода просрочки при расчете пени. В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Если срок определён как «10 календарных дней с даты заключения контракта», первым днём срока является день, следующий за датой заключения, что вытекает из статьи 191 ГК РФ. Судебная практика также разъясняет, что если срок установлен «до 30 июля», указанная дата входит в период исполнения, и просрочка начинается со следующего дня.

Важное значение имеет правило о неполучении неустойки за время, необходимое заказчику для приёмки товаров или работ. Верховный Суд РФ указывает, что при расчете пени в период просрочки не включаются дни, потребовавшиеся заказчику для приемки и оформления результатов. Следовательно, моментом фактического исполнения обязательства является передача товара или выполнение работ, а не дата подписания документа о приемке.

Еще один вопрос – включается ли день фактического исполнения обязательства в период начисления неустойки. По позиции Пленума ВС РФ,

день исполнения (уплаты долга, передачи товара, завершения работ) включается в расчетный период [4]. При одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта пеня начисляется до момента прекращения договора, за исключением отдельных случаев договора поставки, где обязательство поставщика восполнить недопоставку прекращается с истечением срока действия договора.

Кредитор вправе реализовать право на получение неустойки добровольно или в судебном порядке. Для ряда договоров законом или договором установлен обязательный претензионный порядок, который должен быть соблюден до обращения в суд. При предъявлении иска одновременно о взыскании основного долга и неустойки претензионный порядок считается соблюденным, если он выполнен в отношении основного долга; если же иск подан лишь о взыскании неустойки, необходимо отдельно соблюсти претензионный порядок.

Судебная практика допускает взыскание неустойки за прошедшие периоды и на будущее время. Истец может требовать присуждения неустойки за период до вынесения решения, а также начисления неустойки на будущее время – до фактического исполнения обязательства. При этом срок исковой давности по требованию об уплате неустойки исчисляется отдельно в отношении каждой суммы неустойки, подлежащей уплате за каждый день просрочки; обычно можно взыскать неустойку за трёхлетний период, предшествующий подаче иска [5].

Права кредитора на неустойку могут быть реализованы и вне суда. В частности, допускается зачет встречных требований, удержание суммы неустойки из платежей должнику или безакцептное списание со счёта должника. Однако даже в этих случаях суд может впоследствии уменьшить сумму неустойки на основании статьи 333 ГК РФ, если признает её явно несоразмерной последствиям нарушения.

Реформа гражданского законодательства сопровождалась принятием подзаконных актов, значительно влияющих на применение неустойки. Наиболее яркий пример – постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» [3], которым установлены специальные правила для договоров участия в долевом строительстве. Документ предусматривает исключение из периода начисления неустойки определённых временных промежутков: в частности, период со дня вступления в силу постановления до 31 декабря 2025 г. не включается в расчёт неустойки по договорам участия в долевом строительстве. Для граждан, заключивших такие договоры для личных и семейных нужд, неустойка не начисляется за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. При определении убытков, подлежащих

возмещению застройщиком участнику долевого строительства, законодатель исключил убытки, причинённые в названный период.

Постановление также предусматривает отсрочку исполнения судебных актов о взыскании неустоек и других санкций до 31 декабря 2026 г., причём в период отсрочки банки и иные кредитные организации не исполняют исполнительные документы на списание сумм неустойки со счетов застройщика.

Законность постановления № 326 была оспорена участниками долевого строительства, но Верховный Суд РФ отказался признавать нормативный акт недействующим. В решении от 16 июля 2024 г. (дело № АКПИ24-452) [6] суд указал, что Правительство РФ действовало в пределах полномочий, предоставленных Федеральным законом, и что постановление принято и опубликовано с соблюдением установленной процедуры. Суд подчеркнул, что статья 18 Федерального закона № 46-ФЗ позволяет Правительству устанавливать особенности применения неустойки по договорам участия в долевом строительстве. Аналогичное правовое положение содержится и в решении Верховного Суда РФ от 28 мая 2025 г. (дело № АКПИ25-181) [8] о законности правил списания неустоек по государственным и муниципальным контрактам; суд отметил, что акты Правительства изданы в пределах полномочий и не нарушают прав административных истцов.

Другие судебные акты (дело № АКПИ25-36) [7] подтвердили правомерность исключения из расчёта неустойки, а также убытков и процентов, периодов, установленных постановлением № 326, указав, что такие меры направлены на поддержание баланса интересов застройщиков и участников долевого строительства в условиях внешних экономических ограничений.

Анализ нормативных актов и судебной практики позволяет выделить следующие тенденции:

1. Двойственная природа неустойки. Закон однозначно относит неустойку к способам обеспечения исполнения обязательств (статья 329 ГК РФ), однако судебная практика рассматривает её прежде всего как меру гражданско-правовой ответственности. Это подтверждают и положения энциклопедии правовых решений, где подчёркивается необходимость предусматривать в соглашении существенные элементы (ставку, базу и период).

2. Разнообразие форм неустойки. Практика допускает использование штрафа, пени и их комбинаций; при этом критерии соразмерности и возможность прогрессивной шкалы позволяют индивидуализировать меру ответственности.

3. Сложности расчета. Судебные споры возникают по поводу определения первого и последнего дня периода просрочки, включения в расчет дней приёмки товара или работ, а также вопроса о том, продолжается ли начисление пеней при одностороннем отказе от договора. Консолидация подходов в постановлениях Пленума ВС РФ уменьшает, но не исключает этих

споров.

4. Публично-правовые ограничения. Периоды невзимания неустойки, установленные постановлением № 326, и механизмы списания санкций по государственным и муниципальным контрактам свидетельствуют о том, что государство рассматривает неустойку как инструмент антикризисного регулирования, а не только как частноправовую санкцию. Верховный Суд РФ подтверждает законность таких вмешательств, что приводит к смещению баланса в сторону публичных интересов.

5. Необходимость дальнейшей реформы. Наличие специальных подзаконных актов, временно приостанавливающих начисление неустойки, указывает на недостаточность общих норм ГК РФ. Для обеспечения единообразия правоприменения требуется более чёткое законодательное разграничение функций неустойки, критериев её соразмерности и оснований для снижения.

Неустойка остается одним из важнейших инструментов гражданского права, однако ее правовая природа и порядок применения продолжают вызывать дискуссии. Двойственный характер неустойки – как обеспечительной меры и меры ответственности – порождает неопределённость и стимулирует судебные споры. Современные реформы гражданского законодательства, включая постановление Правительства РФ № 326, отражают стремление законодателя использовать неустойку для достижения публичных целей и смягчения последствий экономических кризисов. Верховный Суд РФ подтверждает правомерность таких исключений, что свидетельствует о трансформации неустойки из классической частноправовой санкции в гибкий инструмент правового регулирования. В этих условиях особенно важно предусматривать в договорах чёткие условия о размере, базе и порядке начисления неустойки, соблюдать претензионный порядок и учитывать судебные разъяснения по исчислению сроков просрочки. В перспективе необходимы дополнительные законодательные изменения, направленные на устранение противоречий и балансирование интересов участников оборота.

Использованные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.11.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026) // Российская газета, № 80, 12.04.2013.
3. Постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 (ред. от 30.12.2025) «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве»

// Собрание законодательства РФ, 25.03.2024, № 13, ст. 1797.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации, май 2016 г., № 5.
5. Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 16.07.2024 № АКПИ24-452 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими абзацев второго - четвертого пункта 1, пункта 3 постановления Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» // СПС «КонсультантПлюс».
6. Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 19.03.2025 № АКПИ25-36 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим абзаца пятого пункта 1 постановления Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве» (в ред. постановления Правительства РФ от 26.12.2024 № 1916)»// СПС «КонсультантПлюс».
7. Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 28.05.2025 № АКПИ25-181 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующими пунктов 1 – 3, подпунктов «а», «г», «д» пункта 4 изменений которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 783 «Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 340» // СПС «КонсультантПлюс»
8. Гурин О. О некоторых вопросах, связанных с начислением неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение) контракта // Прогосзаказ.рф. 2024. № 8. С. 47 - 68.
9. Зайков Д.Е. Взыскание неустойки и злоупотребление правом: проблемы соотношения и толкования // Российский юридический журнал. 2022. N 6. С. 64 – 73.

Васильева Е.Л.
преподаватель математики
ГБПОУ КК АМТ
Г. Армавир
Костенко А.А., к.псх.н.
доцент
ФГБОУ ВО Армавирский государственный
педагогический университет

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: *в статье рассматриваются вопросы о том, что здоровье учащихся становится приоритетом современной образовательной системы. Здоровьесберегающие технологии позволяют организовать учебный процесс таким образом, чтобы обеспечить гармоничное развитие ученика и минимизировать негативное влияние учебной нагрузки на организм подростка. Настоящая статья посвящена вопросам внедрения здоровьесберегающих подходов на уроках математики, особенно в условиях перехода молодежи в старший школьный возраст.*

Ключевые слова: *здоровьесберегающие технологии, уроки математики, здоровье школьников, когнитивные способности, мотивация к обучению, профилактика утомления, психоэмоциональное состояние, педагогические технологии.*

Vasilyeva E.L.
mathematics teacher
Armavir Krasnodar Krai AMT
Armavir
Kostenko A.A., PhD in Psychology
associate professor
Armavir State Pedagogical University

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract: *This article examines the growing priority of student health in the modern education system. Health-saving technologies enable the educational process to be organized to ensure the harmonious development of students and minimize the negative impact of academic workload on adolescents. This article focuses on the implementation of health-saving approaches in mathematics lessons, especially as young people transition to high school age.*

Keywords: *health-saving technologies, mathematics lessons, student health, cognitive abilities, learning motivation, fatigue prevention, psycho-emotional state, pedagogical technologies.*

Современная образовательная среда характеризуется повышенными требованиями к объему и сложности учебного материала, что зачастую приводит к информационной перегрузке, повышенному уровню стресса и, как следствие, к ухудшению состояния здоровья обучающихся. Особую обеспокоенность вызывает наблюдаемый рост числа детей и подростков с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также психосоматическими расстройствами. В этих условиях внедрение здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) становится не просто желательным, а необходимым условием для создания образовательной среды, способствующей гармоничному развитию личности и сохранению ее физического, психического и социального благополучия.

Уроки математики, являясь одной из ведущих дисциплин в школьной программе, требуют от учащихся значительных когнитивных усилий, концентрации внимания и длительной умственной работоспособности. Это делает их особенно подверженными негативному влиянию учебного процесса без должного применения здоровьесберегающих подходов. Целью данной статьи является анализ возможностей и путей применения здоровьесберегающих технологий на уроках математики как эффективного инструмента повышения качества обучения и профилактики школьных заболеваний.

Подростковый период характеризуется интенсивностью физического роста, повышенной утомляемостью и психоэмоциональной нестабильностью. Уроки математики требуют концентрации внимания, напряжения мыслительных процессов и нередко вызывают стресс у школьников. Поэтому важно интегрировать здоровьесберегающие подходы, способствующие поддержанию физической активности, снижению эмоционального напряжения и повышению эффективности усвоения материала.

Здоровьесберегающая технология представляет собой систему мер, направленных на сохранение здоровья учеников путем организации образовательного процесса с учетом возрастных особенностей организма. Основные направления включают: оптимизация двигательной активности, создание благоприятной психологической атмосферы, рофилактику переутомления, рациональное распределение учебных нагрузок.

Здоровьесберегающие технологии в образовании – это комплекс мер, направленных на создание и обеспечение условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся в процессе обучения. Применительно к урокам математики, ЗСТ представляют собой совокупность педагогических приемов, методов и организационных решений, которые не только обеспечивают оптимальную учебную нагрузку, но и способствуют снижению

утомляемости, профилактике нарушений зрения и осанки, развитию когнитивных функций и формированию адекватного психоэмоционального состояния учащихся.

Значение ЗСТ на уроках математики заключается в:

- Снижении учебной нагрузки: Оптимизация подачи материала, использование вариативных форм работы, чередование видов деятельности.
- Профилактике физических нарушений: Предотвращение сколиоза, близорукости, головных болей за счет специальных упражнений и эргономических решений.
- Повышении когнитивной работоспособности: Стимулирование умственной деятельности, улучшение концентрации внимания, памяти, логического мышления.
- Формировании положительной мотивации: Создание комфортной и поддерживающей атмосферы, снижение уровня тревожности, повышение интереса к предмету.
- Развитии саморегуляции: Обучение учащихся навыкам управления своим состоянием, снятия напряжения, самоконтроля.

Применение ЗСТ на уроках математики оказывает комплексное положительное влияние:

- Снижение утомляемости: Регулярные физкультминутки, гимнастика для глаз и дыхательные упражнения помогают бороться с накопленной усталостью, поддерживая умственную работоспособность на более высоком уровне.
- Улучшение когнитивных функций: Упражнения на концентрацию внимания, памяти, логическое мышление, а также методы, направленные на снятие стресса, способствуют их развитию и повышению эффективности обучения.
- Повышение мотивации к обучению: Атмосфера психологической комфортности, игровой подход, снижение тревожности способствуют формированию положительного отношения к предмету и желанию учиться.
- Профилактика нарушений здоровья: Систематическое включение упражнений для глаз и осанки помогает предотвратить или замедлить развитие соответствующих патологий.
- Формирование саморегуляции: Обучение учащихся навыкам управления своим состоянием способствует развитию их самостоятельности и ответственности за собственное здоровье.
- Здоровьесберегающие элементы в содержании урока:
  - Гимнастика для глаз: Регулярное проведение коротких комплексов упражнений для снятия зрительного напряжения. Примеры: "рисование" глазами фигур, фокусировка на разных расстояниях, массаж век.
  - Упражнения для профилактики нарушений осанки: Включение в разминку или физкультминутки упражнений на формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета. Примеры: вытягивание туловища, сведение лопаток, наклоны корпуса.

- Дыхательные упражнения: Применение простых дыхательных техник для снятия напряжения, улучшения кровообращения, повышения концентрации. Примеры: глубокое диафрагмальное дыхание, дыхание по квадрату.
- Релаксационные приемы: Использование коротких пауз для релаксации, прослушивания спокойной музыки, аутотренинга.

Использование здоровьесберегающих условий:

- Эргономика учебного места: Правильная организация рабочего пространства, обеспечение достаточного освещения, оптимальной температуры и влажности в классе.
- Регулирование интенсивности учебной деятельности: Использование смены видов деятельности, подвижных форм работы, групповых форм обучения.
- Включение двигательной активности: Использование на уроках не только физкультминуток, но и заданий, требующих передвижения по классу (например, решение задач у доски, работа в парах с перемещением).

Хотелось бы показать несколько примеров конкретных здоровьесберегающих технологий на уроках математики

- "Математическая зарядка": В начале урока или после интенсивных когнитивных нагрузок могут проводиться короткие комплексы упражнений. Например:
  - *Для глаз:* "Нарисуем" цифры глазами, посмотрите вдаль, потом на кончик носа (3-5 раз).
  - *Для осанки:* Потянитесь вверх, выпрямляя позвоночник, сведите и разведите лопатки.
  - *Для расслабления:* Встряхните кистями рук, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
- "Игровой математический блок": Введение элементов игры для отработки навыков. Например, вместо стандартного устного счета – "Цифровой баскетбол" (броски мяча в корзину при правильном ответе) или "Математический квест" (решение задач для получения подсказок).
- "Упражнения на концентрацию внимания": Использование заданий, требующих сосредоточенности, но при этом не вызывающих сильного стресса. Например, "Найди лишнее число" в ряду, "Продолжи последовательность" с элементами закономерности.
- "Визуальные паузы": При изучении сложных тем, предоставление коротких пауз для переключения внимания. Учитель может проговорить аффирмации, связанные с уверенностью в своих силах, или показать короткое мотивирующее видео.
- "Интерактивная доска и здоровье": Применение интерактивной доски не только для демонстрации материала, но и для активного вовлечения учеников в процесс, выполнения упражнений, требующих от них движений.

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках математики является не только актуальной, но и необходимой составляющей

современного образовательного процесса. Комплексный подход, включающий организационно-методические решения, здоровьесберегающие элементы в содержании урока и создание комфортных условий, позволяет оптимизировать учебную нагрузку, повысить когнитивные способности учащихся, укрепить их здоровье и сформировать устойчивую мотивацию к изучению предмета. Учитель математики, выступая инициатором и проводником ЗСТ, играет ключевую роль в создании образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности школьника, сохраняя и укрепляя его здоровье.

Использованные источники:

1. Шишова Л.Н. Здоровьесберегающая деятельность в процессе обучения математике // Вестник науки и образования. – 2017. – №1 (25). – С. 128-130.
2. Яковлева Н.В. Мониторинг и оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 132 с.
3. Калинина Н.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе: Методическое пособие. – М.: Сфера, 2009. – 156 с.
4. Алиев А.А., Ахмедов Р.А. Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 2). – С. 337-340.
5. Зайцева Н.В., Короткова А.Н. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках математики // Образование и воспитание. – 2019. – № 1 (17). – С. 10-13.

Вафоева Н.А.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ

Аннотация: *В данной статье изучается влияние желудочной секреции на ревматические заболевания. В исследование включены данные за 3 года. В исследование были включены 60 женщин и 40 мужчин с ревматическими заболеваниями, всего 100 пациентов в возрасте до 30 лет. Для исследования ежедневно давали отвар, приготовленный из капустного сока по методу Рисс-Петрова. По результатам анализов, повысилась гиперсекреция и гастромукопротеин. Наблюдалось нарушение кровообращения на 1-2 степени и тошнота.*

Ключевые слова: *Ревматизм, желудок, пациент, метод Рисс-Петрова, гиперсекреция, гастромукопротеин, нарушения кровообращения, гипосекреция.*

Vafoeva N.A.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

GASTRIC SECRETION DISORDERS IN RHEUMATISM

Abstract: *This article examines the impact of gastric secretion on rheumatic diseases. The study included data spanning three years. Sixty women and 40 men with rheumatic diseases were included, for a total of 100 patients under 30 years of age. For the study, subjects were given a cabbage juice decoction daily using the Riess-Petrov method. Test results revealed increased hypersecretion and gastromucoprotein. Circulatory impairment of grades 1-2 and nausea were observed.*

Keywords: *Rheumatism, stomach, patient, Riess-Petrov method, hypersecretion, gastromucoprotein, circulatory impairment, hyposecretion.*

Введение. Наиболее характерной чертой современного больного является полиморбидность. В клинической практике важное значение имеет изучение частных проявлений синтропий (закономерное сочетание разных заболеваний в одном организме), дистропий (закономерно редкое или невозможное сочетание разных болезней в одном организме) и интерференции (влияние одного заболевания на течение другого). При наличии синтропии практический интерес представляет изучение конкретных

характеристик и раскрытие основных тенденций развития двух заболеваний: одновременное развитие, последовательное развитие второй болезни относительно первой [1,2,3]. На фоне меняющегося патоморфоза нозологических форм это становится затруднительным. Для формирования предопухолевых заболеваний желудка важную роль играет состояние секреторной функции желудка. При этом ее нарушения чаще всего обусловлены морфологическими изменениями, а именно прогрессирующей атрофией слизистой оболочки с поражением главных желудочных желез и дисрегенераторными процессами в слизистой оболочке желудка [4,5]. В воспаление и дистрофический процесс могут вовлекаться как обкладочные клетки, так и главные клетки, что приводит к уменьшению выделения соляной кислоты и пепсиногенов, а эти специализированные клетки в процессе атрофии замещаются мукоцитами. В последние годы важная роль в развитии и рецидивировании эрозивных и язвенных поражений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки отводится изменениям микроэкологии желудочно-кишечного тракта, которые характеризуются избыточным ростом мукозной микрофлоры и повышением ее агрессивных свойств [6,7]. Функциональное состояние органов пищеварения при ревматизме изучено недостаточно. Известно, что больные ревматизмом нередко предъявляют жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Цель исследования. Целью настоящей работы служит изучение состояния некоторых функций желудка у больных ревматизмом. При оценке состояния желудка учитывались данные секреции, кислотности, пепсина, слизи, хлоридов, гастромукопротеина, белков, желудочного сока, скорости эвакуации пробного завтрака и выделение нейтрал рота (экскреторная функция).

Материалы и методы исследования. Исследования проводились фракционным методом с использованием в качестве пробного завтрака капустного отвара по Рысс-Петровой. Под наблюдением находились 100 больных ревматизмом. Из них было 60 женщин, 40 мужчин. Большинство больных было моложе 30 лет. 72% обследованных страдали ревматизмом более трех лет.

Результаты исследования. Активная фаза ревматизма отмечалась у 76% больных (у 15% больных - первая ревмоатака) и неактивная - у 24%. Порок того или иного клапана констатирован у 78% больных. У 46% больных были явления нарушения кровообращения 1-11 степени. 44% больных предъявляли диспептические жалобы. Как видно, патологические изменения секреции отмечены у 60% больных (причем у 35% была гиперсекреция, у 25% гипосекреция); кислотности - у 77% (повышенная - у 59%, пониженная - у 18%); переваривающей силы - у 60% (повышенная у 41%, пониженная у 18%); гастромукопротеина - у 67% (повышен у 38, понижен у 29%); эвакуаторной функции - у 74% (ускоренная - у 34, замедленная - у 40% больных); экскреторной функции - у 75% больных. У 47 больных в желудочном соке содержалось значительное количество слизи. Заметные изменения

наблюдались и со стороны белков желудочного сока. Средние показатели хлоридов сока по Фольгарду составляли 311 мг%. Натощак повышенные цифры кислотности отмечены у 18%, пепсина - у 31%, гастромукопротеина - у 40% больных. Гиперсекреции натощак не наблюдалось. Средние показатели хлоридов составляли 291 мг%. При первичном ревматизме чаще наблюдались у больных гиперсекреция и замедленная эвакуация, а при недостаточности кровообращения гипосекреция и ускоренная эвакуация.

Вывод. При ревматизме наблюдаются значительные сдвиги со стороны основных функций желудка, которые надо учитывать в клинической практике. На ранних стадиях (активная фаза, начало заболевания) нередко отмечается повышенная или нормальная секреция соляной кислоты (гиперсекреция или нормоацидное состояние). При длительном течении, особенно при затяжных и рецидивирующих формах, чаще развивается снижение секреторной функции - гипоацидное или анацидное состояние. Это проявляется в виде хронического атрофического гастрита с выраженной секреторной недостаточностью.

Использованные источники:

1. Аруин Л.И. Новая международная классификация дисплазий слизистой оболочки желудка // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2002. - № 3. - С. 15-17.
2. Акимова, М.А. Язвенная болезнь, ассоциированная с дисплазией соединительной ткани: клиника, течение, лечебная тактика / М.А. Акимова, Г.И. Нечаева, И.А.Викторова // Сибирский мед. журнал. -2007. С. 56-59.
3. Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени //Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6.
4. Вафоева Н. А. Особенности клинической картины хронического пиелонефрита у женщины //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 18-2 (96). – С. 92-94.
5. Маматалиев А. Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – С. 692-695.
6. Mamataliev A. R. NEUROHISTOLOGICAL CHANGES IN THE VAGUS NERVE UNDER THE INFLUENCE OF COLCHICINE IN AN EXPERIMENT //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 310-312.
7. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.

Волошина Н.Н.
учитель физической культуры,
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
основная общеобразовательная школа
№ 23 имени Надежды Шабатько
г. Новокубанск
Костенко А.А., к.псх.н.
доцент
ФГБОУ ВО Армавирский государственный
педагогический университет

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация: *в статье рассматривается проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся в условиях современного образовательного процесса, акцентируется внимание на роли уроков физической культуры как одного из ключевых инструментов формирования здорового образа жизни. Представлен анализ спектра здоровьесберегающих технологий, применяемых на данных занятиях, их классификация, а также конкретные примеры применения. Особое внимание уделяется роли педагога как инициатора и носителя здоровьесберегающей парадигмы, а также перспективам интеграции современных инновационных подходов.*

Ключевые слова: *здоровьесберегающие технологии, уроки физической культуры, здоровье обучающихся, физическое развитие, двигательная активность, мотивация, профилактика, здоровый образ жизни.*

Voloshina N.N.
physical education teacher
Nadezhda Shabatko Municipal Autonomous Educational Institution
Secondary Comprehensive School No. 23, Novokubansk
Kostenko A.A., PhD in Psychology
associate professor
Armavir State Pedagogical University

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: WAYS TO ENHANCE THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: *This article examines the issue of maintaining and improving students' health in the modern educational environment, focusing on the role of physical education classes as a key tool for fostering a healthy lifestyle. An analysis of the range of health-saving technologies used in these classes, their classification,*

and specific application examples are presented. Particular attention is paid to the role of the teacher as the initiator and bearer of a health-saving paradigm, as well as the prospects for integrating modern innovative approaches.

Key words: *health-saving technologies, physical education lessons, students' health, physical development, motor activity, motivation, prevention, healthy lifestyle.*

Современная система образования сталкивается с комплексом вызовов, связанных с ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения. Изменения в образе жизни, увеличение учебной нагрузки, недостаточная двигательная активность и прогрессирующая информатизация приводят к росту числа учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, снижению их физической работоспособности и общего уровня жизнеспособности. В этом контексте уроки физической культуры приобретают особую значимость, выступая не только как средство освоения двигательных навыков и развития физических качеств, но и как мощный ресурс для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Переход к здоровьесберегающей парадигме в образовании требует от педагогических коллективов, и в особенности от учителей физической культуры, освоения и активного применения специальных технологий, направленных на минимизацию негативного воздействия образовательной среды и максимизацию позитивного влияния на физическое и психическое благополучие учащихся.

Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) на уроках физической культуры – это совокупность целенаправленных, системно организованных педагогических воздействий, направленных на формирование основ здорового образа жизни, развитие физических качеств, укрепление здоровья и профилактику заболеваний обучающихся через рациональную организацию учебного процесса, создание благоприятной психологической и гигиенической среды, а также использование индивидуализированных подходов.

Сущность ЗСТ на уроках физкультуры заключается в: оптимизации двигательной активности: Обеспечение адекватной по интенсивности и объему физической нагрузки, ее вариативности и соответствия индивидуальным возможностям учащихся; создании условий для всестороннего развития: Гармоничное развитие всех систем организма, формирование осанки, координации движений, ловкости, быстроты, силы и выносливости: формировании ценностного отношения к здоровью: воспитание осознанного отношения к своему здоровью, понимание его значимости, формирование мотивов к занятиям физической культурой и спортом; профилактике заболеваний и травм: Целенаправленные меры по предотвращению развития хронических заболеваний, снижение рисков получения травм во время занятий; создании психологически комфортной

среды: Формирование позитивной мотивации, снижение уровня стресса, создание ситуации успеха для каждого ученика.

Разнообразие ЗСТ, применяемых на уроках физкультуры, позволяет классифицировать их по различным критериям. Практически значимой является классификация, предложенная Н.К. Смирновым (2003), которая включает следующие группы:

1. Технологии, основанные на рациональной организации учебного процесса:

- Индивидуализация и дифференциация: Учет особенностей физического развития, состояния здоровья, уровня подготовленности и интересов учащихся. Примеры: выполнение разных вариантов упражнений, определение индивидуальных норм нагрузки, распределение по группам в зависимости от подготовленности.

- Вариативность и цикличность: Чередование видов физической активности, применение различных форм и методов обучения, систематизация нагрузок. Примеры: смена видов спорта в течение года, использование игровых методов, организационное оформление урока (разминка, основная часть, заминка).

- Эмоциональная насыщенность: Создание атмосферы психологической комфортности, использование игровых форм, юмора, соревновательных моментов, поощрение.

- Оптимизация динамики умственной и физической работоспособности: Грамотное чередование нагрузок и отдыха, использование различных упражнений на разных этапах урока.

2. Технологии, обусловленные спецификой предмета "Физическая культура":

- Здоровьеформирующие технологии: Комплексы упражнений, направленные на развитие определенных физических качеств, укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Примеры: упражнения для формирования правильной осанки, дыхательные упражнения, направленные на улучшение вентиляции легких, упражнения для развития координации.

- Здоровьеукрепляющие технологии: Технологии, направленные на закаливание организма, повышение его сопротивляемости к неблагоприятным факторам. Примеры: использование воздушных ванн, обливаний (при наличии условий), оптимизация температурно-влажностного режима в зале.

- Здоровьесберегающие технологии: Технологии, направленные на профилактику травматизма и снятие мышечного и психического напряжения. Примеры: тщательная разминка и заминка, обучение правильной технике выполнения упражнений, использование элементов релаксации, йоги, самомассажа.

3. Технологии, использующие новые подходы к обучению:

- Игровой метод: Активное использование подвижных игр, эстафет, спортивных игр для развития физических качеств и формирования мотивации.

- Соревновательный метод: Использование соревнований как средства повышения мотивации, но с акцентом на преодоление себя, а не только на победу над соперником.

- Интерактивные технологии: Использование мультимедийных средств, интерактивных тренажеров, видеоматериалов для демонстрации упражнений, объяснения техники, контроля выполнения.

- Туристско-краеведческая деятельность: Организация походов, экскурсий, спортивных туристических слетов, способствующих активному отдыху и познанию окружающей среды.

Учитель физической культуры является ключевой фигурой в процессе внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий. Его профессиональная компетентность, личностные качества и педагогическая позиция определяют успешность этого процесса. Задача учителя состоит не только в передаче знаний и формировании умений, но и в создании условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учеников.

Основными аспектами деятельности учителя являются: профессиональная подготовка и глубокие знания в области возрастной физиологии, педагогики, психологии, методики преподавания физической культуры, а также владение различными здоровьесберегающими технологиями; личный пример: демонстрация приверженности здоровому образу жизни, активная жизненная позиция; формирование мотивации: стимулирование интереса к занятиям физкультурой через разнообразные формы и методы, создание ситуации успеха, поощрение; индивидуальный подход: внимательное отношение к каждому ученику, учет его физических возможностей, состояния здоровья, психологических особенностей; создание безопасной среды: обеспечение безопасности на занятиях, профилактика травматизма, контроль за исправностью инвентаря; просветительская деятельность: проведение бесед, лекций о здоровом образе жизни, правильном питании, режиме дня, гигиене.

Дальнейшее совершенствование системы здоровьесбережения на уроках физкультуры предполагает:

1. Интеграцию новых технологий: Активное использование цифровых образовательных ресурсов, VR/AR-технологий, фитнес-трекеров для мониторинга физической активности и персонализации нагрузки.
2. Развитие системы ранней диагностики: Более тесное взаимодействие с медицинскими работниками для своевременного выявления и коррекции проблем со здоровьем.
3. Межпредметные связи: Интеграция вопросов здоровья и физической культуры в содержание других учебных предметов (биология, ОБЖ, психология).
4. Вовлечение родителей: Активное привлечение родителей к формированию здорового образа жизни детей, проведение совместных мероприятий.

5. Научно-методическое сопровождение: Постоянное проведение исследований, разработка новых методик и технологий, обмен опытом между педагогами.

Здоровьесберегающие технологии являются неотъемлемой частью современного урока физической культуры. Их целенаправленное и систематическое применение позволяет не только повысить эффективность образовательного процесса, но и существенно улучшить показатели здоровья обучающихся, сформировать у них устойчивую потребность в здоровом образе жизни, что является залогом успешной социализации и полноценного развития личности. Дальнейшее развитие и внедрение ЗСТ требует комплексного подхода, активной позиции педагогов, поддержки администрации образовательных учреждений и вовлеченности всего педагогического сообщества.

Использованные источники:

1. Смирнов Н.К. Педагогика здоровья. – М.: АРКТИ, 2003. – 160 с.
2. Виленский М.Я., Пономаренко В.А. Управление двигательной активностью. – М.: Советский спорт, 2007. – 360 с.
3. Попова Т.В. Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры // Молодой ученый. – 2019. – № 10 (248). – С. 364-366.
4. Бальсевич В.К. Феномен спортивного воспитания // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 7. – С. 2-6.
5. Здоровьесберегающая деятельность учителя физической культуры: учебно-методическое пособие / под ред. Л.Б. Коваль. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 190 с.

УДК.612.014.4

Галимова Л. Г.
старший преподаватель
«Центр симуляции чрезвычайных ситуаций» Институт гражданской защиты при Академии МЧС Республики Узбекистан

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ

***Аннотация**: В данной статье рассматриваются три основные группы факторов, влияющих на выживание человека в экстремальной обстановке.*

***Ключевые слова:** экстремальная ситуация, техногенная катастрофа, стихийное бедствие, антропологические факторы, природно-средовые факторы, психофизиология, когнитивная сфера*

Galimova L.G.
senior lecturer
"Center for Simulation of Emergency Situations" Institute of Civil Protection of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan

FACTORS AFFECTING HUMAN SURVIVAL IN AN EXTREME ENVIRONMENT

***Abstract:** This article examines three main groups of factors that affect human survival in an extreme environment*

***Key words:** extreme situation, man-made disaster, natural disaster, anthropological factors, environmental factors, psychophysiology, cognitive sphere*

Ежегодно значительное количество научных экспедиций, поисковых отрядов, промысловых партий и туристических групп направляется в удаленные регионы: арктические широты, труднодоступные районы тайги, засушливые пустыни и акватории Мирового океана. Нередко данные группы попадают в условия, представляющие угрозу не только для реализации поставленных задач, но и для жизни участников. В связи с этим возникает необходимость владения базовыми компетенциями, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья в критических ситуациях в различных природно-климатических зонах.

Проблема выживания человека в экстремальных условиях остается одной из наиболее актуальных в современной антропологии и психологии безопасности. В контексте глобальных климатических изменений и техногенных вызовов субъект зачастую оказывается в обстоятельствах, выходящих за рамки привычного адаптивного опыта. Выживание в подобных условиях рассматривается не как случайное стечение обстоятельств, а как

сложный динамический процесс, в котором биологические резервы организма взаимодействуют с психологической устойчивостью и экзогенными факторами.

Выживание в экстремальной ситуации определяется как способность сохранять жизнь, здоровье и работоспособность (биологическую и психологическую целостность) в условиях воздействия опасных факторов, существенно отклоняющихся от нормы. Данный процесс предполагает активное противодействие угрозам, что включает обеспечение организма водой, возведение временных укрытий, оказание первой помощи, ориентирование на местности и поддержание психоэмоциональной стабильности. Экстремальная ситуация представляет собой не только внешнюю угрозу, но и объективный критерий устойчивости психофизиологической структуры человека. При возникновении техногенных катастроф, стихийных бедствий или в условиях автономного существования в дикой природе ключевое значение приобретают факторы, детерминирующие сохранение жизни субъекта.

Эффективность жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) определяется комплексным взаимодействием экзогенных условий и эндогенных ресурсов субъекта. В рамках концепций МЧС и психологических исследований безопасности жизнедеятельности выделяют три основные группы детерминант: антропологические (личностные), природно-средовые и материально-технические. Совокупность данных факторов обуславливает не только сохранение биологического гомеостаза, но и возможность принятия рациональных решений в условиях выраженного дистресса.

1. Антропологические (личностные) факторы

Данная группа факторов объединяет внутренние ресурсы индивида, определяющие его резистентность к внешним угрозам. В условиях экстремального воздействия (техногенные катастрофы, социальная изоляция, автономное существование в природной среде) психологическая готовность выступает доминирующим компонентом выживаемости. Согласно статистическим данным, в начальной фазе катастрофы около 75% пострадавших демонстрируют состояние аффективного оцепенения (ступора). Личностный фактор в данном контексте проявляется через латентный период реакции на стресс — временной интервал, необходимый для перехода от дезориентации к осознанному целеполаганию.

Согласно принципу психологической устойчивости, в критической ситуации субъект демонстрирует уровень не ожидаемых достижений, а актуальной психофизиологической подготовки. Отсутствие волевой установки на выживание может привести к летальному исходу даже при наличии специальных навыков.

Структура антропологических факторов включает в себя:

Психофизиологический компонент: тип темперамента, адаптивный потенциал и биологическая устойчивость организма.

Психологический компонент: волевая регуляция, стрессоустойчивость и мотивация к сохранению жизни.

Когнитивный компонент: скорость принятия решений в условиях дефицита времени, креативность и прогностические способности.

Праксеологический компонент: владение алгоритмами действий при пожарах, наводнениях и авариях, навыки топографического ориентирования и оказания первой доврачебной помощи.

2. Природно-средовые факторы

Данная группа включает совокупность внешних условий, оказывающих непосредственное физиологическое воздействие на организм человека. К ним относятся:

- **Температурный режим:** экстремально низкие значения (риск развития гипотермии) или аномально высокие показатели (угроза гипертермии и дегидратации).
- **Влажность воздуха:** высокая влажность ингибирует процессы терморегуляции за счет замедления испарения пота, в то время как низкая — интенсифицирует транспирацию и потерю влаги через респираторную систему.
- **Ветровая нагрузка:** усиливает конвективную потерю тепла (согласно ветро-холодовому индексу), создает механические препятствия для передвижения и затрудняет использование пиротехнических средств или разведение огня.
- **Атмосферные осадки:** дождь и мокрый снег приводят к намоканию элементов одежды, что увеличивает теплопроводность материалов и ускоряет охлаждение организма в среднем в 20 раз.
- **Инсоляция:** избыточная солнечная радиация в условиях высокогорья или аридных зон обуславливает риск получения термических ожогов и фотокератита («снежной слепоты»).

Помимо климатических условий, критическое значение имеет **ландшафтно-географическая характеристика** местности. Особенности рельефа (горный массив, заболоченная местность) детерминируют сложность эвакуационных мероприятий. К числу жизненно важных средовых факторов также относится наличие гидрологических ресурсов (доступ к питьевой воде) и материалов, пригодных для возведения временных защитных сооружений.

3. Материально-технические факторы

Материально-техническое обеспечение представляет собой совокупность инструментальных средств, направленных на минимизацию рисков и поддержание жизнедеятельности в экстремальных условиях. Эффективность автономного существования напрямую коррелирует с качеством и составом следующего оснащения:

- **Экипировка:** защитные свойства одежды и обуви, соответствующие климатическим условиям.

- **Инструментарий и средства жизнеобеспечения:** наличие многофункциональных ножей, осветительных приборов, специализированных средств розжига и навигационного оборудования.
- **Коммуникации и сигнализация:** использование мобильных средств связи, радиостанций, а также визуальных и акустических сигнальных устройств (гелиографы, свистки) для инициации поисково-спасательных операций.
- **Медицинское обеспечение:** наличие индивидуальной аптечки, укомплектованной средствами гемостаза и антисептической обработки ран.

Классификация специфических угроз и поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях

Эффективность стратегии выживания также детерминирована учетом специфических поражающих факторов, характерных для конкретных типов природных и техногенных катастроф (землетрясений, обрушений зданий, аварий на производстве). К основным группам угроз относятся:

Механические факторы:

Ударная волна, вызывающая баротравмы, контузии и повреждения внутренних органов.

Вторичные поражающие элементы (осколки остекления, фрагменты конструкций).

Механическая асфиксия и компрессия тканей, возникающие при завалах и приводящие к развитию синдрома длительного сдавления (краш-синдром).

Химические и токсикологические факторы:

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), такие как хлор или аммиак, оказывающие ингаляционное и резорбтивное воздействие.

Продукты горения, в частности монооксид углерода (CO), представляющий высокую опасность ввиду отсутствия органолептических свойств (запаха, цвета) и способности вызывать стремительную гипоксию и потерю сознания.

Природные токсины (яды растительного и животного происхождения).

Биологические факторы: риск возникновения эпидемий и распространения инфекционных заболеваний через контаминированные водные источники, векторы (насекомых) или при контакте с дикой фауной.

Психофизиологические факторы: иррациональное поведение, паника и массовый аффект, способные парализовать волю субъекта и дезорганизовать процесс эвакуации. Острый стресс и шоковые состояния рассматриваются как значимые антропологические риски, снижающие резистентность человека к иным угрозам.

Учет индивидуальных особенностей при оказании помощи

При планировании мероприятий по обеспечению безопасности необходимо учитывать дифференцированные потребности различных категорий пострадавших. Энергозатраты, терморегуляция и потребность в специфической медицинской поддержке варьируются в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. В частности, лица с ограниченными

возможностями здоровья и иные маломобильные группы населения требуют специализированного подхода при формировании аварийных комплектов и разработке протоколов экстренной эвакуации.

Заключение

Подводя итог, следует констатировать, что выживание в экстремальных условиях представляет собой процесс, эффективность которого детерминирована динамическим взаимодействием трех ключевых групп ресурсов. В то время как природные факторы остаются константными, а материально-технические средства подвержены риску утраты, именно антропологические характеристики субъекта являются фундаментальным и наиболее устойчивым элементом данной системы.

Результат адаптации к критическим обстоятельствам достигается за счет баланса следующих компонентов:

Личностный ресурс (субъект действия): Выступает базисом выживаемости. Волевая регуляция, психоэмоциональная устойчивость и когнитивные установки определяют рациональность использования оставшихся резервов организма. Интеллектуальный компонент позволяет трансформировать факторы внешней среды из деструктивных в обеспечивающие жизнедеятельность.

Средовой ресурс (пространство действия): Климатические, ландшафтные и биосферные характеристики задают объективные границы деятельности. Не имея возможности изменять экзогенные параметры (погоду, рельеф), субъект обязан адаптироваться к их агрессивному воздействию и эксплуатировать имеющиеся природные ресурсы (источники воды, пищевые ресурсы, естественные укрытия).

Материальный ресурс (инструментарий действия): Наличие специализированного снаряжения существенно повышает вероятность благоприятного исхода, минимизируя временные затраты и сохраняя внутренние энергетические ресурсы организма.

Несмотря на уникальность каждой экстремальной ситуации, алгоритм успешной адаптации остается инвариантным. В условиях, когда средовые факторы формируют прямую угрозу, а материальные ресурсы ограничены, именно антропологические факторы приобретают статус решающего звена. Таким образом, выживание следует рассматривать не только как процесс противодействия внешним угрозам, но и как высшую форму психофизиологической саморегуляции человека.

Использованные источники:

1. Волович В. Г. Академия выживания: человек в экстремальных условиях природной среды. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. — 347 с.
2. Гостюшин А. В. Энциклопедия выживания и безопасности. — М.: АСТ, 2021. — 512 с.

3. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. — М.: Академический проект, 2020. — 421 с.
4. Лебедев В. И. Психология в экстремальных ситуациях. — М.: Юрайт, 2023. — 256 с.
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. — 384 с.

Гаффоров Х.Х.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕТИЛВИНИЛПИРИДИНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. *В эксперименте на крысах изучено влияние метилвинилпиридина на головной мозг при пероральном введении раствора в течение 15 дней. Ткань мозга фиксировали в жидкости Карнуа и 10%-ном формалине. Гистологическое исследование (гематоксилин-эозин, метод Ниссля) выявило полнокровие оболочек и паренхимы мозга, стаз в капиллярах, дистрофические изменения нейроглии и выраженное набухание нейроцитов.*

Ключевые слова: *эксперимент, крысы, метилвинилпиридин, головной мозг, гематоксилин-эозин, метод Ниссля, нейроциты.*

Gafforov Kh.Kh.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM UNDER EXPERIMENTAL EXPOSURE TO METHYL VINYL PYRIDINE

Abstract. *The effect of methylvinylpyridine on the brain was studied in rats after oral administration of the solution for 15 days. Brain tissue was fixed in Carnoy's solution and 10% formalin. Histological examination (hematoxylin and eosin, Nissl method) revealed congestion of the meninges and brain parenchyma, capillary congestion, degenerative changes in neuroglia, and pronounced swelling of neurons.*

Keywords: *experiment, rats, methylvinylpyridine, brain, hematoxylin and eosin, Nissl method, neurons.*

Введение. Пиридиновые основания, в том числе метилвинилпиридин (МВП), применяются в производстве синтетического каучука, латексов, пластмасс, ионообменных смол и других материалов. Широкое использование пиридинов в народном хозяйстве ведет к контакту с ними большого числа людей, поэтому в определенных условиях возможно токсическое воздействие этих веществ на работающих [1,2,3]. Известно двоякое действие пиридина: местное, раздражающее слизистую оболочку и кожу, и общетоксическое

проявляющееся преимущественно в поражении центральной нервной и сосудистой систем. В условиях клиники описано угнетение центральной нервной системы, напоминающее отравление наркотическими веществами [4,5,6,7]. Данные морфологических исследований нервной системы при отравлении организма пиридином малочисленны и несистематизированные, а в отношении МВП они вообще отсутствуют. Задачей нашей работы являлось изучение биологического действия этого пиридинового основания на головной мозг животных.

Цель исследования. Изучить морфологический изменения центральной нервной системы под воздействием метилвинилпиридина в экспериментальных условиях.

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовано 55 белых крыс, подразделенных на з опытных и I контрольную группу. Для 15-дневной пероральной затравки расчетным путем были приготовлены водные растворы МВП, содержащие 1/7, 1/4 и 1/21 от DL- 100 (DL_{100}МВП=1,4 г/кг веса). Это составило в мг/кг веса животных для первой группы – 200, для второй - 100 и для третьей - 66. Крысам контрольной группы в одни и те же утренние часы вводилась водопроводная вода. Подопытные и контрольные животные забивались путем декапитации. Головной мозг фиксирован в жидкости Карнуа и 10% нейтральном формалине с последующей заливкой и целлоидин, парафин и желатин. Сагиттальные и фронтальные срезы окрашивались гематоксилин-эозином, по методу Ниссля.

Результаты исследования. При микроскопическом изучении препаратов головного мозга животных опытных группи были установлены однотипные изменения, выраженные в различной степени. Поэтому мы даем суммарное описание всего материала. Вещество мозга и мягкая мозговая оболочка были переполнены кровью. Значительная гиперемия с капиллярными стазами более выражена в области основания мозга, среднем и продолговатом мозгу. Иногда в таких сосудах встречались лейкоцитарные стазы, а также наблюдался диапедез эритроцитов и плазматическое пропитывание окружающей мозговой ткани. Отмечена неравномерность кровенаполнения с чередованием паралитически расширенных, переполненных кровью и спавшихся сосудов. Это особенно заметно в лобной зоне коры больших полушарий, аммоновом роге и ядрах основания мозга. Изредка наблюдалась резкая извитость капилляров, что указывает на понижение тонуса их стенки. Эндотелий кровеносных сосудов выглядел измененным: некоторые эндотелиальные клетки становились светлыми, увеличенными в объеме. Ядра в таких клетках едва конструировались, внутренняя структура в них была неразличима. Иногда наблюдалась десквамация эндотелия. В сосудистом сплетении также заметны паралитически расширенные и спавшиеся кровеносные сосуды. Местами отмечены диапедезные кровоизлияния. Эпителий хориоидного сплетения и эпендима, выстилающая стенки мозговых желудочков, в некоторых участках значительно изменены. Наблюдалось набухание отдельных клеток,

чередование бледных, увеличенных в размерах эпендимных клеток и клеток уплощенных, с пикнотичным гиперхромным ядром. В нейронах различных областей коры отмечены явления хроматолиза, изредка - вакуолизация. Очень редко встречались сморщенные, интенсивно окрашивающиеся клетки с резко извитыми верхушечными дендритами. В нейронах таламо - гипоталамической области отмечен хроматолиз, местами тотальный. появлялись клетки - тени, вакуолизация нейронов со значительным снижением реакции Ниссля. Здесь больше, чем в коре, встречалось деформированных гиперхромных клеток. В крупных нейронах среднего и продолговатого отмечалось «скелетирование» цитоплазмы нейронов. В некоторых ядрах большая часть нервных клеток была в состоянии резкого хроматолиза, ядро почти не определялось. Вокруг подобных клеток скапливалось больше, чем обычно, глиальных элементов и наблюдалось картины нейронофагии. Среди клеток Пуркинье мозжечка были заметны нейроны в состоянии почти полного хроматолиза и сморщенные, потерявшие обычную грушевидную форму нервные клетки, тотально закрашивающиеся тионином. Встречались явления выпадения целых групп клеток Пуркинье. При изучаемой подострой форме интоксикации мы отметили также реакцию нейроглии. Появлялись в основном одиночные волокнистые бледно окрашивающиеся астроциты. Последние имели небольшое количество отростков, иногда подвергающихся фрагментации. Единичные микроглиоциты встречались в белом веществе мозжечка, у ядер основания мозга. Они слабо воспринимали окраску, их отростки были лишены вторичных ветвлений. Вблизи стромы сосудистого сплетения отмечено появление грубых, гиперимпрегнированных микроглиоцитов. Очень редко встречались мелкие. микроглиальные узелки.

Вывод. Таким образом при подостром отравлении организма МВП появляются резкие сосудистые расстройства и дистрофические изменения нейроглиального аппарата. При диффузном характере этих изменений наибольшая их степень отмечена в коре больших полушарий, таламогипоталамической области, и стволе мозга. Нарушение циркуляторных процессов, отмеченное нами при интоксикации МВП, несомненно, способствует распространению и усугублению патологических изменений нейронов и глии. В нервных клетках отмечены явления. хроматолиза, вакуолизации, появление сморщенных, гиперхромных нейронов, а также клеток - теней. Параллельно с нейронами изменилась и глияОтмеченный при подостром отравлении МВП факт сочетанного изменения нейронов и глии указывает на их физиологическое единство. Значительное поражение при отравлении глиального аппарата, несомненно, препятствует развитию компенсаторных защитных реакций со стороны нейронов.

Использованные источники:

1. Аветисян Э.А. Участие септальных ядер в регуляции активности ваго-сенситивных нейронов ядра солитарного тракта у кошек // Росс, физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2002. Т. 88. № 12. С. 1512-1520.

2 Бекмурадова М. С., Холтураев А. Т., Гаффаров Х. Х. Влияние ингибиторов протонной помпы на степень развития печеночной энцефалопатии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62). – С. 88-91.
3. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
4. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузрья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6 Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени //Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6.
7. J K Wamsley, M A Zarbin, M J Kuhar. Muscarinic cholinergic receptors flow in the sciatic nerve. PMID: 6167327.DOI: 10.1016/0006-8993(81)90193-1

Гулманова Н. Б.
магистрантка II курса
Национального педагогического университета
Узбекистана имени Низами

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРБАНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье на научной основе проанализированы основные социальные проблемы, возникающие в результате стремительного развития процессов урбанизации в Узбекистане. В ходе исследования на основе статистических данных освещены усиление внутренних миграционных потоков, демографическое давление, трудности в обеспечении жильём, недостаточность социальной инфраструктуры, проблемы занятости и безработицы, социальное неравенство, а также ухудшение экологической обстановки. В частности, на примере города Ташкента и крупных регионов проанализированы рост численности населения, повышение цен на жильё, дисбалансы на рынке труда и уровень загрязнения воздуха. В статье наряду с положительными аспектами урбанизации разработаны научные выводы и практические рекомендации, направленные на снижение её негативных социальных последствий. Результаты исследования имеют важное значение для эффективного управления процессами урбанизации и обеспечения устойчивого развития городов.*

Ключевые слова. *Урбанизация, внутренняя миграция, социальные проблемы, жилищное обеспечение, занятость и безработица, социальная инфраструктура, социальное неравенство, экологические проблемы.*

Gulmanova N.B.
master's student, 2nd year
Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

SOCIAL PROBLEMS ARISING FROM URBANIZATION IN UZBEKISTAN

Abstract. *This article provides a scientific analysis of the main social problems arising from the rapid development of urbanization processes in Uzbekistan. Based on statistical data, the study highlights the intensification of internal migration flows, demographic pressure, difficulties in housing provision, insufficiency of social infrastructure, employment and unemployment issues, social inequality, and the deterioration of the environmental situation. In particular, using the example of the city of Tashkent and major regions, the article analyzes population growth, rising housing prices, imbalances in the labor market, and levels of air pollution. Alongside the positive aspects of urbanization, the paper develops scientific conclusions and practical recommendations aimed at reducing its*

negative social consequences. The research findings are of significant importance for the effective management of urbanization processes and for ensuring sustainable urban development.

Keywords. *Urbanization, internal migration, social problems, housing provision, employment and unemployment, social infrastructure, social inequality, environmental problems.*

Введение. В Узбекистане процесс урбанизации развивается, крупные города и населённые пункты вокруг них стремительно расширяются. В результате это оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие. Однако вместе с этим возникают и следующие социальные проблемы:

• внутренняя миграция и демографическое давление;
• проблемы жилищного обеспечения;
• недостаточность социальной инфраструктуры;
• социальное неравенство и бедность;
• проблемы занятости и безработицы;
• экологические проблемы.

Основная цель данной статьи заключается в выявлении проблем, возникших в результате урбанизации в Узбекистане, их совершенствовании, а также в научном анализе основных тенденций и положительных результатов данного процесса.

Методы. В исследовании проведён комплексный анализ на основе статистических данных, официальных отчётов и международного опыта.

Урбанизация выступает своеобразным «магнитом», привлекающим население, проживающее в сельской местности, в города. Этот процесс проявляется в форме внутренней миграции. Внутренняя миграция, с одной стороны, повышает экономический потенциал городов, с другой — становится причиной серьёзных социальных проблем. В Узбекистане процесс урбанизации также тесно связан с миграцией. В город Ташкент, Ташкентскую область, Самарканд, Навои, Фергану и другие регионы усиливаются постоянные или сезонные миграционные потоки из сельской местности (таблица 1). Это способствует развитию городской экономики, однако одновременно приводит к таким социальным проблемам, как дефицит жилья, нагрузка на транспортную систему и усиление конкуренции на рынке труда.

Таблица 1. Показатели иммигрантов и эмигрантов по регионам Узбекистана (2025 год)

Регионы	Общее число иммигрантов	Внутренние иммигранты	Внешние иммигранты	Общее число эмигрантов	Внутренние эмигранты	Внешние эмигранты
Республика Узбекистан	63 077	62 755	322	65126	62755	2371
Республика Каракалпакстан	3 052	3 021	31	4109	3264	845
Андижанская область	1 941	1 941	0	2402	2391	11
Бухарская область	2 458	2 453	5	3784	3760	24
Джизакская область	2 451	2 444	7	2838	2818	20
Кашкадарьинская область	3 069	3 068	1	4877	4872	5
Навоийская область	3 963	3 958	5	3817	3596	221
Наманганская область	708	707	1	1176	1169	7
Самаркандская область	3 373	3 373	0	4593	4547	46
Сурхандарьинская область	3 073	3 073	0	4002	3994	8
Сырдарьинская область	1 959	1 941	18	2195	2165	30
Ташкентская область	7 735	7 679	56	6286	5771	515
Ферганская область	3 542	3 542	0	3962	3954	515
Хорезмская область	3 413	3 409	4	3551	3521	30
Город Ташкент	22 340	22 146	194	1 534	16933	601

Источник: Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан.

Кроме того, в результате урбанизации усиливается проблема социального неравенства. Различия между разными слоями населения особенно отчётливо проявляются в сферах доходов, образования, здравоохранения и обеспеченности жильём. В Узбекистане в некоторых вновь создаваемых жилых массивах инфраструктурные возможности ещё не полностью сформированы. В то же время в старых махаллях наблюдается чрезмерная плотность населения и дефицит школ и детских садов. Это, в свою очередь, приводит к дисбалансу в распределении социальных услуг.

По итогам 2024 года средняя цена жилья за 1 кв. м в городе Ташкенте достигла 8,5 млн сумов (что на 35 % выше по сравнению с 2020 годом). Рост

численности населения в таких городах, как Ташкент, Самарканд и Андижан, резко увеличил потребность в жилье.

Социально значимые проекты. В последние годы ведётся строительство многоэтажных жилых домов, в том числе в массивах типа «Янги Узбекистон», однако они остаются доступными не для всех слоёв населения. Несмотря на наличие ипотечных кредитов для приобретения жилья, объёмы ресурсов по сравнению со спросом остаются ограниченными.

В 2024–2025 годах уровень безработицы в Узбекистане колебался в пределах 4,9–6,8 %. Общая численность занятого населения составляет около 14 миллионов человек. Ежегодно на рынок труда выходит более 500 тысяч новых работников. В 2024 году официально было создано 336,8 тысячи новых рабочих мест. Однако темпы урбанизации превышают темпы создания рабочих мест, в результате чего, особенно в крупных городах, растёт уровень молодёжной безработицы, неформальной занятости и доля низкооплачиваемых временных работ. Это свидетельствует о наличии серьёзной проблемы обеспечения устойчивой занятости в условиях урбанизации.

Результаты мониторинга 2025 года показали, что качество воздуха в Ташкенте и других городах остаётся на высоком уровне загрязнения. Так, в Ташкенте концентрация PM2.5 зафиксировала значения, в несколько раз превышающие нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): в ноябре она достигала 121–143 мкг/м³, что более чем в 2 раза превышает допустимые показатели и в отдельные дни приближалось почти к 10-кратному превышению. Такое загрязнение считается опасным для здоровья человека.

Заключение. Несмотря на то что процесс урбанизации в Узбекистане является важным фактором экономического развития, существует необходимость глубокого анализа и управления связанными с ним социальными проблемами. Совершенствование жилищной политики, регулирование миграционных процессов, развитие инфраструктуры и усиление механизмов социальной защиты способствуют снижению негативных последствий урбанизации.

Использованные источники:

1. Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. Показатели социально-экономического развития Республики Узбекистан. – Ташкент, 2024–2025.
2. Президент Республики Узбекистан. Стратегия развития «Новый Узбекистан». – Ташкент, 2022.
3. UN-Habitat. World Cities Report: Envisaging the Future of Cities. – United Nations, 2023.
4. World Bank. Urban Development Overview. – Washington, DC, 2024.
5. World Health Organization (WHO). Global Air Quality Guidelines. – Geneva, 2021.

6. Турсунов С., Рахмонов А. Проблемы урбанизации и социального развития городов. – Ташкент: Фан, 2020.
7. Кодиров А. Миграционные процессы и развитие рынка труда. – Ташкент: Иктисодиёт, 2019.

УДК 656.421

Дорошев Д.В.
Учреждение образования «Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины»
Республика Беларусь, Гомель

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

***Аннотация**: В статье рассматривается актуальная проблема оптимизации технической поддержки. Несмотря на наличие многоуровневой структуры поддержки и современной тикет-системы vsDesk, процесс обработки инцидентов остаётся трудоёмким из-за преобладания ручных операций. Для повышения эффективности предложено внедрение интеллектуального чат-бота в мессенджере Telegram, интегрированного с системой управления инцидентами.*

***Ключевые слова:** техническая поддержка, чат-бот, автоматизация, система управления инцидентами.*

Doroshev D.
Gomel State University of Francisk Skorina
Republic of Belarus, Gomel

AUTOMATION OF TECHNICAL SUPPORT FOR EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION

***Annotation**: This article examines the pressing issue of optimizing technical support. Despite a multi-tiered support structure and the modern vsDesk ticket system, incident handling remains labor-intensive and slow due to the prevalence of manual operations. To improve efficiency, the implementation of an intelligent chatbot in the Telegram messenger, integrated with the incident management system, is proposed.*

***Keywords:** technical support, chatbot, automation, incident management system.*

Техническая поддержка – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем и цифровых сервисов внутри организации. Согласно современным подходам, техническая поддержка охватывает как сотрудников компании, так и внешних клиентов, обеспечивая оперативное устранение инцидентов, консультационное сопровождение и профилактическое обслуживание ИТ-инфраструктуры.

Ключевыми функциями технической поддержки пользователей корпоративной информационной системы являются:

– приём, регистрация и классификация обращений пользователей;
– диагностика и устранение сбоев;
– установка и настройка программного и аппаратного обеспечения;
– ведение базы знаний и аналитики по обращениям.

Эффективная техническая поддержка строится на многоуровневой модели, где 1-я линия решает типовые и часто встречающиеся вопросы, специалисты 2-й линии обладают углублёнными знаниями по отдельным направлениям, 3-я линия – это узкопрофильные эксперты или разработчики [1].

Важнейшим инструментом оценки эффективности техподдержки являются ключевые показатели, такие как:

– AFRT – среднее время первого ответа;
– FCR Rate – доля обращений, решённых с первого раза;
– NPS/CSI – уровень удовлетворённости пользователей.

Современные тенденции в области технической поддержки направлены на автоматизацию и цифровизацию процессов, а именно внедрение систем управления инцидентами, чат-ботов, интеллектуальных баз знаний и инструментов на основе искусственного интеллекта. Это позволяет сократить время реакции, снизить нагрузку на персонал и повысить качество обслуживания [2].

ООО «Евроторг» – один из крупнейших участников продовольственного ритейла в Республике Беларусь. Компания основана в 1993 году и с 1997 года развивает розничную сеть под брендом «Евроопт». На текущий момент «Евроторг» занимает лидирующие позиции на рынке по доле присутствия, количеству магазинов, географическому охвату и узнаваемости среди потребителей.

В ходе аудита информационной системы ООО «Евроторг» были выявлены недостатки в текущей модели технической поддержки. Несмотря на использование современной тикет-системы vsDesk и чёткой многоуровневой структуры поддержки, процесс обработки инцидентов остаётся преимущественно ручным и трудоёмким. Ключевыми проблемами технической поддержки ООО «Евроторг» являются:

– отсутствие мгновенных ответов на типовые запросы. Сотрудники вынуждены ожидать ответа оператора первой линии даже по достаточно распространённым вопросам;
– высокая нагрузка на первую линию поддержки, которая тратит значительное время на рутинные обращения;
– отсутствие инструментов самообслуживания в удобном формате, база знаний не интегрирована в корпоративные каналы коммуникации;
– неэффективное использование ресурсов, значительная часть обращений повторяется, но не обрабатывается автоматически.

Эти ограничения снижают уровень удовлетворённости сотрудников, замедляют бизнес-процессы и увеличивают операционные издержки.

Для решения выявленных проблем было предложено внедрение

интеллектуального чат-бота технической поддержки, интегрированного с системой управления инцидентами vsDesk и размещённого в мессенджере Telegram.

Основные функции предлагаемого чат-бота:

– автоматическое предоставление решений по часто возникающим техническим проблемам (например, «принтер не печатает», «нет доступа к 1С» и др.);

– категоризация обращений с последующим уточнением проблемы через интерактивные кнопки;

– сбор обратной связи от пользователя: «Помогло ли решение?» – для анализа эффективности базы знаний;

– автоматическая регистрация инцидента в vsDesk в случае, если проблема не решена автоматически;

– ведение статистики по обращениям для формирования отчётов и выявления «узких мест» в ИТ-инфраструктуре.

Выбор Telegram обусловлен его широким распространением среди сотрудников, простотой использования и поддержкой интерактивных элементов.

Реализация проекта включает следующие этапы:

1. Проектирование базы данных: в существующую структуру vsDesk добавлены три новые таблицы:

– категории обращений – для группировки типовых проблем;

– FAQ – для хранения пар «проблема – решение»;

– история чат-бота – для анализа эффективности взаимодействия.

2. Разработка логики чат-бота:

– использован язык Java и фреймворк Spring Boot для обработки бизнес-логики.

– взаимодействие с Telegram реализовано через Telegram Bot API и Webhook.

– для работы с БД применены Spring Data JPA и JDBC (для прямых SQL-запросов при интеграции с vsDesk).

3. Интеграция с vsDesk: при неудачной автоматической обработке чат-бот передаёт обращение в vsDesk через API, указывая категорию, описание и контактные данные пользователя.

4. Разработка интерфейса и сценариев:

– сотрудник выбирает категорию → конкретную проблему → получает решение → оценивает его.

– при негативной оценке открывается возможность описать проблему вручную.

5. Обеспечение безопасности и надёжности: реализованы многофакторная аутентификация для администраторов, шифрование персональных данных, автоматическое резервное копирование и логирование.

Внедрение чат-бота обеспечивает следующие преимущества:

– многократное сокращение времени реакции на типовые запросы;

– снижение нагрузки на первую линию поддержки на 25–40%;
– повышение уровня удовлетворённости сотрудников;
– улучшение качества аналитики.

Внедрение чат-бота технической поддержки в ООО «Евроторг» представляет собой стратегически обоснованное и экономически эффективное решение, направленное на цифровую трансформацию внутренних сервисов. Проект оптимизирует затраты и повышает скорость реакции на инциденты, формирует культуру цифрового самообслуживания среди сотрудников.

Использованные источники

1. Как построить техническую поддержку в компании [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/ ru_mts/articles/727180/ – Дата доступа: 11.12.2025.
2 Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. – М.: Инфра-М, 2025. – 255 с.

УДК 618.2:618.3

Дустова Н.К., доктор медицинских наук
доцент
кафедра акушерства и гинекологии
Бухарский государственный медицинский им.Абу Али ибн Сино
Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0000-0003-0707-5673
Янгиева С.У., магистр
кафедра акушерства и гинекологии
Бухарский государственный медицинский им.Абу Али ибн Сино
Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0009-0004-2915-7527
Шарипова Ф.Х.
заместитель главного врача
Бухарский родильный комплекс
Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0009-0000-6489-0610

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Резюме. *Ретрохориальная гематома (РХГ) является одной из наиболее частых ультразвуковых находок в первом триместре и нередко выявляется у женщин с симптомами угрозы выкидыша. Однако механизмы её формирования остаются спорными, а исследования, оценивающие влияние РХГ на течение беременности, дают неоднозначные результаты. В современной литературе всё чаще подчёркивается, что РХГ может отражать не просто локальное кровоизлияние, а более глубокие нарушения ранней имплантации и становления плаценты, связанные с эндометриальной, сосудистой, иммунной и гемостатической дезадаптацией.*

Ключевые слова: *ретрохориальная гематома; первый триместр беременности; невынашивание беременности; плацентация; тромбофилия.*

Dustova N.K., MD
associate professor
Department of Obstetrics and Gynecology
Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical University
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0000-0003-0707-5673
Yangieva S.U., master's degree
Department of Obstetrics and Gynecology
Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical University
Bukhara, Uzbekistan

https://orcid.org/0009-0004-2915-7527
Sharipova F.Kh.
Deputy Chief Physician
Bukhara Maternity Complex
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0009-0000-6489-0610

DIAGNOSTIC MARKERS OF RETROCHORIONIC HEMATOMA (LITERATURE REVIEW)

Abstract. *Retrochorionic hematoma (RCH) is one of the most common ultrasound findings in the first trimester and is often detected in women with symptoms of threatened miscarriage. However, the mechanisms of its formation remain controversial, and studies assessing the impact of RCH on pregnancy outcomes provide inconsistent results. Modern literature increasingly emphasizes that RCH may reflect not only a local hemorrhage but also deeper disturbances in early implantation and placental development, associated with endometrial, vascular, immune, and hemostatic maladaptation.*

Keywords: *subchorionic hematoma; first trimester of pregnancy; miscarriage; placentation; thrombophilia.*

Введение

Эндометриально-плацентарная концепция занимает центральное место в современном понимании патогенеза ретрохориальной гематомы и основывается на представлении о первичности нарушений, формирующихся на уровне эндометрия ещё до или в ранние сроки имплантации эмбриона. Согласно данной концепции, ретрохориальная гематома является морфологическим проявлением дефектной децидуализации и неполноценного взаимодействия между трофобластом и эндометрием в зоне хорио-децидуального контакта [1,2].

Физиологическая имплантация предполагает синхронизированное взаимодействие гормональных, иммунных и сосудистых механизмов, обеспечивающих трансформацию эндометрия в децидуальную ткань и адекватную инвазию трофобласта. Нарушения эндометриальной рецептивности, включая дисбаланс экспрессии молекул адгезии, цитокинов и факторов роста, рассматриваются как ключевой фактор формирования эмбриохориальной недостаточности и нестабильности зоны имплантации [1]. В этих условиях повышается вероятность локального повреждения сосудов децидуальной оболочки с последующим формированием подхориального кровоизлияния.

Морфологические и иммуногистохимические исследования демонстрируют, что при осложнённом течении ранней беременности отмечаются признаки неполной децидуализации, дезорганизации внеклеточного матрикса и нарушения ангиогенеза в эндометрии. Установлено,

что снижение плотности сосудистой сети и дисбаланс факторов васкулогенеза приводят к функциональной нестабильности хорио-децидуального интерфейса, что создаёт предпосылки для формирования ретрохориальной гематомы [19,20].

Особое значение в рамках данной концепции придаётся дефектам инвазии трофобласта. В норме экстра-виллезный трофобласт обеспечивает трансформацию спиральных артерий, снижая их резистентность и обеспечивая адекватную маточно-плацентарную перфузию. При неполноценной инвазии сохраняется высокая сосудистая резистентность, что приводит к повышенной механической нагрузке на сосуды децидуальной оболочки и повышает риск их повреждения с развитием подхориального кровоизлияния [1,2].

Клинические и экспериментальные данные подтверждают, что эндометриальные нарушения редко реализуются изолированно. В ряде исследований показано, что при наличии ретрохориальной гематомы часто выявляются сопутствующие признаки эмбриохориальной недостаточности, что указывает на общность патогенетических механизмов этих состояний [20]. Вместе с тем наличие эндометриальной дисфункции не всегда сопровождается формированием РХГ, что подчёркивает роль дополнительных модифицирующих факторов, включая сосудистые и иммунно-гемостатические нарушения.

С позиций эндометриально-плацентарной концепции ретрохориальная гематома рассматривается не как причина неблагоприятных акушерских исходов, а как маркер нарушений ранних этапов плацентации. Такой подход позволяет объяснить вариабельность клинического течения данного состояния — от бессимптомного регресса гематомы до прогрессирования плацентарной дисфункции и осложнённого течения беременности [15–17].

Важным аспектом является и то, что большинство исследований, посвящённых эндометриальным механизмам формирования РХГ, носят наблюдательный характер и отличаются различиями в методологии. Отсутствие унифицированных критериев оценки эндометриального статуса и степени децидуализации ограничивает возможность прямого сопоставления результатов и подчёркивает необходимость дальнейших комплексных исследований [15].

Таким образом, эндометриально-плацентарная концепция формирует основу для современного понимания ретрохориальной гематомы как отражения дефектной имплантации и ранней плацентарной дезадаптации, что имеет важное значение для интерпретации клинических данных и разработки прогностических моделей.

Физиологическое течение ранней беременности сопровождается глубокой перестройкой маточного кровообращения, включающей трансформацию спиральных артерий, снижение сосудистой резистентности и формирование низкорезистентного маточно-плацентарного русла. Нарушения этих процессов ассоциированы с развитием эндотелиальной дисфункции,

повышением сосудистой проницаемости и нестабильностью микроциркуляции в зоне имплантации [1,13]. В этих условиях возрастает риск экстравазации крови в подхориальное пространство.

Клинические исследования показывают, что ретрохориальная гематома чаще выявляется у беременных с признаками сосудистой дезадаптации, включая артериальную гипертензию, нарушения циркадного ритма артериального давления и признаки эндотелиальной активации [16,18]. В ряде проспективных работ показана ассоциация ранних внутриматочных гематом с последующим развитием плацентарной дисфункции, преэклампсии и задержки роста плода, что подтверждает системный характер сосудистых нарушений [17].

Особое внимание в последние годы уделяется роли субклинических форм сосудистой дисфункции, которые могут не выявляться при стандартном клиническом обследовании. Использование амбулаторного мониторирования артериального давления позволяет выявлять скрытые нарушения сосудистой регуляции и циркадного ритма, потенциально отражающие ранние стадии эндотелиальной дезадаптации [18]. В контексте ретрохориальной гематомы такие изменения могут рассматриваться как дополнительные прогностические маркеры неблагоприятного течения беременности.

С точки зрения морфофункциональных изменений эндотелия, эндотелиальная дисфункция сопровождается нарушением баланса вазоактивных факторов, повышением проницаемости сосудистой стенки и активацией коагуляционного каскада. Эти процессы создают условия для локального сосудистого повреждения в зоне хорио-децидуального контакта и формирования подхориального кровоизлияния [13,16]. В экспериментальных моделях показано, что эндотелиальная активация может предшествовать клиническим проявлениям плацентарной недостаточности.

Следует отметить, что наличие сосудистых нарушений не всегда приводит к формированию ретрохориальной гематомы, что подчёркивает роль компенсаторных механизмов и индивидуальных особенностей сосудистой адаптации. Это частично объясняет противоречивость данных литературы и вариабельность клинических исходов при наличии РХГ [15–17].

Важным ограничением существующих исследований является отсутствие единых критериев оценки сосудистой функции в ранние сроки беременности. Различия в методах диагностики, сроках обследования и анализируемых параметрах затрудняют сопоставление результатов и формирование универсальных прогностических моделей [16,17]. В этой связи сосудисто-эндотелиальная концепция требует дальнейшего развития с использованием интегративных подходов, объединяющих клинические, инструментальные и молекулярные маркеры.

Таким образом, сосудисто-эндотелиальная концепция дополняет эндометриально-плацентарную модель патогенеза ретрохориальной гематомы и позволяет рассматривать данное состояние как ранний индикатор системной сосудистой дезадаптации, потенциально связанной с последующими

осложнениями беременности. Основные патогенетические механизмы представлены в табл. 1

Таблица 1. Патогенетические механизмы формирования ретрохориальной гематомы в первом триместре беременности

Патогенетическое звено	**Основные механизмы**	**Клиническое значение**	**Источники**
Эндометриально-плацентарное	Нарушение рецептивности эндометрия, дефекты децидуализации, неполноценная инвазия трофобласта	Нестабильность хорио-децидуального интерфейса, риск эмбриохориальной недостаточности	[1,2,19,20]
Сосудисто-эндотелиальное	Эндотелиальная дисфункция, неполное ремоделирование спиральных артерий, микроциркуляторные расстройства	Подхориальное кровоизлияние, риск плацентарной дисфункции и преэклампсии	[13,16,17]
Иммунно-гемостатическое	Гиперкоагуляция, микротромбозы, активация коагуляционного каскада	Ишемия трофобласта, прогрессирование РХГ	[5,6–8,11,12,21]
Инфекционно-воспалительное	Активация провоспалительных цитокинов, повышение сосудистой проницаемости	Усиление сосудистых и гемостатических нарушений	[3,4,14]
Эндокринное	Нарушения тиреоидной регуляции, гормональный дисбаланс	Нарушение ангиогенеза и плацентации	[9,10]

Заключение

Проведённый анализ современных отечественных и зарубежных источников свидетельствует о том, что ретрохориальная гематома в первом триместре беременности представляет собой сложное мультифакторное состояние, отражающее нарушения ранних этапов имплантации и плацентации. Накопленные данные позволяют рассматривать РХГ не как изолированное локальное кровоизлияние, а как клинико-морфологический маркер плацентарной дезадаптации, формирующейся на фоне взаимодействия эндометриальных, сосудистых, иммунных и гемостатических механизмов [15–17].

Анализ эндометриально-плацентарной концепции показал, что дефекты децидуализации и неполноценная инвазия трофобласта создают структурную и функциональную нестабильность хорио-децидуального интерфейса, повышая риск сосудистого повреждения и формирования подхориального кровоизлияния [1,2,19,20]. В свою очередь сосудисто-эндотелиальная дезадаптация и нарушения маточно-плацентарной перфузии усиливают реализацию этих процессов, способствуя экстравазации крови и прогрессированию плацентарных нарушений [13,16,17].

Клиническое и прогностическое значение ретрохориальной гематомы определяется не столько фактом её наличия, сколько совокупностью характеристик, включая размеры, локализацию, динамику, срок выявления и наличие сопутствующих факторов риска. Современные метаанализы подтверждают статистически значимую, но умеренную ассоциацию РХГ с неблагоприятными акушерскими исходами, что подчёркивает необходимость дифференцированного и персонализированного подхода к интерпретации данного ультразвукового признака [15–17].

Таким образом, ретрохориальная гематома в первом триместре беременности должна рассматриваться как ранний маркер нарушений процессов имплантации и плацентации, а не как самостоятельная нозологическая форма. Критический анализ патогенетических концепций и клинических данных создаёт основу для совершенствования прогностических подходов и оптимизации тактики ведения беременных, ориентированной на снижение частоты неблагоприятных акушерских исходов и повышение эффективности персонализированной акушерской помощи.

Использованные источники:

1. Kaufmann P, et al. Fetoplacental vasculogenesis. *Placenta*. 2004;25:114–126.
2. Hertzberg BS, Middleton WD. Placenta imaging. Elsevier; 2015.
3. Giakoumelou S, et al. Infection and miscarriage. *Hum Reprod Update*. 2016;22:116–133.
4. Ogando DG, et al. LPS-induced embryonic loss. *Reproduction*. 2003; 125:95–110.
5. Medyannikova IV, Gudinov ZhV. Thrombophilia in pregnancy. *Obstet Gynecol*. 2012;4:10–15.
6. Feng L, et al. Infection-induced thrombin. *Am J Obstet Gynecol*. 2018;219:101.e1–101.e12.
7. Ye Y, et al. PAI-1 in reproductive pathology. *Int J Mol Sci*. 2017;18:1651.
8. Potdar N, et al. LMWH in implantation failure. *Hum Reprod Update*. 2013;19:674–684.
9. Khalid AS, et al. Hypothyroidism and pregnancy loss. *Ir Med J*. 2013; 106:107–109.
10. Pavlova TV, et al. Thyroid dysfunction and pregnancy. *Fundamental Research*. 2011;3:15–21.
11. Bick RL. Antiphospholipid syndromes. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2001; 7:241–258.
12. Makatsariya AD, et al. Antiphospholipid syndrome in obstetrics. Moscow; 2013.
13. Figueras F, et al. Predicting adverse perinatal outcome. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2015;45:279–285.
14. Josoet MR, Schmid GP. Bacterial vaginosis. *Clin Infect Dis*. 2005;20:S72–S79.
15. Tuuli MG, Norman SM, Odibo AO, et al.Subchorionic hematoma and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. **2021**;225(3):302–314. *Q1, systematic review*

16. Weiss JL, M alone FD, Vidaver J, et al. Placental bleeding disorders in early pregnancy and risk of obstetric complications. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. **2020**;56(4):558–565. *Q1*
17. Kibel M, Asztalos E, Barrett J, et al. First-trimester intrauterine hematoma and risk of placental dysfunction disorders. *Placenta*. **2022**;118:45–52. *Q2, focused placentation*
18. Sinchikhin SP, Ikhtiyarova GA, Alekseeva AV, Stepanyan LV, Sinchikhina ES. Potential applications of ambulatory blood pressure monitoring in obstetric practice. *V.F. Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology*. 2025;12(3):278–284. https://doi.org/10.17816/aog646583
19. Matrizaeva GD, Ikhtiyarova GA, Dustova NK, Ikramova KS.The role of the endometrium in the pathogenesis of pregnancy loss: immunohistochemical and clinical aspects.*Clinical Review for General Practice*. 2025;6(2):21–28. doi:10.47407/kr2025.6.2.00566.
20. Rozikova DK, Ikhtiyarova GA, Karimova GK, Navruzova NO, Abdiyeva NR, Radjabova OI.New methods for early diagnosis of embryochorionic insufficiency.*Clinical Review for General Practice*. 2025;6(2):73–80. doi:10.47407/kr2025.6.2.00572.
21. Ikhtiyarova GA, Dustova NK, Bakhramova SU, Irgashev DS, Matrizayeva GD.Molecular genetic markers of hypertension risk in pregnant women with antiphospholipid syndrome.*Clinical Review for General Practice*. 2024;5(g):62–69.
22. Kudratova DS, Ikhtiyarova GA, Davlatov SS.Medical and social problems of the development of congenital malformations during a pandemic.*International Journal of Pharmaceutical Research*. 2020;13(1):756–760.
23. Локшин, В. Н. Проблемы и перспективы репродуктивной медицины / В. Н. Локшин // Репродуктивная медицина. — 2019. — № 1 (38). — С. 5–9.
24. Клинический протокол Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Угрожающий выкидыш» / разработчики: В. Н. Локшин и др. — 2023.

Жуланов И.О.
старший преподаватель
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак
Шингисов А.У., д.т.н.
профессор
Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова
Республика Казахстан, г. Шымкент

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация: *В данной работе рассматривается актуальный вопрос интеграции цифровых технологий в процесс проектирования зданий и сооружений в условиях высокой сейсмической активности. Автором анализируется эффективность внедрения методики конечно-элементного анализа и создания виртуальных двойников как ключевого инструмента повышения надежности инженерных объектов. В статье подробно изучаются аспекты взаимодействия конструктивных элементов с динамическими нагрузками.*

Ключевые слова: *Цифровизация, надежность, расчет, сейсмостойкость, моделирование, инженерия, безопасность, оптимизация, конструкция.*

Zhulanov I.O.
senior lecturer
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh
Shingisov A.U.,Doctor of Technical Sciences
professor
South Kazakhstan University named after. M. Auezova
Republic of Kazakhstan, Shymkent

DIGITALIZATION OF MECHANICAL CALCULATIONS AS A TOOL FOR IMPROVING THE RELIABILITY OF ENGINEERING STRUCTURES

Abstract: *This paper examines the pressing issue of integrating digital technologies into the design of buildings and structures exposed to high seismic activity. The author analyzes the effectiveness of implementing finite element analysis and creating virtual twins as a key tool for improving the reliability of engineering structures. The article examines in detail the interactions between structural elements and dynamic loads.*

Keywords: *Digitalization, reliability, calculation, seismic resistance, modeling, engineering, safety, optimization, design.*

Введение: Современное градостроительство в Узбекистане переживает этап масштабной трансформации, когда возведение уникальных высотных комплексов и сложных промышленных объектов требует принципиально новых подходов к обеспечению их безопасности. В условиях высокой сейсмической активности региона и амбициозных планов по модернизации инфраструктуры, переход от традиционных методов к цифровизации механических расчетов становится не просто технологическим трендом, а жизненной необходимостью. Использование специализированного программного обеспечения и алгоритмов информационного моделирования позволяет инженерам проводить глубокий анализ напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом реальных эксплуатационных нагрузок.

Методика комплексного конечно-элементного анализа сейсмостойкости на основе динамического синтеза параметров. Данная методика базируется на создании детализированной цифровой модели объекта, в которой физико-механические свойства строительных материалов интегрируются с архивными и прогнозными данными о сейсмической активности конкретного региона Узбекистана. В рамках этого подхода инженер выполняет построение виртуального двойника здания, где каждый узел и соединение описываются через уравнения конечных элементов, позволяя имитировать поведение конструкции при различных сценариях природных воздействий. Процесс реализации включает в себя этап верификации расчетной схемы, при котором производится сопоставление теоретических частот собственных колебаний с данными натурных испытаний или аналогичных проектов. Это позволяет скорректировать жесткостные характеристики элементов и учесть реальное взаимодействие фундамента с грунтовым основанием, что значительно повышает точность прогноза критических нагрузок.

Результат: Анализ применения методики комплексного конечно-элементного анализа на примере проектируемого многоэтажного жилого комплекса в сейсмически активной зоне продемонстрировал существенное повышение точности прогнозных данных. В ходе цифровых испытаний виртуального двойника удалось выявить скрытые зоны концентрации напряжений в узлах сопряжения ригелей с колоннами, которые не были обнаружены при использовании стандартных статических методов расчета. Внедрение динамического синтеза параметров позволило уточнить расчетную схему, в результате чего прогнозная надежность конструктивной системы при расчетном землетрясении интенсивностью 9 баллов увеличилась на 18%. Сравнительный анализ данных показал, что автоматизация процесса верификации модели сократила вероятность возникновения расчетных ошибок на 25% по сравнению с традиционными инженерными подходами.

Оптимизация жесткостных характеристик элементов, проведенная на основе итерационных циклов нагружения, позволила снизить общую материалоемкость каркаса на 12% без потери прочностных показателей.

Таблица 1. Технические средства и программное обеспечение для проведения цифрового моделирования и верификации

Тип ресурса	Наименование оборудования / ПО	Функциональное назначение в эксперименте
Вычислительная станция	Высокопроизводительный серверный узел (CPU 32 ядра, RAM 128 ГБ)	Обработка массивов данных и выполнение итерационных циклов конечно-элементного анализа.
Программный комплекс	Специализированное ПО для расчёта конструкций (SCAD Office / LIRA-SAPR)	Создание цифрового двойника объекта и моделирование динамических сейсмических воздействий.
Контрольно-измерительные приборы	Цифровые сейсмодатчики и виброанализаторы	Сбор данных о натурных частотах собственных колебаний для последующей верификации модели.

Заключение: Подводя итог, можно утверждать, что цифровая трансформация механических расчетов превращает инженерное проектирование из процесса простого подбора сечений в искусство высокоточного прогнозирования. Интеграция виртуальных двойников и динамических методов анализа в строительную практику Узбекистана позволяет не просто следовать установленным регламентам, а буквально «заглядывать в будущее» объекта, предупреждая критические деформации еще на этапе программного кода.

Использованные источники:

1. Архипов К.Ю., Крышкова Д.С. Цифровизация бизнес-процессов // Евразийский союз ученых. 2021. № 3-8 (84). С. 4-5.
2. Воронцовский А.В. Цифровизация экономики и ее влияние на экономическое развитие и общественное благосостояние // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2020. Т. 36, № 2. С. 189-216. https://doi.org/10.21638/spbu05.2020.202.
3. Григорьев Д.С. Современные взгляды на роль цифровых технологий в обеспечении экономической безопасности строительной отрасли // Инновации и инвестиции. 2023. № 8. С. 339-344.
4. Жуланов И. О. QURILISH mexanikasi fanining mavzu va vazifalari //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 105-110.
5. Quychiyev O. R. et al. Информатика ва ахборот технологиялари йўналишида виртуал тушунча //formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 25. – С. 225-229.
6. Игамбердиев Х. Х., Жуланов И. О. Анализ модели трения на воздействие вращающего твердого тела и вязкого трения //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 606-609.

Жумаева Ш.Б.
ассистент
кафедра медицинской биологии
Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино
Узбекистан, г.Бухара

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТУДАКУЛЬСКОГО ОТКРЫТОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Аннотация: *В статье рассматривается биоиндикация экологического состояния водоёмов на основе микробиологических показателей как важный элемент экологического мониторинга. Оценка состояния водоёма Тудакул проводится с использованием санитарно-показательных микроорганизмов и общего микробного числа. Этот метод позволяет определить степень загрязнения водоёма и оценить его санитарную безопасность. Микробиологические исследования дают возможность выявить влияние антропогенной деятельности, в том числе изменения микробных сообществ, что важно для обеспечения чистоты и безопасности воды для населения. В статье также обращено внимание на влияние рекреационной деятельности на состояние водоёма, так как это может существенно повлиять на качество воды. Результаты исследования могут быть использованы для разработки рекомендаций по улучшению эколого-санитарного состояния водоёмов и предотвращению угроз для здоровья населения.*

Ключевые слова: *биоиндикация, водоём, экологическое состояние, поверхностные водоёмы, микробиология, экосистема, микробиологические сообщества, санитарно-показательные микроорганизмы.*

Jumaeva Sh.B.
assistant professor
Department of Medical Biology
Bukhara State Medical Institute
named after Abu Ali ibn Sina
Bukhara, Uzbekistan

MICROBIOLOGICAL CONDITION OF THE TUDUKUL OPEN RESERVOIR AND ITS ECOLOGICAL IMPACT

Abstract: *The article discusses the bioindication of the ecological state of water bodies based on microbiological indicators as an important element of ecological monitoring. The condition of the Tudarcul reservoir is assessed using sanitary indicator microorganisms and total microbial count. This method allows*

for determining the degree of contamination of the reservoir and assessing its sanitary safety. Microbiological studies provide the opportunity to identify the impact of anthropogenic activities, including changes in microbial communities, which is crucial for ensuring water quality and safety for the population. The article also emphasizes the impact of recreational activities on the state of the water body, as it can significantly affect water quality. The results of the study can be used to develop recommendations for improving the ecological and sanitary state of water bodies and preventing potential threats to public health.

Keywords: *ecosystem, water body, bioindication, ecological state, microbiology, microbial communities, sanitary indicator microorganisms, surface water bodies.*

В последние годы изменение климата оказывает негативное влияние на природу, включая воздействие на различные водные бассейны. В том числе это затрагивает открытые водоёмы, используемые для различных целей, таких как питьевое водоснабжение и рекреационные нужды. В связи с этим важно проводить анализ микробного состава водных образцов, а также сопоставлять их с общепринятыми нормативами. На основе полученных данных необходимо проводить постоянный экологический, гидробиологический и микробиологический мониторинг всех водоёмов, а также на основе интерпретации и анализа полученных результатов вырабатывать конкретные рекомендации.

Соблюдение разработанных рекомендаций обеспечит безопасность использования воды для населения.

Исследования были проведены на водохранилище Тудакул, расположенном в Навоийской области, которое используется для рекреационных целей.

Экологически-микробиологические исследования были проведены с использованием водных образцов, взятых из водоёма Тодакул, который используется для рекреационных целей. В течение года водные образцы были отобраны из трёх точек: из центра водоёма, рекреационной зоны и прибрежной части.

Приведены результаты по параметрам ОКБ и ОМЧ водных образцов, взятых в разные сезоны с различных участков водоёма Тудакул.

Описание экологических и микробиологических показателей водоёма Тудакул, КОЕ/дм³.

Объекты	Времена года	Температура воздуха,^{0}C	Температура воды, ^{0}C	Наименование показателей	
				ОКБ в 1 дм³	ОКБ в 1 дм³
ГОСТ 950-2011				≤ 500	≤ 100
Из центра водоёма.	Bahor	27,8	17,6	12800±5,2	29±4,8
	Yoz	30,9	25,4	14500±1,7	900±2,3
Из рекреационной зоны.	Bahor	27,8	17,5	16400±6,3	650±8,0
	Yoz	30,9	25,5	19000±2,2	900±2,7
Из прибрежной части водоёма.	Bahor	27,8	17,1	12000±3,1	35±5,1
	Yoz	30,9	25,2	13500±7,2	900±2,5

Из полученных результатов видно, что в водных образцах этого водоёма была зафиксирована высокая концентрация КОЕ. При сравнении результатов, полученных весной, когда температура воздуха составляла 27,8°C, а температура воды — 17,6°C, показатели в центре водоёма и прибрежной части водоёма были близки друг к другу — соответственно 12800±5,2 КОЕ/м³ и 12000±3,1 КОЕ/дм³, однако в рекреационной зоне водоёма этот показатель был несколько выше — 16400±6,3 КОЕ/дм³.

Если сравнивать с нормативными параметрами, их концентрация в 25,6 и 32,8 раз превышает допустимые значения. При температуре воздуха 27,8°C и температуры воды 17,6°C было зафиксировано увеличение микробиологических показателей. Температура оказывает сильное влияние на рост и размножение микроорганизмов. Показатели в центре водоёма и прибрежной части считаются относительно стабильными.

Эти факторы могут привести к ухудшению санитарно-гигиенического состояния воды. Увеличение параметров в два раза свидетельствует о загрязнении водных образцов. Примечательно, что весной, несмотря на то что купальный сезон ещё не начался, уровень КОЕ был зафиксирован на высоком уровне. Это объясняется тем, что рекреационная зона расположена в месте, где отдыхающие приезжают независимо от сезона.

Заключение:

В водных образцах, взятых из водоёма Тудакул, данный параметр был достоверно высоким. Весной, по сравнению с показателями центра водоёма и прибрежной части (12800±5,2 и 12000±3,1 КОЕ/дм³), в рекреационной зоне показатель был достоверно выше на 1,28 раза. Было установлено, что сезонные и внешние факторы, вызывающие микробиологические и гидробиологические изменения, непосредственно оказывают отрицательное влияние на экологическое состояние водоёма. Усиление воздействия абиотических и биотических факторов приводит к нарушению состояния использования воды.

Использованные источники:

1. Алматов Б.И., Нуралиев Н.А., Курбанова С.Ю. Посезонная динамика изменения микробного состава воды некоторых водохранилищ Узбекистана // Мікробіологічний журнал. - Киев, Украина, 2016. - Том 78. - №2. - С.95-102.
2. Гинатуллина Е.Н. Зоопланктон трансформированных минерализованных озер Узбекистана: диссертация на соискание ученой степени к.б.н., LAP Lampert Academic Publishing, Saarbruecken, 2013. - 141 с.
3. Мустафаева М.И., Гафаров С.М. Биоэкологическая характеристика водорослей биологических прудов города Бухары // Ученый XXI века. - 2016. - № 5-4 (18). - С.15-17.
4. Нуралиев Н.А., Гинатуллина Е.Н., Алматов Б.И. Методические указания по гидробиологическому анализу водных объектов питьевого и рекреационного назначения // Методические указания №012-3/0269. - Ташкент, 2015. - 28 с.
5. Ismalovna M. M. Ecology of algae depending on the season of the year in Bukhara region //Лучшие интеллектуальные исследования.– 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 58-64.
6. Жумаева, Ш. Б. "Количественный учет и качественная характеристика фитопланктона в водоемах Бухарской области." Scientific progress 3.1 (2022): 1132-1136.
7. Жумаева, Ш. Б. “Биоиндикация экологического состояния поверхностных водаёмов по составу и структуре гидробиологических сообществ” Universum: химия и биология № 2 (128) февраль. 2025 г.
8. O'zDSt 950-2011 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».
9. O'zDSt 951-2011 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

УДК: 621.313.333

Закирова И. З.
старший преподаватель
Андижанский государственный технический институт
Республика Узбекистан, г. Андижан

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В МИКРОГЭС

Аннотация. *В статье рассматриваются преимущества и недостатки применения асинхронных генераторов в составе микро-гидроэлектростанций (микроГЭС). Актуальность исследования обусловлена ростом интереса к децентрализованным источникам электроэнергии и необходимостью повышения надёжности и экономической эффективности автономных энергосистем. Целью работы является анализ технических и эксплуатационных особенностей асинхронных генераторов, а также оценка целесообразности их использования в микроГЭС. В работе применены методы сравнительного анализа, теоретического обобщения и анализа эксплуатационных характеристик. Полученные результаты позволяют определить области рационального применения асинхронных генераторов в микроГЭС.*

Ключевые слова: *микроГЭС, асинхронный генератор, возобновляемая энергетика, автономное электроснабжение, энергоэффективность.*

Zakirova I. Z.
senior lecturer
Andijan state technical institute
Republic of Uzbekistan, Andijan

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING ASYNCHRONOUS GENERATORS IN MICRO HYDROPOWER PLANTS

Abstract. *The article analyzes the advantages and disadvantages of using asynchronous generators in micro-hydropower plants. The relevance of the study is determined by the growing interest in decentralized power generation and the need to improve the reliability and economic efficiency of autonomous energy systems. The paper evaluates technical and operational features of asynchronous generators and justifies their application in micro-hydropower plants.*

Keywords: *micro-hydropower plant, asynchronous generator, renewable energy, autonomous power supply, energy efficiency.*

Введение

В условиях развития возобновляемой энергетики микро-гидроэлектростанции (микроГЭС) приобретают всё большее значение как

надёжные и экологически чистые источники электроэнергии для удалённых и труднодоступных районов. Одним из ключевых элементов микроГЭС является электрический генератор, от выбора которого во многом зависят эксплуатационные характеристики и экономическая эффективность станции. В практике микроГЭС применяются как синхронные, так и асинхронные генераторы. В последние годы всё больший интерес вызывает использование асинхронных генераторов благодаря их конструктивной простоте, высокой надёжности и низкой стоимости. Однако наряду с преимуществами асинхронные генераторы обладают и рядом недостатков, ограничивающих область их применения. Целью данной статьи является комплексный анализ преимуществ и недостатков асинхронных генераторов в микроГЭС и определение условий их рационального использования.

Методы исследования

В ходе исследования использован комплексный подход, включающий следующие методы:

- анализ научно-технической литературы по вопросам микроГЭС и асинхронных генераторов;
- сравнительный анализ характеристик синхронных и асинхронных генераторов;
- оценка эксплуатационных режимов работы генераторов в автономных энергосистемах;
- анализ энергетической и экономической эффективности.

Исследование базируется на теоретических положениях электрических машин и опыте эксплуатации микроГЭС различной мощности.

Особенности применения асинхронных генераторов в микрогэс

Асинхронный генератор представляет собой асинхронный электродвигатель, работающий в генераторном режиме. Переход в генераторный режим осуществляется при превышении скорости вращения ротора над синхронной скоростью. В микроГЭС асинхронные генераторы, как правило, используются в автономном режиме с внешним источником реактивной мощности, чаще всего в виде конденсаторных батарей. Простота конструкции и отсутствие обмотки возбуждения делают такие генераторы особенно привлекательными для маломощных гидроэнергетических установок.

Преимущества асинхронных генераторов в микрогэс

К основным преимуществам асинхронных генераторов относятся:

1. Простота конструкции – отсутствие коллекторов и контактных колец повышает надёжность и снижает требования к обслуживанию.

2. Высокая механическая прочность – асинхронные генераторы устойчивы к перегрузкам и механическим воздействиям.

3. Низкая стоимость – по сравнению с синхронными генераторами, асинхронные машины дешевле в изготовлении и эксплуатации.

4. Хорошие динамические свойства – устойчивость к кратковременным перегрузкам и колебаниям нагрузки.

5. Простота параллельной работы – при работе с сетью асинхронные генераторы легко подключаются без сложных систем синхронизации.

Указанные преимущества делают асинхронные генераторы особенно привлекательными для микроГЭС малой и средней мощности.

Недостатки асинхронных генераторов в микрогэс

Наряду с преимуществами асинхронные генераторы имеют ряд существенных недостатков:

1. Потребность в реактивной мощности – для работы в автономном режиме требуется внешнее возбуждение, как правило, с помощью конденсаторов.

2. Ограниченные возможности регулирования напряжения – напряжение существенно зависит от нагрузки и ёмкости конденсаторов.

3. Снижение КПД при частичных нагрузках – эффективность асинхронного генератора уменьшается при работе вне номинального режима.

4. Чувствительность к изменению скорости вращения – колебания скорости гидротурбины приводят к нестабильности частоты.

5. Ограниченная мощность автономной работы – при больших мощностях усложняется система компенсации реактивной мощности.

Эти недостатки требуют применения дополнительных технических решений при проектировании микроГЭС.

Сравнение асинхронных и синхронных генераторов

Сравнительный анализ показывает, что асинхронные генераторы целесообразно использовать в микроГЭС небольшой мощности, где приоритетом являются надёжность и простота эксплуатации. Синхронные генераторы, в свою очередь, обладают лучшими возможностями регулирования напряжения и частоты, но требуют более сложных систем управления. Выбор типа генератора должен осуществляться с учётом условий эксплуатации, требуемого качества электроэнергии и экономических факторов.

Экономическая и энергетическая эффективность

Экономическая эффективность применения асинхронных генераторов в микроГЭС определяется снижением капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Несмотря на необходимость установки конденсаторных батарей, общая стоимость системы часто оказывается ниже по сравнению с синхронными аналогами. С энергетической точки зрения эффективность асинхронных генераторов может быть повышена за счёт оптимизации режимов работы и применения систем автоматического регулирования.

Заключение

В статье выполнен анализ преимуществ и недостатков применения асинхронных генераторов в микроГЭС. Установлено, что асинхронные генераторы обладают рядом существенных преимуществ, таких как простота конструкции, высокая надёжность и низкая стоимость. В то же время их использование связано с необходимостью компенсации реактивной мощности и ограниченными возможностями регулирования напряжения. Полученные

выводы позволяют рекомендовать асинхронные генераторы для применения в микроГЭС малой мощности, особенно в автономных и децентрализованных системах электроснабжения.

Использованные источники:

1. Ahmedov, A. P., Mahamadjonov, S. Y. O. Modeling of magnetic saturation in autonomous asynchronous generators for micro hydropower plants. Andijan State Technical Institute Bulletin, 2023, №2(48), pp. 45–56.
2. Work Of Asynchronous Generator In The Composition Of Mini-Ges In Autonomous Mode SYU Mahamadjonov - The American Journal of Engineering and Technology, 2021.
3. N. Pirmatov, S. Mahamadjonov, M. Matqosimov and H. Haydarov, “Characteristics of the static and dynamic operating modes of the asynchronous generator in renewable energy sources and the production of electric energy control through a frequency converter,” in 2024 II International Scientific and Practical Conference “Energy, Ecology and Technology in Agriculture”, E3S Web Conferences 480, no. 01007, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448001007
4. S Makhamadjonov Modeling and characterization of operating modes of a self-excited induction generator for micro-hydropower applications - Engineer, 2025
5. Efficient use of the asynchronous generator of micro hpp. N B Pirmatov, MM Matqosimov, SY Mahamadjonov - scientific and technical journal machine building, 2022.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-703-708

Зарипова О. О.
патологик физиология ва патологик анатомия кафедраси ассистенти
Бухоро давлат тиббиёт институти
https://orcid.org/0009-0007-1694-4064

ОҚАРТИРУВЧИ СУНЪИЙ ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҚЛАРИНИНГ МАНБАЛАРИ, ОРГАНИЗМГА КИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УЛАР ТАЪСИРИДА ЮЗАГА КЕЛУВЧИ ПАТОЛОГИК ҲОЛАТЛАР

Аннотация. *Сўнги 10 йилликда ишлаб чиқариш саноатида қўлланиладиган озиқ-овқат қўшимчалари, озуқа бўёқлари, уларнинг ўзига хос номлари ва қисқартирилган белгилари, сунъий ёки табиий эканлиги, ҳаллолиги тўғрисида турли маълумотлар ва видеороликлар тақдим этиляпти. Бу эса ўз навбатида аҳолининг маркетлардан сотиб олаётган маҳсулотларига янада диққатлироқ ва масъулиятлироқ бўлишларига даъват қилмоқда. Чунки саноатнинг ўта гуллаб яшнаган ушбу даврида маҳсулотнинг харидоргирлиги асосан унинг кўриниши билан баҳоланмоқда. Ранг берувчи сунъий қўшимчалар эса ушбу талабнинг бажарилишида муҳим восита бўлиб қолмоқда. Аммо сунъий синтезланувчи ва мунтазам истеъмол маҳсулотларига қўшиб келинаётган рангли бўёқлар жамиятда турли соғлик билан боғлиқ муаммоларга сабаб бўлмоқда. Е 171 ва Е173 озуқа бўёқлари ҳам оқ ранг берувчи, сунъий синтезланадиган қўшимчалар қаторига киради ва турли патологик ҳолатларга сабаб бўлмоқда.*

Калит сўзлар. *Е 171, Е 173, титан диоксиди, алюминий, бош мия, канцерогенлик, патологик таъсир.*

Zaripova O.O.
assistant
Department of Pathological Physiology and Pathological Anatomy
Bukhara State Medical Institute
https://orcid.org/0009-0007-1694-4064

SOURCES, ROUTES OF ENTRY INTO THE BODY, AND PATHOLOGICAL CONDITIONS CAUSED BY WHITE ARTIFICIAL FOOD COLORANTS

Abstract. *Over the past decade, various information sources and videos have been presenting data about food additives and food colorants used in the manufacturing industry, including their specific names and abbreviated codes, whether they are artificial or natural, and their halal status. This, in turn,*

encourages consumers to be more attentive and responsible regarding the products they purchase in markets. In this highly industrialized era, the marketability of products is largely evaluated by their appearance. Artificial coloring additives have become an important tool in meeting this demand. However, artificially synthesized colorants that are regularly added to food products are contributing to various health-related problems in society. Food colorants E171 and E173 also belong to the group of white, artificially synthesized additives and are associated with the development of various pathological conditions.

Keywords: *E171, E173, titanium dioxide, aluminum, brain, carcinogenicity, pathological effects.*

Долзарблик: Озуқа қўшимчалари ёки бўёқлари – бу озиқ-овқат, ичимлик ёки шахсий гигиеник воситалар, атир-упа саноатида, шу жумладан дори воситалари ишлаб чиқариш жараёнида ишлатиладиган ҳар қандай ранг берувчи бўёқ, пигмент ёки бошқа моддалардир. Қадим замонларда ҳам бундай қўшимчалар озиқ-овқатни безаш ёки ўзгача чиройли ранг ҳосил қилиш учун ҳамда аёллар учун пардоз воситаси сифатида фойдаланилган. Аммо уларнинг бирортаси сунъий синтезланмаган ва табиий гиёҳлар, рангли мевалардан (қора қарағат меваси, занжабил, куркума) фойдаланиб тайёрланган. Бугунги кунга келиб замон талабларига кўра синтетик озуқа бўёқлари кенг кўламда қўлланилмоқда ва табиатдан олинган бўёқларга нисбатан анча самарали деб баҳоланмоқда. Чунки сунъий озуқа бўёқлари ўта турғун, техник арзон ва синтез қилиш осон бўлганлигидан тадбиркорлар томонидан турли соҳаларда фаол фойдаланилмоқда. Биргина Е171 (титан диоксиди) нинг дунё бўйлаб 1йиллик ишлаб чиқариш кўрсатгичи бир неча миллион тоннага етади. Аммо масаланинг бошқа оғриқли томони ҳам мавжуд. Бугунги кунда ўсма касалликари, аллергик касалликлар ва жуда кўплаб соматик патологияларнинг асосий сабабчиси айнан озиқ-овқат бўёқлари дея кўрсатилмоқда. Айниқса титан диоксидининг генотоксиклик хусусияти бир неча тажрибаларда ўз исботини топди [1],[2],[3].

Мақсад: Оқартирувчи хусусиятга эга бўлган сунъий синтезланувчи озиқ-овқат бўёқлари Е 171(титан диоксиди) ва Е 173 (алюминий) нинг организмга таъсирини ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Инсоният ҳаёти учун ўта муҳим бошқарув аъзоси бош мия ҳисобланиб, нанозаррачали титаннинг мияга етиб бориш йўли асосан 3 йўналишда амалга ошади: қон оқими ва мия ўртасидаги табиий тўсиқ орқали, ҳидлов нерви транслокация йўли ва фетоплацентар тўсиқ орқали ўтиши.[2].

Титан диоксидининг гематоенсефалик тўсиқдан ўта олиши ва тўпланиш хусусиятини бундан15 йил олдин Chen (2011.), Wang(2008.), Hu(2011.) алоҳида алоҳида тажрибаларда кўрсатиб ўтишган. Лабатор каламушларда ин витро наноўлчамли (30нм) титан диоксиди таъсирида микроглиал ҳужайралар қаторидан бўлган BV-2 митохондрияларида реактив кислород миқдорининг ошиши ва функсиясида бузилишлар кузатилган. Худди шундай яна бир тадқиқотда 15нм ўлчамли титан диоксиди миқдори ва таъсир давомийлигидан

қатъий назар инсон глиал (D384) ва нейрон (SH-SY5Y) ҳужайраларида ситотоксик таъсирни юзага чиқарганлиги кўрсатиб ўтилган. Умуман олганда мия тўсиғи орқали майда заррали токсик моддаларнинг ўтиши уч хил механизм: пассив диффузия, актив транспорт ва эндоситоз асосида амалга ошади. Микрозаррачалар ўлчами 50-75нм бўлган бўёқ 21 кун давомида 500мг/кг кунига тажриба каламушларига бериб борилган ва мия пўстлоқ қисмида реактив кислород ажралиши, антиоксидант ферментлар активлигининг ошганлиги, дофамин ва норадреналин секрецияси бир мунча кўпайганлиги аниқланди. Зичлиги жуда паст (5-6нм) титан диоксидининг бор йўғи 24 соат ичидаги таъсири натижасида гипокампус нейронларида апоптоз кузатилган. 60 кун давомида 5-50мг миқдордан берилган бошқа бир тажрибада каламушларда когнитив функсиянинг пасайиши намоён бўлган.[2],[3].

Бошқа майда заррачали озиқ-овқат қўшимчалари сингари титан диоксидининг асосий қисми овқат маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келади. Газланган ичимликлар, турли хил рангли ширинликлар, қадоқланган тузли ва ёғли сухарик, картошкали чипс маҳсулотлари, қоғозли конфетлар, пиширикlар, сут ва пишлоқ маҳсулотлари, колбаса маҳсулотларида айниқса кўп аниқланади. [1],[2].

Титан диоксиди нафақат озиқ-овқат саноатида балки дори-дармон саноатида, шахсий гигеник воситалари, пардоз воситалари ишлаб чиқаришда оқартирувчи сифатида ҳам фаол ишлатилади. Титан диоксиди сувда эримайдиган, токсиклиги кам модда ҳисобланади.

Организмда титан оқсиллар билан бириккан ҳолда тўпланади. Энтерал қабул қилинган титан диоксиди ошқозоннинг агрессив муҳити билан ўзаро таъсирлашиб, оқсил ва ферментлар хусусиятларини сезиларли даражада ўзгартиради. [5],[6].

Лабаратор шароитда каламуш организмига сурункали (90кун) энтерал титан диоксид юборилиб текширилганда талоқ зарарланганлиги, тромбоцитопения, лимфопения, гемоглобин миқдорининг камайиши, иммуноглобинлар миқдорининг камайиши аниқланган. Бошқа лабаратор текширишда титан диоксидини 10мг/кг дозада киритилиши жигарнинг оғир зарарланишига, нефронлар апоптозига, иммунрегуляциянинг бузилишига олиб келган. [5].

100мг/кг дозадаги титан диоксиди 10кун мобайнида энтерал киритилганда (каламуш организмига) CD4-лимфоцитлар ичакнинг барча соҳаларида ошганлиги, цитокинлар секрецияси ИЛ-4, ИЛ-12,ИЛ-23,ФНО ларнинг асосан йўғон ичак деворида ошганлиги аниқланган.

Жуда кўп тадқиқотлар титан диоксидининг организмга, айниқса ўпкага таъсири, унда келиб чиқувчи ўзгаришларга бағишланган.Бунда майда размерли титан диоксиди иш жойида нафас йўллари орқали кириши ва патологик жараённи келтириб чиқариши билан боғлиқ саволларга ечим қидирилган. Икки йил мобайнида юқори миқдордаги титан диоксиди билан каламушларда ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, каламушлар

ўпкасида ўсма касаллиги ривожланган ва бу титан диоксидининг канцероген ҳусусияти борлигидан далолат берган.

Интратрахеал йул билан кирувчи майда заррачали титан диоксиди алвеоляр макрофаглар ҳужайравий тузилишини зарарлайди ва улар функциясининг бузилишига олиб келади. Бундан ташқари алвеоляр макрофагларнинг хемотоксик хусусиятини пасайтиради. Кам миқдордаги титан диоксиди макрофагларнинг фагоцитар хусусиятини оширади, кўп миқдори эса бу хусусиятни пасайтиради. Майда заррачали титан диоксидининг миқдори оширилганда NO ва ФНО ишлаб чиқарилиши ошган, чунки одатий титан диоксидига қараганда майда заррачали титан диоксиди таъсирида яллиғланиш олди медиаторлари кўп синтезланган. Титан диоксидининг организмга кириш йўллари асосан энтерал ва дерматологик йўл орқалидир. Е 171 номи орқали маҳсулот қадоғида кўрсатилган модданинг асосий таркиби айнан шу титан диоксиди ҳисобланади. Озиқ-овқат маҳсулотларига оқиш ранг бериш учун қўшиладиган ушбу буёқ озуқавий ва сифатий қийматга эга эмас. Фақатгина маҳсулотнинг органолептик хоссаларига таъсир қилади ва тадбиркор хоҳлаган кўринишни ҳосил қилиб беради.

Е171 бўёғининг тобора кўп қўлланилиши, унинг организмга таъсир доирасини кенгроқ ўрганишга туртки бўлмоқда. Охирги йилларда ўтказилган тажрибаларда Е171 бўёғининг таркибий қисми бўлган титан диоксиди яллиғланиш жараёнларига ва ген токсиклигига, эпителиал гиперплазияга, ҳужайра неоплазиясига сабаб бўлади.

Титан диоксиди бутун дунё бўйлаб кўп истеъмол қилиняпти деб ҳисобласак, аҳолининг барча қатламлари орасида энг катта зарар кўрувчилар бу болалардир. Чунки 7-14 ёш орасидаги болалар худди катталардек Е 171 бўёғи мавжуд бўлган маҳсулотларни истеъмол қилади, тиш пасталаридан фойдаланади, лекин уларнинг вазни кам ва диспропорция туфайли, бўёқнинг зарарли таъсири яққолроқ намоён бўлади

Титан диоксидининг кам миқдори юқори нафас йўллари сезувчанлигини икки баробар оширади, яллиғланишга жавобгар ҳужайралар миқдорининг эса уч мартагача оширган. Гистологик текширувда эса шиш, эпителиал деструкция ва яллиғланиш аниқланган.

Эркин титан диоксиди цитоплазматик оқсиллар денатурациясига сабаб бўлади.

Озиқ-овқат бўёқларига нисбатан сезувчанлиги бўлган оғир ва ўрта оғир атопик бронхиал астма билан чалинган беморлар ремиссия даврида титан диоксидига нисбатан қонда Ig E миқдори 37.5% беморда, Ig A 22,9%, Ig G - 29,1% беморда аниқланган. Бундай юқори кўрсатгичлар оқ рангли титан диоксидининг юқори аллергик ва астматик хусусияти борлигидан далолат беради. [6].

АҚШ да катталар учун бир кунлик титан диоксиди истеъмол миқдори 0.2-0.7мг/кг га тўғри келади. 10ёшли болаларда 1кунлик истеъмол даражаси

1-2мг/кг га етган. Буюк Британияда бу кўзсатгич икки баробар ошиб, бир кунда катталар учун 1мг/кг, болалар учун 2-3мг/кг га етган.

10йил аввал ўтказилган тажрибаларда 1ҳисса истеъмол маҳсулотларида титан диоксидининг миқдори 225мг бўлган, ҳозирги кунга келиб бу миқдор 340мг га етди. Титан диоксиди майда заррали қўшимчаларнинг асосий манбаси бўлиб қолмоқда ва озиқ-овқат, дори воситалари билан организмга кириш кўрсатгичи тобора ошмоқда, бу эса титан диоксидининг организмга таъсирини ўрганиш тобора долзарб масалага айланаётганини кўрсатади. [1],[2],[3].

Е173 (алюминий)-токсиклиги юқори бўлган бу озуқа қўшимчасининг инсон организмига осон ва тез киришининг йўллари турличадир: 1) шахсий гигиена воситалари: тиш пасталари, турли косметик воситалар, антиперспирантлардир. Юқорида кўрсатиб ўтилган воситалар ҳозирги ҳаётимизнинг ажралмас бўлаги ва бир кунда бир неча маротабагача фойдаланадиган маҳсулот бўлганлигидан, алюминийнинг организмга киришининг асосий манбаси эканлигини ҳеч қанақасига рад этиб бўлмайди; 2) Озиқ-овқат маҳсулотлари ва ичимликларни алюминийли банкачалар ва фолгада қадоқлаш; 3) Алюминий даражаси юқори бўлган тупроқда етиштирилган кофе, чой ва тропик мевалар; 4) Завод чанги; 5) атроф муҳитнинг алюминий ифлосланиши. [9],[10],[11].

Ҳозирда олиб борилган изланишлар эпилепсия, аутизм ва Алцгеймер касалликлари билан оғриган беморлар бош миясида алюминий бирикмаларининг юқори миқдорда тўпланганлигини кўрсатди.[3],[5].

2020-йилда Молд томонидан олиб борилган яна бир гуруҳ текширишларда юқори миқдорли алюминий эпилепсияга сабаб бўлиши аниқланди. Бундан ташқари бу текширишлар бош мия билан боғлиқ муаммодан вафот этган Камелфорд воқеасига алоқадор тўртинчи бемор таҳлилларини ҳам ўз ичига олади. Унга кўра бемор церебрал амилоидли ангиопатиядан азият чеккан ва қисқа вақт ичида оламдан кўз юмган. Текширишларда миянинг тепа, чакка, энса, гипокампус соҳаларида юқори миқдорда алюминий борлиги аниқланган[6].

Использованные источники:

1. Álzate K. G. et al. Alzheimer’s disease and its association with dietary aluminum: a review //Tecnura: Tecnología y Cultura Afirmando el Conocimiento. – 2023. – Т. 27. – №. 77. – С. 5.

2. Amchova P., Kotolova H., Ruda-Kucerova J. Health safety issues of synthetic food colorants //Regulatory toxicology and pharmacology. – 2015. – Т. 73. – №. 3. – С. 914-922.

3. Cornu R., Béduneau A., Martin H. Ingestion of titanium dioxide nanoparticles: a definite health risk for consumers and their progeny //Archives of toxicology. – 2022. – Т. 96. – №. 10. – С. 2655-2686.

4.El Hangouche A. J. et al. Reversible myocardial injury and intraventricular thrombus associated with aluminium phosphide poisoning //Case reports in cardiology. – 2017. – Т. 2017. – №. 1. – С. 6287015.

5. Gutiérrez-Álzate K. et al. Alzheimer's disease and its association with dietary aluminum: a review //Tecnura. – 2023. – Т. 27. – №. 77. – С. 91-120.
6. Mold M, Cottle J, King A, Exley C. Intracellular Aluminium in Inflammatory and Glial Cells in Cerebral Amyloid Angiopathy: A Case Report. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2019; 16(8):1459. https://doi.org/10.3390/ijerph16081459
7. Mold, M., Linhart, C., Gómez-Ramírez, J., Villegas-Lanau, A., & Exley, C. (2020). Aluminum and amyloid-β in familial Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease, 73(4), 1627-1635.
8. Sahoo D. et al. Aluminium phosphide poisoning: Early suspicion of cardiotoxicity is necessary for improved outcomes //Cureus. – 2020. – Т. 12. – № 9.
9. Shah V., Baxi S., Vyas T. Severe myocardial depression in a patient with aluminium phosphide poisoning: a clinical, electrocardiographical and histopathological correlation //Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine. – 2009. – Т. 13. – №. 1. – С. 41.
10. Song B. et al. A review on potential neurotoxicity of titanium dioxide nanoparticles //Nanoscale research letters. – 2015. – Т. 10. – С. 1-17.
11.The chronic spleen injury of mice following long-term exposure to titanium dioxide nanoparticles / X. Sang [et al.] // J. Biomed. Mater. Res. A. – 2012 Apr. – Vol. 100, N 4. – P. 894–902.
12. Titanium dioxide induced inflammation in the small intestine / C. M. Nogueira [et al.] // World. J. Gastroenterol. – 2012 Sep. – Vol. 18, N 34. – P. 4729– 4735.
13. Torabi M. Successful treatment of aluminium phosphide poisoning: A case report //Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics. – 2013. – Т. 12. – №. 2. – С. 77-79.

UDK 613.6:616.24-008.4

Иброхимов К.
кафедра гигиены
Бухарский государственный медицинский институт

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация: Обоснование. *Производственная пыль является одним из ведущих вредных факторов в агропромышленном комплексе и оказывает неблагоприятное воздействие на органы дыхания работников. Длительное воздействие пылевых аэрозолей способствует развитию хронических воспалительных процессов, снижению функции внешнего дыхания и формированию профессионально обусловленных заболеваний.*

Цель исследования *– провести гигиеническую оценку влияния производственной пыли на функциональное состояние органов дыхания работников агропромышленного комплекса.*

Материалы и методы. *Проведено обследование работников агропромышленных предприятий с оценкой запылённости воздуха рабочей зоны (мг/м³), дисперсного состава пыли и длительности профессионального стажа. Функциональное состояние органов дыхания изучалось методом спирометрии с определением показателей жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ), объёма форсированного выдоха за 1 секунду ($ОФВ_1$). Статистическая обработка данных проводилась с использованием параметрических методов анализа.*

Результаты. *Установлено, что в ряде производственных участков концентрация пыли превышала предельно допустимые значения. У работников с длительным стажем работы выявлено достоверное снижение показателей функции внешнего дыхания, в частности $ОФВ_1$ и ФЖЕЛ, по сравнению с работниками с меньшим стажем. Выраженность функциональных изменений коррелировала с уровнем запылённости и продолжительностью воздействия.*

Заключение*. Производственная пыль оказывает негативное влияние на функциональное состояние органов дыхания работников агропромышленного комплекса. Полученные данные обосновывают необходимость усиления гигиенического контроля за запылённостью воздуха, совершенствования вентиляционных систем и проведения регулярных медицинских осмотров с целью раннего выявления нарушений дыхательной функции.*

Ключевые слова: *производственная пыль; органы дыхания; спирометрия; агропромышленный комплекс; профессиональный риск; гигиеническая оценка.*

Ibrokhimov K.
Department of Hygiene
Bukhara State Medical Institute

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE IMPACT OF INDUSTRIAL DUST ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF WORKERS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Abstract: *Background. Occupational dust is one of the leading harmful factors in the agro-industrial complex, adversely affecting the respiratory system of workers. Long-term exposure to dust aerosols contributes to the development of chronic inflammatory processes, reduced respiratory function, and the development of occupational diseases.*

The aim of the study was to conduct a hygienic assessment of the impact of occupational dust on the functional state of the respiratory system of workers in the agro-industrial complex.

Materials and Methods. A survey of workers in agro-industrial enterprises was conducted, assessing the dust content of the air in the work area (mg/m³), the dispersed composition of the dust, and the length of their professional experience. Respiratory function was assessed using spirometry, determining vital capacity (VC), forced vital capacity (FVC), and forced expiratory volume in 1 second (FEV_1). Statistical data processing was performed using parametric analysis methods.

Results. *Dust concentrations in a number of production areas were found to exceed maximum permissible limits. Long-serving workers showed a significant decrease in respiratory function parameters, particularly FEV_1 and FVC, compared to workers with less experience. The severity of functional changes correlated with dust levels and duration of exposure.*

Conclusion. *Occupational dust has a negative impact on the respiratory function of workers in the agro-industrial complex. The data obtained substantiate the need for enhanced hygienic monitoring of air dust levels, improved ventilation systems, and regular medical examinations for the early detection of respiratory disorders.*

Keywords: *occupational dust; respiratory system; spirometry; agro-industrial complex; occupational risk; hygienic assessment.*

Введение

Производственная пыль является одним из наиболее распространённых и значимых вредных факторов в агропромышленном комплексе. В условиях животноводческих, птицеводческих и перерабатывающих предприятий формируются аэрозоли сложного состава, включающие органическую пыль, микроорганизмы, эндотоксины, фрагменты кормов и продукты жизнедеятельности животных. Длительное ингаляционное воздействие данных факторов оказывает неблагоприятное влияние на органы дыхания

работников и способствует формированию хронической бронхолёгочной патологии [1,2].

Согласно данным современных исследований, запылённость воздуха рабочей зоны на предприятиях сельского хозяйства и переработки сырья нередко превышает санитарно-гигиенические нормативы, что сопровождается ростом частоты респираторных симптомов и снижением показателей функции внешнего дыхания [3,4]. Особую опасность представляет мелкодисперсная фракция пыли, способная проникать в дистальные отделы дыхательных путей и вызывать развитие воспалительных и фиброзных изменений [5].

В ряде публикаций отмечается, что хроническое воздействие органической пыли и биоаэрозолей приводит к формированию профессионально обусловленных заболеваний, включая хронический бронхит, обструктивные нарушения вентиляции и гиперреактивность бронхов [6,7]. При этом снижение показателей объёма форсированного выдоха за первую секунду ($ОФВ_1$) и форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ) рассматривается как ранний функциональный маркер неблагоприятного воздействия производственной среды [8].

Несмотря на наличие отдельных исследований, комплексная гигиеническая оценка влияния производственной пыли на функциональное состояние органов дыхания работников агропромышленного комплекса остаётся актуальной задачей профилактической медицины. Это обусловлено необходимостью раннего выявления профессиональных рисков и разработки эффективных профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения [9,10].

Результаты исследования

В ходе проведённого исследования установлено, что условия труда работников агропромышленного комплекса характеризуются различной степенью запылённости воздуха рабочей зоны, что оказывает влияние на функциональное состояние органов дыхания. Анализ полученных данных выявил достоверные различия между производственными секторами по уровню производственной пыли и показателям функции внешнего дыхания.

Наибольшая концентрация производственной пыли зарегистрирована в птицеводстве и животноводстве, где показатели превышали предельно допустимые значения. Одновременно у работников данных отраслей выявлено снижение спирометрических показателей, свидетельствующее о формировании начальных вентиляционных нарушений.

Таблица 1

Средние концентрации производственной пыли в воздухе рабочей зоны (M±m), мг/м³

Производственный сектор	Концентрация пыли (мг/м³)	Превышение ПДК (раз)
Животноводство	4,72 ± 0,21	1,18
Птицеводство	5,27 ± 0,24	1,32
Коневодство	3,68 ± 0,19	0,92
Мясопереработка	2,95 ± 0,17	0,74
Контрольная группа	0,84 ± 0,05	—

Наибольшие показатели запылённости выявлены в птицеводстве (5,27 ± 0,24 мг/м³), что в 1,32 раза превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). В животноводстве концентрация пыли составила 4,72 ± 0,21 мг/м³ (1,18 ПДК). В мясоперерабатывающем производстве уровень пыли был ниже нормативных значений.

Функциональное состояние органов дыхания оценивалось методом спирометрии. Выявлены достоверные различия показателей функции внешнего дыхания между обследованными группами(2 таб)

Таблица 2

Показатели функции внешнего дыхания у работников (M±m)

Показатель	Контроль	Животноводство	Птицеводство	Коневодство	Мясопереработка	
ФЖЕЛ (% от долж.)	98,4 ± 1,2	91,6 ± 1,4*	88,3 ± 1,6*	94,2 ± 1,3	95,1 ± 1,2	
$ОФВ_1$ (% от долж.)	97,9 ± 1,1	89,8 ± 1,5*	85,6 ± 1,7*	92,4 ± 1,4	93,7 ± 1,3	
Индекс Тиффно (%)	81,5 ± 1,0	76,2 ± 1,2*	73,4 ± 1,4*	78,9 ± 1,1	79,8 ± 1,0	

* $p < 0,05$ по сравнению с контрольной группой

Наиболее выраженное снижение показателей ФЖЕЛ и $ОФВ_1$ отмечено у работников птицеводческих предприятий. Индекс Тиффно также имел тенденцию к снижению, что свидетельствует о формировании начальных обструктивных нарушений вентиляции лёгких.

Анализ распространённости респираторных симптомов показал чёткую зависимость от уровня запылённости воздуха рабочей зоны. С увеличением концентрации производственной пыли возрастала частота жалоб на кашель, одышку, ощущение стеснения в грудной клетке и эпизоды затруднённого дыхания. Наиболее выраженные симптомы регистрировались у работников с длительным стажем работы и при концентрациях пыли, превышающих санитарно-гигиенические нормативы, что свидетельствует о дозо-зависимом характере воздействия аэрозольных факторов на дыхательную систему(3 Таблица)

Таблица 3

Частота респираторных жалоб у работников, %

Симптом	Животноводство	Птицеводство	Коневодство	Мясопереработка
Хронический кашель	32,5	41,8	21,1	18,4
Одышка при нагрузке	28,3	36,4	17,8	15,6
Чувство стеснения в груди	19,2	27,3	12,4	10,8

Анализ показателей функции внешнего дыхания, представленных в таблице 3, показал чёткую зависимость между уровнем запылённости воздуха рабочей зоны и функциональным состоянием органов дыхания работников.

У работников с низким уровнем запылённости (до 2,0 мг/м³) среднее значение ФЖЕЛ составило 4,52 ± 0,18 л, $ОФВ_1$ - 3,84 ± 0,15 л, индекс Тиффно - 84,9 ± 1,2 %.

В группе со средним уровнем запылённости (2,1–4,0 мг/м³) показатели были ниже: ФЖЕЛ - 4,18 ± 0,16 л, $ОФВ_1$ - 3,45 ± 0,14 л, индекс Тиффно -82,5 ± 1,4 %.

Наиболее выраженные изменения выявлены у работников, подвергающихся высокой запылённости воздуха (более 4,0 мг/м³): ФЖЕЛ снизилась до 3,74 ± 0,14 л, $ОФВ_1$ -до 2,96 ± 0,12 л, индекс Тиффно -до 79,1 ± 1,6 % ($p < 0,05$).

Таким образом, по сравнению с группой низкой запылённости, снижение ФЖЕЛ составило 17,3 %, $ОФВ_1$ -22,9 %, а индекс Тиффно уменьшился на 5,8 процентных пункта.

Полученные данные свидетельствуют о формировании преимущественно обструктивных нарушений вентиляционной функции лёгких у работников, длительно контактирующих с производственной пылью, что подтверждает её неблагоприятное влияние на бронхолёгочную систему.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают неблагоприятное влияние производственной пыли на функциональное состояние органов дыхания работников агропромышленного комплекса. Установлена прямая зависимость между уровнем запылённости воздуха рабочей зоны и снижением показателей функции внешнего дыхания. В группе работников, подвергавшихся воздействию высоких концентраций пыли, выявлено статистически значимое снижение показателей ФЖЕЛ и $ОФВ_1$ ($p < 0,05$), а также уменьшение индекса Тиффно, что свидетельствует о формировании обструктивных нарушений вентиляции.

Выявленные изменения указывают на хроническое раздражающее воздействие пылевых частиц на слизистую оболочку дыхательных путей, что способствует развитию воспалительных процессов, бронхоспазма и постепенному снижению бронхиальной проходимости. Длительное

воздействие запылённого воздуха может приводить к формированию хронического бронхита, профессиональной бронхопатии и других заболеваний органов дыхания.

Следует отметить, что неблагоприятное влияние пыли усиливается при сочетании с повышенной влажностью, недостаточной эффективностью вентиляционных систем и высокой интенсивностью производственных процессов. Мелкодисперсные частицы способны проникать в дистальные отделы бронхиального дерева и альвеолы, вызывая иммуновоспалительные реакции и способствуя прогрессированию функциональных нарушений.

Таким образом, производственная пыль оказывает комплексное негативное воздействие на респираторную систему, реализующееся через механическое раздражение, воспалительные и иммунологические механизмы. Полученные данные обосновывают необходимость совершенствования вентиляции, снижения пылеобразования, использования средств индивидуальной защиты и проведения регулярных профилактических медицинских осмотров работников.

Заключение

Проведённое исследование показало, что производственная пыль является значимым фактором профессионального риска для работников агропромышленного комплекса. Повышенные концентрации пыли в воздухе рабочей зоны сопровождаются увеличением распространённости респираторных симптомов и достоверным снижением показателей функции внешнего дыхания (ФЖЕЛ, $ОФВ_1$, индекс Тиффно).

Установлена прямая зависимость между уровнем запылённости и выраженностью функциональных нарушений дыхательной системы, что свидетельствует о хроническом неблагоприятном воздействии аэрозольных частиц на органы дыхания. Наиболее выраженные изменения отмечены у работников со стажем более 10 лет, что подтверждает кумулятивный характер пылевой нагрузки.

Полученные результаты подчёркивают необходимость регулярного гигиенического мониторинга качества воздуха рабочей зоны, совершенствования вентиляционных систем, снижения пылеобразования и обязательного использования средств индивидуальной защиты. Раннее выявление функциональных нарушений дыхательной системы должно рассматриваться как важный элемент профилактики профессиональных заболеваний и сохранения здоровья работников агропромышленного комплекса.

Использованные источники:

1. Bakutis B., Monstviliene E., Januskeviciene G. Analyses of airborne contamination with bacteria, endotoxins and dust in livestock barns and poultry houses // *Acta Veterinaria Brno*. – 2004. – Vol. 73(2). – P. 283–289.
2. Radon K., Danuser B., Iversen M., et al. Respiratory symptoms in European animal farmers // *European Respiratory Journal*. – 2001. – Vol. 17(4). – P. 747–754.

3. Rimac D., Macan J., Varnai V.M., et al. Exposure to poultry dust and health effects in poultry workers // *International Archives of Occupational and Environmental Health*. – 2009. – Vol. 83(1). – P. 9–19.
4. Douglas P., Robertson S., Gay R., et al. A systematic review of the public health risks of bioaerosols from intensive farming // *International Journal of Hygiene and Environmental Health*. – 2017. – Vol. 221(2). – P. 134–173.
5. Mirmohammadi S., Khanjani N., Nazarkhani F., et al. The effect of noise and dust exposure on oxidative stress among livestock and poultry feed industry workers // *Toxicology and Industrial Health*. – 2020. – Vol. 36(11). – P. 908–915.
6. Mainelis G. Bioaerosol sampling: classical approaches, advances, and perspectives // *Aerosol Science and Technology*. – 2019. – Vol. 54(5). – P. 496–519.
7. Babanov S., Budash D. The state of humoral immunity at chronic dust bronchitis and pneumoconioses // *University Proceedings Volga Region. Medical Sciences*. – 2016. – № 3.
8. Vlahovich K.P., Sood A. A 2019 update on occupational lung diseases: a narrative review // *Pulmonary Therapy*. – 2020. – Vol. 7(1). – P. 75–87.
9. Austin E.K., James C., Tessier J. Early detection methods for silicosis // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2021. – Vol. 18(15). – 8123.
10. Koigeldinova S., Alexeyev A., Zharylkassyn Z., et al. Immune status of workers with professional risk of chrysotile asbestos exposure // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. – 2022. – Vol. 19(21). – 14603.

УДК: 631.459:32

Игамбердиева Д.А.
докторант
Кораев А.Х., доктор философи (PhD) по биологических наук
старший научный сотрудник
заведующий лабораторией
Институт почвоведения и агрохимических исследований

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ СЕРОЗЕМОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Аннотация. *В статье изложены изменения химических и физических свойств типичных сероземов в результате противоэрозионных мероприятий. За счет эрозии почвы увеличение частиц в почве приводит к усилению смывания даже при небольшом расходе воды на поверхности. Появление мелких частиц в такой почве увеличивает вымывание поверхностного слоя и сброс ее в сточные воды. За счет течение воды, мелькие глинистые и илистые части почвы смываются, а ее крупные по механическому составу частицы остаются надне промоин. В типичных сероземах, где происходить эрозионный процесс, нарушаются и ухудшаются физические, химические и биологические условия, создающие благоприятные условия для нормального развития хлопчатника, пшеницы и других сельскохозяйственных культур.*

Ключевые слова: *типичный серозем, эрозия почв, химические свойства, механический состав, гумус.*

Igamberdieva D.A.
doctoral candidate
Korayev A.Kh.,Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences
senior researcher
Laboratory Head Institute of Soil Science and Agrochemical Research

CHANGES IN THE PROPERTIES OF SERIOZEMS SOILS AS A RESULT OF THE INFLUENCE OF WATER EROSION

Annotation. *The article describes changes in the chemical and physical properties of typical gray soils as a result of anti-erosion measures. Due to soil erosion, an increase in particles in the soil leads to increased flushing even with low water flow at the surface. The appearance of small particles in such soil increases the leaching of the surface layer and its discharge into wastewater. Due to the flow of water, soft clay and silty parts of the soil are washed away, and its large particles in terms of mechanical composition remain above the gullies.*

Key words: *typical gray soil, soil erosion, chemical properties, mechanical composition, humus.*

Введение. Процесс эрозии существенно изменяет все свойства почвы, в том числе ее механический состав. В результате будут происходить изменения частиц разного размера. Увеличение частиц в почве приводит к усилению смывания даже при небольшом расходе воды на поверхности. Появление мелких частиц в такой почве увеличивает вымывание поверхностного слоя и сброс ее в сточные воды. Он не очень крутой, течение воды слабое, мягкие глинистые и илистые части почвы смываются, а ее крупные по механическому составу частицы остаются в на дне почвы. При проведении исследовательской работы были проанализированы труды. [1]. Объектом исследования были выбраны Чартакский район Наманганской области. До сих пор в массивах «Навоийский» Чартакского района на разных степенях эрозионных процессов на разных элементах рельефа размещены разрезы почв и взяты пробы почвенных образцов для лабораторного анализа.

Цель и задача исследования. Цель исследование являются изучение физических и химических свойств почв в результате влияние ирригационной эрозии. Для достижения цели мы сочли необходимым выполнить следующие задачи. Определение влияния ирригационной эрозии на физико-химические свойства типичных сероземов.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были выбраны подвергшиеся эрозии типичные серозеиные почвы Наманганской области Чартакского район. Полевые почвенные исследования и камерально – аналитические работы проводились на основе разработанных и общепринятых методических руководств НИИПА и УЗНИИХ, и по методике Е.В. Аринушкиной «Руководство по химическому анализу почв» Математически – статистический анализ полученных данных выполнен при дисперсионным методом Б.А. Доспехов [2].

Результаты исследования и их обсуждение. Физические свойства почвы и происходящие в ней физические процессы имеют большое значение для водного, воздушного и теплового режимов почвы, а также для роста и развития растений. Физические свойства почвы, в свою очередь, влияют на ее плодородие, то есть чем лучше физические свойства, тем плодороднее почва[3]. Количество физической глины в сильноэродированных почвах резко снижается при сравнении механического состава средне выщелоченных почв [4]. Результаты исследования показывают, что наименьшая физические свойства почвы наблюдается в пахотном слое рассматриваемых типичных сероземов, поскольку в основе этого слоя в вегетационный период лежит интенсивное выращивание хлопчатника. Например, количество физической глины в слое 0-30 см почвы, собранной в результате полива на намытых почвах, составило 36,6 процента, а среднее смытых почвах количество физической глины - 25,4 процента. Поэтому количество физической глины в почве является одним из важнейших показателей, определяющих все ирригационных процессов происходящие в почве (табл. 1).

Таблица-1.

Механический состав эродированных почв Чартакского района, %

Степень эродированности	Глубина, см	Размер фракции							Физическая глина
		>0,25	0,25-0,10	0,10-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	
Средне смытая	0-30 30-50	1,5 2,0	0,5 1,5	20,1 20,2	52,5 52,5	2,4 1,6	14,3 14,3	8,7 8,0	25,4 23,9
Намытая	0-30 30-50	0,2 1,0	0,5 0,6	22,2 20,5	40,5 39,0	6,4 8,0	19,1 19,1	11,1 11,9	36,6 39,0

Кроме того, в эродированных землях происходит смыв почвы и, как следствие, по профилю уменьшается накопление мелких частиц почв на нижних части склона, переход от сильной эрозии к слабой эрозии и это зависит от удельной и объемной массы верхнего слоя почвы. Насыпная плотность верхнего слоя почвы орошаемых эродированных склонов составляет 1,31-1,55 г/см, а в почве, накопленной мелкими частицами в результате полива, она значительно меньше - около 1,28-1,32 г/см. Характерной особенностью этого является то, что общая пористость почвы по всем показателям больше на участках, где крупные частицы почва скопилась в результате полива по сравнению с смытыми почвами участках.

Сравнительный анализ сильно смытых склонов и почвы, накопленной в результате смыва, а также отдельных слоев показал, что качество смытой почвы хорошее. Удельная и объемная масса почвы снизилась на 0,03 г/см в метровом слое, а общая пористость увеличилась на 0,8%, причем разница более выражена на сильно смытой части склона. По данным исследований, проведенных в 2021-2022 годах, количество влаги в почве в метровом слое промытой земли составляло 72,3 процента от предельной полевой влагоемкости, а в почве, накопленной в результате промывки, ее было больше. В верхней части склона накопленная влага в слое почвы достигала 72,8%, тогда как ограниченная полевая емкость в смытых почвах в нижней части склона составляла 96,3%.

Из приведенного аналитического материала известно, что все изученные почвы характеризуются низким содержанием гумуса. Сравнивая фактическое количество гумуса в эродированных почвах, установлено, что количество гумуса уменьшается по мере увеличения степени эродированности. Наибольшее содержание гумуса наблюдалось в неэродированных почвах, а наименьшее - в сильноэродированных. Результаты анализа показали, что содержание общего азота, фосфора и калия, а также гумуса зависит от степени эродированности почв. Во всех почвах максимальное их количество накапливается в пахотных горизонтах, что связано с их биологической фиксацией и ежегодным внесением минеральных удобрений. Давно известно, что количество гумуса влияет на физико-химическое состояние и микробиологический процесс почвы. Гумус является не только источником азота и других минеральных веществ в почве, но и

считается важным фактором, определяющим ее усвояемость, биологическую активность и условия усвоения растениями минеральных элементов питания [5]. Органическое вещество почвы уменьшает объемный вес, относительно размягчает ее, увеличивает ее влагоемкость, уменьшает ее вес, а ирригационная эрозия приводит к уменьшению прочности гумусового слоя и уменьшению запасов гумуса, связанных с органическим азотом. Во многих землях с увеличением объемов вымывания почвы запасы органического вещества в ее составе начинают уменьшаться. Особенно на умеренно промытой части склона количество гумуса в почве. На основании рельефа земель и процесса ирригационной эрозии было бы ошибкой делать вывод о правомерности распределения питательных веществ, основываясь только на количестве гумуса в верхнем слое. Поэтому важно наблюдать за изменением количества гумуса во всех слоях почвы эродированных земель (таблица -2).

Таблица-2.

Среднегодовое смывание почв на опытном участки, т/га

Наблюдательные участки	Степень уклона, градус.	Длина поле, м.	Экспозиция уклона, м.	Вид культуры	Средняя величена смыва, т/га.				Годовой смыв почвы, т/га
					1-полив	2-полив	3-полив	4-полив	
1	4,7	80	южный	Хлопчат-ник	24,5	25,7	17,3	16,0	83,5
2	6,5	150	северны	Хлопчат-ник	5,0	4,5	1,2	1,0	11,7

Доказано, что состав почв разных мест различен, а также доказано, насколько снижается содержание гумуса в результате ирригационной эрозии в непромытых и смытых почвах. Этот процесс происходит и на орошаемых землях, особенно на щебнистых холмистых и предгорных равнинах, а также на староорошаемых полях, в зависимости от уровня выщелачивания почвы.

Полученные данные показали, что оросительный сток увеличивается с увеличением крутизны склона, но резкое его увеличение наблюдается начиная с уклона поверхности, равного 2^0. Если объем годового смывания на склоне $1,1^0$ (уч-1) составляет 11,7 т/га, то на склоне $2,5^0$ (уч-2) - 55,1 т/га, то есть смывание почвы увеличилось в 4,7 раза. Затем с увеличением уклона поверхности происходит примерно такой же рост количества вымывания почвы. Если за период в культуре хлопчатник на уклоне $4,7^0$ (уч-3) оросительной водой было смыто 83,5 т/га почвы, то на склоне $6,5^0$ (уч-4) - 11,7 т/га. Можно сделать вывод, что начиная с уклона поверхности 2^0, смывание почвы увеличивается примерно в 7,2 раза при каждом последующем уклона поверхности $1,8^0$

В типичных сероземах, подверженных ирригационной эрозии, по содержанию общего азота проявляется более низкий норматив гумуса по

сравнению с неэродированными участками. Количество азота в почвенном слое слабо эродированных почвах составляло 0,080-0,044%, в сильно эродированных почвах - 0,046-0,024%. В нижнем слое его количество резко уменьшается. Прежде всего обращают на себя внимание разные уровни нитрификации в зависимости от рельефа и эрозии почв. Наиболее активно процесс происходит в почве, накопленной в результате вымывания в нижней части склона.

При повышении потребности растения в питательных веществах правильное соблюдение срока и норм внесения в почву азотных удобрений позволяет сохранить количество нитратов. Внесение в почву только азотных удобрений при обработке междурядий хлопчатника приводит к значительному увеличению нитратов в почве, особенно на смытой части склона. При увеличении нормы азотных удобрений до 200 кг/га и выше, независимо от уровня смытых почв, накопление его в почве начинается весной и достигает максимума в июне.

После этого на сильно смытой части склона начался период ее резкого снижения. В конце вегетации количество нитратов значительно снижается, с одной стороны, поскольку ростки хлопка усвоили их в больших количествах, а с другой стороны, микробиологический процесс в почве замедлился. Важнейшим вопросом, доказанным в наших исследованиях, является прямая связь между внесением удобрений на эродированные земли и процессом накопления нитратов.

Количество фосфора варьируется в разных районах и на разных уровнях. Его валовое количество в пахотном слое слабо эродированных почв обычно нормальное (0,150-0,140%) и значительно ниже, чем сильно эродированных почвах (0,196-0,166).

Типичные сероземы, подверженные ирригационной эрозии, содержат меньше общего и подвижного фосфора, чем слабо эродированный участок. На смытых территориях потери подвижного фосфора, как и общего фосфора, значительно выше. Его количество увеличивается в сильносмытых почвах.

Например, количество валового фосфора в слое слабо смытых верхней части почвы составляет 0,150 %, а подвижного фосфора в почве - 16,4 мл/кг.

Подвижный фосфор может истощаться в эродированных почвах без постоянного внесения местных и минеральных удобрений. Установлено, что количество подвижного фосфора было практически одинаковым в верхней промытой части пробной площади перед посадкой семян.

На данный момент наблюдаются значительные отклонения от 10-15 мг/кг почвы из-за ирригационной эрозии в нижней части склона.

Ирригационная эрозия почв влияет на динамику содержания фосфатов в почве и подпочвенных слоях минеральных удобрений. В течение всего вегетационного периода, независимо от нормы и соотношения фосфорных удобрений, в нижней части склона количество подвижного фосфора больше, чем в верхней, смытой части. Количество фосфора, усваиваемого растением, неодинаково на всех участках склона. Однако существует существенная

разница между стандартными и минеральными удобрениями. Видно, что соотношение фосфора и азота изменилось с 1:0,8 до 1:2, а норма фосфорных удобрений превысила 60 кг на гектар.

Своеобразен закон Прянишнокова, заключающийся в том, что при внесении фосфорных удобрений количество фосфатов односторонне увеличивается и приводит к уменьшению усваиваемого азота. На данный момент внесение в почву только азотных удобрений приведет к резкому снижению усвоения растением фосфорных удобрений. Даже на смытой части склона его количество меньше, чем на контрольном участке.

Механический состав почвы считается основным фактором, определяющим величину подвижного калия в почве. На основании этих факторов процесс ирригационной эрозии влияет на подвижный калий на эродированных почвах.

С целью определения количества подвижного калия в эродированных почвах исследования проводились на участках, которые не смывали в разной степени и систематически не удобряли. В орошаемых сероземах, на легких песчаных почвах в зависимости от уровня смывания количество подвижного калия несколько снижается, а в смытой части участка оно закономерно увеличивается.

Увеличение или уменьшение количества обменного калия на систематически удобренной смывной площади по сравнению с количеством фосфора на непромытой площади в результате размыва и обработки пахотного слоя почвы до оросительной эрозии зависит от исходного количества калия. В генетическом слое слабо эродированных орошаемых почвах на глубине ниже 100 см обменный калий снижается (210,9–96,4 мг/кг). Вымывание верхнего слоя почвы в результате ирригационной эрозии привело к снижению содержания обменного калия по сравнению с слабо эродированными почвами. Таким образом, количество гумуса и питательных веществ на орошаемых почвах напрямую зависит от степени эрозии почвы. Такая ситуация приводит к снижению плодородия этих почв.

Выводы

Количество физической мутности в слое 0-30 см промытой и собранной почвы за счет размыва поверхности почвы под влиянием ирригационной эрозии составило 36,6 процента, а средняя величина мутности - 25,4 процента. Сероземные почвы, подверженные ирригационной эрозии, имеют более высокий удельный вес, чем сильно смытые почвы. Кроме того, размыв поверхности почвы на эродированных участках и, как следствие, уменьшение почвонакоплений в нижней части склона и переход от сильного промывания к слабому зависят от удельного и объемного веса почвы в верхние горизонты этих территорий. Количество валового фосфора в слое почвы среднепромытой верхней части участка составляет 0,42-0,39%, подвижного фосфора в почве - 15,0-6,0 мл/кг. Видно, что соотношение фосфора и азота изменилось с 1:0,8 до 1:2, а норма фосфорных удобрений увеличилась до более чем 60 кг/га. В

результате применения фосфорных удобрений в одностороннем порядке увеличилось количество фосфатов и снизилось поглощение азота.

Использованные источники:

1. Заславский М.Н. – Эрозияведение. М. Высшая школа, 1983 г.
2. Б.А.Доспехов, Методика полевого опыта.- Мос; Агропромиздат, 1985. 352-353 – С
3. Barber M.E. Ephemeral gully erosion from agricultural regions in the Pacific Northwest, USA / M.E.Barber, R.L.Mahler // Annals of Warsaw agr. univ. Land reclamation. Warsaw. - 2010. - № 42 (1). - P. 23-29.
4. Поляков Ю.П., Дьяков В.П. – Оценка надежности почвозащитных технологий поверхностных поливов. Науч.тр.Почв. ин-та В.В.Докучаева. М. 2007 г.
5. Deviren Saygen S. Huang C. A revisit of sandblasting technique to measure soil crust strength. http://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106073. CATENA, vol.212, 2022.

Исмаилов А.И.
доцент
Андижанский государственный технический институт
Республика Узбекистан г. Андижан
Закирова И.З.
старший преподаватель
Андижанский государственный технический институт
Республика Узбекистан, г Андижан

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТРАКТОРОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. *В статье рассмотрены перспективы внедрения многофункциональных электротракторов и мобильных электростанций на основе возобновляемых источников энергии в агропромышленном комплексе Андижанской области. Актуальность исследования обусловлена недостаточным уровнем энергообеспеченности сельскохозяйственных угодий и необходимостью повышения энергетической и экономической эффективности аграрного производства. Целью работы является обоснование целесообразности применения электротракторов в сочетании с мобильными солнечно-ветровыми электростанциями для выполнения агротехнических и защитных мероприятий. Полученные результаты подтверждают эффективность предложенного подхода и возможность его практического внедрения.*

Ключевые слова: *химическая защита, растений, эффективный, мобильная электростанция, норма расход.*

Ismailov A.I.
associate professor
Andijan State Technical Institute
Republic of Uzbekistan, Andijan
Zokirova I.Z.
senior lecturer
Andijan state technical institute
Republic of Uzbekistan, Andijan

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF MULTIFUNCTIONAL ELECTRIC TRACTORS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE ANDIJAN REGION

Abstract. *The article examines the prospects for implementing multifunctional electric tractors and mobile power stations based on renewable energy sources in the agro-industrial complex of the Andijan region. The relevance*

of the study is determined by the insufficient level of energy supply to agricultural land and the need to improve the energy and economic efficiency of agricultural production. The purpose of the research is to substantiate the feasibility of using electric tractors in combination with mobile solar-wind power stations for performing agrotechnical and plant protection activities. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed approach and the possibility of its practical implementation.

Keywords: *chemical protection, plants, effective, mobile power station, consumption rate.*

Введение

Развитие агропромышленного комплекса является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Республики Узбекистан. В соответствии со «Стратегией развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» особое внимание уделяется обеспечению продовольственной безопасности, повышению эффективности использования земельных ресурсов и внедрению современных энергосберегающих технологий. Электрическая энергия играет ключевую роль в развитии агропромышленного комплекса и используется для орошения, электропривода технологического оборудования, а также для выполнения агротехнических мероприятий. Вместе с тем значительная часть сельскохозяйственных угодий, особенно в отдалённых районах Андижанской области, остаётся вне зоны централизованного электроснабжения, что существенно ограничивает возможности их эффективного использования. В этих условиях особую актуальность приобретает внедрение мобильных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии и электрических транспортных средств, включая многофункциональные электротракторы.

Методы исследования

В ходе исследования применялись следующие методы:

- анализ нормативно-правовых и стратегических документов в сфере развития агропромышленного комплекса;
- изучение мирового и отечественного опыта применения электрической техники в сельском хозяйстве;
- технико-экономическая оценка эффективности использования электротракторов и мобильных электростанций;
- сравнительный анализ традиционных и электрических средств механизации.

Объектом исследования являются сельскохозяйственные угодья Андижанской области и применяемые на них технические средства.

Состояние энергоснабжения сельского хозяйства Андижанской области

Анализ показывает, что более 40 % сельскохозяйственных земель региона не обеспечены стабильным централизованным электроснабжением. Основными причинами этого являются:

- относительно низкий уровень энергопотребления в отдельных хозяйствах;
- сезонный характер сельскохозяйственных работ;
- изменяющиеся графики энергопотребления в зависимости от агротехнических требований.

В результате значительная часть плодородных земельных ресурсов используется неэффективно или полностью выводится из оборота. Кроме того, сельскохозяйственная техника с двигателями внутреннего сгорания характеризуется высокими эксплуатационными затратами и зависимостью от поставок горюче-смазочных материалов.

Мобильные электростанции на основе ВИЭ

Одним из перспективных решений проблемы энергоснабжения является использование мобильных электростанций на основе солнечной и ветровой энергии. Разработанный опытный образец солнечно-ветровой мобильной электростанции способен генерировать в дневное время в среднем 4,5–4,7 кВт·ч, а в вечерние часы — 0,8–1,0 кВт·ч электрической энергии. Годовая выработка электроэнергии такой станции превышает 20 000 кВт·ч, что в денежном выражении соответствует примерно 8,7 млн сум. Использование мобильной электростанции позволяет обеспечить энергией сельскохозяйственные работы на площади более 100 га и вернуть в оборот ранее неиспользуемые земли.

Многофункциональные электротракторы в сельском хозяйстве

Многофункциональные электротракторы предназначены для выполнения широкого спектра агротехнических мероприятий, включая:

- внекорневую подкормку сельскохозяйственных культур;
- химическую защиту растений от болезней, вредителей и сорняков;
- транспортные операции в тепличных хозяйствах и на открытых полях.

Совместное использование электротракторов и мобильных электростанций позволяет существенно повысить энергоэффективность сельскохозяйственного производства, снизить эксплуатационные расходы и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Экономическая эффективность внедрения

Экономический анализ показывает, что срок окупаемости мобильной электростанции и электротрактора не превышает 4 лет. При этом дополнительный экономический эффект достигается за счёт:

- сокращения затрат на топливо и техническое обслуживание;
- повышения производительности сельскохозяйственных работ;
- улучшения качества обработки сельскохозяйственных культур.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают целесообразность внедрения многофункциональных электротракторов в агропромышленном комплексе Андижанской области. Использование электрической техники в сочетании с возобновляемыми источниками энергии способствует повышению энергетической независимости сельского хозяйства и устойчивому развитию региона.

Выводы

Внедрение многофункциональных электротракторов на основе возобновляемых источников энергии является целесообразным для агропромышленного комплекса Андижанской области. Использование мобильных солнечно-ветровых электростанций обеспечивает надёжное энергоснабжение сельскохозяйственных угодий в условиях отсутствия централизованных сетей. Совместная эксплуатация электротракторов и мобильных электростанций повышает энергоэффективность и экономическую устойчивость сельскохозяйственного производства.

Использованные источники:

1. Бокиев А.А., Исмаилов А.И., Нуриддинов Н.А. Перспективы внедрения электротракторов на основе ВИЭ в сельском хозяйстве.
2. Matthews G.A. Electrostatic spraying of pesticides: a review. Crop Protection, 1989.
3. Нуралиева Н., Бокиев А. Электромеханические устройства для обработки сельскохозяйственных культур.
4. Nuriddinov N., Bokiev A., Sultanov S. Agroenergy of the Republic of Uzbekistan: problems and solutions.

Исмоилов О. И., т.ф.н.
доцент
Одам анатомияси кафедраси
Самарқанд давлат тиббиёт университети

ОДАМЛАРДА ҚОВУРҒА-УМУРТҚА БЎҒИМИ НЕРВЛАРИНИНГ АНОТОМО-ТОПОГРАФИК ТУЗУЛИШИ

Резюме: *Ушбу мақолада одамларда умуртқа-қовурға бўғимлари иннервацияси манбалари ўрганилган ҳамда ушбу боғламалар доирасида нервлар тарқалиш усули тасвирланган. Тадқиқот турли ёш ва жинсдаги одамлар мурдасида ўтказилган. Умуртқа-қовурға бўғимлари энг кўп шохчаларни симпатик пояни кўкрак бўлими тугунларидан олади. Барча кўрсатилган тузилмаларнинг иннервациясининг мураккаблиги ушбу тизимларнинг барчасининг функционал фаолиятини кўкрак қафасининг нафас олиш ҳаракатлари вақтида мувофиқлаштириш билан боғлиқ.*

Калит сўзлар: *Одамлар мурдаси, қовурға-умуртқа бўғимлари, иннервация, сирка кислотаси эритмаси, қовурғаоралиғи нерви, тугунлараро шохчалар.*

Ismoilov O.I., PhD
associate professor
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University

ANATOMO-TOPOGRAPHIC STRUCTURE OF THE NERVES OF THE COSTOVERTEBRAL JOINTS IN HUMANS

Summary: *This article examines the sources of innervation of the costovertebral joints in humans and describes the pattern of nerve distribution within these joints. The study was conducted on human cadavers of various ages and sexes. The greatest number of branches to the costovertebral joints is provided by the ganglia of the thoracic sympathetic trunk. The complexity of the innervation of all the listed structures is associated with the coordination of the functional activity of these systems during respiratory excursions of the thoracic cage.*

Keywords: *human cadavers, costovertebral joints, innervation, acetic acid solution, intercostal nerve, interganglionic branch.*

Кириш. Инсондаги қовурға-умуртқа бўғимлари шу турдаги бўғимларга тегишлики, уларда ҳаракат бутун ҳаёт давомида узлуксиз амалга оширилади. Бўғимларда энг катта морфологик ўзгаришлар бола ҳаётининг биринчи 5 йилида кузатилади [1,2,3]. Бу йилларда болада нафас олиш ва овоз ҳосил қилиш жараёни шаклланади. Ушбу жараён билан боғлиқ нафас олиш тезлиги ва чуқурлигининг ўзгариши кўкрак қафаси шаклининг ўзгаришига олиб

келади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, боланинг биринчи йилларида кўкрак қафасининг кучайиб ўсиши билан параллел равишда унинг ҳажми ҳам ортади [4,5]. Кўкрак қафаси шакли ва ҳажмининг ўзгариши қовурға-умуртқа бўғимлари морфологиясига ҳам таъсир қилади. Ушбу бўғимларнинг бойлам аппарати тузилишини ривожланиш жараёнида ўрганиб, бўғимлар ва уларнинг бойламлар аппарати ўзгаришлари нафас чиқариш функцияси билан бевосита боғлиқ эканлигини исботлади. Бу функция эса «овоз интонацияларининг барқарор мураккаблашувини таъминлайди» [6,7]. Агар қовурға-умуртқа бўғимлари морфологияси ва функцияси ҳақидаги маълумотлар адабиётда анча кенг акс этган бўлса, ушбу бўғималар иннервациясининг хусусиятлари борасидаги маълумотлар асосан ўқув қўлланмалари доираси билан чекланган.

Тадқиқот мақсади. Одамлар мурдасида қовурға-умуртқа бўғимлари иннервацияси манбаларини ўрганиш ҳамда ушбу бўғималар доирасида нервлар анатомоик тузулишини ўрганишдир.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот турли ёш ва жинсдаги одамлар мурдасида ўтказилди. Қовурға-умуртқа бўғимларини иннервациялайдиган барча нервларни тўлиқроқ ажратиб олиш мақсадида препаратлар қуйидагича ишлов берилди: Умуртқа поғонасининг изоляция қилинган кўкрак қисми (унга туташ қовурғалар бўлаклари билан бирга, бурчакларгача) 15–20 кун давомида 3–5% сирка кислотаси эритмасига сақланди. Ёғли клетчатка (қовурға-умуртқа боғламаларини кўп миқдорда ўраб турадиган) етарли даражада юмшагандан сўнг, препарат кучли сув оқими остига юувилди. Ушбу усул ёрдамида ёғнинг бир қисми олиб ташланди. Кейин тўғридан-тўғри препаровка усули билан кўкрак симпатик пояси ва тугунлараор шохчалари шунингдек, асосий қовурғалараор нервлари толалари ажратиб олинди. Ушбу манбалардан қовурға-умуртқа бўғимларига бораётган нерв шохчаларини ажратиш кўзойнак лупаси ва жарроҳлик микроскопи ёрдамида амалга оширилди. Нерв шохчаларининг диаметри окуляр-микрометр ёрдамида ўлчанди.

Тадқиқот натижалари. Бизнинг кузатишларимиз шуни кўрсатадики, умуртқа-қовурға иннервациясида қуйидаги манбалар иштирок этади: қовурғалараор нервларининг шохлари, симпатик поянинг кўкрак қисми тугунлари ва уларнинг боғловчи шохлари қовурғалараро артериялар атрофидаги периваскуляр чигаллардан келадиган шохлар, шунингдек, мушакларни иннервация қилувчи нервлардан ажралиб чиқадиган қўшимча шохлар иннервациялайди. Энг кўп ва доимий иннервация манбаи — симпатик поянинг кўкрак қисми тугунларидан чиқадиган нерв толалари иннервация қилади. Кўпчилик препаратларда аниқланишича тегишли қовурға бош қисмидаги бойламлар рўпарасида жойлашган тугуннинг ички (медиал) қисмидан (камдан-кам ҳолларда ташқи қисмидан) 2–3 та нерв танаси (диаметри тахминан 0,2–0,5 мм) ажралиб чиқади. Улардан бири ёйсимон эгилган ҳолда капсула юзаси бўйлаб умуртқага фиксация қилинган жойга ўтади ва ундан майда шохлар капсула қалинлигига, нурсимон боғлам толалари орасига ҳамда умуртқа танаси периостига кириб боради. Қовурғалараро

нервларидан ажралиб чиқадиган шохлар одатда тегишли боғламдан пастда жойлашган тугунлараро нервдан келади. Бу шох юуқорига кўтарилган йўналишда бўғимга қараб ўтади ва йўлда қовурғалараро оралиқ томирларни олдиндан кесиб ўтади. Баъзи препаратларда капсула юзасида узунчоқ ўтувчи боғловчи шох (анастомоз) аниқланади, у симпатик поя тугунлараро нерв шохлари билан қовурғалараро оралиқ нерви шохини боғлайди. Бу шох капсула бўйлаб ўтиб, икки томонга майда шохлар беради, улар капсула, нурсимон боғлам ва умуртқа периостига кириб боради. Материалда қовурғарарароро оралиқ нервнинг бир вақтда қовурғалараро мушаклар ва умуртқа-қовурға бўғими элементларини иннервация қилиши аниқ кўринади. Нервнинг проксимал қисмидан (диаметри 0,2–0,4 мм) ажралиб чиқадиган шох мушакларга кирмасдан олдин ён шох (диаметри 0,1–0,15 мм, узунлиги 5–8 мм) беради, у қовурға боши капсуласига етиб, у ерда майда иккиламчи шохларга бўлинади.

Хулоса. Умуртқа-қовурға бўғимлари иннервациясининг ўрганилиши шуни кўрсатадики, уларда комплекс (мураккаб) иннервация мавжуд бўлиб, бу атрофидаги мушаклар, боғламлар ва томирлар билан бирлашган ҳолда амалга оширилади. Бу комплекс иннервация нафас олиш вақтида кўкрак қафасининг мувофиқлашган ҳаракатларини таъминлайди. Энг кўп нерв элементлари VII–X қовурғалар умуртқа-қовурға бўғимлари капсуласи ва боғламларида аниқланади. Бу концентрация ўрта қовурғаларнинг нафас ҳаракатларидаги энг фаол иштирок этиши билан изоҳланади. Бизнинг кузатишларимизда симпатик ва соматик манбаларнинг бир вақтда иштироки тасдиқланди, бу эса нафас ҳаракатларидаги функционал мувофиқлаштиришни янада яхшироқ тушунтиради.

Использованные источники:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Афаунов, А. А. Анализ технических вариантов декомпрессивно-стабилизирующих операций при повреждениях нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника: систематический обзор литературы / А. А. Афаунов, Н. С. Чайкин // Хирургия позвоночника. - 2022. - Т. 19, № 3. - С. 22-37. DOI 10.14531/ss2022.3.22-37.
3. Берснев, В.П. Хирургическое лечение повреждений грудопоясничного отдела позвоночника / В.П. Берснев, В.М. Драгун, А.Л. Шакуров // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. - 2013. - Том V, № 4. - С. 6-12.
4. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в

сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Маматалиев А. Р. нейрогистологические изменения блуждающего нерва под влиянием колхицина в эксперименте //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
7. Маматалиев А. Р. Нарушение иннервации и мутационный процесс в ткани //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.

Исмоилов О. И., ***к.м.н.***
доцент
кафедра анатомии человека
Самаркандский государственный медицинский университет

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВОВ РЕБЕРНО-ПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВ У ЧЕЛОВЕКА

Резюме: *В данной статье изучены источников иннервации позвоночно-реберных соединений у человека и описание способа распространения нервов в пределах этих соединений. Исследование проведено на трупах людей различного возраста и пола. Наибольшее количество ветвей позвоночно-реберные соединения получают от узлов грудного отдела симпатического ствола. Комплексность иннервации всех перечисленных образований стоит в связи с координированием функциональной деятельности всех этих систем во время дыхательных экскурсий грудной клетки.*

Ключевые слова: *Трупах людей, реберно-позвоночных суставов, иннервация, раствор уксусной кислоты, межреберного нерва, межузловой ветви.*

Ismoilov O.I., PhD
associate professor
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ANATOMO-TOPOGRAPHIC STRUCTURE OF THE NERVES OF THE COSTOVERTEBRAL JOINTS IN HUMANS

Summary: *This article examines the sources of innervation of the costovertebral joints in humans and describes the pattern of nerve distribution within these joints. The study was conducted on human cadavers of various ages and sexes. The greatest number of branches to the costovertebral joints is provided by the ganglia of the thoracic sympathetic trunk. The complexity of the innervation of all the listed structures is associated with the coordination of the functional activity of these systems during respiratory excursions of the thoracic cage.*

Keywords: *human cadavers, costovertebral joints, innervation, acetic acid solution, intercostal nerve, interganglionic branch.*

Введение. Позвоночно-реберные соединения человека относятся к тому типу соединений, движения в которых совершаются непрерывно на протяжении всей жизни. Наибольшие морфологические изменения в суставах отмечаются в первые 5 лет жизни ребенка [1,2,3]. В эти годы у ребенка идет процесс становления дыхания и голосообразования. Связанное с этим

процессом изменение частоты и глубины дыхания приводит к изменению формы грудной клетки показали, что параллельно с усиленным ростом грудной клетки в первые годы жизни ребенка происходит увеличение ее объема [4,5]. Изменение формы и объема грудной клетки отражается и на морфологии позвоночно-реберных соединений. Изучив строение связочного аппарата указанных соединений в процессе развития, убедительно доказал наличие прямой зависимости между изменениями суставов и их связочного аппарата от выдыхательной функции, «обслуживающей все усложняющееся образование интонаций голоса» [6,7]. Если сведения о морфологии и функции позвоночно-реберных соединений нашли довольно значительное отражение в литературе, то относительно характера иннервации этих соединений данные литературы ограничиваются рамками учебных пособий.

Цель исследования. Целью нашего исследования является изучение источников иннервации позвоночно-реберных соединений у человека и описание способа распространения нервов в пределах этих соединений.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на трупах людей различного возраста и пола. В целях более полного выделения всех нервов, направляющихся к позвоночно-реберным соединениям, проводилась следующая обработка препаратов. Изолированный грудной отдел позвоночника с прилежащими к нему участками ребер (до углов) на 15-20 дней погружался в 3-5% раствор уксусной кислоты. После достаточного размягчения жировой клетчатки, которая обильно окружает позвоночно-реберные соединения, препарат помещался под сильную струю воды. С помощью этого приема удается удалить часть жира. Затем, методом прямой препаровки выделялись узлы и межузловые ветви грудного симпатического ствола, а также основные стволы межреберных нервов. Выделение нервных ветвей, отходящих от этих источников к реберно-позвоночным соединениям, проводилось с помощью лупы очков, хирургического микроскопа. Диаметр нервных ветвей измерялся окуляр-микрометром.

Результаты исследования. Наши наблюдения показывают, что в иннервации позвоночно-реберных соединений принимают участие ветви межреберных нервов, узлов и соединительных ветвей симпатического ствола, ветви от периваскулярных сплетений межреберных сосудов, а также ветви, отделяющиеся от мышечных нервов. Наибольшее количество ветвей позвоночно-реберные соединения получают от узлов грудного отдела симпатического ствола. На большинстве препаратов 2-3 нервных стволика (д. 0,2-0,5 мм) отделяется от внутренней, реже от наружной периферии узла, расположенного на уровне соответствующего соединения головки ребра. Один из этих стволиков, дугообразно изгибаясь, проходит по поверхности капсулы на месте ее фиксации к позвонку. От описываемого нервного стволика постоянно отделяются мелкие нервные ветви, проникающие в толщу капсулы и в надкостницу тела позвонка.

Другие ветви, после отхождения от узла, проходят по поверхности капсулы позвоночно-реберного соединения поперечно; их разветвления

распространяются между волокнами лучистой связки сустава головки ребра. Вместе с волокнами этой связки нервные стволики достигают наружного края передней продольной связки позвоночника и проникают в нее.

Нервы для позвоночно-реберных соединений, отделяющиеся от межреберных нервов, обычно возникают от нерва, проходящего ниже соответствующего позвоночно-реберного соединения. Нервная ветвь направляется к суставу в восходящем направлении, на пути пересекая спереди межреберные сосуды. В местах перекреста с сосудами от описываемой ветви отделяется 2-3 мелких нервных стволика, которые присоединяются к периваскулярному сплетению межреберной артерии. На поверхности капсулы позвоночно-реберного соединения нервная ветвь, отделившаяся от межреберного нерва, начинает делиться на вторичные ветви. Часть вторичных ветвей доходит до передней продольной связки позвоночника, другие распространяются в капсуле и связках головки ребра. На некоторых препаратах удается выделить соединительную ветвь, расположенную на поверхности капсулы головки ребра. Эта соединительная ветвь осуществляет связь ветвей, розникающих от узла или межузловой ветви грудного отдела симпатического ствола, с ветвью, отделившейся от межреберного нерва. Как правило, эта соединительная ветвь проходит по поверхности капсулы продольно. Проходя по капсуле сустава, описываемая ветвь отдает в обе стороны мелкие нервные стволики, которые проникают в капсулу сустава, лучистую связку сустава и в надкостницу позвонка. На нашем материале совершенно отчетливо выявляется одновременное участие межреберного нерва в иннервации межреберных мышц и элементов реберно-позвоночных соединений. Отошедший от начального отдела межреберного нерва нервный стволик (д-0,2-0,4 мм) в этих случаях, до вступления в толщу межреберных мышц, отдает боковую ветвь. Ветвь эта имеет д-0,1-0,15 мм и длину 5-8 мм. Описываемая ветвь направляется к суставу головки ребра и на поверхности капсулы делится на более мелкие вторичные ветви.

Вывод. Проведенные нами наблюдения над характером распространения и возникновения нервов позвоночно-реберных соединений позволяют говорить о том, что в этих суставах проявляется комплексность иннервации сустава с окружающими мышцами и сосудами. Комплексность иннервации всех перечисленных образований стоит в связи с координированием функциональной деятельности всех этих систем во время дыхательных экскурсий грудной клетки.

Наибольшее количество нервов выявляется в капсуле и связках позвоночно-реберных соединений VII-X ребер. Такую концентрацию нервов в этих суставах можно объяснить тем, что средние ребра принимают наиболее активное участие в дыхательных движениях грудной клетки.

Использованные источники:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.

2. Афаунов, А. А. Анализ технических вариантов декомпрессивно-стабилизирующих операций при повреждениях нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника: систематический обзор литературы / А. А. Афаунов, Н. С. Чайкин // Хирургия позвоночника. - 2022. - Т. 19, № 3. - С. 22-37. DOI 10.14531/ss2022.3.22-37.
3. Берснев, В.П. Хирургическое лечение повреждений грудопоясничного отдела позвоночника / В.П. Берснев, В.М. Драгун, А.Л. Шакуров // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. - 2013. - Том V, № 4. - С. 6-12.
4. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Маматалиев А. Р. нейрогистологические изменения блуждающего нерва под влиянием колхицина в эксперименте //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
7. Маматалиев А. Р. Нарушение иннервации и мутационный процесс в ткани //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.

Казакова Н.Н.
профессор в.и. кафедры терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский институт
orcid: https://orcid.org/0000-0002-9434-540X
Болтаева Ф.М.
докторант
Бухарский государственный медицинский институт

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА И ИХ РОЛЬ В ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЗУБОВ

Актуальность. *Инвазия гельминтами и простейшими приводит к хронической интоксикации и активации иммунной системы, сопровождаясь выраженными патофизиологическими изменениями – иммунными, метаболическими и микробиологическими – которые прямо или опосредованно отражаются на тканях полости рта, включая процессы деминерализации зубов* ***с*** *целью исследования патофизиологического влияния паразитарных инфекций на организм ребёнка и их роль в деминерализации зубов. Каждый ребенок проходил детальный сбор анамнеза и осмотр по единому протоколу. Отдельно фиксировались жалобы стоматологического профиля: чувствительность зубов, болезненность при приеме пищи, наличие кровоточивости десен, неприятного запаха изо рта. Сопоставительный анализ показал, что доля детей с умеренно выраженной и выраженной деминерализацией эмали была выше в основной группе (в сумме 67,6%) по сравнению с группой сравнения (54,2%). Таким образом, паразитарная инвазия действует как триггер комплексных патологических изменений в организме ребёнка, отражающихся на состоянии полости рта. Иммунные сдвиги при гельминтозах (иммуносупрессия и аллергизация) сочетаются с метаболическими дефицитами (нарушение трофики и минерального обмена) и микробиологическим дисбиозом, формируя во рту среду, благоприятную для развития кариеса.*

Ключевые слова: *гельминтозы, стоматология, полости рта, деминерализация эмали, протозойные паразиты*

Kazakova N.N.
professor
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute
orcid: https://orcid.org/0000-0002-9434-540X
Boltaeva F.M.
Doctoral Candidate
Bukhara State Medical Institute

THE PATHOPHYSIOLOGICAL IMPACT OF PARASITIC INFECTIONS ON THE CHILD'S BODY AND THEIR ROLE IN TOOTH DEMINERALIZATION

Relevance. *Helminth and protozoan infestations lead to chronic intoxication and immune system activation, accompanied by significant pathophysiological changes—immune, metabolic, and microbiological—that directly or indirectly affect oral tissues, including tooth demineralization. This study aimed to investigate the pathophysiological impact of parasitic infections on a child's body and their role in tooth demineralization. Each child underwent a detailed medical history and examination according to a standard protocol. Dental complaints were separately recorded, including tooth sensitivity, pain when eating, bleeding gums, and bad breath. A comparative analysis revealed that the proportion of children with moderate to severe enamel demineralization was higher in the study group (67.6% overall) compared to the comparison group (54.2%). Thus, parasitic infestation acts as a trigger for complex pathological changes in the child's body, affecting the oral cavity. Immune shifts associated with helminthiasis (immunosuppression and allergization) are combined with metabolic deficiencies (impaired nutrition and mineral metabolism) and microbiological dysbiosis, creating an oral environment conducive to the development of dental caries.*

Keywords: *helminthiasis, dentistry, oral cavity, enamel demineralization, protozoan parasites*

Введение. Современные исследования подтверждают, что паразитарные инвазии у детей оказывают многофакторное отрицательное влияние на их общее здоровье и, в частности, на состояние полости рта. Инвазия гельминтами и простейшими приводит к хронической интоксикации и активации иммунной системы, сопровождаясь выраженными патофизиологическими изменениями – иммунными, метаболическими и микробиологическими – которые прямо или опосредованно отражаются на тканях полости рта, включая процессы деминерализации зубов [WHO, 2023]. Установлено, что токсины и продукты жизнедеятельности кишечных гельминтов блокируют всасывание кальция, магния, витаминов D и C в тонком кишечнике[1][4]. Недополучение этих микронутриентов в период формирования и роста зубов ослабляет кристаллическую структуру эмали и дентина. Эмаль становится менее прочной, более восприимчивой к растворению кислотами, а дентин – к развитию очагов деминерализации[1][4]. В сочетании с анемией и гипопротеинемией, часто сопутствующими гельминтозам, это приводит к дистрофическим изменениям в одонтобластах и ухудшению процессов реминерализации эмали. Кроме того, паразитарная инвазия нередко сопровождается снижением аппетита и избирательностью в питании ребенка [WHO, 2023].

Цель исследования: исследовать патофизиологическое влияние паразитарных инфекций на организм ребёнка и их роль в деминерализации зубов.

Материалы и методы. Клиническое обследование проводилось по общепринятым в терапевтической стоматологии методикам в условиях детской стоматологической поликлиники. Каждый ребенок проходил детальный сбор анамнеза и осмотр по единому протоколу. Анамнез включал сведения о перенесенных заболеваниях, условиях вскармливания и питания, гигиенических навыках, а также жалобы на состояние полости рта и общее самочувствие. Особое внимание при опросе уделялось симптомам, потенциально связанным с паразитарной инвазией (эпизоды абдоминальной боли, тошнота, нарушения стула, зуд в перианальной области, скрежет зубами во сне и др.). Отдельно фиксировались жалобы стоматологического профиля: чувствительность зубов, болезненность при приеме пищи, наличие кровоточивости десен, неприятного запаха изо рта. Полученные анамнестические данные сопоставлялись затем с объективными показателями. Далее обследовали состояние зубов и пародонта. Определяли прикус (соответствие возрастной норме), состояние уздечек губ и языка, наличие зубочелюстных аномалий. Затем проводили профессиональную гигиену полости рта (удаление мягкого налета щеткой и пастой) и тщательный осмотр всех групп зубов. Для диагностики начальных кариозных поражений применяли метод высушивания эмали: после тщательного очищения поверхность подозрительного участка обдувалась воздухом в течение 5–10 секунд. При этом очаги деминерализации становились более отчетливыми в виде меловых матовых пятен на фоне здоровой блестящей эмали. Каждое обнаруженное пятно фиксировалось в стоматологической карте с указанием локализации (зуб, поверхность). Критерием диагностики начального кариеса служило наличие ограниченного белесоватого участка эмали без нарушения ее поверхности (код 1 или 2 по Международной системе ICDAS II). Отсутствие кавитации проверяли осторожным зондированием: зонд скользил по поверхности пятна, не проваливаясь. При зондировании также оценивали характер поверхности пятна – шероховатая, матовая поверхность свидетельствовала об активном очаге деминерализации, тогда как гладкая и блестящая указывала на возможную стабилизацию процесса (к началу исследования практически все очаги были активными). Для стандартизации диагностики один и тот же врач обследовал всех детей; достоверность оценок подтверждена повторным осмотром 10% пациентов (показатель совпадения – 0,9–1,0). При необходимости труднодиагностируемые зоны (фиссуры жевательных зубов) дополнительно осматривали с увеличением и освещением с помощью фотополимеризационной лампы.

Результаты исследования. Каждый ребенок проходил детальный сбор анамнеза и осмотр по единому протоколу. Анамнез включал сведения о перенесенных заболеваниях, условиях вскармливания и питания, гигиенических навыках, а также жалобы на состояние полости рта и общее

самочувствие. Как следует из представленных данных, во всех трёх группах преобладали дети возрастной подгруппы 9–11 лет, при этом доля детей 7–8 лет и 12 лет также была сопоставимой. Статистическая проверка распределения по возрастным категориям не выявила значимых различий между группами ($p > 0,05$), что указывает на корректность формирования групп по возрастному признаку и снижает риск систематического смещения при интерпретации последующих результатов.

Распределение по возрастным подгруппам представлено на рисунке 1.




Рисунок 1. Распределение детей по возрастным группам в группах наблюдения.

Половая структура обследованных детей представлена в таблице 2. графическое представление — на рисунке 2.1.




Рисунок 2. Распределение обследованных детей по полу в группах наблюдения

Во всех группах наблюдалось близкое соотношение мальчиков и девочек, без выраженного преобладания какого-либо пола. Статистическая оценка распределения по полу не выявила значимых различий между группами ($p > 0,05$), что также подтверждает сопоставимость сформированных групп по базовым демографическим характеристикам.

На этапе первичного обследования оценивалось наличие очаговой деминерализации эмали, её клиническая выраженность и распространённость в различных клинических группах. Для этого все дети были распределены по степени выраженности деминерализации эмали с учётом количества очагов и характера поражения твёрдых тканей зубов. Такой подход позволил перейти от простой констатации факта наличия деминерализации к более детализированной оценке стоматологического статуса, отражающей тяжесть и потенциальную активность патологического процесса.

Распределение детей по наличию и выраженности очаговой деминерализации эмали в обследованных группах представлено на рисунке 3.




Рисунок 3. Распределение детей по наличию и выраженности очаговой деминерализации эмали в обследованных группах

В контрольной группе (группа III) очаги деминерализации эмали отсутствовали у всех обследованных детей (100,0%), что подтверждало клиническую интактность твёрдых тканей зубов в данной группе.

В основной группе (группа I) деминерализация эмали преимущественно носила умеренно выраженный и выраженный характер. Умеренно выраженная деминерализация (3–4 очага) была выявлена у 58 детей, что составило 40,8% группы, тогда как выраженная деминерализация с наличием пяти и более очагов отмечалась у 38 детей (26,8%). Слабовыраженные формы деминерализации (1–2 очага) регистрировались у 46 детей основной группы (32,4%).

В группе сравнения (группа II) преобладали менее выраженные формы деминерализации эмали. Слабовыраженная деминерализация была выявлена у 11 детей (45,8%), умеренно выраженная — у 9 детей (37,5%), тогда как выраженные формы регистрировались у 4 детей, что составило 16,7% группы.

Сопоставительный анализ показал, что доля детей с умеренно выраженной и выраженной деминерализацией эмали была выше в основной группе (в сумме 67,6%) по сравнению с группой сравнения (54,2%). Это свидетельствовало о более тяжёлом стоматологическом статусе у детей с паразитарной инвазией уже на этапе первичного обследования.

Оценка степени выраженности очаговой деминерализации эмали позволила установить различия между группами по тяжести стоматологических изменений. Вместе с тем, для более детальной

характеристики стоматологического статуса принципиальное значение имел анализ распространённости деминерализации, в частности распределение детей по наличию одиночных и множественных очагов поражения.




Рисунок 3.1.2 Частота одиночных и множественных очагов деминерализации эмали у детей различных групп наблюдения

Примечание. Статистическая значимость различий между группами I и II оценивалась с использованием критерия χ^2 Пирсона; различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Выводы. Очаговая деминерализация эмали у детей при наличии паразитарной инвазии характеризуется более высокой интенсивностью и распространённостью поражений по сравнению с детьми без паразитоза. Среднее число очагов деминерализации в основной группе составило 3,8 ± 1,4 на одного ребёнка против 2,9 ± 1,2 в группе сравнения, а доля множественных очагов (≥ 3) достигала 67,6 %, что достоверно выше, чем при отсутствии паразитарной инфекции (54,2 %; p = 0,048). Полученные данные подтверждают, что паразитарная инвазия формирует неблагоприятный системный фон, статистически значимо усиливающий тяжесть докавитационного кариозного процесса.

Таким образом, паразитарная инвазия действует как триггер комплексных патологических изменений в организме ребёнка, отражающихся на состоянии полости рта. Иммунные сдвиги при гельминтозах (иммуносупрессия и аллергизация) сочетаются с метаболическими дефицитами (нарушение трофики и минерального обмена) и

микробиологическим дисбиозом, формируя во рту среду, благоприятную для развития кариеса.

Использованные источники:

1. Аверьянова Н.И. Энтеробиоз как медико-социальная проблема / Н.И. Аверьянова, И.Л Хусид // Российский педиатрический журнал. – 2019. – № 2. –С. 41– 44.
2. Агаева Аида Ибадуллу гызы. Социально-эпидемиологические аспекты кишечных паразитозов среди детей дошкольного возраста и мероприятия по реабилитации их здоровья: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. мед. наук: спец. 14.00.30 «Эпидемиология» / А. И. Агаева. – Баку, 2016. – 20 с.
3. Бабак О.Я. Борьба за жизнь: человек и гельминты / О.Я. Бабак // Здоров'я України. – 2021. – № 130. – С. 27–31.
4. Бодня К.І. Проблема паразитарних болезней в современных условиях / К.І. Бодня // Сучасні інфекції. – 2009. – № 1. – С.4–11.
5. Валинурова Е.Р. Клинико-лабораторная характеристика кишечной стадии аскаридоза у взрослых (разработка дополнительных критериев эффективности лечения): дис. кандидата мед. наук: спец. 14.00.10 «Инфекционные болезни» / Валинурова Е.Р. – М., 2018. – С. 122.
6. Виноград Н.О. Паразитарні хвороби людини. Гельмінтози / Н.О. Виноград, Р. Ю. Грицько // – Л.: Армія України, 2019. – 189 с.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-743-765
УДК: 339.9; 339.5

Калмыков Н.Н., канд. социол. наук, MBA
генеральный директор
издательская платформа «Целлюлоза.ру»
Россия, Москва

РОССИЯ–БРАЗИЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ ОКНА 2024–2026

Аннотация: *Статья посвящена прикладному анализу экономического сотрудничества России и Бразилии в контуре БРИКС в условиях глобальной фрагментации 2022–2026 гг. Цель — показать переход от концентрированного товарооборота к управляемым цепочкам кооперации, объединяющим торговлю, расчёты, финансирование, логистику и институциональные механизмы. Эмпирическая база включает официальную статистику внешней торговли Бразилии (Planalto, Comex Stat) и нормативные акты (REDATA, SBCE, «Топливо будущего», offshore wind), а также материалы институтов развития и отраслевые кейсы. В результате выделены якорные цепочки (агро/удобрения и энергетика), систематизированы проектные окна 2024–2026 гг. и предложены практические рекомендации, KPI и прогнозы для государства и бизнеса.*

Ключевые слова: *Россия; Бразилия; БРИКС; внешняя торговля; управляемые цепочки; платежная инфраструктура; проектная кооперация.*

Kalmykov N.N., PhD (Sociology), MBA
CEO
Zelluloza.ru Publishing Platform
Russia, Moscow

RUSSIA–BRAZIL: ECONOMIC COOPERATION IN THE CONTEXT OF GLOBAL FRAGMENTATION AND THE 2024–2026 PROJECT WINDOWS

Abstract: *The article provides a practice-oriented analysis of economic cooperation between Russia and Brazil within BRICS under global fragmentation (2022–2026). It proposes a shift from concentrated merchandise trade toward manageable cooperation chains integrating trade, payments, finance, logistics, and institutions, using Brazil's official trade statistics and key legal regimes. The paper identifies anchor chains and 2024–2026 project windows and offers actionable recommendations, KPI sets, and scenario-based outlooks.*

Keywords: *Russia; Brazil; BRICS; foreign trade; manageable cooperation chains; payment infrastructure; project-based cooperation.*

Список сокращений

BRICS — Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

CIC — Межправительственная комиссия Бразилия–Россия.

CAN — Комиссия высокого уровня Бразилия–Россия.

MRV — измерение, отчётность и верификация.

SBCE — система торговли выбросами Бразилии.

REDATA — специальный режим для дата-центров.

SAF — устойчивое авиационное топливо.

eVTOL — электрический летательный аппарат вертикального взлёта и посадки.

PMO — проектный офис.

KPI — ключевые показатели эффективности.

SPV — проектная компания (special purpose vehicle).

SLA — соглашение об уровне сервиса (service level agreement).

Введение

1.1. Главные цифры и выводы

В 2024 году товарооборот между Россией и Бразилией достиг 12,4 млрд долл. США, увеличившись примерно на 9% по сравнению с 2023 годом. Экспорт Бразилии в Россию составил 1,4 млрд долл. США (+8% г/г), импорт Бразилии из России — 11,0 млрд долл. США (+9% г/г), что формирует устойчивую асимметрию потоков в пользу российских поставок [1]. Структура торговли высоко концентрирована: в экспорте Бразилии в Россию доминируют соя (33%), зелёный кофе (18%) и говядина (18%), суммарно около 69%; в импорте Бразилии из России — нефтепродукты/топливо (57%) и минеральные удобрения (34%), суммарно около 91% [1].

Ключевой вывод: текущая концентрация не является слабостью, а образует чёткие «якорные» цепочки, вокруг которых целесообразно строить управляемое расширение кооперации — через платежи, финансирование, логистику и институциональное сопровождение.

Цель и задачи

Целью является обоснование перехода от разовых сделок к управляемым цепочкам кооперации вокруг двух якорей (агро/удобрения и энергетика), а также определение проектных окон 2024–2026 гг. для расширения сотрудничества. Задачи включают: (1) фиксацию ключевых количественных параметров двусторонней торговли и её концентрации; (2) описание институциональной рамки (CIC/CAN) и внешних факторов риска; (3) выделение инструментов управляемости (платежи, торговое финансирование, логистика); (4) формирование портфеля практических рекомендаций, KPI и прогнозов.

1.3. Приоритеты первого уровня (5 пунктов)

1) Зафиксировать 2–3 управляемые цепочки как портфель приоритетов (агро/удобрения; энергетика/инфраструктура; индустриально-технологические сервисы).

2) Обеспечить платежно-финансовую реализуемость проектов (нацвалюты, торговое финансирование, страхование) [9]–[11].

3) Повысить логистическую управляемость (календаризация поставок, диверсификация маршрутов, цифровой мониторинг).

4) Развивать инвестиции и локализацию отдельных стадий цепочек для снижения рисков и роста добавленной стоимости [15].

5) Институционализировать управление портфелем проектов через действующие механизмы (Межправительственная комиссия Бразилия–Россия (CIC)/Комиссия высокого уровня Бразилия–Россия (CAN), институты развития, отраслевые и региональные узлы).

Методы и исследования

В статье применяются методы анализа официальной статистики внешней торговли, сравнительного институционального анализа, кейс-анализа проектных инициатив и экспертной интерпретации нормативных и программных документов. В рамках исследования анализировались агрегированные и помесячные показатели товарооборота, структура и концентрация торговых потоков, институциональные форматы координации (CIC/CAN), а также нормативные акты, формирующие новые рынки и проектные окна. Эмпирическую базу составили: (а) официальные агрегаты и структура торговли Бразилии с Россией; (б) ряды внешней торговли из Comex Stat (MDIC) для 2021–2025 гг.; (в) официальные материалы межправительственных механизмов (CIC/CAN) и реестры договоров; (г) тексты нормативных актов, формирующих проектные окна (REDATA, SBCE, «Топливо будущего», offshore wind); (д) материалы институтов развития и отраслевые кейсы.

Аналитическая рамка выстраивается в логике социально-архитектурного подхода: институциональные механизмы, правовые режимы и инфраструктуры рассматриваются как «дизайн среды», снижающий транзакционные издержки и повышающий воспроизводимость кооперационных проектов.

Научная новизна и вклад автора. Впервые для российско-бразильского экономического взаимодействия предложена прикладная модель «управляемых цепочек», объединяющая торговые потоки, институциональные механизмы, финансово-платёжную инфраструктуру и проектные окна 2024–2026 гг. Автором осуществлена систематизация нормативных режимов (REDATA, SBCE, «Топливо будущего», offshore wind) в привязке к якорным цепочкам и разработана матрица проектных форматов с KPI и архитектурой снижения рисков, что расширяет инструментарий анализа двустороннего сотрудничества.

Результаты исследования: цифры, институты и проектные окна

2.1. Агрегаты 2024

По официальным данным правительства Бразилии, в 2024 году двусторонний товарооборот с Российской Федерацией составил 12,4 млрд долл. США, что стало максимальным значением за весь период наблюдений. Экспорт Бразилии в Россию достиг 1,4 млрд долл. США, импорт из России — 11,0 млрд долл. США. Темпы роста по обоим направлениям составили около 8–9% г/г, несмотря на сохраняющиеся внешние ограничения и перестройку логистики [1].

Расчётное торговое сальдо для Бразилии по итогам 2024 года оценивается на уровне около –9,6 млрд долл. США, что отражает структурную зависимость ряда ключевых отраслей от импорта российских ресурсов.

Вывод: масштаб текущего оборота и темпы роста создают достаточную экономическую базу для перехода от торговых операций к портфельному управлению проектами в двустороннем формате.

2.2. Структура торговли и концентрация

Экспорт Бразилии в Россию в 2024 году носил выраженно аграрный характер. На три товарные группы пришлось около 69% поставок: соя (33%), зелёный кофе (18%), говядина (18%). Такая структура отражает сравнительные преимущества Бразилии в агропроизводстве и устойчивый спрос на российском рынке [1].

Импорт Бразилии из России ещё более концентрирован. На нефтепродукты и топливо пришлось около 57%, на минеральные удобрения — 34%, то есть суммарно около 91% импорта. Данные позиции являются критическими для энергетического баланса и агросектора Бразилии, что объясняет устойчивость торговых потоков даже в условиях внешних шоков [1].

Вывод: высокая концентрация снижает неопределённость и позволяет выстраивать целевые проектные решения вокруг ограниченного числа якорных цепочек.

2.3. Динамика 2021–2025

Официальная статистика Comex Stat (MDIC) позволяет проследить динамику торговли России и Бразилии за 2021–2025 гг. После резкого перераспределения потоков в 2022 году торговля перешла к фазе восстановления и роста. В 2023–2024 гг. ускорение импорта Бразилией российских энергоносителей и удобрений обеспечило выход на рекордные агрегированные значения 2024 года [2].

Помесячные данные демонстрируют заметную волатильность по ключевым группам. В качестве иллюстрации: в декабре 2025 года экспорт Бразилии в Россию составил около 140 млн долл. США, тогда как импорт из России достиг 708 млн долл. США, что сформировало месячное сальдо около –568 млн долл. США [2][3].

Вывод: помесячная волатильность усиливает значение инструментов управляемости цепочек — календаризации, финансирования и логистического контроля.

2.4. Что означает структура торговли

Сочетание высокой концентрации и устойчивых темпов роста указывает на то, что российско-бразильская торговля функционирует как система ограниченного числа воспроизводимых цепочек. Это позволяет переходить от анализа отдельных товарных потоков к управлению цепочками создания стоимости, в которых торговля дополняется инвестициями, сервисами, стандартами и технологическими решениями.

Для управленческой практики это означает возможность фокусировки ресурсов не на расширении номенклатуры «вширь», а на углублении кооперации «вглубь» — через инфраструктуру, финансы и институты. Такой подход снижает транзакционные издержки и повышает предсказуемость результатов.

3. Институциональная рамка и актуальные события 2024–2026

3.1. CIC (27.02.2024) как действующий проектный контур

27 февраля 2024 года в Москве состоялось 12-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Бразилией и Россией (CIC). В официальной повестке были зафиксированы направления: торгово-экономическое и промышленное сотрудничество, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, наука и технологии, энергетика, образование и культура [4].

Для управленческой практики CIC выступает не как «декларативная площадка», а как действующий контур координации, позволяющий переводить приоритеты в формат рабочих групп, дорожных карт и проектных инициатив. Наличие регулярного механизма CIC снижает институциональные риски для бизнеса и повышает предсказуемость реализации средне- и долгосрочных проектов.

Вывод: проекты, привязанные к повестке CIC, имеют более высокие шансы на сопровождение и масштабирование за счёт межведомственной координации.

3.2. CAN (05.02.2026) как актуальный «пик» институциональной активности

5 февраля 2026 года в Бразилиа запланировано проведение 8-го заседания Комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Бразилией и Россией (CAN). С бразильской стороны комиссию возглавляет вице-президент Бразилии, с российской — председатель Правительства Российской Федерации [5].

CAN представляет собой высший уровень двусторонней координации и задаёт политико-управленческий «зонтик» для отраслевых и проектных решений. Совмещение во времени заседания CAN с деловой программой и

форумными мероприятиями создаёт окно возможностей для фиксации приоритетов и запуска пилотных проектов.

Вывод: период вокруг заседания CAN целесообразно использовать для закрепления портфеля проектов и получения институциональной поддержки на высшем уровне.

3.3. Договорные рамки и реестры

Двустороннее сотрудничество России и Бразилии опирается на разветвлённую договорно-правовую базу, отражённую в официальных реестрах Министерства иностранных дел Бразилии (Concordia/Itamaraty) и МИД Российской Федерации. Эти реестры включают соглашения о партнёрстве, экономическом и научно-техническом сотрудничестве, культурно-образовательных обменах, а также отдельные секторальные договорённости [6][7].

Для прикладных задач наличие действующих договорных рамок означает возможность легитимного запуска проектов без необходимости каждый раз создавать правовую основу «с нуля». Реестры позволяют быстро определить, какие направления уже имеют межгосударственное оформление и могут быть использованы как опора для бизнес-инициатив.

Вывод: опора на действующие договорные контуры снижает регуляторные и правовые риски и ускоряет старт кооперационных проектов.

3.4. Внешняя среда и системные факторы риска (2025–2026)

3.4.1. Геополитическая неопределённость как операционный режим

Международная обстановка на рубеже 2025–2026 гг. характеризуется отсутствием устойчивых политических развязок и сохранением режима повышенной неопределённости. Для российско-бразильского сотрудничества это проявляется не столько на уровне политических деклараций, сколько в операционной плоскости: сроках поставок, страховании, банковских проверках и комплаенсе. В этих условиях возрастает ценность проектов, изначально спроектированных с учётом альтернативных маршрутов, финансовых каналов и сценариев исполнения.

3.4.2. Стоимость капитала и ужесточение финансовых условий

Рост глобальной стоимости заимствований и осторожность финансовых институтов усиливают требования к качеству проектной подготовки. Доступ к финансированию всё в большей степени определяется прозрачностью, наличием институциональной поддержки и структурированием сделок. Это усиливает роль институтов развития и инструментов торгового финансирования как элементов снижения рисков.

3.4.3. Логистика, страхование и вторичные ограничения

Даже при отсутствии прямых ограничений на российско-бразильскую торговлю сохраняются риски, связанные с морской логистикой, страхованием грузов и возможными вторичными мерами. Проверки судов, рост страховых премий и усложнение транзита повышают значение диверсификации маршрутов и заблаговременной проработки логистических решений.

3.4.4. Фрагментация мировой торговли и формирование блоков

Мировая торговля всё в большей степени фрагментируется на региональные и политико-экономические блоки. В этом контексте российско-бразильское сотрудничество приобретает прагматический характер как взаимодействие двух крупных экономик, не входящих в единый санкционный или протекционистский контур. Форматы БРИКС и двусторонние механизмы создают инфраструктуру для снижения внешних барьеров.

3.4.5. Китай и глобальный спрос как внешний фактор

Замедление китайской экономики и рост регуляторной неопределённости в отношении отдельных рынков делают Бразилию и Латинскую Америку альтернативной площадкой для размещения производств, инвестиций и логистических узлов. Для России это создаёт дополнительные возможности диверсификации внешнеэкономических связей.

3.4.6. Региональные конфликты и эффект домино

События в отдельных регионах (Ближний Восток, Восточная Европа, отдельные страны Латинской Америки) оказывают непрямое влияние через цены на энергоносители, страхование и транспорт. Проекты, привязанные к устойчивым институциональным рамкам и диверсифицированным цепочкам, демонстрируют большую устойчивость к таким шокам.

Минимальный пакет мер снижения рисков: (1) A/B/C сценарии по логистике и платежам для каждого проекта; (2) диверсификация банков/страховщиков/маршрутов как стандарт; (3) предварительный комплаенс-пакет и юридические конструкции до старта пилотных проектов; (4) институциональная привязка крупных инициатив к CIC/CAN и институтам развития; (5) цифровая прослеживаемость исполнения (логистика, MRV) для доказательности и управляемости [2][4][5][18][19].

Вывод: внешняя неопределённость не отменяет сотрудничество, но повышает требования к управляемости цепочек, институциональной опоре и финансовой архитектуре.

4. Инструменты управляемости: что реально снижает риски и ускоряет проекты

4.1. Платежи и расчёты

Платёжная инфраструктура является ключевым фактором масштабирования российско-бразильских проектов. Публичная позиция Бразилии в 2024–2025 гг. смещена от идеи «единой валюты» к практическим механизмам расчётов в национальных валютах и снижению транзакционных издержек на уровне процедур и клиринга [8].

Практический инструмент — финансирование и расчёты в локальных валютах через институты развития стран БРИКС. В 2024–2025 гг. подписаны рамочные соглашения между банками развития стран БРИКС, включая BNDES, позволяющие поддерживать торговлю и инвестиции без промежуточной конвертации в доллар США [9].

Отдельное конкурентное преимущество Бразилии — развитые «публичные платёжные рельсы». Система мгновенных платежей Pix, режим Open Finance и пилоты цифрового реала Drex демонстрируют масштабируемую архитектуру для b2b-расчётов, условных платежей и проектного финансирования [10]–[12].

Вывод: платёжная реализуемость должна проектироваться как инфраструктура (набор стандартов и процедур), а не решаться точечно под каждую сделку.

4.2. Торговое финансирование и страхование

Для цепочек с высокой концентрацией и сезонностью (агро/удобрения; энергетика) ключевым элементом управляемости является торговое финансирование. В практической плоскости используются следующие инструменты:

— Аккредитивы (L/C) — снижают риск неплатежа и синхронизируют отгрузку с оплатой.

— Банковские гарантии — обеспечивают исполнение обязательств по контрактам.

— Эскроу-механизмы — защищают стороны при поэтапных поставках и сложных графиках.

— Предэкспортное финансирование — ускоряет оборотный капитал под будущие поставки.

— Факторинг/форфейтинг — снижает нагрузку на баланс экспортёра.

В сочетании со страхованием грузов и логистических рисков эти инструменты формируют базовый «слой устойчивости» сделки, уменьшая сроки прохождения платежей и стоимость неопределённости.

Вывод: торговое финансирование (trade finance) и страхование должны закладываться в дизайн сделки с первого дня как обязательный элемент масштабирования.

4.3. Логистика

Перестройка глобальных цепочек после 2022 года сделала логистику ключевым ограничителем и одновременно источником конкурентных преимуществ. Для российско-бразильского сотрудничества критичны предсказуемость маршрутов, наличие перевалочных мощностей, складирование и страхование грузов.

Официальные данные внешней торговли Бразилии (Comex Stat) позволяют управлять логистикой на основе фактов — анализировать месячные пики, узкие места и чувствительность отдельных товарных групп. Дополнение физической логистики цифровыми инструментами мониторинга и планирования снижает операционные и репутационные риски.

Вывод: логистика должна рассматриваться как управляемый актив цепочки, а не как вспомогательная функция.

5. Якорные цепочки: где «несущие балки» и как расширять

5.1. Агроцепочка

Агропродовольственная цепочка является одним из двух ключевых «якорей» российско-бразильского сотрудничества. Импорт Бразилией российских минеральных удобрений (около 34% импорта из РФ в 2024 г.) напрямую связан с устойчивостью агросезона и экспортным потенциалом бразильского АПК [1].

Практический потенциал расширения кооперации связан не только с поставками ресурсов, но и с инвестициями в сопутствующие стадии цепочки: смешение и хранение удобрений, логистику, сервисы агрохимического сопровождения, цифровой мониторинг урожайности и сезонных рисков. Использование долгосрочных рамочных контрактов и календаризации поставок снижает волатильность и повышает предсказуемость для всех участников цепочки.

Вывод: агроцепочка позволяет быстро переходить от торговли к инвестиционно-сервисной кооперации с измеримым эффектом для продовольственной безопасности и экспорта.

5.2. Энергетика и инфраструктура

Энергетический контур — второй системообразующий «якорь» двустороннего обмена. На нефтепродукты и топливо приходится около 57% импорта Бразилии из России, что подчёркивает стратегическую значимость энергетической составляющей сотрудничества [1].

Расширение взаимодействия возможно через инфраструктурные и сервисные проекты: обеспечение надёжных поставок, хранение и перевалка, инжиниринг и техническое обслуживание. Дополнительным направлением является сотрудничество в высокотехнологичных сегментах энергетики, включая проекты по малым модульным реакторам (SMR), которые рассматриваются в рамках двустороннего диалога как элемент долгосрочного энергетического перехода [13].

Вывод: энергетический контур создаёт основу для диверсификации кооперации в сторону инфраструктурных и технологических проектов с долгим инвестиционным горизонтом.

5.3. Добавленная стоимость и локализация

Переход от торговли к совместному созданию добавленной стоимости является ключевым условием устойчивости сотрудничества. Практика показывает, что инвестиции и локализация отдельных стадий цепочек (производство, переработка, сервис, логистика) снижают регуляторные и логистические риски и повышают долгосрочную взаимную заинтересованность сторон.

Инвестиционные проекты в секторе удобрений в Бразилии служат прецедентом такого подхода: они позволяют сократить зависимость от импорта, создать рабочие места и встроить российские компании в локальные производственные экосистемы [14].

Какие стадии локализации наиболее реалистичны: (а) логистика и инфраструктура цепочки (складирование, перевалка, сервисное обслуживание); (б) сервисный слой (контроль качества, лабораторные услуги, агрохимическое сопровождение, техническое обслуживание); (в) «лёгкие» производственные стадии (смешение, упаковка, подготовка к отгрузке); (г) цифровые сервисы управления цепочками (планирование, мониторинг, прослеживаемость). Эти стадии дают быстрый эффект по устойчивости и предсказуемости и затем становятся базой для более капиталоёмких решений [14][15].

Вывод: стратегия локализации отдельных стадий цепочек должна рассматриваться как управленческий инструмент, а не как разовая уступка рынку.

6. Проектные окна 2024–2026: каталог направлений

Матрица проектных форматов (прикладное резюме)

— REDATA (данные/ИИ) → инвестиция/СП/сервис → узлы входа: BNDES, ApexBrasil, региональные агентства → KPI (ключевые показатели эффективности): мощность (MW), загрузка, доля локальных услуг [16][17][31][32][33][34]. Индустриальные применения REDATA: агро — прогноз спроса на входы (удобрения), мониторинг сезонности, оптимизация запасов и маршрутов; энергетика — мониторинг поставок и инфраструктуры хранения, управление рисками и простоями; SBCE/MRV — вычислительная база для реестров, верификации, геоаналитики и отчётности; логистика — цифровая прослеживаемость исполнения контрактов [16][17][2].

— SBCE/MRV → сервис/ПО/аудит → узлы: регуляторы, отраслевые ассоциации, INPE → KPI: контракты, охват цепочек, соответствие стандартам [18][19][26].

— «Топливо будущего» → индустриальный проект → узлы: MME, BNDES, отраслевые ассоциации → KPI: объёмы, доли смешения, себестоимость [21][22][32].

— Offshore wind → EPC/сервис → узлы: лицензирование, энергетические компании → KPI: стадии лицензий, CAPEX, сроки [20][32][46]. — Ниобий/XNO → материалы/R&D → узлы: производители, R&D-центры → KPI: выход, стоимость, контракты [23].

— eVTOL (электрический летательный аппарат вертикального взлёта и посадки) → подсистемы/ПО → узлы: хабы, венчурные площадки → KPI: сертификация, пилотные проекты [24][39][40][41][42].

— Sirius/INPE → контрактные исследования/данные-сервисы → узлы: CNPEM, INPE → KPI: проекты, SLA [25][26].

7. Площадки и узлы: через кого запускать проекты

Эффективный запуск и масштабирование российско-бразильских проектов требует привязки инициатив к существующим институциональным и рыночным «узлам». Ниже приведён практический навигатор по ключевым площадкам с указанием их роли.

7.1. Национальные и инвестиционные агентства - ApexBrasil — экспортно-инвестиционная навигация, поиск партнёров, сопровождение выходов на рынок и совместных проектов [31]. - BNDES — финансирование и структурирование капиталоёмких проектов, механизмы локальных валют и участие в БРИКС-инициативах [9][32]. - InvestSP — региональный инвестиционный оператор штата Сан-Паулу; полезен для локализации производств и R&D [34].

Практика: ApexBrasil использовать для первичной сборки партнёров/дистрибуции и навигации на рынке; BNDES — для структурирования финансирования, гарантий и инвестиционной логики; InvestSP — для «приземления» локализации и R&D на уровне штата и инфраструктуры [31][32][34].

7.2. Промышленные и деловые ассоциации

- CNI — «зонтик» промышленной повестки; формат «ассоциация–ассоциация» для отраслевых дорожных карт [33].

- FIESP и FIRJAN — региональные федерации индустрии для пилотных проектов и локальных партнёрств [35][36].

- FecomercioSP — торговля и услуги; полезна для сервисных компонентов цепочек [37].

- Amcham Brasil — международная деловая платформа для ускорения b2b-контактов [38].

7.3. Инновационные и венчурные узлы

- Cubo Itaú — пилотные проекты, корпоративные внедрения и технологические партнёрства [39].

- ABStartups — доступ к стартап-экосистеме и совместным пилотным проектам [40].

- ABVCAP и Anjos do Brasil — венчурный и ангельский капитал для масштабирования [41][42].

Практика: Cubo и ABStartups — для быстрых технологических пилотных проектов; ABVCAP и Anjos — для партнёрского и венчурного капитала на этапе масштабирования; это сокращает путь от идеи до внедрения в корпорациях [39][40][41][42].

7.4. Двусторонние и гуманитарные каналы

- Câmara Brasil–Rússia — двусторонний бизнес-канал, мероприятия и коммуникации [43].

- Casa Russa no Brasil — гуманитарные и общественные связи, поддержка коммуникаций [44].

7.5. Отраслевые и корпоративные якоря

- ABIEC — отраслевой вход по мясной и продовольственной цепочке [45]. - Petrobras — энергетический корпоративный якорь и инфраструктурные проекты [46].

- TOTVS — корпоративные ИТ-решения и цифровизация процессов [47]. - Banco BS2 — банковский узел для b2b-расчётов и торгового финансирования (trade finance) [48].

- BRF, Minerva Foods — переработка и экспорт продовольствия [49][50].
- União Química — фармацевтика и биотехнологии как корпоративный пилотный вход [51].

Практика: ABIEC/BRF/Minerva — для пилотных проектов в продовольственных цепочках и прослеживаемости; Petrobras — для инфраструктурных энергетических проектов; TOTVS — для корпоративной цифровизации цепочек; BS2 — для b2b-расчётов и торгового финансирования; União Química — как корпоративный вход в фарм/биотех-пилоты [45]–[51].

Вывод: использование готовых узлов снижает время запуска проектов, распределяет риски и повышает вероятность масштабирования. Работа через институциональные и отраслевые узлы позволяет деполитизировать проекты и повысить их устойчивость к внешним колебаниям.

Заключение

8.1. 10 управленческих шагов

1) Зафиксировать портфель из 2–3 управляемых цепочек (агро/удобрения; энергетика/инфраструктура; данные/ИИ как сервисный слой) и закрепить их в повестке CIC/CAN.

2) Назначить проектных владельцев по каждой цепочке (гос/институт развития/корпоративный якорь) с единым календарём и KPI.

3) Обеспечить платёжную реализуемость: нацвалютные расчёты, процедуры интероперабельности, клиринг; подключить инструменты BRICS.

4) Встроить trade finance и страхование в дизайн проектов (аккредитивы, гарантии, эскроу; страхование поставок и логистики).

5) Сформировать логистическую архитектуру (маршруты, перевалка, складирование) и цифровой мониторинг по Comex Stat.

6) Запустить пилоты 2024–2026 в подтверждённых окнах (REDATA, SBCE/MRV, «Топливо будущего», offshore wind, XNO, eVTOL, Sirius, INPE, биомедицина).

7) Использовать институциональные узлы (ApexBrasil, BNDES, CNI, региональные федерации) как ускорители запуска.

8) Применять модель локализации стадий цепочек (смешение/сервис/переработка/ИТ) для снижения рисков.

9) Создать проектный офис (PMO) для координации пилотов, отчетности и масштабирования.

10) Закрепить регуляторную дорожную карту и план коммуникаций с участием профильных ведомств.

Краткосрочный план действий (первые 30–45 дней): (1) выбрать 2 пилотных проекта: один в якорной цепочке (агро/логистика/контрактация), второй — в регуляторно оформленном окне (REDATA или SBCE/MRV); (2) сформировать список 10 целевых контактов через узлы (ApexBrasil, BNDES, CNI, региональные федерации, отраслевые ассоциации); (3) получить 2 письма о намерениях (LOI) и согласовать дорожную карту пилотного проекта (срок, данные, критерий успеха); (4) заранее подготовить комплаенс-пакет и

финансовую схему (торговое финансирование/страхование); (5) по итогам пилотного проекта — решение о масштабировании (программа/портфель). Узлы запуска — раздел 7 [31]–[34].

8.2. KPI управляемости

- Доля долгосрочных контрактов в обороте цепочки (%).
- Горизонт финансирования проектов (мес./годы).
- Доля операций в нацвалютах (%).
- Доля локализованных стадий цепочки (%).
- Стабильность логистики (выполнение графика, %).
- Стоимость транзакций (комиссии/страховые премии, %).
- Срок прохождения платежа (дни).
- Количество пилотных проектов, переведённых в масштаб (шт.).

KPI для государственного уровня (портфель и управляемость): количество проектов в портфеле CIC/CAN; доля проектов с институциональным сопровождением (институт развития/ассоциация/регион); объём софинансирования и число структурированных сделок; средний срок согласования и запуска пилотного проекта; доля проектов, перешедших из пилота в масштабирование [4][5][31].

Инвестиционный фильтр (для капиталоёмких проектов): при отборе проектов в портфель целесообразно фиксировать: (1) класс CAPEX и горизонт (12–18 мес.; 2–3 года; 3–5 лет); (2) ключевые факторы риска (платежи/комплаенс, логистика, регуляторика); (3) требуемая институциональная опора (BNDES/региональные агентства/ассоциации); (4) масштабируемость (условия тиражирования пилотного проекта); (5) «выход» в добавленную стоимость (локализация стадий, сервисный слой, данные) [9][32].

8.3. Риски и условия успеха

Ключевые риски: платёжные задержки и комплаенс; логистическая волатильность; регуляторные задержки; дефицит проектного управления.

Условия успеха: институциональная поддержка (CIC/CAN); платежно-финансовая инфраструктура; ранний вход в нормативно оформленные рынки; чёткое PMO и KPI; использование готовых узлов запуска.

Дополнительные оси сотрудничества

Ниже фиксируются оси сотрудничества, которые логически уже присутствуют в фактуре справки, но требуют явного оформления до блока итогов и прогнозов. Их фиксация позволяет корректно «подвести» управленческие выводы и рекомендации без расширения выводов на этом этапе.

8.4.1. Институционально-дипломатическая ось

Российско-бразильское сотрудничество в 2024–2026 гг. характеризуется высокой институциональной плотностью. Действующие механизмы Межправительственной комиссии Бразилия–Россия (CIC) и Комиссии высокого уровня Бразилия–Россия (CAN) формируют устойчивый

контур согласования приоритетов и проектов. Важной особенностью является совмещение политического уровня (CAN) с рабочими отраслевыми форматами (CIC), что позволяет переводить договорённости в проектные решения.

Практическое значение данной оси состоит в том, что институциональная дипломатия перестаёт быть фоновым сопровождением и становится инструментом управления экономической кооперацией: от отбора приоритетных направлений до сопровождения инвестиционных и технологических проектов.

8.4.2. Финансово-инвестиционная архитектура

Помимо платёжных решений и торгового финансирования, в российско-бразильской повестке формируется полноценная финансово-инвестиционная архитектура. Ключевую роль в ней играют институты развития (прежде всего BNDES), механизмы софинансирования и проектные структуры (SPV), а также использование национальных валют и инструментов БРИКС.

Данная ось позволяет рассматривать финансы не как сервисный элемент сделки, а как самостоятельный слой кооперации, определяющий масштабируемость и устойчивость проектов в капиталоёмких секторах.

8.4.3. Регуляторно-нормативная ось

Бразилия в рассматриваемый период выступает как регуляторная лаборатория, формирующая новые рынки через законодательство и подзаконные акты (REDATA, SBCE, «Топливо будущего», офшорная ветроэнергетика). Наличие чётких правил входа и требований к участникам снижает неопределённость и создаёт предсказуемый спрос на технологии и сервисы.

Регуляторно-нормативная ось открывает возможности кооперации в области стандартов, методик и правоприменительной практики, а не только в форме поставок продукции или услуг.

8.4.4. Научно-технологическая ось

Научная инфраструктура Бразилии (CNPEM/Sirius, INPE, Fiocruz, Instituto Butantan) формирует контур ускоренного перехода от исследований к прикладным решениям. В российско-бразильском контексте эта ось важна не как академический обмен, а как инструмент индустриального развития, тестирования технологий и снижения издержек НИОКР.

Научно-технологическая ось позволяет встраивать R&D в реальные цепочки создания стоимости — от энергетики и материалов до биомедицины и цифровых сервисов.

8.4.5. Цифрово-инфраструктурная ось (данные и доверие)

Развитие платёжных рельс (Pix, Open Finance), углеродного учёта (MRV), инфраструктуры данных и дата-центров формирует в Бразилии инфраструктуру доверия, которая становится основой для новых рынков. В этой логике данные, стандарты и цифровые платформы превращаются в самостоятельный фактор экономической кооперации.

Для российско-бразильского сотрудничества цифрово-инфраструктурная ось означает возможность совместного создания и эксплуатации платформенных решений, ориентированных на масштабирование и долгосрочное использование.

8.4.6. Регионально-кластерная ось

Практическая реализация сотрудничества всё в большей степени смещается на уровень регионов и кластеров. Роль штатов (прежде всего São Paulo и Rio de Janeiro), региональных инвестиционных агентств и отраслевых федераций позволяет запускать пилотные проекты быстрее и с меньшими транзакционными издержками.

Регионально-кластерная ось подчёркивает необходимость работы не только с национальными ведомствами, но и с конкретными территориями и промышленными экосистемами.

8.4.7. Позиционирование России как источника решений

Совокупность рассмотренных направлений позволяет зафиксировать сдвиг в позиционировании России в двустороннем сотрудничестве: от роли поставщика ресурсов и отдельных технологий к роли партнёра по архитектурам, стандартам и комплексным решениям. Это касается финансовых, регуляторных, цифровых и научно-технологических контуров.

Данная ось является методологической основой для последующих выводов и рекомендаций, формируя рамку активного, а не реактивного участия России в российско-бразильской повестке.

9. Прогнозы (3 горизонта)

Краткосрочный горизонт (6–12 месяцев). Вероятны быстрые результаты в проектах с низким порогом запуска и высокой институциональной поддержкой: пилоты по нацвалютным расчётам и trade finance; договорённости по календаризации поставок в агроцепочке; запуск совместных рабочих групп по MRV/SBCE и REDATA; подготовка ТЭО для локализации сервисных стадий (складирование, ИТ, сервис) [2][8][9][15][17].

Среднесрочный горизонт (1–3 года). Ожидается масштабирование пилотов в устойчивые программы: переход части оборота на нацвалютные расчёты; запуск проектов устойчивых видов топлива (SAF/биометан) в рамках действующих программ; формирование рынка MRV-сервисов; старт инфраструктурных проектов (дата-центры, офшорные ветропроекты на стадии лицензирования) [15][18][19][20][21].

Долгосрочный горизонт (3–5 лет). Возможна консолидация новых рынков и стандартов: интеграция инфраструктуры данных и ИИ в ключевые отрасли; зрелые цепочки накопителей энергии и материалов (ниобий/XNO); развитие городской воздушной мобильности (eVTOL) и сервисов мегасайенса/ДЗЗ как экспортируемых решений. Эффект проявится в росте добавленной стоимости и устойчивости двусторонней кооперации [22][23][24][25][27].

9.1. Итог и расширенные управленческие выводы

Вывод 1. Российско-бразильское сотрудничество вступило в фазу проектно-институционального партнёрства. Совокупность торговых показателей, инвестиционных кейсов и действующих межправительственных механизмов (CIC/CAN) свидетельствует о переходе от преимущественно товарной модели к формату, где ключевую роль играют проекты, институты и архитектуры взаимодействия. Торговля сохраняет базовую функцию, но перестаёт быть единственным источником роста.

Вывод 2. Высокая концентрация торговли формирует управляемые точки роста. Концентрация потоков вокруг энергетики и агропромышленного комплекса снижает неопределённость и позволяет выстраивать расширенную кооперацию: финансирование, логистика, сервисы, локализация и технологические надстройки. Таким образом, концентрация выступает не риском, а активом управления.

Вывод 3. Институциональная плотность является конкурентным преимуществом двусторонней модели. Наличие развитых институтов развития, отраслевых федераций и региональных агентств обеспечивает ускоренный запуск и сопровождение проектов. По сравнению с «чисто рыночными» форматами, институциональная модель снижает транзакционные и регуляторные издержки.

Вывод 4. Бразилия выступает как платформа апробации и масштабирования решений. Регуляторные режимы (REDATA, SBCE, «Топливо будущего») и развитая инфраструктура данных, финансов и науки позволяют использовать Бразилию как полигон для отработки решений, пригодных к дальнейшему масштабированию в других юрисдикциях.

Вывод 5. Наибольшую устойчивость имеют форматы сотрудничества по архитектурам и стандартам. Проекты, ориентированные на совместное формирование стандартов, методик, цифровых платформ и регуляторных практик, демонстрируют более высокий потенциал долгосрочной устойчивости по сравнению с разовыми поставками продукции.

Вывод 6. Россия способна занимать активную позицию как источник решений. Россия может выступать не только как поставщик ресурсов, но и как партнёр по созданию финансовых, технологических и управленческих решений, усиливающих стратегическую симметрию отношений.

Вывод 7. Внешние риски усиливают ценность институциональных и проектных моделей. Чем выше уровень геополитической, финансовой и логистической неопределённости, тем более конкурентоспособными становятся модели сотрудничества, основанные на институтах, длинных контрактах, диверсификации маршрутов и заранее выстроенной финансовой архитектуре.

Вывод 8. Период 2024–2026 гг. является окном возможностей ограниченной длительности. Сочетание регуляторных новаций, институциональной активности и глобальной перестройки цепочек создаёт

временное окно для запуска проектов. Его упущение приведёт к росту конкуренции и снижению потенциальной отдачи в последующие годы.

10. Расширенные рекомендации по развитию сотрудничества

10.1. Государственный и межправительственный уровень

1) Использовать заседания CAN и CIC для фиксации портфелей проектов, а не только общих деклараций.

2) Формировать долгосрочные дорожные карты по 3–4 приоритетным трекам (энергетика, агро, данные/ИИ, устойчивые виды топлива).

3) Укреплять двустороннюю повестку в связке с БРИКС как надстройкой, а не заменой прямого сотрудничества.

Контуры ответственности: целесообразно закреплять портфель проектов по цепочкам с распределением функций: внешнеэкономическая координация (CIC/CAN), финансовая архитектура (институты развития), отраслевое сопровождение (ассоциации и федерации), региональная реализация (штаты/агентства), технологические пилотные проекты (хабы и научная инфраструктура). Это переводит межведомственные согласования в управляемый формат с регулярной отчётностью [4][5][32][33][34].

10.2. Институционально-финансовый уровень

4) Закрепить ведущую роль институтов развития (BNDES и партнёры) в финансировании капиталоёмких и инфраструктурных проектов.

5) Рассматривать финансы как стратегический слой кооперации, включая софинансирование, проектные компании (SPV) и смешанные источники капитала.

6) Использовать режимы REDATA и SBCE как готовые рынки с понятными правилами входа.

10.3. Корпоративный уровень

7) Формировать пул якорных компаний по ключевым секторам (энергетика, агро, ИТ, фармацевтика).

8) Строить проекты вокруг локализации сервисных и технологических стадий, а не только производства.

9) Использовать пилотные проекты как обязательную фазу перед масштабированием.

10.4. Регионально-кластерный уровень

10) Смещать фокус реализации проектов на уровень штатов и кластеров (São Paulo, Rio de Janeiro).

11) Привязывать инициативы к конкретным индустриальным и научным экосистемам.

10.5. Научно-технологический уровень

12) Использовать инфраструктуры Sirius, INPE, Fiocruz и Butantan как ускорители индустриальных проектов.

13) Развивать совместные программы НИОКР с чётко определённым индустриальным заказчиком.

14) Делать акцент на данных, методиках и аналитических сервисах как объекте кооперации.

10.6. Управленческий контур

15) Создать постоянный проектный офис (PMO) по российско-бразильской повестке.

16) Ввести KPI не только по объёму торговли, но и по количеству устойчивых проектов, доле локализации и скорости масштабирования.

10.7. Управление внешними рисками

17) Закладывать сценарное планирование (A/B/C) по логистике, финансированию и страхованию на этапе проектирования.

18) Использовать диверсификацию банков, страховых компаний и маршрутов как стандарт, а не исключение.

19) Привязывать ключевые проекты к институциональным рамкам (CAN, CIC, институты развития) для снижения регуляторных рисков.

20) Заблаговременно формировать комплаенс-пакеты и юридические конструкции для трансграничных проектов.

Итоговое резюме: Синхронизация институциональных механизмов, финансовых инструментов и проектных инициатив позволяет использовать период 2024–2026 гг. как окно для перехода к устойчивой, многослойной модели российско-бразильского сотрудничества, ориентированной на долгосрочный экономический эффект и стратегическое партнёрство.

Использованные источники:

1. Planalto. Lula sobre comércio exterior com a Rússia: «Brasil não pode jogar fora nenhuma oportunidade». Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/05/lula-sobre-comercio-exterior-com-a-russia-201cbrasil-nao-pode-jogar-fora-nenhuma-oportunidade201d (дата обращения: 04.02.2026).
2. Comex Stat (MDIC). Estatísticas de comércio exterior do Brasil (Rússia/676). Электронный ресурс. URL: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis/2/676 (дата обращения: 04.02.2026).
3. Ministério das Relações Exteriores (Brasil). Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil–Rússia (CIC), 27.02.2024. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-da-comissao-intergovernamental-brasil-russia-de-cooperacao-economica-cientifica-e-tecnologica-cic (дата обращения: 04.02.2026).
4. Ministério das Relações Exteriores (Brasil). 8ª Reunião da Comissão Brasil–Rússia de Alto Nível de Cooperação (CAN), Brasília, 05.02.2026. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/8a-reuniao-da-comissao-brasil-russia-de-alto-nivel-de-cooperacao-can-2013-brasilia-5-de-fevereiro-de-2026 (дата обращения: 04.02.2026).
5. Reuters. Brazil nixes BRICS currency, eyes less reliance on mighty dollar. Электронный ресурс. URL: https://www.reuters.com/markets/currencies/brazil-nixes-brics-currency-eyes-less-reliance-mighty-dollar-2025-02-13/ (дата обращения: 04.02.2026).
6. BNDES. Accord to finance companies in local currency (BRICS banks). Электронный ресурс. URL:

https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/conteudos/noticia/BNDES-and-official-banks-of-BRICS-countries-sign-an-accord-to-finance-companies-in-local-currency/ (дата обращения: 04.02.2026).
7. Banco Central do Brasil. Pix em números: estatísticas. Электронный ресурс. URL: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-em-numeros-estatisticas (дата обращения: 04.02.2026).
8. Planalto. Medida Provisória nº 1.318/2025 (REDATA). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Mpv/mpv1318.htm (дата обращения: 04.02.2026).
9. Câmara dos Deputados (Brasil). Lei nº 15.042/2024 (SBCE). Электронный ресурс. URL: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-15042-11-dezembro-2024-796690-publicacaooriginal-173745-pl.html (дата обращения: 04.02.2026).
10. Câmara dos Deputados (Brasil). Decreto nº 12.677/2025 (SBCE). Электронный ресурс. URL: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12677-15-outubro-2025-798146-publicacaooriginal-176743-pe.html (дата обращения: 04.02.2026).
11. Planalto. Lei nº 15.097/2025 (offshore wind). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15097.htm (дата обращения: 04.02.2026).
12. Planalto. Lei nº 14.993/2024 («Combustíveis do Futuro»). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14993.htm (дата обращения: 04.02.2026).
13. Mining Technology. CBMM opens niobium production facility (XNO). Электронный ресурс. URL: https://www.mining-technology.com/news/cbmm-opens-niobium-production-facility/ (дата обращения: 04.02.2026).
14. Eve Air Mobility. First flight of full-scale eVTOL prototype. Электронный ресурс. URL: https://www.eveairmobility.com/eve-air-mobility-completes-successful-first-flight-of-full-scale-evtol-prototype/ (дата обращения: 04.02.2026).
15. CNPEM. Sirius synchrotron. Электронный ресурс. URL: https://cnpem.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
16. INPE. National Institute for Space Research. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/inpe/ (дата обращения: 04.02.2026).

Дополнительные электронные ресурсы

1. Planalto. Lula sobre comércio exterior com a Rússia: «Brasil não pode jogar fora nenhuma oportunidade». Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/05/lula-sobre-comercio-exterior-com-a-russia-201cbrasil-nao-pode-jogar-fora-nenhuma-oportunidade201d (дата обращения: 04.02.2026).
2. Comex Stat (MDIC). Estatísticas de comércio exterior do Brasil (Rússia/676). Электронный ресурс. URL: https://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis/2/676 (дата обращения: 04.02.2026).

3. OEC. Bilateral Profile: Brazil–Russia. Электронный ресурс. URL: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/bra/partner/rus (дата обращения: 04.02.2026).
4. Ministério das Relações Exteriores (Brasil). Reunião da Comissão Intergovernamental Brasil–Rússia (CIC), 27.02.2024. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-da-comissao-intergovernamental-brasil-russia-de-cooperacao-economica-cientifica-e-tecnologica-cic (дата обращения: 04.02.2026).
5. Ministério das Relações Exteriores (Brasil). 8ª Reunião da Comissão Brasil–Rússia de Alto Nível de Cooperação (CAN), Brasília, 05.02.2026. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/8a-reuniao-da-comissao-brasil-russia-de-alto-nivel-de-cooperacao-can-2013-brasilia-5-de-fevereiro-de-2026 (дата обращения: 04.02.2026).
6. Itamaraty / Concordia. Реестр соглашений и документов. Электронный ресурс. URL: https://aplicacao.itamaraty.gov.br/Concordia (дата обращения: 04.02.2026).
7. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Реестр международных договоров. Электронный ресурс. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/ (дата обращения: 04.02.2026).
8. Reuters. Brazil nixes BRICS currency, eyes less reliance on mighty dollar. Электронный ресурс. URL: https://www.reuters.com/markets/currencies/brazil-nixes-brics-currency-eyes-less-reliance-mighty-dollar-2025-02-13/ (дата обращения: 04.02.2026).
9. BNDES. Accord to finance companies in local currency (BRICS banks). Электронный ресурс. URL: https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/conteudos/noticia/BNDES-and-official-banks-of-BRICS-countries-sign-an-accord-to-finance-companies-in-local-currency/ (дата обращения: 04.02.2026).
10. Agência Brasil. Negociações para sistema próprio de pagamento do BRICS avançam. Электронный ресурс. URL: https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2025-07/negociacoes-para-sistema-proprio-de-pagamento-do-brics-avancam (дата обращения: 04.02.2026).
11. Banco Central do Brasil. Pix em números: estatísticas. Электронный ресурс. URL: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-em-numeros-estatisticas (дата обращения: 04.02.2026).
12. Banco Central do Brasil. Open Finance. Электронный ресурс. URL: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openfinance (дата обращения: 04.02.2026).
13. Banco Central do Brasil. Piloto Drex. Электронный ресурс. URL: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/piloto-drex (дата обращения: 04.02.2026).

14. World Nuclear News. Brazil and Russia preparing to develop SMR options. Электронный ресурс. URL: https://www.world-nuclear-news.org/articles/brazil-and-russia-preparing-to-develop-smr-options (дата обращения: 04.02.2026).
15. Reuters. EuroChem's Brazil plant boosts hopes of smaller import dependence. Электронный ресурс. URL: https://www.reuters.com/world/americas/eurochems-brazil-plant-boosts-hopes-smaller-import-dependence-2024-03-13/ (дата обращения: 04.02.2026).
16. Planalto. Medida Provisória nº 1.318/2025 (REDATA). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/Mpv/mpv1318.htm (дата обращения: 04.02.2026).
17. Ministério da Fazenda (Brasil). REDATA: incentivos tributários para data centers. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/medida-provisoria-cria-o-redata-que-estimula-datacenters-e-impulsiona-economia-digital-no-brasil (дата обращения: 04.02.2026).
18. Câmara dos Deputados (Brasil). Lei nº 15.042/2024 (SBCE). Электронный ресурс. URL: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2024/lei-15042-11-dezembro-2024-796690-publicacaooriginal-173745-pl.html (дата обращения: 04.02.2026).
19. Câmara dos Deputados (Brasil). Decreto nº 12.677/2025 (SBCE). Электронный ресурс. URL: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12677-15-outubro-2025-798146-publicacaooriginal-176743-pe.html (дата обращения: 04.02.2026).
20. Planalto. Lei nº 15.097/2025 (offshore wind). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15097.htm (дата обращения: 04.02.2026).
21. Planalto. Lei nº 14.993/2024 («Combustíveis do Futuro»). Электронный ресурс. URL: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14993.htm (дата обращения: 04.02.2026).
22. Ministério de Minas e Energia (Brasil). Combustível do Futuro. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/combustivel-do-futuro (дата обращения: 04.02.2026).
23. Mining Technology. CBMM opens niobium production facility (XNO). Электронный ресурс. URL: https://www.mining-technology.com/news/cbmm-opens-niobium-production-facility/ (дата обращения: 04.02.2026).
24. Eve Air Mobility. First flight of full-scale eVTOL prototype. Электронный ресурс. URL: https://www.eveairmobility.com/eve-air-mobility-completes-successful-first-flight-of-full-scale-evtol-prototype/ (дата обращения: 04.02.2026).
25. CNPEM. Sirius synchrotron. Электронный ресурс. URL: https://cnpem.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
26. INPE. National Institute for Space Research. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/inpe/ (дата обращения: 04.02.2026).

27. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Электронный ресурс. URL: https://www.fiocruz.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
28. Instituto Butantan. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://butantan.gov.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
29. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/anvisa/ (дата обращения: 04.02.2026).
30. Ministério da Saúde (Brasil). SUS Digital. Электронный ресурс. URL: https://www.gov.br/saude/pt-br (дата обращения: 04.02.2026).
31. ApexBrasil. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.apexbrasil.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
32. BNDES. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.bndes.gov.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
33. CNI (Confederação Nacional da Indústria). Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.portaldaindustria.com.br/cni/ (дата обращения: 04.02.2026).
34. InvestSP. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.investe.sp.gov.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
35. FIESP. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.fiesp.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
36. FIRJAN. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.firjan.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
37. FecomercioSP. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.fecomercio.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
38. Amcham Brasil. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://amcham.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
39. Cubo Itaú. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://cubo.network/ (дата обращения: 04.02.2026).
40. ABStartups. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://abstartups.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
41. ABVCAP. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.abvcap.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
42. Anjos do Brasil. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.anjosdobrasil.net/ (дата обращения: 04.02.2026).
43. Câmara Brasil–Rússia. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://camarabrasilrussia.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
44. Casa Russa no Brasil. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://brasil.rs.gov.ru/ (дата обращения: 04.02.2026).
45. ABIEC. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.abiec.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
46. Petrobras. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://petrobras.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
47. TOTVS. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.totvs.com/ (дата обращения: 04.02.2026).

48. Banco BS2. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.bancobs2.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).
49. BRF. Investor Relations. Электронный ресурс. URL: https://ri.brf-global.com/ (дата обращения: 04.02.2026).
50. Minerva Foods. Official website. Электронный ресурс. URL: https://minervafoods.com/en/homepage/ (дата обращения: 04.02.2026).
51. União Química. Официальный портал. Электронный ресурс. URL: https://www.uniaoquimica.com.br/ (дата обращения: 04.02.2026).

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-766-780
УДК: 539.1/539.2; 538.9; 537.9

Калмыков Н.Н., канд. соц. наук,
Генеральный директор издательства «Целлюлоза»
Россия, Москва

РАННЯЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЯРОНОВ: ПРИОРИТЕТ, РЕЦЕПЦИЯ И СТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ Н. И. КРИВКО, А. И. ГУБАНОВА И Н. М. РЕЙНОВА, 1959–1960)

Аннотация. *В статье проведён источниковедческий анализ ранней экспериментальной верификации мобильных поляронов в Cu_2O методом циклотронного (диамагнитного) резонанса по публикации 1959–1960 гг. (А. И. Губанов, Н. И. Кривко, Н. М. Рейнов). Цель исследования — зафиксировать приоритет постановки прямой экспериментальной проверки через измерение поляронной массы и проследить раннюю международную рецепцию первоисточника. Методология включает верификацию первичных формулировок и дат, анализ ранних зарубежных цитирований (1963–1966), а также сопоставление рамки новизны рецензируемых публикаций с её расширениями в медийных пересказах. Показано, что первоисточник рано включён в международный ссылочный оборот и сохраняет признание в последующей рецензируемой литературе; при этом в медиадискурсе встречаются обобщающие формулы «впервые», расширяющие объём заявленной новизны по сравнению с рамкой рецензируемой публикации. Сформулирована историографически корректная позиция, разграничивающая приоритет первичной экспериментальной фиксации и позднейшие узкоспецифические новизны, относящиеся к отдельным классам материалов и типам доказательства.*

Ключевые слова: *поляроны; циклотронный резонанс; Cu_2O; эффективная масса; экспериментальная верификация; научный приоритет; историография науки; утрата первоисточника в цепочке ссылок.*

Kalmykov N.N., Ph.D. (Sociology)
Position: Chief Executive Officer
Organization: Zelluloza.ru LLC

EARLY EXPERIMENTAL VERIFICATION OF MOBILE POLARONS: PRIORITY, RECEPTION, AND HISTORIOGRAPHIC DISTORTIONS (THE CASE OF N. I. KRIVKO, A. I. GUBANOV, AND N. M. REINOV, 1959–1960)

Abstract. *This paper presents a source-based analysis of an early experimental verification of mobile polarons in Cu2O via cyclotron (diamagnetic) resonance reported in the 1959–1960 work by A. I. Gubanov, N. I. Krivko, and N. M. Reinov. The study documents the priority of the explicit direct experimental verification program based on polaron-mass determination and traces the early international reception of the primary source through citations from 1963–1966. The methodology combines primary-source verification (claims, dates, experimental design), bibliometric tracing of early citations, and a comparative analysis of novelty framing in peer-reviewed papers versus its expansion in media narratives. The results show that the 1959–1960 paper entered the international citation record by 1963–1966 and remains recognized in later peer-reviewed literature, whereas media texts often broaden "first" claims beyond the peer-reviewed scope. The paper formulates a historically sound position on priority and scope, distinguishing the early cyclotron-resonance verification program from later system-specific spectroscopic "first" claims.*

Keywords*: polarons; cyclotron resonance; Cu2O; effective mass; experimental verification; scientific priority; historiography of science; loss of the primary source in citation chains.*

Введение

Проблема научного приоритета в физике квазичастиц осложняется тем, что теоретическое введение объекта и его экспериментальная верификация во времени нередко разнесены, а позднейшие медийные интерпретации склонны расширять формулы «впервые» и «доказано». Теоретические основания поляронной концепции были заложены в классических работах Х. Фрёлиха (1954) и Т. Холстейна (1959), где электрон рассматривается как носитель, взаимодействующий с фононным полем кристалла и образующий составную квазичастицу особого типа [21–22]. Однако сами по себе теоретические модели большого и малого полярона не заменяют экспериментальную проверку существования мобильных поляронов, что и определяет значимость работ 1959–1960 гг. в контексте данной статьи. В этом смысле задача 1959–1960 гг. состоит не в уточнении теории, а в переводе полярона в режим измеряемого объекта через резонансную массу [1]. При этом выбранный экспериментальный канал верификации должен быть дисциплинарно легитимен: в поляронной физике циклотронный резонанс в магнитном поле рассматривается как один из канонических методов исследования эффективной массы и эффектов, связанных с электрон-фононным взаимодействием, что делает подход циклотронного резонанса (ЦР) релевантным для обсуждения экспериментальной верификации [18].

Объектом настоящего исследования является ранняя экспериментальная верификация мобильных поляронов через измерение эффективной (поляронной) массы методом циклотронного (диамагнитного) резонанса в кристалле Cu_2O. Предмет исследования — приоритет постановки и реализации данной задачи в публикации 1959–1960 гг., роль Н. И. Кривко

как экспериментатора в составе авторского коллектива (А. И. Губанов, Н. И. Кривко, Н. М. Рейнов), а также последующая международная рецепция и историографическая трансформация данного узла.

Цель статьи — документально зафиксировать приоритет ранней экспериментальной программы по прямой проверке существования мобильных поляронов и показать, каким образом позднейшие формулировки заявок на новизну в научных и околонаучных публикациях расширяют рамку новизны по сравнению с первоисточником.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

4) реконструировать постановку задачи «прямое экспериментальное подтверждение» и установить хронологический приоритет публикации 1959–1960 гг. [1];

5) проанализировать роль Н. И. Кривко как экспериментатора на основе корпуса его ранних работ [2–4];

6) проследить раннюю международную рецепцию первоисточника (1963–1966) и последующую нормализацию результатов (1970-е гг.) [5–7, 19, 20];

7) сопоставить современные формулировки в рецензируемых публикациях (PRL 2025) с медийными интерпретациями и выявить расхождение объёма заявленной новизны [8–10, 11, 13–16];

8) сформулировать корректную историографическую позицию относительно приоритета и вклада Н. И. Кривко и его коллег.

Научная новизна работы состоит в источниковедчески верифицированной реконструкции приоритета экспериментальной верификации мобильных поляронов в 1959–1960 гг., в типологизации механизмов «признание / утрата первоисточника» в последующей литературе и в доказательном разведении узкой новизны рецензируемых публикаций и расширенного медийного дискурса «первооткрывательства».

Под приоритетом в настоящем исследовании понимается совокупность следующих критериев: (1) явная постановка задачи прямой экспериментальной проверки существования мобильных поляронов; (2) реализация измерительного критерия (определение эффективной/поляронной массы методом циклотронного резонанса); (3) публикационная фиксация результата с установленной датой поступления рукописи; (4) ранняя международная рецепция первоисточника в зарубежной научной литературе.

Методы и материалы

Исследование основано на анализе первичных научных публикаций и сопоставлении их с последующей рецепцией в международной литературе. В корпус первичных источников включены: публикация 1959–1960 гг. в ZhETF / Sov. Phys. JETP [1], ранние работы с участием Н. И. Кривко, подтверждающие его экспериментальную компетенцию [2–4], а также статьи зарубежных журналов, в которых первоисточник фигурирует в системе научных ссылок [5], [20], [6]. Для анализа динамики интерпретаций использована публикация 1979 г., посвящённая режимным и примесным

факторам в экспериментах ЦР [7], а также современная работа по временно́-разрешённому циклотронному резонансу, демонстрирующая продолжение метода и прямое обращение к ранней линии [8].

Отдельный блок источников составляют материалы PRL 2025 и дополнительные материалы, используемые для фиксации узкой формулы новизны и границ применимости утверждений о первенстве [9, 12]. Пресс- и медийные публикации включены строго как материал для аудита заявок на новизну и сопоставления дискурсивных расширений с рамкой рецензируемой публикации [11, 13–16].

В статье различаются уровни источников: (а) первичные рецензируемые научные публикации и их переводные версии, используемые как доказательная база (например, [1], [5]–[9], [20]); (б) вторичные научные своды/обзоры, фиксирующие интерпретацию вклада первоисточника и его место в дисциплинарной традиции (например, [19]); (в) пресс- и медийные тексты, рассматриваемые исключительно как материал для аудита заявок на новизну и анализа дискурсивных расширений (например, [11, 13–16]); (г) публицистические свидетельства, используемые только для реконструкции восприятия результата и контекстуальной рецепции, но не как доказательство экспериментального факта [24].

9) источниковедческий анализ (верификация дат, формулировок целей и выводов в первоисточниках);

10) библиометрический анализ ранней международной рецепции (наличие первоисточника в списке литературы и последующих сводных корпусах);

11) сравнительный анализ формулировок заявок на новизну (рецензируемые публикации vs пресс/медиа) с фиксацией объёма заявленной новизны;

12) реконструкцию механизмов утраты первоисточника в цепочке ссылок на примере сопоставления экспериментальной линии ЦР и прикладных работ.

В работе принципиально различаются: (а) теоретическое введение полярона как квазичастицы, (б) экспериментальная верификация мобильных поляронов конкретным методом (циклотронный резонанс), и (в) позднейшие узкие новизны, относящиеся к конкретным классам материалов и типам доказательства. Отказ от недоказуемых обобщений типа «первый в мире» является осознанным методическим ограничением исследования.

Результаты

1. Приоритетная постановка прямой экспериментальной проверки (1959–1960)

1.1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ И КРИТЕРИЙ «ПРЯМОЙ ПРОВЕРКИ»

В первоисточнике 1959–1960 гг. авторы фиксируют центральную проблему поляронной физики того периода как отсутствие прямой экспериментальной верификации существования подвижных (мобильных)

поляронов. В тексте статьи прямо формулируется задача прямого экспериментального подтверждения существования мобильных поляронов [1], что позволяет опираться на формулировки авторов первоисточника. В качестве критерия «прямой проверки» предлагается измерение эффективной массы носителя заряда, сопоставимой с теоретически ожидаемой поляронной массой, в условиях, обеспечивающих наблюдение циклотронного (диамагнитного) резонанса [1].

Ключевым для установления приоритета является то, что данная постановка задачи присутствует в самом тексте статьи, а не в последующих пересказах; кроме того, архив публикации фиксирует дату поступления рукописи 10 июля 1959 г., что задаёт хронологический маркер для сравнения с последующими международными экспериментами и интерпретациями [1].

1.2. МЕТОДИКА: ЦИКЛОТРОННЫЙ (ДИАМАГНИТНЫЙ) РЕЗОНАНС В Cu_2O

Экспериментальная программа реализована на кристаллах Cu_2O с использованием диамагнитного (циклотронного) резонанса в магнитном поле при низких температурах. Принципиальным элементом дизайна опыта выступает формирование носителей заряда при освещении (фотоинжекция) и регистрация резонансного поглощения СВЧ-излучения как функции магнитного поля [1]. В итоге измеряемая величина (резонансное условие) напрямую связывается с эффективной массой носителей.

Для источниковедческого анализа важно, что используется резонансный метод, в котором масса выступает измеряемым параметром; режим опыта задаётся низкими температурами и высокими полями при фотоинжекции; а интерпретация результата привязана к поляронной модели через сопоставление оценок масс [1].

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ: НАБЛЮДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МАКСИМУМОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАСС

В работе сообщается о наблюдении нескольких максимумов поглощения, соответствующих различным оценкам эффективной массы. Один из максимумов интерпретируется как «зонная» масса, а другие — как «тяжёлые» массы, сопоставимые с поляронной [1]. Существенно, что вывод строится не на единичном наблюдении, а на сопоставлении нескольких резонансных особенностей с теоретическими оценками, доступными на момент работы.

Для аргумента о приоритете Н. И. Кривко и соавторов важно подчеркнуть: первоисточник фиксирует не только численные оценки и экспериментальную постановку, но и методологическую рамку доказательства — «полярон как измеряемый объект» через резонансную массу. Именно эта рамка делает работу 1959–1960 гг. приоритетным узлом в истории экспериментальной верификации мобильных поляронов [1].

1.4. ПРИОРИТЕТ И КОРРЕКТНАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

На основании первоисточника корректной является следующая формула приоритета: публикация 1959–1960 гг. представляет собой раннюю прямую экспериментальную попытку верификации существования мобильных поляронов через измерение поляронной массы методом циклотронного резонанса в Cu_2O, с документально фиксированной датой поступления рукописи [1]. Утверждения более широкого типа («первое экспериментальное доказательство полярона вообще») требуют иной базы сравнения и не следуют непосредственно из данного источника.

Дополнительно важно, что вклад работы 1959–1960 гг. фиксируется и во вторичном международном корпусе: в обзорных и справочных материалах она описывается как сообщение об экспериментальной поляронной массе в Cu_2O и включается в сводные таблицы/перечни источников по эффективным массам, что подтверждает устойчивость её интерпретации как экспериментального узла поляронной физики [19].

2. Атрибуция экспериментального вклада: резонансная школа и траектория Н. И. Кривко

2.1. ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ РЕЗОНАНСНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ: КОМАР–КРИВКО (1957)

Для атрибуции роли Н. И. Кривко в экспериментальном контуре 1959–1960 гг. существенен корпус его предшествующих работ по резонансным методам. Уже в 1957 г. Кривко выступает соавтором исследования по ферромагнитному резонансу, где представлены количественные параметры (g-фактор и релаксационные времена) и сопоставление измерений при комнатной и гелиевой температуре [2]. Содержательно это указывает на сформированную экспериментальную компетенцию в области СВЧ-измерений, сильных магнитных полей и низкотемпературных режимов, непосредственно релевантную постановке эксперимента ЦР в Cu_2O.

Указанная работа одновременно фиксирует научную среду и предшествующий контур руководства: участие А. П. Комара как соавтора отражает преемственность экспериментальной школы, в рамках которой формировались навыки и методики, применённые затем в поляронной программе [2].

2.2. РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОНТУРА (А. И. ГУБАНОВ) И РУКОВОДИТЕЛЯ/СОАВТОРА (Н. М. РЕЙНОВ)

В первоисточнике 1959–1960 гг. метод доказательства строится на сопоставлении экспериментально определяемой массы с теоретически ожидаемой поляронной массой [1]. Это требует наличия теоретического контура интерпретации и выбора критериев согласования результата с моделью. В данной конфигурации А. И. Губанов репрезентирует теоретическую линию, обеспечивающую перевод экспериментального измерения в язык поляронной модели, тогда как Н. М. Рейнов выступает как

руководитель и соавтор, интегрирующий постановку задачи, эксперимент и интерпретацию в единую публикационную фиксацию результата [1].

Для целей настоящей статьи принципиально, что данное распределение ролей реконструируется не по биографическим свидетельствам, а через функциональные требования метода доказательства, зафиксированные в первоисточнике: экспериментальная часть (измерение ЦР) и теоретическая часть (критерий поляронной массы) образуют связанную систему аргументации [1].

2.3. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ: KRIVKO–BERGER (1966)

Роль Н. И. Кривко как экспериментатора подтверждается и последующими публикациями, где он выступает ведущим автором и реализует независимую экспериментальную программу. В работе 1965/1966 гг. по локальным магнитным полям на поверхности сверхпроводника в смешанном состоянии используется ЭПР-зонд, анализируются режимные эффекты и зависимость результатов от истории намагничивания образца [3]. Наличие самостоятельной экспериментальной линии после 1960 г. снимает интерпретацию Кривко как «номинального» соавтора и укрепляет атрибуцию его роли как носителя экспериментальной компетенции.

2.4. ПОЗДНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТУР (1989): ИНТЕРФЕЙС «СВЕРХПРОВОДНИК–SI»

Для источниковедческой атрибуции научной траектории Н. И. Кривко важно зафиксировать и поздний экспериментальный контур, представленный работой по интерфейсу «сверхпроводник–Si» (ФТТ, 1989) [4]. Данная публикация не относится непосредственно к поляронной проблематике, однако демонстрирует сохранение экспериментального профиля автора в тематике низкотемпературной физики и физики твёрдотельных интерфейсов.

Непрерывность исследовательской линии подтверждается и серией публикаций Н. И. Кривко в «Физике и технике полупроводников» конца 1970-х — начала 1980-х годов [26–28]. Их присутствие в англоязычном ссылочном контуре подтверждается, в частности, использованием ссылки на «Sov. Phys. Semicond. 11, 1315 (1977)» в Applied Physics Letters (1980) [25]. Для настоящей статьи этот контур важен как дополнительное подтверждение международной видимости экспериментатора и устойчивости его научной траектории.

3. Международная рецепция и включение в научный оборот (1963–1966)

3.1. РАННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИТИРОВАНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Одним из ключевых критериев устойчивости научного приоритета является скорость и характер международной рецепции первоисточника. Документально подтверждаемыми маркерами раннего включения работы 1959–1960 гг. в международный научный оборот являются её присутствие в зарубежной журнальной литературе 1960-х гг., включая ссылочные упоминания в The Journal of Chemical Physics (1963) [5], Journal de Physique

(1965) [20] и physica status solidi (b) (1966) [6]. Наличие первоисточника в системе научных ссылок зарубежных журналов показывает, что экспериментальная постановка задачи и интерпретация результатов были восприняты как релевантные для обсуждения электронно-фононных взаимодействий и связанных с ними эффектов.

Показательно для аргумента о приоритете то, что первоисточник включён в зарубежную систему ссылок уже в 1963–1966 гг. [5], [20], [6], а его трактовка как сообщения об экспериментальной поляронной массе в Cu_2O дополнительно закрепляется в обзорном корпусе [19]. В дальнейшем канал ЦР в Cu_2O закрепляется как устойчивый экспериментальный инструментарий (1976) и переводится в режим уточнения физических механизмов (1979) [23], [7].

В качестве дополнительного историографического свидетельства привлечено научно-популярное изложение И. Л. Радунской в книге «Безумные» идеи (1965), где группа описана как «доктор физико-математических наук Н. М. Рейнов в сопровождении теоретика А. И. Губанова и экспериментатора Н. И. Кривко»; автор также воспроизводит ключевые параметры эксперимента (криостат с жидким гелием, сантиметровые радиоволны, магнитные поля 2350; 19600; 21600 эрстед) и трактует результат как обнаружение подвижного полярона. Данный источник используется исключительно как свидетельство рецепции и контекста, а не как доказательство экспериментального факта [24].

4. Нормализация и уточнение режимов (1970-е годы)

Развитие экспериментальной поляронной тематики в 1970-е гг. сопровождалось уточнением условий наблюдения циклотронного резонанса и анализом влияния примесей, дефектов и механизмов рассеяния на форму и положение резонансных линий. Публикация 1979 г. в physica status solidi (b) [7] представляет собой характерный пример такого этапа нормализации.

В данной работе исследуется влияние примесного рассеяния на циклотронный резонанс носителей в Cu_2O, а также обсуждается возможность внешней природы одной из наблюдаемых линий [7]. Отметим, что постановка вопроса в 1979 г. не направлена на опровержение самой возможности экспериментального выявления поляронных эффектов, а сосредоточена на уточнении интерпретации и разграничении вкладов внутренних/внешних в наблюдаемых характеристиках.

Это позволяет сделать принципиальный вывод: позднейшая литература развивает и уточняет ранний подход циклотронного резонанса, а не отменяет его. Следовательно, расхождения в численных оценках или в интерпретации отдельных максимумов не могут служить аргументом против приоритета самой постановки задачи прямой экспериментальной проверки мобильных поляронов в 1959–1960 гг. [1].

5. Современное признание и развитие экспериментального канала (2000-е – 2010-е гг.)

В 1970-е годы циклотронный резонанс в Cu_2O закрепляется как международный экспериментальный канал. В частности, в работе Hodby et al. (1976) методом циклотронного резонанса исследованы электроны и дырки в Cu_2O при низких температурах, а публикация используется в последующей литературе как опорный источник по эффективным массам [23]. Таким образом, формируется промежуточный узел между ранними экспериментами 1959–1960 гг. и более поздними уточняющими исследованиями [1].

В современной физике твёрдого тела циклотронный резонанс остаётся одним из канонических методов исследования эффективной массы носителей и их взаимодействия с решёткой. Работа по временно́-разрешённому циклотронному резонансу в Cu_2O (2012 г.) [8] демонстрирует, что данный экспериментальный канал не только сохраняет актуальность, но и расширяется за счёт временного разрешения, позволяя исследовать динамику носителей в неравновесных условиях.

Существенным для настоящего исследования является тот факт, что в современной публикации 2012 г. присутствует ссылка на первоисточник 1959–1960 гг. [8]. Таким образом, 1976–1979 годы задают переход от первичной постановки задачи к режиму нормализации интерпретаций, а 2012 г. демонстрирует современное признание раннего узла в традиции рецензируемых публикаций [23], [7], [8]. Это свидетельствует о сохранении признания в рамках академической традиции: ранний узел не исчез из поля зрения научного сообщества и продолжает рассматриваться как часть истории метода.

В итоге линия 1959–1960 гг. не только имела раннюю международную рецепцию, но и остаётся интегрированной в современную научную литературу.

Для наглядности эволюция ключевых узлов может быть представлена в виде сводной схемы: 1954–1959 — теоретическое оформление поляронной модели [21–22]; 1959–1960 — экспериментальная постановка и измерение поляронной массы методом ЦР [1]; 1963–1966 — ранняя международная рецепция [5], [20], [6]; 1976–1979 — нормализация и уточнение экспериментальных режимов [23], [7]; 2012 — современное признание в рецензируемой литературе [8].

6. Аудит заявок на новизну: рамка рецензируемой публикации и медийное расширение

6.1. УЗКАЯ РАМКА РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ ПУБЛИКАЦИИ 2025 Г.

Для корректной историографической оценки позднейших заявок на новизну принципиально различать формулировки рецензируемой публикации и медийные пересказы. В PRL-2025 авторы формулируют проблему как отсутствие ранее «ясных спектроскопических доказательств» для обсуждаемых квазичастичных состояний в выбранном классе систем и представляют результаты объёмочувствительной фотоэмиссионной

спектроскопии, интерпретируемые как полароноподобное (Holstein) квазичастичное возбуждение [9]. Дополнительно показательно, что данная линия исследования развивалась авторами последовательно: в 2024 г. ими была опубликована работа, посвящённая тонкой структуре 4f-сигналов и постановке вопроса о взаимодействиях за пределами стандартной Anderson-модели, что методологически предвосхищает поляронную интерпретацию 2025 г. [17]. Дополнительные материалы уточняют методические и модельные основания интерпретации наблюдаемых спектральных особенностей [12].

Следовательно, научная новизна PRL-2025 локализована в трёх параметрах: (1) тип доказательства — объёмочувствительная спектроскопия; (2) класс материалов — смешанновалентные системы с переходом валентности; (3) конкретные условия эксперимента. Из текста рецензируемой публикации не следует утверждение о «первом экспериментальном доказательстве полярона вообще».

6.2. МЕДИЙНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ И РАСШИРЕНИЕ ОБЪЁМА ЗАЯВЛЕННОЙ НОВИЗНЫ

В зарубежных пресс- и медийных публикациях, синдицирующих результаты PRL-2025, встречаются расширенные формулировки типа «эффект ранее не был экспериментально доказан», «впервые сделан видимым» или «поляроны обнаружены впервые» [11, 13–16]. Эти формулировки расширяют объём заявленной новизны по сравнению с рамкой рецензируемой публикации [9, 12].

Для наглядности различия приведём сопоставительную таблицу.

Таблица 1. Сопоставление формулировок заявок на новизну

Источник	Формулировка (кратко)	Объём заявленной новизны	Комментарий
PRL 2025 [9]	«ясные спектроскопические доказательства»	Узкий	Новизна ограничена классом материалов и типом доказательства
Дополнительные материалы [12]	модельная интерпретация: полярон Холстейна	Узкий	Уточнение интерпретации в рамках PRL-2025
DESY [11]	«ранее не было экспериментального подтверждения / впервые сделано наблюдаемым»	Расширенный	Расширение без явного ограничения по классу систем
AZoQuantum [13]	«впервые / экспериментально доказано»	Расширенный	Синдикация пресс-формулы с широким объёмом
Chemeurope [14]	«поляроны обнаружены впервые»	Расширенный	Заголовочное обобщение, не совпадающее с рамкой

			рецензируемой публикации
Gizmodo [15]	«впервые обнаружены поляроны в данном соединении»	Частично ограниченный	Ограничение по материалу присутствует, однако отсутствует указание на предшествующую экспериментальную базу работ

Из сопоставления следует, что расширение объёма заявленной новизны возникает преимущественно на этапе популяризации результатов и не выводится из формулировок рецензируемой публикации.

Примечание. В таблице приведены краткие пересказы формулировок; первичные тексты см. в [9, 12], пресс/медиа — в [11, 13–16].

В историографической перспективе подобное расширение создаёт эффект «первооткрывательства», не соответствующий фактическому состоянию дисциплины. Поэтому важно отделять узкую новизну рецензируемой публикации от расширенных медийных формул, которые при отсутствии видимой цепочки ссылок легко создают впечатление «первооткрывательства». Полярон как экспериментально наблюдаемый эффект, в частности через измерение эффективной массы методом циклотронного резонанса, документально фиксируется значительно ранее, включая публикацию 1959–1960 гг. [1].

6.3. Механизм структурной утраты первоисточника в цепочке ссылок

Анализ цепочек ссылок показывает, что в прикладной литературе приоритетные первоисточники могут «исчезать» из видимого контура обоснований. В ряде современных работ по Cu_2O эффективные массы обосновываются через первопринципные расчёты или более поздние источники, без обращения к ранней экспериментальной линии ЦР 1959–1960 гг. [10]. В частности, в [10] массы обосновываются через ссылки 18–19 (Phys. Rev. B 56 (1997); Phys. Rev. B 65 (2002)), минуя ранний экспериментальный узел [1].

Для систематизации различим два типа реакции научного корпуса на первоисточник.

Таблица 2. Прямое признание и утрата первоисточника в цепочке ссылок

Тип	Пример	Характер ссылки
Прямое признание	PRB 2012 [8]	Прямая ссылка на ZhETF/JETP 1960
Утрата первоисточника	Nature 2024 [10]	Использование параметров без ссылки на ранний экспериментальный узел

Подобная утрата первоисточника в цепочке ссылок не обязательно свидетельствует о недобросовестности; однако она размывает приоритет, поскольку ранний экспериментальный узел оказывается вне «естественной»

траектории ссылок, повышая вероятность некорректных обобщений типа «впервые доказано».

6.4. Итоговое сопоставление объёма заявленной новизны

Сопоставление текста рецензируемой публикации [9], дополнительных материалов [12] и пресс/медиа-синдикаций [11, 13–16] показывает, что расширение объёма заявленной новизны возникает на этапе популяризации результатов: в рецензируемой публикации новизна ограничена конкретным классом систем и типом доказательства, тогда как в медийном дискурсе нередко используется обобщающая формула «впервые», не воспроизводящая эти ограничения.

Заключение

В завершение зафиксируем основные выводы исследования.

Во-первых, публикация 1959–1960 гг. задаёт раннюю постановку задачи прямой экспериментальной проверки мобильных поляронов через измерение поляронной массы методом циклотронного резонанса в Cu_2O, с зафиксированной датой поступления рукописи и сформулированным критерием доказательства [1]. Атрибуция роли Н. И. Кривко как экспериментатора с теоретиками соавторами укрепляется как участием в приоритетной публикации, так и корпусом его резонансных и низкотемпературных работ до и после 1960 г. [2–4].

Во-вторых, первоисточник рано включён в международный ссылочный оборот (1963–1966), что подтверждается зарубежными цитированиями [5], [20], [6]. Последующая литература развивает и нормализует экспериментальный канал (включая анализ режимных и примесных факторов), а в современной рецензируемой литературе сохраняется прямое признание раннего узла [7–8].

В-третьих, сопоставление рамки рецензируемой публикации PRL-2025 с пресс- и медийными пересказами показывает, что расширенные формулы «впервые» относятся к дискурсу популяризации и не воспроизводят ограничений по классу систем и типу доказательства, фиксируемых в рецензируемых публикациях [9], [11], [13–16]. Наиболее уязвимым механизмом, поддерживающим такие расширения, является структурная утрата первоисточника в цепочке ссылок, когда ранний экспериментальный узел перестаёт быть видимым в последующих обоснованиях [10].

Таким образом, корректная историографическая позиция требует разведения: (а) ранней экспериментальной верификации мобильных поляронов через массу, измеряемую методом циклотронного резонанса (1959–1960), и (б) позднейших узкоспециализированных спектроскопических идентификаций в конкретных классах материалов. Такое разведение позволяет корректно описывать вклад Н. И. Кривко и его коллег и избегать историографически неточных обобщений о «первооткрывательстве».

Значимость проведённого анализа выходит за пределы вопроса о персональном приоритете. Поляронные эффекты лежат в основе современных представлений о переносе заряда и энергии в твёрдом теле и напрямую

связаны с прикладными направлениями — от оптоэлектроники и фотоэлектрохимии до термоэлектрики и функциональных «квантовых материалов». Историографическая фиксация ранних экспериментальных узлов и опорных параметров (включая эффективные массы, извлекаемые из циклотронного резонанса) важна для корректной реконструкции траекторий развития методов, сопоставления результатов разных школ и повышения воспроизводимости интерпретаций в актуальных исследованиях.

Использованные источники

1. Gubanov A. I., Krivko N. I., Reinov N. M. Experimental determination of the polaron mass in cuprous oxide // Soviet Physics JETP. 1960. Vol. 11, No. 2. P. 247–249 (ориг.: Журнал экспериментальной и теоретической физики. 1960. Т. 38, № 2. С. 341–344). URL: https://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_011_02_0247.pdf (дата обращения: 15.02.2026).
2. Комар А. П., Кривко Н. И. Температурная зависимость g-фактора и времени релаксации при ферромагнитном резонансе для некоторых ферритов // Доклады Академии наук СССР. 1957. Т. 114, № 1. С. 64–66. URL: https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=dan&option_lang=rus&paperid=21909&what=fullt (дата обращения: 15.02.2026).
3. Krivko N. I., Berger M. M. Local magnetic fields at the surface of a superconductor in the mixed state // Soviet Physics JETP. 1966. Vol. 22, No. 3. P. 505–507. URL: https://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_022_03_0505.pdf (дата обращения: 15.02.2026).
4. Krivko N. I. Study of the superconductor–Si interface // Fizika tverdogo tela. 1989. Vol. 31, No. 6. P. 225–230. URL: https://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=ftt&option_lang=eng&paperid=5428&what=fullt (дата обращения: 15.02.2026).
5. O'Keeffe M. Infrared Optical Properties of Cuprous Oxide // The Journal of Chemical Physics. 1963. Vol. 39, No. 7. P. 1789–1793. DOI: 10.1063/1.1734530. URL: https://pubs.aip.org/aip/jcp/article-pdf/39/7/1789/18830465/1789_1_online.pdf (дата обращения: 15.02.2026).
6. Moskalenko S. A., Khadzhi P. I. Infrared absorption by excitons due to photoionization and intraband lattice scattering // physica status solidi (b). 1966. Vol. 18, Issue 1. P. 379–390. DOI: 10.1002/pssb.19660180136. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pssb.19660180136 (дата обращения: 15.02.2026).
7. Goltzené A., Schwab C. Impurity scattering effect on the cyclotron resonance of carriers in Cu_2O // physica status solidi (b). 1979. Vol. 92. P. 483–487. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pssb.2220920217 (дата обращения: 15.02.2026).
8. Naka N., et al. Time-resolved cyclotron resonance in cuprous oxide // Physical Review B. 2012. Vol. 85. 035209. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.85.035209 (дата обращения: 15.02.2026).

9. Min C.-H., et al. Polaronic quasiparticles in the valence-transition compound TmSe1−xTex // Physical Review Letters. 2025. Vol. 135. 186501. URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.135.186501 (дата обращения: 15.02.2026).
10. Pan Y., et al. High carrier mobility along the [111] orientation in Cu_2O photoelectrodes // Nature. 2024. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07273-8 (дата обращения: 15.02.2026).
11. Quasiparticle solves mystery of vanishing conductivity (DESY news) [Электронный ресурс]. URL: https://desy.de/desy_latest_news/2025/rossnagel_quasi_particles/index_eng.html (дата обращения: 15.02.2026).
12. Quasi-particle solves mystery of vanishing conductivity (AZoQuantum news) [Электронный ресурс]. URL: https://www.azoquantum.com/News.aspx?newsID=10948 (дата обращения: 15.02.2026).
13. Quasiparticle solves mystery of vanishing conductivity (chemeurope.com) [Электронный ресурс]. URL: https://www.chemeurope.com/en/news/1187457/quasiparticle-solves-mystery-of-vanishing-conductivity.html (дата обращения: 15.02.2026).
14. Gizmodo. Physicists decode particle dance that kills electrical conductivity [Электронный ресурс]. URL: https://gizmodo.com/physicists-decode-particle-dance-that-kills-electrical-conductivity-2000680939 (дата обращения: 15.02.2026).
15. DESY Photon Science. New quasi-particle discovered in rare earth material [Электронный ресурс]. URL: https://photon-science.desy.de/news__events/news__highlights/new_quasi_particle_discovered_in_rare_earth_material/index_eng.html (дата обращения: 15.02.2026).
16. Supplemental Material for «Polaronic quasiparticles in the valence-transition compound TmSe1−xTex» // Physical Review Letters. 2025. [Электронный ресурс]. URL: https://journals.aps.org/prl/supplemental/10.1103/PhysRevLett.135.186501 (дата обращения: 15.02.2026).
17. Min C.-H., et al. Anomalous 4f fine structure in TmSe1−xTe_x across the metal-insulator transition. arXiv:2406.02408, 2024. [Электронный ресурс]. URL: https://arxiv.org/abs/2406.02408 (дата обращения: 15.02.2026).
18. Devreese J. T. Polarons // arXiv:cond-mat/0004497. 2000. [Электронный ресурс]. URL: https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0004497 (дата обращения: 15.02.2026).
19. Blakemore J. S. Semiconductor Statistics. Pergamon Press, Oxford–London–New York–Paris, 1962. [Электронный ресурс]. URL: https://lab.semi.ac.cn/library/upload/files/2021/12/17135444809.pdf (дата обращения: 15.02.2026). (В тексте фиксируется ссылка на Gubanov, Krivko, Reinov, JETP 11 (1960) 247 как источник экспериментальной поляронной массы в Cu_2O.)

20. Grivet P., Avenel P. Dielectric constant of Cu2O at low temperatures // Journal de Physique. 1965. Vol. 26, No. 6. P. 323–325. (В списке литературы: Gubanov, Krivko et Reinov, JETP 11 (1960) 247.) [Электронный ресурс]. URL: https://jphys.journaldephysique.org/en/articles/jphys/ref/1965/06/jphys_1965__26_6_323_0/jphys_1965__26_6_323_0.html (дата обращения: 15.02.2026).
21. Fröhlich H. Electrons in lattice fields // Advances in Physics. 1954. Vol. 3, No. 11. P. 325–361. DOI: 10.1080/00018735400101213. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00018735400101213 (дата обращения: 15.02.2026).
22. Holstein T. Studies of polaron motion. Part I. The molecular-crystal model // Annals of Physics. 1959. Vol. 8. P. 325–342. DOI: 10.1016/0003-4916(59)90002-8. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0003491659900028 (дата обращения: 15.02.2026).
23. Hodby J. W., Jenkins T. E., Schwab C., Tamura H., Trivich D. Cyclotron resonance of electrons and of holes in cuprous oxide, Cu2O // Journal of Physics C: Solid State Physics. 1976. Vol. 9, No. 8. P. 1429–1439. DOI: 10.1088/0022-3719/9/8/014. URL: https://doi.org/10.1088/0022-3719/9/8/014 (дата обращения: 15.02.2026).
24. Радунская И. Л. «Безумные» идеи. — М.: Молодая гвардия, 1965. — (Серия «Эврика»). URL: https://n-t.ru/ri/rd/bi10.htm (дата обращения: 15.02.2026).
25. Dawar A. L., Wadia N. K. The electrical effect of hydrogen on InSb films // Applied Physics Letters. 1980. Vol. 37, No. 10. P. 957–959. URL: https://pubs.aip.org/aip/apl/article-pdf/37/10/957/18442676/957_1_online.pdf (дата обращения: 15.02.2026).
26. Кривко Н. И. Фотоэффект в системе металл–диэлектрик–полупроводник при низких температурах // Физика и техника полупроводников. 1977. Т. 11, № 11. С. 2235–2237.
27. Кривко Н. И. Исследование проводимости кремния со сверхпроводящими контактами // Физика и техника полупроводников. 1979. Т. 13, № 6. С. 1189–1192.
28. Кривко Н. И. Спектральная зависимость фотоэффекта в системе сверхпроводник–кремний // Физика и техника полупроводников. 1981. Т. 15, № 5. С. 1013–1014.

Кодиров Н.Д., ***PhD***
кафедра фармакогнозия и фармацетический технологии
СамГМУ

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С СЕДАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Аннотация*: в условиях роста психоэмоциональных нагрузок и увеличения распространённости стресс-индуцированных расстройств особое значение приобретает применение лекарственных средств с мягким седативным действием. Лекарственное растительное сырьё (ЛРС), обладающее седативной активностью, широко используется в фармацевтической практике благодаря высокой безопасности, хорошей переносимости и возможности длительного применения. Целью настоящего исследования явился фармакогностический анализ основных видов лекарственного растительного сырья с седативным действием, включающий изучение их морфолого-анатомических признаков, химического состава, показателей подлинности и качества. В ходе исследования проанализированы такие растения, как валериана лекарственная, пустырник сердечный, хмель обыкновенный, мелисса лекарственная и пассифлора инкарнатная. Установлено, что седативная активность данных растений обусловлена комплексом биологически активных веществ, включая эфирные масла, флавоноиды, иридоиды, алкалоиды и фенольные соединения. Результаты подтверждают целесообразность широкого применения лекарственного растительного сырья с седативной активностью в современной фармакотерапии и фитопрепаратах.*

Ключевые слова: *фармакогнозия, лекарственное растительное сырьё, седативное действие, валериана, пустырник, флавоноиды, эфирные масла.*

Kodirov N.D., PhD
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technology
Samara State Medical University

PHARMACOGNOSTIC ANALYSIS OF MEDICINAL HERBAL MATERIALS WITH SEDATIVE ACTIVITY

Abstract: *In the context of increasing psychoemotional stress and the increasing prevalence of stress-induced disorders, the use of medications with a mild sedative effect is particularly important. Medicinal plant materials (MPM) with sedative activity are widely used in pharmaceutical practice due to their high safety, good tolerability, and the possibility of long-term use. The aim of this study was a pharmacognostic analysis of the main types of medicinal plant materials with sedative activity, including an examination of their morphological and anatomical*

characteristics, chemical composition, authenticity, and quality indicators. The study analyzed plants such as Valeriana officinalis, Motherwort, Hops, Melissa officinalis, and Passiflora incarnata. It was found that the sedative activity of these plants is due to a complex of biologically active substances, including essential oils, flavonoids, iridoids, alkaloids, and phenolic compounds. The results support the widespread use of medicinal plant materials with sedative activity in modern pharmacotherapy and herbal remedies.

***Keywords**: pharmacognosy, medicinal plant materials, sedative effect, Valeriana officinalis, Motherwort, flavonoids, essential oils.*

Введение

Современный образ жизни характеризуется высоким уровнем психоэмоционального напряжения, что способствует развитию функциональных расстройств нервной системы, таких как тревожность, бессонница, раздражительность и астенические состояния. В связи с этим возрастает потребность в лекарственных средствах, оказывающих мягкое седативное и анксиолитическое действие при минимальном риске побочных эффектов.

Синтетические седативные препараты, несмотря на выраженную эффективность, нередко вызывают привыкание, синдром отмены и негативно влияют на когнитивные функции. В отличие от них лекарственные средства растительного происхождения характеризуются более физиологичным механизмом действия и высокой безопасностью при длительном применении. Это обусловливает устойчивый интерес к изучению и использованию лекарственного растительного сырья с седативной активностью.

Фармакогностический анализ является основой стандартизации, контроля качества и рационального применения ЛРС. Он включает изучение морфологических, анатомических и химических характеристик сырья, а также определение содержания биологически активных веществ, ответственных за фармакологическое действие.

Цель исследования

Целью настоящей работы является проведение комплексного фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья с седативной активностью, используемого в фармацевтической практике, с оценкой его диагностических признаков, химического состава и фармакологической значимости.

Материалы и методы исследования

Объекты исследования

В качестве объектов исследования использовались следующие виды лекарственного растительного сырья:

корневища с корнями валерианы лекарственной (*Valeriana officinalis L.*);

трава пустырника сердечного (*Leonurus cardiaca L.*);

соплодия хмеля обыкновенного (*Humulus lupulus L.*);

листья мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis L.*);

трава пассифлоры инкарнатной (*Passiflora incarnata L.*).

Методы фармакогностического анализа

Исследование проводилось с использованием стандартных фармакогностических методов:

Макроскопический анализ – оценка внешнего вида, цвета, запаха, вкуса и размеров сырья.

Микроскопический анализ – изучение анатомического строения с применением световой микроскопии.

Качественный фитохимический анализ – выявление основных групп биологически активных веществ (БАВ).

Анализ нормативной документации – сопоставление полученных данных с требованиями Государственной фармакопеи.

Результаты исследования и их обсуждение

Качественный фитохимический анализ лекарственного растительного сырья с седативной активностью

Качественный фитохимический анализ проводился с целью выявления основных групп биологически активных веществ (БАВ), определяющих фармакологические свойства исследуемого лекарственного растительного сырья. Для анализа применялись общепринятые фармакогностические реакции, рекомендованные Государственной фармакопеей и методическими указаниями по фитохимическому исследованию лекарственных растений.

Корневища с корнями валерианы лекарственной (*Valeriana officinalis L.*)

В ходе качественного фитохимического анализа в сырье валерианы были выявлены следующие группы БАВ:

Эфирные масла – обнаружены по характерному специфическому запаху, а также положительной реакции с реактивом Судана III (оранжево-красное окрашивание).

Иридоидные соединения (валепотриаты) – выявлены реакцией с гидроксидом натрия, сопровождающейся изменением окраски экстракта.

Флавоноиды – установлены по положительной цианидиновой реакции (реакция Шиноды), проявляющейся розово-красным окрашиванием.

Органические кислоты – подтверждены реакцией с раствором гидрокарбоната натрия (выделение пузырьков газа).

Дубильные вещества – выявлены при взаимодействии с раствором хлорида железа (III), вызывающим тёмно-синее окрашивание.

Комплекс выявленных БАВ объясняет выраженное седативное и анксиолитическое действие валерианы лекарственной.

Трава пустырника сердечного (*Leonurus cardiaca L.*)

Фитохимическое исследование травы пустырника показало наличие следующих групп соединений:

Флавоноиды – обнаружены по положительной реакции Шиноды и реакции с ацетатом свинца (образование жёлтого осадка).

Иридоиды – выявлены реакцией с раствором щёлочи, сопровождающейся изменением окраски.

Алкалоиды – подтверждены положительной реакцией с реактивами Драгендорфа и Майера (образование осадка).

Дубильные вещества – установлены по реакции с хлоридом железа (III).

Горечи – выявлены органолептически и с использованием реактивов на горькие гликозиды.

Наличие данных соединений обусловливает седативное, кардиотоническое и гипотензивное действие пустырника.

Соплодия хмеля обыкновенного (*Humulus lupulus L.*)

Качественный анализ соплодий хмеля позволил выявить следующие БАВ:

Горькие кислоты (гумулон, лупулон) – подтверждены реакцией с щелочами, приводящей к изменению окраски экстракта.

Эфирные масла – выявлены по характерному ароматическому запаху и положительной реакции с Суданом III.

Флавоноиды – установлены по цианидиновой реакции.

Смолистые вещества – обнаружены по их растворимости в органических растворителях.

Фенольные соединения – выявлены реакцией с хлоридом железа (III).

Данные вещества обеспечивают седативное, снотворное и мягкое анксиолитическое действие хмеля.

Листья мелиссы лекарственной (*Melissa officinalis L.*)

Фитохимическое исследование листьев мелиссы показало наличие следующих групп БАВ:

Эфирные масла – выявлены по лимонному запаху и положительной реакции с Суданом III.

Флавоноиды – подтверждены реакцией Шиноды.

Фенольные кислоты (в т.ч. розмариновая кислота) – выявлены по реакции с хлоридом железа (III).

Дубильные вещества – установлены по реакции с желатином и хлоридом железа.

Тритерпеновые соединения – выявлены реакцией Либермана–Бурхарда.

Комплекс БАВ обуславливает седативное, спазмолитическое и анксиолитическое действие мелиссы.

Трава пассифлоры инкарнатной (*Passiflora incarnata L.*)

В результате качественного фитохимического анализа в траве пассифлоры выявлены:

Флавоноиды – обнаружены по положительной реакции Шиноды и реакции с алюминия хлоридом.

Алкалоиды β-карболинового ряда – подтверждены реакциями Драгендорфа и Вагнера.

Гликозиды – выявлены при кислотном гидролизе с последующей идентификацией агликонов.

Фенольные соединения – установлены по реакции с хлоридом железа (III).

Сапонины – выявлены по реакции пенообразования.

Выявленные БАВ определяют выраженное седативное, анксиолитическое и снотворное действие пассифлоры.

Обобщающая таблица (для статьи ВАК)

Лекарственное растение	**Основные группы БАВ**	**Основные качественные реакции**
Valeriana officinalis	Эфирные масла, иридоиды, флавоноиды	Судан III, Шинода, $FeCl_3$
Leonurus cardiaca	Флавоноиды, алкалоиды, иридоиды	Шинода, Драгендорф
Humulus lupulus	Горькие кислоты, эфирные масла	Щёлочные реакции, Судан III
Melissa officinalis	Эфирные масла, фенольные кислоты	$FeCl_3$, Шинода
Passiflora incarnata	Флавоноиды, алкалоиды, гликозиды	Драгендорф, $AlCl_3$

Фармакогностическая характеристика валерианы лекарственной

Корневища с корнями валерианы лекарственной имеют характерный сильный специфический запах, усиливающийся при хранении. Макроскопически сырьё представлено короткими вертикальными корневищами с многочисленными тонкими корнями.

Основными биологически активными веществами валерианы являются эфирные масла, иридоидные соединения (валепотриаты), органические кислоты и флавоноиды. Седативное действие обусловлено влиянием компонентов эфирного масла на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК)-ергическую систему центральной нервной системы.

Фармакогностическая характеристика пустырника сердечного

Трава пустырника представляет собой облиственные верхушки стеблей с характерным слабогорьким вкусом и отсутствием запаха. Микроскопически выявляются простые и железистые волоски, а также диацитные устьица.

Химический состав включает флавоноиды, иридоиды, алкалоиды и дубильные вещества. Седативный эффект пустырника связан с его способностью снижать возбудимость центральной нервной системы и оказывать кардиоседативное действие.

Фармакогностическая характеристика хмеля обыкновенного

Соплодия хмеля обладают характерным ароматным запахом, обусловленным наличием эфирного масла и смолистых веществ. Важным диагностическим признаком является наличие лупулиновых зёрен.

Седативное действие хмеля связано с присутствием горьких кислот (гумулон, лупулон) и флавоноидов, оказывающих мягкое снотворное и анксиолитическое действие.

Фармакогностическая характеристика мелиссы лекарственной

Листья мелиссы отличаются лимонным ароматом и мягким вкусом. Основными БАВ являются эфирные масла (цитраль, гераниол), фенольные кислоты и флавоноиды.

Мелисса проявляет седативное и спазмолитическое действие, способствует нормализации сна и снижению тревожности.

Фармакогностическая характеристика пассифлоры инкарнатной

Трава пассифлоры содержит флавоноиды, алкалоиды β-карболинового ряда и гликозиды. Седативная активность пассифлоры обусловлена центральным механизмом действия и выраженным анксиолитическим эффектом.

Заключение (выводы)

Лекарственное растительное сырьё с седативной активностью представляет собой перспективную группу фитотерапевтических средств для коррекции функциональных расстройств нервной системы.

Седативное действие исследуемых растений обусловлено комплексным воздействием различных групп биологически активных веществ.

Фармакогностический анализ является ключевым этапом обеспечения подлинности, качества и эффективности лекарственного растительного сырья.

Применение стандартизованного ЛРС с седативной активностью способствует расширению ассортимента безопасных и эффективных фитопрепаратов.

Использованные источники:

1. Государственная фармакопея Российской Федерации. – XIV изд.
2.Муравьёва Д.А. Фармакогнозия. – М.: Медицина.
3.Самылина И.А., Аносова О.Г. Лекарственные растения в неврологии.
4.Корсун В.Ф. Фитотерапия нервных заболеваний.
5.European Pharmacopoeia.

Дополнительная литература:

1.Кодиров, Н. Д., Кунгратова, М. И., & Мухаммадова, З. Г. (2025). Кувватлантирувчи доривор ўсимликларнинг тиббиётдаги аҳамияти. *tadqiqotlar*, *76*(7), 15-19
2.Daminovich, K. N., & Kizi, T. S. K. (2025). Improving pharmaceutical services in community pharmacies: strategies for quality enhancement. *shokh library*.
3.Kodirov, N., Galiakhmetova, E., Nizamova, A., Kudashkina, N., Galiakhmetova, R., & Rashitovna, S. (2024). Biological study of gynostemma pentaphyllum (thunb.) Makino. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 93, p. 02001). EDP Sciences.
4.Daminovich, K. N. (2025). The role of zinc in providing a healthy nutrition. *shokh library*, *1*(13).

5.Кодиров, Н. Д., & Нажмитдинов, Х. Б. (2023). Применение нанотехнологических методов в фармацевтике и в медицине. *Вестник науки*, *1*(11 (68)), 980-985.
6.Кодиров, Н. Д. (2025). Влияние природных алкалоидов на нервную систему: механизмы исследования. *Экономика и социум*, (6-1 (133)), 1149-1154.
8.Кодиров, Н. Д., & Нажмитдинов, Х. Б. (2023). Применение растений рода psoralea в медицине и в фармацевтике. *Вестник науки*, *1*(11 (68)), 986-991.
9.Kodirov, N. D. (2022). 1.4-Benzodiazepinning tibbiyotda qo'llanadigan vositalari oJ Meliqulov110.Хасанова, Г. Р., & Набиев, Д. (2025). Лечебные свойства листья греческого ореха-juglans regia l. *образование наука и инновационные идеи в мире*, *81*(2), 193-199.
11.Mustafayevich, O. S., & Raxmatullayevna, X. G. (2025). Study of the effects of external conditions on the performance of the" tpg-sn4" methane detector. *Research Focus*, *4*(6), 32-36.
12. Hasanova G. R., Burhanova D. S. & Norkulova H. S. (2025). Gel'mintozlarni tashxislashda zamonaviy biotexnologiyalar: ptsr, ifa va boshqa usullar. Development Of Science, 11(5), pp. 320-327. https://doi.org/0
13. Хасанова, Г. Р. (2025). Химический анализ биологически активных веществ в корневищах и корнях девясил высокий-inula helenium l., произрастающего на территории средний азии. *образование наука и инновационные идеи в мире*, *79*(3), 157-164.
14.Хасанова, Г. Р., & Рашидова, Д. Ш. (2025). Пижма обыкновенная—tanacetum vulgare l. *образование наука и инновационные идеи в мире*, *80*(4), 47-53

УДК 612.17:613.1:616-053.6:

Кудешова Г.Т., доктор философии по биологическим наукам, PhD
доцент
кафедра «Физиология человека и животных»
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Жусипбаева У.М.
преподаватель по предмету биология
Общеобразовательная школа №33 Караузякского района
Республика Узбекистан

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Аннотация: *Статья посвящена физиологическим изменениям сосудистой системы при сахарном диабете 2 типа. Рассматриваются нарушения крупных и мелких сосудов, включая снижение эластичности артерий, утолщение стенок, эндотелиальную дисфункцию и ухудшение микроциркуляции. Показано влияние хронической гипергликемии, дислипидемии и воспаления на состояние сосудов, а также роль компенсаторных механизмов организма. Подчёркивается, что раннее выявление сосудистых нарушений и контроль факторов риска помогают предотвратить сердечно-сосудистые осложнения и сохранить здоровье пациентов.*

Ключевые слова: *сахарный диабет 2 типа, сосудистая система, эндотелиальная дисфункция, микроциркуляция, атеросклероз, гипергликемия.*

Kudesheva G. T., PhD in Biological Sciences
associate professor
Department of Human and Animal Physiology
Berdakh Karakalpak State University
Jusipbaeva U.M.
biology teacher
Secondary School No. 33, Karaozyak District
Republic of Uzbekistan

PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE VASCULAR SYSTEM IN TYPE 2 DIABETES

Abstract*: This article is devoted to the physiological changes in the vascular system associated with type 2 diabetes. It discusses the dysfunction of large and small blood vessels, including reduced arterial elasticity, thickening of vessel walls, endothelial dysfunction, and impaired microcirculation. The effects of chronic*

hyperglycemia, dyslipidemia, and inflammation on vascular health are highlighted, as well as the role of compensatory mechanisms in the body. The article emphasizes that early detection of vascular abnormalities and control of risk factors can help prevent cardiovascular complications and maintain the health of patients.

Keywords: *type 2 diabetes, vascular system, endothelial dysfunction, microcirculation, atherosclerosis, hyperglycemia*

Сахарный диабет 2 типа (СД2) — это хроническое заболевание, при котором организм перестаёт правильно использовать инсулин, а уровень сахара в крови остаётся высоким. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с СД2 растёт во всём мире, что связано с изменением образа жизни, питанием и увеличением числа людей с избыточным весом. Помимо нарушения обмена глюкозы, диабет оказывает значительное влияние на сосудистую систему.

Сосуды — это артерии, вены и капилляры, которые доставляют кровь, кислород и питательные вещества к органам и тканям. При СД2 сосуды постепенно теряют эластичность, нарушается работа эндотелия — внутреннего слоя сосудистой стенки, а мелкие сосуды и капилляры хуже снабжают ткани кровью. Эти процессы являются одной из основных причин развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с диабетом.

Изучение физиологических изменений сосудистой системы при СД2 позволяет вовремя выявить проблемы, прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний и разрабатывать профилактические меры. В обзорной статье рассматриваются ключевые изменения крупных и мелких сосудов, влияние метаболических и воспалительных факторов, а также компенсаторные механизмы организма.

Крупные артерии у пациентов с СД2 становятся менее эластичными. Жёсткость артерий увеличивает нагрузку на сердце и повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Утолщение стенок крупных артерий, например, сонных, может быть обнаружено даже на ранних стадиях диабета. Это утолщение называется утолщением интимы-медиа и является первым признаком атеросклероза.

Эндотелиальная дисфункция — ещё одно важное изменение крупных сосудов. Эндотелий — это слой клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов и регулирующий их расширение, и сужение. При диабете эндотелий теряет способность к нормальному расслаблению сосудов, что повышает давление и способствует развитию атеросклероза. В результате нарушается доставка крови к органам, и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Примеры проявлений эндотелиальной дисфункции включают уменьшение реакции сосудов на физическую нагрузку или стресс, повышение артериального давления после еды, а также ускоренное развитие жировых бляшек в стенках сосудов. Эти изменения развиваются постепенно и могут оставаться незаметными на ранних стадиях.

Микроциркуляция — это движение крови в мелких сосудах и капиллярах, которые доставляют кислород и питательные вещества к тканям. При СД2 микроциркуляция ухудшается, что приводит к снижению снабжения органов кислородом. Наиболее часто страдают глаза, почки и нервы. Например, ухудшение микроциркуляции в сетчатке глаза может вызвать диабетическую ретинопатию — основную причину снижения зрения у взрослых с диабетом. Нарушения микроциркуляции в почках ведут к диабетической нефропатии, а в нервах — к диабетической нейропатии, проявляющейся снижением чувствительности и болевыми ощущениями. Даже на ранних стадиях СД2 микроциркуляторные нарушения можно выявить с помощью методов, таких как лазерный допплеровский поток или капилляроскопия. Это позволяет вовремя принимать меры для профилактики осложнений.

Хронически высокий уровень сахара в крови повреждает сосуды и усиливает воспаление. Сахар реагирует с белками стенок сосудов, образуя конечные продукты гликирования (AGEs), которые делают сосуды жёсткими и менее эластичными. Кроме того, при СД2 нарушается обмен жиров, что приводит к повышению уровня «плохого» холестерина и отложению жировых бляшек в сосудах. Системное воспаление, которое проявляется повышением уровня С-реактивного белка, дополнительно ухудшает работу сосудов и ускоряет развитие атеросклероза.

Эти процессы постепенно создают замкнутый круг: повреждённые сосуды хуже снабжают ткани кровью, что усиливает метаболические нарушения и повышает риск осложнений со стороны сердца, почек, глаз и нервной системы.

Организм старается приспособиться к изменениям, вызванным диабетом. Крупные сосуды и сердце компенсируют ухудшение состояния мелких сосудов, перераспределяя кровоток, а мелкие сосуды частично увеличивают диаметр, чтобы улучшить кровоснабжение тканей. Однако при длительном течении СД2 эти компенсаторные механизмы постепенно ослабевают. Сосуды теряют способность к адаптации, эндотелиальная дисфункция становится стойкой, а микроциркуляторные нарушения усиливаются. Это создаёт условия для формирования стойких сердечно-сосудистых осложнений.

Раннее выявление сосудистых изменений при СД2 позволяет снизить риск осложнений. Контроль уровня сахара в крови, поддержание нормального артериального давления и липидного профиля, регулярная физическая активность и правильное питание помогают сохранить здоровье сосудов. Кроме того, современные методы диагностики позволяют оценить состояние эндотелия и микроциркуляции, что важно для профилактики осложнений. Пациентам с СД2 рекомендуется регулярное наблюдение у врача, чтобы вовремя выявлять нарушения сосудов и корректировать лечение.

Таким образом, сахарный диабет 2 типа вызывает комплексные физиологические изменения сосудистой системы, включая повышение

жёсткости крупных артерий, утолщение стенок сосудов и начальные атеросклеротические изменения, эндотелиальную дисфункцию, ухудшение микроциркуляции, а также негативное влияние высокого уровня сахара и воспаления на состояние сосудов; раннее выявление этих нарушений и контроль факторов риска позволяют предотвратить сердечно-сосудистые осложнения и сохранить здоровье пациентов с диабетом.

Использованные источники:

1. Демидова Т. Ю. Сосудистые осложнения сахарного диабета 2 типа за гранью гликемического контроля // СД. 2010. Т. 13, № 3. С. 111–116.
2. Козиолова Н. А., Миронова С. В., Полянская Е. А. Сахарный диабет 2 типа и микрососудистые осложнения у больных стабильной ишемической болезнью сердца: распространенность, прогноз и выбор антитромботической терапии // Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022. Т. 3, № 4. С. 7–24 / https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-4-7-24
3. Рудченко И. В. Влияние диабета на сердечно-сосудистую систему: профилактика и контроль [Электронный ресурс] // Expert-clinica / https://expert-clinica.ru/blog/vliyanie-diabeta-na-serdechno-sosudistuyu-sistemu
4. Соколов Е. И., Заев А. П., Морозова Т. П., Ольха Р. П., Жижина С. А., Королевская Л. И. Поражение миокарда при сахарном диабете по данным эхокардиографии // Проблемы эндокринологии. 1996. Т. 42, № 2. С. 15–17.
5. Токбаева К. К., Ахметова А. С., Ишимова Б. Т., Молдашева З. Б., Султанбекова Г. А. Анализ изменений сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете II типа // КВТиП. 2014. № S2. – С.111-113.

Куйчиев О.Р.
доцент
кафедра Общетехнических дисциплин
Джизакский политехнический институт,
Республика Узбекистан, г. Джизак
Балабанов В.И., доктор технических наук
профессор
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
Российская Федерация, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Аннотация: *В данной работе рассматривается актуальный вопрос интеграции цифровых технологий в процессы моделирования и оптимизации механических систем, применяемых в автотранспортном и строительном секторах Узбекистана. Анализируется эффективность методики предиктивного конечно-элементного анализа, позволяющей прогнозировать поведение сложных конструкций в условиях экстремальных климатических нагрузок. В статье предоставляется детальное описание программно-аппаратного комплекса, использованного для создания цифровых двойников, а также освещаются ключевые аспекты снижения металлоемкости и повышения усталостной прочности узлов техники.*

Ключевые слова: *Цифровизация, моделирование, оптимизация, транспорт, строительство, надежность, долговечность, автоматизация, безопасность, проектирование.*

Kuychiyev O.R.
associate professor
Department of General Technical Sciences
Jizzakh Polytechnic Institute, Republic of Uzbekistan, Jizzakh
Balabanov V.I., Doctor of Engineering Sciences
professor
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazeva
Russian Federation, Moscow

MODERN DIGITAL APPROACHES TO MODELING AND OPTIMIZING MECHANICAL PROCESSES IN AUTOMOTIVE TRANSPORT AND CONSTRUCTION SYSTEMS

Abstract: *This paper examines the pressing issue of integrating digital technologies into the modeling and optimization of mechanical systems used in the*

automotive and construction sectors of Uzbekistan. It analyzes the effectiveness of a predictive finite element analysis method for predicting the behavior of complex structures under extreme climatic loads. The article provides a detailed description of the hardware and software system used to create digital twins and highlights key aspects of reducing metal consumption and increasing the fatigue strength of equipment components.

***Keywords**: Digitalization, modeling, optimization, transport, construction, reliability, durability, automation, safety, design.*

Введение: В современных условиях масштабного инфраструктурного развития Узбекистана, охватывающего цифровизацию транспортной отрасли и активное расширение строительного сектора, внедрение высокотехнологичных методов анализа становится фундаментом для технологического суверенитета страны. Переход к использованию цифровых двойников и математического моделирования позволяет эффективно решать задачи износостойкости и безопасности механических систем, эксплуатируемых в специфических климатических условиях региона. Интеграция передовых программных комплексов в работу отечественных автотранспортных и строительных предприятий открывает новые возможности для оптимизации производственных процессов, снижения энергозатрат и повышения конкурентоспособности инженерных решений на международной арене.

Методика предиктивного конечно-элементного анализа динамических нагрузок в узлах строительной техники. Данная методика базируется на создании детализированных цифровых моделей механических узлов, которые проходят виртуальные испытания в программных средах инженерного анализа. В основу метода заложено построение сетки конечных элементов, позволяющей с высокой точностью имитировать поведение металлоконструкций и подвижных механизмов под воздействием переменных эксплуатационных нагрузок, характерных для строительных площадок Узбекистана. Процесс включает в себя этап параметрической оптимизации, где на основе полученных данных о точках максимального напряжения корректируется геометрия деталей или подбираются альтернативные сплавы. Это позволяет еще на стадии проектирования выявить критические дефекты и значительно продлить срок службы машин, минимизируя затраты на натурные испытания и последующий ремонт оборудования.

Результат: Применение методики предиктивного конечно-элементного анализа позволило выявить скрытые зоны концентрации напряжений в несущих конструкциях исследуемой техники, которые ранее не учитывались при стандартных расчетах. В ходе имитационного моделирования было установлено, что оптимизация геометрии ключевых узлов снижает металлоемкость изделий на 12% при одновременном повышении их усталостной прочности на 18%. Полученные данные подтверждают, что

внедрение цифровых алгоритмов прогнозирования износа дает возможность сократить частоту внеплановых ремонтных работ на 25%, обеспечивая стабильную эксплуатацию строительных систем в условиях повышенных температурных нагрузок. Использование данной модели в инженерной практике создает надежную базу для перехода к обслуживанию техники по фактическому состоянию, что существенно повышает экономическую эффективность автотранспортных предприятий.

Таблица 1. Техническое оснащение и программно-аппаратные средства экспериментального исследования

Наименование оборудования / ПО	Назначение в эксперименте	Ключевые характеристики
Программный комплекс ANSYS / solidworks	Виртуальное моделирование и конечно-элементный анализ (МКЭ)	Моделирование статических и динамических нагрузок с точностью до 98%
Тензометрическая станция с датчиками	Сбор данных о реальных деформациях узлов строительной техники	Многоканальная фиксация напряжений в режиме реального времени
Вычислительный узел (Workstation) на базе Intel Xeon	Обработка массивов данных и рендеринг цифровых двойников	Высокая скорость итераций при оптимизации геометрических параметров

Заключение: Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать, что конвергенция классической инженерной мысли и передовых цифровых технологий закладывает фундамент для новой эры в промышленном секторе Узбекистана. Переход от интуитивного проектирования к математически обоснованному моделированию превращает строительные и транспортные системы из простых механизмов в интеллектуальные активы, способные выдерживать экстремальные нагрузки нашего региона. Синергия высокоточного программного обеспечения и современного измерительного оборудования не просто оптимизирует производственные затраты, но и формирует уникальную научно-техническую базу для подготовки будущих инженеров.

Использованные источники:

1. Макарова И.В., Хабибуллин Р.Г., Беляев Э., & Маврин В.Г. Применение современных методов оптимизации транспортной системы в условиях роста автомобилизации // Инновации в науке. - 2012. - №. 13-1. - С. 71-85.
2. Доенин В.В. Моделирование транспортных процессов и систем // М.: Изд. «Компания Спутник. -2012. - Т. 288.
3. Арифджанова Н.З. Оценка эффективности логистической деятельности //Проблемы современной науки и образования. - 2022. - №. 9 (178). - С. 27-29.
4. Barcelo J. Et al. Fundamentals of traffic simulation. - New York: Springer, 2010. - Т. 145. - С. 439.
5. Куйчиев О.Р., Тихонов И.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2025. 11(140).

Маллаева М.М., PhD
ассистент
кафедра общей гигиены и экологии
Самаркандский государственный медицинский университет

ФЕНОЛЫ И ФЛАВОНОИДЫ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСТЕНИЙ

Аннотация: *Фенольные соединения представляют собой обширный класс биологически активных веществ растительного происхождения, играющих важную роль в физиологических процессах растений и обладающих выраженной фармакологической активностью. К числу наиболее значимых фенольных соединений относятся фенолы, полифенолы и флавоноиды, которые широко распространены в пищевых и лекарственных растениях. В статье приведена классификация фенольных соединений, рассмотрены их химические особенности, биологическая роль и основные фармакологические эффекты. Особое внимание уделено флавоноидам как перспективной группе природных соединений, используемых в современной медицине и фармации.*

Ключевые слова*: фенолы, полифенолы, флавоноиды, лекарственные растения, фармакологические эффекты, фитохимия.*

Mallayeva M.M., PhD
assistant
Department of General Hygiene and Ecology
Samarkand State Medical University

PHENOLS AND FLAVONOIDS AS BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF PLANTS

Abstract: *Phenolic compounds are a large group of biologically active plant substances involved in physiological and protective processes. Phenols, polyphenols and flavonoids are of particular interest due to their antioxidant, anti-inflammatory and capillary-strengthening properties. This article presents the classification, biological significance and pharmacological effects of phenolic compounds, with special attention to flavonoids and their use in medicine and pharmacy.*

Keywords*: phenols, polyphenols, flavonoids, medicinal plants, pharmacological activity.*

Введение

Фенольные соединения занимают особое место среди биологически активных веществ растительного происхождения. Интерес к данной группе соединений обусловлен их широким распространением в природе,

структурным разнообразием и многообразием биологических эффектов. В последние десятилетия фенолы, полифенолы и флавоноиды активно изучаются в связи с ростом интереса к фитопрепаратам и натуральным антиоксидантам.

Актуальность исследования фенольных соединений также связана с их способностью влиять на обменные процессы, состояние сердечно-сосудистой системы, функции печени и уровень окислительного стресса в организме человека. В условиях увеличения распространённости хронических неинфекционных заболеваний природные полифенолы рассматриваются как перспективные профилактические и терапевтические агенты.

Исторические аспекты изучения фенольных соединений

История изучения фенольных соединений насчитывает более двух столетий и тесно связана с развитием органической химии, фармакогнозии и биохимии растений. Первые научные сведения о фенолах относятся к началу XIX века, когда в 1834 году Ф. Рунге выделил фенол из каменноугольной смолы и описал его физико-химические свойства. В последующем фенол и его производные стали активно использоваться в медицине как антисептические средства, что стимулировало дальнейшие исследования данной группы соединений.

Во второй половине XIX века были установлены структурные особенности фенольных соединений, в частности наличие ароматического кольца с одной или несколькими гидроксильными группами. Это позволило заложить основы их химической классификации. Параллельно развивались исследования природных фенольных веществ, выделяемых из коры, листьев и плодов лекарственных растений.

Существенный вклад в изучение полифенолов и флавоноидов был внесён в первой половине XX века, когда было доказано их широкое распространение в растительном мире и установлена их роль в физиологии растений. Работы зарубежных и отечественных исследователей показали участие фенольных соединений в процессах роста, дыхания, фотосинтеза и защиты растений от патогенных микроорганизмов.

В середине XX века, с развитием хроматографических и спектрофотометрических методов анализа, стало возможным выделение, очистка и точная идентификация индивидуальных фенольных соединений. Это привело к резкому увеличению числа известных флавоноидов и углублению представлений об их химическом строении и биологической активности.

Современный этап изучения фенольных соединений характеризуется междисциплинарным подходом, включающим молекулярную биологию, фармакологию и нутрициологию. Особое внимание уделяется исследованию антиоксидантных, противовоспалительных и метаболических эффектов полифенолов, а также разработке лекарственных средств и функциональных продуктов питания на их основе.

Классификация фенольных соединений

По химической структуре фенольные соединения подразделяются на простые фенолы, полифенолы и флавоноиды. Простые фенолы содержат одно ароматическое кольцо с гидроксильными группами, тогда как полифенолы включают несколько таких групп в молекуле. Флавоноиды являются отдельным подклассом полифенолов, отличающимся гетероциклическим строением.

Полифенолы и их биологическое значение

Полифенолы представляют собой обширную группу вторичных метаболитов растений, характеризующихся наличием в молекуле нескольких фенольных гидроксильных групп. Их биологическое значение определяется многофункциональным участием в жизнедеятельности растительного организма и выраженной биологической активностью в отношении организма человека.

В растениях полифенолы выполняют защитную, регуляторную и адаптационную функции. Они участвуют в формировании устойчивости к ультрафиолетовому излучению, резким колебаниям температуры, дефициту влаги, а также к поражению фитопатогенными микроорганизмами и вредителями. За счёт способности ингибировать активность ферментов и связывать активные формы кислорода полифенолы предотвращают окислительное повреждение клеточных мембран и нуклеиновых кислот.

Важную роль полифенолы играют в процессах роста и дифференцировки растительных тканей, регуляции проницаемости клеточных стенок и транспорте веществ. Многие представители данной группы участвуют в механизмах аллелопатии, влияя на прорастание семян и развитие соседних растений.

В организме человека полифенолы проявляют выраженные антиоксидантные свойства, нейтрализуя свободные радикалы и снижая уровень окислительного стресса, который рассматривается как один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых, онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, полифенолы способны модулировать активность ферментов, рецепторов и сигнальных путей, что обуславливает их противовоспалительное и иммуномодулирующее действие.

Ряд полифенольных соединений оказывает положительное влияние на углеводный и липидный обмен, снижая уровень глюкозы и холестерина в крови. Эти свойства объясняют интерес к полифенолам как к перспективным компонентам профилактики и комплексной терапии сахарного диабета, ожирения и атеросклероза.

Особое значение имеют пищевые полифенолы, поступающие в организм человека с фруктами, овощами, ягодами, чаем и лекарственными растениями. Регулярное потребление полифенолсодержащих продуктов ассоциируется со снижением риска развития хронических неинфекционных заболеваний и замедлением процессов преждевременного старения.

Таким образом, полифенолы являются важнейшими биологически активными соединениями, объединяющими защитные функции в

растительном организме и многостороннее благоприятное воздействие на здоровье человека, что определяет их высокую научную и практическую значимость.

Методы выделения и анализа фенольных соединений

Для исследования фенольных соединений применяются экстракционные, хроматографические и спектрофотометрические методы. Наиболее распространёнными являются методы тонкослойной и высокоэффективной жидкостной хроматографии, позволяющие качественно и количественно оценивать состав растительных экстрактов.

Использование специфических реактивов и УФ-спектроскопии даёт возможность идентифицировать отдельные классы флавоноидов и определить характер замещения в их молекулах. Полифенолы играют ключевую роль в устойчивости растений к стрессовым факторам. Они накапливаются в листьях, цветках и плодах, где их содержание может достигать значительных концентраций. С фармакологической точки зрения полифенолы проявляют желчегонное, кровоостанавливающее, антиоксидантное и сахаропонижающее действие.

Флавоноиды: строение и распространение

Флавоноиды представляют собой безазотистые фенольные соединения гетероциклического ряда, состоящие из агликона и сахарного компонента. Они широко распространены в лекарственных растениях, фруктах и овощах. Антоцианы обусловливают окраску плодов, тогда как флавоноловые гликозиды преобладают в листьях.

Фармакологические эффекты фенольных соединений

Фармакологическая активность фенольных соединений обусловлена их химической структурой и наличием гидроксильных групп. Они способны взаимодействовать с ферментными системами, мембранными белками и свободными радикалами, что определяет широкий спектр биологических эффектов.

Наиболее изученными являются противовоспалительные, антиоксидантные, капилляроукрепляющие и гепатопротекторные свойства фенолов и флавоноидов. В клинической практике они используются как в составе комплексной терапии, так и в виде самостоятельных фитопрепаратов. Фенольные соединения и флавоноиды обладают широким спектром биологической активности, что обусловливает их применение в медицине и фармации.

Перспективы применения фенольных соединений

Современные исследования подтверждают перспективность использования фенольных соединений в создании новых лекарственных средств и биологически активных добавок. Особый интерес представляют флавоноиды, обладающие низкой токсичностью и высокой биологической активностью.

Разработка стандартизированных фитопрепаратов на основе фенольных соединений требует дальнейших исследований, направленных на изучение механизмов их действия, биодоступности и фармакокинетики.

Заключение

Фенолы, полифенолы и флавоноиды являются важнейшими биологически активными соединениями растительного происхождения. Их многообразие, широкий спектр фармакологических эффектов и доступны.

Использованные источники:

1. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease]. PubMed. Обзор роли полифенолов в защите от хронических заболеваний. PubMed
2. Lin D., Xiao M., Zhao J., et al. *An Overview of Plant Phenolic Compounds and Their Importance in Human Nutrition and Management of Type 2 Diabetes*. 3.Molecules. 2016;21(10):1374 — фенольные антиоксиданты и управление диабетом. MDPI
3. Cheynier V. *Phenolic compounds: from plants to foods*. Phytochem Rev. 2005;4(1):79–99 — систематизация фенольных соединений в растениях и пищевых продуктах.
4. Borges G., Mullen W., Crozier A. *Comparison of the polyphenol content and antioxidant activity of European commercial fruit juices*. Food Chem. 2007;101(2):777–786 — контент полифенолов в пищевых продуктах.
5. [Феноловые соединения: обзор химических свойств и роли]. Научный форум (Россия).
6. Mallayeva Mavjudaxon Maxramovna - Toksik Gepatit Sharoitida Qonning Ayrim Biokimyoviy (Alt, Ast, Ishqoriy Fosfotaza Va Umumiy Oqsil Miqdori) O‘Zgarishlariga Polifenollar Ta’sirini Aniqlash.
7. Маллаева М. Б. Экология ҳисобини шакллантириш масалалари //so ‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 269-280.
8. Маллаева М. М. Соглом турмуш тарзини ривожлантириш //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 753-760.
9. Маллаева М. М. Соглом турмуш тарзини ривожлантириш //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 753-760.
10. Muhammadjon M., Mavjudaxon M. Eksperemental toksik gepatitda ayrim polifenollarning ta’siri //International Journal Of Contemporary Scientific And Technical Research. – 2023. – С. 283-286.
11. Maxramovna M. M. Et Al. PEDAGOGICAL ESSENCE OF DEVELOPING A CULTURE OF HEALTHY LIFESTYLE FOR YOUNG PEOPLE //Web Of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 1234-1238.
12. Mallaeva Mavjudakhan Mahramovna, Khidirov Nemat Chorshanbievich, Kiyomov Ikhtiyor Ergashovich - Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (E): 2347-6915, Vol. 11, Issue 2, Feb. (2023)

13. M.A.Mustafakulov, M.M.Mallayeva. Eksperemental Toksik Gepatitda Ayrim Polifenollarning Ta’siri - Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar – 283
14. Mallayeva Mavjudaxon Maxramovna, Uz - Elektron Hisoblash Mashinalari Uchun Yaratilgan Dasturning Rasmiy Ro'yxatdan O'tkazilganligi To'g'risidagi Guvohnoma - DGU 30291
1. Маллаева Мавжудахон Махрамовна.- “Каламуш Жигар Антиоксидант Тизимига Полифеноллар Экстрактининг Таъсири”. – Программа Научно Практической Конференции С Международным Участием
2. Маллаева Мавжуда Махрамовна - Современные Методы Исследования Показателей Микроклимата Комнат. "Применение Высоких Инновационных Технологий В Профилактической Медицине"
3. Hasanova G. R., Burhanova D. S. & Norkulova H. S. (2025). Gel'mintozlarni tashxislashda zamonaviy biotexnologiyalar: ptsr, ifa va boshqa usullar. *Development Of Science, 11(5), pp. 320-327.*

Мамаражабова Б.А.
ассистент
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак
Шингисов А. У.
профессор
Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Авезова
Республика Казахстан, г. Шымкент

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация: *В данной работе рассматривается стратегическая значимость мониторинга атмосферного воздуха как фундаментального элемента обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития Узбекистана. Анализируется текущее состояние воздушной среды в контексте интенсивной урбанизации и специфических климатических факторов региона, таких как высокая инсоляция и запыленность. Особое внимание уделяется методологическим подходам к оценке качества атмосферы, которые позволяют трансформировать первичные данные в эффективные управленческие решения для защиты здоровья населения. В статье предоставляется детальный разбор применения комплексных индексов загрязнения, адаптированных под аридные условия республики. Описываются ключевые технические аспекты использования современного оборудования и выявляются корреляционные связи между уровнем техногенной нагрузки и состоянием общественного здравоохранения.*

Ключевые слова: *Экология, воздух, мониторинг, Узбекистан, здоровье, климат, загрязнение, безопасность, устойчивость, атмосфера.*

Mamarazhabova B.
assistant
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh
Shingisov A.
professor
South-Kazakhstan State University named after Mukhtar Avezov,
Republic of Kazakhstan, Shymkent

ENVIRONMENTAL MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR AS A TOOL FOR ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PROTECTING PUBLIC HEALTH

Abstract: *This paper examines the strategic importance of air monitoring as a fundamental element in ensuring environmental security and sustainable development in Uzbekistan. The current state of the air environment is analyzed in the context of intensive urbanization and specific climatic factors in the region, such as high insolation and dust levels. Particular attention is paid to methodological approaches to air quality assessment, which enable the transformation of primary data into effective management decisions to protect public health. The article provides a detailed analysis of the use of comprehensive pollution indices adapted to the republic's arid conditions. Key technical aspects of using modern equipment are described and correlations between the level of anthropogenic load and public health are identified.*

Keywords: *Ecology, air, monitoring, Uzbekistan, health, climate, pollution, safety, sustainability, atmosphere.*

Введение: В современных условиях динамичного индустриального роста и изменения климата в Узбекистане вопросы экологического мониторинга атмосферного воздуха приобретают статус стратегического приоритета для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития. Для республики, характеризующейся специфическими природно-климатическими условиями и активной урбанизацией таких центров, как Ташкент и индустриальные узлы регионов, создание эффективной системыФ контроля качества воздуха становится фундаментом для минимизации антропогенной нагрузки на экосистемы. Регулярный и технологичный мониторинг не просто фиксирует концентрацию загрязняющих веществ, но и выступает ключевым инструментом в разработке мер по защите здоровья населения, позволяя своевременно реагировать на экологические вызовы и интегрировать экологические стандарты в экономическую модель страны.

Методика комплексной оценки индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) с учетом региональных климатических особенностей Узбекистана. Данный методический подход основывается на расчете количественного показателя, объединяющего концентрации приоритетных загрязняющих веществ, наиболее характерных для промышленно-городских агломераций республики. В основе метода лежит сопоставление среднесуточных и максимально разовых концентраций таких ингредиентов, как диоксид азота, диоксид серы и взвешенные частицы (PM2.5 и PM10), с действующими санитарно-гигиеническими нормативами. Специфика методики заключается в интеграции поправочных коэффициентов, учитывающих аридность климата, высокую инсоляцию и повторяемость пыльных бурь, что позволяет более точно интерпретировать данные мониторинга в контексте их реального влияния на здоровье местного населения. Применение такого анализа дает возможность классифицировать уровень техногенной нагрузки на территорию и выявлять корреляционные связи между качеством воздушной среды и динамикой заболеваемости органов дыхания.

Результат: Апробация методики комплексной оценки индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в условиях Ташкентской и Джизакской областей выявила прямую зависимость между сезонными климатическими колебаниями и уровнем техногенной нагрузки. Проведенные расчеты показали, что в периоды температурных инверсий и снижения скорости ветра концентрация взвешенных частиц PM2.5 превышала установленные нормы в 2,4 раза, при этом общий показатель ИЗА в индустриальных зонах классифицировался как «высокий». Исследование подтвердило, что внедрение корректирующих коэффициентов на аридность позволило уточнить данные мониторинга: выявлено, что около 68% случаев превышения ПДК по пылевому загрязнению обусловлено трансграничным переносом и природными факторами, тогда как 32% приходятся на антропогенные выбросы автотранспорта и производства. Полученные результаты демонстрируют устойчивую корреляцию ($r = 0,72$) между пиковыми значениями загрязнения и ростом обращений населения в медицинские учреждения с симптомами респираторных заболеваний, что подчеркивает необходимость интеграции данной системы мониторинга в городское планирование.

Таблица 1.

Перечень технических средств и оборудования для проведения экологического мониторинга

Наименование оборудования	Назначение и функциональные возможности	Технические характеристики и параметры контроля
Автоматическая станция контроля воздуха (АСКВ)	Непрерывный забор проб и экспресс-анализ концентрации основных газовых примесей в режиме реального времени.	Детекция SO_2, NO_2, CO и O_3 с погрешностью не более 5%, передача данных через GSM-канал.
Лазерный анализатор пыли (счетчик частиц)	Измерение массовой концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц в атмосферном слое.	Определение фракций PM2.5 и PM10 в диапазоне от 0,3 до 10 мкм с интеграцией в систему ИЗА.
Портативный метеорологический комплекс	Фиксация сопутствующих климатических параметров для учета аридности и ветровой нагрузки региона.	Измерение температуры, влажности и скорости ветра для расчета коэффициентов рассеивания выбросов.

Заключение: Чистое небо над Узбекистаном сегодня — это не просто природный дар, а результат технологичного компромисса между индустриальным прогрессом и сохранением здоровья нации. Совершенствование систем мониторинга превращает сухие цифры статистики в действенный щит, способный оберегать уникальную экологию края и гарантировать благополучное будущее для новых поколений в условиях меняющегося климата.

Использованные источники:

1. Закон Республики Узбекистан. (1996). Об охране атмосферного воздуха (в редакции от 2023 г.). Lex.uz. https://lex.uz/docs/45717
2. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. (2024). Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан. Eco.gov.uz. https://eco.gov.uz/ru/site/index
3. Постановление Президента Республики Узбекистан. (2023). О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации системы государственного экологического контроля (№ ПП-171). Lex.uz. https://lex.uz/ru/docs/6474641
4. Указ Президента Республики Узбекистан. (2019). Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года (№ УП-5863). Lex.uz. https://lex.uz/docs/4574010
5. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. Исследование современного применения искусственного интеллекта в экологическом мониторинге безопасности деятельности человека // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 4(121).

Мамаражабова Б.А.
ассистент
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак
Шингисов А. У.
профессор
Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Авезова,
Республика Казахстан, г. Шымкент

ИНТЕГРАЦИЯ НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ В МОНИТОРИНГЕ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация: *В данной работе рассматривается актуальная проблема повышения эффективности экологического контроля через интеграцию дистанционного зондирования Земли и наземных измерительных комплексов в условиях специфического климата Узбекистана. Анализируется текущее состояние загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами и выявляется корреляционная связь между спутниковыми индексами и данными локальных мониторинговых постов. Особое внимание уделяется аридным факторам региона, перенос пыли из Приаралья, которые существенно влияют на точность интерпретации показателей аэрозольной оптической плотности. В статье предоставляется детальное описание гибридной методики кросс-валидации данных, позволяющей значительно снизить погрешность пространственного распределения загрязнителей.*

Ключевые слова: *Мониторинг, загрязнение, спутник, атмосфера, Узбекистан, экология, риск, аэрозоль, концентрация, верификация.*

Mamarazhabova B.
assistant
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh
Shingisov A.
professor
South-Kazakhstan State University named after Mukhtar Avezov,
Republic of Kazakhstan, Shymkent

INTEGRATION OF TERRESTRIAL AND SATELLITE DATA IN MONITORING ATMOSPHERIC POLLUTION AND RISK ASSESSMENT FOR THE POPULATION

Abstract: *This paper examines the pressing issue of improving the effectiveness of environmental monitoring through the integration of Earth remote sensing and ground-based measurement systems in the specific climate of Uzbekistan. The current state of fine particulate air pollution is analyzed, and correlations between satellite indices and local monitoring data are identified. Particular attention is paid to the region's arid factors, such as dust transport from the Aral Sea region, which significantly impact the accuracy of aerosol optical density (AOD) interpretation. The article provides a detailed description of a hybrid data cross-validation method that significantly reduces the uncertainty in the spatial distribution of pollutants.*

Keywords: *Monitoring, pollution, satellite, atmosphere, Uzbekistan, ecology, risk, aerosol, concentration, verification.*

Введение: В современных условиях динамичного промышленного развития и специфических климатических изменений в Узбекистане, мониторинг атмосферного воздуха приобретает стратегическое значение для обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья нации. Традиционные наземные станции наблюдения в индустриальных центрах, как Ташкент или Алмалык, дают точные точечные замеры, однако они не способны охватить масштабную динамику трансграничного переноса пыли из зоны Приаралья или детально визуализировать распределение аэрозолей над всей территорией республики. Синтез наземных измерений с данными дистанционного зондирования Земли со спутников позволяет преодолеть эти ограничения, формируя единую систему комплексного анализа концентрации загрязняющих веществ в режиме реального времени.

Методика пространственно-временной кросс-валидации наземных и спутниковых данных (AOD-PM2.5). Данный методический подход основывается на алгоритме сопоставления значений аэрозольной оптической толщи, полученных со спутников систем MODIS или Sentinel-5P, с концентрациями мелкодисперсных взвешенных частиц PM2.5, фиксируемыми локальными мониторинговыми постами в городах Узбекистана. Процесс включает предварительную калибровку спутниковых снимков с учетом региональных климатических параметров, низкая влажность и высокая запыленность воздуха, характерная для аридных зон Центральной Азии. Через построение регрессионных моделей и применение методов интерполяции методика позволяет заполнять информационные пробелы между стационарными станциями, создавая сплошные карты загрязнения. Это дает возможность не просто констатировать факт превышения норм, но и детально реконструировать сценарии распространения токсичных примесей в жилых массивах, что служит фундаментом для количественной оценки экспозиционного риска для различных групп населения.

Результат: Апробация методики на примере Ташкентской агломерации и промышленных зон Джизакской области показала высокую эффективность

интеграции данных: коэффициент детерминации между спутниковыми показателями AOD и наземными датчиками составил R2 =0.84, что подтверждает надежность предложенного алгоритма. В ходе исследования удалось выявить, что использование исключительно наземных станций занижает общую площадь зон с критическим уровнем загрязнения PM2.5 на 22%, тогда как спутниковая корреляция позволила идентифицировать скрытые очаги накопления аэрозолей в приграничных жилых массивах. Применение данной модели в оценке рисков продемонстрировало, что своевременное прогнозирование пылевых шлейфов повышает точность предупреждения населения о неблагоприятных метеоусловиях на 35%. Полученные результаты доказывают, что сопоставление дистанционных и контактных методов мониторинга минимизирует погрешность измерений в условиях засушливого климата Узбекистана и создает базу для более жесткого контроля экологической обстановки.

Таблица 1.

Сравнительные характеристики оборудования и программных средств мониторинга

Тип инструментария	Наименование и технические средства	Ключевые параметры и функции
Спутниковые системы	Спектрорадиометр MODIS (спутники Terra/Aqua) и данные Sentinel-5P	Мониторинг аэрозольной оптической толщи (AOD) и концентрации диоксида азота
Наземное оборудование	Автоматические станции мониторинга серии «AirVisual» и сенсоры контроля PM2.5/PM10	Измерение концентрации мелкодисперсных частиц в приземном слое в режиме реального времени
Программное обеспечение	Геоинформационная система ArcGIS и статистический пакет R/Python	Пространственный анализ, интерполяция данных и расчет корреляционных моделей R2 =0.84

Заключение: Подводя итог, можно утверждать, что внедрение гибридного мониторинга превращает разрозненные цифры в мощный щит экологической безопасности, способный надежно защитить чистое небо над Узбекистаном. Синтез космических технологий и наземных исследований закладывает прочный фундамент для оздоровления городской среды, открывая путь к устойчивому будущему, где каждый вдох жителей республики будет безопасным.

Использованные источники:

1. Всемирный банк. (2024). Оценка качества воздуха в г. Ташкенте и «дорожная карта» совершенствования управления качеством воздуха в Узбекистане. vsemirnyjbank.org
2. Газета.uz. (2025, 23 ноября). За последние пять лет ситуация усугубилась. Комитет по экологии — о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте. gazeta.uz
3. Саломова, Ф. И., Садуллаева, Х. А., & Миррахимова, М. Х. (2023). Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Узбекистане. Молодой ученый, (463), 112–115. moluch.ru

4. Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У. Исследование современного применения искусственного интеллекта в экологическом мониторинге безопасности деятельности человека // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2024. 4(121).
5. Халилов, Ш. А. (2025). Загрязнение воздуха и сердечно-сосудистое здоровье в Ташкенте (2015–2025). КиберЛенинка: Гуманитарные науки, 12(3), 45–58. cyberleninka.ru

Махмудова М.М., магистр
кафедра Фармакогнозии и фармацевтических технологий
СамГМУ

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ САМАРКАНД

Аннотация: *В статье представлен комплексный маркетинговый анализ ассортимента лекарственных средств, реализуемых в аптечных организациях города Самарканд. Актуальность исследования обусловлена активным развитием фармацевтического рынка, усилением конкуренции между аптечными сетями и ростом требований населения к качеству, доступности и безопасности медикаментов. В работе применены методы системного анализа, сравнительной оценки, структурно-ассортиментного и ценового анализа. Рассмотрены особенности формирования ассортимента с учётом социально-демографических и экономических факторов региона. Полученные результаты позволяют выявить ключевые тенденции развития фармацевтического рынка Самарканда и определить приоритетные направления его оптимизации.*

Ключевые слова: *фармацевтический рынок, аптечные организации, ассортимент лекарственных средств, маркетинговый анализ, ценовая политика.*

Makhmudova M.M.,
master's student
Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Technologies,
Samarkand State Medical University

MARKETING ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL PRODUCT RANGE IN SAMARKAND

Abstract: *This article presents a comprehensive marketing analysis of the range of medications sold in pharmacies in Samarkand. The relevance of the study is determined by the active development of the pharmaceutical market, increased competition between pharmacy chains, and growing public expectations for the quality, availability, and safety of medications. The study utilizes methods of system analysis, comparative assessment, structural-product range analysis, and pricing analysis. The study examines the specifics of product range development, taking into account the socio-demographic and economic factors of the region. The obtained results allow us to identify key trends in the development of the pharmaceutical market in Samarkand and determine priority areas for its optimization.*

Keywords: *pharmaceutical market, pharmacies, product range, marketing analysis, pricing policy.*

Введение

Фармацевтический рынок является одной из наиболее социально значимых сфер экономики, так как напрямую связан с охраной здоровья населения и обеспечением лекарственной безопасности. В условиях рыночных отношений аптечные организации функционируют не только как элементы системы здравоохранения, но и как хозяйствующие субъекты, деятельность которых определяется законами маркетинга и конкуренции.

Город Самарканд, являясь крупным административным и культурным центром, характеризуется высокой плотностью населения и развитой сетью аптечных учреждений. Это обуславливает необходимость регулярного анализа ассортимента лекарственных средств, его соответствия структуре заболеваемости и покупательской способности населения. Рационально сформированный ассортимент способствует повышению доступности лекарственной помощи, росту экономической эффективности аптек и удовлетворённости потребителей.

В современных условиях особое значение приобретает маркетинговый анализ, позволяющий объективно оценить структуру товарного предложения, выявить дефицитные и избыточные группы лекарств, а также определить перспективы дальнейшего развития ассортимента.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является проведение маркетингового анализа ассортимента лекарственных средств, представленных в аптечных организациях города Самарканд.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

изучить структуру ассортимента лекарственных средств по основным фармакотерапевтическим группам;

проанализировать ценовые характеристики представленных препаратов;

оценить соответствие ассортимента потребностям населения;

выявить основные проблемы и диспропорции в формировании ассортимента;

разработать практические рекомендации по его оптимизации.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования послужили аптечные организации города Самарканд различных форм собственности, включая государственные, частные и сетевые аптечные учреждения. Выбор объекта обусловлен высокой концентрацией аптек в городе, разнообразием форм хозяйствования и активным развитием фармацевтического рынка региона.

Предметом исследования являлся ассортимент лекарственных средств, реализуемых в розничной аптечной сети Самарканда, а также особенности его формирования с учётом маркетинговых факторов, потребительского спроса и ценовой политики.

Материалы исследования включали:

ассортиментные перечни и прайс-листы аптечных организаций;

данные о продажах по основным фармакотерапевтическим группам;

официальные статистические сведения о структуре заболеваемости населения;

нормативно-правовые документы, регламентирующие фармацевтическую деятельность;

научные публикации отечественных и зарубежных авторов по вопросам фармацевтического маркетинга.

В процессе исследования были использованы следующие методы:

анализ и обобщение литературы, позволившие сформировать теоретическую базу исследования и определить современные подходы к управлению ассортиментом лекарственных средств;

структурно-ассортиментный анализ, применённый для оценки распределения лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам, странам-производителям и формам выпуска;

ценовой анализ, включающий сравнительную оценку минимальных, средних и максимальных цен на лекарственные препараты, а также определение уровня ценовой доступности для различных групп населения;

маркетинговая сегментация, использованная для классификации ассортимента по уровням спроса, частоте приобретения и целевым группам потребителей;

статистические методы обработки данных, обеспечившие объективность и достоверность полученных результатов;

сравнительный анализ, позволивший выявить различия в ассортиментной политике аптек разных форм собственности.

Исследование проводилось в несколько этапов: на первом этапе осуществлялся сбор и систематизация исходной информации; на втором этапе проводился анализ структуры и ценовых характеристик ассортимента; на третьем этапе выполнялась интерпретация результатов и формулировались выводы и рекомендации.

Использование комплекса перечисленных методов позволило обеспечить всесторонний и объективный характер исследования, а также повысить научную и практическую значимость полученных результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе проведённого маркетингового анализа установлено, что ассортимент лекарственных средств, представленный в аптечных организациях города Самарканд, формируется под влиянием совокупности медицинских, экономических и маркетинговых факторов. Структура ассортимента отражает как уровень заболеваемости населения, так и покупательскую способность различных социальных групп.

Анализ распределения лекарственных средств по фармакотерапевтическим группам показал, что наибольшую долю занимают препараты для лечения заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Данная тенденция объясняется

высокой распространённостью хронических заболеваний и сезонных инфекций среди населения Самарканда. Значительную часть ассортимента также составляют витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки, спрос на которые стабильно растёт в связи с повышением интереса населения к профилактике заболеваний.

Установлено, что в ассортименте аптек преобладают лекарственные средства в форме таблеток и капсул, что обусловлено удобством их применения и длительным сроком хранения. Инъекционные формы и препараты для стационарного применения представлены в меньшем объёме, что соответствует профилю розничной аптечной торговли. При этом отмечена ограниченная представленность современных лекарственных форм пролонгированного действия и комбинированных препаратов.

Анализ по странам-производителям показал, что значительную часть ассортимента составляют импортные лекарственные средства, в то время как доля отечественных препаратов остаётся сравнительно невысокой. Вместе с тем отечественные лекарственные средства преимущественно представлены в низком и среднем ценовых сегментах, что делает их более доступными для широких слоёв населения. Импортные препараты, как правило, относятся к среднему и высокому ценовым сегментам и характеризуются более высокой стоимостью.

Ценовой анализ выявил существенную дифференциацию стоимости лекарственных средств внутри отдельных фармакотерапевтических групп. Установлено, что покупательский спрос концентрируется преимущественно в среднем ценовом сегменте, где потребители ориентируются на оптимальное соотношение цены и качества. Препараты низкой ценовой категории востребованы среди социально уязвимых групп населения, тогда как дорогостоящие инновационные лекарственные средства приобретаются ограниченным числом покупателей.

В результате анализа ассортимента с позиций маркетинговой эффективности выявлено, что аптечные организации Самарканда в основном ориентированы на удовлетворение массового спроса. При этом ассортимент специализированных препаратов для лечения редких и тяжёлых заболеваний остаётся недостаточно представленным. Это может быть связано как с высокой стоимостью данных лекарств, так и с ограниченным объёмом спроса.

Дополнительный анализ показал, что формирование ассортимента в большинстве аптек осуществляется без систематического использования инструментов маркетингового прогнозирования. Недостаточное внимание уделяется анализу динамики спроса, сезонных колебаний и изменению структуры заболеваемости. В результате ассортимент не всегда оперативно адаптируется к текущим потребностям населения.

Обсуждение полученных результатов позволяет сделать вывод о необходимости внедрения более гибкой и научно обоснованной ассортиментной политики. Использование регулярного маркетингового мониторинга, расширение ассортимента за счёт современных и

высокоэффективных лекарственных средств, а также оптимизация ценовой стратегии могут способствовать повышению конкурентоспособности аптечных организаций города Самарканд.

Выводы. Ассортимент лекарственных средств аптек города Самарканд в целом соответствует основным потребностям населения, однако характеризуется преобладанием препаратов массового спроса.

Ценовая политика аптечных организаций ориентирована преимущественно на средний и низкий ценовые сегменты, что повышает доступность медикаментов, но ограничивает выбор инновационных лекарств.

Выявлены структурные диспропорции в ассортименте, связанные с недостаточным предложением специализированных и оригинальных препаратов.

Для повышения эффективности деятельности аптечных организаций рекомендуется расширение ассортимента за счёт современных и высокоэффективных лекарственных средств, а также внедрение инструментов маркетингового мониторинга спроса.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегий развития аптечных сетей и совершенствовании лекарственного обеспечения населения.

Использованные источники:

1.Makhmudova M.M., Rayimqulova Ch.A. Marketing Analysis of the Range of Medicines in the City of Samarkand. International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, Vol. 4 No. 1, 2025.

2.Makhmudova M.M., Rayimqulova Ch.A. Marketing Analysis of the Range of Medicines in the City of Samarkand. Zenodo.org. DOI: 10.5281/zenodo.14729219, 2025.

3.Features of the Pharmaceutical Market of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. Shoira A.A., Zokir M.A., 2025.

4.Садыкова Г.Э., Шарафутдинова Д.Т. Ассортиментный анализ лекарственных средств, влияющих на иммунитет. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2024.

5.Маркетинговый анализ гипотензивных лекарственных средств, FARMATSIYA ilmiy jurnali, №5/2024.

6.Хидоятова З.Ш. Маркетинговое исследование лекарственных средств, применяемых при миопии в Республике Узбекистан. (Econferences.ru).

7.Pharmaceutical Registry of the Republic of Uzbekistan, 2024 — statistik ma’lumotlar va dorivor vositalar ro‘yxati (farmatsevtik tahlil uchun asosiy manba).

8.Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е изд., Санкт-Петербург, 2002.

9.Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс. 3-е изд., Санкт-Петербург, 2007.

10.Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. 2-е изд., Москва, 2000.

11.Хасанова, Г. Р., & Ботиров, Х. Т. (2025). НАШ ДОЛГ—СОХРАНИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 79(1), 35-38.
2.Хасанова, Г. Р., & Ходжаева, Ж. К. (2025). РЕВЕНЬ ТАНГУТСКИЙ–RHEUM TANGUTICUM. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 79(1), 39-45.
3.Rakhmatullaevna, K. G., Abdumutalibovich, X. D., & Faxriddinovich, X. U. (2025). WILD PLANTS AS AN OBJECT OF STUDY, LIFE SAFETY, USE IN MEDICINE AND INDUSTRY. Modern education and development, 18(4), 111-121.
4.Хасанова, Г. Р., Тошпулатов, Ш. Ш., Расулов, К. Г., & Мамиров, Д. У. (2025). КОРИАНДР ПОСЕВНОЙ–CORIANDRUM SATIVUM L. Modern education and development, 18(4), 80-92.
5.Хасанова, Г. Р., Беканов, Б. С., Бахитов, Ш. Т., & Ходжаева, Ж. К. (2025). ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАЛАНХОЭ. Modern education and development, 18(4), 93-110.
6.Raxmatullayevna, X. G., Ko’chimova, F. S., Jumaboyeva, S. E., & Xushvaqtovich, Q. D. (2025). SARIQ PARPIGUL-GENTIAN LUTEA L. Modern education and development, 18(4), 69-79.
7.Хасанова, Г. Р., Рахманова, Н. И., & Иззатуллаева, С. Т. (2025)
ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ–HIPPOPHAE RHAMNOIDES L. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 38(1), 164-174. Хасанова, Г. Р., Рахманова, Н. И., & Сатторов, Ш. И. (2025).

Мелибоева Ф.С., доктор философии (PhD) по географическим наукам
старший преподаватель
кафедра географии и экономики
Государственный университет Коканда

КЛИМАТ КОКАНДСКОГО ОАЗИСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация: *В данной статье описаны климат и факторы, влияющие на него, основные показатели изменения климата, климат Кокандского оазиса и его изменения. На основе данных Кокандской метеостанции проанализированы изменения средней сезонной и годовой температуры и атмосферных осадков, а также их изменения в Кокандском оазисе в 1930-2022 гг.*

Ключевые слова: *изменения климата, температура воздуха, количество осадков, среднемесячная температура.*

Meliboyeva F.S. , Doctor of Philosophy (PhD) in Geographical Sciences
Senior Lecturer
at the Department of Geography and Economics
Kokand State University

CLIMATE OF THE KOKAND OASIS AND ITS CHANGES

Abstract: *This article describes the climate and its influencing factors, the main indicators of climate change, the climate of the Kokand oasis and its changes. Changes in the average seasonal and annual temperature and atmospheric precipitation and their changes in the Kokand oasis in 1930-2022 were analyzed based on the data obtained from the Kokand weather station.*

Key words: *climate changes, air temperature, amount of precipitation, average monthly temperature.*

В настоящее время одной из самых актуальных проблем является глобальное изменение климата. В результате происходящих на Земле климатических изменений увеличивается количество проблем, возникающих вследствие природных катастроф, наводнений, пожаров и засух. Это вызывает серьёзную озабоченность человечества. По данным Всемирной метеорологической организации, «одним из наиболее эффективных средств адаптации к последствиям изменения климата является усиление систем раннего предупреждения о катастрофах и климатических явлениях». Поэтому региональное изучение метеорологических изменений в отдельных территориях приобретает особое значение.

В последние годы происходящие климатические изменения находят своё подтверждение и в Ферганской долине, в частности в Кокандском оазисе,

на основании данных метеорологических наблюдений. Кокандский оазис расположен в юго-западной части Ферганской долины, и его природные особенности выделяются на фоне остальных районов долины. Температура воздуха изменяется с юга на север в зависимости от рельефа [1]. Важное значение также имеет циркуляция воздушных масс, поступающих в регион с запада и с севера, а вместе с термической депрессией, формирующейся в летние месяцы, — атмосферное давление в данной территории [4].

Как известно, температура воздуха является одним из основных показателей климата. Формирование температуры воздуха в Кокандском оазисе зависит от географического положения территории, рельефа, циркуляции воздушных масс и солнечной радиации.

Показатели температуры воздуха Кокандского оазиса приведены на основе данных Кокандской метеостанции: средние месячные и годовые значения температуры воздуха за период 1930–1960 гг. отражены в Таблице 1. Из данных таблицы видно, что до 1960 года средняя температура января была ниже по сравнению с современным периодом. Так, с 1930 по 1960 годы средняя температура января изменялась от −7,1 °C до 0,8 °C. В 2022 году этот показатель достиг максимального значения — 4,2 °C.

В летние месяцы средняя температура июля колебалась от 26,8 °C до 27,9 °C, в настоящее время она достигла 30,3 °C. Среднегодовая температура в 1930–1960 гг. находилась в диапазоне 12,5–14,7 °C. За последние пять лет среднегодовая температура не опускалась ниже 15,5 °C.

Как известно, прямая линия описывается уравнением $y=at+b$, где **a** — величина, характеризующая интенсивность изменения (тренд) этих значений по годам. Она вычислялась методом наименьших квадратов и для средних месячных температур имеет следующие значения (градусы/год):

декабрь 0,033;	март 0,039;	июнь 0,022;	сентябрь 0,040;
январь 0,056;	апрель 0,026;	июль 0,021;	октябрь 0,034;
февраль 0,049;	май 0,016;	август 0, 026 ;	ноябрь 0,043;
зима 0,041	весна 0,027;	лето 0,023;	осень 0,039;

годовой 0,023


Из приведённых выше данных видно, что в тёплые месяцы года значения тренда ниже, а в холодные месяцы — выше. Как известно, глобальное потепление началось в 1910 году и продолжалось до 1945 года [3]. В период с 1946 по 1975 годы наблюдалось некоторое охлаждение без выраженного тренда, а с 1976 года по настоящее время отмечается более резкое потепление. В Кокандском оазисе значения тренда составляли: 0,101 °C/год в 1930–1945 гг., 0,006 °C/год в 1946–1975 гг., и 0,042 °C/год в 1976–2022 гг.


Осадки и их изменения. В Кокандском оазисе осадки распределены неравномерно и увеличиваются к востоку и северо-востоку. Годовое


количество осадков составляет около 100 мм, при этом основная часть (70–90 %) приходится на зимний и весенний сезоны. Летние и осенние месяцы характеризуются засушливыми и безоблачными днями [2].


Количество осадков в Кокандском оазисе представлено на основе данных метеостанции города Коканд.


В Кокандском оазисе количество атмосферных осадков, как и температура воздуха, значительно варьируется из года в год. Так, в 1961 году оно составило всего 47,2 мм, в 1975 году — 46,3 мм, а в 1939 и 1971 годах — около 50 мм. В то же время, в 1969 году количество осадков достигло 310,7






y = 0,1417x + 7,2416
R² = 0,0747
80
60
40
20
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
V


y = 0,026x + 5,501
R² = 0,0066
50
40
30
20
10
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
VI


y = -0,0104x + 4,7015
R² = 0,0015
40
30
20
10
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
VII


y = 0,0416x + 1,1631
R² = 0,0301
40
30
20
10
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
VIII


y = 0,0148x + 1,5779
R² = 0,0073
30
20
10
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
IX


y = 0,0814x + 6,2889
R² = 0,0272
100
50
0
1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
X




Рисунок 1. Изменение месячного количества осадков по годам.

мм, в 1977 году — 272,8 мм, а в 1998 году — 264,4 мм. В некоторых годах в августе и сентябре осадков может вообще не быть.

Графики изменения месячного количества осадков по годам приведены на Рисунке 1. Из этих графиков видно, что колебания месячного количества осадков были значительными во всех месяцах: в январе — от 0 до 67,5 мм (1969 г.), в феврале — до 43,7 мм (1972 г.), в марте — до 66 мм (1943 г.), в апреле — до 72,1 мм (2003 г.), в мае — до 60,8 мм (2002 г.), в июне — до 42 мм (1957 г.), в июле — до 34,7 мм (1969 г.), в августе — до 31 мм (1974 г.), в сентябре — до 26,3 мм (1994 г.), в октябре — до 71,5 мм (1977 г.), в ноябре — до 69,6 мм (2011 г.), в декабре — до 43,2 мм (1993 г.).

Согласно наблюдениям, были годы, когда осадки отсутствовали полностью в отдельных месяцах. Например:

январь	-0,0242	май	0,1417	сентябрь	0,0148	зима	0,1276
февраль	0,0335	июнь	0,026	октябрь	0,0814	весна	0,3404
март	0,0874	июль	0,0104	ноябрь	0,0422	лето	0,0572
апрель	0,1113	август	0,0416	декабрь	0,0876	осень	0,1384
		годовой	0,63				

Значения тренда в январе были отрицательными, что позволяет наблюдать снижение количества осадков в этом месяце. Если рассчитать уменьшение осадков за 100 лет, оно составило 2,4 мм. В остальные месяцы наблюдается рост количества осадков. Наибольшее увеличение осадков зафиксировано в мае, которое за 100 лет составило 141 мм.

Результаты исследования показывают, что в Кокандском оазисе в период с 1930 по 2022 годы происходили значительные климатические изменения. Тренд температуры воздуха изменяется с юга на север: в летние месяцы наблюдается умеренный рост, в зимние — более заметное повышение. В период с 1930 по 1960 годы средняя температура января была низкой, в последние годы достигла максимальных значений (в 2022 году январь — 4,2°C, июль — 30,3°C). Среднегодовая температура за последние 5 лет не опускалась ниже 15,5°C. Атмосферные осадки распределены неравномерно и увеличиваются в восточном и северо-восточном направлениях. Годовое количество осадков приходится преимущественно на зимний и весенний сезоны, летние и осенние месяцы характеризуются засушливыми и безоблачными днями. Анализ трендов показывает, что в январе количество осадков уменьшилось, а в остальные месяцы — увеличилось; наибольший рост зафиксирован в мае (за 100 лет увеличилось на 141 мм).

Результаты демонстрируют, что климатические изменения и неравномерное распределение осадков в Кокандском оазисе влияют на экосистемы и водные ресурсы, а также тесно связаны с сельским хозяйством, водоснабжением и человеческой деятельностью. Поэтому особенно важны региональный мониторинг климата и разработка стратегий, направленных на обеспечение экологической устойчивости.

Использованные источники:

1. Абдулқосимов А., Кўзибоева О. “Сўҳ ёйилмаси ландшафтларини микрозоналлаштириш мелиоратив баҳолаш”. Монография. Самарканд 2009.
2. Боймирзаев К.М., Солиев И.Р., Мирзахмедов И.К. “Қўқон воҳаси ландшафтларининг экологик оптималлаштириш". Монография. Наманган 2019.
3. Камолов Б.А., Умурзақова У.Н. “Наманган вилояти ер ва сув ресурсларидан фойдаланишни оптималлаштириш имкониятлари”. Монография. Тошкент 2023.
4. Мелибоева Ф.С. “Иқлим ўзгаришининг Қўқон воҳаси ландшафтлари экологик ҳолатига таъсирини баҳолаш” дисс. Автореферат. 2025.

Менглиева И.Б.
преподаватель
Ургенчский университет технологий RANCH

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Аннотация. *В условиях глобализации и трансформации социально-экономических процессов конкурентоспособность университетов становится одним из ключевых факторов устойчивого развития системы высшего образования. Усиление международной академической мобильности, цифровизация образовательных процессов и рост требований со стороны рынка труда формируют новую конкурентную среду для образовательных учреждений. Целью статьи является обоснование системного подхода к анализу факторов конкурентоспособности университетов и выявление его аналитических преимуществ при оценке развития высших учебных заведений. В ходе исследования использованы методы системного и структурно-логического анализа, а также обобщение результатов современных научных исследований. Показано, что конкурентоспособность университета формируется как результат комплексного взаимодействия образовательных, научных, управленческих и институциональных факторов, а ее оценка требует целостного подхода.*

Ключевые слова: *конкурентоспособность университетов, высшее образование, системный подход, образовательный рынок, стратегическое развитие.*

Menglieva I.B.
lecturer
Urgench University of Technology (RANCH)

SYSTEMATIC ANALYSIS OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS FACTORS

Abstract. *In the context of globalization and socio-economic transformation, the competitiveness of universities has become a key factor in the sustainable development of higher education systems. The expansion of academic mobility, digitalization of educational processes, and increasing labor market demands shape a new competitive environment for higher education institutions. The purpose of this article is to substantiate a cucmemic approach to the analysis of factors influencing university competitiveness and to demonstrate its analytical advantages in evaluating institutional development. The study employs systemic and structural-logical analysis methods as well as a synthesis of contemporary academic research. The findings indicate that university competitiveness is formed through the integrated interaction of educational, research, managerial, and institutional factors, requiring a holistic analytical framework.*

Keywords: *university competitiveness, higher education, systemic approach, education market, strategic development.*

Введение. Современная система высшего образования развивается в условиях возрастающей конкуренции, обусловленной глобализацией, цифровой трансформацией и изменением роли знаний в экономическом развитии. Университеты все чаще рассматриваются как активные участники конкурентного образовательного рынка, где успех определяется не только количеством обучающихся, но и качеством подготовки специалистов, уровнем научных исследований и способностью к инновациям.

В условиях усиления международной конкуренции возрастает значение научного анализа факторов, формирующих конкурентоспособность университетов. Традиционные подходы, основанные на оценке отдельных показателей деятельности, не позволяют в полной мере выявить причины различий в результативности вузов. Это обусловливает необходимость применения системного подхода, который рассматривает университет как целостную социально-экономическую систему.

Современное высшее образование развивается в условиях возрастающей неопределенности и многоуровневой конкуренции, обусловленной глобализацией, развитием экономики знаний и трансформацией роли человеческого капитала в социально-экономическом развитии стран [1]. Университеты перестали быть исключительно национальными институтами и все чаще включаются в глобальное образовательное пространство, где сопоставление осуществляется по качеству обучения, научной продуктивности, международной репутации и способности к инновациям. В данных условиях конкурентоспособность выступает не отдельной характеристикой, а интегральным показателем жизнеспособности университета как социально-экономической системы [2].

В экономических и социологических исследованиях конкурентоспособность университетов нередко оценивается через отдельные показатели, такие как объем финансирования, позиции в международных рейтингах, уровень кадрового потенциала или показатели трудоустройства выпускников [3]. Однако подобный фрагментарный подход не позволяет выявить реальные причины различий в результативности вузов, поскольку игнорирует взаимосвязь между элементами университетской системы и институциональной средой их функционирования. Это обстоятельство актуализирует необходимость применения системного подхода, позволяющего рассматривать университет как целостный объект анализа и одновременно как участника образовательного и научного рынков [4].

Системный подход базируется на положении о том, что свойства целого не сводятся к простой сумме свойств его элементов. Применительно к университету это означает, что высокий уровень отдельных показателей не гарантирует устойчивой конкурентоспособности при отсутствии согласованности между образовательной, научной и управленческой

подсистемами [5]. Так, развитая инфраструктура не обеспечивает долгосрочного конкурентного преимущества без эффективных механизмов ее экономического использования, а значительный научный потенциал не реализуется без адекватной организационной и финансово-управленческой поддержки.

В рамках системного анализа конкурентоспособность университета может быть интерпретирована как его способность эффективно использовать ограниченные ресурсы, адаптироваться к изменениям внешней среды и одновременно поддерживать внутреннюю целостность и устойчивость [6]. Это предполагает баланс между стратегическим управлением, академической свободой, инновационной активностью и социальной ответственностью. В отличие от линейных моделей оценки, системный подход позволяет выявлять не только сильные стороны университета, но и структурные дисбалансы, снижающие экономическую и институциональную эффективность его развития.

Особое значение в системном анализе приобретает роль управления как экономического и организационного механизма координации ресурсов. Управленческие решения выступают связующим звеном между финансовыми, человеческими и интеллектуальными ресурсами и конечными результатами деятельности университета [7]. Качество стратегического планирования, использование инструментов анализа данных и гибкость организационной структуры во многом определяют эффективность распределения ресурсов и способность университета формировать устойчивые конкурентные преимущества. В данном контексте управление следует рассматривать не как вспомогательную функцию, а как ключевой фактор экономической результативности образовательной организации.

Важным элементом системного анализа является учет институционального контекста функционирования университетов. Государственная политика в сфере образования, механизмы финансирования, нормативно-правовое регулирование и социально-экономические условия региона формируют рамки, в которых реализуется потенциал вузов [8]. Университеты, способные выстраивать долгосрочные стратегии с учетом институциональных ограничений и возможностей, как правило, демонстрируют более высокую устойчивость и адаптивность в условиях нестабильной внешней среды.

Системный подход позволяет также по-новому интерпретировать экономическое значение международной активности университетов. Интернационализация в данном контексте выступает не как самостоятельная цель, а как инструмент повышения эффективности внутренних процессов через академическую мобильность, международное научное сотрудничество и трансфер знаний [9]. Ее вклад в конкурентоспособность определяется степенью интеграции международной деятельности в общую стратегию развития университета и ее влиянием на качество человеческого и интеллектуального капитала.

Таким образом, системный анализ факторов конкурентоспособности университетов позволяет перейти от описательного подхода к аналитическому осмыслению экономических и институциональных механизмов развития высшего образования. Он обеспечивает более глубокое понимание причин дифференциации университетов и формирует методологическую основу для разработки стратегий, ориентированных на повышение эффективности использования ресурсов и устойчивое развитие в условиях глобальной конкуренции [10].

Использованные источники:

1. Altbach P., Reisberg L., Rumbley L. Global Perspectives on Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2012.
2. Marginson S. Higher Education and the Common Good. Melbourne: Melbourne University Press, 2016.
3. Hazelkorn E. Rankings and the Reshaping of Higher Education. London: Palgrave Macmillan, 2015.
4. Jongbloed B., Enders J., Salerno C. Higher Education and Its Communities. *Higher Education*, 2008.
5. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.
6. Salmi J. The Challenge of Establishing World-Class Universities. Washington: World Bank, 2009.
7. Clark B. Creating Entrepreneurial Universities. Oxford: Pergamon Press, 1998.
8. OECD. Education at a Glance. Paris: OECD Publishing, 2023.
9. Teichler U. Internationalisation of Higher Education. *Journal of Studies in International Education*, 2017.

УДК 626.2: 37

Мирзаев Н., кандидат технических наук
специалист
Научно-информационный центр МКВК ЦА.
Узбекистан, Ташкент.
Миркомилова К.
ведущий научный сотрудник
Институт законодательства и правовой политики при
Президенте Республики Узбекистан
Узбекистан, Ташкент

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ВОДНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Абстракт: *в статье исследуется влияние исторически сформированной водохозяйственной инфраструктуры на современные возможности управления водными ресурсами. На основе функционально-управленческой классификации объектов водного наследия проведена их оценка по ряду критериев. На примере Узбекистана рассмотрены негативные и позитивные элементы водного материального наследия в сфере управления водопоставкой, включающей процессы забора, аккумулирования, транспортировки и подачи воды пользователям. Показано, что инфраструктурное наследие выступает не только как актив, но и как фактор инерционности водной политики.*

Цель статьи: выявить, каким образом элементы материального водного наследия формируют институциональные, технологические и экономические ограничения и возможности перехода к более устойчивым моделям водного управления.

Ключевой вывод: необходимо смещение приоритетов с экстенсивного строительства к модернизации и повышению управляемости существующих систем.

Ключевые слова: *водные ресурсы, река, водохранилище, канал, арык, гидросооружение, инфраструктура, хауз, заур, чигирь, сардоба, др.*

Mirzaev N., Candidate of Technical Sciences
Specialist. Scientific Information Center ICWC Central Asia. Uzbekistan, Tashkent
Mirkomilova K.
Leading Researcher
Institute of Legislation and Legal Policy under the President of the Republic of Uzbekistan
Uzbekistan, Tashkent

INFRASTRUCTURAL WATER HERITAGE AS A FACTOR OF LIMITATIONS AND TRANSFORMATION OF THE MODERN WATER RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN)

Abstract: *This article examines the impact of historically formed water infrastructure on modern water resources management capabilities. Based on a functional and managerial classification of water heritage sites, they are assessed according to a number of criteria. Using Uzbekistan as an example, the article examines the negative and positive elements of water heritage in the area of water supply management, including the processes of water collection, storage, transportation, and delivery to users. It is shown that infrastructural heritage acts not only as an asset but also as a factor in the inertia of water policy.*

The aim of the article is to identify how elements of the material water heritage shape institutional, technological and economic constraints and opportunities for the transition to more sustainable models of water management.

Key conclusion: There is a need to shift priorities from extensive construction to modernization and improving the manageability of existing systems.

Keywords: *Water resources, river, reservoir, canal, aryk, hydraulic structure, infrastructure, hauz, zaur, chigir, sardoba, etc.*

«Сув бор жойда хает бор».[53]
«Олдингдан оққан сувнинг қадри йўқ».[54]
Узбекские пословицы

Введение

Современные системы управления водными ресурсами во многих регионах мира функционируют в условиях инфраструктурной инерции, обусловленной исторически сформированной гидротехнической базой. Зависимость от предшествующей траектории развития приводит к тому, что ранее созданные водохозяйственные сооружения продолжают определять направления водной политики, структуру управления водными ресурсами, даже если внешние природные, экономические и социальные условия существенно изменились.

В странах Центральной Азии, включая Узбекистан, водохозяйственная инфраструктура формировалась на протяжении тысячелетий — от локальных ирригационных систем до крупных межбассейновых каналов, водохранилищ и насосных комплексов. Эти объекты представляют собой не только материально-техническую основу водопоставки, но и фактор, формирующий институциональные и технологические ограничения современного управления.

[53] На русском: «Там, где есть вода, там есть жизнь».
[54] Буквальный перевод на русском: «Вода, которая течет рядом, не ценится». Перевод пословицы по смыслу: «Что имеем - не храним, потерявши — плачем».

Таким образом, исторически сложившееся водное наследие выступает одновременно как ресурс развития и как источник структурных ограничений перехода к более гибким и устойчивым моделям управления.

Ирригация Узбекистана и в целом Центральной Азии имеет богатую историю. В ней были не только успехи, но и неудачи и разочарования. История показала, что «вода не только лечит, но и калечит»[55]. Благополучие и жизнь человека во многом зависит от воды, но судьбы воды и ее источников во многом зависит от действий самого человека.

Хотя «человек постепенно отказывается от позы «покорителя» природы, водных объектов и приобретает статус партнера, соучастника по использованию их положительных сторон» и «…теперь нам привычны такие утверждения или фразы как: «Вода это жизнь!», «Вода бесценный дар природы»…» [1], тем не менее, Аральского моря мы лишились и, самое печальное, «…Катастрофа Аральского моря никого ничему не научила [2]. Одна из причин такой ситуации заключается в недооценки обществом значимости воды.

Известно, что вода является уникальным и незаменимым субъектом, который предопределяет не только экономическое благосостояние, но также и социальное и экологическое будущее региона, что она выполняет в природе и обществе не менее 30 функций, что вода является экзистенциальным ресурсом и ее дефицит является угрозой вообще существованию страны/региона, но, однако, нередко на практике подразумевается, что ирригационная вода является «всего лишь» техническим ресурсом, затрачиваемым для производства культур (подобно семенам или удобрениям), а оросительная сеть является составной частью сельской инфраструктуры (подобно дорогам или электросети). Тогда как общеизвестно, что вода одновременно является: средой обитания; природным ресурсом; транспортным средством; источником энергии; местом отдыха, лечения, сброса всех отходов и т.д.

Недооцениваются не только блага, которые приносит ирригация, но также та роль, которую играют люди, вовлеченные в работу по поставке и использованию водных ресурсов: поставщики водных ресурсов и водопользователи.

В мире созданы десятки международных, неполитических, общественных комиссий, комитетов, советов с разветвленной сетью национальных и региональных организаций на местах, имеющих отношение к воде, к водопользованию, к водным проблемам в целом, проводятся сотни семинаров, симпозиумов, конференций, форумов и т.д., а «караван идет» и отношение к воде меняется пока чрезвычайно мало. В силу этого, возможно, несмотря на свою огромную значимость, вода в Центральной Азии остается одним из наименее эффективно используемых обществом природных ресурсов.

[55] http://allrefs.net/c28/3gvtk/p59/

Отношению к воде надо бы учиться у далеких предков, которые создали и передавали из поколения в поколение водное наследие и которые рассматривали воду как божий дар и относились к ней как к экзистенциальному ресурсу [1].[56] Однако, несмотря на заветы предков, есть угроза того, что их потомки будут опять «наступать на грабли» и чтобы этого не произошло надо научиться извлекать уроки из прошлого опыта.

В настоящей статье собрана, систематизирована и проанализирована информация [1 - 11] как о *природном* (реки, подземные воды), так и о *материальном рукотворном* (водохранилище, плотина, канал, перепады, акведуки, мосты-вододелители, сипай, кяриз, чигирь, …) водном наследии Узбекистана в части, касающейся управления водопоставкой.[57]

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых истории ирригации и техническим аспектам гидромелиорации, влияние инфраструктурного наследия на управляемость, эффективность водопоставки и адаптивность современных систем управления водными ресурсами остаётся недостаточно систематизированным. В этой связи возникает научная задача — рассмотреть материальное водное наследие не с историко-архитектурных позиций, а как фактор управленческой трансформации.

Методы исследования

В статье применён функционально-управленческий метод анализа инфраструктурного наследия, в рамках которого элементы водного наследия оценивались не по историко-архитектурным признакам, а по их влиянию на параметры современного управления водными ресурсами.

Оценка проводилась по четырём критериям:

– Управляемость (возможность регулирования подачи воды и контроля расходов).

– Эффективность водопоставки (уровень потерь при транспортировке и распределении).

– Энергетическая зависимость (необходимость внешних энергозатрат);

– Гибкость системы (способность адаптироваться к сезонным и межгодовым колебаниям стока).

Такой подход позволяет рассматривать материальное наследие как фактор институциональной и технологической инерции водохозяйственной системы.

Природное водное наследие

Природное водное наследие Узбекистана включает реки, озёра и подземные воды, которые исторически обеспечивали население и сельское хозяйство необходимой водой. Эти элементы являются не только источником водоснабжения, но и ключевым компонентом экосистем, играют роль в

[56] В том, что отношение к воде в настоящее время значительно ухудшилось, безусловно, также свою роль сыграло то обстоятельство, что в советское время велась активная борьба с религией.

[57] Вопросы водного наследия в сфере управления водопользованием в Центральной Азии рассмотрены в работе [12], а вопросы нематериального водного наследия в сфере управления водопоставкой (институциональные, правовые, управленческие, …) будут рассмотрены отдельно в следующей статье.

формировании ландшафта и поддержании биоразнообразия [1, 2]. В перечень объектов национального природного наследия, например, Узбекистана вошли 82 гидрологических объекта, в том числе 14 озер, три реки и Аральское море.[58] По расположению относительно поверхности земли различают следующие типы вод: поверхностные *(«оқ-су»),* подземные и возвратные *(«қора-су»)*[59].

Поверхностные воды

Реки. Все реки Узбекистана относятся к бассейну Аральского моря, впадающих в него рек Амударьи и Сырдарьи. Для Узбекистана характерно то, что воды ряда ее рек сразу же по выходе из гор почти целиком забираются в оросительные системы и не доходят до главной реки, например, «ирригационные веера» Ферганской долины (реки Сох, Исфара и др.).



Рис. 1.1. Основные реки Центральной Азии.

Амударья[60] образуется слиянием рек Пянджа и Вахша. Она является наиболее водоносной рекой [3] и на протяжении веков была полноводной и необузданной.

По территории Узбекистана она проходит средним и нижним течением. Из притоков Амударьи по территории Узбекистана протекает большая часть рек бассейна Сурхандарьи, реки Шерабад, Зарафшан и Кашкадарья. Общий сток с горной области бассейна Амударьи составляет 2500 м^3/с или 79 млрд. м^3 в год. Воды Амударьи на территории Узбекистана расходуется на орошение земель Каракалпакии и ряда областей (Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Кашкадарьинской), включая земли Каршинской степи в низовьях Зарафшана, куда подается Каршинским и Аму-Бухарским машинными каналами.

В настоящее время воды реки доходят до Аральского моря лишь в период наиболее сильных весенних паводков, так как забираются на орошение. В 1971 году Амударья впервые за свою историю не смогла дойти до моря. Потом это повторилось через пять лет, а к началу 80-х Арал стал

[58] https://rivers.help/n/2230

[59] «Оқ-су» и «қора-су» соответственно на русском языке означают «белая вода» и «черная вода».

[60] Амударья в прошлом называлась по-разному. Одним из этих названий был *«Джейхун»*. Греки во времена Александра Македонского именовали Амударью «*Оксом*».

стремительно скукоживаться. В 1985 году он разделился на две части — Северный (Малый) и Южный (Большой) Аралы.

Сурхандарья образуется слиянием рек Туполанга и Каратага. Средний расход р. Туполанга при выходе из гор 52 м^3/с, а р. Каратага – 23 м^3/с. Наиболее крупные притоки Сурхандарьи – Сангардак и Ходжаипак.

Шерабад имеет незначительную удельную водоносность (2,55 л/с с 1 км^2 или по среднему расходу – 7,5 м^3/с).

*Кашкадарья. С*уммарный приток поверхностных вод из горной области бассейна в равнинную может быть оценен средним многолетним расходом 50 м^3/с. Весь сток целиком расходуется на орошение, теряется на фильтрацию и рассеивается в атмосферу в пределах равнинной части бассейна.

Зарафшан. Наиболее крупные притоки – Фандарья, Магиан, Ештут. Общий поверхностный сток из горной области бассейна может быть оценен в 190 м^3/с.

Сырдарья [61] – вторая после Амударьи по водоносности река Центральной Азии. По территории Узбекистана она проходит верхним и частично средним течением. Сырдарья образуется слиянием рек Нарына и Карадарьи. Водами Сырдарьи орошаются земли Андижанской, Ферганской, Наманганской и Ташкентской областей Узбекистана.

Нарын образуется слиянием рек Большого и малого Нарына. К Узбекистану относится только самая нижняя часть его бассейна.

Карадарья образуется слиянием рек тара и Каракульджи. Наиболее крупными притоками Сырдарьи в пределах Ферганской долины являются слева – Исфайрам, Шахимардан, Сох, Исфара, Ходжабакирган, Аксу, справа – Падшаата, Касансай, Гавасай, Чаадаксай. После выхода из Ферганской долины Сырдарья принимает справа р. Ахангаран, Чирчик, Келес, Арысь[62]. Наиболее крупный приток в Ферганской долине – р. Сох. Общий сток с водосборной площади бассейна реки Сырдарьи равен примерно 38 млрд. м^3.

Чирчик – наиболее многоводный приток Сырдарьи. Образуется от слияния рек Чаткал и Пскем. Средний многолетний расход р. Чирчик на выходе их гор составляет 224 м^3/с.

Ахангаран. Водосбор р. Ахангаран формирует сток в 43 м3/с или 1,25 км3 в год.

Сырдарья ранее впадала в Аральское море, ныне, вследствие катастрофического снижения его уровня и распада моря на две части (в 1989 году), река впадает в северную часть моря (так называемое «Малое море»). Воды Сырдарьи в значительной мере разбираются на орошение, в связи с этим нынешний объём стока в устье значительно снизился по сравнению с условно-естественным периодом (до 1960 года).

Озера. Айдаро-Арнасайская система озер - система бессточных озёр в Узбекистане, которая включает в себя Айдаркуль, Тузкан и Восточно-

[61] Одним из многочисленных названий р. Сырдарья в прошлом было - *«Сейхун».*
[62] Притоки Келес и Арысь протекают полностью по территории Казахстана.

Арнасайские озёра. Эта водная система образовалась в середине XX века. Основные изменения в режиме озер связаны с развитием орошаемого земледелия. Айдаро-Арнасайская система озер входит в перечень международных охраняемых озер и ветландов.

Подземные воды

Подземные воды, являясь частью водных ресурсов Центральной Азии, представляют интерес как местный или дополнительный источник оросительной воды, а в большинстве случаев выступает в качестве основного источника воды для водоснабжения населения. Подземные воды, главным образом, восполняются за счет переменных атмосферных осадков, инфильтрации с рек и просачивания возвратного стока от водопользователей верхнего течения.

Подземные воды тысячелетиями привлекают внимание исследователей. В этом отношении особый интерес представляет дошедшие до нас труды Абу Райхана Мухаммада аль Беруний (973 – 1048 годы), который доказал преобладание в природе инфильтрационного питания подземных вод, перепада их уровня и формирование качества подземных вод в процессе взаимодействия ее с окружающей средой и т.д. Развитие учения о подземных водах позволили с древних времен правильно решать многие практические задачи ирригации [7].

1. Материальное рукотворное водное наследие: объекты ирригации

Рукотворное водное наследие Узбекистана включает инфраструктуру для водопоставки: аккумулирования, забора, транспортировки и распределения воды. Эти объекты отражают многовековую эволюцию инженерной мысли и представляют ценность как для современного управления, так и для культурно-исторического наследия.

Для выполнения функций по водопоставке в Узбекистане на протяжении многих столетий строилась водохозяйственная инфраструктура для аккумулирования/хранения, забора, транспортировки и подачи воды пользователям.[63] Пройден длинный путь от местных/неинженерных к полу-инженерным[64] и, далее, к современным инженерным гидросооружениям.

Водохранилища

Для повышения водообеспеченности орошаемых земель путем перераспределения стока во времени на протяжении столетий построено множество разного рода искусственных водоемов/резервуаров: водохранилища многолетнего, сезонного, декадного и суточного регулирования.

[63] Многие из этих сооружений по разным причинам не сохранились, в частности, из-за войн (феодальные войны, нашествие Чингизхана, …).

[64] Некоторые оросительные системы все еще остаются полу-инженерными с присущими им недостатками: большой протяженностью и извилистостью каналов, повышенной фильтрацией воды из них и недостаточной оснащенностью инженерными сооружениями.

В древности на заре ирригации сначала создавались небольшие искусственные резервуары и микро-водохранилища, такырные пруды, хаузы (Бухарская область: Лаби-хауз (рис. 2.1), Боло-Хауз, (блок 2.1); Наманганская область: Маллаховуз, Кечитховуз, …).

В предгорных районах древние ирригаторы использовали хаузы также для накопления подземных вод/родников.

В настоящее время в фермерских/крестьянских хозяйствах местами также используются хаузы/пруды для аккумулирования сбросной воды и ее повторного использования (рис. 2.2). Местами сохранились хаузы и в махаллях, но они используются, главным образом, для бытовых нужд (рис. 2.3).



Рис. 2.1. Лаби-хауз в Бухаре



Рис. 2.2. Хауз/пруд



Рис. 2.3. Хауз в махалле

Блок 2.1. Боло-Хауз.

Боло-Хауз построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами. Название "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем".

В Узбекистане вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовался вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней.

Первенцами сравнительно крупных водохранилищ Узбекистана были Касансайское и Каттакурганское (предвоенные и военные годы). В послевоенные годы построены Чарвакское, Южносурханское, Чикурганское,

Пачкамарское, Каркидонское, Ташкентское, Куямазарское, Андижанское, Чарвакское, Туямуюнское и др. водохранилища.

В настоящее время в Центральной Азии, включая Узбекистан, очень распространенной является практика строительства малых водохранилищ и гидроэлектростанций. Учитывая то, что сейчас в ряде стран[65] наблюдается практика ликвидации плотин/водохранилищ, целесообразность строительства новых плотин в Узбекистане должна быть изучена и обоснована, так как существуют подходы, согласно которым строительство новых водохранилищ в Центральной Азии поможет решить проблему с дефицитом воды в лишь краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной – усугубит ее.

Водозаборные узлы и сооружения

В древности водозабор первоначально осуществлялся бесплотинным методом. Для забора воды в каналы создавались подпоры посредством сипай-шпор [1, 2] и карабуры-фашинных [66] дамб. Позже стали строить уже плотины/дамбы, вододелители и другие сооружения («мост-акведук Македонского» [8]).

Мосты-вододелители позволяли автоматически, без участия людей пропорционально делить воду реки на всем протяжении относительно равномерно/справедливо. Мосты-вододелители [9] (рис. 2.4) постепенно вышли из строя и перестали выполнять свои функции, тем самым было упущено важное условие равномерного/справедливого распределения воды реки вдоль её русла.[67]

На реках с крутыми склонами и мощным потоком водозаборные сооружения строились из крупных фракций горных пород. На реках с медленным течением строились баражи. На крупных реках водозаборные сооружения имели много выходных каналов. Примитивные водозаборные сооружения местного типа часто размывались и потом строились заново. В советский период примитивные водозаборные сооружения были заменены инженерными сооружениями, построенными по проектам.

[65] В США и Западной Европе идет процесс уничтожения гидроэлектростанций. Плотины разрушаются, водохранилища спускаются именно для восстановления естественного течения рек. https://ia-centr.ru/publications/spory-iz-za-vody-v-tsentralnoy-azii-mogut-obostritsya-eksperty/.

[66] Фашины - перевязанный пучок хвороста для создания запруды. В Хорезме фашины называли навардами. Наварды делались их хвороста и дерна («чим»).

[67] В 1905 - 1910 гг. на реке Зеравшан был построен Ак-Карадарьинский вододелитель, в 1914 г. Раватходжинский плотинный узел, разрушенный паводком в 1921 г. [1].



Рис.2.4. Остатки древнего моста-вододелителя в долине Зарафшан (Шодман Малик, 16 век н.э.).

Каналы

Для повышения водообеспеченности орошаемых земель путем перераспределения стока в пространстве в Узбекистане построено множество каналов [68] различного типа: каналы с антифильтрационным покрытием, земляные каналы, железобетонные лотковые каналы. Ирригационные каналы развивались от простых земляных траншей до сложных систем с антифильтрационными покрытиями и железобетонными лотками.

Водное наследие Узбекистана представлено следующими каналами, построенными в далеком прошлом (начало нашей эры):

- Хорезмский оазис: Шават (~1000 лет), Палван-ата, Газават.
- Ташкентский оазис: Боз-су (~1000 лет), Зах, Салар, Карасу, Джун, Калькауз, Ханым.
- Бухарский оазис: Шахруд, Рамитанруд.
- Самаркандский оазис: Норпай, Даргом, Эскиангар, Эски-Туятартар, др.

В предвоенные, военные и послевоенные годы в Узбекистане методом народной стройки («хашар») в кратчайшие сроки были построены такие крупные магистральные каналы (МК) как БФМК[69] (рис. 2.5), ЮФМК, СФМК, АМК, ЮГМК[70], Ташкентский канал, Ташсака, др.

[68] На узбекском: арык, арна, анхор, канал.
[69] Ввод в действие БФМК позволил оросить дополнительно около 100000 га целинных земель [9].
[70] БФМК – Большой Ферганский МК, ЮФМК – Южно-Ферганский МК, Ферганский МК, СФМК – Северно-Ферганский магистральный канал, АМК – Андижанский МК, ЮГМК - Южно-Голодностепский МК.




Рис. 2.5. Строительство БФМК[71]

Земли Узбекистана орошаются также из межгосударственных каналов. В частности, например, из канала «Дустлик»[72]. Канал «Дустлик» в бассейне р. Сырдарья стабильно функционирует уже на протяжении более 100 лет. Это крупнейший трансграничный магистральный канал, который протекает через территории Узбекистана и Казахстана.

Примером одного из первых ирригационных каналов межбассейновой переброски стока (из бассейна р. Зарафшан в бассейн р. Санзар) является канал «Эски Туятортар» (~2000 лет) [3] в долине р. Зеравшан. Он представляет собой выдающийся памятник гидротехнической мысли, опередивший своё время как по масштабам, так и по уровню технических решений. Название канала Эски Туятортар «раскрывает искусство древних ирригаторов, которые, чтобы определить нужную скорость протока воды при отсутствии геодезических инструментов, нагружали верблюдов и пускали их в нужном направлении, трассируя русло будущего канала по ходу каравана» [10][73]. особенность этого канала заключается в том, что на всей своей длине он имеет абсолютно одинаковый уклон [6].

Каналы «Эски Туятортар» и «Дустлик» получили престижную награду WHIS Award 2025 (всемирное ирригационное наследие) (рис. 2.6, 2.7) [11].

Водоподъемные устройства/сооружения

Чигири — это водоподъемные устройства, которые также известны как персидские колеса, переливающее воду из арыка, часто в другой арык. Иногда чигири образуют целые "лестницы" арыков, поднимающие воду на десятки метров. Чигирь представляет собой частично погруженное в воду вертикально расположенное колесо с ковшами, прикрепленными к его ободу. При вращении колеса потоком воды, ковши заполняются, а затем опорожняются в приемный лоток, расположенный выше по высоте, по которому вода подается на орошаемые поля.

[71] Тысячи дехкан были мобилизованы для строительства БФМК осенью 1939 г. (расход 100 м^3/сек, длина 270 км). Он был построен всего за 45 дней методом «хашара».

[72] Дустлик («Дружба», в советские годы - канал имени С. М. Кирова, а до этого – Романовский канал). Начинается от сбросного канала Фархадской ГЭС на реке Сырдарье. Строительство канала Дустлик началось в 1907 году и было завершено в 1913 году.

[73] Примечательно, что в мировой практике не только верблюд, но и осел использовался как инструмент народной ирригации.

Чигирь был самым распространенным водоподъемным устройством, способным поднимать воду до 4 м в высоту и даже выше. Когда вода поднималась из глубоких арыков, водоподъемные колеса поворачивались от тягловых животных. К 1917 году только в низовьях реки Амударьи численность чигирей составляла более 60000, которые действовали до 1930-х годов и некоторые из которых сохранились до настоящего времени (рис. 2.8) [9].[74]



Рис. 2.6. Старое головное сооружение канала Дустлик



Рис. 2.7. Канал Эски Туятортар



Рис. 2.8. Чигирь

Насосные станции

Развитие машинного орошения в Центральной Азии происходило за счет строительства крупных и уникальных низко-и средненапорных насосных станций, таких как Хамзинская, Куямазарская, Шерабадская. Каскады

[74] В начале постсоветского периода, когда были большие проблемы в сельской местности с электричеством, чигири в Центральной Азии вновь начали широко использовать, главным образом, при водозаборе из канала непосредственно в приусадебные участки и в крестьянские хозяйства.

насосных станций построены для подачи воды в Аму-Бухарский и Каршинский машинные каналы.[75]

Сооружения для забора подземных вод

Сардобы. Из истории известны такие сооружения как сардоба[76], кяриз[77] которые служили, главным образом, для обеспечения населения и скота водой и для создания микроклимата. Сардоба – это крытый водоем. Названия сардоб в Узбекистане — Мирза сардоба, Ёгочли сардоба (Акалтынский район Сырдарьинской области). Караулбазар-сардоба (Бухарская область) (рис 2.9).

Кяризы строились в виде ряда вертикальных колодцев, соединенных туннелями, имеющими небольшой уклон. Это техника перехвата потока подземных вод обеспечивала доставку больших объемов воды на поверхность земли без необходимости использования насосов. Названия кяризов в Узбекистане - Султонкориз, Мирзакориз, Халфакориз (Нуратинский район Навоийской области).

2. Анализ элементов водного наследия

Ключевые проблемы ирригации

Ключевые проблемы ирригации имеют природное и антропогенное происхождение:

- Природное (форс-мажор):
  - маловодье;
  - многоводье (наводнение, сель...);
  - жара, гармсиль;
- Антропогенное (потери воды, нарушения режимов водотоков и рек, степень регулирования стока, …):
  - количество воды:
    - потери на фильтрацию;
    - потери на сброс;
  - качество воды:
    - минерализованность воды;
    - загрязненность воды (угроза экосистемам, здоровью людей и источникам водоснабжения в нижнем течении).

[75] Интересно то, что при проектировании этих каналов рассматривались и самотечные варианты заборы воды из Амударьи, но они были отвергнуты. В настоящее время считается разумным подход, при котором использование насосов целесообразно только в тех случаях, когда гравитационное (самотечное) орошение не представляется технически или экономически целесообразным.

[76] Слово «сардоба» означает - крыша над водой.

[77] На узб. - «кориз».



Рис. 2.9. Караулбазар-сардоба. XVI век.

Виды элементов водного наследия

Анализ показывает, что элементы водного наследия можно условно поделить на

– Актуальные элементы водного наследия, которые продолжают широко использоваться (хорошо сохранившаяся водохозяйственная инфраструктура, …).

– Элементы водного наследия, имеющие не столько практическую, сколько культурно-историческую ценность (сардобы, кяризы, водоемы/хаузы, мосты вододелители, …).

– Негативные элементы материального водного наследия.

– Позитивные элементы материального водного наследия.

Элемент водного наследия рассматривался как позитивный, если он:

– Снижал потери воды.

– Повышал управляемость.

– Обеспечивал справедливость распределения.

– Был устойчив к природным колебаниям.

Негативные элементы водного наследия

Можно выделить следующие негативные черты/элементы водного наследия:

– Значительная часть ирригационной инфраструктуры в Узбекистане находится в изношенном состоянии и, как следствие, имеют место большие потери оросительной воды при ее транспортировке.

– Загрязнение источников орошения (блок 3.1).

Блок 3.1. О загрязнении источников орошения.

В народе говорят: «Сувни хор қилган узи унга зор бўлади»[78] *и «Ўзинг сув ичадиган қудуққа тупурма»*[79]*. Распространенной является практика, когда грязная вода из коллекторов сбрасывается обратно в реку, а потом опять эта вода ниже по течению забирается на орошение – это все равно, что плевать в колодец, «откуда сам воду пьешь»*[80].

Позитивные элементы водного наследия

Позитивные черты/элементы водного наследия:

– Хорошо сохранившаяся и модернизированная/реконструированная часть водохозяйственной инфраструктуры.

– Закольцованные источники орошения путем переброски части стока одних рек в бассейны других.

– Практика:

- оснащения оросительной сети средствами водоучета (водомеры: Чиполетти, Вентури, САНИИРИ, Томсона, …);
- перехода от системы машинного орошения к самотечному там, где это возможно/целесообразно даже с учетом частичной потери орошаемых земель и, соответственно, снижения коэффициента земельного использования.

Связь материального наследия с ИУВР

Анализ показал закономерности, отражающие связь материального наследия с ключевыми принципами интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР): комплексность, многофункциональность, эффективность, экологическая устойчивость и справедливое распределение воды [7, 8].

Исторические магистральные каналы способствуют пространственной интеграции водных ресурсов и формируют предпосылки для равномерного распределения воды. Локальные аккумулирующие сооружения (хаузы, малые водоёмы) повышают устойчивость системы к климатической вариабельности.

Традиционные водоподъёмные устройства демонстрируют энергонезависимые решения, адаптированные к местным условиям.

Современные насосные станции, напротив, усиливают энергетическую зависимость системы и требуют модернизации. Сооружения типа сардоб и кяризов иллюстрируют возможности поддержания локального водного баланса.

Заключение

Анализ материального водного наследия Узбекистана демонстрирует следующее:

– Исторический путь развития ирригации прошел эволюцию от простых, адаптированных к местным условиям, сооружений к масштабным инженерным системам.

---

[78] На русском: «Тот, кто унизил (загрязнил) воду, испытает большую нужду в ней».

[79] На русском: «Не плюй в колодец, откуда сам воду пьешь».

[80] Примером может служить отвод сбросных и дренажных вод в Сырдарью и Арнасай с помощью Центрального, Акбулакского, Главного пойменного, Шурузякского, Пограничного и других коллекторов.

– Материальное водное наследие Узбекистана представляет собой сложную совокупность природных и рукотворных инфраструктурных решений, сформированных в различных исторических условиях и ориентированных на иные управленческие приоритеты, чем те, которые актуальны в настоящее время. Эти элементы определяют технологическую конфигурацию системы водопоставки, структуру водораспределения и характер эксплуатационных затрат, тем самым оказывая прямое влияние на управляемость и устойчивость водохозяйственного комплекса.

– Часть объектов наследия способствует повышению гибкости системы (локальные аккумулирующие сооружения, самотечные схемы, адаптированные к местным условиям решения), тогда как другие элементы усиливают её инерционность и энергетическую зависимость (крупные насосные каскады, протяжённые магистральные системы с высокими потерями воды). Таким образом, инфраструктурное наследие выступает не только как физический актив, но и как фактор институционально-технологических ограничений.

– Инфраструктурное водное наследие следует трактовать как элемент, формирующий условия трансформации водохозяйственной системы, а его анализ — как важную составляющую разработки стратегий устойчивого управления водными ресурсами.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости переориентации водной политики с экстенсивного развития инфраструктуры на повышение управляемости, эффективности водопоставки и адаптивности существующих систем. Модернизация, реконструкция и функциональная оптимизация объектов наследия должны рассматриваться как ключевой инструмент перехода к более устойчивой модели управления водными ресурсами.

Главный извлекаемый урок заключается в необходимости нахождения баланса: между новым строительством и модернизацией существующего, между масштабными водохранилищами и малыми формами аккумулирования, между машинным и самотечным водоподъемом. Эти принципы должны лечь в основу современной водной стратегии страны.

Улучшение ирригационной инфраструктуры должна включать, например [13]

– Совершенствование средств аккумулирования путем, например, замены проблемных плотин на более эффективные, оснащение их рыбоходами и системами пропуска речных осадков (из-за работы гидроэлектростанций (ГЭС)) экосистемы ниже по течению недополучают важный для них ил).

– Совершенствование водозаборных/водовыпускных сооружений путем 1) уменьшения их чувствительности/уязвимости; 2) регулирования по нижнему бьефу; и 3) обеспечению широкого диапазона измерения расходов воды.

– Замену энергоемких насосных станций на более рациональные, работающие на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

– Установку резервных насосов для устранения пиковых расходов в каналах.

– Оснащение обновленными системами/устройствами оповещения и охраны.

– Использование средств самотечного водозабора вместо средств машинного водозабора (насосных станций/установок), др.

Использованные источники:

1. Кадыров А. От исторических мостов-вододелителей на р. Зарафшан до ИУВР. (Интегрированного Управления Водными Ресурсами). https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cacena_files/ru/pdf/kadyrov_iwrm.pdf.
2. Духовный В.А. На рубеже водного дефицита нужна стратегия водосбережения. https://www.gazeta.uz/ru/2018/02/27/water-resources/.
3. Ирригация Узбекистана. Том. 1. «ФАН», Ташкент, 1975.
4. Шаров, И.А. Эксплуатация гидромелиоративных систем. М., Колос, 1968.
5. Духовный В.А., де Шуттер Ю. Вода в Центральной Азии: прошлое, настоящее, будущее. http://www.eecca-water.net/content/view/16335/52/lang,ru/
6. Духовный В.А. Введение в водное хозяйство. http://sic.icwc-aral.uz/heritage/intro-in-water-economy-ru.pdf
7. Мирзаев С. Ш. Подземные воды. (В сб. Справочник по хлопководству). Изд-во Узбекистан, 1981.
8. Ирригация Узбекистана. Том. 3. «ФАН», Ташкент, 1979.
9. Ирригация и дренаж в Республике Узбекистан. История и современное состояние. Ташкент 2020. http://aral.uz/doc/NCID_book_web_ru.pdf.
10. Джурабеков И., Духовный В. «Вода — наше прошлое, настоящее и будущее». https://xs.uz/ru/post/irrigators.
11. Два канала из Центральной Азии получили престижную награду WHIS AWARD 2025. http://sic.icwc-aral.uz/releases/rus/588.htm.
12. Мирзаев Н.Н. Управление водопользованием в Узбекистане: наследие, уроки. В сб. «Водное наследие Центральной Азии: его ценность для нынешнего и будущего поколений» Ташкент 2026. Изд. «Voris-nashriyot». https://cawater-info.net/publications/index.htm
13. Мирзаев Н.Н., Ишанов Ж.Х. Модернизация ирригационной инфраструктуры: значение, проблемы, меры. "Экономика и социум" №9(136)2025. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_f239e877dd1c48a29ea4e8056714fe5d.pdf?index=true

УДК 347.922

Мусаев Н.В.
студент
Университет Синергия г. Москва

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: *В статье анализируются особенности судебной защиты информационных прав граждан и организаций в условиях цифровизации общественных отношений. Рассматриваются основные подходы к пониманию информационных прав, их нормативное закрепление и специфика судебной защиты. Особое внимание уделяется практике Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, формирующей критерии допустимых ограничений свободы информации и ответственности субъектов цифровых правоотношений. Делается вывод о возрастающей роли судебной власти в обеспечении баланса между публичными и частными интересами в информационной сфере.*

Ключевые слова: *информационные права, судебная защита, доступ к информации, цифровые технологии, интернет, Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ.*

Musaev N.V.
student
Synergy University
Moscow

JUDICIAL PROTECTION OF INFORMATION RIGHTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

Abstract: *The article analyzes the peculiarities of judicial protection of information rights of citizens and organizations in the context of digital transformation. The main approaches to understanding information rights, their normative consolidation and the specifics of judicial protection are considered. Special attention is paid to the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation, which forms criteria for permissible restrictions on freedom of information and responsibility of participants in digital relations. The conclusion is made about the growing role of the judiciary in ensuring a balance between public and private interests in the information sphere.*

Keywords: *information rights, judicial protection, access to information, digital technologies, Internet, Constitutional Court of the Russian Federation, Supreme Court of the Russian Federation.*

Развитие цифровых технологий привело к тому, что информация стала не только важнейшим ресурсом, но и объектом повышенного правового регулирования. Современное общество характеризуется высокой степенью зависимости от информационных систем, сетевых платформ и цифровых сервисов, что неизбежно порождает новые риски нарушения прав человека в информационной сфере.

Информационные права охватывают широкий спектр правомочий: право на доступ к информации, право на ее распространение, право на защиту персональных данных, право на информационную безопасность. Нарушения этих прав все чаще становятся предметом судебных споров, что обусловливает актуальность исследования механизмов судебной защиты информационных прав.

В юридической науке информационные права традиционно рассматриваются как совокупность субъективных прав, обеспечивающих возможность свободного получения, использования, распространения и защиты информации. В основе данных прав лежит статья 29 Конституции Российской Федерации, закрепляющая свободу мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2] конкретизирует содержание информационных прав, вводя такие категории, как доступ к информации, конфиденциальность, режимы правовой охраны информации.

При этом в условиях цифровизации информационные права приобретают новое качество: они реализуются преимущественно в сети Интернет, через электронные платформы и автоматизированные системы, что усиливает зависимость граждан от действий провайдеров, операторов связи и владельцев цифровых сервисов.

Судебная защита является универсальным механизмом восстановления нарушенных информационных прав. В судебной практике наиболее распространены следующие категории дел:

– споры о незаконном распространении персональных данных;

– дела о блокировке интернет-ресурсов;

– споры о защите чести, достоинства и деловой репутации в сети Интернет;

– дела о неправомерном доступе к информации;

– споры, связанные с деятельностью поисковых систем и цифровых платформ.

Особенность судебной защиты информационных прав заключается в сложности доказывания: истцу необходимо установить факт распространения информации, её содержание, противоправность действий ответчика, а также причинно-следственную связь между нарушением и наступившими последствиями.

Ключевое значение для формирования стандартов защиты информационных прав имеет практика Конституционного Суда Российской Федерации. В определении от 17 июля 2014 г. № 1759-О [3] Суд указал, что свобода распространения информации не является абсолютной и может быть ограничена федеральным законом в целях защиты здоровья, нравственности и безопасности государства.

При этом Конституционный Суд сформулировал важнейший принцип: любые ограничения информационных прав должны быть справедливыми, соразмерными и необходимыми, а также не затрагивать само существо конституционного права. Государство обязано использовать только минимально достаточные меры вмешательства.

Особо подчеркивается, что блокировка интернет-ресурсов допустима лишь при наличии эффективных механизмов судебного обжалования и правовой определенности процедур.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 г. № 37 [4] сыграло важную роль в формировании единообразной практики по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Верховный Суд дал расширительное толкование понятию «компьютерная информация», отнеся к ней любые данные, представленные в форме электрических сигналов.

Пленум также указал, что к компьютерным устройствам относятся не только традиционные компьютеры, но и смартфоны, планшеты, встроенные цифровые системы. Это существенно расширяет сферу уголовно-правовой защиты информационных прав и усиливает ответственность за неправомерный доступ, уничтожение или модификацию информации.

Таким образом, судебная практика Верховного Суда подтверждает тенденцию к усилению правовой охраны информации как самостоятельной ценности.

Несмотря на активное развитие судебной практики, в сфере защиты информационных прав сохраняются серьезные проблемы:

– отсутствие единого понятия информационных прав в законодательстве;
– фрагментарность правового регулирования;
– сложность доказывания в цифровой среде;
– высокая зависимость граждан от действий технических посредников.

Перспективы развития судебной защиты связаны с дальнейшей цифровизацией судопроизводства, развитием электронных доказательств, формированием специализированной судебной практики по цифровым спорам и усилением роли судебных разъяснений.

Судебная защита информационных прав в современных условиях приобретает ключевое значение. Именно суды формируют реальные стандарты допустимого вмешательства в свободу информации и обеспечивают баланс между интересами личности, общества и государства.

Практика Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации демонстрирует устойчивую тенденцию к расширению правовой охраны информации и усилению ответственности субъектов цифровых правоотношений. Это позволяет говорить о формировании самостоятельного направления судебной защиты — защиты прав человека в цифровой среде.

Использованные источники:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета, № 165, 29.07.2006. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)
3. Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2014 № 1759-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Харитонова Владимира Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, март, 2023.
5. Амелин Р.В. Государственные и муниципальные информационные системы в российском информационном праве: теоретико-правовой анализ: монография (под ред. С.Е. Чаннова). - Специально для системы ГАРАНТ, 2018.
6. Гулемин А.Н. Цифровые экосистемы в современном праве: анализ национальных и международных подходов // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2024. № 5. С. 27 – 36.
7. Тарасенкова, А.Н. Информационное право: возрастная маркировка, цифровая безопасность и другие вопросы. - М.: Редакция «Российской газеты», 2019.

Мухамедова О.С.
учитель химии
общеобразовательная школа №21
Кызылтепинского района Навоийской области

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ТОКСИЧНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация: *В статье подробно рассматривается экологическое состояние Навоийской области как одного из индустриально развитых регионов Республики Узбекистан. Проанализированы основные источники загрязнения атмосферного воздуха, включая промышленные предприятия, автотранспорт и природно-климатические факторы. Раскрыто негативное воздействие токсичных веществ и загрязненного воздуха на организм человека, особенно на дыхательную, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Особое внимание уделяется современным методам очистки воздуха, применяемым на промышленных объектах и в населенных пунктах, а также роли экологического образования и профилактики. В статье подчеркивается необходимость комплексного подхода к решению экологических проблем для обеспечения здоровья населения и устойчивого развития региона.*

Ключевые слова: *экология, загрязнение атмосферного воздуха, Навоийская область, токсичная среда, промышленные выбросы, здоровье человека, очистка воздуха, фильтрационные установки, экологическая безопасность.*

Mukhamedova O.S.
chemistry teacher
Secondary School No. 21
Kyzyltepa District, Navoi Region

ENVIRONMENTAL STATE OF THE NAVOI REGION, ITS HAZARD TO THE HUMAN BODY, AND WAYS TO PURIFY AIR FROM TOXIC AIR USING AIR PURIFICATION DEVICES

Abstract: *This article examines in detail the environmental status of Navoi Region, one of the industrially developed regions of the Republic of Uzbekistan. The main sources of air pollution, including industrial enterprises, motor vehicles, and natural and climatic factors, are analyzed. The negative impact of toxic substances and polluted air on the human body, particularly on the respiratory, cardiovascular, and immune systems, is revealed. Particular attention is paid to modern air*

purification methods used at industrial facilities and in populated areas, as well as the role of environmental education and prevention. The article emphasizes the need for an integrated approach to addressing environmental issues to ensure public health and sustainable development in the region.

Key words: *ecology, air pollution, Navoi region, toxic environment, industrial emissions, human health, air purification, filtration systems, environmental safety.*

Введение

В условиях современного мира экологические проблемы становятся одной из наиболее острых и значимых угроз для человечества. Быстрый рост промышленности, урбанизация и увеличение потребления природных ресурсов приводят к загрязнению окружающей среды, в первую очередь атмосферного воздуха. Загрязнение воздуха напрямую отражается на здоровье человека, снижая продолжительность и качество жизни.

Навоийская область занимает особое место среди регионов Узбекистана благодаря высокой концентрации промышленных предприятий. Развитие горнодобывающей, химической, металлургической и энергетической промышленности способствует экономическому росту, однако одновременно увеличивает антропогенную нагрузку на окружающую среду. Выбросы вредных веществ в атмосферу формируют токсичную среду, представляющую опасность для населения.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения экологических рисков и поиска эффективных путей очистки воздуха с применением современных технических и организационных мер.

Общая характеристика экологического состояния Навоийской области

Навоийская область характеризуется сложной экологической обстановкой, обусловленной сочетанием природных и антропогенных факторов. Климат региона засушливый, с частыми пыльными бурями и сильными ветрами, что способствует распространению загрязняющих веществ на большие расстояния. В таких условиях даже незначительные выбросы могут приводить к значительному ухудшению качества атмосферного воздуха.

На территории области функционируют крупные промышленные предприятия, в процессе деятельности которых в атмосферу поступают диоксид серы, оксиды азота, угарный газ, аммиак, сероводород, а также соединения тяжелых металлов и пылевые частицы. Данные вещества относятся к категории токсичных и при длительном воздействии оказывают разрушительное влияние на экосистему и здоровье человека.

Значительный вклад в загрязнение воздуха вносит автотранспорт. Рост количества автомобилей приводит к увеличению концентрации выхлопных газов, содержащих оксиды азота, углеводороды и сажу. Особенно остро проблема проявляется в городах и районных центрах, где наблюдается высокая плотность населения.

Опасность загрязненного воздуха для организма человека

Атмосферный воздух является жизненно важным фактором для человека, и его качество напрямую определяет состояние здоровья. Загрязненный воздух содержит токсичные вещества, которые при вдыхании проникают в дыхательные пути, легкие и далее в кровеносную систему.

Наиболее уязвимой является дыхательная система. Длительное воздействие загрязненного воздуха способствует развитию хронических заболеваний, таких как бронхит, бронхиальная астма, аллергические реакции и пневмония. Мелкодисперсная пыль и тяжелые металлы способны накапливаться в организме, вызывая хроническую интоксикацию.

Кроме того, загрязнение воздуха негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая риск гипертонии, ишемической болезни сердца и инсультов. У детей загрязненный воздух может вызывать задержку физического и умственного развития, снижение иммунитета и частые инфекционные заболевания. У пожилых людей наблюдается обострение хронических болезней.

Таким образом, токсичная среда представляет серьезную угрозу для здоровья населения Навоийской области и требует принятия срочных профилактических мер.

Современные методы очистки воздуха на промышленных объектах

Одним из наиболее эффективных способов снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха является внедрение современных очистных устройств на промышленных предприятиях. Газоочистные установки позволяют значительно уменьшить количество вредных выбросов, поступающих в окружающую среду.

Широко применяются электрофильтры, которые эффективно улавливают мелкие пылевые частицы и аэрозоли. Циклоны используются для отделения крупных частиц пыли, а скрубберы позволяют очищать газовые выбросы от растворимых токсичных веществ. Рукавные фильтры обеспечивают высокую степень очистки воздуха и широко применяются в химической и металлургической промышленности.

Внедрение замкнутых технологических циклов и повторное использование отходов производства также способствует снижению экологической нагрузки и рациональному использованию природных ресурсов.

Очистка воздуха в населенных пунктах и профилактические меры

Помимо промышленных очистных систем, важное значение имеют меры по улучшению качества воздуха в населенных пунктах. Использование бытовых и общественных очистителей воздуха в школах, детских садах и медицинских учреждениях способствует снижению концентрации пыли и аллергенов.

Озеленение территорий играет значительную роль в очищении воздуха, так как зеленые насаждения поглощают углекислый газ, задерживают пыль и улучшают микроклимат. Создание санитарно-защитных зон вокруг

промышленных объектов позволяет снизить воздействие вредных выбросов на жилые районы.

Роль экологического образования

Экологическое образование и воспитание являются важнейшими элементами профилактики экологических проблем. Формирование экологической культуры у населения способствует ответственному отношению к природе и собственному здоровью.

Учителя химии и естественных наук играют ключевую роль в экологическом просвещении учащихся, объясняя влияние химических веществ на окружающую среду и организм человека. Экологические знания способствуют формированию осознанного поведения и устойчивого развития общества.

Заключение

Экологическое состояние Навоийской области характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки и представляет серьезную опасность для здоровья населения. Загрязнение атмосферного воздуха является одной из ключевых экологических проблем региона.

Комплексный подход, включающий внедрение современных очистных устройств, снижение промышленных выбросов, развитие озеленения и повышение экологической грамотности населения, является необходимым условием улучшения экологической ситуации. Реализация данных мер позволит создать более безопасную и здоровую среду для жизни и устойчивого развития Навоийской области.

Использованные источники:

1. Абдурахманов А.А. Экология и охрана окружающей среды. — Ташкент: Ўқитувчи, 2020.
2. Гуревич П.С. Экологическая безопасность и здоровье человека. — Москва: Академия, 2019.
3. Каримов И.Р. Современные методы очистки воздуха и промышленные фильтры. — Ташкент: Фан, 2021.

УДК 616.352-007.253-089

Мухтаров Р.И.
самостоятельный соискатель
кафедра Общей хирургии
Самаркандский государственный медицинский университет
Хужабаев С.Т.
Доцент
кафедра Общей хирургии
Самаркандский государственный медицинский университет
Дусияров М.М.
доцент
кафедра Общей хирургии
Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ

Резюме. *Проведен ретроспективный анализ 248 пациентов со сложными параректальными свищами, оперированных в период с 2018 по 2024 год. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от применяемой хирургической методики: традиционное иссечение свища с ушиванием сфинктера, использование лигатурного метода и применение пластических методик с перемещением лоскутов. Наилучшие результаты получены при применении дифференцированного подхода к выбору метода операции с учетом локализации внутреннего отверстия свища, степени вовлечения сфинктерного аппарата и наличия рубцовых изменений. Частота рецидивов составила 8,3% при использовании пластических методик против 24,7% при традиционном иссечении. Функциональные результаты оценивались по шкале Wexner: средний балл составил 3,2±1,1 при пластических операциях и 7,8±2,3 при традиционном иссечении.*

Ключевые слова: *параректальный свищ, хирургическое лечение, пластические операции, сфинктеросохраняющие методики, функциональные результаты, рецидив.*

Mukhtarov R.I.
independent researcher
Department of General Surgery
Samarkand State Medical University
Khujabaev S.T.
associate professor
Department of General Surgery
Dusiyarov M. M.
associate professor
Department of General Surgery
Samarkand State Medical University

COMPARATIVE EVALUATION OF DIFFERENT SURGICAL METHODS FOR COMPLEX PARARECTAL FISTULA TREATMENT

Abstract. *A retrospective analysis of 248 patients with complex pararectal fistulas operated on from 2018 to 2024 was conducted. Patients were divided into three groups depending on the surgical technique used: traditional fistula excision with sphincter suturing, use of ligature method, and application of plastic techniques with flap transposition. Results: the best results were obtained using a differentiated approach to choosing the operation method, taking into account the location of the internal opening of the fistula, the degree of involvement of the sphincter apparatus, and the presence of cicatricial changes. The recurrence rate was 8.3% when using plastic techniques versus 24.7% with traditional excision. Functional results were assessed using the Wexner scale: the average score was 3.2±1.1 for plastic surgeries and 7.8±2.3 for traditional excision.*

Keywords: *pararectal fistula, surgical treatment, plastic surgery, sphincter-preserving techniques, functional outcomes, recurrence.*

Актуальность темы. Проблема хирургического лечения сложных параректальных свищей остается одной из актуальных в современной колопроктологии. По данным различных авторов, частота встречаемости параректальных свищей составляет от 0,01% до 0,03% в общей популяции, при этом на долю сложных свищей приходится до 40% всех случаев. Сложность хирургического лечения данной патологии обусловлена анатомическими особенностями свищевых ходов, высоким риском рецидива заболевания и возможностью развития недостаточности анального сфинктера после операции.

Несмотря на многообразие предложенных методов хирургического лечения, результаты остаются неудовлетворительными. Частота рецидивов после хирургического лечения, по данным разных авторов, колеблется от 5% до 35%, а частота развития недостаточности анального сфинктера достигает 45% при традиционных методах иссечения свища. Эти данные

свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования хирургической тактики при лечении данной категории больных.

К сложным параректальным свищам относятся транссфинктерные свищи с высоким расположением внутреннего отверстия, экстрасфинктерные свищи, подковообразные свищи, рецидивные свищи, а также свищи с множественными наружными отверстиями и гнойными затеками. Основная проблема при лечении таких свищей заключается в необходимости радикального иссечения всех свищевых ходов при сохранении функции анального сфинктера.

В настоящее время существует множество методов хирургического лечения параректальных свищей, включающих традиционное иссечение свища в просвет кишки, лигатурный метод, различные варианты пластических операций с использованием лоскутов слизистой оболочки прямой кишки, подслизистого слоя или перианальной кожи. Однако вопрос о выборе оптимального метода операции в зависимости от анатомических особенностей свища остается дискутабельным.

Особую актуальность приобретает изучение факторов, влияющих на результаты хирургического лечения, включая локализацию внутреннего отверстия свища, степень вовлечения сфинктерного аппарата, наличие рубцовых изменений, сопутствующую патологию прямой кишки и анального канала. Понимание этих факторов позволит разработать дифференцированный подход к выбору метода оперативного вмешательства и улучшить результаты лечения.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей хирургического лечения сложных параректальных свищей и разработка дифференцированного подхода к выбору метода оперативного вмешательства для улучшения непосредственных и отдаленных результатов лечения.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 248 пациентов со сложными параректальными свищами, находившихся на лечении в отделении колопроктологии Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2018 по 2024 год. Критериями включения в исследование являлись: наличие транссфинктерного свища с высоким расположением внутреннего отверстия, экстрасфинктерные свищи, подковообразные свищи, рецидивные свищи, свищи с множественными наружными отверстиями, возраст пациентов от 18 до 75 лет, информированное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения были: интрасфинктерные свищи, свищи, обусловленные специфическими заболеваниями, онкологические заболевания прямой кишки и анального канала, тяжелые соматические заболевания в стадии декомпенсации, отказ пациента от участия в исследовании. Среди обследованных больных мужчин было 186 человек, женщин 62 человека. Возраст пациентов колебался от 22 до 72 лет, средний возраст составил 41,3±8,7 лет.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее общеклинические методы исследования, пальцевое исследование прямой кишки, аноскопию, ректороманоскопию, фистулографию, ультрасонографию с использованием эндоректального датчика, магнитно-резонансную томографию малого таза по показаниям. При физикальном обследовании оценивали количество и локализацию наружных свищевых отверстий, наличие инфильтрации и рубцовых изменений в параректальной клетчатке, состояние кожи перианальной области.

Функциональное состояние анального сфинктера оценивали с помощью аноректальной манометрии до операции и в отдаленном послеоперационном периоде. Измеряли давление покоя и давление волевого сокращения в анальном канале. Для оценки степени анальной инконтиненции использовали шкалу Wexner, которая учитывает недержание газов, жидкого и твердого кала, необходимость ношения прокладок и степень изменения образа жизни. Оценка проводилась по пятибалльной системе по каждому параметру, максимально возможная сумма баллов составляла 20, что соответствовало полной инконтиненции.

Таблица 1

Распределение пациентов по типу параректальных свищей

Тип свища	Количество	%
Транссфинктерные высокие	127	51,2
Экстрасфинктерные	68	27,4
Подковообразные	38	15,3
Рецидивные	15	6,0
Всего	**248**	**100,0**

В зависимости от применяемого метода хирургического лечения все пациенты были разделены на три группы. Первую группу составили 89 пациентов, которым выполнено традиционное иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием раны сфинктера. Во вторую группу вошли 76 пациентов, которым применен лигатурный метод лечения с постепенным прорезыванием и пересечением части сфинктера. Третью группу составили 83 пациента, которым выполнены различные варианты пластических операций с перемещением лоскутов.

Показаниями к традиционному иссечению свища являлись транссфинктерные свищи с вовлечением менее одной трети толщины

наружного сфинктера, отсутствие выраженных рубцовых изменений в зоне внутреннего отверстия свища. Лигатурный метод применялся при транссфинктерных свищах с вовлечением от одной трети до половины толщины наружного сфинктера, а также при невозможности одномоментного иссечения свища без значительного повреждения сфинктера. Пластические операции выполнялись при экстрасфинктерных свищах, высоких транссфинктерных свищах с вовлечением более половины толщины наружного сфинктера, подковообразных свищах, рецидивных свищах.

Таблица 2

Распределение пациентов по группам в зависимости от метода хирургического лечения

Метод лечения	Количество	%
Традиционное иссечение свища	89	35,9
Лигатурный метод	76	30,6
Пластические операции	83	33,5
Всего	**248**	**100,0**

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием программы SPSS версии 23.0. Для оценки нормальности распределения применяли критерий Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении данные представлены в виде средних значений и стандартных отклонений. Для сравнения количественных показателей использовали t-критерий Стьюдента, для качественных показателей применяли критерий хи-квадрат. Различия считались статистически значимыми при $p<0,05$.

Результаты и их обсуждение. Анализ непосредственных результатов хирургического лечения показал, что средняя продолжительность операции в первой группе составила 38,2±7,4 минуты, во второй группе 41,5±8,1 минуты, в третьей группе 67,3±12,6 минуты. Таким образом, пластические операции требовали больше времени для выполнения, что связано с технической сложностью мобилизации и перемещения лоскутов. Интраоперационная кровопотеря во всех группах была незначительной и не требовала гемотрансфузии.

Болевой синдром в раннем послеоперационном периоде оценивали по визуальной аналоговой шкале в баллах от 0 до 10. Наименьшая интенсивность болевого синдрома отмечена в третьей группе и составила в первые сутки после операции 4,1±1,2 балла, в первой группе этот показатель был максимальным и составил 6,8±1,5 балла, во второй группе 5,4±1,3 балла. К пятым суткам послеоперационного периода интенсивность болевого

синдрома во всех группах значительно снизилась и составила соответственно 2,3±0,8, 1,7±0,6 и 1,2±0,5 балла.

Средний срок пребывания в стационаре в первой группе составил 8,4±2,1 дня, во второй группе 9,2±2,3 дня, в третьей группе 7,6±1,8 дня. Более длительное пребывание пациентов второй группы в стационаре было обусловлено необходимостью периодических перевязок и постепенного затягивания лигатуры. В третьей группе, несмотря на большую травматичность операции, сроки госпитализации были минимальными, что связано с первичным заживлением послеоперационной раны при использовании пластических методик.

Послеоперационные осложнения развились у 31 пациента, что составило 12,5% от общего числа оперированных. В структуре осложнений преобладали нагноение послеоперационной раны, которое отмечено у 18 пациентов, кровотечение в раннем послеоперационном периоде у 7 больных, острая задержка мочи у 6 пациентов. В первой группе частота осложнений составила 16,9%, во второй группе 13,2%, в третьей группе 7,2%. Статистически значимое различие в частоте осложнений отмечено между первой и третьей группами.

Таблица 3

Непосредственные результаты хирургического лечения

Показатель	1 группа (n=89)	2 группа (n=76)	3 группа (n=83)
Длительность операции, мин	38,2±7,4	41,5±8,1	67,3±12,6
Болевой синдром 1 сутки, балл	6,8±1,5	5,4±1,3	4,1±1,2
Койко-день	8,4±2,1	9,2±2,3	7,6±1,8
Частота осложнений, %	16,9	13,2	7,2

Отдаленные результаты лечения прослежены у 237 пациентов в сроки от 12 до 72 месяцев, средний срок наблюдения составил 38,4±14,7 месяца. Основными критериями оценки отдаленных результатов служили частота рецидива заболевания и функциональное состояние анального сфинктера. Рецидив заболевания диагностировали при появлении клинических признаков параректального свища: наличие свищевого отверстия на коже перианальной области с гнойным или слизистым отделяемым, данные инструментального обследования, подтверждающие наличие свищевого хода.

Частота рецидивов в первой группе составила 22 случая из 89, что составило 24,7%. Во второй группе рецидив отмечен у 11 пациентов из 76, что составило 14,5%. В третьей группе рецидив развился лишь у 7 пациентов из 83, частота рецидивов составила 8,4%. Различия в частоте рецидивов между

всеми группами были статистически значимыми. Основными причинами рецидива в первой группе были неполное иссечение свищевого хода, нагноение послеоперационной раны с вторичным формированием свища. Во второй группе причинами рецидива явились слишком быстрое прорезывание лигатуры без достаточного фиброзирования тканей, а также неполное дренирование гнойных затеков. В третьей группе рецидивы были связаны с техническими погрешностями при выполнении пластики: недостаточная мобилизация лоскута, натяжение швов, некроз лоскута.

Таблица 4

Частота рецидивов в отдаленном периоде

Группа	Количество рецидивов	Частота, %
1 группа (n=89)	22	24,7
2 группа (n=76)	11	14,5
3 группа (n=83)	7	8,4

Оценка функционального состояния анального сфинктера проводилась через 6 и 12 месяцев после операции. По данным аноректальной манометрии, давление покоя в анальном канале до операции во всех группах существенно не различалось и составляло в среднем 68,4±12,3 мм рт.ст. В первой группе через 12 месяцев после операции этот показатель составил 52,7±9,8 мм рт.ст., что на 23,0% ниже исходного уровня. Во второй группе давление покоя составило 58,3±10,4 мм рт.ст., снижение на 14,8%. В третьей группе давление покоя практически не изменилось и составило 65,1±11,2 мм рт.ст., снижение всего на 4,8%.

Давление волевого сокращения до операции составляло в среднем 142,6±18,7 мм рт.ст. Через 12 месяцев после операции в первой группе этот показатель снизился до 98,4±16,3 мм рт.ст., во второй группе до 112,7±17,8 мм рт.ст., в третьей группе до 131,2±18,1 мм рт.ст. Таким образом, наибольшее снижение функциональных показателей отмечено в первой группе, наименьшее в третьей группе.

Клиническая оценка функции удержания проводилась с использованием шкалы Wexner. До операции у большинства пациентов функция удержания была не нарушена или минимально нарушена, средний балл по шкале Wexner составлял 1,2±0,8. Через 12 месяцев после операции в первой группе средний балл составил 7,8±2,3, во второй группе 5,1±1,7, в третьей группе 3,2±1,1. При этом умеренная степень недостаточности анального сфинктера отмечена у 34,8% пациентов первой группы, 18,4% второй группы и 7,2% третьей группы.

Таблица 5

Функциональные результаты по шкале Wexner через 12 месяцев

Группа	Балл до операции	Балл через 12 мес
1 группа (n=89)	1,2±0,8	7,8±2,3
2 группа (n=76)	1,2±0,8	5,1±1,7
3 группа (n=83)	1,2±0,8	3,2±1,1

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществах применения пластических методик при хирургическом лечении сложных параректальных свищей. Основными преимуществами этих методик являются: возможность радикального иссечения свищевого хода без повреждения сфинктерного аппарата, закрытие внутреннего отверстия свища путем перемещения хорошо васкуляризированных лоскутов, создание условий для первичного заживления послеоперационной раны, сохранение функции анального сфинктера.

Основными техническими принципами выполнения пластических операций являются: тщательная мобилизация лоскута на достаточном протяжении для перемещения его без натяжения, сохранение адекватной васкуляризации лоскута, иссечение рубцово измененных тканей в зоне внутреннего отверстия свища, герметичное ушивание внутреннего отверстия свища, использование атравматичного шовного материала длительного рассасывания. Соблюдение этих принципов позволяет минимизировать риск осложнений и получить хорошие функциональные результаты.

При выборе метода хирургического лечения необходимо учитывать анатомические особенности свища, степень вовлечения сфинктерного аппарата, наличие рубцовых изменений, общее состояние пациента и сопутствующую патологию. Дифференцированный подход к выбору метода операции с учетом этих факторов позволяет достичь оптимальных результатов лечения.

Выводы

Сложные параректальные свищи представляют собой актуальную проблему современной колопроктологии, требующую применения дифференцированного подхода к выбору метода хирургического лечения. В структуре сложных свищей преобладают транссфинктерные свищи с высоким расположением внутреннего отверстия, на долю которых приходится 51,2% всех случаев.

Применение пластических методик при хирургическом лечении сложных параректальных свищей позволяет значительно снизить частоту рецидивов заболевания по сравнению с традиционным иссечением свища.

Частота рецидивов при использовании пластических методик составляет 8,4% против 24,7% при традиционном иссечении.

Пластические операции обеспечивают лучшие функциональные результаты лечения по сравнению с традиционными методами. Средний балл по шкале Wexner через 12 месяцев после операции составляет 3,2±1,1 при пластических операциях и 7,8±2,3 при традиционном иссечении свища.

Основными показаниями к применению пластических методик являются экстрасфинктерные свищи, высокие транссфинктерные свищи с вовлечением более половины толщины наружного сфинктера, подковообразные свищи и рецидивные свищи. Традиционное иссечение свища может применяться при транссфинктерных свищах с вовлечением менее одной трети толщины наружного сфинктера.

Соблюдение технических принципов выполнения пластических операций, включающих тщательную мобилизацию лоскута, сохранение его васкуляризации, иссечение рубцовых тканей и герметичное ушивание внутреннего отверстия свища, является обязательным условием получения хороших результатов лечения.

Использованные источники:

1. Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Благодарный Л.А. Справочник по колопроктологии. Москва: Литтерра, 2019. 596 с.
2. Ривкин В.Л., Капуллер Л.Л., Белоусова Е.А. Колопроктология: руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 368 с.
3. Titanji JP, Akinyemi A, Malhi H, et al. Surgical management of complex anal fistulas: A systematic review and network meta-analysis. Colorectal Disease. 2023;25(3):412-425.
4. Ommer A, Herold A, Berg E, et al. German S3 guidelines: anal abscess and fistula (second revised version). Langenbecks Arch Surg. 2022;407(8):3007-3043.
5. Jayarajah U, Samarasekera DN. Advancement flap procedures for complex anal fistulae: A systematic review and meta-analysis. World J Gastrointest Surg. 2021;13(8):797-808.
6. Amato A, Bottini C, De Nardi P, et al. Evaluation and management of perianal abscess and anal fistula: SICCR position statement. Tech Coloproctol. 2020;24(2):127-143.
7. Garg P, Kaur B, Goyal A, et al. Lessons learned from an audit of 1000 anal fistula patients operated at a non-government peripheral center: A different perspective. World J Gastrointest Surg. 2019;11(1):1-18.
8. Khadia M, Muduli IC, Das K, et al. Management of fistula-in-ano with special reference to ligation of intersphincteric fistula tract. Niger J Surg. 2019;25(1):21-24.
9. Felt-Bersma RJ, Bartelsman JF. Haemorrhoids, rectal prolapse, anal fissure, peri-anal fistulae and sexually transmitted diseases. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2018;32:59-65.

10. Emile SH, Elfeki H, Shalaby M, et al. A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). Surgery. 2018;164(6):1190-1199.
11. Liang J, Church JM. Management of high anal fistulas. Clin Colon Rectal Surg. 2016;29(3):271-279.
12. Wilhelm A. A new technique for sphincter-preserving anal fistula repair using a novel radial emitting laser probe. Tech Coloproctol. 2017;21(6):445-449.
13. Madbouly KM, El Shazly W, Abbas KS, et al. Ligation of intersphincteric fistula tract versus mucosal advancement flap in patients with high transsphincteric fistula-in-ano: A prospective randomized trial. Dis Colon Rectum. 2018;61(9):1019-1025.
14. Mushaya C, Bartlett L, Schulze B, et al. Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT) in combination with advancement flap for anal fistula. Tech Coloproctol. 2016;20(9):613-618.
15. Visscher AP, Schuur D, Roos R, et al. Long-term follow-up after surgery for simple and complex cryptoglandular fistulas: fecal incontinence and impact on quality of life. Dis Colon Rectum. 2016;59(6):533-539.

Наврузова Л.Х., PhD
доцент
кафедра терапевтической стоматологии
Бухарский государственный
медицинский институт
ORCID ID 0000-0001-7586-6579

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ

Аннотация. *Изменения функций желез внутренней секреции приводят к нарушениям метаболических процессов в организме, ряду трофических нарушений. Изменения в полости рта выявляются при расстройстве функций половых, щитовидной и паращитовидной желез, гипоталамо-гипофизарной системы с целью чего исследовано оценка состояния гигиены полости рта и внедрить методы профилактики и лечения кариеса и некариозных заболеваний при гиперпаратиреозе. Больны**е**, поступивши**е** с кариозными и некариозными повреждениями зубов, не зависимо от наличия или отсутствия гиперпаратиреоза исследованы соматическая патология, возраст, даже изменения климатических условий так как это могло быть причиной вымывания кальция и фтора с организма, и развития подобных патологий. По**сле** санации полости рта **и** лечения основного заболевания и использования препарата «Denta-Fluo» в комплексе, в течение 3-х недель объективная симптоматика в виде изменения цвета слизистой оболочки полости рта, обложенность и отёчность языка достоверно улучшились что в заключении было выяснено ранняя диагностика этих заболеваний в полости рта позволит комплексно планировать профилактику и лечение развивающихся патологий в полости рта.*

Ключевые слова: *паращитовидная железа;остеопороз; ультраструктура эмали; минерализация; кариесрезистентность*

Navruzova L. Kh., PhD
assistant
Department therapeutic dentistry
Asian international university
ORCID ID 0000-0001-7586-6579

METHODS OF PREVENTION AND TREATMENT OF CARIES AND NON-CARIOUS DISEASES IN HYPERPARATHYROIDISM

Abstract. *Changes in endocrine gland function lead to metabolic disturbances in the body and a number of trophic disorders. Oral changes are detected in disorders of the reproductive, thyroid, and parathyroid glands, as well*

as the hypothalamic-pituitary system. This study aimed to assess oral hygiene and implement methods for the prevention and treatment of caries and non-carious diseases in hyperparathyroidism. Patients admitted with carious and non-carious dental lesions, regardless of the presence or absence of hyperparathyroidism, were assessed for somatic pathology, age, and even climate changes, as these could cause calcium and fluoride leaching from the body and the development of such pathologies. Following oral sanitation and treatment of the underlying condition, along with the use of Denta-Fluo, objective symptoms such as discoloration of the oral mucosa, tongue coating, and swelling significantly improved over a three-week period. The conclusion was that early diagnosis of these oral conditions will enable comprehensive planning for the prevention and treatment of developing oral pathologies.

Keywords: *parathyroid gland; osteoporosis; enamel ultrastructure; mineralization; caries resistance*

Введение. В развитии патологии зубов играет роль многофакторность имеющихся причин, в том числе и нарушение работы эндокринной системы, в частности паращитовидной железы, необходимо периодически проводить анализ крови с определением состава крови на уровень кальция, витамина Д3, паратгормона. Кроме того, для обеспечения профилактики и предотвращения осложнений, развившихся патологии зубов следует обеспечить организм необходимым количеством кальция и витамина D, рекомендуя препараты, содержащие перечисленные вещества.

Ткани полости рта также бывают чувствительными к дефициту определенных компонентов пищи. При дефиците белков в периоде развития зубов приводит к уменьшению их размера и массы, нарушается структура эмали зубов. Количество белков в пищевом рационе непосредственно связана с минеральными компонентами зубов и челюстей. При пониженном содержании белков в употребляемой пище накопление кальция и образование апатита происходят нерационально.

Цель исследования: оценить состояния гигиены полости рта и внедрить методы профилактики и лечения кариеса и некариозных заболеваний при гиперпаратиреозе.

Материалы и методы исследования: Больным, поступившим с кариозными и некариозными повреждениями зубов, не зависимо от наличия или отсутствия гиперпаратиреоза рекомендовали использование зубных паст с содержанием фтора и кальция, зубные нити с фторидами практически без ограничений, так как любая соматическая патология, возраст, даже изменения климатических условий могут быть причиной вымывания кальция и фтора с организма, и развития подобных патологий. И необходимо отметить, что даже флюороз не всегда являлся противопоказанием использования этих зубных паст. Данный принцип соблюдали также, для профилактики развития кариозных и некариозных заболеваний зубов у нами исследованных пациентов.

Результаты исследования: После использования композитного материала, санации полости рта лечения основного заболевания и использования препарата «Denta-Fluo» в комплексе, в течение 3-х недель объективная симптоматика в виде изменения цвета слизистой оболочки полости рта, обложенность и отёчность языка достоверно улучшились (P<0,001) (рис. 1).




Рис. 1. Динамика объективной симптоматики у больных с гиперпаратиреозом при применении «Denta-Fluo»

Однако, несмотря на улучшение таких симптомов, как атрофия сосочков языка и наличие отпечатков в боковой его поверхности, они не имели статистически достоверных результатов, по-видимому, которые требовали более длительного лечения основной патологии и наблюдения специалистов.

После получения положительных результатов при использовании «Denta-Fluo» в течение 10-15 дней, и далее укрепления структурных изменений твердых тканей зубов композитным материалом «S-LIGHT» в течение последующих 3-х месяцев наблюдали за состоянием стоматологического статуса пациентов. Тем временем, рекомендовали приём антирезорбтивных препаратов с динамичным наблюдением за индексной оценкой результата. Так, методом вычисления пародонтального индекса (PI) по Rusel по 8-бальной системе наблюдали достоверно положительные результаты по сравнению с признаками до лечения (P<0,01), в виде восстановления. По данным рентгенологического анализа и рассасывания клинического кармана, замыкающих кортикальных пластинок на вершинах альвеолярного отростка, при этом PI после лечения составил 1,62±0,2 балла при первичном, 2,34±0,3 при вторичном гиперпаратиреозе (рис. 1).

Динамику программы лечения продолжили наблюдать по методу Muhlemann – отмечалось уменьшение кровоточивости, отсутствие крови в межзубном треугольнике и перфузного кровотечения после зондирования, при этом индекс Muhlemanna был равен в среднем 1,62±0,2 степени у больных с первичным гиперпаратиреозом и 1,53±0,1 степени с вторичной формой заболевания, отмечаясь точечные кровоподтёки и единичные лёгкие линейные кровотечения по краю сосочка

Оценку состояния гигиены полости рта, по индексу Грин-Вермиллиона, в динамике лечения проводили после механической очистки поверхности зубов, затем, добавляли предложенную нами программу лечения, на фоне которого отмечали снижение степени индекса OHI-S до 0,86±0,2, не имея статистической разницы между группами, в то время, как по отношению с выявленными признаками до лечения, они статистически отличались (P<0,01) (рис.2).




Рис. 2. Динамика терапии индексных оценок ротовой полости

Оценку состояния гигиены полости рта, по индексу Грин-Вермиллиона, в динамике лечения проводили после механической очистки поверхности зубов, затем, добавляли предложенную нами программу лечения, на фоне которого отмечали снижение степени индекса OHI-S до 0,86±0,2, не имея статистической разницы между группами, в то время, как по отношению с выявленными признаками до лечения, они статистически отличались (P<0,01). Индекс Грин-Вермиллиона (OHI-S) при этом оценивался как «низкий», а гигиена полости рта как «хорошая», т.е. предложенная программа лечения оказалась эффективной, приемлемой для широкого использования в стоматологическую практику (рис. 2).

Так как, в физиологическом состоянии десны находятся от зуба не более чем на 2-3 мм, при патологии (например, воспалительном процессе, когда десна начинает отекать и краснеть) промежуток становится больше и образуется пародонтальный или зубодесневой карман, с формированием кариеса корня зуба, нарушением периодонтальных связей, что приводит к расшатыванию и развитию пародонтита. Так, после применения нами предложенной программы лечения отмечалось уменьшение глубины

пародонтального кармана, которое зависело, как уже говорилось выше, от состояния пародонта, т.е. уменьшения симптомов воспаления – в 1-группе наблюдалось полное отсутствие пародонтального кармана после лечения (P<0,001), во 2-группе, у больных с первичным гиперпаратиреозом она была равна 1,32±0,23 мм, достоверно отличаясь от больных до проводимой терапии (P<0,01); при вторичной форме заболевания глубина пародонтального кармана была равна в среднем 1,86±0,15 мм (P<0,01). Как видно, в сравнительной группе, когда нет картины гиперпаратиреоза предложенная программа лечения оказывает достоверно высокую эффективность, однако, при наличии гиперпаратиреоза отмечается более стойкий характер воспаления пародонта и остаточных явлений пародонтального кармана, с частичным его рассасыванием. Несмотря на длительное лечение антирезорбтивными препаратами, у больных с вторичным гиперпаратиреозом глубина пародонтального кармана оказалась достоверно больше, чем у больных с первичным гиперпаратиреозом (P<0,05), хоть и в динамике терапии они имели статистически достоверные результаты (P<0,01, P<0,001 соответственно).

По оценке метода Массера индекс PMA, что указывал на воспалительный процесс в деснах, уменьшен, и степень его во 2-группе был достигнут до 12,6±0,94% при первичном гиперпаратиреозе, и 13,8±1,1% при вторичной форме заболевания, что соответствовало легкой степени воспаления, в сравнительной, группе больных без клиники гиперпаратиреоза, было отмечено полное исчезновение воспаления после лечения, что имело статистическую достоверность по сравнению с первоначальными признаками, как в 1-, так и во 2-группах (P<0,001)

Выводы

Таким образом, процесс кариеса и некариозных процессов зубов являются серьезной патологией, которые могут стать важным показателем и/или предиктором развития соматических заболеваний, указывая на физическое здоровье лиц, страдающих гиперпаратиреозом. Однако, профилактика подобных состояний, своевременная диагностика, правильный выбор терапии относятся к важным приоритетным направлениям медико-стоматологической этики для предотвращения развития серьёзных осложнений и заболеваний, связанных с деформацией зубочелюстной системы. В связи с этим, несмотря на многочисленные научные работы отечественных и зарубежных исследователей данная проблема остаётся актуальной и своевременной, а по некоторым соображениям малоизученной и востребованной для разработки методов ранней диагностики, прогнозирования, профилактики, а также лечения.

Ранняя диагностика этих заболеваний в полости рта позволит комплексно планировать профилактику и лечение развивающихся патологий в полости рта.

Таким образом, проведенный анализ терапии применения программы, состоящей из препаратов «Denta-Fluo» и композитного материала «S-LIGHT» у больных при наличии структурных изменений зубов, страдающих

гиперпаратиреозом показывает достоверно высокую эффективность, однако, исходя из генеза заболевания, который требует подключения к терапии лечения основного заболевания в ранних этапах патологии может служить как профилактикой развития кариеса и некариозных заболеваний зубов, так и предупреждением развития осложнений, даже таких как выпадение зубов.

Следуя всему сказанному, можно добавить, что для сохранения стоматологического здоровья населения необходимыми мероприятиями должны быть в первую очередь гигиена полости рта и соблюдение правильного питания. Генез стоматологических заболеваний, а тем более, связанных с тяжелыми необратимыми соматическими патологиями, отчасти, имея генетическое начало, нуждается в тщательном изучении, ведении их совместно со смежными специалистами, для получения наиболее эффективных результатов терапии.

Использованные источники:

1. Dasanayake A.P. Poor periodontal health of the pregnant women as a risk factor for low birth weight. Ann Periodontol 2018; 3 (1): 206—212.

2. Offenbacher S., Jared H.L., O'Reilly P.O., Wells S.R., Salvi G.E., Lawrence H.P., Socransky S.S., Beck J.D. Potential pathogenic mechanisms of periodontitis associated pregnancy complications. Ann Periodontol 2012; 3 (1): 233—250.

3. Боровский Е.В. Пути повышения качества лечебной работы. Стоматология 2017; 1: 65—68.

4. Чучмай Г.Н. Стоматологическая диспансеризация беременных и ее значение в предупреждении пародонтопатий у матерей и кариеса зубов у детей. Автореф. дис. … докт. мед. наук. Львов; 2014.

5. Бахмудов Б.Р., Бахмудова З.Б. Распространенность и интенсивность кариеса, и санитарно-гигиенические навыки ухода за полостью рта. Стоматология 2000; 3: 12—14.

6. Федоров Ю.А., Пигаревский В.Е., Блохин В.П. Диагностика заболеваний пародонта и прогнозирование результатов лечения. Л; 2015; 19 с.

7. Navruzova L.X. Results examination of the organs of the oral cavity by index estimates for hyperparathyroisis. Eurasian journal of medical and natural sciences innovative academy. Research Support Cente UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Volume 3 Issue 2, February 2023. – ISSN 2181-287X – P. 164-169 1996; 3: 15—18.

8. Navruzova L.X. The role of sex hormones (FSH, LH) in thedevelopment of carious and non-carious dental diseases in hyperparathyroisis. Eurasian journal of medical and natural sciences innovative academy. Research Support Cente UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Volume 3 Issue 2, February 2023. – ISSN 2181-287X – P. 164-169

9. Ирсалиев Х.И. Наврузова Л.Х. Изменение на нижней челюсти при гиперпаратиреоидной остеодистрофии. Новый день в медицине. Ташкент 4(28)2019 с- 163-166

10. Наврузова Л.Х.Scaning elektronik mikroskopi of hard dental tissues at hyperfunktion of parascitroid. . Вестник науки и образования.№ 4(102) декабрь 2020

Назаров Ф.Ю.
старший преподаватель
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ МЕТИЛВИНИЛПИРИДИНА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ КОЖИ КРЫС

Резюме: *Данная статья описывает экспериментальных условиях крысам скармливали водный раствор метилвинилпиридина в дозе 1 мг/кг в течение 30, 60, 90 суток и изучали гистологические изменения в тонких структурах кожи крыс. При анализе полученных результатов выявлены деформация рогового слоя и столбчатого эпителия эпидермиса кожи, нарушение их гистологической целостности. Отмечены случаи утонщения базальной мембраны в дерме. При активной детоксикации (внутривенное введение витамина В1, растворов глюкозы, глутамина и аскорбиновой кислоты) наблюдалось быстрое востоновление гистологической структуры кожи.*

Ключевые слова: *эксперимент, крыс, раствор метилвинилпиридина, кожи крыс, эпидермис, коллагеновые фибриллы.*

Nazarov F.Y.
senior lecturer
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University

EFFECT OF METHYLVINYL PYRIDINE ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF RAT SKIN

Summary: *The article describes an experiment in which rats were given an aqueous solution of methylvinylpyridine orally at a dose of 1 mg/kg body weight for periods of 30, 60, 90 days, followed by histological examination of the fine structures of rat skin. Analysis of the results revealed deformation of the stratum corneum and columnar epithelium of the epidermis, as well as disruption of their histological integrity. Thinning of the basal membrane in the dermis was also observed. During active detoxification (intravenous administration of vitamin B1, glucose solutions, glutamine, and ascorbic acid), rapid restoration of the histological structure of the skin was noted.*

Keywords: *experiment, rats, methylvinylpyridine solution, rat skin, epidermis, collagen fibrils.*

Введение. Бурный рост химической промышленности в нашей стране обязывает исследователей многосторонне изучать условия труда, активно участвовать в предупреждении возможных вредных воздействий химических соединений на людей, занятых в различных процессах производства [1,2].

Метилвинилпиридин (МВП), как известно, является весьма ценным веществом в производстве синтетического каучука и других материалов, имеющих большое народнохозяйственное значение. Так же, как и все производные пиридина, это соединение обладает повреждающим действием на тканевые структуры органов животных и человека [3,4]. Трудами ряда авторов установлено, что метилвинилпиридин в организме весьма медленно обезвреживается и может кумулировать. Наиболее последовательно о токсичности метилвинилпиридиновая изложено в трудах [5,6,7]. Острыми хроническими опытами, проведенными исследователями с нанесением капель метилвинилпиридина на кожу морских свинок, была установлена быстрая всасываемость этого соединения, представляло большую опасность, так как приводило острому отравлению животных. Однако, несмотря на имеющиеся общие данные относительно повреждения кожи в условиях непосредственного попадания на нее МВП, вопрос, касающийся изменений в тонких структурах кожи условиях поступления метилвиниллиридина в организм и последующих восстановительных процессов остается совсем не изученным. Отсутствие в литературе необходимых гистологических сведений, представляющих значительный научно-практический интерес, побудило к выполнению названной темы.

Цель исследования. Исследовать в эксперименте влияние метилвинилпиридина на гистологическую структуру кожи крыс.

Материалы и методы исследования. Экспериментальными животными послужили 30 взрослых, здоровых белых крыс, которым ежедневно перорально в течение 30, 60, 90 суток вводился водный раствор метилвинилпиридина в дозе 1 мг/кг. Через 90 суток эксперимента группе подопытных крыс, наряду с введением метилвинилпиридина, применялся комплекс витаминов, как веществ, снижающих интоксикацию. Контрольным животными являлись аналогичные белые крысы, которые принимали водопроводную воду. По прошествии указанных сроков жизнь животных прерывалась путем мгновенной декапитации. Вырезанные из разных мест лоскуты кожи использовались для изготовления препаратов с применением разнообразных способов гистологической и гистохимической техники.

Результаты исследования. Детально изучая препараты кожи, взятой у животных через 30, 60 и 90 суток, в течение которых они ежедневно получали раствор пиридина, удалось подметить некоторые особенности. Они выражались в разволокшей рогового слоя, разрыхлении шиповатого и цилиндрического слоев эпидермиса, в неравномерности толщины базальной мембраны. Ядра клеток росткового слоя представлялись несколько увеличенными в размерах. В них отчетливо определялись глыбки хроматина с значительным содержанием ДНП. Нередко в цилиндрических клетках ветречались фазы деления. Обнаруживалась неравномерность в распределении РНП в цитоплазме, Гребешки эпидермиса по сравнению с контролем всюду выглядели укороченными, тупоконечными. Соединительнотканные сосочки кожи становились несколько сглаженными по

отношению эпидермиса. Отмечалась умеренная сосудистая реакция, проявляющаяся в повышенном кровенаполнении, диффузной лейкоцитарной инфильтрации всех слоев дермы с распространением и в подкожную зону. В месте с тем во всех участках собственно кожи обнаруживались скопления клеточных форм соединительной ткани. Среди них находились в различных стадиях дифференциации фибробласты, в состоянии фагоцитарной деятельности гистиоциты, с усиленной метахромазией и дегрануляцией тучные клетки. Волокнистые структуры кожи оставались без видимых микроскопических изменений. Можно было указать лишь на беспорядочное расположение коллагеновых волокон сетчатого слоя. Местами между ними наблюдались широкие просветы, на фоне которых выделялись сильно ветвящиеся эластические волокна. Аргирофильные волокна обнаруживались в отдельных участках собственно кожи. Они выявлялись в виде тонких сеточек по ходу кровеносных сосудов или в виде утолщенных фрагментированных образований вблизи коллагеновых пучков у основания сосочкового слоя. Тончайшие прерывистые аргирофильные волокна были видны стенке сосудов и около базальной мембраны. Дериваты кожи и нервные волокна оставались без видимых под микроскопом изменений. Изредка между ними отмечалось наличие щелевидных пространств, через них в подэндотелиальный слой проникали лейкоциты и эритроциты. В средней оболочке сосудов местами были видны разобщения между мышечными клетками и скопления здесь небольших групп лимфоцитов. В железистых структурах кожи также были заметны своеобразные изменения. Клетки сальных желез значительно гипертрофировались, в их цитоплазме определялось повышенное содержание липидов. Крупное ядро секреторных клеток слабо воспринимало красители. В камбиальных, герминативных клетках, окружающих секреторные отделы, отмечалась гиперхромность ядра и цитоплазмы явная неравномерность в распределении нуклеопротеидов. Фазы деления в этих клетках встречались лишь изредка. Наблюдалась выраженная диффузная лейкоцитарная инфильтрация волосяных фолликулов. Обнаруживались гистологические и гистохимические отклонения от нормы и в нервных волокнах кожи. Таким образом мы убедились, что метилвинилпиридин, будучи введенным организм перорально, способен оказывать свое отрицательное влияние и на периферические части тела т.е. на кожный покров, который, как известно, представляет собой сложный орган с многосторонними, важными для всего организма функциями. Восстановительные процессы протекают медленно, не вдруг после прекращения доступа МВП в организм животных. Исследования, проведенные нами, показывают, у что при определенных условиях в организме наступает нормализация в тонких тканевых структурах, в томе числе и в коже. Так, изучая препараты кожи, взятой у подопытных белых крыс, через 15, 20, 30 суток после того, как животные находились в хороших условиях содержания без введения им указанного раствора метилвинилпиридина, мы смогли констатировать появление первых признаков регенерации тканевых элементов кожи спустя 15 суток периода

последействия. Улучшение состояния тканевых структур нарастало по мере удлинения времени восстановительного периода. Нормализация в строении эпидермиса, соединительнотканных структурах кожи, ее дериватах и тонких нервных волоконцах обнаруживалась через 30 суток после прекращения воздействия метилвинилпиридина. Лишь местами в этот период оставалась заметной лейкоцитарная инфильтрация и повышенное кровенаполнение просветов сосудов. Изредка еще наблюдались деформированные фибробласты. Более активно восстановительные процессы в тканевых элементах кожи подопытных крыс совершались в условиях введения в их организм веществ, снижающих интоксикацию (витамин В1, глюкоза, глютаминовая и аскорбиновая кислоты).

Вывод. Изменения, возникающие в тонких структурах кожи под влиянием метилвинилпиридина, введенного через пищеварительный тракт, указывают на резорбтивные свойства этого соединения. Изменения, наступающие в коже, обратимы в условиях длительного, не менее 30-суточного перерыва, в прекращении доступа в организм метилвинилпиридина. Заметное снижение интоксикации в организме экспериментальных животных и ускорение процессов регенерации в тканевых структурах кожи, измененных метилвинилпиридином, происходит под влиянием витаминов, глюкозы и других биологически активных веществ.

Использованные источники:

1. Ярмухамедова С. Х., Бекмурадова М. С., Назаров Ф. Ю. Диагностическая ценность натрийуретического пептида при выявлении пациентов с бессимптомной систолической или диастолической дисфункцией //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62). – С. 84-88.
2. Назаров Ф. Ю. КОРРЕКЦИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ТОТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 832-836.
3. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузырья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
4. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
5. Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени //Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6.
6. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
7. J K Wamsley, M A Zarbin, M J Kuhar. Muscarinic cholinergic receptors flow in the sciatic nerve. PMID: 6167327.DOI: 10.1016/0006-8993(81)90193-1

Наимова З. С.
старший преподаватель
кафедра общей гигиены и экологии
СамГМУ

РОЛЬ ВИТАМИНОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: *В статье рассматривается биологическая и физиологическая роль фруктов и овощей в питании человека. Освещается значение растительных продуктов как основных источников витаминов, минеральных веществ и других биологически активных соединений, необходимых для нормального функционирования организма. Особое внимание уделено участию фруктов и овощей в профилактике гипо- и авитаминозов, поддержании обменных процессов, иммунной защиты и снижении риска развития хронических заболеваний. Показано, что регулярное употребление растительных продуктов способствует укреплению здоровья и повышению адаптационных возможностей организма.*

Ключевые слова*:фрукты, овощи, витамины, биологически активные вещества. рациональное питание, профилактика авитаминозов, обмен веществ, здоровье человека*

Naimova Z.S.
senior lecturer
Department of General Hygiene and Ecology
Samara State Medical University

THE ROLE OF PLANT-BASED VITAMINS IN HUMAN FUNCTION

Abstract*: This article examines the biological and physiological role of fruits and vegetables in human nutrition. It highlights the importance of plant foods as the main sources of vitamins, minerals, and other biologically active compounds necessary for normal bodily function. Particular attention is paid to the role of fruits and vegetables in preventing hypo- and avitaminosis, maintaining metabolic processes, immune defense, and reducing the risk of chronic diseases. Regular consumption of plant foods has been shown to promote health and enhance the body's adaptive capacity.*

Keywords*: fruits, vegetables, vitamins, biologically active substances, balanced nutrition, vitamin deficiency prevention, metabolism, human health*

Актуальность: В повседневной речи фрукты и овощи нередко отождествляют с источниками витаминов, что имеет под собой научное обоснование. С глубокой древности представители медицины рассматривали растительную пищу не только как элемент питания, но и как важное лечебно-профилактическое средство. Именно поэтому плоды, ягоды и овощи нередко

именовались «целебной пищей» и активно применялись при заболеваниях внутренних органов.

Фруктово-ягодные, овощные, зерновые культуры, а также дикорастущие съедобные растения богаты биологически активными соединениями, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья и жизнеспособности организма. Среди этих веществ особое место занимают витамины — низкомолекулярные органические соединения, необходимые для нормального роста, развития и функционирования человека.

Термин «витамин» был введён в научный оборот в 1911 году польским исследователем К. Функом и происходит от латинского *vita* — «жизнь». Витамины преимущественно синтезируются в растительных организмах, особенно в плодах и ягодах, что делает растительную пищу основным естественным источником этих соединений.

В настоящее время известно около двадцати витаминов, каждый из которых отличается специфическим химическим строением и биологическим действием. Витамины не являются взаимозаменяемыми: каждый из них выполняет строго определённую функцию и участвует в конкретных биохимических процессах.

Цель исследования Целью данной работы является комплексный анализ биологической роли витаминов и обоснование значения растительных продуктов как основного источника витаминного обеспечения организма человека.

Материалы и методы исследования Материалами исследования послужили данные учебной и научной литературы по фармакогнозии, биохимии, физиологии питания и гигиене. Использовались аналитический, сравнительно-описательный и обобщающий методы, позволяющие систематизировать сведения о классификации витаминов, их биологическом действии и содержании в растительных продуктах.

Витамины выступают в роли естественных регуляторов метаболизма, влияя на ферментативные реакции, нервно-эндокринную регуляцию, иммунную защиту, кроветворение, свертываемость крови и другие жизненно важные функции. Их дефицит приводит к развитию гиповитаминозов, сопровождающихся снижением работоспособности, нарушением сна, ухудшением состояния кожи и слизистых оболочек. Полное отсутствие витаминов вызывает авитаминозы — самостоятельные патологические состояния.

Классификация витаминов

По физико-химическим свойствам витамины подразделяются на две основные группы:

1. Водорастворимые витамины:

B_1, B_2, B_3, B_6, B_9 (фолиевая кислота), B_{12}, B_{15}, C, P, PP, H, PABA.

2. Жирорастворимые витамины:

A, D, E, K, F.

Названия витаминов могут быть буквенными, химическими либо отражать их биологическое действие. Суточная потребность организма в витаминах относительно невелика и при регулярном употреблении свежих овощей и фруктов, как правило, полностью покрывается за счёт растительных продуктов.

Водорастворимые и жирорастворимые витамины: биологическая роль и значение

Витамин B_1 (тиамин)

Тиамин играет ключевую роль в функционировании нервной системы, обеспечивая проведение нервных импульсов. Он участвует в процессах образования и распада нейромедиатора ацетилхолина, регулируя тем самым синаптическую передачу. Помимо этого, витамин B_1 вовлечён в углеводный и аминокислотный обмен, процессы клеточного дыхания и синтез аденозинтрифосфата (АТФ). Под его влиянием активируется фермент холинацетилаза и ингибируется холинэстераза, что приводит к повышению концентрации ацетилхолина в нервной ткани.

В организме тиамин фосфорилируется с образованием тиаминдифосфата (кокарбоксилазы), который выступает коферментом ряда ферментов, обеспечивающих нормальное течение углеводного обмена.

Дефицит витамина B_1 сопровождается нарушением углеводного и водно-электролитного баланса, снижением интеллектуальной и физической активности. При выраженном авитаминозе вследствие угнетения синтеза ацетилхолина развиваются парезы, параличи, атония кишечника, гипоацидные гастриты и другие патологические состояния. Тяжёлая форма дефицита B_1 приводит к развитию болезни бери-бери.

Следует учитывать, что тиамин разрушается под действием фермента тиаминазы, содержащегося в сырой рыбе, чернике, чёрной смородине, вишне и шпинате. Чрезмерное и длительное употребление данных продуктов может способствовать формированию гиповитаминоза B_1.

Витамин B_2 (рибофлавин)

Рибофлавин является обязательным компонентом ферментных систем, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. Он входит в состав дыхательных ферментов, обеспечивающих тканевое дыхание и энергетический обмен. Недостаток витамина B_2 приводит к нарушениям белкового обмена и клеточного дыхания, что клинически проявляется повышенной утомляемостью, снижением зрения, расстройствами сна, поражениями кожи и слизистых оболочек, анемией и дисфункцией желудочно-кишечного тракта.

Витамин B_3 (пантотеновая кислота)

Пантотеновая кислота является структурным компонентом коэнзима А, участвующего в транспорте органических кислот и ключевых метаболических процессах. Коэнзим А необходим для синтеза АТФ, жирных кислот, фосфолипидов, ацетилхолина, гормонов коры надпочечников и половых желёз. Кроме того, витамин B_3 способствует утилизации продуктов

дезаминирования аминокислот и улучшает проведение нервных импульсов за счёт повышения всасывания калия.

Недостаток пантотеновой кислоты приводит к функциональным нарушениям центральной нервной системы, сопровождающимся бессонницей, утомляемостью, парестезиями и расстройствами координации движений.

Витамин B_6 (пиридоксин)

Пиридоксин участвует в процессах кроветворения, стимулирует клеточное деление и синтез гемоглобина. Он необходим для образования биогенных аминов, включая серотонин и катехоламины, а также для синтеза никотиновой кислоты, НАД и НАДФ.

Фосфорилированная форма витамина B_6 — пиридоксальфосфат — является коферментом ферментов, регулирующих обмен аминокислот, реакции трансаминирования, декарбоксилирования и дезаминирования. В центральной нервной системе данный витамин обеспечивает превращение глутаминовой кислоты в γ-аминомасляную кислоту, выполняющую тормозную функцию.

Дефицит B_6 проявляется анемией, дерматитами, полиневритами, нарушением трофики слизистых оболочек и в тяжёлых случаях судорожным синдромом.

Витамин B_9 (фолиевая кислота)

Фолиевая кислота в организме восстанавливается до активной формы — фолиновой кислоты, которая участвует в переносе одноуглеродных фрагментов. Она играет важную роль в синтезе нуклеиновых кислот, белков и форменных элементов крови. Витамин B_9 стимулирует гемопоэз и препятствует избыточному отложению жиров во внутренних органах.

Витамин B_{12} (цианокобаламин)

Цианокобаламин участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов и активирует фолиевую кислоту. Он необходим для синтеза нуклеиновых кислот, нормального кроветворения и функционирования центральной нервной системы. Витамин B_{12} синтезируется кишечной микрофлорой и депонируется преимущественно в печени.

Его дефицит сопровождается развитием мегалобластной анемии, лейкопении, полиневритов, задержкой роста у детей и снижением иммунной защиты.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом и участвует в многочисленных обменных процессах. Она укрепляет сосудистую стенку, снижает капиллярную проницаемость, стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, а также усиливает детоксикационную функцию печени.

Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, активирует иммунные реакции и улучшает обмен холестерина. Его недостаток приводит

к кровоточивости, геморрагиям, снижению работоспособности и развитию цинги.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)

Жирорастворимые витамины регулируют рост и развитие организма, кальциево-фосфорный обмен, процессы антиоксидантной защиты, свертываемость крови и липидный метаболизм. Их дефицит сопровождается нарушением зрения, костной системы, репродуктивной функции и повышенной ломкостью сосудов.

Роль растительных продуктов в витаминном обеспечении

Фрукты и овощи обеспечивают организм витаминами тремя основными путями:

1.Являются прямым источником витаминов и витаминоподобных веществ.

2.Содержат пищевые волокна, стимулирующие рост нормальной кишечной микрофлоры, способной синтезировать витамины группы B и K.

3.Обеспечивают оптимальные условия для всасывания и активации витаминов за счёт органических кислот, эфирных масел, флавоноидов и фитонцидов.

Результаты исследования В результате анализа установлено, что растительные продукты способны обеспечить значительную часть суточной потребности организма в витаминах. Наибольшая концентрация витаминов содержится в свежих и минимально обработанных продуктах. Доказано, что разнообразие растительной пищи является ключевым фактором полноценного витаминного обеспечения.

Выводы: Витамины являются незаменимыми регуляторами обменных процессов и жизнедеятельности организма. Растительные продукты представляют собой основной и физиологически оптимальный источник витаминов. Рациональное питание с преобладанием овощей и фруктов способствует профилактике гипо- и авитаминозов и укреплению здоровья

Регулярное включение растительных продуктов в рацион является важнейшим условием профилактики гипо- и авитаминозов, поддержания обменных процессов и укрепления здоровья.

Использованные источники:

1. Xolmatov X.X, Axmedov U.A Farmakognoziya — 2 qism.-Toshkent: Fan, 2007.- 400 bet.

2. Пўлатова Т.П, Холматов Х.Х. Фармакогнозия амалиѐти — Тошкент: Абу Али https://scientific-jl.org/obr 57 Выпуск журнала №-80 Часть–3_ Ноябр– 2025 ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 2181 3187 Ибн Сино номидаги тиббиѐт нашриѐти, 2002.-360 бет.

3. Самылина И.А., Аносова О.Г. Фармакогнозия. Атлас: учебное пособие в 2-х томах.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2007.-Т.1.-192 с.

4. Mallayeva Mavjudaxon Maxramovna - Toksik Gepatit Sharoitida Qonning Ayrim Biokimyoviy (Alt, Ast, Ishqoriy Fosfotaza Va Umumiy Oqsil Miqdori) O‘zgarishlariga Polifenollar Ta’sirini Aniqlash.

5. Маллаева М. Б. Экология ҳисобини шакллантириш масалалари //so ‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 269-280.
6. Маллаева М. М. Соглом турмуш тарзини ривожлантириш //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 753-760.
7. Маллаева М. М. Соглом турмуш тарзини ривожлантириш //o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 753-760.
8. Muhammadjon M., Mavjudaxon M. Eksperemental toksik gepatitda ayrim polifenollarning ta’siri //International Journal Of Contemporary Scientific And Technical Research. – 2023. – С. 283-286.
9. Mallaeva Mavjudakhan Mahramovna, Khidirov Nemat Chorshanbievich, Kiyomov Ikhtiyor Ergashovich - Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915, Vol. 11, Issue 2, Feb. (2023)
10. M.A.Mustafakulov, M.M.Mallayeva. Eksperemental Toksik Gepatitda Ayrim Polifenollarning Ta’siri - Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar – 283
11. Mallayeva Mavjudaxon Maxramovna, Uz - Elektron Hisoblash Mashinalari Uchun Yaratilgan Dasturning Rasmiy Ro'yxatdan O'tkazilganligi To'g'risidagi Guvohnoma - DGU 30291

УДК: 621.51: 621.313

Низамов Ж.А.
доцент
Андижанский государственный технический институт
Республика Узбекистан, г. Андижан
Мухамаджонов Б.Х.
студент 4-го курса
Андижанский государственный технический институт
Республика Узбекистан, г. Андижан

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы проектирования электрического привода поршневых компрессоров. Актуальность исследования обусловлена широким применением компрессорных установок в промышленности и необходимостью повышения их энергетической эффективности и надёжности. Целью работы является анализ требований к электрическому приводу поршневого компрессора, выбор электродвигателя и основных элементов системы управления.*

Ключевые слова: *поршневой компрессор, электрический привод, электродвигатель, проектирование, энергоэффективность.*

Nizamov J.A.
associate professor
Andijan State Technical Institute
Republic of Uzbekistan, Andijan
Mukhamadjonov B. Kh.
4th-year student
Andijan State Technical Institute
Republic of Uzbekistan, Andijan

DESIGN OF ELECTRIC DRIVE SYSTEMS FOR RECIPROCATING COMPRESSORS

Abstract. *This article addresses the issues related to the design of electric drive systems for reciprocating compressors. The relevance of the study is determined by the widespread application of compressor units in industry and the need to improve their energy efficiency and reliability. The purpose of the work is to analyze the requirements for the electric drive of a reciprocating compressor, as well as to select the electric motor and the main elements of the control system.*

Keywords: *reciprocating compressor, electric drive, electric motor, design, energy efficiency.*

Введение

Поршневые компрессоры широко применяются в различных отраслях промышленности для сжатия и подачи воздуха и газов. Надёжная и экономичная работа компрессорной установки во многом определяется правильно спроектированным электрическим приводом, обеспечивающим требуемые режимы работы при минимальных энергетических затратах. Электрический привод поршневого компрессора характеризуется неравномерной нагрузкой, значительными пусковыми токами и повышенными требованиями к надёжности. Поэтому при проектировании привода необходимо учитывать механические особенности компрессора, характер нагрузки и условия эксплуатации. Целью данной статьи является разработка и анализ принципов проектирования электрического привода поршневых компрессоров с учётом энергетических и эксплуатационных требований.

Методы исследования

В процессе исследования использованы следующие методы:

анализ механических и энергетических характеристик поршневого компрессора;

расчёт мощности и тока электродвигателя;

анализ пусковых и установившихся режимов работы;

выбор элементов системы управления и защиты;

оценка энергоэффективности электрического привода.

Методологической основой исследования является теория электрического привода и нормативные требования к компрессорному оборудованию.

Особенности нагрузки поршневого компрессора

Поршневой компрессор относится к механизмам с переменным моментом сопротивления. Мгновенный крутящий момент на валу компрессора изменяется в течение рабочего цикла, что приводит к колебаниям нагрузки на электродвигатель.

Средний момент сопротивления можно определить по выражению:

$$M_{\text{ср}} = \frac{P_{\text{к}}}{\omega}$$

где

$P_{\text{К}}$ - мощность, потребляемая компрессором, Вт;

ω - угловая скорость вращения вала, рад/с.

Расчет мощности электропривода

Мощность электродвигателя определяется исходя из потребляемой компрессором мощности с учётом коэффициента полезного действия и коэффициента запаса:

$$P_{\text{дв}} = \frac{P_{\text{к}}}{\eta \cdot K_{\text{з}}}$$

где

$P_{\text{дв}}$- номинальная мощность электродвигателя, Вт;

η - КПД механической передачи;

$K_з$ - коэффициент запаса мощности.

Потребляемая мощность компрессора может быть определена по формуле:

$$P_к = \frac{p \cdot Q}{\eta_к}$$

где

p - рабочее давление, Па;

Q- подача компрессора, м³/с;

$\eta_к$ - КПД компрессора.

Выбор электродвигателя

Для привода поршневых компрессоров, как правило, применяются асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, отличающиеся простотой конструкции и высокой надёжностью.

Номинальный ток электродвигателя определяется по формуле:

$$I_н = \frac{P_{дв}}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi \cdot \eta}$$

где

U - линейное напряжение сети;

cosφ - коэффициент мощности;

η - КПД электродвигателя.

При выборе электродвигателя необходимо учитывать пусковой момент, который должен удовлетворять условию:

$$M_п \geq M_{ср}$$

Система управления и защиты

Система управления электрическим приводом поршневого компрессора включает пусковую аппаратуру, средства защиты и элементы автоматизации. Для защиты электродвигателя применяются автоматические выключатели и тепловые реле, выбираемые по условию:

$$I_{защ} \geq I_н$$

В современных компрессорных установках широко используются частотно-регулируемые приводы, обеспечивающие плавный пуск и регулирование производительности.

Энергоэффективность электропривода

Энергоэффективность электрического привода компрессора во многом определяется правильным выбором электродвигателя и режимов его работы. Использование частотных преобразователей позволяет снизить пусковые токи и сократить потребление электроэнергии на 15–30%. Дополнительное повышение эффективности достигается за счёт оптимизации режимов загрузки компрессора и автоматического управления.

Обсуждение результатов

Проведённый анализ показывает, что рациональное проектирование электрического привода поршневого компрессора позволяет повысить надёжность оборудования и снизить эксплуатационные затраты. Наибольший

эффект достигается при комплексном подходе, включающем расчёт параметров привода, выбор энергоэффективных электродвигателей и внедрение автоматизированных систем управления.

Заключение

В статье рассмотрены основные принципы проектирования электрического привода поршневых компрессоров. Приведены методы расчёта мощности и тока электродвигателя, а также требования к системе управления и защиты. Показано, что применение современных решений в области электрического привода позволяет повысить энергоэффективность и надёжность компрессорных установок. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании и модернизации промышленного компрессорного оборудования.

Использованные источники:

1. J Nizamov, Sh Ergashov, DI Kurbanbaeva Phase angle measurement device between the resultable electric drive force and the electric drive force of the main harmonic magnetic field in the air gap of the industrial …AIP Conference ProceedingsAIP Conf. Proc. 3152, 040021 (2024) https://doi.org/10.1063/5.0218808

2. J Nizamov, SO Ergashov, ON Berdiyorov, UN Berdiyorov Device for measuring the resulting magnetic field of the stator winding of asynchronous motor for general industrial application AIP Conference Proceedings AIP Conf. Proc. 3152, 050013 (2024) https://doi.org/10.1063/5.0218809 June 2024

3. NB Pirmatov, JA Nizamov, O Ergashev Sh MAGNETIC FIELD IN THE AIR GAP OF AN INDUCTION MOTOR GENERAL INSPECTION INFORMATION APPLICATIONS

Нуралиев Р.Т., и.ф.н., к.и.х.
бўлим мудири
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази
Усманов Б. Ш.
кичик илмий ходим
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузуридаги Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш маркази

ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. *Давлат активларини бошқаришни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини ишлаб чиқиш аҳамияти тобора ортиб бораётганини ҳисобга олган ҳолда, тадқиқот ўтказилди ва тасдиқланган дастурларнинг асосий кўрсаткичлари бажарилиши таҳлил қилинди. Шунингдек, давлат активларини самарали бошқариш мақсадида ўрта муддатли истиқболда ушбу соҳада асосий йўналишлар таклиф этилди.*

Калит сўзлар*: Давлат активлари, давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш (ДИК), кузатув кенгаши, корпоратив бошқарув, кузатув кенгашларининг мустақил аъзолари, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИҲТТ).*

Nuraliyev R.T.,Candidate of Economic Sciences
senior researcher
Head of Department at the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan
Usmanov B.Sh.
junior researcher
Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management State Assets Management Agency of the Republic of Uzbekistan.

IMPROVING THE MECHANISM OF STATE ASSET MANAGEMENT

Abstract. *Considering the increasing importance of developing key directions for state asset management, a study was conducted and the implementation of main indicators from approved programs was analyzed. Furthermore, to ensure effective management of state assets, primary directions in this field for the medium-term perspective were proposed.*

Keywords: *State assets, management of state-owned enterprises (SOEs), supervisory board, corporate governance, independent members of supervisory boards, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).*

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 166-сонли қарори билан тасдиқланган "2021-2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегияси"га (бундан кейин - Стратегия) мувофиқ, давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилишнинг мақсадлари, вазифалари ҳамда устувор йўналишлари белгиланди. Бунда илғор хорижий тажриба, жумладан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (ИҲТТ) давлат иштирокидаги корхоналар учун корпоратив бошқарув тамойиллари инобатга олинди.

Стратегиянинг устувор йўналишлари илғор хорижий тажриба ва амалиётга асосланиб, қуйидагиларни ўз ичига олди: хорижий экспертлар иштирокида қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш; давлат иштирокидаги корхоналарга (кейинги ўринларда - ДИК) эгалик қилиш асосларини белгилаш; иқтисодиётнинг ривожланган тармоқларида давлат иштирокини чеклаш; корпоратив бошқарув органлари аъзоларини танлов асосида сайлаш; уларнинг масъулиятини ошириш ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг бозор механизмларига ўтиш; кузатув кенгаши таркибига профессионал мустақил аъзоларни жалб этиш ҳамда унинг ҳузурида қўмиталар ташкил этиш.

Бироқ, объектив сабабларга кўра, Стратегияда белгиланган айрим кўрсаткичлар бўйича натижаларга фақат қисман эришилди. Хусусан, давлат хўжалик ширкатларининг сони 75 фоиз ўрнига 67 фоизга қисқартирилди, корхоналарда бошланғич оммавий таклиф ўтказиш атиги 20 фоизга бажарилди, кузатув кенгашлари таркибида мустақил аъзолар улуши 30 фоизга етказилмади.

Шу билан бирга, давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилишнинг қуйидаги устувор йўналишлари белгиланди ва шунга мувофиқ давлат улуши бўлган корхоналарда корпоратив муносабатларни такомиллаштириш ва яхшилаш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. Хусусан:

Давлат иштирокидаги корхоналар сонининг кескин қисқартирилиши.

- Стратегияда 2025 йилга қадар давлат иштирокидаги корхоналар сонини 75 фоизга қисқартириш кўзда тутилган эди. Амалда бу кўрсаткич 67 фоизни ташкил этди. Қисқартириш жараёнида асосий эътибор тўлиқ ёки қисман давлат улушига эга бўлган самарасиз корхоналарни оптималлаштириш масаласига қаратилди.

- Режага кўра, 477 та истиқболсиз, фаолият юритмайдиган, зарар кўриб ишлаётган ва паст даромадли корхоналар тугатилиши керак эди. Амалда эса режадан ташқари 487 та корхона тугатилди. Натижада давлат портфелида фақат нисбатан муваффақиятли корхоналар сақланиб қолди.

Корпоратив бошқарувнинг замонавий усулларини жорий этиш.

- Барча кузатув кенгашлари ҳузурида қўмиталар ташкил этиш режаси корхоналарнинг 91 фоизида амалга оширилди. Шу билан бирга, қўмиталарнинг жорий фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш тавсия этилди;

- Кузатув кенгашларидаги мустақил аъзолар улуши 30 фоизга етиши керак эди. Акциядорлик жамияти шаклидаги 253 та ДИКнинг атиги 34 фоизида кузатув кенгашларидаги мустақил аъзолар улуши 30 фоизга етказилган.

Бундан ташқари, қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилди:

- режа бўйича, 25 та корпоратив облигациялар эмиссияси ташкил этилиши лозим эди. Амалда 10 та эмиссия ўтказилди;

- корхоналарнинг 20 фоизида комплаенс тизимини жорий этиш мўлжалланган эди. Амалда 16 фоиз корхонада комплаенс хизмати ташкил этилди.

Умуман олганда, Стратегиянинг мақсадли кўрсаткичларига эришиш даражаси ўртача 80 фоиз деб баҳоланиши мумкин.

Бизнинг фикримизча, давлат активларини бошқаришнинг амалдаги тизимини таҳлил қилиш ушбу йўналишдаги ишларнинг қуйидаги асосий камчиликларини аниқлаш имконини беради:

- жойлардаги давлат вакиллари ва кузатув кенгаши аъзолари Стратегия мақсадларини амалга оширишда етарли даражада масъулият ва фаоллик кўрсатмаяпти;

- давлатнинг корхоналар бошқарув органларидаги ўз ваколатларидан самарасиз ва ўз вақтида фойдаланмаслиги Стратегия мақсадларини амалга оширишга эътиборсизлик билан қараган ижро этувчи орган аъзоларига нисбатан ўз вақтида чоралар кўрилмаслик ҳолатига олиб келмоқда;

- айрим давлат вакилларининг касбий тайёргарлиги ва тажрибаси етарли эмаслиги корпоратив бошқарув органларининг амалий фаолияти самарадорлигига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Натижада:

- Корхоналарнинг инвестицион жозибадорлиги пастлиги туфайли давлат улуши акцияларини сотиш суръатлари режалаштирилганидан паст даражада қолмоқда;

- корпоратив бошқарув органларининг ҳаракатсизлиги оқибатида фаол эмиссия сиёсати ва фаолияти олиб борилмаяпти;

- кузатув кенгашларида мустақил аъзолар улушини оширишга қаратилган корпоратив тадбирларни (кенгаш йиғилишлари, акциядорларнинг умумий йиғилишлари ва бошқалар) ўтказиш кечиктирилмоқда.

Шу муносабат билан давлат активларини бошқаришнинг янги стратегик йўналишларини шакллантириш алоҳида аҳамият касб этади. Бизнинг фикримизча, мақсадга эришиш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

Давлат активларига эгалик қилиш ва уларни бошқариш соҳасида:

- давлат активлари фақат Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ва ижтимоий сиёсатини рўёбга чиқариш учун зарур бўлган шакл ва ҳажмлардагина шакллантирилади ва сақланади;

- барча активлар вақти-вақти билан инвентаризация қилиниб, давлатнинг стратегик мақсадларини амалга ошириш учун уларни сақлаш зарурати баҳоланади. Аҳамиятини йўқотган айрим давлат активлари хусусийлаштирилиши лозим;

- агар давлат вазифаларини бажариш учун давлат активлари етарли бўлмаса, улар қўшимча равишда зарур шакл ва ҳажмларда шакллантирилади. Бунда давлат активларининг мақсадга мувофиқлиги аниқланади.

Давлат активларини ишончли бошқарувга топшириш соҳасида:

- давлат активлари фақат ваколатли орган белгилаган ягона бошқарув қоидалари ва усуллари асосида бошқарилиши шарт;

- қоида ва усуллардан ҳар қандай четга чиқишга йўл қўйилмайди, улардан истиснолар эса бошқарувнинг ягона қоидалари ва усулларини белгилаш ваколатига эга бўлган орган билан келишилган ҳолда амалга оширилиши лозим;

- миллий мудофаа ва хавфсизлик мақсадларида фойдаланиладиган активлар бундан мустасно бўлиб, уларнинг масъулияти фақат тегишли ташкилотлар зиммасига юкланади, қолган барча давлат активларини тўғри ва самарали бошқариш учун жавобгарлик давлат активларини бошқариш бўйича ягона ваколатли органга юклатилади;

- давлат мулкини бошқариш ваколатлари бошқа давлат бошқаруви органига ўтказилганда ҳам, давлат мулкини тегишли тарзда бошқариш бўйича жавобгарлик давлат активларини бошқариш бўйича ягона ваколатли органдан олиб ташланмайди. Шу сабабли, давлат активларини бошқаришга ваколатли бўлган барча давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари давлат активларини бошқариш бўйича ягона ваколатли органга ҳисобот бериши ва масъул бўлиши шарт.

Давлат мулкини бошқариш ва ҳисобга олиш соҳасида:

- давлат бюджетининг солиқдан ташқари манбаларини шакллантириш учун фойдали давлат активларини сақлаш йўналишларини давом эттириш, минимал мезонларга мос келмайдиган давлат активларини тугатиш;

- таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа давлат ижтимоий кафолатлари доирасидаги соҳалардаги ижтимоий инфратузилма объектларини сақлашни, шунингдек, мамлакат бўйича ўртача иш ҳақидан юқори бўлган янги иш ўринлари яратаётган корхоналарда давлат активларини шакллантириш ва сақлашни кўзда тутувчи ижтимоий мувофиқликни таъминлаш;

Хулоса

Давлат корхоналари сонини камайтириш ва бошқарув харажатларини оптималлаштириш, шунингдек, давлат улушларидан келадиган даромадларни кўпайтириш мақсадида, бизнингча, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан муҳим бўлмаган корхоналарда давлатга тегишли акциялар миқдорини қисқартириш

ҳамда давлат акция пакетларини бошқариш тизимини такомиллаштириш лозим.

Давлат улуши мавжуд бўлган жамиятларни самарали бошқариш учун давлат улушларини бошқаришни тармоқ уюшмаларига топшириш имкониятини кўриб чиқиш, шунингдек, давлат учун аҳамияти паст бўлган жамиятлардаги давлат улушини хусусийлаштиришни ўйлаб кўриш мақсадга мувофиқ бўларди.

Давлат активларини тўғри ва самарали бошқариш ҳуқуқи ҳамда масъулияти давлат активларини бошқариш бўйича ягона ваколатли органга юклатилиши керак. Шунга мувофиқ, давлат активларини бошқаришга ваколатли бўлган барча давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари давлат активларини бошқариш бўйича ягона ваколатли органга жавобгар ва ҳисобдор бўлиши шарт.

Использованные источники:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон Фармони. [Электрон манба] URL: https://lex.uz/ru/docs/6600413.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.03.2021 йилдаги “2021 – 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 166-сон Қарори. [Электрон манба] URL: https://lex.uz/uz/docs/5348948.

Нуралиев Р.Т., к.э.н. с.н.с.
доцент
Банковско-финансовой Академия
заведующий отделом Центра исследований проблем приватизации управления государственными активами
Хамроева И.Н., доктор философии (PhD) по экономическим наукам
доцент, заведующий кафедрой «Инвестиции и рынок капитала»
Банковско-финансовая Академия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ НА ПЕРИОД ДО 2026-2030 ГОДЫ

Аннотация. *Учитывая возрастающее значение разработки основных направлений развития управления государственными активами, проведено исследование, проанализированы выполнения основных показателей утвержденной Стратегией управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 - 2025 годы. А также, для эффективного управления государственными активами на период до 2026-2030 годов предложены основные направления, в области управления государственными активами на среднесрочную перспективу.*

Ключевые слова: *Государственные активы, приоритетные направления стратегии, управление предприятиями с государственным участием (ПГУ), наблюдательный совет, корпоративное управление, независимые члены в наблюдательных советах, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).*

Nuraliev R.T., Candidate of Economic Sciences associate professor
at the Academy of Banking and Finance
Head of the Department at the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management
Khamroyeva I. N., Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences associate professor
Head of the Department of Investments and Capital Markets at the Banking and Finance Academy

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF STATE ASSETS FOR THE PERIOD UP TO 2026-2030

Abstract. *Considering the growing importance of developing main directions for state asset management, a study was conducted analyzing the implementation of key indicators from the approved Strategy for Management and Reform of State-Owned Enterprises for 2021-2025. Additionally, for effective management of state*

assets in the period up to 2026-2030, main directions in the field of state asset management for the medium term are proposed.

Keywords: *State assets, priority areas of the strategy, management of state-owned enterprises (SOEs), supervisory board, corporate governance, independent members on supervisory boards, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).*

Введение

В соответствии со «Стратегией управления и реформирования предприятий с государственным участием на 2021 - 2025 годы», утвержденной Постановлением[81] Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.03.2021 г. No 166 (далее - Стратегия), определены цели, задачи и приоритетные направления управления и реформирования предприятий с государственным участием с учетом передового зарубежного опыта, в том числе принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием.

Приоритетные направления Стратегии, исходя из передового зарубежного опыта и практики, включали разработку с участием зарубежных экспертов проектов законов, определение основ владения предприятиями с государственным участием (далее - ПГУ), ограничение государственного участия в развитых отраслях экономики, резкое сокращение количества ПГУ, определение коммерческих и некоммерческих целей в отношении ПГУ, создание равных условий для ПГУ и негосударственных юридических лиц, разделение функций государства как собственника и регулятора, избрание членов органов корпоративного управления на конкурсной основе, повышение их ответственности и переход на рыночные механизмы оплаты труда, привлечение профессиональных независимых членов в состав наблюдательного совета, создание при нем комитетов, применение к ним фидуциарных обязательств, обеспечение прозрачности и раскрытия информации в управлении ПГУ.

Однако по объективным причинам результаты по некоторым показателям, предусмотренные Стратегией, были достигнуты лишь частично. В частности, количество ПГУ сокращено на 67% вместо 75%, проведение IPO на предприятиях выполнено только на 20%, доля независимых членов в составе наблюдательных советов не доведена до 30%.

Вместе с этим, были определены следующие приоритетные направления управления и реформирования предприятий с государственным участием, и в соответствии с этим в ПГУ реализован ряд мер по совершенствованию и улучшению корпоративных отношений. В частности:

I. Совершенствование нормативно-правовой базы управления и реформирования предприятий с государственным участием.

[81] Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.03.2021 йилдаги “2021 – 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 166-сон Қарори. URL: https://lex.uz/uz/docs/5348948

Проекты законов "Об управлении государственным имуществом" и "О приватизации государственного имущества" разработаны с участием специалистов международных финансовых институтов, консалтинговых компаний и Исследовательского центра.(которые в настоящее время приняты).

II. Резкое сокращение предприятий с участием государства.

- Стратегия предусматривала сокращение количества предприятий с государственным участием на 75 процентов к 2025 году. На практике уровень сокращения составил 67 процентов. В процессе сокращения основное внимание уделялось оптимизации неэффективных предприятий с полной или частичной государственной долей (табл. 1);

- Согласно плану, 477 бесперспективных, бездействующих, убыточных и низкорентабельных предприятий должны были быть ликвидированы. На практике сверх плана ликвидировано 487 предприятий. В результате в государственном портфеле остались только относительно успешные предприятия.

III. Полный перевод деятельности предприятий с участием государства на рыночные механизмы.

Определение коммерческих и некоммерческих целей (PSO) предприятий в Стратегии планировалось в первую очередь для крупных ПГУ. С участием представителей международных финансовых институтов был проведен опрос 44 ПГУ на основе специально разработанной анкеты.

IV. Внедрение современных методов корпоративного управления.

- К 2025 году было запланировано внедрение правил корпоративного управления, основанных на принципах ОЭСР, на 50 процентах предприятий. Их полное внедрение было проведено на 50 крупных государственных предприятиях, и 98% из них завершили этот процесс;

- план по созданию комитетов при всех наблюдательных советах выполнен на 91% предприятий. Вместе с тем, рекомендовано дальнейшее совершенствование системы оценки эффективности действующей деятельности комитетов;

- Доля независимых членов в наблюдательных советах должна была достичь 30 процентов. Только в 34 процентах из 253 ГИК в форме акционерных обществ доля независимых членов в наблюдательных советах доведена до 30 процентов.

Кроме того, были реализованы следующие меры:

- Планировалось привлечь 100 иностранных менеджеров в ГИК, фактически привлечен 161 иностранный менеджер, что превышает запланированное количество;

- согласно плану, должно было быть организовано 25 эмиссий корпоративных облигаций. На практике осуществлено 10 эмиссий;

Таблица 1

Состояние фактического выполнения целевых показателей Стратегии [82]

П/н	Результаты, которые должны быть достигнуты согласно стратегии	Единица измерения	По плану	Фактически	Выполнение плана (%)
1	Сокращение числа предприятий с государственным участием	процент	75	67	89
2	Размещение акций предприятий с государственным участием посредством IPO и SPO	штук	20	4	20
3	Увеличение доли независимых членов в наблюдательных советах	процент	30	10	34
4	Привлечение иностранных менеджеров	штук	100	161	190
5	Выпуск корпоративных облигаций	штук	25	10	40
6	Ликвидация неэффективных и убыточных предприятий	штук	477	487	102
7	Внедрение правил корпоративного управления	процент	50	50	98
8	Внедрение службы комплаенс	процент	20	83	80
9	Оценка системы корпоративного управления	процент	100	60	60
10	Создание комитетов при наблюдательном совете	процент	100	91	91

- планировалось внедрить систему комплаенс на 20% предприятий. Фактически на 16 процентах предприятий организована служба комплаенса.

В целом, средний уровень достижения целевых показателей Стратегии можно оценить в 80 процентов.

В то же время Правила корпоративного управления предприятиями с государственным участием, разработанные на основе принципов ОЭСР, были внедрены более чем на 60 предприятиях с государственным участием, и началась практика избрания (назначения) руководителей 392 предприятий.

Анализ действующей системы управления государственными активами, на наш взгляд, позволяет выделить следующие основные недостатки работы в данном направлении:

- представители государства на местах, члены наблюдательного совета не проявляют достаточной ответственности и активности в реализации целей Стратегии;

- неэффективное и несвоевременное использование государством своих полномочий в органах управления предприятий приводит к ситуации

[82] Подготовлено на основе данных Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

несвоевременного принятия мер в отношении членов исполнительного органа, халатно относившихся к реализации целей Стратегии;

- недостаточная профессиональная подготовка и опыт некоторых государственных представителей негативно сказываются на результативности практической деятельности органов корпоративного управления;

- вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность предприятий с государственным участием, а также преобладание государственных служащих в наблюдательном совете отрицательно влияют на ответственность исполнительного органа перед акционерами.

В результате:

- Из-за низкой инвестиционной привлекательности ГИК темпы реализации акций государственной доли остаются ниже запланированных;

- вследствие бездействия органов корпоративного управления не ведется активная эмиссионная политика и деятельность;

- откладывается проведение корпоративных мероприятий (заседаний совета, общих собраний акционеров и т.д.), направленных на увеличение доли независимых членов в наблюдательных советах.

Целью разработки стратегических направлений управления государственными активами на период до 2026-2030 годов является определение основных направлений государственной политики в области управления государственными активами на среднесрочную перспективу.

В связи с этим особое значение имеет формирование новых стратегических направлений управления государственными активами, и, на наш взгляд, для достижения цели необходимо осуществить следующее:

В сфере владения и управления государственными активами:

- государственные активы формируются и сохраняются только в формах и объемах, достаточных для реализации экономической и социальной политики Республики Узбекистан;

- все активы должны периодически инвентаризироваться с оценкой необходимости их сохранения для выполнения стратегических целей государства. Некоторые государственные активы, утратившие свою значимость, подлежат приватизации;

- если государственных активов недостаточно для выполнения государственных задач, государственные активы дополнительно формируются в необходимых формах и объемах. При этом определяется целесообразность государственных активов.

В сфере передачи государственных активов в доверительное управление:

- государственные активы должны управляться только по единым правилам и методам управления, определяемым уполномоченным органом;

- любые отклонения от правил и методов не допускаются, и исключения из них должны быть согласованы с органом, уполномоченным определять единые правила и методы управления;

- ответственность за правильное и эффективное управление государственными активами возлагается на единый уполномоченный орган по управлению государственными активами, за исключением активов, используемых в целях национальной обороны и безопасности, ответственность за которые возлагается исключительно на соответствующие организации;

- при передаче полномочий по управлению государственным имуществом другому органу государственного управления ответственность за надлежащее управление государственным имуществом не снимается с единого уполномоченного органа по управлению государственными активами. Соответственно, все органы государственной власти и управления, уполномоченные управлять государственными активами, должны быть ответственны и подотчетны единому уполномоченному органу по управлению государственными активами.

В сфере управления и учета государственного имущества:

- сохранить направления, предусматривающие поддержание полезных государственных активов для формирования неналоговых источников государственного бюджета, ликвидировать государственные активы, не отвечающие минимальным критериям;

- обеспечить социальную совместимость, предусматривающую содержание объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и других областях, являющихся предметом государственных социальных гарантий, а также формирование и содержание государственных активов на предприятиях, создающих новые рабочие места с заработной платой выше средней по стране;

- разработать направление, предусматривающее самообеспечение процесса реинвестирования для развития государственных активов в сфере создания новых инновационных производств, которое должно осуществляться, по возможности, за счет инвестиционной политики государства в экономической сфере, части доходов от государственных инвестиционных активов без привлечения средств из государственного бюджета.

Заключение

В целях сокращения количества государственных предприятий и оптимизации управленческих расходов, а также увеличения доходов от государственных долей, на наш взгляд, необходимо сократить количество акций, принадлежащих государству в экономически и социально незначимых предприятиях, а также усовершенствовать механизм управления государственными пакетами акций.

Для эффективного управления обществами с государственной долей целесообразно рассмотреть возможность передачи управления государственными долями отраслевым ассоциациям, а также приватизировать государственную долю в обществах, малозначимых для государства.

Право и ответственность за правильное и эффективное управление государственными активами должны быть возложены на единый уполномоченный орган по управлению государственными активами. Соответственно, все органы государственной власти и управления, уполномоченные управлять государственными активами, обязаны нести ответственность и быть подотчетными единому уполномоченному органу по управлению государственными активами.

В целях контроля за надлежащим управлением государственными активами, мониторинга финансового состояния государственных предприятий, а также обеспечения прозрачности и эффективности деятельности государственных предприятий целесообразно создание контролирующего органа (Инспекции).

Инспекция должна быть полностью независимой от органов государственного управления и управления предприятиями и подчиняться непосредственно единому уполномоченному органу по управлению государственными активами.

Основными целями Инспекции являются:

- оценка эффективности управления государственными пакетами акций;
- оценка экономической целесообразности сохранения или приобретения государственных долей в уставном капитале предприятий;
- подготовка предложений по финансовой, экономической и иной поддержке предприятий с государственным участием;
- координация решений уполномоченного государственного органа по размерам дивидендов по государственным акциям с учетом финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
- координация решений уполномоченного государственного органа по обмену, приобретению и реализации акций и других ценных бумаг предприятий с государственным участием.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УП-158, Стратегия «Узбекистан-2030». URL: https://lex.uz/ru/docs/6600404.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.03.2021 йилдаги “2021 – 2025 йилларда давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш ва ислоҳ қилиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 166-сон Қарори. URL: https://lex.uz/uz/docs/5348948.

UDK 618.11-006.2-07-08:575.113:612.017

Олимова Н.И., PhD
доцент
Кафедра акушерства и гинекологии №1
Бухарский государственный медицинский институт

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ

Аннотация: ***Актуальность****. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из наиболее распространённых эндокринных патологий у женщин репродуктивного возраста и характеризуется сочетанием гиперандрогении, овуляторной дисфункции и метаболических нарушений. Современные данные свидетельствуют о значимой роли иммунологических и молекулярно-генетических факторов в формировании данного синдрома, что обосновывает необходимость персонализированного подхода к лечению.*

Цель исследования *изучить клинико-гормональные, иммунологические и молекулярно-генетические детерминанты СПКЯ и определить их значение в разработке персонифицированной терапии.*

Материалы и методы. В исследование включены 80 пациенток с СПКЯ и 40 женщин контрольной группы. Проводилась оценка гормонального профиля (ЛГ, ФСГ, тестостерон, АМГ), иммунологических маркеров (IL-6, TNF-α, VEGF-A), а также анализ полиморфизмов генов VEGF-A и АМГ методом ПЦР с последующим генотипированием. Статистическая обработка данных выполнена с использованием программ SPSS и Statistica.

Результаты. *У пациенток с СПКЯ выявлены достоверно повышенные уровни ЛГ, тестостерона, АМГ, IL-6, TNF-α и VEGF-A по сравнению с контрольной группой (p<0,05). Частота неблагоприятных генотипов VEGF-A (GG) и АМГ (AA) была статистически выше в основной группе. Обнаружены взаимосвязи между показателями воспаления, гиперандрогении и генетическими полиморфизмами.*

Заключение. *СПКЯ сопровождается выраженными гормональными, иммунологическими и молекулярно-генетическими изменениями. Полученные данные подтверждают необходимость внедрения персонализированных терапевтических стратегий с учётом клинико-генетического и иммунного профиля пациенток.*

Ключевые слова: *синдром поликистозных яичников; VEGF-A; антимюллеров гормон; цитокины; генетические полиморфизмы; персонализированная медицина.*

Olimova N.I., PhD
Associate Professor
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute

CLINICAL, GENETIC, AND IMMUNOLOGICAL DETERMINANTS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME IN THE CONTEXT OF PERSONALIZED MEDICINE

Abstract: *Background. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disorders in women of reproductive age and is characterized by a combination of hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and metabolic disturbances. Current data demonstrate the significant role of immunological and molecular genetic factors in the development of this syndrome, which justifies the need for a personalized approach to treatment.*

The aim of this study was to investigate the clinical, hormonal, immunological, and molecular genetic determinants of PCOS and determine their significance in the development of personalized therapy.

Materials and Methods. The study included 80 patients with PCOS and 40 women in the control group. Hormonal profiles (LH, FSH, testosterone, AMH) and immunological markers (IL-6, TNF-α, VEGF-A) were assessed, as well as VEGF-A and AMH gene polymorphisms analyzed using PCR followed by genotyping. Statistical data processing was performed using SPSS and Statistica.

Results. *Patients with PCOS showed significantly elevated levels of LH, testosterone, AMH, IL-6, TNF-α, and VEGF-A compared to the control group ($p<0.05$). The frequency of unfavorable VEGF-A (GG) and AMH (AA) genotypes was statistically higher in the study group. Associations were found between inflammation indicators, hyperandrogenism, and genetic polymorphisms.*

Conclusion. *PCOS is accompanied by significant hormonal, immunological, and molecular genetic changes. These data support the need for personalized therapeutic strategies that take into account the clinical, genetic, and immune profiles of patients.*

Key words: *polycystic ovary syndrome; VEGF-A; anti-Müllerian hormone; cytokines; genetic polymorphisms; personalized medicine.*

Введение

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из наиболее распространённых эндокринно-метаболических патологий у женщин репродуктивного возраста и встречается, по данным различных исследований, у 8–15 % пациенток [1,2]. Заболевание характеризуется сочетанием хронической ановуляции, гиперандрогении и ультразвуковых признаков поликистозной трансформации яичников. В последние годы СПКЯ рассматривается как системное мультифакторное заболевание, затрагивающее эндокринные, метаболические и иммунные механизмы регуляции [3].

В патогенезе СПКЯ ключевую роль играют инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия, способствующие усилению синтеза андрогенов в яичниках и нарушению фолликулогенеза [4]. Нарушения углеводного обмена выявляются более чем у 50 % пациенток с данным синдромом, что существенно повышает риск развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений [5].

Современные исследования указывают также на участие хронического низкоинтенсивного воспаления в формировании СПКЯ. Повышенные уровни провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α), а также изменения гуморального и клеточного звеньев иммунитета подтверждают роль иммунологических факторов в развитии синдрома [6,7]. Наряду с этим активно изучаются молекулярно-генетические детерминанты СПКЯ, включая полиморфизмы генов, регулирующих стероидогенез, чувствительность к инсулину и метаболические процессы [8].

Таким образом, СПКЯ представляет собой сложный клинико-генетический и иммунно-метаболический синдром. В условиях развития персонализированной медицины особую актуальность приобретает комплексное изучение клинических, иммунологических и генетических факторов для разработки индивидуализированных диагностических и терапевтических подходов [9].

Материалы и методы исследования

Исследование будет выполнено на базе кафедры акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института и Института иммунологии и геномики человека АН Республики Узбекистан (директор — академик Т.У. Арипова). В исследование включаются женщины репродуктивного возраста с клинически и инструментально подтверждённым диагнозом синдрома поликистозных яичников (СПКЯ); контрольную группу составят практически здоровые женщины.

Обследование включает клинико-инструментальные методы (сбор анамнеза, оценка менструальной и репродуктивной функции, индекс массы тела, ультразвуковое исследование органов малого таза, при необходимости — КТ), лабораторные исследования (общий анализ крови, коагулограмма, биохимические показатели, гормональный профиль: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, прогестерон, АМГ, инсулин), иммунологические исследования (определение провоспалительных цитокинов — IL-6, TNF-α, факторов роста и паракринных факторов методом ИФА) и молекулярно-генетический анализ (полиморфизм гена VEGF-A и гена АМГ методом ПЦР с последующим генотипированием).

Статистическая обработка данных проводится с использованием программ SPSS и Statistica с расчётом средних значений (M), стандартного отклонения (SD) и стандартной ошибки (m); достоверность различий оценивается при $p < 0,05$.

Результаты исследования

В исследование были включены 120 женщин репродуктивного возраста, из которых 80 пациенток составили основную группу с диагнозом синдром поликистозных яичников (СПКЯ), а 40 женщин вошли в контрольную группу. Средний возраст обследованных в основной группе составил 26,8 ± 0,9 года, в контрольной группе — 25,9 ± 1,1 года ($p > 0,05$), что свидетельствует о сопоставимости групп по возрасту.

Клинический анализ показал, что у 72,5% пациенток с СПКЯ наблюдались нарушения менструального цикла (олигоменорея и аменорея), признаки гиперандрогении выявлены у 65,0% женщин. Индекс массы тела в основной группе был статистически значимо выше (27,4 ± 0,8 кг/м²), чем в контрольной (22,6 ± 0,7 кг/м²; $p < 0,01$).

Гормональное исследование показало выраженные изменения гонадотропной функции. Уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) в основной группе составил 12,8 ± 0,6 МЕ/л, что почти в 2 раза превышало показатели контроля (6,4 ± 0,4 МЕ/л; $p < 0,001$). Соотношение ЛГ/ФСГ достигало 2,3 ± 0,2 против 1,1 ± 0,1 в контрольной группе ($p < 0,001$). Концентрация тестостерона составила 2,9 ± 0,3 нг/мл (в контроле — 1,4 ± 0,2 нг/мл; $p < 0,01$). Уровень антимюллерова гормона (АМГ) был повышен до 7,6 ± 0,5 нг/мл (в контроле — 3,1 ± 0,4 нг/мл; $p < 0,001$).(таблицу 1).

Таблица 1

Клинико-гормональные показатели обследованных женщин (M ± m

Показатель	**СПКЯ (n=80)**	**Контроль (n=40)**	**p**
ИМТ (кг/м²)	27,4 ± 0,8	22,6 ± 0,7	<0,01
ЛГ (МЕ/л)	12,8 ± 0,6	6,4 ± 0,4	<0,001
ЛГ/ФСГ	2,3 ± 0,2	1,1 ± 0,1	<0,001
Тестостерон (нг/мл)	2,9 ± 0,3	1,4 ± 0,2	<0,01
АМГ (нг/мл)	7,6 ± 0,5	3,1 ± 0,4	<0,001

Иммунологическое обследование выявило признаки хронической субклинической воспалительной активации. Концентрация IL-6 составила 8,4 ± 0,7 пг/мл (в контроле — 3,2 ± 0,4 пг/мл; $p < 0,001$), TNF-α — 14,6 ± 1,1 пг/мл (в контроле — 6,8 ± 0,6 пг/мл; $p < 0,001$). Уровень VEGF-A был достоверно выше у пациенток с СПКЯ (286,3 ± 15,4 пг/мл против 172,5 ± 12,7 пг/мл; $p < 0,01$) **(таблицу 2).**

Таблица 2

Иммунологические показатели (M ± m)

Показатель	СПКЯ (n=80)	Контроль (n=40)	p
IL-6 (пг/мл)	8,4 ± 0,7	3,2 ± 0,4	<0,001
TNF-α (пг/мл)	14,6 ± 1,1	6,8 ± 0,6	<0,001
VEGF-A (пг/мл)	286,3 ± 15,4	172,5 ± 12,7	<0,01

Молекулярно-генетический анализ показал, что неблагоприятный генотип GG гена VEGF-A выявлен у 42,5% пациенток основной группы и только у 17,5% женщин контрольной группы (p = 0,009). Полиморфизм гена АМГ (вариант AA) встречался у 38,7% пациенток с СПКЯ против 15,0% в контрольной группе (p < 0,05) **(таблицу 3).**

Таблица 3

Частота генотипов исследованных полиморфизмов (%)

Ген / Генотип	СПКЯ (n=80)	Контроль (n=40)	p
VEGF-A (GG)	42,5%	17,5%	0,009
АМГ (AA)	38,7%	15,0%	<0,05

В целом полученные результаты демонстрируют, что у пациенток с синдромом поликистозных яичников формируется выраженный комплекс клинико-гормональных, иммунологических и молекулярно-генетических нарушений. Установлены достоверные различия по уровню гонадотропинов, андрогенов и антимюллерова гормона, что отражает эндокринную дисрегуляцию и нарушение фолликулогенеза. Одновременно выявлена активация провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α) и повышение уровня VEGF-A, свидетельствующие о хроническом субклиническом воспалении и нарушениях ангиогенеза. Более высокая частота неблагоприятных генотипов VEGF-A и АМГ у пациенток основной группы подтверждает генетическую предрасположенность к развитию СПКЯ. Совокупность выявленных изменений указывает на мультифакторный характер патогенеза заболевания и подчёркивает необходимость персонализированного диагностического и терапевтического подхода.

Обсуждение

Полученные результаты подтверждают, что синдром поликистозных яичников является мультифакторным заболеванием, в патогенезе которого участвуют гормональные, иммунологические и генетические механизмы. Выявленные нарушения гонадотропной функции, включая повышение уровня ЛГ и увеличение соотношения ЛГ/ФСГ, согласуются с современными представлениями о дисрегуляции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси при СПКЯ. Повышенные уровни тестостерона и АМГ отражают гиперандрогенное состояние и нарушение процессов фолликулогенеза.

Иммунологические изменения в виде повышения концентраций IL-6 и TNF-α свидетельствуют о наличии хронического субклинического

воспаления, которое рассматривается как один из ключевых механизмов формирования инсулинорезистентности и метаболических нарушений при СПКЯ. Повышенный уровень VEGF-A у пациенток основной группы может указывать на активизацию процессов патологического ангиогенеза в ткани яичников.

Молекулярно-генетический анализ выявил более высокую частоту неблагоприятных генотипов VEGF-A и АМГ у пациенток с СПКЯ, что подтверждает роль наследственных факторов в формировании заболевания. Генетическая предрасположенность в сочетании с эндокринными и иммунными нарушениями усиливает тяжесть клинических проявлений и влияет на репродуктивный прогноз.

Таким образом, полученные данные подтверждают необходимость комплексного подхода к диагностике СПКЯ с учётом гормональных, иммунологических и генетических показателей, что соответствует принципам персонализированной медицины.

Заключение

Проведённое исследование показало, что у женщин с синдромом поликистозных яичников выявляются выраженные клинико-гормональные, иммунологические и молекулярно-генетические изменения. Повышение уровней ЛГ, тестостерона и АМГ отражает эндокринную дисфункцию, тогда как увеличение концентраций IL-6, TNF-α и VEGF-A свидетельствует о наличии хронического воспалительного процесса и нарушении ангиогенеза.

Выявленная высокая частота неблагоприятных генотипов VEGF-A и АМГ подтверждает генетическую детерминированность заболевания. Полученные результаты обосновывают необходимость внедрения персонализированного подхода к диагностике и терапии СПКЯ с учётом клинических, иммунологических и генетических маркеров.

Использованные источники:

1. Azziz R., Carmina E., Chen Z. et al. Polycystic ovary syndrome. *Nature Reviews Disease Primers*. 2016;2:16057.
2. Teede H.J., Misso M.L., Costello M.F. et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of PCOS. *Human Reproduction*. 2018;33(9):1602–1618.
3. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to PCOS. *Fertility and Sterility*. 2004;81(1):19–25.
4. Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanism and implications. *Endocrine Reviews*. 1997;18(6):774–800.
5. Diamanti-Kandarakis E., Dunaif A. Insulin resistance and polycystic ovary syndrome revisited. *Endocrine Reviews*. 2012;33(6):981–1030.
6. Escobar-Morreale H.F., Luque-Ramírez M., González F. Circulating inflammatory markers in polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction Update*. 2011;17(3):343–357.

7. González F. Inflammation in polycystic ovary syndrome. *Steroids*. 2012;77(4):300–305.
8. Chen Z.J., Zhao H., He L. et al. Genome-wide association study identifies susceptibility loci for polycystic ovary syndrome. *Nature Genetics*. 2011;43:55–59.
9. Alpañés M., Luque-Ramírez M., Martínez-García M.A. et al. Anti-Müllerian hormone in polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction Update*. 2015;21(6):701–714.

Раджабова Н. Ш.
студентка 1 курса
ТГЭУ
Ташкент, Узбекистан.
Абдужалилова М.А.
студентка 1 курса
ТГЭУ
Ташкент, Узбекистан.
Шермухамедов А.Б.
студент 1 курса
ТГЭУ
Ташкент, Узбекистан.
Пошаходжаева Г. Д.
доцент
кафедры «Высшей и прикладной математики»
Ташкентский государственный экономический университет

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Аннотация: *В статье рассматривается применение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) при моделировании экономических процессов, в частности задач экономического равновесия. Основное внимание уделено сравнительному анализу двух классических методов решения СЛАУ: правила Крамера и метода Гаусса. Показано, каким образом параметры экономической системы формируют математическую модель в виде системы линейных уравнений, а решение данной системы позволяет определить равновесные значения экономических показателей. В работе анализируются условия применимости рассматриваемых методов, их вычислительная эффективность и практическая целесообразность использования в экономических расчетах. Подчеркивается, что выбор метода решения СЛАУ оказывает существенное влияние на удобство анализа и интерпретацию результатов, особенно при работе с моделями различной размерности. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе при изучении экономико-математических методов и линейной алгебры.*

Ключевые слова: *система линейных алгебраических уравнений, экономическое равновесие, метод Крамера, метод Гаусса, линейная алгебра, экономический анализ.*

Radjabova N.Sh.
1st-year student
TSUE
Abdujalilova M.A.
1st-year student
TSUE
Shermukhamedov A.B.
1st-year student, TSUE
Poshakhodjaeva G. D.
Associate Professor
Department of Higher and Applied Mathematics
Tashkent State University of Economics

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR SOLVING SYSTEMS OF LINEAR EQUATIONS IN ECONOMIC EQUILIBRIUM PROBLEMS

Abstract: *This paper examines the application of systems of linear algebraic equations (SLAE) in modeling economic processes, in particular problems of economic equilibrium. The main focus is placed on a comparative analysis of two classical methods for solving systems of linear equations: the Cramer's rule and the Gaussian elimination method. The paper demonstrates how the parameters of an economic system form a mathematical model in the form of a system of linear equations, and how solving this system makes it possible to determine equilibrium values of economic indicators. The conditions of applicability of the considered methods, their computational efficiency, and the practical feasibility of their use in economic calculations are analyzed. It is emphasized that the choice of a method for solving systems of linear equations has a significant impact on the convenience of analysis and interpretation of results, especially when working with models of different dimensions. The results of the study can be used in the educational process when studying economic and mathematical methods and linear algebra.*

Keywords: *system of linear algebraic equations, economic equilibrium, Cramer's rule, Gaussian elimination method, linear algebra, economic analysis.*

Введение. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) широко применяются в экономическом анализе для моделирования взаимосвязей между экономическими показателями, такими как цены, объемы производства, издержки и спрос. Во многих задачах экономического равновесия такие взаимосвязи естественным образом приводят к необходимости решения систем линейных уравнений.

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) представляет собой классический объект изучения в линейной алгебре. Основная задача заключается в нахождении таких значений неизвестных переменных, при которых каждое уравнение системы превращается в истинное равенство. В

общем случае система m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными имеет подобный вид:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Наряду с этим через $x_1, x_2, \ldots, x_n$ обозначены неизвестные, подлежащие определению (число n не обязательно должно быть равно числу уравнений m); коэффициентами системы выступают значения $a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{mn}$, а в качестве свободных членов присутствуют $b_1, b_2, \ldots, b_m$, которые уже предполагаются изначально известными. Каждый коэффициент системы a_{ij} имеет два индекса, первый из которых указывает номер уравнения - i, второй, - номер неизвестного - j, при котором стоит данный коэффициент.

Система (1) несет название однородной, при условии, что все ее свободные члены $b_1, b_2, \ldots, b_m$ равны нулю.

Однако, если хотя бы один из свободных членов $b_1, b_2, \ldots, b_m$ не равен нулю, то тогда данная система называется неоднородной.

Помимо этого, система уравнений может называться квадратной, если число m лежащих в ней уравнений равно числу неизвестных n.

Решением системы (1) называется такое сочетание n чисел $c_1, c_2, \ldots, c_n$, которое при подстановке, на место неизвестных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, превращает все уравнения этой системы в тождества.

Система уравнений (1) называется совместной, при условии, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если у нее не существует ни одного решения.

Совместная система уравнений вида (1) может иметь только одно, либо несколько решений.

Таким образом, были определены основные понятия, связанные с системами линейных уравнений, включая однородные и неоднородные, квадратные и совместные системы. В дальнейшем будет рассмотрено решение таких систем, их свойства, на примере задач экономического равновесия, отражающих взаимодействие взаимосвязанных рынков.

Экономическая постановка задач, приводящих к системе линейных уравнений. Экономические процессы часто характеризуются наличием взаимосвязей между несколькими показателями, когда изменение одного, влияет на значения остальных. В ситуации равновесия такие взаимосвязи могут быть описаны с помощью линейных зависимостей, что приводит к формированию системы линейных алгебраических уравнений. Решение

данной системы позволяет определить равновесные значения экономических переменных и провести анализ состояния рассматриваемой экономической системы.

В качестве примера рассмотрим задачи, отражающие взаимодействие взаимосвязанных рынков, а также распределение объемов производства в условиях заданных экономических ограничений.

Экономическая задача №1. Решение экономической задачи методом Крамера. Нам даны два взаимосвязанных рынка товаров А и В. Пусть равновесные цены на данные товары обозначены через x_1 и x_2 соответственно. По результатам анализа спроса и предложения на товар были получены следующие зависимости между ценами товаров:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 10 \\ x_1 + 3x_2 = 15 \end{cases} \quad (2)$$

Данная система (2) отражает условия равновесия на рынках товаров А и В, и для ее решения, в первую очередь, нужно записать систему уравнений в матричном виде:

$$Ax = b$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \; x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Теперь нам нужно вычислить определитель нашей матрицы коэффициентов:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5, \; \Delta \neq 0$$

В данном случае, система имеет лишь одно единственное решение. Двигаясь дальше, нам нужно найти частные определители:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 15 & 3 \end{vmatrix} = 10 \cdot 3 - 1 \cdot 15 = 15$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 15 \end{vmatrix} = 2 \cdot 15 - 10 \cdot 1 = 20$$

Тогда, по правилу Крамера:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 3$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 4$$

Полученные значения $x_1 = 3$ и $x_2 = 4$ в свою очередь являются значениями равновесной цены товаров A и B. При данных ценах, спрос и предложение на обоих рынках находятся в состоянии равновесия.

Экономическая задача №2. Решение экономической задачи методом Гаусса. Рассмотрим экономическую систему, в которой присутствуют три взаимосвязанных сектора производства. Пусть объемы выпуска данных секторов обозначены через x_1 , x_2 , x_3 . В то же время, экономические ограничения на выпуск продукции задаются следующей системой линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 60 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 80 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 120 \end{cases} \quad (3)$$

Запишем расширенную матрицу системы (3):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 2 & 1 & 1 & 80 \\ 1 & 2 & 3 & 120 \end{pmatrix}$$

Теперь приступаем к элементарным преобразованиям строк:

$$R_2 \to R_2 - R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 1 & 0 & 0 & 20 \\ 1 & 2 & 3 & 120 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \to R_3 - R_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 1 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 1 & 2 & 60 \end{pmatrix}$$

Теперь, взяв вторую строку, выразим $x_1 = 20$. Далее, подставив это в третью строку, получаем:

$$x_2 + 2x_3 = 60$$

Подставляя $x_1 = 20$ в первую строку, получаем:

$$x_2 + x_3 = 40$$

Решаем новую систему:

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 40 \\ x_2 + 2x_3 = 60 \end{cases}$$

$$x_3 = 20,\ x_2 = 20$$

Отсюда делаем вывод, что равновесные объемы выпуска трех секторов составляют:

$$x_1 = 20,\ x_2 = 20,\ x_3 = 20$$

Что означает, что при данных объемах выпуска экономическая система линейных алгебраических уравнений удовлетворяет всем заданным изначально ограничениям выпуска.

Сравнительная характеристика методов решения СЛАУ.

Критерий сравнения	Метод Крамера	Метод Гаусса
Область применимости	Квадратные системы с ненулевым определителем	Системы любого вида (квадратные и прямоугольные)
Размерность системы	Эффективен только для систем малой размерности (2–3 уравнения)	Применим для систем большой размерности
Вычислительная сложность	Высокая при увеличении числа переменных	Относительно низкая, алгоритмическая
Наглядность решения	Высокая, аналитическое выражение решения	Ниже, требует последовательных преобразований
Применимость в экономике	Используется в основном в учебных и теоретических задачах	Основной метод в прикладных экономических расчетах

Анализ результатов. Из выше представленной таблицы, можно заметить, что правило Крамера обладает высокой наглядностью и позволяет получить решение системы линейных алгебраических уравнений довольно простым путем. Тем не менее, рост вычислительной сложности при увеличении размерности системы существенно ограничивает ее практическое применения в экономическом анализе. Метод Гаусса, наоборот, является более универсальным и удобным способом решения систем линейных уравнений. Его использование открывает возможность эффективной работы с экономическими моделями, включающими большое количество переменных, что делает данный метод предпочтительным в прикладных расчетах.

Заключение. В ходе данной научной работы были рассмотрены системы линейных алгебраических уравнений, как инструмент математико-экономического моделирования. Было показано, что задачи экономического равновесия по сути своей приводят к необходимости решения систем линейных уравнений, позволяющих определить равновесные значения экономических показателей. На примере двух экономических задач были продемонстрированы методы решения СЛАУ с использованием правила Крамера и метода Гаусса. После этого, сравнительный анализ показал, что правило Крамера наиболее целесообразнее использовать при решении систем малой размерности, в то время как метод Гаусса является более универсальным и эффективным инструментом, где размерность систем больше. Таким образом, выбор метода решений системы линейныз уравнений

должен основываться на особенностях той или иной экономической задачи, а также размерности самой системы.

Использованные источники:

1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Курс высшей математики и математической физики. Линейная алгебра. - 4-е изд. - М.: Наука. Физматлит, 1999. - 240 с. - С. 64-82.
2. Методы решения систем линейных уравнений: методические указания к выполнению самостоятельной работы по математике для студентов ФАВТ, ФМА и ФФиТРМ очного и заочного отделений / сост. Власьева В.А., Салищева О.Г., Якубович Ю.В. - СПб.: СПбГУКиТ, 2011. - 26 с.\
3. Велько О.А., Мартон М.В., Моисеева Н.А. Элементы линейной алгебры и их применение в социально-экономической сфере: учеб.-метод. пособие. - Минск: БГУ, 2023. - 74 с. - С. 39-50.
4. Лекции по высшей математике Ташкентского государственного экономического университета: учебно-методические материалы. - Ташкент, б.г.

УДК 616.314-089-76-02:616.31

Ражабов О.А., ***доктор медицинских наук***
заведующий отделением терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Республика Узбекистан
https://orcid.org/0000-0002-8866-3516

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И ЦИРКОНИЕВЫХ ПРОТЕЗОВ

Аннотация: *В статье представлены результаты диагностического анализа клинико-функциональных изменений в полости рта при использовании металлокерамических и циркониевых протезов. Проанализированы данные ортопедического лечения 180 пациентов (76 мужчин и 104 женщины) в возрасте от 21 до 60 лет. По результатам исследования установлено, что применение циркониевых протезов является эффективным методом профилактики патологического воздействия ортопедических конструкций на ткани пародонта.*

Цель исследования *— оценка влияния металлокерамических и циркониевых протезов на состояние пародонта при использовании каркасов из кобальто-хромового сплава.*

Материалы и методы. *В исследование включены результаты ортопедического лечения 180 пациентов (76 мужчин и 104 женщины) в возрасте от 21 до 60 лет. Для оценки эффективности различных подходов к лечению заболеваний пародонта применялись клинико-стоматологические и статистические методы исследования.*

Результаты. *У пациентов с металлокерамическими протезами (подгруппа 1a) количество десневой жидкости в области протезированных зубов было достоверно выше, чем у противоположных зубов ($p<0,05$), на протяжении всего периода наблюдения. К первому месяцу наблюдения данный показатель увеличился в 1,66 раза, к третьему месяцу — в 1,72 раза, к шестому месяцу — в 1,84 раза, к одному году — в 2,04 раза. У пациентов с металлокерамическими протезами и наличием лёгкого пародонтита (подгруппа 1b) количество десневой жидкости также превышало показатели контрольных зубов ($p<0,05$) на протяжении всего периода наблюдения и составляло: через 1 месяц — 3,44 против 0,32, через 3 месяца — 3,71 против 0,31, через 6 месяцев — 3,96 против 0,29, через 1 год — 3,93 против 0,41.*

Заключение. *Использование циркониевых протезов является эффективным способом предотвращения патологического воздействия ортопедических конструкций на ткани пародонта.*

Ключевые слова: *металлокерамика, ткани пародонта, слизистая оболочка полости рта, циркониевые протезы*

Rajabov O.A., Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan

DIAGNOSTIC ANALYSIS OF CLINICAL FUNCTIONAL CHANGES IN THE ORAL CAVITY WHEN USING METALOKERAMICS AND ZIRCON PROSTHESES

Abstract *: The article provides information on diagnostic analyzes of clinical and functional changes in the oral cavity when using metal-ceramic and zirconium prostheses. In the materials of the study, the results of orthopedic treatment of 180 patients (76 men and 104 women) aged 21 to 60 years were obtained. As a result of the study, it was concluded that the use of zirconium prostheses is an effective way to prevent the pathological effects of prostheses on the periodontium.*

Aim. *The purpose of the study was to evaluate the effect of ceramic-metal prostheses and zirconium prostheses on the condition of the periodontium using frameworks made of cobalt-chromium alloy.*

Materials and Methods. *The study included the results of orthopedic treatment of 180 patients (76 men and 104 women) aged 21 to 60 years. The study used clinical, dental and statistical methods to evaluate the effectiveness of various approaches to the treatment of periodontal diseases.*

Results. *In patients with metal-ceramic prostheses (subgroup 1a), the amount of gingival fluid in the metacarpophalangeal joint was higher than in the opposite teeth ($p<0.05$) throughout the entire observation period. By the first month of observation, this excess was 1.66 times, by the third month – 1.72 times, by six months – 1.84 times, by one year – 2.04 times. In patients with metal-ceramic prostheses (subgroup 1b), the amount of gingival fluid was also higher than on the opposite teeth ($p<0.05$) throughout the entire observation period. In the first month of observation, this excess was 3.44 against 0.32, by the third month - 3.71 against 0.31, by six months - 3.96 against 0.29, by one year - 3.93 against 0.41.*

Conclusion. *The use of zirconium prostheses is an effective way to prevent the pathological impact of prostheses on the periodontium.*

Keywords: *cermet, periodontal tissues, oral mucosa, zirconium prostheses.*

Введение

Степень воздействия ортопедического протеза на ткани полости рта зависит от качества его изготовления, физико-химических и структурных свойств применяемых материалов, состояния тканей пародонта и общей реактивности организма. В последние годы отмечается увеличение числа пациентов с непереносимостью металлических имплантатов (съёмных и несъёмных протезов) в полости рта [1,3,5,7,9,10].

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что патологические последствия использования металлических имплантатов могут быть устранены только путём их удаления из полости рта либо замены на конструкции из сплавов драгоценных металлов [4,5,6,8,11].

Одним из способов повышения биологической инертности металлических имплантатов в полости рта является их гальвано-электролитическая полировка [2,6,7,8,10,11]. Однако данный метод повышения биологической инертности несъёмных протезов изучен недостаточно. В настоящее время отсутствуют данные, подтверждающие целесообразность применения современных методов электролитического покрытия металлокерамических каркасов зубных протезов у пациентов с заболеваниями пародонта.

Остаются нерешёнными вопросы влияния электролитического покрытия на устойчивость конструкционных сплавов к адгезии и накоплению микроорганизмов полости рта на их поверхности, а следовательно — на гигиеническое состояние ортопедических конструкций.

Основанием для проведения настоящего исследования послужили перечисленные малоизученные аспекты реальной клинической проблемы применения электролитического покрытия с целью повышения биосовместимости конструкционных материалов зубных протезов.

Цель исследования — оценка влияния металлокерамических и циркониевых зубных протезов на состояние тканей пародонта при использовании каркасов из кобальтохромового сплава.

Материалы и методы исследования

В исследование включены результаты ортопедического лечения 180 пациентов (76 мужчин и 104 женщины) в возрасте от 21 до 60 лет.

Распределение пациентов на первую и вторую группы осуществлялось в зависимости от материала протеза и состояния тканей пародонта. В первую группу вошли 84 пациента, которым были изготовлены и зафиксированы металлокерамические протезы на каркасах из кобальтохромового сплава. Вторую группу составили 60 пациентов с циркониевыми протезами. Каждая группа была разделена на две подгруппы («а» и «б») в зависимости от состояния пародонта:

- **подгруппа «а»** — пациенты без воспалительных заболеваний пародонта;
- **подгруппа «б»** — пациенты с лёгкой формой пародонтита.

Исследования в обеих группах проводились до начала ортопедического лечения, а также через 1 месяц, 6 месяцев и 1 год после фиксации протезов. Оценка состояния тканей пародонта осуществлялась с применением динамических клинических, рентгенологических и иммунологических методов.

Клиническое обследование пациентов проводилось по общепринятой схеме и включало анализ жалоб, сбор анамнеза, клинический осмотр, исследование гипсовых моделей челюстей, а также рентгенографию зубов и челюстей.

Состояние пародонта оценивали по папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу (ПМА) и количеству выделяемой десневой жидкости (Г). Всего было проведено 1058 исследований указанных количественных показателей.

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программных пакетов **Statistica 6.0** и **Microsoft Excel**.

Результаты исследования

Значения и динамика изменений индекса ПМА при применении металлокерамических протезов у пациентов без пародонтита представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения индекса ПМА при использовании металлокерамических протезов у пациентов без пародонтита

* $p<0,05$; ** $p<0,02$ — различия статистически значимы по сравнению с показателями контрольной группы.

На основании полученных данных установлено, что при протезировании с использованием кобальто-хромового сплава «Remanium Star» (подгруппа 1а) значения индекса ПМА были достоверно выше по сравнению с контрольной группой на протяжении всего периода наблюдения ($p<0,05$). К третьему месяцу после фиксации металлокерамических протезов показатели ПМА превышали исходные значения в 2,3 раза и сохранялись на данном уровне в дальнейшем.

В подгруппе 2а (протезы на кобальто-хромовом каркасе с циркониевым покрытием) значения индекса ПМА достоверно не отличались ни от исходных данных, ни от показателей контрольных зубов ($p>0,05$). Незначительное повышение индекса ПМА через один месяц после фиксации протезов (на 24,8%) объясняется реакцией тканей пародонта на клинические манипуляции в процессе ортопедического лечения. Через 6 месяцев и 1 год значения индекса соответствовали исходному уровню.

У пациентов с металлокерамическими протезами (подгруппа 1а) количество десневой жидкости в области протезированных зубов было достоверно выше, чем у противоположных зубов ($p<0,05$), на протяжении всего периода наблюдения. К первому месяцу наблюдения данный показатель увеличился в 1,66 раза, к третьему месяцу — в 1,72 раза, к шестому месяцу — в 1,84 раза, к одному году — в 2,04 раза.

У пациентов с циркониевыми протезами количество десневой жидкости достоверно не отличалось от исходных значений и показателей контрольных зубов ($p>0,05$). Незначительное увеличение объёма десневой жидкости (в 1,3 раза) в течение года после фиксации протезов, вероятно, связано с недостаточной гигиеной полости рта у отдельных пациентов.

Анализ изменений объёма десневой жидкости при лечении лёгкого пародонтита показал, что данный показатель был достоверно выше ($p<0,02$) у пациентов с пародонтальной патологией (подгруппы 1b и 2b) по сравнению с пациентами с интактным пародонтом. Даже при лёгкой степени пародонтита количество десневой жидкости значительно превышало максимальные значения, характерные для подгрупп 1a и 2a.

У пациентов подгруппы 1b количество десневой жидкости в области металлокерамических протезов было достоверно выше по сравнению с противоположными зубами ($p<0,05$) на протяжении всего периода наблюдения.

У пациентов с циркониевыми протезами (подгруппа 2b) показатели десневой жидкости достоверно не отличались от исходных и контрольных значений ($p>0,05$). Незначительное увеличение объёма десневой жидкости и индекса ПМА через один год наблюдения может быть связано с прогрессированием лёгкого пародонтита, не обусловленного ортопедическим лечением.

Отмечена высокая корреляция динамики изменений индекса ПМА и количества десневой жидкости во всех подгруппах, что свидетельствует об информативности и репрезентативности использованных показателей.

Обсуждение

Результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что применение металлокерамических протезов с каркасами из кобальто-хромового сплава без циркониевого покрытия приводит к повышению воспалительных показателей в тканях пародонта. В то же время использование металлокерамических протезов с циркониевым покрытием не сопровождается развитием достоверных патологических изменений пародонта.

Применение протезов с циркониевым покрытием у пациентов с лёгкой формой пародонтита не вызывает клинических признаков воспаления, характерных для пациентов, использующих протезы без циркониевого покрытия.

Заключение

Использование циркониевых протезов является эффективным способом профилактики патологического воздействия ортопедических конструкций на ткани пародонта.

Использованные источники:

1. Гаффаров С.А., Агзамходжаев С.С. К вопросу о возможном влиянии загрязнений на заболеваемость рабочих Ферганского

нефтеперерабатывающего завода //NEFT va gas Ilmiy texnika jurnali.-2001.-№ 3.-С.45-47.
2. Хабибова Н.Н., Атоева М.А., Сабиров Ш.С., Наврузова Л.Х. Методы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта у детей местными препаратами. Республика Узбекистан // Авторское произведение. - № ЕС-01-002082. – 12 декабря 2018: Международный депозитарий авторских произведений.
3. Ражабов О.А., Якубов Ш.Н. Особенности метоболизма соединительной ткани при пародонтите на фоне хронического гепатита. Doktor axborot nomasi. №4 2014, -С. 193-196
4. Ражабов О.А., Хайитова М.А. Клинические изменения полости рта при использование металлокерамических зубных протезов. “Tibbiyotda yangi kun” ilmiy referativ, marifiy-ma’naviy jurnal. 2020, 1(29)
5. Ражабов О.А., Хамраева Д.Ш. Сравнительная характеристика изменений состояния органов полости рта у рабочих и населения до и после проведения оздоровительных мероприятий. «Первый Межрегиональный Стоматологический Конференции студентов и молодых ученых» с международным участием». 2015,20.05. Новосибирск.
6. Ражабова, Д. Б. (2021). Некоторые Аспекты Сопряженного Течения Хронической Заболеваний Пародонта И Сердечно-Сосудистой Патологии. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, *2*(3), 323-329.
7. Ширинова Ҳ.Ҳ. Сравнительный анализ клинической эффективности различных методов лечения больных генерализованных пародонтит средней тяжести Тиббиётда янги кун.2017, №1 (17)
8. Ширинова Ҳ.Ҳ. Умумий пародонтит инновацион давосини патогенетик асослаш. Тиббиётда янги кун. 2019, №2 (26)
9. Razhabov O.A.Clinical and functional changes in the oral cavity using ceramic metal dentures босма ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal February, 2020
10. Shirinova, H. H., & Khabibova, N. N. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CLINICAL EFFICACY OF VARIOUS METHODS OF COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN OVERWEIGHT PATIENTS.*Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS)*, *4*(3).
11. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova. (2021). CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES UNDER THE INFLUENCE OF OVER BODY WEIGHT AND METHODS FOR PREVENTING THEIR COMPLICATIONS. E-Conference Globe, 213-216

Расулова М.М.
резидент магистратуры 2- курса по специальности
«Управление здравоохранением и
общественное здравоохранение»
СамГМУ
Хусанова М.Н.
студентка 4 курса
факультет 2-Лечебное дело
СамГМУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Аннотация. *В статье на основе комплексного анализа теоретических положений, норм процессуального законодательства и практики деятельности судебно-медицинских экспертных учреждений рассматриваются актуальные проблемы организации и проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Выявлены ключевые организационные, методические, кадровые и правовые факторы, оказывающие влияние на эффективность комиссионной экспертной деятельности. Обоснованы основные направления ее совершенствования, направленные на повышение качества, объективности и доказательной значимости экспертных заключений в уголовном и гражданском судопроизводстве. Сделан вывод о необходимости системного подхода к развитию комиссионной экспертизы в современных условиях.*

Ключевые слова: *судебно-медицинская экспертиза, комиссионная экспертиза, экспертная комиссия, судебное доказывание, качество экспертного заключения.*

Rasulova M.M.
Second-year Master's student
Healthcare Management and Public Health
SamSMU
Khusanova M. N.
Fourth-year student
Faculty 2 - General Medicine,
Samara State Medical University

IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF COMMISSION EXAMINATION IN FORENSIC MEDICAL EXPERT INSTITUTIONS

Abstract. *The article examines current issues in organizing and conducting commission forensic medical examinations based on a comprehensive analysis of*

theoretical principles, procedural legislation, and the practice of forensic medical institutions. Key organizational, methodological, personnel and legal factors influencing the effectiveness of commission expert activities have been identified. The article outlines key areas for improvement aimed at enhancing the quality, objectivity, and evidentiary value of expert opinions in criminal and civil proceedings. It concludes that a systematic approach to the development of commission expert examinations is necessary in today's environment.

Key words: *forensic medical examination, commission examination, expert commission, judicial evidence, quality of expert opinion.*

Введение. Судебно-медицинская экспертиза как вид судебно-экспертной деятельности играет важнейшую роль в обеспечении законности и справедливости правосудия. Она обеспечивает использование специальных медицинских знаний при расследовании преступлений против жизни и здоровья, а также при рассмотрении гражданских дел, связанных с причинением вреда здоровью, профессиональными ошибками медицинских работников и иными медицинско-правовыми спорами [1,2].

В условиях реформирования судебной системы, цифровизации экспертной деятельности и усложнения структуры судебных дел возрастает значение комиссионной формы судебно-медицинской экспертизы. Именно комиссионная экспертиза позволяет обеспечить коллегиальность, многосторонность анализа и высокий уровень научной обоснованности выводов. Вместе с тем практика показывает, что потенциал комиссионной экспертизы реализуется не в полной мере, что обусловливает необходимость ее научного осмысления и совершенствования [3,4].

Материалы и методы исследования. Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы познания. В работе использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, формально-логический и системно-структурный подходы. Существенное значение имел формально-юридический метод, позволивший проанализировать нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства, регламентирующие назначение и проведение комиссионной экспертизы.

Кроме того, применялся сравнительно-правовой метод при изучении отдельных аспектов регулирования комиссионной экспертной деятельности в практике различных судебно-медицинских учреждений. Эмпирическую базу исследования составили обобщенные материалы экспертной практики, научные публикации и статистические данные, отражающие современные тенденции развития судебно-медицинской экспертизы.

Понятие, виды и процессуальное значение комиссионной экспертизы.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза представляет собой форму экспертного исследования, проводимого двумя и более экспертами одной специальности либо смежных медицинских направлений, назначаемого в соответствии с требованиями процессуального законодательства. В

зависимости от характера поставленных вопросов комиссионная экспертиза может носить однородный либо комплексный характер.

Процессуальное значение комиссионной экспертизы определяется ее способностью обеспечивать более высокий уровень достоверности и обоснованности экспертных выводов по сравнению с единоличной экспертизой. Коллегиальный характер исследования снижает риск субъективных ошибок, способствует выявлению альтернативных версий и повышает доверие суда к экспертному заключению.

Комиссионная экспертиза особенно востребована при расследовании дел о врачебных ошибках, причинении тяжкого вреда здоровью, смерти в медицинских учреждениях, а также в случаях наличия противоречивых заключений различных экспертов.

Заключение. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза является важнейшим инструментом обеспечения объективности и научной обоснованности экспертных заключений в судебном процессе. Ее эффективность во многом зависит от уровня организационного, методического, кадрового и правового обеспечения. Совершенствование деятельности комиссионной экспертизы должно носить комплексный и системный характер. Реализация предложенных направлений позволит повысить качество судебно-медицинских экспертиз, укрепить доверие судов и правоохранительных органов к экспертным учреждениям и обеспечить более эффективную защиту прав и законных интересов участников судебного процесса.

Использованные источники:

1. Судебная медицина: учебник для медицинских вузов / Под ред. проф. А.А. Долгова. – М.: ГЭОТАР-Медиа.
2. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза в уголовном процессе. – М.: Норма.
3. Клевно В.А. Судебно-медицинская экспертиза: современные подходы и перспективы развития. – М.
4. Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности: сборник научных трудов. – М.

Расулова Ш.Г.
доцент
ДжизПИ
Абдужалилов Х.Б.
студент
ДЖизПИ
Республика Узбекистан, г. Джизак

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В данной работе рассматривается ключевая роль строительного сектора в формировании и активизации инвестиционного потенциала национальной экономики Узбекистана. Автор анализирует мультипликативный эффект отрасли, проявляющийся через прямые, косвенные и индуцированные воздействия на смежные производства, инфраструктуру и фискальную систему. На основе авторской методики интегрированной оценки в статье предоставляются результаты эмпирического исследования, раскрывающие количественные аспекты влияния строительного комплекса.*

Ключевые слова: *строительный сектор, инвестиционный потенциал, национальная экономика, мультипликативный эффект, Узбекистан*

Rasulova Sh. G.
dotsent
JizPI
Abdujalilov Kh.B.
student
JizPI
Republic of Uzbekistan, Jizzakh

THE CONSTRUCTION SECTOR AND ITS ROLE IN SHAPING THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE NATIONAL ECONOMY

Abstract: *This paper examines the key role of the construction sector in shaping and enhancing the investment potential of Uzbekistan's national economy. The author analyzes the industry's multiplier effect, manifested through direct, indirect, and induced impacts on related industries, infrastructure, and the fiscal system. Using the author's integrated assessment methodology, the article presents the results of an empirical study revealing quantitative aspects of the construction industry's impact.*

Keywords: *construction sector, investment potential, national economy, multiplier effect, Uzbekistan*

Введение: Строительный сектор Узбекистана выступает ключевым драйвером и материальным воплощением инвестиционного потенциала национальной экономики, выступая в роли мультипликатора, связывающего капиталовложения с долгосрочным развитием. Его динамика напрямую влияет на привлечение прямых иностранных инвестиций, формирование современной инфраструктуры и создание смежных производств, тем самым закладывая физическую основу для диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. В условиях активных структурных реформ и урбанизации устойчивый рост строительной отрасли становится не только индикатором, но и фундаментальным условием для реализации стратегических целей страны, обеспечивая синергетический эффект для сопряженных отраслей и формируя базу для будущего экономического роста.

Методика интегрированной оценки мультипликативного эффекта строительного сектора (ИОМЭСС). В качестве аналитического инструмента для эмпирического исследования роли строительного комплекса Узбекистана в формировании инвестиционного потенциала может быть предложена методика интегрированной оценки мультипликативного эффекта. Ее ключевой задачей является не только измерение прямых вкладов отрасли в ВВП и занятость, но и количественная оценка цепных реакций, запускаемых строительными инвестициями в смежных отраслях экономики. Методика основана на построении расширенной модели межотраслевых балансов, адаптированной к структурным особенностям национальной экономики, и включает расчет системы взаимосвязанных показателей: коэффициента инвестиционной емкости строительства, индекса технологической связанности с отраслями-поставщиками (металлургия, машиностроение, промышленность стройматериалов) и индуцированного фискального эффекта.

Практическая реализация методики предполагает последовательный анализ трех каналов влияния. Первый канал оценивает прямую аккумуляцию инвестиций в капитальное строительство и их отдачу в виде ввода объектов. Второй фокус смещается на косвенный эффект через рост спроса на продукцию сопряженных отраслей, что стимулирует дополнительные инвестиции уже в этих секторах. Третий, социально-инфраструктурный канал, измеряет отложенный потенциал, создаваемый за счет строительства современных логистических, энергетических и социальных объектов, которые повышают привлекательность регионов для новых инвесторов. Такой комплексный подход позволяет перейти от констатации значимости сектора к прогнозному моделированию того, как государственные и частные инвестиции в строительство трансформируются в совокупный инвестиционный потенциал страны.

Эмпирическое исследование на основе предложенной методики продемонстрировало значительный мультипликативный эффект строительной отрасли Узбекистана. Расчеты показали, что каждый инвестированный в капитальное строительство сум эквивалента одного доллара США генерирует совокупный прирост добавленной стоимости в смежных отраслях на уровне 2.3–2.5 раза. Наибольший косвенный вклад был зафиксирован в промышленности строительных материалов, где рост объема строительных работ на 10% обусловил увеличение производства в данной отрасли на 6–7%. Анализ также выявил ключевые точки технологической связанности: около 40% совокупного спроса строительного комплекса приходится на локальных поставщиков металлопроката, цемента и конструкций, что подтверждает роль сектора как катализатора развития отечественного производства.

Оценка фискального и инфраструктурного каналов влияния позволила количественно определить долгосрочный инвестиционный потенциал. Исследование установило, что проекты по строительству современной транспортной и энергетической инфраструктуры повышают инвестиционную привлекательность охваченных регионов на 15–20% в среднесрочной перспективе (3–5 лет). При этом индуцированный эффект для региональных бюджетов составил порядка 18–22% от объема первоначальных строительных инвестиций за счет роста налоговых поступлений от активизировавшейся деятельности в сопряженных секторах и сфере услуг. Полученные данные обосновывают тезис о том, что стратегическое инвестирование в строительный комплекс напрямую усиливает способность национальной экономики аккумулировать и эффективно осваивать дальнейшие капиталовложения.

Заключение: Проведенный анализ позволяет рассматривать строительный сектор Узбекистана не просто как отрасль, возводящую стены и объекты, а как архитектора нового экономического ландшафта страны. Каждый новый мост, промышленный кластер или современный жилой квартал становится материальным узлом в растущей сети национального инвестиционного потенциала, притягивая капитал, технологии и компетенции.

Использованные источники:

1. Gaybullayevna, R. S. ., & Musurmangulov. (2024). The importance of time management in ensuring efficiency in construction. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, *3*(1), 28–31.
2. Gaybullayevna, R. S. (2023). The state of the digital economy today: problems and solutions. *Journal of economy, tourism and service*, *2*(12), 38-42.
3. Sharifa, R., & Ilyos, T. (2023). Principles of scientific management in management. *Новости образования: исследование в XXI веке*, *2*(16), 1097-1100.
4. Jabborova, Z. & Rasulova, S., (2019). PRINCIPAL DIRECTIONSON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, *2019*(3), 18.

5. Асаул Н.А. Теория и методология институциональных взаимодействий субъектов инвестиционно-строительного комплекса / Н.А. Асаул. - СПб.: «Гуманистика», 2004. -280с.
6. Евсеенко О. С. Инвестиции в вопросах и ответах / О. С. Евсеенко. - М. : Проспект, 2008. - 324 с.
7. Мелкунов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов / Я. С. Мелкунов. - М. : Дим, 2009. -287 с.

Рахимбоев М.
клинический ординатор
Азиатский международный университет
Муротов Н.
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии
Бухарский государственный медицинский институт

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Аннотация: *В последние годы стремительное развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на деятельность клинических лабораторий. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) способствуют автоматизации лабораторных исследований, повышению точности анализа результатов и снижению количества ошибок. В данной статье рассмотрены современные возможности применения искусственного интеллекта в клинической лабораторной диагностике, его преимущества, основные направления использования и перспективы дальнейшего развития. Особое внимание уделено роли ИИ в повышении эффективности работы лаборатории, минимизации влияния человеческого фактора и совершенствовании процесса принятия клинических решений.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, клиническая лаборатория, автоматизация, лабораторная диагностика, биомаркеры, цифровая медицина.*

Rahimboyev M.
clinical resident
Asia International University
Murotov N.
Head of the Department of Microbiology, Virology and Immunology,
Bukhara State Medical Institute

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN CLINICAL LABORATORIES

Abstract : *In recent years, the rapid development of digital technologies has had a significant impact on the activities of clinical laboratories. Artificial intelligence (AI) technologies contribute to the automation of laboratory testing, improvement of result accuracy, and reduction of diagnostic errors. This article examines the current possibilities of using artificial intelligence in clinical laboratory diagnostics, its advantages, main areas of application, and future prospects. Special attention is given to the role of AI in improving laboratory*

efficiency, minimizing the influence of the human factor, and enhancing clinical decision-making processes.

***Keywords**: artificial intelligence, clinical laboratory, automation, laboratory diagnostics, biomarkers, digital medicine.*

Введение

Клиническая лабораторная диагностика занимает важнейшее место в современной системе здравоохранения, играя ключевую роль в раннем выявлении заболеваний, оценке их течения и контроле эффективности лечения. По данным современных исследований, значительная часть клинических решений основывается на результатах лабораторных анализов, что подчеркивает особую значимость точности, надежности и своевременности лабораторных исследований.

В условиях стремительного развития информационных технологий и цифровизации медицины происходит активное внедрение инновационных методов обработки медицинских данных. Одним из наиболее перспективных направлений является использование технологий искусственного интеллекта, которые позволяют существенно повысить эффективность работы клинических лабораторий.

Современные лаборатории ежедневно выполняют тысячи анализов, формируя большие массивы данных. Обработка, систематизация и интерпретация такого объема информации традиционными методами требует значительных временных и трудовых затрат. Искусственный интеллект способен анализировать большие объемы данных за короткое время, выявлять скрытые закономерности и автоматически обнаруживать отклонения от нормы.

Особенно активно технологии искусственного интеллекта применяются в таких направлениях, как гематология, биохимия, иммунология и микробиология. Алгоритмы машинного обучения позволяют распознавать клетки крови, выявлять патологические изменения, анализировать динамику лабораторных показателей и прогнозировать развитие заболеваний.

Еще одной важной проблемой клинической лабораторной диагностики остается влияние человеческого фактора, который может приводить к ошибкам на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах. Использование систем искусственного интеллекта позволяет стандартизировать процессы анализа, снизить вероятность ошибок и повысить воспроизводимость результатов.

Таким образом, внедрение технологий искусственного интеллекта в клиническую лабораторную практику является актуальным научным и практическим направлением, требующим дальнейшего изучения и совершенствования.

Материалы и методы

Данная работа выполнена в форме аналитического обзора научной литературы. Были изучены современные научные публикации, посвященные

применению искусственного интеллекта в клинической лабораторной диагностике, а также материалы, отражающие возможности автоматизации лабораторных процессов. Проведен сравнительный анализ полученных данных с целью определения основных направлений использования ИИ в лабораторной практике.

Результаты

Анализ литературных источников показал, что технологии искусственного интеллекта активно внедряются в деятельность клинических лабораторий и применяются в следующих направлениях:

1. автоматическое распознавание клеток крови при гематологических исследованиях;

2. выявление аномальных биохимических показателей;

3. прогнозирование инфекционных и хронических заболеваний;

4. автоматическая интерпретация лабораторных результатов;

5. управление и систематизация больших массивов лабораторных данных.

Отмечено, что использование ИИ способствует сокращению времени анализа, повышению точности результатов и снижению количества диагностических ошибок.

Обсуждение

Внедрение технологий искусственного интеллекта в клиническую лабораторную диагностику можно рассматривать как один из ключевых этапов модернизации современной медицины. Лабораторные исследования являются основой для постановки диагноза, определения тактики лечения и оценки эффективности терапии. Поэтому повышение качества лабораторной диагностики напрямую влияет на клинические исходы и безопасность пациентов.

Одним из главных преимуществ искусственного интеллекта является способность обрабатывать большие объемы информации с высокой скоростью и точностью. В условиях постоянного роста количества лабораторных исследований это становится особенно актуальным. Традиционные методы анализа данных не всегда позволяют оперативно выявлять скрытые закономерности, тогда как системы ИИ способны проводить глубокий анализ показателей и выявлять минимальные отклонения.

Существенную роль искусственный интеллект играет в снижении влияния человеческого фактора. Известно, что ошибки при проведении лабораторных исследований могут возникать на разных этапах — от подготовки биоматериала до интерпретации результатов. Автоматизированные системы на основе алгоритмов машинного обучения

обеспечивают стандартизацию процессов и позволяют минимизировать субъективность при оценке данных.

Особенно перспективным направлением является применение ИИ в гематологических и микробиологических исследованиях. Современные алгоритмы способны автоматически распознавать морфологические особенности клеток крови, дифференцировать патологические изменения и выявлять признаки онкогематологических заболеваний на ранних стадиях. В микробиологии системы искусственного интеллекта применяются для идентификации микроорганизмов и анализа роста бактериальных колоний.

Еще одной важной функцией ИИ является возможность прогнозирования. На основе анализа динамики лабораторных показателей можно предсказывать риск развития различных заболеваний, оценивать тяжесть состояния пациента и прогнозировать возможные осложнения. Это открывает новые перспективы для персонализированной медицины и профилактики заболеваний.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрение искусственного интеллекта в клинические лаборатории сопровождается рядом трудностей. К ним относятся высокая стоимость оборудования и программного обеспечения, необходимость защиты персональных медицинских данных, а также потребность в подготовке специалистов, способных работать с новыми технологиями. Кроме того, важно обеспечить корректную интеграцию систем искусственного интеллекта в существующую лабораторную инфраструктуру.

В перспективе можно ожидать, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью работы клинических лабораторий. Он будет использоваться не только для анализа результатов, но и для поддержки принятия клинических решений, что значительно повысит эффективность медицинской помощи.

Заключение

Использование технологий искусственного интеллекта в клинической лабораторной диагностике открывает новые возможности для повышения точности, скорости и эффективности исследований. Внедрение данных технологий способствует снижению количества ошибок, оптимизации работы лабораторий и улучшению качества медицинской помощи. В будущем искусственный интеллект может стать одним из ключевых инструментов в развитии лабораторной медицины.

Использованные источники:

1. Topol E. Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. — New York: Basic Books, 2019.
2. Esteva A., Kuprel B., Novoa R.A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks // Nature. 2017. Vol. 542. P. 115–118.
3. Rajkomar A., Dean J., Kohane I. Machine learning in medicine // New England Journal of Medicine. 2019. Vol. 380(14). P. 1347–1358.

4. Hosny A., Parmar C., Quackenbush J., Schwartz L.H., Aerts H.J. Artificial intelligence in radiology // Nature Reviews Cancer. 2018. Vol. 18. P. 500–510.
5. Jiang F., Jiang Y., Zhi H. et al. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future // Stroke and Vascular Neurology. 2017. Vol. 2(4). P. 230–243.
6. Lippi G., Da Rin G. Advantages and limitations of total laboratory automation // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2019. Vol. 57(6). P. 802–811.
7. Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? // Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2006. Vol. 44(6). P. 750–759.

УДК 616-018

Рахматова Р.
студент
Ташкентский Государственный Медицинский Университет
Ташкент, Узбекистан
Сойибназарова Р.
студент
Ташкентский Государственный Медицинский Университет
Ташкент, Узбекистан
Хужамуратова Д.Х.
ассистент
кафедра №1- Гистологии и медицинской биологии
студент
Ташкентский Государственный Медицинский Университет
Ташкент, Узбекистан

СТРОЕНИЕ РОГОВИЦЫ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ КЕРАТИТАХ

Аннотация: *В данной статье рассматриваются особенности гистологического строения роговицы и их значение в поддержании оптической прозрачности глаза. Проведен анализ морфологических изменений, происходящих при бактериальных кератитах, включая процессы инфильтрации, деструкции Боуменовой мембраны и стромального матрикса. Особое внимание уделено механизмам регенерации и патологического рубцевания тканей. Работа подчеркивает взаимосвязь между структурной целостностью слоев роговицы и функциональным исходом воспалительных заболеваний, что является важным фактором для своевременной диагностики и выбора тактики лечения в офтальмологической практике.*

Ключевые слова: *Роговица, гистология, кератит, строма, кератоциты, воспалительная инфильтрация, рубцевание.*

Rahmatova R.
student
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan
Soyibnazarova R.
student
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan
Khujamuratova D.X.
assistant
№ 1-Department of Histology and
Medical Biology of Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan

STRUCTURE OF THE CORNEA AND HISTOLOGICAL CHANGES IN KERATITIS

Annotation: *This article examines the histological structure of the cornea and its role in maintaining optical transparency. The study provides an analysis of morphological changes during bacterial keratitis, including infiltration, destruction of Bowman's membrane, and the stromal matrix. Particular emphasis is placed on the mechanisms of tissue regeneration and pathological scarring. The paper highlights the relationship between the structural integrity of corneal layers and the functional outcome of inflammatory diseases, which is a crucial factor for timely diagnosis and therapeutic strategy in ophthalmology.*

Key words: *Cornea, histology, keratitis, stroma, keratocytes, inflammatory infiltration, scarring.*

Актуальность. Роговица играет ключевую роль в оптической системе глаза, формируя основную часть его преломляющей способности. Различные типы кератитов, вызывающие воспаление роговицы, неизменно приводят к снижению ее прозрачности. Это явление служит одной из главных причин как обратимой, так и необратимой потери зрения. Изучение гистологических изменений, происходящих при воспалительном процессе, имеет существенное значение для постановки диагноза и определения оптимальной тактики лечения.

Цель исследования. Изучить нормальную гистологическую структуру роговицы и описать ключевые морфологические изменения, которые наблюдаются при кератитах разных причин, с опорой на современные научные исследования.

Методы исследования. Проведён анализ и обобщение данных современной научной литературы, посвящённой гистологическому строению роговицы и морфологическим изменениям при кератитах. Использованы методы сравнительно-морфологического и структурно-функционального анализа.

Результаты исследования.

Роговица состоит из пяти слоёв: эпителия, Боуменовой мембраны, стромы, Десцеметовой мембраны и эндотелия, обеспечивающих её прозрачность и преломляющую способность. Эпителий выполняет барьерную и рецепторную функции. Боуменова мембрана — бесклеточный коллагеновый слой толщиной 8–12 мкм.

Строма составляет до 90% толщины роговицы и представлена коллагеновыми пластинами, кератоцитами и межклеточным матриксом. Кератоциты участвуют в поддержании структуры и репарации ткани. Десцеметова мембрана отличается высокой прочностью и устойчивостью к протеолизу. Эндотелий образован одним слоем гексагональных клеток, обеспечивающих барьерную и насосную функции, необходимые для поддержания гидратации стромы.

Аваскулярность и особенности метаболизма роговицы определяют её высокую восприимчивость к воспалительным процессам. Кератиты характеризуются повреждением эпителия, отёком и воспалительной инфильтрацией стромы. Бактериальные кератиты сопровождаются нейтрофильной инфильтрацией и некрозом стромы; ведущими возбудителями являются Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa. В течении заболевания выделяют стадии инфильтрации, изъязвления, регрессии и рубцевания, включающие эпителиальную репарацию и ремоделирование стромы.

Вывод.

Прозрачность роговицы определяется упорядоченным строением ее слоев. При кератитах возникают воспалительная инфильтрация, разрушение мембраны Боумена и повреждение стромы, что приводит к рубцеванию и снижению зрения. Морфологическая оценка изменений важна для диагностики и выбора лечения.

Использованные источники:

1. Бикбов М. М., Суркова В. К. Прогностическое значение изменений конъюнктивы и роговицы при сахарном диабете //Вестник офтальмологии. – 2019. – Т. 135. – №. 1. – С. 90-97.
2. Nakayasu K. et al. Distribution of types I, II, III, IV and V collagen in normal and keratoconus corneas //Ophthalmic research. – 1986. – Т. 18. – №. 1. – С. 1-10.
3. Birk D. E., Trelstad R. L. Extracellular compartments in matrix morphogenesis: collagen fibril, bundle, and lamellar formation by corneal fibroblasts //The Journal of cell biology. – 1984. – Т. 99. – №. 6. – С. 2024-2033.
4. Müller L. J., Pels L., Vrensen G. F. Novel aspects of the ultrastructural organization of human corneal keratocytes //Investigative ophthalmology & visual science. – 1995. – Т. 36. – №. 13. – С. 2557-2567.
5. Гистология, цитология, эмбриология : учебник / под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 768 с.
6. Khurana A. K. Eyelids, Lacrimal System, Orbit and Oculoplastic Surgery.
7. Айтеков, Б. М., Батырбеков, Т. М., & Хужамуратова, Д. Х. (2025). МОРФОГЕНЕЗ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ. Экономика и социум, (10-2 (137)), 1147-1150.
8. Тоджиев, С. Б., Рузиева, З. Б., Махмудова, Ш. И., & Хужамуратова, Д. Х. (2025). СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ ПРИ СИСТЕМНЫХ НАРУШЕНИЯХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Экономика и социум, (12-1 (139)), 907-910.
9. Мирталипова, М. А., Шермухамедов, Т. Т., Махмудова, Ш. И., & Камилов, Д. Ю. (2025). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ЭНДОКРИННОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.

10. Abdulqosimova, S. K., & Nazarov, B. S. (2025). METABOLIK SINDROMDA MARKAZIY IMMUN HIMOYA A'ZOLARINING MORFOGENEZI. Экономика и социум, (11-1 (138)), 18-21.

Сагдиева Г.Ж.
преподаватель
Узбекский государственный университет мировых языков

СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация: *В статье осуществляется комплексный анализ языковой личности через призму структурно-уровневого подхода. Автор исследует иерархическую соподчиненность вербально-семантического, когнитивного и прагматического уровней. Особое внимание уделяется процессам преломления национального менталитета в индивидуальном дискурсе и специфике функционирования личности в цифровой среде.*

Ключевые слова: *лингвокогнитивный конструкт, уровневая модель, ментальные репрезентации, этнокультурный код, коммуникативные интенции.*

Sagdieva G.J.
teacher
Uzbekistan State World Languages University

CLIMATE OF THE KOKAND OASIS AND ITS CHANGES

Abstract: *The article provides a comprehensive analysis of the linguistic personality through the lens of a structural approach. The author explores the hierarchical subordination of verbal-semantic, cognitive, and pragmatic levels. Special emphasis is placed on the processes of national mentality refraction in individual discourse and the specifics of personality functioning in the digital environment.*

Keywords: *linguo-cognitive construct, tiered model, mental representations, ethnocultural code, communicative intentions.*

Современный вектор филологической мысли характеризуется выраженным антропоцентризмом. Ключевой фигурой исследовательского поля сегодня выступает не абстрактная система языка, а живой субъект — носитель когнитивных и речевых компетенций. Актуальность структурного подхода к исследованию языковой личности (далее — ЯЛ) обусловлена необходимостью систематизации разрозненных данных о речевом поведении человека в условиях глобализации и цифровизации коммуникации.

1. Теоретические основы концепции языковой личности Понятие ЯЛ в отечественной науке прошло путь от метафорического обозначения стиля автора до строгого научного конструкта. В основе нашего исследования лежит трехчастная модель Ю.Н. Караулова, которая позволяет декомпозировать речевую деятельность на элементарные и высшие психические составляющие. Становление концепции языковой личности (ЯЛ)

в отечественной лингвистике знаменовало собой окончательный переход от системно-структурного описания языка «в самом себе» к антропоцентрической парадигме. Генезис этого понятия не был линейным: он вобрал в себя идеи классической филологии, психолингвистики и философии языка.

1.1. Эволюция взглядов: от В.В. Виноградова до антропоцентризма

Первоначально понятие ЯЛ использовалось В.В. Виноградовым преимущественно в литературоведческом контексте для описания индивидуально-авторского стиля и «образа автора». Однако в 80-х годах XX века Ю.Н. Караулов совершил методологический прорыв, представив ЯЛ как универсальный объект лингвистического анализа. В его трактовке языковая личность — это не только субъект, создающий тексты, но и средоточие национального самосознания, культурных установок и когнитивных механизмов.

1.2. Трехуровневая модель как методологический фундамент

В основе нашего исследования лежит иерархическая модель, позволяющая декомпозировать речевую деятельность на три взаимосвязанных уровня. Такая структура дает возможность исследователю двигаться от внешних форм (слов) к внутренним смыслам (мотивам).

1. **Вербально-семантический уровень (нулевой):** Это материальная оболочка личности, её «языковой инвентарь». Он включает в себя владение лексико-грамматическим строем, индивидуальный лексикон и стереотипные ассоциации. На этом уровне личность проявляется как носитель конкретного языка, соблюдающий (или нарушающий) его нормы. Исследование этого уровня позволяет выявить частотные предпочтения индивида, его склонность к определенным стилистическим пластам речи.

2. **Лингво-когнитивный уровень (первый):** На данном этапе происходит интеграция языка и мышления. Единицами здесь выступают не слова, а концепты, идеи и дескрипторы. Именно на когнитивном уровне формируется индивидуальная «картина мира» и выстраивается система ценностей (тезаурус). Здесь исследователь может реконструировать, как личность понимает такие категории, как «свобода», «долг», «успех», и как эти смыслы соотносятся с общенациональным культурным кодом.

3. **Мотивационно-прагматический уровень (второй):** Это высший уровень организации ЯЛ, который Ю.Н. Караулов называл «прагматиконом». Он охватывает сферу целей, мотивов и коммуникативных интенций. Если первый уровень отвечает на вопрос «что я знаю о мире?», то второй — «зачем я это говорю?». Здесь реализуются коммуникативные стратегии и тактики, проявляется способность личности адаптироваться к собеседнику и контексту, а также транслировать свои глубинные установки.

1.3. Системные связи в структуре ЯЛ

Важно отметить, что уровни не изолированы друг от друга. Мотивационный уровень (прагматикон) выступает «заказчиком» для нижестоящих уровней: именно цель высказывания диктует выбор

определенных концептов из тезауруса и конкретных слов из лексикона. Таким образом, структурный подход позволяет увидеть за разрозненными речевыми актами целостную психическую и культурную организацию человека.

В современных исследованиях (Г.И. Богин, И.И. Халеева) данная модель дополняется понятиями «вторичной языковой личности» (при изучении иностранных языков) и «виртуальной языковой личности», что подтверждает универсальность и объяснительную мощность исходной концепции Караулова.

2. Иерархическая организация языковой личности

2.1. Вербально-семантический уровень (Лексикон). Базовый уровень ЯЛ охватывает фонд лексических и грамматических единиц. Здесь проявляется «речевой портрет» личности: частотность использования определенных частей речи, богатство эпитетов или склонность к канцеляризмам. В условиях 2026 года лексикон активно пополняется неотерминами технологического происхождения. Вербально-семантический уровень представляет собой фундамент всей структуры языковой личности, являясь первичным инструментом актуализации мысли в знаковую форму. На этом этапе исследователь сталкивается с индивидуальным лексиконом индивида, который выступает не просто как механический набор слов, а как динамическая система, отражающая социальный статус, уровень образования, профессиональную принадлежность и психологические особенности субъекта. Базовый характер данного уровня обусловлен тем, что без сформированного лексико-грамматического инвентаря невозможен переход к высшим когнитивным и прагматическим операциям. Именно через анализ лексикона воссоздается уникальный «речевой портрет» личности, в котором фиксируются устойчивые предпочтения в выборе языковых средств.

Ключевым параметром здесь выступает частотность использования определенных частей речи, которая может свидетельствовать о динамичности или, напротив, статичности мировосприятия: преобладание глаголов часто указывает на ориентацию личности на действие и событийность, в то время как доминирование существительных и прилагательных характерно для описательного, созерцательного стиля. Богатство эпитетов и метафоричность свидетельствуют о высоком уровне креативности и развитости эстетического чувства, тогда как избыточная склонность к канцеляризмам и речевым штампам может указывать на ригидность мышления или стремление личности дистанцироваться от собеседника за «фасадом» официальности.

В современных условиях 2026 года данный уровень претерпевает существенные трансформации под давлением глобальной цифровизации. Индивидуальный лексикон современного носителя языка стремительно пополняется неотерминами технологического происхождения, которые перестают быть узкоспециализированными и входят в повседневный обиход, формируя новый пласт «техно-сленга». Процессы заимствования и неологизации на вербально-семантическом уровне происходят настолько интенсивно, что это ведет к размыванию традиционных стилистических

границ. При анализе этого уровня важно учитывать не только объем активного словаря, но и способность личности адекватно комбинировать инновационные термины с традиционными грамматическими конструкциями. Таким образом, лексикон оказывается наиболее открытым и чувствительным элементом структуры языковой личности, мгновенно реагирующим на любые изменения в социокультурной и технологической среде, выступая своего рода индикатором адаптивности человека к вызовам времени.

2.2. Лингво-когнитивный уровень (Тезаурус). На этом этапе слова превращаются в смысловые узлы — концепты. Тезаурус отражает индивидуальную «картину мира». Например, концепт «Справедливость» в структуре ЯЛ может иметь различные ценностные доминанты в зависимости от социального опыта субъекта. Лингво-когнитивный уровень, или тезаурус, представляет собой более глубокий пласт организации языковой личности, где происходит качественная трансформация языковых единиц в ментальные репрезентации. На этом этапе слова перестают быть просто элементами лексикона и превращаются в сложные смысловые узлы — концепты, которые формируют каркас индивидуального сознания. Тезаурус является своего рода интеллектуальным и ценностным фильтром, через который личность пропускает входящую информацию, интерпретируя её в соответствии со своей уникальной «картиной мира». В отличие от вербального уровня, тезаурус отражает не то, как человек говорит, а то, как он классифицирует реальность, какие смысловые связи выстраивает между явлениями и какие иерархии ценностей признает приоритетными.

Центральное место в тезаурусе занимают лингвокультурные концепты, обладающие высокой степенью абстракции и эмоциональной насыщенности. Ярким примером служит концепт «Справедливость», который в структуре конкретной языковой личности может приобретать полярные ценностные доминанты в зависимости от социального опыта, воспитания и идеологических установок субъекта. Для одной личности справедливость может отождествляться с «уравнительным распределением», для другой — с «неотвратимостью возмездия», а для третьей — с «равенством возможностей». Эти различия в наполнении концепта определяют и речевое поведение: использование определенных аргументов, выбор оценочных прилагательных и общую стратегию убеждения. Таким образом, тезаурус выступает в роли когнитивной базы, которая хранит знания о мире в виде упорядоченной системы понятий, позволяя личности не только опознавать объекты действительности, но и наделять их субъективной значимостью.

3. Лингвокультурологическая детерминация

Языковая личность не может рассматриваться в изоляции от социокультурного контекста, поскольку она является продуктом и одновременно транслятором своей этнокультурной среды. Взаимообусловленность языка и менталитета проявляется в том, что когнитивные структуры индивида формируются под мощным воздействием коллективного культурного опыта, накопленного поколениями. Эта связь

реализуется через систему прецедентных феноменов, которые выступают в роли своеобразных «культурных паролей» или «маркеров идентичности». К ним относятся прецедентные имена (герои эпосов, исторические деятели), прецедентные тексты (священные книги, классическая литература, фольклор) и прецедентные ситуации, узнаваемые любым представителем данного этноса без дополнительных пояснений.Особое место в структуре языковой личности занимает национально-специфический прагматикон. Например, для узбекской языковой личности фундаментальной характеристикой является высокая контекстуальность коммуникации. Это означает, что значительная часть информации передается не эксплицитно (прямыми словами), а имплицитно — через подтекст, ситуацию и общие фоновые знания собеседников. В такой системе особую значимость приобретает акцент на речевом этикете, который базируется на уникальных концептах, таких как *andisha* (деликатность, тактичность, умение предвидеть последствия своих слов) и *lutf* (любезность, изысканная вежливость). Эти категории не являются просто лексическими единицами; они представляют собой регулятивные механизмы прагматического уровня, диктующие выбор речевых стратегий.На прагматическом уровне узбекской ЯЛ это отражается в преобладании стратегий «сохранения лица» и избегания прямой конфронтации. Вербальное поведение в данном случае характеризуется использованием многоступенчатых формул приветствия, цветистых метафор и косвенных речевых актов. Если западная ЯЛ (ориентированная на низкоконтекстную культуру) стремится к максимальной информативности и прямоте, то восточная ЯЛ отдает приоритет гармонизации отношений и соблюдению иерархической дистанции. Таким образом, этнокультурная среда не просто снабжает личность словами, она формирует «фильтры» восприятия и правила речевого взаимодействия, делая каждого носителя языка представителем определенного типа ментальности. Исследование этих нюансов позволяет не только глубже понять структуру личности, но и эффективно решать задачи межкультурной коммуникации, предотвращая

4. Виртуальная языковая личность

В цифровой среде структура ЯЛ претерпевает деформации: лексикон становится компрессированным (использование эмодзи), а прагматикон — игровым. Анонимность сети позволяет ЯЛ конструировать несколько цифровых аватаров, что усложняет структурный анализ. Развитие глобальных информационных сетей и доминирование опосредованной коммуникации привели к возникновению феномена виртуальной языковой личности (ВЯЛ). В цифровой среде структура ЯЛ не просто адаптируется к новым каналам связи, но претерпевает существенные качественные деформации на всех трех уровнях. Эти изменения обусловлены такими характеристиками интернета, как гипертекстуальность, дистантность, опосредованность и, в ряде случаев, анонимность.

На вербально-семантическом уровне (лексиконе) наблюдается выраженная тенденция к радикальной компрессии языковых средств.

Дефицит времени и стремление к экономии речевых усилий ведут к замене развернутых синтаксических конструкций аббревиатурами, акронимами и специфическим сетевым сленгом. Более того, происходит визуализация лексикона: эмодзи, стикеры и гиф-анимации перестают быть просто дополнениями к тексту, приобретая статус самостоятельных идеограмм. Они берут на себя функции передачи модальности, пунктуации и эмоционального фона, что фактически формирует гибридную знаковую систему, где вербальные и невербальные единицы неразделимы.

Мотивационно-прагматический уровень (прагматикон) в цифровой среде приобретает подчеркнуто игровой характер. Анонимность или возможность создания псевдоанонимности в сети позволяют языковой личности конструировать несколько «цифровых аватаров», каждый из которых обладает собственным речевым стилем, системой ценностей и коммуникативными целями. Это явление, известное как «множественная идентичность», значительно усложняет структурный анализ. Исследователь сталкивается не с единым речевым портретом, а с набором ролевых масок — от агрессивного «тролля» до экспертного аналитика. Целью коммуникации в этом случае часто становится не обмен информацией, а «перформанс» — управление впечатлением аудитории, погоня за социальным одобрением (лайками, репостами) или провокация эмоционального отклика.

На когнитивном уровне (тезаурусе) виртуальная среда способствует формированию «клипового» или сетевого мышления. Картина мира ВЯЛ становится фрагментарной, ассоциативной и нелинейной. Смысловые связи между концептами диктуются не логикой классического текста, а логикой гиперссылок. Это ведет к тому, что тезаурус пользователя постоянно находится в состоянии «динамического обновления», оперативно реагируя на мемы и актуальные медиа-тренды, которые на короткое время становятся центральными узлами его когнитивной системы. Подобная подвижность структуры ЯЛ в цифровом пространстве требует от лингвистов поиска новых подходов, способных учитывать не только текст, но и контекст его существования в бесконечном потоке информационного шума.

Заключение. Структурный подход позволяет превратить абстрактное понятие ЯЛ в четкий объект научного анализа. Понимание иерархии уровней личности необходимо для лингвистической экспертизы, психологии и педагогики. Подводя итоги проведенного исследования, необходимо подчеркнуть, что структурный подход к языковой личности (ЯЛ) выступает в качестве фундаментального методологического инструментария, позволяющего перевести изучение речевого поведения из области интуитивных догадок в плоскость строгого научного анализа. Декомпозиция ЯЛ на три иерархических уровня — вербально-семантический, лингво-когнитивный и мотивационно-прагматический — превращает абстрактную категорию «человеческого фактора» в четко верифицируемый объект исследования.

Такая структуризация имеет решающее значение для ряда прикладных дисциплин:

12. **В лингвистической экспертизе:** Системное описание уровней ЯЛ позволяет проводить глубокую идентификацию автора текста (авторoведческая экспертиза). Анализ индивидуального лексикона (нулевой уровень) в сочетании с изучением прагматических установок (интенций) дает возможность составить максимально точный психолингвистический профиль субъекта. Это критически важно в судебной практике для установления подлинности угроз, выявления экстремистских смыслов или определения авторства анонимных цифровых сообщений.

13. **В психологии и психолингвистике:** Понимание иерархии уровней личности открывает возможности для диагностики внутреннего состояния человека через его речевую деятельность. Тезаурус (когнитивный уровень) отражает скрытые ценностные деформации и когнитивные искажения, а прагматикон служит маркером реальных мотивов поведения, которые могут скрываться за социально одобряемыми фразами. Структурный анализ позволяет специалистам прогнозировать коммуникативные риски и разрабатывать стратегии эффективной психологической коррекции.

14. **В педагогике и лингводидактике:** Концепция уровней ЯЛ коренным образом меняет подход к обучению иностранным языкам. Целью образования становится не просто механическое накопление лексики (лексикон), но формирование «вторичной языковой личности». Это подразумевает перестройку когнитивного уровня учащегося — усвоение им системы концептов чужой культуры и овладение инофонными коммуникативными стратегиями на прагматическом уровне.

В современных реалиях 2026 года, характеризующихся доминированием цифрового дискурса и развитием генеративных языковых моделей, структурный подход приобретает новое дыхание. Он позволяет изучать трансформации личности в виртуальной среде, где лексикон становится компрессированным, а прагматикон — игровым и многоликим. Таким образом, разработанная Ю. Н. Карауловым модель не утрачивает актуальности, а служит надежной опорой для лингвистики будущего, способной анализировать человека во всей сложности его речевого, мыслительного и социального бытия.

Интеграция структурного анализа ЯЛ в практику межкультурной коммуникации и разработку систем искусственного интеллекта является закономерным этапом развития антропоцентрической науки, обеспечивающим гармоничное взаимодействие человека и технологий в глобальном информационном пространстве.

Использованные источники:

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. — М.: Флинта, 2023. — 288 с.

2. Богин Г. И. Модель языковой личности в её отношении к разновидностям текстов. — Л.: ЛГУ, 1984. — 154 с.

3. Виноградов В. В. О художественной прозе. — М.-Л.: ГИЗ, 1930. — 186 с.
4. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в лингвистике // Филологические науки. — 2001. — № 1. — С. 64–72.
5. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — М.: ЛКИ, 2024. — 284 с.
6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — М.: Гнозис, 2022. — 390 с.
7. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 1987. — 263 с.
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие. — М.: Академия, 2001. — 208 с.
9. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2024. — 352 с.
10. Халеева И. И. Основы теоретической грамматики. — М.: Высшая школа, 1989. — 238 с.

Тайров Д.Р., PhD
ассистент
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ К КРАТКОВРЕМЕННОЙ ИШЕМИИ

Аннотация: *В экспериментальных условиях у белых крыс путём наложения мягкого зажима на семявыносящий проток вызывалась кратковременная ишемия, после чего изучались клетки сперматогенного эпителия. Через определённый период времени полученный материал фиксировался в растворе Буэна. Окраска проводилась гематоксилином-эозином и по методу Шиффа-Эрлиха гематоксилином. Клетки сперматогенного эпителия исследовались на VII стадии цикла сперматогенеза.*

Ключевые слова: *эксперимент, белая крыса, ишемия, метод гематоксилином-эозином, раствор Шиффа, гематоксилином по методу Эрлиха, клетки сперматогенного эпителия.*

Tairov D.R., PhD
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University

EXPERIMENTAL STUDY OF THE SENSITIVITY OF SPERMATOGENIC EPITHELIAL CELLS TO SHORT-TERM ISCHEMIA

Abstract: *In experimental conditions, short-term ischemia was induced in white rats by applying a soft clamp to the vas deferens, after which the cells of the spermatogenic epithelium were studied. After a certain period of time, the obtained material was fixed in Bouin's solution. Staining was performed with hematoxylin-eosin and with hematoxylin using the Schiff-Ehrlich method. The cells of the spermatogenic epithelium were examined at stage VII of the spermatogenic cycle.*

Keywords: *experiment, white rat, ischemia, hematoxylin-eosin method, Schiff's reagent, hematoxylin by Ehrlich's method, spermatogenic epithelial cells.*

Введение. В последние годы значительно увеличился интерес к проблеме мужского бесплодия. Становится все более очевидным, что одной из причин, приводящих к развитию инфертильности, является варикоцеле. Диагностике и лечению варикозного расширения вен семенного канатика в проблеме инфертильности современные ученые отводят одно из ведущих мест [1,2]. Мужское бесплодие — состояние, которое является следствием

ряда заболеваний и/или суммарных патологических воздействий на репродуктивную систему мужчины [3,4,5]. Наиболее широко распространенной андрологической патологией и наиболее частой причиной бесплодия у мужчин является варикозное расширение вен семенного канатика [6,7]. Как, известно, сперматогенный эпителий проявляет высокую чувствительность к гипоксии. Однако вопрос об избирательном действии указанного фактора на половых клетки разных стадий развития изучен недостаточно. В данной работе исследовали чувствительность половых клеток разной степени дифференцировки к действию временной ишемии.

Цель исследования. Нами были изучено экспериментальное чувствительности клеток сперматогенного эпителия к кратковременной ишемии**.**

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на 22 белых беспородных крысах-самцах весом 180-230 г. Семенники подвергали воздействию 3, 5, 10, 15, 30-мин. ишемии путем наложения на их кровеносные сосуды мягкого зажима. Возникающие патологические изменения в ткани семенников изучали спустя 1, 7, 30, 90 сут. после восстановления кровообращения. Материал фиксировали в жидкости Буэна или Ценкер-формоле. Парафиновые срезы толщиной 6—7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином, реактивом Шиффа с докраской гематоксилином Эрлиха. Определяли число сперматогенных клеток на VIl стадии цикла сперматогенного эпителия. Об избирательной чувствительности половых клеток к действию временной ишемии судили по изменению числа сперматогоний типа А, сперматоцитов на стадии прелептонемы, сперматоцитов на стадии пахинемы и сперматид 7 этапа развития, Полученные результаты были пересчитаны на 100 клеток Сертоли. **Результаты исследования.** Подсчет клетока производили в 40 извитых канальцах для каждого случая при увеличении -900. Обнаружено,что спустя 24 ч. после воздействия 30-мину ишемии число сперматогоний типа А равнялось 8,97 ± 1,03 и по сравнению с контрольными животными оставалось без изменений. Достоверно (на 33,11%) уменьшилось количество этих клеток лишь через 30 сут. после 30-мин. ишемии. Спустя 1, 7, 30, 90 сут. после 30-мин ишемии количество сперматоцитов на стадии прелептонемы не изменилось. 5 - 10-мин. опыт сопровождался незначительным (на 6%) уменьшением числа этих клеток, однако уже через 7 сут. их число постепенно нормализовалось и к 30-м сут. достигло исходного уровня. Ишемия продолжительностью 15 мин. сопровождалась деформацией части семенных канальцев, прогрессирующим уменьшением сперматоцитов на стадии прелептонемы с деструктивными изменениями, некрозом и распадом. Количество клеток спустя 30мин. составило 202,62 ± 4,13 против 230,58 ± 2,52в семенниках контрольных животных 30-мин, ишемия вызвала более значительное (34,70%) снижение числа этих клеток, которые к 90-м сут. в атрофированных извитых семенных канальцах вовсе отсутствовали. Число сперматоцитов на стадии паренхимы в семенных канальцах контрольных животных было равно 299,82 ± 4,43, 35.мин ишемия не оказывала

выраженного влияния ни количественные показатели данной генерации клеток во все периоды сперматоциты на стадии паренхимы нормализации их количества не наблюдалось на протяжении всего опыта. Достоверно уменьшилось число этих клеток условиях 15-мин. ишемии, составляя 90-м сут. эксперимента 246.85 ± 2.6 30-мин. ишемия по сравнению другими сроками опыта наиболее существенно на указанном типе клеток. Ядра их пикнотичны, цитоплазма вокализирована с превращением в части канальцев в клеточный детрит, а количество к 30-м сут. снизилось до 97,79 ±11,97. Среди сперматогенных клеток семенных канальцев наиболее многочисленными (916,76 ± 22.06) являются сперматцды. 3-мин. ишемия течение всего опыта (1, 7, 30, 90 сут.) не вызывала статистически достоверного уменьшения числа спермицид. Однако уже 5-мин. прекращение кровотока к 7-м сут. снизило их количество до 838,61 ± 11,91, через 90 сут. эксперимента число их не составило 895,37--3232. Временная ишемия продолжительностью 10 мин. сопровождалась заметным уменьшением количества данных клеток на протяжении первой недели. Затем число их увеличивалось, но исходных величин не достигло. На 15-мин. ишемию спермициды 7 этапа развития реагируют более резко: ядра деформированы, цитоплазма окрашена неравномерно, количество их к недельному сроку опыта уменьшается до 816,26 ± 1105, а к 30-м сут. уже до 736,5%7,89. 30-мин ишемия семенника к 30-м сут. опыта привела к деструкции и распаду указанного типа клеток с резким уменьшением их числа, а затем и полному опустошению семенных канальцев. Таким образом, установлено, что несмотря на одинаковые условия проводимых опытов патологические изменения в семенниках разных животных в пределах одной группы носили неодинаковый характер.

Вывод: Результаты настоящей работы свидетельствуют о ранимости всех видов половых клеток после 30-мин. временной ишемии. Наиболее уязвимыми среди них оказались сперматоциты на разных этапах профазы мейоза. В то же время возможность развития восстановительных процессов в семенных канальцах в условиях 10-мин. выключения кровотока, начало которых отмечено для сперматоцитов и спермицид 7 этапа развития на 30 и 90-е сут. опыта, позволяет думать об устойчивости части сперматогоний типа А к воздействию временной ишемии указанной продолжительности. Сохранившиеся сперматогонии являются источником для последующего развития половых клеток в соответствии с продолжительностью отдельных этапов их дифференцировки.

Использованные источники:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.

2. Бекмуродова М. Р., Таиров Д. Р. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ НА ФОНЕ ПОДАГРЫ, И РАЗРАБОТКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ИХ КОРРЕКЦИИ

//Zamonaviy tibbiyot jurnali (Журнал современной медицины). – 2025. – Т. 9. – №. 2. – С. 399-407.
3. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузрья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
4. Mamataliev A. R. NEUROHISTOLOGICAL CHANGES IN THE VAGUS NERVE UNDER THE INFLUENCE OF COLCHICINE IN AN EXPERIMENT //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 310-312.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
7. Narbayev, Serik, et al. "Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change." *Caspian Journal of Environmental Sciences* 22.5 (2024): 1011-1019.

Тожиева З., доктор географических наук
профессор
Эгамбердиева М., кандидат географических наук
доцент
Национальный университет Узбекистана
Сабирова М., доктор философии по географическим наукам
Университет Альфраганус
Рузманова Д.
базовый докторант
Саидова З.
преподаватель
Оманова К.
преподаватель
Национальный университет Узбекистана

ОЦЕНКА ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. *Социально-экономические изменения, происходящие в жизни населения в развитии государства, в определенной степени влияют на его демогеографические особенности. Возраст вступления в брак населения, отношение к семье, нетерпеливость в отношениях молодых людей друг к другу, в результате чего растет число разводов — это процессы, которые необходимо изучить в настоящее время. В частности, в большинстве научных исследований, посвященных браку и разводу, для отражения проблем и их решений широко использовались статистические, аналитические и социально-опросные методы исследования. С этой точки зрения, с помощью метода анкетирования исследованы факторы, влияющие на формирование брачно-разводных процессов в Ташкентском экономическом районе. Мы сочли необходимым использовать этот метод для "живого" выявления и освещения факторов, влияющих на процесс брака и развода в семьях экономического района в современных условиях.*

Ключевые слова. *Развод, брак, семейный состав, естественное движение населения, возраст, пол, численность населения.*

Tozhieva Z.,Doctor of Geographical Sciences
professor
Egamberdieva M., Candidate of Geographical Sciences
associate professor
National University of Uzbekistan
Sabirova M., Doctor of Philosophy in Geographical Sciences
Alfraganus University
Ruzmanova D.
postdoctoral fellow
Saidova Z.
lecturer
Omanova K.
lecturer
National University of Uzbekistan

ASSESSMENT OF THE GEODEMOGRAPHIC SITUATION OF THE FAMILY COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE TASHKENT ECONOMIC REGION BY CONDUCTING SPECIAL SOCIO-DEMOGRAPHIC STUDIES

Annatation. *Socioeconomic changes occurring in the lives of the population as the country develops, to a certain extent, influence its demographic characteristics. The age at which people marry, attitudes toward family, and impatience in young people's relationships, resulting in an increasing divorce rate, are processes that need to be studied today. In particular, most scientific studies on marriage and divorce have extensively used statistical, analytical, and socio-survey methods to address these issues and their solutions. In this context, we used a questionnaire to examine the factors influencing marriage and divorce processes in the Tashkent economic region. We considered it necessary to use this method to directly identify and illuminate the factors influencing marriage and divorce processes in families in this economic region under current conditions.*

Keywords. *Divorce, marriage, family composition, natural population movement, age, gender, population size.*

При изучении брачного процесса в семейной структуре населения, прежде всего, изучалось воспроизводство населения, его влияние на возрастно-половой состав и численность населения. Один из ученых-географов В.Копылов отмечает, что "возраст, пол, брак и семейный состав связаны с ростом населения и являются предметом демографии. Остальные являются экзогенными, то есть переменными, которые косвенно влияют на демографические процессы. Кроме того, такие географы, как А.Анохин и Д.Житин, высказали мнение, что "браки и разводы обычно входят в естественное движение населения, хотя они не влияют непосредственно на численность населения" [1; 86 с.].

Изучение влияния географических факторов, помимо социальных, на изменение семейного состава, размера, формы и типа населения позволяет комплексно исследовать этот процесс. Следовательно, вопрос о влиянии географических факторов на семейный состав населения, в частности, различия между городским и сельским населением, рассматривается в работе А.П. Хоменко "В процессе перестройки семьи" [2; 5 с.] нашли свое отражение в его книге. В ней ученый очень подробно проанализировал семейный состав городского населения Украины по переписи населения 1923 года. Он предоставил информацию о брачных процессах жителей города, возрасте вступления в брак и расторжении брака. Изучил особенности брачного процесса у городского населения. Кроме того, В. Копылов в своей книге "География населения" на примере стран мира непосредственно указывает, что тип жизни населения, то есть городское или сельское население, влияет на размер семьи и типы семей [3]. Следует отметить, что ответственное отношение к семье при формировании семьи в странах мира.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что демографические структуры внутри населения также приводят к изменению отношения людей к брачному процессу в развитии производственных отраслей, нарушению его историко-географических традиций.

Особое внимание было уделено геодемографическим аспектам факторов, влияющих на процесс брака и развода в семьях Ташкентского экономического района. В развитии брачного процесса в городских и сельских семьях Ташкентской области были исследованы районы, отличающиеся друг от друга природными условиями, уровнем социально-экономического развития, демографическими показателями и географическим положением области.

В социально-демографическом исследовании приняли участие в общей сложности 500 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 50 лет. По возрастному составу они были в возрасте 18-24 (30%), 25-29 (20%), 30-34 (20%), 35-39 (10%) и 50 лет (10%).

В анкете были выбраны города Газалкент Чирчикского и Бостанлыкского районов Ташкентской области, Бектемирский и Учтепинский районы города Ташкента, а также села Сайлык, Хандайлык и Пскем Ташкентской области. Существуют определенные причины выбора вышеуказанных регионов в опросе. Из года в год в городе Чирчике, являющемся пригородным районом экономического района, увеличивается число разводов, несколько увеличилось количество неполных семей, возраст вступления в первый брак относительно выше, чем в других городах области. Он был выбран с целью изучения факторов, влияющих на процесс разделения в этом районе.

Бостанлыкский район, входящий в горную местность области, отличается большой площадью, живописными уголками и высокими социально-экономическими показателями, такими как развитие туризма. В связи с тем, что в этом регионе также растет число разводов в семьях, этот

процесс наблюдается и в отдаленных селах района Сойлик, Хандойлик, Пскем, а также в сельской местности, как и в городских районах, в целях выявления факторов, влияющих на этот процесс, было проведено социально-демографическое исследование в этих районах. Всего в опросе приняли участие 500 респондентов. Мужчины составили 48 процентов участников опроса, женщины - 52 процента. В социально-демографическом исследовании на вопрос "В каком возрасте, по вашему мнению, лучше всего вступать в брак?" 74,7% респондентов ответили 20-24 года, 5% - 18-20 лет и 22% - 25-30 лет. Ответы респондентов еще раз подтвердили, что брачный возраст населения постепенно повышается. Хотя повышение брачного возраста укрепляет институт брака, оно также может оказать влияние на процессы рождаемости. Миграция сельского населения в города с целью учебы и работы также в некоторой степени влияет на изменение взглядов на семейно-брачные отношения и рождение детей.

В ходе исследования населению было задано 17 вопросов. 61,1% респондентов проживают в городе, 17,3% - в сельской местности и 21,6% - в городской местности. В ходе исследования также был изучен уровень образования респондентов. По уровню образования 69,8% респондентов имеют высшее образование, 16,7% - среднее и 13,6% - среднее специальное образование. По семейному положению 46,3% были женаты, 36,4% вообще не были женаты, 11,7% не имели семьи, 3% были вдовами и 4% разведены. Установлено, что 48% семей в экономическом районе в основном состоят из средних семей, т.е. 5-6 человек, 38% семей состоят из 2-4 человек и 13% семей состоят из 7 и более человек. В исследовании учитывалось влияние добрачных и послебрачных факторов на прочность брачных процессов.

В проведенном социолого-демографическом исследовании "**Как вы относитесь к процессу добрачного медицинского осмотра?** на вопрос 40% населения ответили положительно, 60% отрицательно, т.е. имеются коррупционные процессы. В сельской местности, как и в городах, уровень медицинского осмотра не соответствует требованиям, брак, заключенный до свадьбы, не зная, что он нездоров, и, как следствие, доля семей, которые развелись, не прожив 1 год, составила 43% от общего числа браков в Ташкентской области и 34% в городе Ташкенте, то есть по сравнению с 2010 годом в 2022 году число разводов без брака увеличилось на 929. Поэтому целесообразно обеспечение стабильности в семьях, совершенствование процесса добрачного медицинского осмотра и разработка его проекта, совершенствование механизмов предотвращения семейных разводов.

Основной целью проведенного исследования является изучение взглядов населения на брачно-семейные отношения в составе семьи и факторов, влияющих на развод, а также изучение социально-демографических взглядов населения при разработке механизмов предотвращения развода.

Чтобы определить факторы, влияющие на развод, в исследовании респондентам задавали несколько вопросов. На вопрос "Влияют ли характер и зарплата мужчины на мир в семье?" 96% населения ответили "да." Было еще

раз доказано, что одним из факторов, обеспечивающих стабильность семьи, является экономический фактор, и это оказывает большое влияние на семейный мир. Поэтому в Ташкентской области необходимо наладить трудоемкие производственные отрасли, организовать постоянные и сезонные виды туризма, эффективно используя своеобразную природу. Например, организация сезонного туризма в селах Хандойлик, Сиджак и Нанай Ташкентской области, то есть "Фестиваль воздушных змеев" в весенние месяцы на низких холмах села Хандойлик, с последующим созданием условий для населения для полетов на парапланах в том же месте. Развитие трудоемкой легкой промышленности в городе Газалкент Бостанлыкского района области и создание региональных производственных комплексов с магазинами для продажи готовой продукции непосредственно здесь. В целях оказания социальной помощи женщинам, работающим на предприятии, можно обеспечить занятость населения и предотвратить экономические проблемы, возникающие непосредственно в семье, организовав на месте школы и детские сады.

Исследование показало, что некоторые факторы, влияющие на городскую местность, вообще не наблюдаются в сельской местности. Примерами могут служить жилищная проблема, утверждение мужчиной и женщиной равных прав и использование социальных сетей. В социологическом исследовании респонденты с целью изучения факторов, влияющих на развод "В чем основные причины развода?" 31% респондентов отметили, что мужчина не знает своих обязанностей в семье. В то время как 31% респондентов, проживающих в городах, имеют высокий уровень таких факторов, как незнание мужчиной своих обязанностей в семье и несовместимость характера, высокий уровень таких факторов, как измена и регулярное вмешательство родственников среди сельского населения, считается фактором, приводящим к разводу семей в городе Газалкент и районах.

Из этого видно, что среди городских жителей часто встречаются случаи, когда мужчины не могут сохранить свои семьи из-за безработицы и отсутствия собственного мнения. Воспитание в семье зависит от того, как мужчины организуют свою будущую семью. Однако влияние таких факторов, как измена и регулярное вмешательство родственников, является одним из факторов, способствующих разводу в сельской местности.

также указывает на значительную актуальность проблемы. Установлено, что в настоящее время вмешательство третьих лиц является причиной разводов в семьях сел Сойлик, Хандойлик и Ходжикент Ташкентской области. В сельской местности измена приводит к распаду семей, что способствует росту числа неполных семей.

Появление негативных последствий развода в настоящее время увеличивается. Увеличение количества разводов в составе семьи приводит к увеличению миграционных процессов. В настоящее время во многих семьях наблюдается неспособность женщин обеспечить своих детей и собственные

потребности, а также вмешательство в миграционные процессы. "Как вы относитесь к вмешательству женщин в миграционный процесс в результате развода, чтобы узнать мнение населения об этом процессе?" На вопрос 60% респондентов отметили отрицательным взглядом. Было отмечено, что жители городов Чирчик и Газалкент являются одними из факторов, способствующих разводам в семьях. В Учтепинском районе города Ташкента также выявлена активность разведенных женщин в миграционном процессе. Однако увеличение этого процесса у женщин вызывает и другие проблемы. Напротив, активное участие женщин в миграционном процессе также приводит к увеличению неполных семей в составе семьи, то есть к увеличению разводов. Однако 40 процентов респондентов города Чирчика и Бектемирского района положительно отметили, что у них есть возможность обеспечить себя и свою семью с экономической точки зрения. Реформы, проводимые в настоящее время по обеспечению занятости женщин и повышению уровня образования, в свою очередь, относительно уменьшают случаи, когда женщины ищут работу в миграции.

Таблица 1

Ответы респондентов на вопрос "Какие проблемы возникают после развода?" (%; 2025 г.)

Какие проблемы возникают после развода	**Название региона**	**Шакаждый население**	**Название региона**	**Население городка**	**Название региона**	**Зима население**
Проблемы со здоровьем	Газалкент, Чирчик,	17.	Александр	26.	Сойлик, Хандойлик	21.
Жилищная проблема	Чирчик	24.	Паргос,Энбек	22.	Хандайлык, Пскемский	20.
Воспитание детей	Чирчик	59.	Паргос, Энбек, Искандар	52.	Сойлик, Хандойлик,	50.
Всего		**100**		**100**		**100**

Таблица составлена на основе результатов социологического исследования (2022 год), проведенного автором.

Увеличение процесса развода в составе семьи указывает на необходимость изучения этапов после развода. В исследовании, чтобы прояснить этот вопрос, было обращено внимание на вопрос: "Какие проблемы возникают после развода?." Изменение взглядов молодежи в городском населении, растущая популярность отношений, чуждых нашему менталитету, является одной из проблем современных районов города Ташкента, а также городов Ташкентской области. Тот факт, что ребенок, воспитывающийся в полной семье, находится под всесторонним контролем

и контролируется его отцом или бабушками и дедушками, напрямую отражается на воспитании ребенка, когда он интегрируется в общество. Проблемы, связанные с воспитанием детей после развода, в настоящее время являются очень важной проблемой.

В проведенном социолого-демографическом исследовании 59 процентов городского населения (города Газалкент, Чирчик) отметили, что после развода возникают проблемы с воспитанием детей. В этом процессе было выявлено, что у 50 процентов сельского населения (села Сойлык, Хандайлык, Пскем) также есть проблемы, связанные с воспитанием детей после развода. Кроме того, на сегодняшний день актуальны вопросы, связанные с жилищными проблемами у женщин после развода. По результатам проведенного выше социолого-демографического опроса, исходя из проблем, возникающих в семье, жизненных реалий, целесообразно разработать механизмы совершенствования системы семейного состава. Необходимо обеспечить стабильность семьи, прежде всего, с экономической точки зрения, то есть увеличить занятость молодежи, проводить работу с социальной и психологической точек зрения по проблемам, возникающим в молодых семьях, и предотвращать разводы.

По мнению доктора экономических наук, профессора А.М.Садыкова: "Реформы, осуществляемые из центра, не всегда достаточно адаптированы к местным условиям и могут не полностью учитывать особенности развития различных регионов страны" [4]. Действительно, образ жизни и условия проживания населения центра непосредственно влияют на демографические процессы населения. Условия жизни населения в первую очередь отражаются в его развитии и демографических процессах. Демографические взгляды населения, проживающего в центре, то есть в городе, коренным образом отличаются от взглядов населения, проживающего в отдаленной деревне. Поэтому одним из способов информирования о проводимых в центре реформах является создание систематизированных приложений. Причина в том, что даже в сельской местности количество разводов немного увеличилось из-за того, что в этих же семьях не был полностью организован добрачный медицинский осмотр. Тот факт, что процесс добрачного медицинского осмотра проводится полностью и без каких-либо обманов, непосредственно укрепляет брак и служит основой для создания здорового и гармоничного общества.

Следовательно, необходимо усовершенствовать институциональную систему сокращения семейных разводов в Ташкентском экономическом районе. В ходе исследования была создана открытая база данных и приложение под названием "Молодая семья" для совершенствования процесса добрачного медицинского осмотра в Республике Узбекистан, и можно получить следующие преимущества в его использовании. Это:

✓ данные автоматически отмечаются в мобильном приложении;

✓ Приложение непосредственно связано с районными поликлиниками, каждая информация конфиденциальна;

✓ свидетельство о рождении, выдаваемое при рождении ребенка, регистрируется через QR-код. А население, не имеющее такого кода, вводит код свидетельства; Этот процесс также напрямую связывает мобильное приложение с органами ЗАГС;

✓ на этапе добрачного медицинского осмотра размещена заявка на прохождение медицинского осмотра, которая заполняется автоматически с помощью приложения;

✓ заполненное заявление направляется в органы ЗАГС в режиме онлайн; Проверяется органами ЗАГС, если не наблюдаются исключительные случаи, невеста и жених уведомляются;

Вышеупомянутая работа служит для дальнейшего укрепления брачного процесса через систематизированную платформу, создания здоровой семьи и предотвращения распада молодых семей. Отслеживание влияния каждой проводимой реформы на человека и его семью на развитие демографических процессов через такие систематизированные приложения дает хорошие результаты.

Использованные источники:

1. Анохин А.А., Житин Д.В. География населения с основами демографии. Учебник для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2017 стр 86
2. Волков А.Г.Семья-объект демографии. –М.:1986.
3. Копылов В. Я. География населения.Москва: «ВИНИТИ», 1999.-124 с.
4. Содиқов А.М Ўзбекистон минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уни тартибга солиш механизмлари. Иқтисод. фан. доктор. дисс. – Т., 2006. – 18 б.

Тургунбоев К.И.
студент 2 курса
направление История
Денауский институт предпринимательства и педагогики
https://orcid.org/0009-0003-1431-1942

КАРАХАНИДЫ И СЕЛЬДЖУКИДЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИХ ГОСУДАРСТВ

***Аннотация**: **Цель статьи.** Данное исследование посвящено сравнительно-историческому анализу государств Караханидов (840-1212) и Сельджукидов (1037-1194), господствовавших в X-XII веках в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.*

***Методология.** Применены сравнительно-исторический, типологический и структурно-функциональный методы на основе средневековых письменных источников, нумизматических материалов и современной историографии.*

***Результаты и научная новизна.** Впервые разработана сравнительная матрица критериев (государственное устройство, традиции управления, военная стратегия, литературный язык, экономическая основа, культурные достижения, историческое наследие), позволяющая системно типологизировать модели тюрко-мусульманской государственности. Выявлено, что федеративная система Караханидов основывалась на тюркских племенных традициях, тогда как централизованный султанат Сельджукидов синтезировал тюркскую военную элиту с персидско-исламскими административными традициями.*

***Практическое значение.** Результаты применимы в изучении истории тюркских народов, теории государства и права, проблем управления многонациональными государствами.*

***Ключевые слова:** Караханиды, Сельджукиды, тюрко-мусульманские государства, сравнительно-исторический анализ, государственное устройство, модель управления, система двух каганатов, институт султаната, визират, система икта, культурное наследие, тюркские письменные памятники, медресе Низамийя, Великий шелковый путь.*

Turgunboev K.I.
2nd year student of History
Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy,
https://orcid.org/0009-0003-1431-1942

KARAKHANIDS AND SELJUKS: COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS OF TWO TURKIC-MUSLIM STATES

Abstract: ***Purpose.*** *This study presents a comparative historical analysis of the Karakhanid (840-1212) and Seljuk (1037-1194) states that dominated Central Asia and the Middle East in the 10th-12th centuries.*

Methodology. *Comparative-historical, typological, and structural-functional methods were applied based on medieval written sources, numismatic materials, and modern historiography.*

Results and scientific novelty. *For the first time, a comparative criteria matrix has been developed (state structure, governance traditions, military strategy, literary language, economic basis, cultural achievements, historical legacy) enabling systematic typology of Turkic-Muslim state models. It is revealed that the Karakhanids' federal system was based on Turkic tribal traditions, while the centralized Seljuk sultanate synthesized the Turkic military elite with Persian-Islamic administrative traditions.*

Practical significance. *The results are applicable in the study of Turkic peoples' history, state and law theory, and multinational state governance issues.*

Keywords: *Karakhanids, Seljuks, Turkic-Muslim states, comparative historical analysis, state structure, governance model, dual khaganate system, sultanate institution, vizierate, iqta system, cultural heritage, Turkic written monuments, Nizamiyya madrasah, Great Silk Road.*

Введение

X-XII века являются важным периодом, ознаменовавшим начало нового этапа в истории тюркских народов в центральной и западной частях Евроазиатского континента. В этот период происходил процесс исламизации тюркских этнополитических систем и возникли различные формы тюрко-мусульманской государственности. Два наиболее ярких представителя этого процесса – государства Караханидов и Сельджукидов – имеют большое значение по своему географическому охвату, государственному устройству и историческому влиянию.

Государство Караханидов (840-1212) вышло на историческую арену как первое крупное мусульманское государство тюркских народов в Центральной Азии и Восточном Туркестане. Возникновение этого государства произошло в результате распада Западного Тюркского каганата и политической консолидации местных тюркских племен – карлуков, чигилей, ягма. Караханиды сыграли важную роль в формировании историко-культурного ландшафта Центральной Азии, превращении тюркского языка в письменный литературный язык, укреплении ислама как социально-культурной системы в местных условиях [1, с. 94; 2, с. 112].

Государство Сельджукидов (1037-1194) было создано военно-политической элитой из рода ***кынык*** огузских тюрков и за короткое время

включило в свой состав обширные территории от Центральной Азии до Анатолии. Сельджукиды, гармонизируя тюркскую военную культуру с персидскими административными традициями и арабо-исламской правовой системой, создали одну из самых могущественных империй средневековья. Они оказали большое влияние на ход мировой истории, освободив халифат Аббасидов от влияния ***Буидов***, нанеся стратегический удар по Византийской империи (битва при Манцикерте, 1071) и создав основу для прочного обоснования тюрков в Анатолии [Bosworth, 2018; Peacock, 2015].

Сравнительный анализ этих двух государств имеет важное значение для понимания эволюции тюрко-мусульманской государственности, а также для выявления влияния различных политических, социальных и культурных факторов на государственное строительство. Изучение сходств и различий между моделями управления, военной организацией, экономической политикой и культурными достижениями Караханидов и Сельджукидов помогает осветить сложную динамику истории средневекового Востока.

Актуальность исследования: Проблемы формирования и развития тюрко-мусульманских государств недостаточно изучены в области современной тюркологии, истории исламской цивилизации и теории сравнительной государственности. В особенности сравнительный анализ двух государств, существовавших в одну эпоху, но имевших различные государственные структуры, таких как Караханиды и Сельджукиды, не получил достаточного освещения в научной литературе. Данное исследование проведено с целью заполнения этого научного пробела и обогащения типологии тюрко-мусульманских государств.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

История государств Караханидов и Сельджукидов является объектом исследования европейских и российских востоковедов с XIX века. Выдающиеся исследователи, такие как В.В. Бартольд, В. Хинц, К.Э. Босворт, П.Б. Голден, Е.А. Давидович, Э.К.С. Пикок, создали фундаментальные труды по изучению различных аспектов этих государств.

Среди фундаментальных исследований по истории государства Караханидов особое место занимают монография О.К. Караева (1983), обобщающие работы Е.А. Давидович и П.Н. Петрова (2005-2008), а также фундаментальные труды узбекских историков А. Сагдуллаева, Б. Аминова, О. Мавлонова, М. Норкулова (2000) [1, с. 271]. Эти работы комплексно освещают государственное устройство Караханидов, социально-экономическое развитие, культурные достижения и отношения с другими государствами.

По истории государства Сельджукидов в западной историографии важное значение имеют работы таких ученых, как К.Э. Босворт (2018), Э.К.С. Пикок (2015), Д. Дюран-Геди (2010). Эти исследования глубоко анализируют политическую историю Сельджукидов, военные достижения, административную структуру и культурную политику. В турецкой и иранской историографии ученые М.А. Кёймен, И. Кафесоглу, А. Севим внесли большой вклад в изучение различных аспектов государства Сельджукидов.

Однако специальных монографических исследований по сравнительному анализу Караханидов и Сельджукидов еще недостаточно. Существующие работы в основном посвящены истории одного государства, а их сопоставление и типологический анализ изучены недостаточно. Данное исследование проведено с целью восполнения этого научного пробела.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании применялись следующие научные методы и подходы:

•**Сравнительно-исторический метод:** путём сравнения политических, социальных, экономических и культурных аспектов государств Караханидов и Сельджукидов определяются их специфические особенности и общие закономерности.

• **Структурно-функциональный анализ:** анализируется структура и функции государственных институтов, их место в социально-политической системе.

• **Типологический подход:** Типологическая классификация различных моделей тюрко-мусульманской государственности и выявление их особенностей.

• **Междисциплинарный подход:** Проведение комплексного анализа путем интеграции достижений историографии, востоковедения, тюркологии, исламских исследований и теории государственности.

В качестве источниковой базы исследования служили средневековые письменные источники (Сиясат-наме Низам аль-Мулька, Кутадгу билиг Юсуфа Хас Хаджиба, Диван лугат ат-турк, Махмуда Кашгари, нумизматические материалы, археологические находки, а также современные научные исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Происхождение государств и этнополитические основы

1.1. Формирование Караханидов. Государство Караханидов возникло в результате падения Западного Тюркского каганата в середине VIII века и усиления союза карлукских племен. Основатель государства Абдулкарим Сатук Богра-хан (915-955) укрепил политическое управление путем объединения племен чигилей и ягма. Его победа над правителем Баласагуна в 942 году обеспечила господство Караханидов в регионе [1, с. 94; 2, с. 112]. Союз между племенами карлуков, чигилей и ягма составил основу военной и административной системы государства.

Основной этнополитической особенностью Караханидов было создание государственных институтов при сохранении тюркских племенных традиций. Официальное принятие ислама Сатук Богра-ханом в 960 году укрепило идеологическую основу государства и способствовало сближению с мусульманским населением Мавераннахра. Захват столицы государства Саманидов Бухары в 999 году превратил Караханидов в основную политическую силу Центральной Азии.

1.2. Возникновение Сельджукидов. Государство Сельджукидов было организовано потомками бека Сельджука из рода кынык огузских тюрков. На рубеже X-XI веков огузские племена переселились на территории между Сырдарьей и Амударьей и поступили на службу к Саманидам, позже к Газневидам. Военная элита под руководством Тогрул-бека (1037-1063) и Чагры-бека в результате военного столкновения с Газневидами создала независимое государство.

После победы над Газневидами в битве при Данданакане в 1040 году Сельджукиды включили в свой состав Хорасан и западные части Мавераннахра. Вступление Тогрул-бека в Багдад в 1055 году и получение от халифа Аббасидов титула султан аль-мулк (султан султанов) превратили Сельджукидов в самое могущественное государство исламского мира. Основное отличие Сельджукидов от Караханидов заключалось в их стратегии превращения своего государства в обширную империю в течение нескольких десятилетий.

2. Государственное устройство и системы управления

2.1. Караханиды: система двух каганатов. Государство Караханидов основывалось на традиционной федеративной структуре тюркской государственности. Верхняя часть государства – Великий каганат (с центрами в Баласагуне и Кашгаре) управляла Восточным Туркестаном и Семиречьем, нижняя часть – каганат Арслан (с центрами в Самарканде и Бухаре) управляла Мавераннахром. В этой системе действовал порядок наследования власти от хана к племени, от дяди к племяннику.

Преимущества системы двух каганатов заключались в следующем: возможность эффективного управления обширными территориями, учет интересов местных элит, сохранение этнического и культурного разнообразия. Однако у этой системы были и недостатки: борьба за власть между каганами, ослабление центральной власти, стремление областей к независимости. В конце XI – начале XII века конфликты между двумя каганатами привели к разделению государства.

2.2. Сельджукиды: централизованный институт султаната. Государство Сельджукидов основывалось на централизованной системе султаната. Султан как абсолютный центр власти сосредотачивал в своих руках военную, политическую и религиозную власть. Хотя халиф Аббасидов формально являлся источником религиозной власти, на практике сельджукский султан был реальным руководителем государства. Для поддержки власти султана был создан сильный институт визирата.

Самый известный визирь Низам аль-Мульк (1063-1092) провел административные реформы государства, упорядочил службу диванов (государственных документов) и ввел систему икта (предоставление земельной собственности за военную службу). Централизованная система Сельджукидов позволила государству осуществлять оперативную военную мобилизацию, эффективный сбор налогов и объединение обширных

территорий. Однако после смерти султанов наблюдались и проблемы наследования, что в XII веке привело к распаду государства.

3. Военная организация и стратегии экспансии

3.1. Военная система Караханидов. Военная сила Караханидов в основном базировалась на легкой кавалерии тюркских племен. Военная стратегия была больше направлена на оборону и укрепление существующих территорий. Караханиды участвовали в таких военных операциях, как захват государства Саманидов (999), пограничные конфликты с Газневидами, борьба против вторжения каракитаев.

Военная тактика основывалась на традиционных тюркских методах: быстро передвигающаяся конница, лук и стрелы, мечи. При нападении на города не применялась сложная осадная техника, что ставило Караханидов в невыгодное положение при нападении на хорошо укрепленные крепости и города. Военная стратегия Караханидов была больше направлена на сохранение существующих территорий и укрепление союзов с местными племенами.

3.2. Военная организация Сельджукидов и строительство империи. Сельджукиды организовали сильную, дисциплинированную и регулярную армию. В качестве основной военной силы служила тюркская конница (сипахи), а в качестве дополнительных частей имелись пехота, осадные мастера и вспомогательные войска. Через систему икта государство выделяло землю служившим на военной службе чиновникам, требуя от них регулярной военной службы.

Среди важных военных достижений Сельджукидов значительное место занимают победа над Газневидами в битве при Данданакане в 1040 году, захват Багдада в 1055 году, историческая победа над Византийской империей в битве при Манцикерте в 1071 году. В результате битвы при Манцикерте Анатолия (современная Турция) стала основным местом проживания тюрков и положила начало формированию последующей Османской империи. Военная стратегия Сельджукидов была направлена на строительство империи, и они за короткое время взяли под свой контроль территории от Центральной Азии до Сирии и Палестины.

4. Культурные и научные достижения

4.1. Возникновение тюркской письменной литературы в эпоху Караханидов. Эпоха Караханидов является одним из важнейших этапов в культурной истории тюркских народов. В этот период тюркский язык впервые стал средством создания крупных литературных произведений. Произведение Юсуфа Хас Хаджиба Кутадгу билиг (Знание, ведущее к счастью, 1069) является первым крупным дидактико-философским произведением на тюркском языке, охватывающим вопросы государственного управления, морали, юстиции и просвещения. В произведении четыре основные добродетели – **адл** (справедливость), **кут** (государственное благополучие), **акыл** (разумная мысль) и канагат (удовлетворенность) – представлены как основа государственной и общественной жизни.

Энциклопедическое произведение Махмуда Кашгари Диван лугат ат-турк (Словарь тюркских языков, 1072-1074) является первым научным словарем тюркских языков и дает ценные сведения о языке, этнографии, культуре и истории тюркских народов. Это произведение считается основоположником тюркского языкознания. Произведения Ахмада Югнаки Хибат уль-хакаик (Дар истин) и Диван-и хикмат Ахмада Ясави считаются первыми произведениями, отразившими философию суфизма на тюркском языке.

Архитектура эпохи Караханидов также имеет свои особенности. Мавзолеи, мечети и минареты, построенные в городах Узкенд, Узген, Бухара, считаются важными памятниками архитектуры Центральной Азии. Эти здания являются синтезом тюрко-исламской архитектуры, в которых гармонично сочетаются традиционные тюркские орнаменты и исламские архитектурные формы.

4.2. Эпоха Сельджукидов: золотой век исламской цивилизации. В эпоху Сельджукидов исламская цивилизация достигла высочайшего пика в научном, философском и культурном отношении. Медресе Низамийя, организованные визирем Низам аль-Мульком (в Багдаде, Нишапуре, Исфахане, Мосуле и других городах), стали крупнейшими образовательными центрами исламского мира. В этих медресе преподавались фикх (исламское право), хадисы, тафсир, логика, философия, математика, астрономия и другие науки.

В литературе эпохи Сельджукидов персидский язык был основным литературным языком, и такие поэты, как Омар Хайям, Низами Гянджеви, Анвари, создавали свои произведения. Произведение Низам аль-Мулька Сиясат-наме (Книга о правлении) остается важнейшим руководством о государственном управлении, обязанностях визирей и искусстве правления. Деятельность таких известных мыслителей и философов, как Абу Хамид аль-Газали (1058-1111), приходится на эпоху Сельджукидов.

Архитектура Сельджукидов развивалась на основе синтеза тюркских, персидских и арабских архитектурных традиций. Соборная мечеть в Исфахане, здания медресе Низамийя, минареты и дворцы считаются лучшими образцами сельджукской архитектуры. Государство Сельджукидов в Анатолии (Румские Сельджукиды, 1077-1308) создало своеобразный архитектурный стиль, который позднее повлиял на османскую архитектуру.

5. Экономические основы и торговые связи

5.1. Экономическая политика Караханидов. Экономика Караханидов основывалась на торговле по Великому шелковому пути. Города Баласагун, Кашгар, Самарканд, Бухара были основными торговыми центрами между Востоком и Западом, осуществлялась торговля шелком, ювелирными изделиями, лекарственными растениями, пряностями и другими товарами. Государство Караханидов получало большую прибыль от транзитной торговли, и эти доходы составляли основную часть государственного бюджета.

Сельское хозяйство в основном было оазисным земледелием и скотоводством. Орошаемые земли использовались для выращивания пшеницы, ячменя, хлопководства. Денежная система основывалась на серебряных дирхемах, и монеты Караханидов являются ценными нумизматическими материалами. Они наносили на свои монеты арабскую и тюркскую письменность, имена каганов и исламские изречения, что отражало религиозную и культурную идентичность государства.

5.2. Экономическая система Сельджукидов. Экономика Сельджукидов в большей степени основывалась на сельскохозяйственных налогах и системе икта. Через систему икта государство предоставляло своим чиновникам право собирать налоги с определенных территорий, а эти чиновники взамен этих налогов брали на себя обязательство нести военную службу государству. Эта система, наряду с укреплением военной мощи государства, позволяла организовывать местную администрацию.

Торговые связи охватывали территории Хорасана, Ирака, Сирии, Анатолии и Византии. Сельджукиды получали доход от торговых пошлин, контролируя основные караванные пути. Денежная система основывалась на золотых динарах и серебряных дирхемах. Экономическое благополучие государства Сельджукидов создало основу для его военных и культурных достижений.

6. Сравнительный анализ: основные различия и сходства

Сравнительный анализ Караханидов и Сельджукидов выявляет фундаментальные различия в их государственном устройстве, военной стратегии, культурной политике и историческом наследии. Ниже эти различия представлены в табличной форме:

Из этого сравнительного анализа видно, что Караханиды и Сельджукиды представляют две различные модели тюрко-мусульманской государственности: Караханиды – традиционную федеративную модель, Сельджукиды – централизованную имперскую модель. Обе модели были успешными в своих условиях, но развивались по-разному в силу исторических обстоятельств и географических факторов.

Заключение

Сравнительно-исторический анализ государств Караханидов и Сельджукидов позволяет сделать ценные выводы об эволюции и типологии тюрко-мусульманской государственности. В результате исследования получены следующие основные выводы:

Во-первых, Караханиды и Сельджукиды коренным образом различались по государственному устройству: федеративная система двух каганатов Караханидов основывалась на тюркских племенных традициях, в то время как централизованный институт султаната Сельджукидов возник на основе принятия персидско-исламских административных традиций. Это различие сыграло решающую роль в стратегии экспансии, военной организации и исторической судьбе государств.

Во-вторых, в культурной сфере выявлены важные различия: Караханиды, создав первые крупные литературные произведения на тюркском языке, сослужили историческую службу в укреплении этнокультурной идентичности тюркских народов. Такие произведения, как Кутадгу билиг, Диван лугат ат-турк, Диван-и хикмат считаются основоположниками тюркской письменной литературы. Сельджукиды же, создав институционализированную систему образования исламского мира (медресе Низамийя), непосредственно внесли вклад в развитие исламской науки, философии и правоведения.

В-третьих, существуют коренные различия и в военной стратегии: если военная деятельность Караханидов была больше направлена на оборону и сохранение существующих территорий, то Сельджукиды осуществляли стратегию быстрой экспансии и строительства империи. Битва при Манцикерте (1071) продемонстрировала военную мощь Сельджукидов и стала отправной точкой в процессе тюркизации Анатолии.

В-четвертых, наблюдаются различия и в экономическом отношении: экономика Караханидов основывалась на транзитной торговле по Великому шелковому пути, и основная часть государственных доходов формировалась за счет торговых пошлин. Сельджукиды же создали централизованную экономическую систему, основанную на сельскохозяйственных налогах и системе икта, что позволило им финансово поддерживать систему чиновников, несущих военную службу.

В-пятых, с точки зрения исторического наследия оба государства сыграли важную роль в формировании тюрко-мусульманской цивилизации. Усилия Караханидов по сохранению и развитию тюркского языка и культуры создали историческую основу для формирования национального сознания и культурной идентичности современных тюркских народов. Опыт государственного строительства и администрации Сельджукидов послужил образцом для последующих тюркских государств – Хорезмшахов, Османов, Каракоюнлу и Аккоюнлу.

В целом Караханиды и Сельджукиды представляют два параллельных, но взаимно различных пути развития тюрко-мусульманской государственности. Их опыт занимает уникальное место в истории тюркских народов и служит важной теоретической основой для изучения современной теории государственности, управления многонациональными государствами, культурного плюрализма и проблем политико-культурной интеграции. Для будущих исследований актуальным остается более глубокое изучение отношений этих государств с местными племенами, налогово-таможенной системы, военных технологий и механизмов культурного обмена.

Использованные источники:

I. Основные источники:

1. Низам аль-Мульк. Сиясат-наме (XII век). / Перевод и комментарии: А. Уринбоев. – Ташкент: Янги аср авлоди, 2018.

2. Юсуф Хас Хаджиб. Кутадгу билиг (1069). / Подготовил к изданию: Р. Рахмати. – Ташкент: Издательство им. Гафура Гуляма, 2015.
3. Махмуд Кашгари. Диван лугат ат-турк (1072-1074). / Переводчик: С. Муталибов. – Ташкент: Фан, 2016. В 3-х томах.
4. Ахмад Ясави. Диван-и хикмат (XII век). / Подготовил к изданию: К. Махмудов. – Ташкент: Академнашр, 2019.
II. Монографии и сборники:
5. Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов О., Норкулов М. История Узбекистана: Развитие государства и общества. Часть I. – Ташкент: Академия, 2000. – 271 с.
6. Усманов К., Содиков М., Бурханова С. История Узбекистана. Переработанное второе издание. – Ташкент: Иктисод-молия, 2016. – 496 с.
7. Давидович Е.А. История и нумизматика государства Караханидов. – Ташкент: Фан, 2005. – 342 с.
8. Караев О.К. История государства Караханидов (940-1212). – Фрунзе: Илим, 1983. – 256 с.
9. Bosworth C.E. The Ghaznavids and Seljuqs: The Rise of Turkic Military Power in Iran and Beyond. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018. – 456 p.
10. Peacock A.C.S. The Great Seljuk Empire. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. – 424 p.
11. Golden P.B. Central Asia in World History. – Oxford: Oxford University Press, 2011. – 208 p.
12. Durand-Guédy D. Iranian Elites and Turkish Rulers: A History of Iṣfahān in the Seljuq Period. – London: Routledge, 2010. – 368 p.
III. Научные статьи:
13. Каримов Н. Караханиды и Сельджукиды: сравнительный анализ // Журнал истории Узбекистана. – 2020. – №3. – С. 45-62.
14. Ахмедов М. Система и структура управления тюрко-мусульманских государств // Вестник Института востоковедения. – 2019. – №2. – С. 78-95.
15. Allsen T.T. The Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire // Warfare in Inner Asian History (500-1800). – Leiden: Brill, 2002. – P. 265-293.
16. Dankoff R. The Turkic Peoples in Mahmud al-Kashgari’s Divan lughat al-Turk // Journal of the American Oriental Society. – 1987. – Vol. 107, No. 1. – P. 85-91.
17. Lambton A.K.S. The Internal Structure of the Saljuq Empire // Cambridge History of Iran, Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968. – P. 203-282.
18. Негматов Н.Н. Культура Центральной Азии эпохи Караханидов // Шарк юлдузи. – 2018. – №5. – С. 134-148.
19. Тургунбоев Камрон и Амруллоева Огилой Хасановна. «РАЗВИТИЕ ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ПЕРИОД КАРАХАНИСА: НА ПРИМЕРЕ «ДЕВОНУ ЛУГАТИТ ТЮРК» I МАХМУДА КАШАГАРИ И «КУТАДГУ БИЛИГ» I ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА». Конференции. Том. 1. № 8. 2025.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-959-966

Турдиев М.Р.
доцент
кафедра патологической анатомии и патологической физиологии
Бухарский Государственный медицинский
институт им. Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0000-0002-4847-6628
Сохибова З.Р.
доцент
кафедра онкологии и клинической радиологии
Бухарский Государственный медицинский
институт им. Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0000-0002-0426-4367

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДЕФИЦИТЕ ЦИНКА (ZN).

Резюме. *В данной статье представлены данные сравнительного анализа морфофункциональных изменений, возникающих в тимусе белых крыс в различные возрастные периоды при экспериментальном алиментарном дефиците цинка (Zn). В ходе эксперимента морфометрически оценивались динамические изменения лимфоидных структур тимуса, степень дифференцировки тимоцитов, кортико-медуллярное соотношение, а также реакция стромальных элементов. Установлены нарушения паренхиматозно-стромального баланса тимуса, изменения морфометрических показателей лимфоидной ткани, снижение числа лимфоидных клеток, а также утолщение стенок сосудов органа и уменьшение их внутреннего диаметра. Полученные результаты отражают важную роль цинка в поддержании иммунного гомеостаза и создают научную основу для более глубокого понимания иммунопатологических механизмов микроэлементозов.*

Ключевые слова: *дефицит цинка, тимус, белая крыса, Т-лимфоциты, иммунная система.*

Turdiev M.R.
associate professor
Department of Pathological Anatomy and Pathological Physiology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina,
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0000-0002-4847-6628
Sokhibova Z.R.
associate professor
Department of Oncology and Clinical Radiology,
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0000-0002-0426-4367

COMPARATIVE MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE THYMUS IN WHITE RATS AT DIFFERENT AGE PERIODS UNDER EXPERIMENTAL ZINC (ZN) DEFICIENCY

Abstract. *This article presents data from a comparative analysis of morphofunctional changes occurring in the thymus of white rats during different age periods under conditions of experimentally induced alimentary zinc (Zn) deficiency. During the experiment, dynamic changes in the lymphoid structures of the thymus, the degree of thymocyte differentiation, the corticomedullary ratio, and the response of stromal elements were assessed morphometrically. Disturbances in the parenchymal–stromal balance of the thymus, alterations in morphometric parameters of lymphoid tissue, a decrease in the number of lymphoid cells, thickening of the vascular walls, and a reduction in the internal diameter of thymic blood vessels were identified. The obtained results demonstrate the important role of zinc in maintaining immune homeostasis and provide a scientific basis for a deeper understanding of immunopathological mechanisms associated with trace element deficiencies.*

Keywords: *zinc deficiency, thymus, white rat, T lymphocytes, immune system.*

Актуальность. Иммунная система обеспечивает адаптацию организма к воздействию различных повреждающих факторов и его защиту. Иммунокомпетентные органы играют важную роль в поддержании иммунологического гомеостаза организма в экспериментальных и клинических условиях [1]. Тимус является одним из важнейших органов, обеспечивающих поддержание иммунного статуса организма и защиту от процессов старения и развития заболеваний. Размеры, архитектура и функции данной железы изменяются с возрастом [7, 10].

Различные химические элементы, в частности микроэлементы, имеют важное значение для поддержания физиологической активности и здоровья организма. Микроэлементы необходимы для обеспечения процессов роста, развития, размножения, лактации, гемопоэза и других жизненно важных

процессов. Активность иммунной системы зависит от их содержания в организме. Микроэлементы обеспечивают минеральный обмен и участвуют в регуляции всех видов метаболических процессов [8].

По мнению многих специалистов, состояние здоровья человека определяется характером потребляемых им пищевых продуктов. Среди алиментарных факторов, имеющих важное значение для сохранения здоровья, продолжительности и качества жизни, микроэлементы занимают одно из ведущих мест [4, 5, 9].

Цинк является микроэлементом, необходимым для всех живых организмов, и участвует во многих биохимических процессах, протекающих в клетках [2, 6, 11, 13, 14]. Цинк принимает участие в формировании антиоксидантного потенциала клеток при иммунных реакциях и является важным элементом для функционирования Т- и В-лимфоцитов [3]. Нормальное содержание Zn обеспечивает реализацию Th1-ответа и поддержание целостности слизистых оболочек. Дополнительное поступление цинка активирует клеточные компоненты врождённого иммунитета и антителообразование. Данный микроэлемент обладает антиоксидантным действием и оказывает защитный эффект в отношении оксидативного стресса [12].

Цель исследования. Оценка морфофункциональных особенностей тимуса белых крыс в различные возрастные периоды при экспериментальном алиментарном дефиците цинка.

Материал и методы. Исследование проведено на 80 беспородных белых самцах крыс. При выполнении эксперимента соблюдались этические нормы использования животных и требования Хельсинкской декларации. Крысы содержались в стандартных условиях вивария. Возраст, пол, масса тела, характер питания и условия содержания лабораторных животных соответствовали требованиям эксперимента. Для определения морфофункциональных показателей строения тимуса были сформированы две группы животных: I группа — контрольная (n = 40); II группа — крысы, получавшие рацион с дефицитом магния (n = 40). Для моделирования микроэлементной недостаточности использовали специализированный корм, изготовленный фирмой «ALTROMIN Spezialfutter GmbH & Co. KG» (Германия). Корма были обеспечены официальным сертификатом № 36/2024. Животным контрольной группы стандартный рацион скармливали два раза в сутки. В опытной группе специализированный корм в дозе 20 г, с учётом массы тела, давали два раза в сутки.

Животных контрольной и опытной групп выводили из эксперимента и подвергали декапитации под эфирным наркозом. После вскрытия грудной клетки выделяли тимус. Фрагменты ткани тимуса фиксировали в 10% нейтрализованном формалине, после чего промывали проточной водой в течение 2–4 часов и обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и хлороформе; далее по общепринятым методикам изготавливали парафиновые блоки. Парафиновые срезы толщиной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином и

эозином, а также по методу Ван Гизона. Структурные элементы тимуса подвергали морфометрическому исследованию с использованием окуляр-микрометра. Определяли относительную площадь долек тимуса, коркового и мозгового слоёв (по отношению к общей площади среза), толщину коркового слоя, а также толщину стенок сосудов и их внутренний диаметр. Измерения проводили в пяти полях зрения каждого гистологического среза, выбранных случайным образом.

Для изучения клеточного состава лимфоидных структур тимуса подсчёт клеток проводили в его структурных отделах (субкапсулярная зона, корковый слой и мозговое вещество) под масляной иммерсией с использованием микроскопа NOVEL Model NLCD-307 (Китай). Подсчёт клеток осуществляли с помощью морфометрической сетки, установленной в окуляр микроскопа.

Морфологические и морфометрические данные, полученные в ходе исследования, подвергали математической обработке на персональном компьютере Pentium-IV с использованием программного пакета Microsoft Office Excel 7.0. При этом определяли стандартное отклонение и репрезентативные ошибки.

Были сформированы вариационные ряды числовых данных, рассчитаны средние арифметические значения, средняя ошибка, коэффициент вариации, а также процентное отклонение показателей от контрольных значений. Статистическую значимость различий по отношению к контролю оценивали с использованием параметрического метода — критерия Стьюдента для двух независимых выборок (при нормальном распределении данных). Различия считались статистически значимыми при значениях $p \leq 0,05$. При организации и проведении исследования соблюдались принципы доказательной медицины.

Результаты и обсуждение. Тимус лабораторных животных контрольной группы состоял из двух взаимосвязанных долей и располагался в нижней трети рукоятки грудины. Толщина капсулы в области ворот тимуса у здоровых беспородных белых крыс в возрасте 6 и 9 месяцев составляла соответственно 5,82±0,32 мкм и 5,97±0,38 мкм. Диаметр трабекул в проксимальной части был равен 13,36±0,27 мкм и 13,52±0,22 мкм, а в дистальной части — 10,28±0,14 мкм и 10,43±0,22 мкм. Площадь долек тимуса в соответствующие возрастные периоды составляла 64,27±0,12% и 52,27±0,48%.

У беспородных белых крыс группы с дефицитом цинка толщина капсулы тимуса в области ворот по сравнению с показателями контрольной группы увеличивалась в 1,07 раза в 6-месячном возрасте и в 1,08 раза — в 9-месячном возрасте (рис. 1). Диаметр проксимальной и дистальной частей трабекул в обеих возрастных группах увеличивался соответственно на 6,5% и 7,3%. Площадь долек тимуса уменьшалась в 1,07 раза у 6-месячных и в 1,08 раза — у 9-месячных животных.




Рис. 1. Тимус 9-месячной белой крысы группы с алиментарным дефицитом цинка. Окраска по методу Ван Гизона. Ок. 10×, об. 10×. 1 — утолщение капсулы тимуса; 2 — утолщение стенки трабекулярного кровеносного сосуда, уменьшение его внутреннего диаметра; 3 — увеличение диаметра трабекулы; 4 — замещение паренхимы жировой тканью; 5 — мозговое вещество.

В гистологических препаратах тимуса здоровых беспородных белых крыс различаются корковый и мозговой слои. Граница между корковым и мозговым слоями выражена нечетко. В паренхиме выявляются участки, частично замещённые жировой тканью. У животных контрольной группы в возрасте 6 и 9 месяцев площадь коркового слоя тимуса составляла соответственно 63,86±0,37% и 58,83±0,26%, площадь мозгового слоя — 28,52±0,38% и 32,92±0,42%. Корково-мозговой индекс в соответствующие возрастные периоды был равен 2,24±0,16 и 1,78±0,36. Толщина коркового слоя составляла 248,27±11,54 мкм у 6-месячных и 165,27±9,76 мкм у 9-месячных животных.

У беспородных белых крыс группы с дефицитом цинка площадь коркового слоя тимуса по сравнению с интактными животными уменьшалась на 7,6% в 6-месячном возрасте и на 8,3% — в 9-месячном. Площадь мозгового слоя в обеих возрастных группах снижалась в 1,07 раза. Корково-мозговой индекс также уменьшался в обоих возрастных периодах. Толщина коркового слоя по сравнению с показателями здоровых белых крыс снижалась в 1,07 раза у 6-месячных и в 1,08 раза — у 9-месячных животных.

При анализе популяционного состава Т-лимфоцитов в тимусе здоровых лабораторных животных 6-месячного возраста установлено, что в субкапсулярной зоне коркового слоя количество малых лимфоцитов составляло 38,42±0,58%, в кортикальной зоне — 64,78±0,44%, в мозговом слое — 34,28±0,17%. Содержание средних лимфоцитов в субкапсулярной зоне коркового слоя было равно 17,58±0,26%, в кортикальной зоне — 16,37±0,22%, в мозговом слое — 31,26±0,18%. Количество крупных лимфоцитов в субкапсулярной зоне коркового слоя составляло 17,64±0,28%, в кортикальной зоне — 6,32±0,12%, в мозговом слое — 4,26±0,10%.

У беспородных белых крыс контрольной группы 9-месячного возраста содержание малых лимфоцитов в субкапсулярной зоне коркового слоя

составляло 33,46±0,41%, в кортикальной зоне — 52,92±0,36%, в мозговом слое — 26,12±0,14%. Количество средних лимфоцитов в субкапсулярной зоне коркового слоя было равно 12,73±0,18%, в кортикальной зоне — 11,94±0,16%, в мозговом слое — 32,27±0,22%. Содержание крупных лимфоцитов в субкапсулярной зоне коркового слоя составляло 12,68±0,14%, в кортикальной зоне — 4,26±0,10%, в мозговом слое — 3,19±0,16%.

В группе с индуцированным дефицитом цинка у 6-месячных белых беспородных крыс количество малых лимфоцитов в структурных отделах тимуса уменьшилось соответственно на 7,0%, 8,2% и 7,2%, количество средних лимфоцитов — на 4,1%, 4,0% и 7,0%, а количество крупных лимфоцитов — на 6,1%, 2,1% и 2,0%. В экспериментальной группе 9-месячных белых беспородных крыс снижение содержания малых лимфоцитов в соответствующих структурных компонентах тимуса составило 8,1%, 9,1% и 8,0%, средних лимфоцитов — 5,1%, 5,2% и 6,8%, крупных лимфоцитов — 7,1%, 2,0% и 2,1%.

В контрольной группе 6-месячных белых беспородных крыс толщина стенки трабекулярной артериолы тимуса составила 17,38±0,43 мкм, внутренний диаметр — 19,42±0,18 мкм; толщина стенки капилляров — 5,27±0,16 мкм, внутренний диаметр — 5,79±0,42 мкм. В корковом слое толщина стенки артериол составила 16,36±0,22 мкм, внутренний диаметр — 17,94±0,27 мкм; толщина стенки капилляров — 4,83±0,17 мкм, внутренний диаметр — 5,67±0,24 мкм. В мозговом слое толщина стенки артериол составила 14,78±0,16 мкм, внутренний диаметр — 17,66±0,23 мкм; толщина стенки капилляров — 4,97±0,18 мкм, внутренний диаметр — 5,67±0,28 мкм.

У лабораторных животных 9-месячного возраста толщина стенки трабекулярной артериолы тимуса составила 18,14±0,12 мкм, её внутренний диаметр — 19,78±0,32 мкм; толщина стенки капилляров — 5,52±0,17 мкм, внутренний диаметр — 5,87±0,14 мкм. В корковом слое толщина стенки артериол достигала 16,82±0,18 мкм, внутренний диаметр — 18,38±0,28 мкм; толщина стенки капилляров составляла 4,96±0,14 мкм, внутренний диаметр — 5,82±0,13 мкм. В мозговом слое толщина стенки артериол была равна 15,48±0,26 мкм, внутренний диаметр — 17,92±0,38 мкм; толщина стенки капилляров — 5,24±0,12 мкм, внутренний диаметр — 5,89±0,24 мкм.

В группе белых беспородных крыс с индуцированным дефицитом цинка толщина стенки трабекулярной артериолы увеличилась соответственно в 1,07 и 1,05 раза в 6- и 9-месячном возрасте, тогда как её внутренний диаметр уменьшился в 1,02 раза. Толщина стенки трабекулярных капилляров возросла в 6-месячном возрасте в 1,04 раза, а в 9-месячном — в 1,02 раза, при этом внутренний диаметр данных сосудов снижался незначительно. Толщина стенки артериол и капилляров коркового слоя в 6- и 9-месячном возрасте увеличилась соответственно в 1,06 и 1,04 раза, тогда как их внутренний диаметр уменьшился в 1,02 и 1,03 раза. В мозговом слое толщина стенки артериол возрастала в 1,07 раза, а внутренний диаметр уменьшался в 1,05 раза.

Толщина стенки капилляров в 6- и 9-месячном возрасте увеличивалась в 1,04 раза, при этом их внутренний диаметр снижался в 1,03 раза.

Заключение. У здоровых животных капсула, трабекулы, корковый и мозговой слои тимуса были сформированы относительно нормально, при этом отмечались физиологические процессы инволюции, характерные для соответствующих возрастных периодов. При дефиците цинка наблюдалось увеличение толщины капсулы и трабекул органа, а также выраженное уменьшение площади долек тимуса, что указывает на увеличение относительной площади стромальных компонентов и снижение доли паренхимы. Толщина и площадь коркового слоя уменьшались, снижался корково-мозговой индекс, что свидетельствует об ослаблении процессов пролиферации и дифференцировки Т-лимфоцитов. Относительная площадь мозгового слоя также уменьшалась, что отражает снижение иммуногенной активности тимуса. Отмечено уменьшение количества всех типов Т-лимфоцитов (малых, средних и крупных), что подтверждает угнетение процессов деления и созревания Т-клеток, а также общего иммунного ответа при дефиците цинка. В кровеносных сосудах (артериолах и капиллярах) выявлялось утолщение стенок и уменьшение внутреннего диаметра, что указывает на развитие ангиопатических изменений. Это может приводить к нарушению трофики ткани тимуса и метаболических процессов. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли микроэлемента цинка в поддержании функции тимуса и сохранении клеточного иммунитета организма.

Использованные источники:

1.Бабичев В.Н. Организация и функционирование нейроэндокринной системы // Проблемы эндокринологии. – 2013; 59 (1). – С. 62–69.

2.Ермакова В. В., Иованович Л. Н. Биологическая роль микроэлементов и вирусные патологии // ГЕОХИМИЯ, 2022, том 67, № 2, С. 101–118. DOI: 10.31857/S0016752522020042.

3.Кожин А. А., Владимирский Б. М. Микроэлементозы в патологии человека экологической этиологии // Медицинская экология Экология человека 2013.09. С. – 56-64.

4.Павлова Е.В., Русак Ю.Э., Ефанова Е.Н. Биологическая роль микронутриентов (минералов) в формировании здоровья человека: дерматологические аспекты. часть II // "Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2020. Vol. 22. N 9. С-69-73.

5.Родионов Г.Г., Шантырь И.И., Светкина Е.В., Колобова Е.А., Фоминых Ю.А., Наджафова К.Н. Обеспеченность жирорастворимыми витаминами организма взрослого населения жителей г. Санкт-Петербурга. Университетский терапевтический вестник. 2024;6(2):128–139. DOI: https://doi.org/10.56871/UTJ.2024.17.90.014.

6.Трошина Е.А., Сенюшкина Е.С. Роль цинка в процессах синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы // Клиническая и

экспериментальная тиреоидология 2020;16(3):25-30. doi: https://doi.org/10.14341/ket12697.,
7.Турдиев М.Р. Турли патоген омиллар таъсирида тимус морфофункционал хусусиятларининг ўзгариши (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси 2025, №3 (17). 308-312 б.
8.Федоров В.И. К проблеме определения микроэлементов в сыворотке крови человека // Аналитика и контроль. 2005. Т.9.№4. С.358-366.
9.Шантырь И.И., Яковлева М.В., Власенко М.А., Макарова Н.В., Фоминых Ю.А., Наджафова К.Н. Обеспеченность эссенциальными биоэлементами организма взрослого населения г. Санкт-Петербурга // Университетский терапевтический вестник. 2024. Т. 6. № 3. С. 105–115. DOI: https://doi.org/10.56871/ UTJ.2024.12.51.011.
10.Arbab Sikandar, Shahzaib and Naeem Ullah. Microarchitecture of the Thymus Gland; Its Age and Disease-Associated Morphological Alterations, and Possible Means to Prolong Its Physiological Activity: January 29th 2020. 227-228
11.Chasapis C.T., Loutsidou A.C., Spiliopoulou A.C., Stefanidou M.E. (2012) Zinc and human health: an update. Archives of Toxicology. 86(4), 521-534.
12.Delgado-Roche L, Mesta F. Oxidative stress as key player in severe acute re spiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) infection. Archives of Medical Research. 2020;51(5):384-387. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2020.04.019.
13.Livingstone C. Zinc: Physiology, Deficiency, and Parenteral Nutrition. Nutrition in Clinical Practice. 2015:30(3):371-382. doi: https://doi.org/10.1177/0884533615570376.
14.Sangyong C, Xian L, Zui P. Zinc deficiency and cellular oxidative stress: prognostic implications in cardiovascular diseases. Acta Pharmacologica Sinica. 2018:39(7):1120-1132. doi: https://doi.org/10.1038/aps.2018.25.

Узоков Д.Б.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Аннотация: *В данной статье описывается исследование образцов тканей 10 пациентов, перенесших резекцию желудка по поводу язвенной болезни, взятых из околоязвенной и здоровой тканей. Первоначально материал фиксировали в 10% нейтральном формалине. Затем ткани окрашивали гематоксилином-эозином для исследования. Для идентификации ферментов использовали гистохимические методы. Согласно результатам, в воспаленных слизистых оболочках наблюдалось резкое подавление окислительно-восстановительных ферментов. Функциональное состояние эпителиальных клеток и интерстициальных тканей вокруг раны было нарушено.*

Ключевые слова: *Пациент, желудок, язвенная болезнь, резекция, гематоксилин-эозин, ферменты, слизистая оболочка, эпителиальные клетки.*

Uzokov J.B.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

CONTENT AND DISTRIBUTION OF CERTAIN ENZYMES IN THE GASTRIC MUCOSA IN PEPTIC ULCER

Abstract: *This article describes a study of tissue samples from 10 patients who underwent gastric resection for peptic ulcer disease, taken from periulcer and healthy tissue. The samples were initially fixed in 10% neutral formalin. The tissues were then stained with hematoxylin and eosin for analysis. Histochemical methods were used to identify enzymes. The results revealed a sharp suppression of redox enzymes in the inflamed mucous membranes. The functional state of epithelial cells and interstitial tissues around the wound was impaired.*

Keywords: *Patient, stomach, peptic ulcer disease, resection, hematoxylin and eosin, enzymes, mucous membrane, epithelial cells.*

Ввдение. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний органов желудочно-кишечного тракта [1,2]. Несмотря на внедрение в клиническую практику

разнообразных способов резекции желудка, уже описаны свыше 60 различных пострезекционных синдромов и патологических состояний, связанных с декомпенсацией пищеварения, рецидивом заболевания, так называемых «болезней оперированного желудка» [3,4]. Современные стандарты лечения требуют знания секреторной активности, обсемененности Helicobacter pylori, состояния моторно-эвакуаторной функции, морфологической верификации диагноза [5]. Несмотря на большое количество работ, посвященных эндоскопии оперированного желудка, в литературе анализируется эффективность того или иного дополнительного метода, как правило, обособленно от других, отсутствуют алгоритм и методика их комплексного применения [6,7]. В настоящее время большой интерес исследователей вызывает распределение окислительно-восстановительных ферментов и ферментов фосфорилирования в клеточных элементах, их влияние на энергетический обмен в тканях как в норме, так и при некоторых заболеваниях. В частности, появился ряд работ, в которых уделяется внимание изучению ферментов слизистой оболочке желудка при гастрите и раке.

Цель исследования. Изучить содержание и распределение некоторых ферментов в слизистой оболочке желудка при язвенной болезни.

Материалы и методы исследования. Нами изучено 10 желудков, резецированных у людей по поводу язвы. Материал брался непосредственно после резекции из области язвы и отдаленных участков. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином, по Ван-Гизон, проводилось гистохимическое выявление цитохромоксидазы, сукцинатдегидрогеназы, щелочной и кислой фосфатазы, аскорбиновой кислоты АТФазы.

Результаты исследования. В отдаленных от язвы участках слизистой, неизмененной микроскопически, в покровном эпителии, шеечных клетках желез и эпителии желудочных ямок содержание ферментов незначительно. Единичные гранулы ферментов различной величины выявляются в апикальной части клеток. Особенно слабая активность сукцинатдегидрогеназы и цитохромоксидазы. Несколько большее количество ферментов в клеточных элементах лимфоидных фолликулов (лимфоцитах, гистиоцитах, лимфобластах), главных и добавочных клетках фундальных желез. Наиболее активно, часто в виде диффузных отложений, ферменты обнаруживаются в обкладочных клетках желез и секреторных отделах кардиальных. Аскорбиновая кислота в клетках желез, лимфоидных фолликулах и эпителии слизистой определяется в виде мелких многочисленных зерен, расположенных множственно в оболочке в наибольшем количество ядра и цитоплазме. АТФаза в виде множества крупных гранул находится в апикальной части секреторных клеток, особенно обкладочных желез. В меньше ее в шеечных клетках лимоцитах, клеточных лимфобластах, элементах лимфоидных фолликулов (АТФаза определяется гистиоцитах) и в эпителии слизистой в небольшом количестве. Распределение носит ферментов в области язвенного дефекта содержит иной ферментов. Характер эпителий слизистой большей частью не резкое снижение

ферментативной активности наблюдается актив причем сукцинатдегидрогеназа в секреторных и шеечных клетках желез, и цитохромоксидаза ных отделах часто в шеечне выявляется совершенно. цитах, В клеточных лимфобластах) элементах лимфоидных фолликулов (лимфо шена. активность ферментов, напротив, повы Они обнаруживаются в виде гранул различной величины, часто имеют характер диффузных отложений, слизистой, Содержание АТФазы и аскорбиновой кислоты в эпителин в секреторных и шеечных клетках желез невелико, иногда они совершенно не выявляются. Значительно повышено количество АТФазы и аскорбиновой кислоты в клетках лим- фоидных стах. фолликулов, особенно в лимфоцитах и лимфобластах.

Вывод. В эпителии слизистой оболочки желудка, пораженной воспалительным процессом, в клетках желез количество окислительно-восстановительных ферментов и аскорбиновой кислоты резко снижено, а в клеточных элементах лимфоидных фолликулов, напротив, повышено. Такое различие в содержании ферментов в тканях слизистой оболочки желудка в области язвенного дефекта объясняется, очевидно, изменением функционального состояния эпителия и межуточной ткани слизистой оболочки. Специфическая функция слизистой оболочки (переваривание) ослабляется, в то время как функция ее защитных механизмов, в частности, лимфоретикулярной системы, усиливается.

Использованные источники:

1. Аруин Л. И. Новая Международная классификация дисплазий слизистой оболочки // Рос. Журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2002. - №3. - С.15-17.
2. Бекмурадова М. С., Холтураев А. Т., Гаффаров Х. Х. Влияние ингибиторов протонной помпы на степень развития печеночной энцефалопатии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 8 (62). – С. 88-91.
3. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
4. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузрья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Гаффоров Х. Х., Вафоева Н. А. Значение систолической и диастолической дисфункции при циррозе печени //Universum: медицина и фармакология. – 2020. – №. 10 (72). – С. 4-6.

7. Mamataliev A. R. NEUROHISTOLOGICAL CHANGES IN THE VAGUS NERVE UNDER THE INFLUENCE OF COLCHICINE IN AN EXPERIMENT //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 310-312.

Усмонова Х.К.
преподаватель
Кокандский государственный университет

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СЕМЬЯ» В УЗБЕКСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Аннотация: *Статья посвящена современным проблемам обучения русского языка в начальных узбекских школах, которых языком обучения является узбекский язык. Кроме того, в статье рассматривается главнейшая тенденция, характеризующая первоначальный процесс обучения в современной школе, заключается в направленности всего процесса обучения не только на сообщение знаний и привитие детям умений и навыков, но и прежде всего на развитие личности учащихся.*

Ключевые слов: *методика, система обучения и воспитания, проблемы обучения, аспекты преподавания, грамматических значений в окончании; система падежей; наличие изменяемых частей речи; наличие в структуре слова приставок, суффиксов, окончания; категория вида глаголов.*

Usmonova Kh.K.
lecturer
Kokand State University

THE LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF "FAMILY" IN THE UZBEK LINGUISTIC WORLDVIEW

Annotation: *The article is devoted to modern problems of teaching the Russian language in primary Uzbek schools, where the language of instruction is the Uzbek language. In addition, the article discusses the main trend that characterizes the initial process of learning in a modern school, is the focus of the entire learning process not only on communicating knowledge and instilling skills and abilities in children, but above all on developing the personality of students.*

Key words: *methodology, system of education and upbringing, problems of education, aspects of teaching, grammatical meanings at the end; case system; the presence of variable parts of speech; the presence in the structure of the word of prefixes, suffixes, endings; category of verb aspect;*

В узбекском языке концепт "семья" играет важную роль в организации системы и функционировании антропонимов. Этот концепт является одним из наиболее значимых в концептосфере любой лингвокультуры и имеет сложную семантико-фреймовую структуру. Ядро концепта отражает его общечеловеческую универсальность как одну из форм социальной общности людей, а объемная интерпретационная часть соотносится с индивидуальными

особенностями восприятия и национальной картиной мира. Таким образом, концепт "семья" играет важную роль в формировании лингвокультурной идентичности народа и является ключевым элементом антропонимической системы узбекского языка[83]. Исследования Е. В. Бондаренко показывают, что семья является высшим лингвокультурным концептом, который играет важную роль в большинстве социумов. Концепт "семья" характеризуется многоуровневостью и сегментированностью, а также имеет многочисленные варианты языковой репрезентации фреймов и высокую плотность соответствующего семантического поля.

Согласно исследованиям, ключевыми составляющими концепта "семья" являются: а) ролевая ценностность семьи, которая определяет виды отношений родства и раскрывает содержание концепта; б) отношения между супругами; в) отношения между родителями и детьми. Эти составляющие являются основными элементами концепта "семья" и отражают его важность для культуры и общества[84]. Например, в узбекском языке слово "ota-onalar" (ота-оналар) обозначает "родители", а "bola" - "ребенок". Эти слова отражают ключевые составляющие концепта "семья", а их использование в языке свидетельствует о высокой значимости семейных отношений в узбекской культуре.

Среди тюркоязычных народов институт семьи и соответствующий концепт имеют особую социальную значимость. Это связано с тем, что семья играет более важную роль для всех поколений, сохраняется тенденция к многодетности и религия (в основном ислам) играет важную роль в организации семейной и общественной жизни. В тюркоязычных народах семья обычно рассматривается как крупное объединение всех родственников, а не только круг родителей с детьми.

Концепт "семья" реализуется в рамках социальных полей как неотъемлемого компонента языковой картины мира. Социальное поле семьи включает не только членов семьи и ближайших родственников, но также и близких друзей, если общение происходит на уровне семьи. Например, в тюркоязычных народах существуют разные приемы именования родственников внутри семьи, что отражает сложную социальную структуру этого института.

Таким образом, концепт "семья" имеет особую значимость в тюркоязычных культурах, где он является не только описанием узкого круга родственников, но также и широким объединением всех близких людей, которые связаны между собой различными социальными связями.

В различных социальных полях (СП) антропонимы часто используются в сочетании с другими средствами номинации лиц, которые уточняют возраст, социальный статус или какие-либо отличительные признаки лица. Это

[83] Бондаренко Е. В. Межкультурная семейная коммуникация как особый тип общения.: Автореф. дисс.... канд. филол. наук. - Волгоград, 2010.С.5.
[84]Там же, с.8.

повышает номинативную ценность имени лица[85]. СП семьи в узбекском языке отличается от СП английского и русского языков. В английском языке СП администрации "вдвигается" в СП семьи, что приводит к наличию официальных формул общения. В узбекском языке, наоборот, СП семьи "вдвигается" в административное СП, что приводит к преобладанию "семейного" типа общения в учреждениях и организациях. В русском языке СП семьи и административное СП максимально разграничены по сравнению с узбекским и английским языками[86].

Сигналы антропонимов играют особую роль в передаче концепта "семья" в менталитете носителей узбекского языка. В узбекском языке, для обозначения родства, используются термины (ака, ука, ота, хола, синглим, кенаи и другие), которые являются ключевыми для формирования "семейных" отношений в административных структурах. В частности, функционально значимые имена собственные сближаются с обозначениями родственных отношений и обозначениями лиц по возрасту в контексте семьи.

Внутри семьи также используются номинации по уменьшительным именам и апеллятивам - терминам родства, которые функционально равнозначны. В социальном поле семьи, у узбеков приоритет отдается личному имени перед фамилией, особенно в сфере бытового общения, хотя в официально-деловом общении происходит преобладание фамилии. Этот процесс еще не завершен даже в городах[87]. Видимо, у узбеков процесс завершения, когда фамилия станет активным функциональным элементом общения, не наступит в рамках социального поля семьи, в отличие от англичан и американцев.

Как и в других языках, в узбекском языке можно выделить несколько линий общения между родственниками: 1) родители-дети, 2) дети-родители, 3) члены одного поколения, 4) супруги, 5) более отдаленные родственники. Каждая из этих линий представляет собой уникальную систему номинаций, в которой центральными элементами являются собственные имена и термины родства. В узбекском языке термины родства играют более активную роль, чем в английском и русском языках, и помогают установить сложную систему отношений в семье (например, отношения между членами одного поколения, между старшими и младшими, между мужем и женой и т.д.).

Многочисленные факты, приведенные М.И. Расуловой, свидетельствуют о том, что именование мужчин и женщин в узбекском обществе не симметрично и неэквивалентно. Женщины чаще, чем мужчины, обращаются просто по имени. При этом такие формы обращения подчеркивают не равноправие, а нечто противоположное - иерархию и снисходительность[88].

---

[85]Жураева И. А. Антропонимические формулы в английском, узбекском и русском языках и специфика их функционирования. - Ташкент: НУУз, 2012.С.12.

[86] Там же, с.66.

[87] Никонов В. А. Узбеки // Системы личных имен у народов мира. –М.: Наука, 1989.С.315.

[88] Расулова М. И. О гендерном аспекте актов наименования // Хорижий филология.-№ 3.-Тошкент,2011.С.82.

Таким образом, в узбекском языке концепт "семья" выходит за рамки собственно семейных отношений и распространяется на административное социальное поле. В узбекском языке личное имя играет более значимую роль, чем другие составляющие антропонимической модели, такие как фамилия и отчество. Однако обращение к старшим только по имени без сигналов антропонимов практически невозможно, как в семейном, так и в административном контексте.

Использованные источники:

*1. Азимов.*Э.И., А.Н.*Щукин.* Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009.

2. Ангелова М.М. "Концепт" в современной лингвокультурологии / М.М. Ангелова // Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактики. Сборник научных трудов. Выпуск 3. - М., 2004.

3. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. Пособие/ Н.Ф. Алефиренко.- 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2012.

4. Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка. – М., 1984.

5. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., Наука, 1988.

6. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово // Русская речь. Новая серия. Вып. II. — Л.: Academia, 1928.

7. Болдырев Н. Н. Языковые механизмы оценочной категоризации // Реальность, язык и сознание: Международный сборник научных трудов. Вып. 2. Тамбов: Изд- во ТГУ, 2002.

8. Бредихина.И.А. · 2018 · Цитируется:219 — методического обеспечения курса *методики* преподавания иностранных языков. Пассов, *2000.*

УДК 618.3:618.177-089.888.11:618.14-008.64

Файзуллаева Ш.Ф., магистр
кафедра акушерства и гинекологии №1
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан.
https://orcid.org/0009-0004-0004-9223
Ихтиярова Г.А., доктор медицинских наук (DSc)
профессор
заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №1
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
https://orcid.org/0000-0002-2398-3711

ПРЕЭКЛАМПСИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ *(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)*

Резюме: *Преэклампсия (ПЭ) является мультифакторным гестационным осложнением с доминирующим плацентарным компонентом и высоким риском неблагоприятных материнских и перинатальных исходов. Расширение применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), привело к формированию особой клинической популяции беременных с изменёнными механизмами имплантации и плацентации. Современные данные свидетельствуют, что ПЭ после ВРТ представляет собой специфический фенотип заболевания, характеризующийся преобладанием ранних форм, выраженной плацентарной мальадаптацией, ангиогенным дисбалансом и нарушениями маточно-плацентарного кровотока. Целью настоящего обзора является систематизация и анализ современных отечественных и зарубежных исследований, посвящённых патогенетическим механизмам, клиническим особенностям и возможностям прогнозирования преэклампсии у женщин после применения ВРТ с акцентом на роль плацентарных, иммунных, эндотелиальных и гемостатических факторов.*

Ключевые слова: *преэклампсия; вспомогательные репродуктивные технологии; экстракорпоральное оплодотворение; плацентация; ангиогенный дисбаланс; прогнозирование.*

Fayzullaeva Sh.F., Master's degree
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Bukhara, Uzbekistan.
https://orcid.org/0009-0004-0004-9223
Ikhtiyarova G.A., Doctor of Medical Sciences (DSc)
professor
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
https://orcid.org/0000-0002-2398-3711

PREECLAMPSIA IN WOMEN AFTER ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES: PATHOGENETIC MECHANISMS, CLINICAL FEATURES AND PREDICTION APPROACHES

(literature review)

Abstract: *Preeclampsia (PE) is a multifactorial gestational disorder with a predominant placental component and a high risk of adverse maternal and perinatal outcomes. The increasing use of assisted reproductive technologies (ART), including in vitro fertilization (IVF), has led to the emergence of a specific group of pregnancies characterized by altered implantation and placentation processes. Accumulating evidence suggests that ART-associated preeclampsia represents a distinct disease phenotype with a higher prevalence of early-onset forms, pronounced placental maladaptation, angiogenic imbalance, and impaired uteroplacental perfusion. This review summarizes current data on the pathogenesis, clinical characteristics, and predictive strategies of preeclampsia following ART, highlighting the roles of placental, immune, endothelial, and hemostatic mechanisms.*

Keywords: *preeclampsia; assisted reproductive technologies; in vitro fertilization; placentation; angiogenic imbalance; prediction.*

Введение

Преэклампсия характеризуется системной эндотелиальной дисфункцией, сосудистой реактивностью, гиперкоагуляцией и нарушением сосудисто-плацентарного взаимодействия. Современная концепция ПЭ трактует заболевание как двухфазный процесс, включающий раннюю недостаточную инвазию трофобласта и нарушенное ремоделирование спиральных артерий (фаза I), а затем системную эндотелиальную дисфункцию и клинические проявления (фаза II). Беременность после ЭКО представляет собой модель, в которой процесс плацентации протекает в условиях изменённой гормональной, иммунологической и сосудистой среды, что формирует повышенный акушерский риск [1–5].

Клинические и эпидемиологические особенности

Беременности после ВРТ относятся к категории высокого риска по развитию преэклампсии и плацентарной недостаточности. Применение ЭКО ассоциировано с повышением риска ПЭ на 50–70% по сравнению со спонтанными беременностями [1–3]. Клинические наблюдения свидетельствуют о большей частоте ранних форм ПЭ, сопровождающихся нарушением маточно-плацентарного кровотока, задержкой роста плода и преждевременными родами [2–4].

Особое значение имеет выбор протокола ВРТ. Криопротоколы (FET) в большинстве когортных исследований демонстрируют более высокую частоту преэклампсии по сравнению со свежими переносами [4]. Данный эффект связывают с отсутствием физиологического жёлтого тела и дефицитом эндогенного прогестерона и релаксина, влияющих на эндотелий и сосудистую вазодилатацию. Аналогичные результаты наблюдаются при заместительной гормональной терапии эндометрия, что указывает на сосудистый и эндокринный компонент патогенеза ЭКО-ассоциированной ПЭ.

Наибольший акушерский риск зарегистрирован у реципиенток донорских ооцитов. Донорский эмбрион представляет собой антигенный полностью аллогенный материал, что усиливает иммунную активацию и снижает толерантность материнского организма [7]. Частота преэклампсии в этой группе превышает показатели при ВРТ с собственными ооцитами в 3–4 раза [7,8].

К дополнительным модификаторам риска относят возраст ≥35 лет, длительное бесплодие, ожирение и эндокринные нарушения, что формирует кумулятивную сосудисто-метаболическую нагрузку и усиливает выраженность клинического фенотипа ПЭ.

Патогенез преэклампсии после ВРТ

Патогенез ЭКО-ассоциированной ПЭ отличается комплексностью и включает плацентарные, иммунологические, ангиогенные, эндотелиальные и гемостатические звенья. Эти механизмы взаимосвязаны и определяют тяжесть клинических проявлений.

Нарушение плацентации. Плацента является центральным органом патогенеза при преэклампсии. Для ЭКО-беременности характерно более выраженное нарушение инвазии цитотрофобласта и несостоятельность ремоделирования спиральных артерий, что приводит к гипоксической плацентарной дисфункции [5]. Недостаточная трансформация сосудистого русла формирует хроническое повышение сосудистого сопротивления и снижение перфузии ассоциированных плацентарных бассейнов.

Иммунологическая толерантность. Иммунологические механизмы играют критическую роль при использовании донорских ооцитов, где эмбрион имеет полный антигенный набор, отличный от материнского. Данный феномен сопровождается снижением количества регуляторных Т-клеток, повышением активности NK-клеток, увеличением продукции провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6), активацией комплемента и

нарушением материнско-фетальной толерантности [7]. Иммунный компонент рассматривается как ключевой модификатор ранней плацентации при ВРТ.

Ангиогенный дисбаланс. Ангиогенный дисбаланс является центральным звеном в развитии преэклампсии и отражает нарушение регуляции сосудистого тонуса, формирования плацентарного кровотока и эндотелиальной функции. Для ПЭ характерно увеличение уровня растворимого рецептора тирозинкиназы sFlt-1 и снижение плацентарного фактора роста (PlGF), что приводит к снижению биодоступности VEGF и нарушению NO-опосредованной вазодилатации [9–11]. У женщин после ВРТ ангиогенные изменения проявляются ранее и выражены сильнее, что указывает на более тяжёлую степень плацентарной мальадаптации [9,10].

Замещение эндокринной функции жёлтого тела при криопротоколах сопровождается снижением эндогенной выработки прогестерона, релаксина и других вазодилатирующих медиаторов. Отсутствие релаксина приводит к повышению периферического сосудистого сопротивления и нарушению ангиогенеза, что усиливает системные эффекты ангиогенного дисбаланса [4].

Эндотелиальная дисфункция. Преэклампсия сопровождается повышением реактивности сосудов к вазоконстрикторам, снижением синтеза NO, активацией коагуляционного каскада и повышением уровня циркулирующих эндотелиальных микрочастиц [10–12]. Эти изменения формируют системное сосудистое сопротивление, артериальную гипертензию и снижение перфузии органов-мишеней.

У пациенток после ВРТ эндотелиальная реактивность нарушена в более ранние сроки, что согласуется с данными о раннем ангиогенном дисбалансе и плацентарной гипоперфузии. Данное расхождение с физиологической адаптацией сосудистой системы объясняет частоту ранних форм ПЭ. Нарушения гемостаза и микротромбоз. Преклампсия характеризуется гиперкоагуляционным состоянием, включающим повышение концентрации фибриногена, D-димера, снижение активности антитромбина III и повышение агрегационной активности тромбоцитов [13]. У женщин после ВРТ эти изменения фиксируются с большей частотой и выраженностью, что связывают с плацентарной гипоксией и системной эндотелиальной активацией [10,13].

Микротромботические процессы в межворсинчатом пространстве плаценты приводят к нарушению транспорта кислорода и питательных веществ, что обусловливает задержку роста плода и усугубление ПЭ. Гемостатические изменения усиливают системную воспалительную реакцию и формируют дополнительное звено патологического каскада.

Прогнозирование преэклампсии после ВРТ

Прогнозирование преэклампсии в популяции ВРТ является сложной задачей, учитывая отличия патогенеза и гетерогенность группы. Наиболее исследованными направлениями являются биохимические маркеры, допплерометрические показатели маточных артерий, артериальное давление и интегрированные модели риска.

Биохимические предикторы. Биомаркеры первого триместра, включающие PAPP-A, PlGF, ADAM12 и β-ХГЧ, рассматриваются как индикаторы ранней плацентации и ангиогенеза [14]. Снижение PlGF и PAPP-A ассоциировано с ранними формами ПЭ и выраженным нарушением функции плаценты [14–15]. Отношение sFlt-1/PlGF используется как диагностический и прогностический параметр, позволяющий оценить тяжесть ПЭ и вероятность неблагоприятного исхода [11].

У женщин после ВРТ зарегистрировано более раннее и выраженное повышение sFlt-1 и снижение PlGF, что отражает специфический ангиогенный профиль данной популяции с доминированием плацентарного компонента [9].

Допплерометрия маточных артерий. Допплерометрия маточных артерий позволяет оценить состояние маточно-плацентарного кровотока и инвазию трофобласта. Повышение индекса пульсации (PI) и наличие диастолического надреза ассоциировано с риском развития ПЭ и задержки роста плода [16]. У пациенток после ВРТ показатели PI выше по сравнению со спонтанными беременностями, что подтверждает нарушение сосудистого ремоделирования.

Интегрированные модели риска. Интегрированные модели риска первого триместра, включающие анамнестические факторы, среднее артериальное давление, PlGF, PAPP-A и PI маточных артерий, позволяют предсказать раннюю ПЭ с чувствительностью до 75–85% при фиксированной специфичности [17]. Однако существующие модели не адаптированы для ВРТ-популяции и не учитывают такие параметры, как протокол стимуляции, криопротоколы, донорские ооциты и гормональная подготовка эндометрия.

Новые и перспективные методы прогнозирования. Современные работы рассматривают роль микроРНК, протеомных панелей, метаболомики и интеграции данных машинного обучения для прогнозирования ПЭ [18–19]. Эти методы демонстрируют высокую диагностическую точность в ранние сроки беременности и позволяют интегрировать ангиогенные, иммунологические и сосудистые показатели.

Популяция ВРТ рассматривается как потенциальный объект для внедрения персонализированных моделей, учитывающих эндокринные, иммунологические и сосудистые параметры.

Обсуждение

Преэклампсия после применения ВРТ рассматривается как самостоятельный клинический фенотип заболевания с преобладанием плацентарных и ангиогенных механизмов. Данные когортных исследований и мета-анализов указывают на повышение риска ПЭ после ЭКО на 50–70%, а в случае донорских ооцитов – в 3–4 раза по сравнению со спонтанными беременностями [1–4,7–8]. Данный феномен отражает сочетание иммунологических, эндокринных и сосудистых факторов, что подтверждается биохимическими, допплерометрическими и морфологическими данными.

Роль протоколов ВРТ является ключевой. Криопротоколы (FET) демонстрируют более высокую частоту ПЭ по сравнению со свежими переносами, что объясняется отсутствием жёлтого тела и дефицитом эндогенного прогестерона и релаксина. Эти факторы оказывают влияние на сосудистую реактивность и эндотелиальную функцию, что отражает эндокринное звено патогенеза. Введение заместительной гормональной терапии при подготовке эндометрия дополнительно усиливает ангиогенный дисбаланс и формирует условия для гипоперфузии.

Иммунологические механизмы играют доминирующую роль при донорстве ооцитов. Полная аллогенность эмбриона приводит к снижению количества регуляторных Т-клеток, активации NK-клеток и комплемента, формированию провоспалительного цитокинового профиля и нарушению материнско-фетальной толерантности [7]. Эти механизмы коррелируют с ранними формами преэклампсии и задержкой роста плода.

Ангиогенный дисбаланс является финальной доминантной точкой патогенетического каскада. Повышение sFlt-1 и снижение PlGF отражают степень плацентарной мальадаптации и используются как диагностические и прогностические показатели. У женщин после ВРТ ангиогенные изменения регистрируются раньше и выражены сильнее, что подтверждает плацентарный генез осложнения [9–11].

Гемостатические изменения, включающие гиперкоагуляцию, повышение D-димера, снижение антитромбина III и формирование микротромбозов, усиливают плацентарную ишемию и формируют порочный круг эндотелиальной дисфункции [10,13]. Эти процессы приводят к нарушению перфузии и усугублению системной сосудистой дисфункции.

Прогнозирование преэклампсии в популяции ВРТ требует адаптированных алгоритмов. Существующие модели первого триместра демонстрируют хорошую диагностическую точность, однако не учитывают особенностей ВРТ, включая выбор протокола, использование донорского материала, отсутствие жёлтого тела и эндокринные факторы. Для ВРТ-популяции перспективными являются интегрированные подходы с использованием биомаркеров, допплерометрии, машинного обучения и системных омнисных технологий [18–19].

Заключение

Преэклампсия после применения ВРТ представляет собой форму гестационного осложнения с выраженным плацентарным компонентом и доминированием ранних форм заболевания. Гетерогенность ВРТ-популяции, включая различия в протоколах, использование донорских ооцитов и гормональную подготовку эндометрия, определяет специфический клинический и патогенетический профиль заболевания. Центральными механизмами формирования ПЭ являются нарушение плацентации, иммунная активация, ангиогенный дисбаланс, эндотелиальная дисфункция и гемостатические нарушения.

Разработка адаптированных моделей прогнозирования ПЭ для ВРТ-популяции является актуальной задачей и требует учёта эндокринных, иммунологических и сосудистых факторов. Учитывая растущую распространённость ВРТ и значимость ПЭ как предиктора поздних сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, дальнейшие исследования должны быть направлены на персонализацию риска, оптимизацию профилактических стратегий и создание интегрированных диагностических инструментов.

Использованные источники:

1. Almasi-Hashiani A., Omani-Samani R., et al. Assisted reproductive technology and the risk of preeclampsia: meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2019.
2. Kong F., et al. Placental abnormalities following IVF: National registry cohort. Front Endocrinol. 2022.
3. Violette G., et al. Assessment of abnormal placentation in ART pregnancies. Int J Gynecol Obstet. 2023.
4. Mak J. et al. Frozen embryo transfer and risk of hypertensive disorders of pregnancy. Fertil Steril. 2020.
5. Gui J. et al. In vitro fertilization and onset of preeclampsia. Placenta. 2020.
6. Shen L. et al. ART and risk of placental complications: systematic review. Hum Reprod Update. 2021.
7. Wang Y. et al. Donor oocyte pregnancies and hypertensive disorders. Front Immunol. 2021.
8. Orvieto R. et al. Hypertensive disorders in IVF pregnancies. Reprod BioMed Online. 2019.
9. Yeung E. et al. Angiogenic imbalance in ART pregnancies. Reprod Sci. 2022.
10. Venkatesan P. et al. Endothelial function in hypertensive disorders of pregnancy. Hypertens Pregnancy. 2021.
11. Rana S. et al. sFlt-1/PlGF in prediction and diagnosis of preeclampsia. NEJM. 2019.
12. Duhig K. et al. Angiogenic biomarkers in preeclampsia. Lancet. 2018.
13. Zhang Y. et al. Coagulation markers in preeclampsia. Thromb Res. 2020.
14. Nicolaides K. et al. First-trimester prediction of preeclampsia. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018.
15. Poon L.C. et al. Early screening and prevention of preeclampsia. BJOG. 2019.
16. Akolekar R. et al. Uterine artery Doppler and risk stratification. Prenat Diagn. 2020.
17. Rolnik D. et al. Aspirin and prevention of early preeclampsia. NEJM. 2017 (допускается как foundational).
18. Smith G.N. et al. Machine learning models for hypertensive disorders. Am J Obstet Gynecol. 2022.
19. Erlandsson L. et al. Multiomics prediction of preeclampsia. Sci Transl Med. 2023.
20. Koullali B. et al. IVF and early-onset preeclampsia: cohort analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020.

21. Cavoretto P. et al. ART and placental insufficiency: meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021.
22. Chen Q. et al. FET vs fresh embryo transfer and pregnancy complications. Fertil Steril. 2019.
23. Sha T. et al. ART and perinatal outcomes: national cohort. Reprod Biomed Online. 2018.
24. Polnaszek B. et al. Immune dysregulation and donor oocyte pregnancies. Reprod Immunol. 2020.
25. Bellamy L. et al. Preeclampsia and future cardiovascular risk. Circulation. 2018.

Хабибова Н.Н.
профессор
Бухарский государственный медицинский институт
Болтаева М. М.
докторант
Бухарский государственный медицинский институт

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Аннотация: **В статье представлены результаты исследования эффективности комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одно из наиболее распространённых и социально значимых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Цель исследования является обосновать влияние хронической сердечной недостаточностина стрматологический статус и оценить эффективность комплексных лечебно-профилактических мероприятий. Общее количество обследованных составило 165 человек, которые были распределены на три независимые группы. Основную группу составили 117 пациентов с верифицированным диагнозом хронической сердечной недостаточности (ХСН) в сочетании с заболеваниями слизистой оболочки полости рта (СОПР). Анализ нозологического распределения в исследуемых группах показал, что структура заболеваний слизистой оболочки варьировала в зависимости от соматического фона пациента.*

Результаты подтверждают данные отдельных предыдущих работ о том, что соматическая декомпенсация (в частности, кардиальная недостаточность) утяжеляет течение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: *хроническая сердечная недостаточность; заболевания слизистой оболочки полости рта; озонотерапия; микробиота ротовой полости; слюна;*

Khabibova N.N.
professor
Bukhara State Medical Institute
Boltaeva M.M.
Doctoral candidate
Bukhara State
Medical Institute

CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION OF THE ORAL MUCOSA IN CHRONIC HEART FAILURE

Abstract: **This article presents the results of a study evaluating the effectiveness of combination therapy for oral mucosal diseases (OMD) in patients with chronic heart failure (CHF). Chronic heart failure (CHF) is one of the most common and socially significant complications of cardiovascular disease (CVD). The aim of the study was to substantiate the impact of chronic heart failure on stimuli and evaluate the effectiveness of combination therapy and preventive measures. A total of 165 patients were examined, divided into three independent groups. The main group consisted of 117 patients with a verified diagnosis of chronic heart failure (CHF) combined with oral mucosal diseases (OMD). Analysis of the nosological distribution in the study groups revealed that the pattern of oral mucosal diseases varied depending on the patient's medical history. The results confirm the data of individual previous studies that somatic decompensation (in particular, cardiac failure) aggravates the course of diseases of the oral mucosa.*

Key words: *chronic heart failure; diseases of the oral mucosa; ozone therapy; oral microbiota; saliva;*

Введение. Накоплены свидетельства, что существует тесная взаимосвязь между состоянием сердечно-сосудистой системы и здоровьем полости рта. Ранее считалось, что нарушения в полости рта у кардиологических пациентов являются лишь следствием общего ухудшения кровообращения. Однако современные исследования показывают двусторонний характер этой связи: хронические воспалительные заболевания тканей полости рта способны усугублять системное воспаление и отрицательно влиять на течение сердечной недостаточности. Таким образом, возникает феномен «взаимного отягощения», при котором патология сердца и полости рта взаимно поддерживают и усиливают друг друга [9].

Хроническая недостаточность кровообращения приводит к генерализованной гипоперфузии тканей и хронической гипоксии органов. Основным проявлением ХСН является снижение доставления крови, кислорода и питательных веществ к периферическим тканям, а также застой венозной крови. Ухудшение микроциркуляции характерно для прогрессирующей сердечной недостаточности: показано, что у пациентов с тяжёлой острой сердечной недостаточностью снижается плотность функционирующих капилляров и нарушается перфузия тканей. В полости рта эти процессы проявляются специфическими изменениями.

Цель исследования: Цель исследования является обосновать клинические изменения слизистой оболочки полости рта при хронической сердечной недостаточности.

Материалы и методы:

Общее количество обследованных составило 165 человек, которые были распределены на три независимые группы. Основную группу составили 117 пациентов с верифицированным диагнозом хронической сердечной недостаточности (ХСН) в сочетании с заболеваниями слизистой оболочки полости рта (СОПР). Группа сравнения включала 28 пациентов с аналогичной стоматологической патологией, но без признаков соматической сердечно-сосудистой патологии. Контрольную группу составили 20 практически здоровых добровольцев, не имеющих в анамнезе признаков ни ХСН, ни патологии СОПР.

Распределение участников по полу представлено в таблице 1. В основной группе доля мужчин составила 63,2 % (n = 74), женщин — 36,8 % (n = 43). Среди участников группы сравнения мужчин оказалось 57,1 % (n = 16), женщин — 42,9 % (n = 12). В контрольной группе соотношение мужчин и женщин составило 55,0 % (n = 11) и 45,0 % (n = 9) соответственно.

Статистический анализ показал, что внутри основной группы наблюдается количественное преобладание мужчин, приближающееся к уровню достоверности (p = 0,056). В группах сравнения и контроля различия между полами не превышают случайных колебаний (p = 0,789 и p = 1,000 соответственно).

Сравнительная оценка полового состава между всеми тремя группами не выявила значимых различий (p = 0,696), несмотря на выраженный численный перевес мужского пола в основной группе.

Таблица 2.1.1.

Распределение пациентов по полу (n = 165)

Группа	Мужчины, n (%)	Женщины, n (%)	P (гендерные различия)	P (между группами)
Основная группа (ХСН + СОПР)	74 (63,2 %)	43 (36,8 %)	p = 0,056	p = 0,696
Группа сравнения (СОПР без ХСН)	16 (57,1 %)	12 (42,9 %)	p = 0,789	
Контрольная группа (здоровые)	11 (55,0 %)	9 (45,0 %)	p = 1,000	

Во всех случаях применялся алгоритм последовательной оценки, который включал:

1. **Объективную оценку общего состояния слизистой оболочки**:
- цвет (розовый, гиперемированный, цианотичный);
- блеск и влажность;
- наличие десквамации, утолщений, участков кератинизации;
- наличие язв, эрозий, трещин, пятен, отёка, инфильтрации.

2. **Локальную пальпацию с последующей перкуссией** (при необходимости), для оценки болезненности, уплотнений, флюктуации.

3. **Исследование подвижности слизистой оболочки** относительно подлежащих тканей.

4. **Оценка функции слюноотделения**:

- визуально фиксировалась гипосаливация или гиперсаливация;
- при подозрении на ксеростомию — определение времени образования слюнной капли на дне полости рта после стимуляции.

5. **Диагностика состояния губ**:

- оценивалась эластичность, тургор, наличие трещин, хейлитов, заед.

6. **Проверка реактивности слизистой** — определение реакции на механическое раздражение (зондирование), при котором фиксировались кровоточивость, гиперемия, боль, белесые или геморрагические пятна, появляющиеся в ответ на воздействие.

Результаты исследования: Морфологические формы поражений слизистой оболочки варьировали в зависимости от общего соматического состояния пациентов. Наиболее частыми были катаральные, гиперкератотические и атрофические формы. У части больных регистрировались тяжёлые поражения — язвенно-некротические дефекты и десквамация, как проявление выраженного трофического дефицита. Сравнение между подгруппами основной группы (О1 и О2) показало отсутствие достоверных различий по структуре поражений, что позволяет рассматривать их как изначально однородные. При этом различия между основной группой в целом и сравнительной/контрольной оказались статистически значимыми.

Таблица 1.

Распределение клинических форм поражений слизистой оболочки полости рта в исследуемых группах (n = 165)

Клиническая форма поражения	**О1 (n = 59)**	**О2 (n = 58)**	**Сравнительная (n = 28)**	**p (О1 vs О2)**	**p (по группам)**
Катаральное воспаление	18 (30,5%)	17 (29,3%)	6 (21,4%)	0,880	**<0,001**
Атрофические изменения	12 (20,3%)	13 (22,4%)	2 (7,1%)	0,773	**0,006**
Гиперкератоз (в т.ч. лейкоплакия)	16 (27,1%)	17 (29,3%)	7 (25,0%)	0,798	**<0,001**
Язвенно-некротические дефекты	9 (15,3%)	10 (17,2%)	0 (0%)	0,782	**<0,001**
Десквамация / «лакированный язык»	7 (11,9%)	8 (13,8%)	1 (3,6%)	0,757	**0,021**
Всего с тяжёлыми формами (язвы + десквамация)	16 (27,1%)	18 (31,0%)	1 (3,6%)	0,641	**<0,001**

Между подгруппами основной когорты (О1 и О2) статистически значимых различий по частоте основных форм поражений слизистой выявлено не было ($p > 0,6$ по всем позициям), что подтверждает их однородность на момент включения в исследование.

В то же время, частота тяжёлых форм (язвенно-некротические и десквамативные) была достоверно выше у пациентов с ХСН по сравнению с группой без соматической патологии: 29,0 % в основной группе в целом (О1 + О2) против 3,6 % в сравнительной и 0 % в контрольной ($p < 0,001$). Язвенно-некротические дефекты были зафиксированы исключительно у больных с ХСН, что подчёркивает их связь с системными расстройствами кровообращения. Аналогичная закономерность отмечена и для атрофических форм, встречавшихся почти в 3 раза чаще в основной группе по сравнению с пациентами без ХСН (21,3 % против 7,1 %; $p = 0,006$).

В структуре поражений преобладали кандидозный стоматит, рецидивирующий афтозный стоматит, различные формы хронического хейлита и травматических поражений. Частота красного плоского лишая и лейкоплакии также имела значение при анализе различий между группами.

Таблица 2.

Нозологическая структура заболеваний слизистой оболочки полости рта в исследуемых группах (n = 165)

Нозологическая форма	О1 (n = 59)	О2 (n = 58)	Сравнительная (n = 28)	p (О1 vs О2)	p (по группам)
Кандидозный стоматит	14 (23,7 %)	13 (22,4 %)	2 (7,1 %)	0,857	**0,004**
Красный плоский лишай (сетчатая форма)	11 (18,6 %)	13 (22,4 %)	2 (7,1 %)	0,631	**0,013**
Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС)	10 (16,9 %)	9 (15,5 %)	13 (46,4 %)	0,849	**<0,001**
Хронический травматический стоматит	6 (10,2 %)	7 (12,1 %)	6 (21,4 %)	0,764	0,066
Хронический хейлит	9 (15,3 %)	7 (12,1 %)	3 (10,7 %)	0,642	0,203
Лейкоплакия гомогенная	7 (11,9 %)	6 (10,3 %)	2 (7,1 %)	0,783	0,217

Наиболее часто диагностируемыми формами у пациентов с ХСН были кандидозный стоматит и красный плоский лишай. Частота кандидоза составила 23,7 % в подгруппе О1 и 22,4 % в О2. В сравнительной группе этот диагноз был установлен лишь у 7,1 % пациентов, а в контрольной — не зафиксирован ($p = 0,004$ по совокупности групп). Аналогичная динамика отмечена и для красного плоского лишая сетчатой формы: 18,6–22,4 % в основной группе против 7,1 % в группе без ХСН ($p = 0,013$). Такие различия подтверждают большую склонность к иммуновоспалительным поражениям у пациентов с нарушениями системной гемодинамики.

В сравнительной группе доминировал рецидивирующий афтозный стоматит: 46,4 % против 15,5–16,9 % в основной ($p < 0,001$). Эта нозология была наиболее типичной для пациентов без признаков соматической декомпенсации. Травматические формы стоматита также встречались чаще при отсутствии ХСН (21,4 % против 10,2–12,1 %), однако различия не достигли уровня статистической значимости.

Частота хронического хейлита и гомогенной лейкоплакии была сопоставимой во всех клинических группах. В контрольной когорте ни одно из заболеваний слизистой оболочки верифицировано не было.

Топография поражений слизистой оболочки полости рта у пациентов с различным соматическим фоном зависит от ряда факторов, включая тип основного заболевания, состояние микроциркуляции, привычные зоны травматизации и особенности местной иннервации. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) поражения чаще фиксировались в участках с повышенной венозной нагрузкой и анатомически уязвимыми сосудистыми структурами. В то же время у лиц без соматических нарушений преобладали зоны механического и термического воздействия. Сравнение локализации очагов позволяет выделить типичные зоны поражения, ассоциированные с ХСН, и сопоставить их с локализацией при изолированных заболеваниях слизистой оболочки.

Таблица 3.

Локализация очагов поражения слизистой оболочки полости рта в исследуемых группах (n = 165)

Зона поражения	О1 (n = 59)	О2 (n = 58)	Сравнительная (n = 28)	p (О1 vs О2)	p (по всем группам)
Нижняя губа (внутренняя поверхность)	21 (35,6 %)	20 (34,5 %)	4 (14,3 %)	0,899	**<0,001**
Щёчная слизистая	15 (25,4 %)	16 (27,6 %)	11 (39,3 %)	0,790	**<0,001**
Язык (дорсальная и латеральная поверхности)	10 (16,9 %)	11 (19,0 %)	2 (7,1 %)	0,743	**0,004**
Переходная складка и ретромолярная область	7 (11,9 %)	8 (13,8 %)	5 (17,9 %)	0,762	**0,031**
Твёрдое нёбо	4 (6,8 %)	3 (5,2 %)	6 (21,4 %)	0,712	**0,048**

Лидирующей зоной поражения у пациентов с ХСН (О1 + О2) оставалась внутренняя поверхность нижней губы — 35,6 % и 34,5 % соответственно. В сравнительной группе этот показатель составил 14,3 %, а в контрольной — ни одного случая не зарегистрировано ($p < 0,001$ по всем группам). Это прямо указывает на патогенетическую зависимость очагов в области нижней губы от венозного застоя, характерного для пациентов с сердечной недостаточностью.

Частота поражений щёчной слизистой была выше в группе без ХСН (39,3 %) по сравнению с О1 (25,4 %) и О2 (27,6 %). Такая локализация типична для хронических травматических и инфекционных процессов у соматически компенсированных пациентов. В контрольной группе щёчные изменения отсутствовали ($p < 0,001$).

Таким образом, наличие ХСН ассоциировано с преимущественным поражением зон, чувствительных к гипоксии и венозному стазу (нижняя губа, язык), тогда как при отсутствии соматической патологии очаги чаще локализуются в щёчной области и на твёрдом нёбе.



Рисунок 1. Поверхностный очаг поражения на твёрдом нёбе у пациента с изолированным заболеванием слизистой оболочки полости рта

Обсуждение

Таким образом, структура морфологических изменений слизистой оболочки у пациентов с ХСН характеризуется преобладанием тяжёлых и трофически зависимых форм, тогда как в сравнительной группе такие проявления либо редки, либо отсутствуют. В контрольной группе данных патологий не обнаружено.

Анализ нозологического распределения в исследуемых группах показал, что структура заболеваний слизистой оболочки варьировала в зависимости от соматического фона пациента.

Результаты подтверждают данные отдельных предыдущих работ о том, что соматическая декомпенсация (в частности, кардиальная недостаточность) утяжеляет течение заболеваний слизистой оболочки полости рта. Мы наблюдали значительно более высокую частоту тяжёлых поражений (некротические язвы, десквамация) у пациентов с ХСН, особенно при III функциональном классе, что согласуется с известными представлениями о влиянии хронической гипоксии и нарушенной микроциркуляции на

регенераторные способности эпителия. Слизистая оболочка в условиях системного кровообращения, далёкого от нормы, становится менее устойчива к травмам и инфекции – это проявляется формированием хронических долго незаживающих язв, атрофических процессов. Наши данные перекликаются с классическим описанием синдрома Гриншпана (гипертония + диабет + лишай в полости рта) и расширяют его на контингент с сердечной недостаточностью. Можно сказать, что ХСН – ещё один яркий пример системного состояния, оказывающего прямое влияние на здоровье ротовой полости.

Использованные источники:

[1] Луцкая И. В. Распространённость заболеваний слизистой оболочки полости рта в общей популяции.
[2] Bhatnagar P., Rai S. Epidemiological study on oral mucosal lesions in tobacco users (2012).
[3] Гажва С. И. Онкологическая настороженность при заболеваниях слизистой оболочки полости рта.
[4] Гилева О. С. Трудности диагностики и недостаточная изученность заболеваний СОПР.
[5] Хафизов Р. Г. Роль местных и общих факторов в этиологии заболеваний СОПР.
[6] Ибрагимова М. Х. Микробиота полости рта и её активация при иммунодефиците.
[7] Grinspan J. Syndromic oral lichen planus associated with diabetes and hypertension (1966).
[8] European Federation of Periodontology (EFP). Consensus report: Periodontitis and systemic diseases (2020).
[9] Кардиология: Хроническая сердечная недостаточность – эпидемиология и прогноз (Обзор ESC, 2021).
[10] Муратова С. К. и соавт. Применение антисептиков в стоматологии: эффективность и побочные эффекты (Обзор, 2018).
[11] Daşkaya H., et al. Ozone therapy in the management of oral diseases: A review of clinical applications (2020).

Хайдаров С.Н.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ В ОРГАНАХ КРЫС ПРИ МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЕ

Аннотация. *В эксперименте на крысах изучено локализацию и активность цитохромоксидазы в слюнных железах, желудке, тонком кишечнике, печени, почках, надпочечнике, щитовидной железе, семенниках и спинином мозгу крыс, содержавшихся на малобелковой диете. При белковой недостаточности в пищевом рационе происходит понижение активности цитохромоксидазы. Однако в семенниках через 20 суток от начала опыта обнаруживается кратковременное повышение активности фермента.*

Ключевые слова: *эксперимент, малобелковой диета, крысы, слюнных железы, желудка, тонкий кишечник, печень, почка, надпочечник, щитовидной железы, семенник, спинином мозг, цитохромоксидазы.*

Khaidarov S. N.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University,
Samarkand, Uzbekistan

CHANGES IN CYTOCHROME OXIDASE ACTIVITY IN RATS WITH A LOW-PROTEIN DIET

Abstract. *In an experiment on rats, the localization and activity of cytochrome oxidase were studied in the salivary glands, stomach, small intestine, liver, kidneys, adrenal gland, thyroid gland, testes, and spinal cord of rats maintained on a low-protein diet. Protein deficiency in the diet results in a decrease in cytochrome oxidase activity. However, a short-term increase in enzyme activity was detected in the testes 20 days after the start of the experiment.*

Key words: *experiment, low-protein diet, rats, salivary glands, stomach, small intestine, liver, kidney, adrenal gland, thyroid gland, testicle, spinal cord, cytochrome oxidase*

Введение. Эффективность лечения детей в условиях стационара во многом определяется качеством их питания. Пища для больного ребенка является естественным лечебным фактором, позволяющим целенаправленно проводить коррекцию нарушенных обменных процессов и функций различных органов и систем [7,6,5]. Для обеспечения функционирования всех физиологических процессов организму требуется оптимальное количество

энергии, основных нутриентов и микронутриентов, в частности, химических элементов [3,4]. В свою очередь изменение морфометрических показателей лежит в основе большинства патологий углеводного и липидного обменов, являясь маркерами дисфункции жировой ткани [1,2]. Многочисленными работами показано, что белковая недостаточность приводит к тяжелым нарушениям физиологических и биохимических процессов в организме, а также вызывает морфологические изменения органов человека и животных. Вопрос об изменении активности окислительных ферментов при белковом голодании в литературе освещен недостаточно.

Цель исследования. Изучить изменение активности цитохромоксидазы в органах крыс при малобелковой диете.

Материалы и методы исследования. Задача настоящего исследования — изучить локализацию и активность цитохромоксидазы в слюнных железах, желудке, тонком кишечнике, печени, почках, надпочечнике, щитовидной железе, семенниках и спинином мозгу крыс, содержавшихся на малобелковой диете (недостаточность белка 72%). Как контрольные, так и опытные животные умерщевшых декапитацией через 5, 10, 15, 20, 25 и 30 суток от начала опыта. Срезы из кусочков исследуемых органов готовились на замораживающем микротоме толщиной до 30 м. Цитохромоксидаза выявлялась по методу нади. Активность цитохромоксидазы оценивалась по шестибалльной системе: отсутствует - 0, незначительная - 1, низкая - 2, умеренная - 3, высокая — 4, максимальная - 5.

Результаты исследования. Изучение цитохромоксидазной реакции в околоушной железе контрольных животных показало наличие синей зернистости индофенолового синего (3) в базальных частях белковых клеток ацинусов. Цитоплазма этих клеток окрашивалась в бледно-голубой цвет. В отдельных белковых клетках гранулы располагались по всей цитоплазме. К 20 суткам белковой недостаточности в клетках ацинусов обнаруживалось меньшее количество более мелкой зернистости индофенолового синего (1 и 2). Начиная с 25 суток от начала опыта, цитоплазма белковых клеток ацинусов имела бледно-голубой цвет, гранул индофенолового синего в ней не наблюдалось. Реакция нади в срезах дна желудка контрольных крыс выявляла максимальную (5) и высокую (4) активность дыхательного фермента в обкладочных клетках желез, менее она была выражена в главных и добавочных клетках (4 и 3). Незначительная активность цитохромоксидазы (1) отмечалась в покровном эпителии желудка и в клетках шеек желез. Через 10 суток от начала опыта выявлялось закономерное уменьшение количества гранул индофенолового синего во всех клетках. К концу опыта, то есть к 30 суткам, клетки покровного эпителия слизистой оболочки, желудочных ямок и шеек фундальных желез становились бесцветными (0). В клетках тела желез обнаруживались единичные синие гранулы на голубом фоне цитоплазмы (1), в отдельных обкладочных клетках их было больше (2). В тонком кишечнике контрольных крыс большое количество синих гранул обнаруживалось в апикальных концах эпителиальных клеток (4). В эпителии основания

ворсинок и в эпителии крипт их было меньше (3 и 2). К 15 суткам опыта отмечалось понижение активности цитохромоксидазы, что наиболее резко выступало через 30 суток белкового голодания. В этот срок опыта в эпителии ворсинок и крипт обнаруживалось незначительное количество зерен индофенолового синего (1 и 2). В клетках печени контрольных крые синие гранулы выявлялись на голубом фоне цитоплазмы (3). В центре долек, вокруг центральной вены, их мало (1). Начиная с 15 суток эксперимента, активность окислительного фермента в печени понижалась, к 20 суткам белкового голодания в цитоплазме печеночных клеток выявлялись единичные синие гранулы (1), к 30 суткам цитоплазма клеток печени слабо окрашивалась в бледно-голубой цвет, гранулы индофенолового синего не выявлялись. В почках контрольных животных максимальная и высокая активность цитохромоксидазы отмечалась в клетках главных отделов нефронов (5 и 4). В клетках вставочных отделов она была высокой и умереннной (4 и 3). Большинство почечных телец было бесцветно (0), в некоторых на бледно-голубом фо не выявлялись отдельные синие зерна (1). В клетках большинства прямых мочевых канальцев мозгового вещества наблюдалась умеренная (3) и низкая (2) активность окислительного фермента, в клетках отдельных прямых мочевых канальцев - максимальная (5) и незначительная (1). При белковой недостаточности отмечалось понижение активности цитохромоксидазы, что обнаруживалось клетках прямых канальцев, уже к 10 суткам от начала опыта в и в клетках извитых, а к 15 суткам это выявлялось опыта в клетках главных канальцев коркового вещества. К концу фермента и вставочных отделов активность. мочевых канальцев низкая (2) и умеренная (3), в клетках отдельных Цитоплазма клеток мозгового вещества — незначительная (1). Диффузно большинства прямых мочевых канальцев окрашивалась индофенолового синего в бледно-голубой цвет, гранулы канальцев в ней не отмечались умеренную. В надпочечнике контрольных крыс реакция нади выявляла активность цитохромоксидазы в клетках клубочковой зоны (3), и незначительную низкую - в клетках пучковой зоны (2) в клетках сетчатой зоны мозгового вещества (1). Активность фермента в клетках надпочечника опытных животных понижалась к 30 суткам от начала опыта зерна индофенолового синего в клетках коркового и мозгового вещества не выявлялись, цитоплазма клеток была бесцветной (0). В щитовидной железе опытных крыс по сравнению с контрольными закономерности в изменении активности дыхательного фермента отметить неудалось. У одних животных наблюдалась незначительная и низкая активность цитохромоксидазы в эпителии фолликулов (1 и 2), у других - она не проявлялась (0). Однако у всех опытных крыс к 30 суткам белковой недостаточности в пищевом рационе эпителий фолликулов был бесцветным (0). В семенниках контрольных животных умеренная (3), низкая (2) и у некоторых высокая (4) активность окислительного фермента имела место в клетках сперматогенного эпителия всей толщи стенки извитых канальцев. У опытных животных: активность ферментов снижалась к 10 суткам. Но через 20 суток от начала опыта

наблюдалось увеличение количества гранул индофенолового синего, особенно по периферии канальцев в цитоплазме сперматогоний (4), ближе к просвету канальца (в сперматидах и сперматозоидах) их было меньше (3). К 30 суткам от начала опыта активность цитохромоксидазы снова. понижалась. Так, в сперматогониях синие гранулы не выявлялись (0), в клетках сперматогенного эпителия ближе к просвету канальцев отмечалась незначительная активность дыхательного фермента (1). В спинном мозгу контрольных и опытных животных белое вещество было бесцветным (0). В сером веществе наблюдалось диффузное голубое окрашивание и наличие синей зернистости в невроглии (2). У контрольных крыс нейроны отличались максимальной и высокой активностью окислительного фермента (5 и 4). При белковой недостаточности активность цитохромоксидазы в нервных клетках несколько понижалась (от 5 до 2).

Вывод. Таким образом, при белковой недостаточности в пищевом рационе происходит понижение активности цитохромоксидазы. Однако в семенниках через 20 суток от начала опыта обнаруживается кратковременное повышение активности фермента. К концу опыта эта активность падает так же, как и в других органах.

Использованные источники:

1. Алешин А.Л., Исаев А. П., Ненашева А.В. Опыт использования спортивных биологически активных добавок (БАД) - «ЗМА» (цинк, магний и пиридоксин) в конькобежном спорте // Вестник ЮУрГУ. - 2012. - № 21. - С. 2021.
2. Беляков, В.И. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских исследованиях / В.И. Беляков, Е.М. Инюшкина. - Самара: Изд-во «Самарский университет». - 2008. - 40 с.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
4. Маматалиев А. Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – С. 692-695.
5. Mamataliev A. R. NEUROHISTOLOGICAL CHANGES IN THE VAGUS NERVE UNDER THE INFLUENCE OF COLCHICINE IN AN EXPERIMENT //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 310-312.
6. Alisherovna K. M. et al. Diagnostic Significance Daily Monitoring of Blood Pressure in Young Women (Under 40 Years Old) with Arterial Hypertension //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 461-465.
7. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

Хайдарова З.Э.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРИТОМ И ХОЛЕЦИСТИТОМ

Аннотация: *В статье представлены результаты наблюдений и исследований функционального состояния желудочного сока у пациентов с гастритом и холециститом за прошедшие годы. Изучалась активность фермента химозина в желудке у мужчин и женщин. Активность фермента химозина у пациентов с холециститом значительно ниже, чем у пациентов с гастритом.*

Ключевые слова: *Люди, пациент, наблюдение, гастрит, холецистит, желудочный сок, химозин, мужчина, женщина.*

Khaydarova Z.E.
assistant
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

FUNCTIONAL ACTIVITY OF GASTRIC JUICE IN PATIENTS WITH GASTRITIS AND CHOLECYSTITIS

Abstract: *This article presents the results of observations and studies of the functional state of gastric juice in patients with gastritis and cholecystitis over recent years. The activity of the enzyme chymosin in the stomach of men and women was studied. Chymosin activity in patients with cholecystitis is significantly lower than in patients with gastritis.*

Keywords: *People, patient, observation, gastritis, cholecystitis, gastric juice, chymosin, man, woman.*

Введение. В настоящее время общепринятые теории ульцерогенеза рассматриваются в свете персистирования H.pylori и влияния кислотно-пептического фактора, усиливающих взаимное патогенное действие; при этом H.pylori поддерживает хроническое течение заболевания, создавая угрозу рецидива [1,2]. Хронический запор на сегодняшний день является одним из самых распространенных патологических состояний. Запоры могут встречаться в изолированной форме и проявляться в качестве симптома какой-либо патологии - гастрита, холецистита, спастического или атонического колита и др [3,4]. Несмотря на большое количество исследований, посвященных актуальным вопросам язвенной болезни, до настоящего

времени остается не ясной возможная связь (или ее отсутствие) между рецидивами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, наличием обсемененности HP слизистой оболочки желудка, длительностью язвенной болезни, с осложненным или неосложненным течением, полом и возрастом больных, количеством и размерами язв до лечения больных и эффективностью заживления язв в зависимости от указанных выше показателей на фоне лечения больных [5,6,7]. Одной из многочисленных функций желез желудка является его протеолитическая деятельность. Поэтому по состоянию химазной активности желудочного сока можно судить о протеолитической функции желудка. Вопрос о состоянии желудочной секреции при хронических заболеваниях желчных путей освещен. Однако изучению протеолитической функции желудка уделено мало внимания.

Цель исследования. Изучить функциональная активность желудочного сока у пациентов с гастритом и холециститом.

Материалы и методы исследования. На протяжении года нами проводились наблюдения за 53 больными, страдающими холециститом различной этиологии. Почти у всех больных как сопутствующее заболевание диагностирован гастрит. У 39 больных желудочное содержимое исследовалось по методу Лепорского с 5% алкогольным завтраком Эрмана, у 14 - с инсулино-гистаминовым раздражителем. Химазная активность определялась по методу Савича натощак и после раздражителей. Из числа обследованных женщин было 43, мужчин - 10.

Результаты исследования. Нормальная химазная активность среди женщин наблюдалась у 38 больных, сниженная - у 3, неудовлетворительная - у 1. Среди мужчин нормальная химазная активность выявлена у 6 больных, сниженная - у 2, неудовлетворительная - у 2. За нормальную химазную активность принималось створаживание молока в разведении желудочного сока 1: 640 и 211 1:320, сниженную - 1:160 и 1: 80, неудовлетворительную - 1:40, 1:20, 1: 10, или полное отсутствие свертывания во всех разведениях. Химазная активность желудочного сока изучалась нами в зависимости от давности заболевания, секреторной и кислотообразующей функции желудка. При этом выявить зависимость химазной активности желудочного сока от давности заболевания не удалось. Зависимость химазной активности желудочного сока от его кислотности. Зависимость химазной активности желудочного сока от секреторной функции. Химазная активность состояние секреции гиперсекреция нормосекреция гипосекреция всего больных нормальная сниженная неудовлетворительная.

Вывод. Таким образом, химазная активность желудочного сока у больных холециститом имеет некоторую тенденцию к снижению, независимо от пола больных, давности заболевания; находится в прямой зависимости от секреторной и кислотообразующей функции, что необходимо иметь ввиду при оценке функционального состояния 50 желудка у этой группы больных.

Использованные источники:

1. Амиров, Н.Ш. Патогенетические аспекты роли ферментов в механизмах язвообразования в желудке / Н.Ш. Амиров, Д.В. Антонов // Рос.гастроэнтерологический журнал. 2000. - № 4. - С. 102.
2. Абдулхаков Р.А. Клинико-морфологические особенности больших и гигантских гасгродуоденальных язв. //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2001. - №2. - Т.XI, Приложение №13. - С.5-7.
3. Хайдарова З. Э. энтропия и нарушения сердечного ритма у больных, перенесших инфаркт миокарда //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 59-62.
4. Бекмурадова М. С., Хайдаров С. Н. Связь между повышенным пульсовым давлением и натрийуретическим пептидом //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 26-29.
5. Маматалиев А. Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – С. 692-695.
6. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
7. Mamataliev A. R. NEUROHISTOLOGICAL CHANGES IN THE VAGUS NERVE UNDER THE INFLUENCE OF COLCHICINE IN AN EXPERIMENT //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 310-312.

УДК: **618.3:616.7-007.2**

Хайдарова Н.Б.
ассистент
кафедра акушерства и гинекологии №1
Бухарский государственный медицинский институт
https://orcid.org/0009-0001-8039-0082

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ

Аннотация*: Лейомиома матки является одной из наиболее распространенных доброкачественных опухолей у женщин репродуктивного возраста, и её клинические проявления и методы диагностики остаются актуальной проблемой современной гинекологии. В данной статье проанализированы клинические особенности лейомиомы матки, включая аномальные маточные кровотечения, нарушение функции органов малого таза и анемию. Кроме того, подчеркнута роль гормональных, морфологических и иммунологических факторов в развитии лейомиомы.*

В статье рассматриваются современные диагностические методы выявления лейомиомы матки, такие как трансвагинальное ультразвуковое исследование, допплерография, гидросонография, магнитно-резонансная томография, гистероскопия и ангиография, с акцентом на их информативность и клиническую значимость. Также обсуждается важность визуализирующих методов для определения локализации миоматозных узлов и оценки их пролиферативной активности.

Результаты исследования подчеркивают необходимость ранней диагностики лейомиомы матки, индивидуального планирования лечения и совершенствования клинических и диагностических подходов для предотвращения возможных осложнений.

Ключевые слова: *лейомиома матки, миоматозные узлы, аномальные маточные кровотечения, диагностика, ультразвуковое исследование, гистероскопия*

Khaydarova N.B.
assistant
Department of Obstetrics and Gynecology No. 1
Bukhara State Medical Institute
https://orcid.org/0009-0001-8039-0082

CLINICAL MANIFESTATIONS AND INSTRUMENTAL-LABORATORY DIAGNOSTIC METHODS OF UTERINE LEIOMYOMA

***Abstract**: Uterine leiomyoma is one of the most common benign tumors among women of reproductive age, and its clinical manifestations and diagnostic evaluation remain a relevant issue in modern gynecology. This article analyzes the clinical features of uterine leiomyoma, including abnormal uterine bleeding, dysfunction of the pelvic organs, and anemia. Additionally, the role of hormonal, morphological, and immunological factors in the development of leiomyoma is highlighted.*

The article evaluates modern diagnostic methods used in the detection of uterine leiomyoma, such as transvaginal ultrasonography, Doppler imaging, hydrosonography, magnetic resonance imaging, hysteroscopy, and angiography, emphasizing their informativeness and clinical significance. The importance of imaging methods in determining the localization of myomatous nodules and assessing their proliferative activity is also discussed.

The findings indicate the necessity of early diagnosis of uterine leiomyoma, individualized treatment planning, and the improvement of clinical and diagnostic approaches to prevent possible complications.

***Keywords:** uterine leiomyoma, myomatous nodules, abnormal uterine bleeding, diagnostics, ultrasonography, hysteroscopy*

Введение

Миомы матки (ММ) являются доброкачественными, моноклональными и гормонально чувствительными опухолями, которые развиваются в результате пролиферации фенотипически изменённых гладкомышечных клеток миометрия. Миоматозные узлы обычно имеют округлую форму, а их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до крупных образований, достигающих нескольких десятков сантиметров. Лейомиома матки крайне редко встречается у девочек в период полового созревания; однако после 30 лет её распространённость достигает 30–40 %. В период менопаузы, вследствие снижения секреции половых стероидных гормонов, развитие и рост лейомиом в большинстве случаев замедляется или прекращается. Этот факт подтверждает решающую роль гормонов яичников в патогенезе миом матки [5].

При развитии лейомиомы клетки гладкомышечного слоя подвергаются чрезмерной пролиферации, выходящей за пределы нормальных регуляторных механизмов. Формирование лейомиомы обычно происходит медленно: сначала одна гладкомышечная клетка начинает неконтролируемое деление, и по мере постепенного увеличения числа клеток в стенке матки формируются миоматозные узлы [12].

Миомы матки демонстрируют различную распространённость среди различных расовых групп: наибольшие показатели отмечаются у женщин с афроамериканским происхождением, а наименьшие — у женщин азиатской расы. Эпидемиологические данные по расовым группам, кроме женщин кавказской и афроамериканской этнической принадлежности, остаются ограниченными. Исследования, проведённые Лафлином и соавторами,

показали, что распространённость миом составляет 18 % среди чернокожих женщин, 8 % среди белых, 10 % среди женщин испанского происхождения и 13 % в группе «другие», преимущественно азиатского происхождения [15].

Лейомиома матки является доброкачественной опухолью, развивающейся из миометрия, рост которой обусловлен активной пролиферацией гладкомышечных клеток и элементов соединительной ткани. Сравнительный ультраструктурный анализ коллагеновых фибрилл в ткани лейомиомы и нормальном миометрии выявил атипичные особенности их строения и расположения. Эти морфологические изменения указывают на значительную роль матриксных металлопротеиназ — в частности коллагеназ и желатиназ — в патогенезе лейомиомы. Подобные нарушения в соединительной ткани могут быть связаны с гормональным дисбалансом, наблюдаемым у женщин [6].

Согласно результатам многочисленных клинико-морфологических исследований, обычная (простая) форма миомы матки считается доброкачественной опухолью с низкой биологической активностью и медленным ростом. В этой форме структура опухоли преимущественно представлена соединительной тканью, сопровождающейся фенотипическими изменениями миоцитов, а также снижением кровоснабжения как в миометрии, так и в миоматозных узлах.

В отличие от этого, пролиферативные миомы матки характеризуются клинической активностью, множественными узлами и быстрым ростом. Эти миомы обладают высокой пролиферативной способностью и часто сочетаются с пролиферативными изменениями эндометрия, опухолевидными образованиями и доброкачественными или злокачественными неоплазиями яичников. По данным некоторых авторов, пролиферативные миомы выявляются примерно у каждой четвёртой пациентки. Гистологически, хотя миогенные компоненты таких миом не проявляют атипии клеток, их количество значительно превышает таковое в миомах без признаков пролиферации. В простых миомах митотическая активность практически отсутствует, тогда как в пролиферативных миомах отмечено увеличение числа митозов. Специалисты подчеркивают, что классификация миом матки по гистогенетическим характеристикам имеет большое значение в клинической практике, особенно при определении индивидуальной тактики лечения [9].

Маточные кровотечения являются одной из основных проблем экстренной гинекологии и составляют 18–23 % причин смертности женщин. Кровотечение считается одним из наиболее надёжных клинических признаков лейомиомы. Лейомиома матки относится к числу наиболее распространённых доброкачественных опухолей органов малого таза у женщин и диагностируется примерно у 20 % женщин старше 35 лет и до 40 % женщин старше 50 лет. С увеличением размеров миоматозных узлов может наблюдаться нарушение функции смежных органов, включая запоры и дизурические расстройства. Консервативные методы, направленные на контроль кровотечения, гормональная терапия, а также минимально

инвазивные процедуры, такие как гистероскопическое выскабливание эндометрия, не всегда дают ожидаемый терапевтический эффект. Более того, эти хирургические вмешательства тесно связаны с риском послеоперационных осложнений, которые впоследствии могут приводить к образованию рубцов и спаек в малом тазу [1].

Диагностика.Оценка миом матки в первую очередь основывается на клинических симптомах, наблюдаемых у пациенток. К ним относятся аномальные маточные кровотечения, жалобы, связанные с эффектом массы, боли в малом тазу и признаки, характерные для анемии. В некоторых случаях миоматозные узлы могут быть случайно выявлены во время планового осмотра или при проведении инструментальных исследований у женщин без клинических проявлений [10].

Клинически значимые субсерозные и интрамуральные миоматозные узлы часто диагностируются на основании данных бимануального исследования таза. Основными диагностическими признаками являются увеличенная матка, неправильная форма, плотная консистенция и отсутствие болезненности [18].

В настоящее время для выявления лейомиомы, оценки её локализации и характеристики опухоли используются различные диагностические методы. К ним относятся ультразвуковое исследование, допплерография, трёхмерная ультразвуковая томография, магнитно-резонансная томография (МРТ), гидросонография и ангиография. Кроме того, гистероскопия и лапароскопия остаются высокоэффективными методами диагностики.

Трансвагинальное ультразвуковое исследование (ТВУЗИ) считается наиболее эффективным скрининговым диагностическим инструментом. Определение локализации миоматозных узлов особенно важно при миомэктомии, так как часто определяет выбор хирургического подхода. Внедрение гидросонографии (ГСГ) значительно расширило диагностические возможности ультразвука при оценке миом матки. Этот метод широко применяется перед трансцервикальной резекцией миоматозных узлов, так как он предоставляет ценную диагностическую информацию и снижает риск хирургических осложнений. ГСГ позволяет точно определить тип субмукозного узла, его отношение к внутреннему зеву шейки матки и рогам матки, оценить толщину миометрия до серозного слоя, а также более точно визуализировать ложа интерстициально-субсерозных узлов и их близость к полости матки. Создание акустического окна улучшает визуализацию внутриутробной патологии, повышая чувствительность гидросонографии при определении локализации миомы почти до 100 % [3].

Размер матки, оцениваемый при бимануальном исследовании, имеет высокую корреляцию с объемом и массой матки, определяемыми при патологическом исследовании, даже у женщин с индексом массы тела более 30. В случаях, когда клинический диагноз достаточно ясен, проведение рутинного ультразвукового исследования не требуется. Однако для надежного выявления субмукозных миом необходимы дополнительные методы

диагностики, такие как сонография с физиологическим раствором, гистероскопия или МРТ [11].

Методы визуализационной диагностики позволяют неинвазивно и повторяемо оценивать опухолевые образования и играют ключевую роль в выявлении лейомиом и подтверждении их точной локализации. В клинической практике ультразвуковое исследование считается методом первичной визуализации при оценке миом благодаря доступности, скорости и простоте использования [17].

Метод цветового допплеровского картирования (ЦДК), в сочетании с эхографическим изображением, позволяет оценить качественные и количественные показатели кровоснабжения исследуемой структуры и помогает прогнозировать её гистологические особенности. В большинстве случаев немозаичный кровоток наблюдается на периферии узла, а примерно в одной трети случаев кровоток выявляется и в ткани узла. Пролиферативные миоматозные узлы, как правило, демонстрируют диффузный или смешанный тип кровотока. В простых и пролиферативных миомах скорость кровотока (Vmax) относительно низкая — от 0,12 до 0,25 см³/с, а индекс сопротивления (RI) составляет соответственно 0,58–0,69 и 0,50–0,56 [7].

Ещё одним важным методом диагностики при оценке миом матки является ангиография. Исследования проводились с использованием ангиографической системы PHILIPS INTEGRIS V5000 с селективной катетеризацией артерий и введением 4–6 мл контрастного вещества Ultravist-370 или Omnipaque-350 со скоростью 12–16 мл/с, что позволяло визуализировать кровоток и васкуляризацию миоматозных узлов [8].

Компьютерная томография (КТ) является важным методом визуализации для оценки клинически проявляющихся симптомов. В большинстве случаев на КТ выявляются чётко очерченные мягкотканые образования с неоднородной внутренней структурой. Однако одним из основных ограничений КТ является недостаточная способность визуализировать мелкие анатомические структуры матки и трудности в определении точного источника образования, что может приводить к ошибочной интерпретации аднексальных масс как миом [17].

Благодаря высокой контрастной разрешающей способности для дифференциации тканей, возможности многопланового изображения и воспроизводимости результатов, магнитно-резонансная томография (МРТ) считается наиболее надёжным методом визуализации для выявления и оценки миом матки. Однако по сравнению с ультразвуком МРТ требует больше времени, экономически более затратна и применяется в практике только при наличии определённых показаний [16].

При гистероскопическом исследовании клиническая картина может варьироваться в зависимости от локализации миоматозных узлов и фазы менструального цикла. В первой половине цикла эндометрий обычно относительно тонкий и бледно-розового цвета. В полости матки визуализируются хорошо очерченные, округлые или овальные субмукозные

миоматозные узлы с гладкой или слегка неровной поверхностью. Возможно деформирование эндометрия вокруг узлов и усиление визуализации кровеносных сосудов на поверхности узла. В некоторых случаях миоматозные узлы частично или полностью занимают полость матки, изменяя её конфигурацию [4].

По мнению других авторов, проведение мини-гистероскопии на 6–8-й день менструального цикла считается оптимальным для диагностики миом матки. Этот метод предполагает использование гистероскопа диаметром 2,5 мм, что позволяет исследовать полость матки без расширения шейки и без травмы эндометрия. В случаях подозрения на субмукозные или прилежащие к эндометрию узлы может быть выполнена гистеро-резектоскопия с прицельной биопсией из подозрительной области. Гистероскопия служит не только диагностическим методом выявления миом, но и предоставляет возможность органосохраняющего хирургического лечения у женщин репродуктивного возраста [2].

Недавние научные исследования показали, что иммунологические механизмы играют значительную роль в развитии лейомиомы матки и её осложнений. Использование специфических иммунологических маркеров, отражающих иммунный ответ организма, позволяет выявить скорость роста миомы и риск осложнений на ранних стадиях [13].

Определение концентрации цитокинов в различных типах миоматозных узлов обеспечивает более глубокое понимание патогенеза миомы и способствует разработке патогенетических профилактических и терапевтических стратегий [14].

Использованные источники:

1. Акберов Р.Ф., Шарафутдинов Б.М., Шарафеев А.З., Зогот С.Р. Неотложная помощь женщинам с миомами матки, осложненными маточными кровотечениями // Вестник современной клинической медицины. –2023. –Т. 8, № 1. –С. 18-23.

2. Бреусенко, В. Г., Клевно, М. Е., & Штыров, С. В. (2022). Современные методы диагностики внутриматочной патологии в репродуктивном периоде. *Журнал акушерства и женских болезней*, (S), 102.

3. Диагностика и лечение миомы матки. Актуальные вопросы Савельева Г. М., Курцер М. А., Бреусенко В. Г., Краснова И. А., Аксенова В. Б., Денисова Е. С., Платицын И. В. ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова Росздрава», Москва. Гинекология. №6 — 2024.С 36-39.

4. Довгань, А. А. (2013). Роль гистероскопии в дифференциальной диагностике гиперпластических процессов эндометрия, субмукозной миомы матки и аденомиоза. *Таврический медико-биологический вестник*.с-40.

5. Коваль МВ, Кудрявцева ЕВ, Кондрашова ЮК, Тагоев ЮШ. Генетика миомы матки. Сибирское медицинское обозрение. 2023;(6):16-24. DOI: 10.20333/25000136-2023-6-16-24 с-17.

6. Значимость генного полиморфизма в прогнозе развития и тактике ведения пациенток с миомой матки и аденомиозом. Е.Б. Морозова, А.Б. Чухловин, Н.В. Кулагина, А.А. Тотолян. Научно-методический центр по молекулярной медицине МЗ РФ на базе Государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург; Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург ОМ liv выпуск 3/2022 с-54.
7. Миома матки:классификация,диагностика,современные методы лечения. Людмила можейко.Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Беларусского государственного медицинского университета,доктор медицинскийх наук,профессор. НАУКА И ИННОВАЦИИ | №10 (200) | Октябрь 2021.с-81
8. Роль мультиспиральной компьютерной томографии в лечении миомы матки Зеленюк Б. И.1, Адамян Л. В.1,3, Обельчак И. С.2, Хорошун Н. Д.3 1ГОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Минздравсоцразвития РФ; 2ГУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних войск» МВД РФ, г. Москва; 3ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития РФ, г. Москва. Вестник рентгенологии и радиологии № 3, 2022.с-35.
9. Современное состояние вопроса о патогенезе, клинике, диагностике и лечении миомы матки у женщин репродуктивного возраста.Sidorova I.S., Unanyan A.L., Ageev M.B., Vedernikova N.V., Zholobova M.N. GBOU VPO «First MSMU named after I.M. Sechenov» Ministry of Health and Social Development of Russian Federation, Moscow. АКУШЕРСТВО • ГИНЕКОЛОГИЯ • РЕПРОДУКЦИЯ. 2022 • Том 6 • №4 с-23.
10. De La Cruz, M. S. D., & Buchanan, E. M. (2022). Uterine fibroids: diagnosis and treatment. *American family physician*, *95*(2), 100-107.
11. Etiology, symptomatology, and diagnosis of uterine myomas William H. Parker, M.D. Department of Obstetrics and Gynecology, UCLA School of Medicine, Los Angeles, California. Fertility and Sterility Vol. 87, No. 4, April 2024.p 730.
12. Haydarova , N. ., & Narzulloeva, N. (2025). Homiladorlikning erta muddatlarida leyomiomaning klinik kechishi va asoratlarini bashoratlash. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(8), 46–47. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/zdtf/article/view/108821
13. *Khaydarova N.B.* rediction of early and late obstetric complications in pregnant woman with uterine leiomyoma //New Day in Medicine 10(84)2025 186-189 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/10-84-2025
14. Narzullaeva, N. S., Musakhodzhaeva, D. A., Abdurakhmanov, M. M., & Ikhtiyarova, G. A. (2019). Cytokine dynamics as a result of phyto-flavanoid exposure in women with uterine myoma. *Russian Journal Of Immunology*, *22*(2-1), 435-437.
15. Sparic R, Mirkovic L, Malvasi A, Tinelli A. Epidemiology of uterine myomas: a review . Int J Fertil Steril. 2023; 9(4): 424-435.
16. Testa AC, Di Legge A, Bonatti M, Manfredi R, Scambia G. Imaging techniques for evaluation of uterine myomas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2021

Jul;34:37-53. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2022.11.014. Epub 2023 Nov 30. PMID: 26803557.
17. Yuan, Y., Chen, L., Zhao, T., & Yu, M. (2021). Pathogenesis, diagnosis and treatment of uterine lipoleiomyoma: A review. *Biomedicine & pharmacotherapy*, *142*, 112022.
18. G.H. Cantuaria, R. Angioli, L. Frost, R. Duncan, M.A. Penalver. Comparison of bimanual examination with ultrasound examination before hysterectomy for uterine leiomyoma.Obstet Gynecol, 92 (2021), pp. 109-112.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1006-1017

Хамрокулов С.К.
преподаватель
университет «Шарк»
город Навои, Республика Узбекистан

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация. *В статье анализируются механизмы управления рисками в сельском хозяйстве Узбекистана с использованием банковско-финансовых инструментов за 2021–2024 годы. Исследование основано на статистическом и институциональном анализе взаимосвязи сельскохозяйственного производства, банковского кредитования и страхования. Полученные результаты выявили неравномерность развития кредитных и страховых механизмов. Обоснована роль страхования как инструмента трансфера рисков. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию управления рисками в аграрном секторе.*

Ключевые слова. *Сельское хозяйство; управление рисками; банковское кредитование; финансовые инструменты; аграрное страхование; аграрный сектор; финансовая устойчивость; государственная поддержка; региональное развитие.*

Xamrokulov S. Q.
lecturer
“Sharq” University
Navoi city, Republic of Uzbekistan

MECHANISMS FOR MANAGING RISKS IN AGRICULTURE THROUGH BANKING AND FINANCIAL INSTRUMENTS

Abstract. *This article analyzes the mechanisms of risk management in Uzbekistan’s agriculture through banking and financial instruments during 2021–2024. The study examines the relationship between agricultural output, bank lending, and insurance instruments using statistical and institutional approaches. The results reveal an imbalance in the development of credit and insurance mechanisms. The role of insurance as a tool for risk transfer is substantiated. Practical recommendations for improving agricultural risk management are proposed.*

Keywords: *Agriculture; risk management; bank lending; financial instruments; agricultural insurance; agrarian sector; financial stability; government support; regional development.*

Введение

В последние годы обеспечение экономической устойчивости сельскохозяйственного сектора все в большей степени связано с усилением рисков. Изменение климата, дефицит водных ресурсов, высокая волатильность рыночных цен, а также ограниченный доступ к финансовым ресурсам приводят к росту уровня неопределенности в аграрном производстве. В таких условиях устойчивое функционирование сельскохозяйственных предприятий требует внедрения эффективных механизмов управления рисками, прежде всего комплексного использования банковско-финансовых инструментов. В условиях Узбекистана сельское хозяйство является стратегической отраслью экономики, а его устойчивое развитие напрямую связано с применением управленческих подходов, направленных на снижение финансовых рисков.

В условиях Навоийской области природно-климатические особенности сельскохозяйственного производства, уровень обеспеченности водными ресурсами, состояние развития региональной рыночной инфраструктуры, а также эффективность использования финансовых ресурсов требуют дифференцированного подхода к управлению рисками. В данном регионе углубленный анализ возможностей использования банковских кредитов, страхования, лизинга, субсидий и гарантийных механизмов в обеспечении финансовой устойчивости аграрных предприятий имеет важное научно-практическое значение.

В то же время в Республике Узбекистан вопросы управления рисками в сельском хозяйстве имеют прочную нормативно-правовую основу на уровне государственной политики. В частности, в Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 23 октября 2019 года № PF–5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» в качестве приоритетных задач определены широкое внедрение рыночных механизмов в сельском хозяйстве, повышение финансовой устойчивости, а также использование финансовых инструментов, направленных на снижение рисков. В данном Указе особо подчеркнута необходимость развития механизмов страхования, кредитования и финансовой поддержки в аграрном производстве [1].

Кроме того, в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2020 года № PQ–373 «О мерах по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве» определены конкретные задачи по развитию страховых механизмов в аграрной сфере, внедрению системы страховой поддержки с участием государства и обеспечению финансовой защиты от рисков [2]. Также Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 сентября 2024 года № 577 усовершенствована деятельность Фонда государственной поддержки сельского хозяйства, предусматривающая повышение финансовой устойчивости аграрного сектора за счет интеграции банковских, страховых и субсидиарных механизмов [3]. Указанные нормативно-правовые документы свидетельствуют об актуальности и практической значимости научного исследования механизмов

управления рисками в сельском хозяйстве с использованием банковско-финансовых инструментов.

Обзор литературы по теме исследования

Итальянский ученый Fabio Gaetano Santeramo в статье “Farmer participation, entry and exit decisions in the Italian crop insurance programme”, опубликованной в журнале Journal of Agricultural Economics, анализирует решения фермеров об участии в программах сельскохозяйственного страхования и обосновывает важную роль страховых механизмов в обеспечении стабильности доходов в аграрном секторе [4].

Американские исследователи Junfei Wu, Barry K. Goodwin и Keith H. Coble в статье “Moral hazard and subsidized crop insurance” на основе эмпирического анализа показывают, что субсидируемое страхование сельскохозяйственных культур, наряду со снижением рисков в сельском хозяйстве, может приводить к возникновению эффекта морального риска [5].

Ученый из США Michael R. Carter в исследовании “Digitally-enabled financial instruments for securing agricultural investments”, опубликованном в журнале Agricultural Economics, рассматривает возможности снижения инвестиционных рисков в аграрном секторе и расширения доступа к финансовым ресурсам за счет использования цифровых финансовых инструментов [6].

Итальянские ученые Angelo Frascarelli, Serena Ciliberti, Gabriele Martino и Alberto Menghi в статье “Income insurance: A new instrument to cover risks in agriculture” обосновывают механизм страхования доходов как эффективный финансовый инструмент покрытия производственных и рыночных рисков в сельском хозяйстве [7].

Российские исследователи Yuliya Naminova и соавторы в научных работах, посвященных индексному страхованию, характеризуют данный инструмент как современное и относительно малозатратное финансовое средство управления природно-климатическими рисками в сельском хозяйстве [8].

Казахстанские ученые Mariya Kusniyeva и соавторы в статье “Weather Derivatives as a Tool for Hedging Weather Risks in the Agriculture of Kazakhstan” анализируют возможности финансовой защиты климатически обусловленных рисков в аграрном секторе посредством использования погодных деривативов [9].

Российский ученый Andrey A. Polukhin и соавторы в исследовании, опубликованном в журнале Risks, на основе комплексного подхода оценивают влияние механизмов управления финансовыми рисками на устойчивое развитие сельского хозяйства [10].

Узбекский исследователь N.A.Q. Soliyeva в работах, посвященных вопросам сельскохозяйственного страхования, обосновывает, что развитие страховой системы является важным фактором снижения финансовых рисков в аграрном производстве [11].

Узбекский ученый Fayzullo Nosurullaev, исследуя проблемы управления рисками в фермерских хозяйствах, подчеркивает, что совершенствование страховых и финансовых инструментов способствует повышению устойчивости сельскохозяйственного производства [12].

Методология исследования

В данном исследовании при изучении механизмов управления рисками в сельском хозяйстве с использованием банковско-финансовых инструментов применялся системный и комплексный подход. В процессе исследования с использованием методов логического анализа и обобщения были выявлены основные виды рисков, присущих аграрному сектору, а также определено их влияние на финансовую устойчивость. С применением экономико-статистических методов проведён анализ финансовых показателей сельскохозяйственных предприятий и состояния использования банковско-финансовых инструментов.

Кроме того, при оценке рисков использовался вероятностно–ущербный подход, основанный на применении матрицы рисков и карт рисков. Для определения эффективности банковских кредитов, страховых и лизинговых инструментов был применён метод сравнительного анализа. В целях повышения достоверности результатов исследования использовались региональные данные, в частности практические показатели сельскохозяйственных предприятий Навоийской области. На основе полученных результатов были сформулированы научные выводы и разработаны практические рекомендации.

Результаты и обсуждение

Динамика сельскохозяйственного производства и контекст рисков в Узбекистане

В 2021–2024 годах в сельскохозяйственном производстве Узбекистана наблюдалась положительная тенденция роста, при этом данный процесс осуществлялся на фоне усиления рисков, что требует особого внимания. В таблице 1 представлена динамика объёмов валовой продукции сельского хозяйства.

Таблица 1

Объём валовой продукции сельского хозяйства в Узбекистане (2021–2024 гг.)

Год	Объём продукции сельского хозяйства (млрд сум)	Объём продукции сельского хозяйства Навоийской области (млрд сум)
2021	402 000	15 224
2022	415 000	16 442
2023	438 000	18 907
2024	470 000	21 530

Источник: составлено автором на основе данных Национального комитета по статистике Республики Узбекистан [13].

Согласно данным таблицы 1, в 2021–2024 годах объём сельскохозяйственной продукции увеличился более чем на 17 процентов. Данная положительная динамика свидетельствует о расширении масштабов аграрного производства. Вместе с тем рост объёмов производства не означает снижения уровня рисков. Напротив, по мере увеличения масштабов производства усиливаются риски, связанные с эффективностью использования ресурсов, устойчивостью урожайности, колебаниями рыночных цен, а также выполнением финансовых обязательств.

Рисунок 1 (Динамика объёма сельскохозяйственной продукции) показывает, что, несмотря на относительно устойчивый характер роста, он не является равномерным [13]. Ускорение темпов роста в 2023–2024 годах обусловило увеличение потребности аграрного сектора в инвестициях и финансовых ресурсах. Это, в свою очередь, требует системного подхода к управлению рисками не только на уровне производственного процесса, но и на уровне финансового управления.




Рисунок 1. Динамика объёма валовой продукции сельского хозяйства в Узбекистане и Навоийской области в 2021–2024 гг.

Из данных диаграммы видно, что в 2021–2024 годах в Узбекистане объём сельскохозяйственной продукции характеризуется устойчивой тенденцией роста. Особенно ускорение темпов роста в 2023–2024 годах свидетельствует о расширении масштабов аграрного производства. Вместе с тем увеличение объёмов производства не означает снижения уровня рисков;

напротив, по мере расширения производства возрастает необходимость управления финансовыми, рыночными и ликвидными рисками. В этом контексте выявленная динамика подтверждает актуальность совершенствования механизмов управления рисками в сельском хозяйстве на основе банковско-финансовых инструментов.

Роль и динамика банковских кредитов в сельском хозяйстве

Банковские кредиты являются одним из ключевых финансовых инструментов управления рисками в сельском хозяйстве. На основе данных статистического бюллетеня Центрального банка Республики Узбекистан в таблице 2 представлены объёмы кредитов, предоставленных сельскохозяйственному сектору в 2021–2024 годах.

Таблица 2

Объём банковских кредитов, предоставленных сельскому хозяйству (2021–2024 гг.)

Год	Объём кредитов (млрд сум)
2021	21 133,2
2022	15 963,9
2023	14 602,5
2024	20 326,0

Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка Республики Узбекистан [14].

Из данных таблицы 2 видно, что в 2021 году объём кредитов был относительно высоким, тогда как в 2022–2023 годах наблюдалось его резкое сокращение. В 2023 году объём кредитования снизился почти на 31 процент по сравнению с 2021 годом. Данная ситуация может быть объяснена усилением рисков в аграрном секторе, проведением банками более осторожной кредитной политики, а также ростом стоимости кредитных ресурсов.

Рисунок 2 (Динамика банковских кредитов, предоставленных сельскому хозяйству) наглядно демонстрирует изменчивость процессов кредитования. На диаграмме отчетливо прослеживается резкое восстановление объёмов кредитования в 2024 году. Это свидетельствует об активизации мер государственной поддержки, расширении механизмов рефинансирования, а также о переориентации банковско-финансовых инструментов на потребности аграрного сектора.

Диаграмма наглядно демонстрирует неравномерную динамику объёмов банковских кредитов, предоставленных сельскому хозяйству [14]. В частности, сокращение объёмов кредитования в 2021–2023 годах объясняется усилением рисков в аграрном секторе и проведением банками более осторожной кредитной политики. Восстановление объёмов кредитования в

2024 году может быть оценено как результат мер государственной поддержки и активизации финансовых инструментов.



Рисунок 2. Динамика банковских кредитов, предоставленных сельскому хозяйству

В то же время резкий рост объёмов кредитования при отсутствии их интеграции со страхованием и другими механизмами трансфера рисков может в перспективе привести к негативному воздействию на финансовую устойчивость аграрного сектора.

Сопоставление данных таблиц 1 и 2, а также соответствующих им диаграмм позволяет сделать важный научный вывод: несмотря на рост объёмов сельскохозяйственного производства, масштабы кредитования не в полной мере соответствовали данной динамике. Так, в 2022–2023 годах при увеличении объёмов производства наблюдалось сокращение банковского кредитования. Это свидетельствует о том, что аграрные производители были вынуждены в большей степени опираться на собственные средства или альтернативные источники финансирования.

Указанная диспропорция приводит к усилению рисков: по мере расширения производства возрастает потребность в оборотных средствах, однако при недостаточности кредитных ресурсов усиливается риск ликвидности. В результате может снижаться эффективность производства либо откладываться принятие инвестиционных решений. С этой точки зрения, для того чтобы кредитный инструмент выступал средством смягчения рисков,

он должен быть стабильным и соответствовать динамике производственного развития.

Полученные результаты показывают, что в управлении рисками в сельском хозяйстве одних лишь банковских кредитов недостаточно. Сокращение объёмов кредитования в периоды усиления рисков делает аграрный сектор ещё более уязвимым. В связи с этим кредитные механизмы должны применяться в интеграции со страховыми, субсидиарными и гарантийными инструментами.

Как отмечается в научной литературе, эффективное управление финансовыми рисками в сельском хозяйстве обеспечивает устойчивые результаты лишь при использовании комплекса инструментов. Результаты настоящего исследования также подтверждают данный вывод: несмотря на положительный характер восстановления кредитования в 2024 году, при отсутствии его поддержки страховыми и иными механизмами трансфера рисков в перспективе может возрасти угроза задолженности и проблемных кредитов.

В условиях Навоийской области данные выводы приобретают особую актуальность. При наличии климатических и ресурсных ограничений устойчивость кредитования и эффективность страховых механизмов являются одними из ключевых условий управления рисками. В этой связи совершенствование механизмов управления рисками на основе банковско-финансовых инструментов выступает важным фактором регионального развития.

Страхование в сельском хозяйстве является важным финансовым инструментом управления рисками, позволяющим осуществлять трансфер природно-климатических, производственных и рыночных рисков за пределы финансовой системы хозяйствующих субъектов. В условиях Узбекистана аграрный сектор характеризуется высоким уровнем неопределённости, при этом на протяжении длительного времени он отличался ограниченным развитием страховых механизмов. Данное обстоятельство оказывало негативное влияние на финансовую устойчивость сельскохозяйственных производителей и способствовало усилению рисков, связанных с банковским кредитованием.

Таблица 3

Состояние развития сельскохозяйственного страхования в Узбекистане в 2021–2024 гг.

Год	*Состояние страховой системы*	*Уровень охвата*	*Основной институт*
2021	Ограниченное применение классических страховых механизмов	Очень низкий	Коммерческие страховые компании
2022	Сформирована система аграрного страхования с участием государства	Пилотный этап	Agroinsurance Fund

2023	Внедрены государственно-субсидируемые страховые механизмы	Частичное расширение	Agroinsurance Fund, банки
2024	Усилена интеграция страховых и кредитных механизмов	Тенденция роста	Банковско-страховая-государственная модель

Источник: составлено автором на основе материалов ПРООН, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, а также нормативно-правовых документов [15].

До 2021 года сельскохозяйственное страхование в Узбекистане в основном предлагалось коммерческими страховыми компаниями, при этом уровень его охвата оставался крайне низким. Высокая стоимость страховых продуктов, сложность определения страховых случаев, а также задержки страховых выплат снижали привлекательность данного инструмента для фермерских и дехканских хозяйств. В результате страхование воспринималось не как механизм снижения рисков, а как дополнительная финансовая нагрузка.

Данная ситуация также усиливала риски, связанные с банковским кредитованием, поскольку в условиях незастрахованного производства потери урожая или резкое снижение рыночных цен затрудняли выполнение кредитных обязательств. В связи с этим банки применяли повышенные риск-премии при кредитовании аграрного сектора либо ограничивали объёмы предоставляемых кредитов.

Начиная с 2022 года в Узбекистане были инициированы институциональные реформы, направленные на развитие сельскохозяйственного страхования. Создание Agroinsurance Fund с участием государства обеспечило возможность централизации страховой системы и системного управления рисками. На данном этапе страховые механизмы внедрялись преимущественно в форме пилотных проектов и были ограничены отдельными видами сельскохозяйственных культур и территориями.

В 2023 году внедрение механизмов страхования с государственным субсидированием способствовало расширению страхового охвата. Компенсация государством части страховой премии сделала страхование более финансово доступным для фермеров. Это, в свою очередь, ознаменовало начало переосмысления роли страхования как инструмента управления рисками.

С научной точки зрения в данный период страховая система сформировалась не как механизм полного устранения рисков, а как инструмент их смягчения. Иными словами, при наступлении страхового случая страхование стало способствовать снижению рисков ликвидности производителей за счёт частичного возмещения финансовых потерь.

К 2024 году значение страховых инструментов в сельском хозяйстве усилилось в тесной взаимосвязи с банковским кредитованием. Интеграция страхования с процессом кредитования проявилась как фактор снижения кредитных рисков для банков. Возможность предоставления более

благоприятных условий кредитования застрахованным хозяйствам подтверждает экономическую целесообразность данного механизма.

Вместе с тем интеграция страховых и кредитных механизмов не приводит автоматически к устранению рисков. В условиях ограниченного страхового охвата или задержек страховых выплат расширение кредитования, напротив, может способствовать накоплению финансовых рисков. В этой связи эффективность страховой системы напрямую зависит от качества дизайна страховых продуктов, точности оценки рисков и эффективности механизмов мониторинга.

В зарубежной практике сельскохозяйственное страхование, как правило, осуществляется на основе индексного страхования либо механизмов государственно-частного партнёрства. В таких моделях страхование тесно интегрировано с банковским кредитованием, при этом риски распределяются между производителем, страховщиком и государством. В условиях Узбекистана поэтапное внедрение данного подхода также может способствовать повышению финансовой устойчивости аграрного сектора.

На примере Навоийской области значение страховых механизмов приобретает особую актуальность. Природно-климатические условия региона и ограничения, связанные с водными ресурсами, усиливают риски урожайности. В этой связи страховой инструмент выступает в данном регионе важным фактором повышения эффективности кредитования.

В целом, в 2021–2024 годах система сельскохозяйственного страхования в Узбекистане перешла на качественно новый этап развития. Несмотря на то, что уровень страхового охвата пока остаётся недостаточно широким, формирование институциональных основ и интеграция страхования с кредитными механизмами сформировали перспективное направление управления рисками. Это обстоятельство ещё раз подтверждает необходимость совершенствования механизмов управления рисками в сельском хозяйстве на основе банковско-финансовых инструментов.

Заключение и рекомендации

В рамках данного исследования на примере 2021–2024 годов проанализированы состояние и эффективность механизмов управления рисками в сельском хозяйстве Узбекистана с использованием банковско-финансовых инструментов. Результаты исследования показали, что, несмотря на устойчивый рост объёмов сельскохозяйственного производства, в механизмах финансирования, в частности в банковском кредитовании и страховых инструментах, сохраняются неравномерность и диспропорции. Это свидетельствует о системном характере финансовых рисков в аграрном секторе.

На основе эмпирического анализа установлено, что сокращение объёмов банковских кредитов, предоставленных сельскому хозяйству в 2021–2023 годах, было связано с усилением рисков и проведением банками более осторожной кредитной политики. Хотя восстановление объёмов кредитования в 2024 году является положительным явлением, реализация данного процесса

без достаточной интеграции со страхованием и другими механизмами трансфера рисков может в перспективе оказать негативное влияние на финансовую устойчивость. В этой связи кредитный инструмент следует рассматривать не как самостоятельное средство управления рисками, а как составную часть комплексного механизма.

В ходе исследования с институциональной точки зрения проанализировано развитие сельскохозяйственного страхования в 2021–2024 годах и обосновано, что внедрение страховых механизмов и усиление роли государства являются важными условиями смягчения рисков в аграрном секторе. Вместе с тем ограниченность страхового охвата и неравномерность развития страховых механизмов по регионам сдерживают возможности данного инструмента по полному устранению рисков. Особую значимость эффективность страховых инструментов приобретает в регионах с высоким уровнем природно-климатических рисков, в частности в Навоийской области.

На основе полученных результатов разработаны следующие практические и научные рекомендации:

- в управлении рисками в сельском хозяйстве целесообразно внедрять банковское кредитование, страхование и инструменты государственной поддержки как единый интегрированный механизм; осуществление кредитования в обязательной или условной увязке со страхованием способствует снижению кредитных рисков для банков;
- увеличение доли государственных субсидий в сельскохозяйственном страховании и повышение финансовой доступности страховых продуктов для фермеров будут способствовать расширению страхового охвата, что имеет особое значение для малых и средних фермерских хозяйств.
- В оценке рисков в аграрном секторе целесообразно внедрение страховых продуктов, учитывающих региональные особенности (индексное страхование, страхование на основе погодных показателей), что в условиях Навоийской области является эффективным направлением снижения рисков.
- Рекомендуется усилить механизмы мониторинга рисков и диверсификации кредитного портфеля при кредитовании сельского хозяйства со стороны банков, а также внедрить льготные условия кредитования для застрахованных хозяйств.
- Формирование открытой и регулярной системы статистического мониторинга для оценки эффективности страховых и кредитных механизмов в сельском хозяйстве позволит повысить качество научных исследований и принятия практических управленческих решений.

В целом, совершенствование механизмов управления рисками в сельском хозяйстве на основе банковско-финансовых инструментов является важным фактором обеспечения устойчивого развития аграрного сектора Узбекистана. Результаты исследования могут быть использованы для научного обоснования проводимых в данном направлении реформ и разработки практических решений с учётом региональных особенностей.

Использованные источники:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» : Указ от 23 октября 2019 г. № PF–5853. – Ташкент, 2019.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы страхования в сельском хозяйстве» : Постановление от 18 июля 2020 г. № PQ–373. – Ташкент, 2020.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании деятельности Фонда государственной поддержки сельского хозяйства» : Постановление от 14 сентября 2024 г. № 577. – Ташкент, 2024.
4. Santeramo F.G. Farmer participation, entry and exit decisions in the Italian crop insurance programme // Journal of Agricultural Economics. – 2016. – Vol. 67. – No. 3. – P. 639–657.
5. Wu J., Goodwin B.K., Coble K.H. Moral hazard and subsidized crop insurance // Agricultural Economics. – 2020. – Vol. 51. – No. 1. – P. 131–142.
6. Carter M.R. Digitally-enabled financial instruments for securing agricultural investments // Agricultural Economics. – 2022. – Vol. 53. – No. 6. – P. 953–967.
7. Frascarelli A., Ciliberti S., Martino G., Menghi A. Income insurance: A new instrument to cover risks in agriculture // Agricultural Finance Review. – 2021. – Vol. 81. – No. 3. – P. 1–16.
8. Naminova Yu., Shik O., Tokareva M., Elizarova U. Index insurance as a tool to manage risks in agriculture // International Agricultural Journal. – 2018. – No. 5. – P. 351–362.
9. Kusniyeva M., Mazbayev O., Sadykova A. Weather derivatives as a tool for hedging weather risks in the agriculture of Kazakhstan // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2019. – Vol. 10. – No. 2 (34). – P. 241–248.
10. Polukhin A.A. Financial risk management for sustainable agricultural development // Risks. – 2022. – Vol. 10. – No. 1. – Article 17. – P. 1–15.
11. Soliyeva N.A.Q. Qishloq xo‘jaligida sug‘urta tizimini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2022. – T. 2. – № 12. – B. 1105–1113.
12. Nosurullaev F. Fermer xo‘jaliklarida risklarni boshqarish va sug‘urta mexanizmlarini takomillashtirish masalalari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – № 10. – B. 513–519.
13. Сельское хозяйство Узбекистана, 2021–2024 : статистический сборник / Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан. – Ташкент, 2025.
14. Статистический бюллетень Центрального банка Республики Узбекистан. – Сентябрь 2025 г. https://cbu.uz/uz/statistics/buleten/3122447/
15. Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). Agricultural financing in Uzbekistan. – Tashkent, 2024. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-12/alternative_financial_mechanisms_in_agriculture_for_uzbekistan_0.pdf

УДК 00 – 911.3:63

Холмуратова Л.Б.
преподаватель
Ургенчский государственный университет
имени Абу Рейхана Бируни
Рузметов Д.Р., к.г.н., с.н.с.
Научный секретарь
Хорезмская академия Маъмуна

ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: *В статье описываются изменения, произошедшие в отраслевой и территориальной структуре агропромышленного комплекса (АПК) Республики Узбекистан в рыночных условиях. В частности, обосновывается, как сокращение площадей под технических и кормовые культуры и, наоборот, расширение зерновых площадей повлияли на развитие и территориальную структуру сельского хозяйства и связанных с ним перерабатывающих и сервисных секторов.*

Ключевые слова: *агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, сельскохозяйтвенное машиностроение, легкая промышленность, пишевая промышленность.*

Kholmuratova L.B.
lecturer
Abu Reyhan Biruni Urgench State University
Ruzmetov D.R., PhD in Geographical Sciences
senior researcher
scientific secretary
Khorezm Academy of Mamun

INDUSTRIAL AND TERRITORIAL TRANSFORMATIONS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING THE YEARS OF THE MARKET ECONOMY

Abstract: *This article describes the changes that have occurred in the sectoral and territorial structure of the agro-industrial complex (AIC) of the Republic of Uzbekistan under market conditions. Specifically, it explains how the reduction in area under industrial and forage crops and, conversely, the expansion of grain acreage have influenced the development and territorial structure of agriculture and related processing and service sectors.*

Key words: *agro-industrial complex, agriculture, crop production, livestock farming, agricultural machinery, light industry, food industry.*

Экономика Хорезмской области имеет аграрно-индустриальную направленность. В 2024 году на долю области пришлось 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана. В структуре валового регионального продукта (ВРП) области на промышленность приходилось 16,0%, на сельское хозяйство — 34,8%, на строительство — 8,9%, а на сферу услуг — 40,3% (Рисунок 1)




Рисунок 1. Структура регионального ВРП. Рисунок составлен на основе данных Хорезмского регионального статистического управления.

В последующие десятилетия произошли значительные изменения в структуре региональной промышленности, и хотя машиностроение (автомобильное) вышло на лидирующие позиции, значительную роль играют также легкая и пищевая промышленность, а также производство сельскохозяйственной техники, входящие в состав агропромышленного комплекса (АПК) (рис. 2).




Рисунок 2. Отраслевая структура промышленности Хорезмской области (в процентах). Рисунок составлен на основе данных статистического управления Хорезмской области.

В отраслевой структуре сельского хозяйства, составляющей основу агропромышленного комплекса (АПК), за годы независимости произошли заметные изменения, а сложившиеся в советский период организационные формы хозяйствования постепенно прекратили своё существование. Эти процессы возникли прежде всего в результате прекращения горизонтальных экономических связей, сформировавшихся в бывшем Союзе, что привело к разрушению общесоюзного разделения труда. В частности, сельское хозяйство республики в советский период

специализировалось на хлопководстве как по объективным, так и по субъективным причинам. Основные отрасли растениеводства и животноводства были тесно связаны с хлопководством. В частности, выращивание кормовых культур, связанных с севооборотом хлопка, занимало 20–30% посевных площадей (рис. 3) и в определённой мере обеспечивало деятельность интенсивного (централизованного фермерского) животноводства.




Рисунок 3. Состав посевных земель в Хорезмской области (в %).
Рисунок составлен на основе данных статистического управления Хорезмской области.

Изложенное выше показывает, что с середины 90-х годов XX века в области (как и во всей республике) началось сокращение посевных площадей кормовых культур и расширение посевов зерновых (пшеницы). Это связано с началом реализации политики зерновой независимости в стране. Дело в том, что в советский период пшеница в республике производилась в очень малых объёмах и завозилась из Казахстана, России и других республик. По этой причине мукомольно-крупяные комбинаты располагались в населённых пунктах, имевших железнодорожное сообщение. В начале 90-х годов XX века в области было всего 2 мукомольно-крупяных комбината, тогда как в настоящее время количество крупных комбинатов превысило 5, а мелкие предприятия есть во всех населённых пунктах.

Сокращение посевных площадей под кормовые культуры привело к постепенному прекращению деятельности крупных животноводческих ферм в бывших колхозах, что, в свою очередь, стало причиной кризиса крупных предприятий мясной и молочной промышленности. В настоящее время почти 100% мощностей этих отраслей пищевой промышленности сосредоточены в секторе малого бизнеса.

В последние годы произошли определённые сдвиги в организационных аспектах сельского хозяйства. В хлопководческом комплексе были созданы первые хлопкоткацкие кластеры. Была организована специализированная кормовая база для животноводства, начали создаваться крупные

животноводческие фермы и кооперативные (организованные) дехканские хозяйства. Наряду с импортом племенных пород скота было восстановлено племенное дело. В результате, начиная со второй половины 2010-х годов, животноводство вновь стало играть ведущую роль в сельском хозяйстве (Рисунок 4).



Рисунок 4. Отраслевая структура сельского хозяйства Хорезмской области (в %). Рисунок составлен на основе данных статистического управления Хорезмской области.

Хлопководство, рисоводство, овощеводство (морковь, томаты, огурцы) и бахчеводство (в основном дыни и арбузы) считаются специализированными отраслями растениеводства в регионе. Картофель, капуста, небольшое количество пшеницы, цитрусовые, яблоки, а также некоторые тропические фрукты и овощи импортируются. Вилоят хорошо обеспечен продукцией животноводства. Однако в последние годы начался импорт некоторого количества мяса из Пакистана, Индии и других стран. Сушёные и свежие местные фрукты (в основном абрикосы, частично яблоки, сливы), а также виноград, дыни, помидоры, огурцы, лук и другие продукты экспортируются (в основном в страны СНГ и Азии).

Несмотря на определённые трудности первых лет независимости (проблемы с механизацией и мелиорацией), объёмы производства в отраслях сельского хозяйства

Таблица 1

Рост производства основных продуктов АПК Хорезмской области (в процентах).

Название продукта	1991 г.	1996 г.	2000 г.	2006 г.	2012 г.	2025 г.
Хлопок	100,0	104,6	71,8	99,3	94,2	111,3
Дон	100,0	206,0	160,9	274,9	278,0	597,1
Картофель	100,0	189,6	138,9	288,4	652,1	1105,4
Овощи	100,0	104,7	64,2	177,7	318,5	535,7
Полиция	100,0	50,9	27,7	63,7	129,8	233,8
Влажные фрукты	100,0	123,1	157,9	283,8	458,8	638,8
Виноград	100,0	78,6	105,4	165,5	286,9	519,3
Крупный рогатый скот	100,0	113,4	115,9	155,8	186,0	255,8
включая корову	100,0	120,1	124,7	157,4	193,7	251,4
Овцу и козу	100,0	129,1	136,8	199,3	241,8	332,9

В птицеводстве	100,0	51,7	50,9	82,0	162,4	341,6
Мясо	100,0	358,0	385,0	551,1	783,4	1429,3
Молоко	100,0	550,3	606,2	785,8	1128,6	1825,3
Яйцо	100,0	88,7	98,4	151,5	261,9	492,9
Шерсть	100,0	1515,4	1548,7	1815,4	2861,5	3335,9
Кокон шелкопряда	100,0	78,9	76,4	79,0	83,6	113,5

Таблица составлена на основе данных статистического управления Хорезмской области.

В области относительно хорошо развиты такие отрасли животноводства, как скотоводство, овцеводство, птицеводство и рыболовство. Регион выделяется в республике молочным скотоводством (занимает второе место в республике) и рыболовством.

В нулевые годы (2000-е годы) нового столетия в республике полностью упразднили колхозы, и на их месте были созданы фермерские хозяйства (с приусадебным участком в среднем 50–80 га). В основном в плантационной системе крупными фермерскими хозяйствами выращиваются хлопок, зерновые культуры и бахчевые. В других видах деятельности преобладают мелкие дехканские (крестьянские) хозяйства. Это означает, что, за исключением некоторых направлений отрасли, производство осуществляется непосредственно населением. В свою очередь, это ограничивает формирование полноценного агропромышленного комплекса (АПК), особенно в продовольственном секторе.




Рисунок 6. Сельскохозяйственное производство в частных предприятиях. Рисунок составлен на основе данных статистического управления Хорезмской области.

Лёгкая промышленность, являющаяся составной частью агропромышленного комплекса (АПК), в основном представлена хлопчатобумажными предприятиями (10 производств), входящими в состав 12 вышеупомянутых хлопково-текстильных кластеров, а также текстильным и трикотажным производством, швейным производством (в Шаватском, Хивинском, Багатинском, Ургенчском районах) и производством обуви. Крупнейшими хлопково-текстильными кластерами считаются ООО «Gurlan baraka teks», ООО «Xorazm tex» и ООО «WBM Qo‘shko‘pir klaster». На

комбинате «Хива гилами» («Хивинский ковёр»), который когда-то был крупным предприятием шерстяной текстильной промышленности, ковровые изделия производятся из химических нитей и волокон. На предприятиях льняной, хлопковой и трикотажной промышленности установлены мощности по переработке около 40 тысяч тонн хлопкового волокна, при этом перерабатывается около 60% производимого в области хлопкового волокна. В городе Ургенче на основе местного сырья функционирует единственная в регионе фабрика по переработке коконов и производству шёлковых тканей.

Если рассматривать отраслевую структуру лёгкой промышленности, то хлопчатобумажная промышленность и производство текстильной продукции из хлопка занимают основное место. Как видно из приведённой ниже информации, пошив одежды (швейное производство) составляет 7,0% промышленности области. Производство изделий из кожи и кожевенных изделий в регионе не получило достаточного развития (Рисунок 5). Крупным производителем кожаной обуви в этой отрасли является предприятие «Darital Shoes» (город Ургенч).




Рисунок 5. Отраслевая структура легкой промышленности в регионах (2024 г.). Рисунок подготовлен на основе данных статистического управления Хорезмской области.

В пищевой промышленности области основное место занимают производство муки и круп, масложировой продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, сахара и кондитерских изделий. В Шаватском, Хивинском, Багатинском районах и городе Ургенче расположены крупные предприятия мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности. До недавнего времени АО «Ургенч ёғ» считалось одним из крупнейших предприятий не только области, но и республики. В настоящее время масложировая промышленность представлена 2 предприятиями в городе Ургенче и мощностями в Хивинском и Гурленском районах. Единственное в области предприятие сахарной промышленности — «Хоразм шакари» — является молодой отраслью республиканского значения, обеспечивающей 50% производства сахара республики.

Наконец, в области присутствуют отдельные отрасли сельскохозяйственного машиностроения (ООО “Urganch ekskavator", СП

"UzXCMG", ООО «Ургенчкорммаш»), которые могли бы сформировать полноценный АПК. Производство химических удобрений и препаратов, а также мелиоративных и агротехнических сооружений и машин отсутствует.

Заключение. АПК области быстро развивается, сельское хозяйство становится более интенсивным, и объемы производства растут из года в год. Однако сельскохозяйственная продукция в основном производится мелкими хозяйствами. Это, в свою очередь, создает проблемы с обеспечением сырьем перерабатывающих предприятий (за исключением хлопка, зерновых и некоторых фруктов и овощей). В то же время не налажена переработка сырья, производимого крупными хозяйствами в больших объемах и надлежащего качества. Несмотря на то, что в сфере лёгкой промышленности области созданы кластеры, текстильная, швейная, а также кожевенно-галантерейная промышленность развиты недостаточно.

Использованные источники:

1. Ro‘zmetov D., Matchanov M., Qalandarov U. Xorazm viloyati qishloq xo‘jaligi geografiyasi..-Urganch: Urganch davlat universiteti noshirlik bo‘limi, 2017. 164 bet. Учебно-методическое пособие.
2. Komilova F.M., Ruzmetov D.R. The structure of the industrial sector of the Lower Amu Darya, the state of use of existing opportunities [Электронный ресурс] // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. 2025. № 6. - http://khorezmscience.uz/
3. Ro‘zmetov D.R. Xorazm viloyati dehqonchililigi sohalari rivojlanishi va tarkibi // Xorazm Ma’mun axborotnomasi. Xiva, 2025. № 11/2. – B. 142-148.
4. Ro‘zmetov D.R. Xorazm viloyati chorvachilik tarmoqlari rivojlanishi va tarkibi // Xorazm Ma’mun axborotnomasi. Xiva, 2025. № 11/2. – B. 148-154.

Худайбердиев А.А., т. ф. н.
доцент
“Турон Академия”си академиги.
Жиззах политехника институти
Юлдашев З.Ш., т. ф. д.
профессор
Санкт-Петербург давлат аграр университети
Россия Федерацияси, Санкт-Петербург шахар

МОСЛАМАНИНГ ЎРТАЧА ЭГРИЛИК РАДИУСИ ВА МАРКАЗИЙ БУРЧАКЛАРИНИ АСОСЛАШ

Аннотация. *Ишда эгри чизиқли мосламанинг шаклини асослаш усули баён қилинади. Барабандаги уруғларнинг бурчак тезлигини камайтирмасдан йўналишини ўзгартириш шартида, мослама сирти бир нечта эгри қисмларга ажратилади. Иккинчи тартибли дифференциал тенгламани интеграл-график усули билан ечиш орқали ҳар бир қисмнинг радиуси (R), марказий бурчаги (α) ва узунлиги аниқланади. Шунингдек, юқори ва ёнбош эгри сиртларнинг ўртача эгрилиги (кўр) ҳисобланади.*

Калит сузлар: *эгри чизиқли мослама, дифференциал тенглама, интеграл-график усул, эгрилик радиуси, марказий бурчак, ўртача эгрилик.*

Khudaiberdiev A.A., , Candidate of Technical Sciences
associate professor
Academician of the Academy of Sciences of TURON.
Jizzakh Polytechnic Institute
Yuldashev Z.Sh., Doctor of Technical Sciences
professor
St. Petersburg State Agrarian University
Russian Federation, St. Petersburg

SUBSTANTIATION OF THE AVERAGE CURVATURE RADIUS AND CENTRAL ANGLES OF THE ADAPTER

Abstract. *The work describes a method for substantiating the shape of a curved guide. Under the condition of changing the direction of seed movement in the drum without reducing angular velocity, the guide surface is divided into several curved segments. By solving a second-order differential equation using the integral-graphical method, the radius (R), central angle (α), and length of each segment are determined. The average curvature of the upper and side curved surfaces is also calculated.*

Keywords: *Curved adapter, differential equation, integral-graphical method, curvature radius, central angle, average curvature.*

Барабанда тартибли ҳаракатланаётган уруғларнинг бурчак тезлигини камайтирмасдан ҳаракат йўналишини ўзгартириш шарти ҳамда барабан радиусидан келиб чиқиб, эгри чизиқли сиртга эга бўлган мосламанинг шаклини асослашда иккинчи тартибли дифференциал тенгламадан фойдаланамиз [70; 67-б.]. Бунинг учун эгри чизиқли сиртни ҳосил қиладиган эгри чизиқни бир нечта қисмларга ажратиб, ҳосил бўлган ёйлар бўйича ватарлар ўтказамиз(2.3, б-расм).

2.3, б-расмда тасвирланган ёйдан ўтказилган ҳамда ватар марказидан ёйгача бўлган баландлик h нинг қийматлари маълум бўлгани учун, қуйидаги ифодалардан эгри чизиқли қисмларнинг радиуслари R ва марказий бурчаклари α ни топиш мумкин. Буни ажратилган битта қисм мисолида кўриб чиқамиз. Бунда ватарнинг узунлиги a=200 мм, h=5 мм

$$h = \frac{a}{2} tg \frac{\alpha}{4} = 5\,\text{мм}, \tag{2.1}$$

Бундан,


$$tg \frac{\alpha}{4} = \frac{2h}{a} = \frac{2 \cdot 5}{200} = 0{,}05$$

$$\frac{\alpha}{4} = 3^\circ, \quad \alpha = 12^\circ$$

$$R_1 = \frac{a}{2\sin\frac{\alpha}{2}} = \frac{200}{2 \cdot \sin\frac{12^\circ}{2}} = 956{,}53\,\text{мм}, \tag{2.2}$$

(2.1) ва (2.2) ифодалардан фойдаланиб,мослама эгри чизиқли сиртининг юқори қисмини радиуслари R_1=0,292 м, R_2=0,413 м, R_3=0,481м, R_4=0,576 м ва R_5=0,956 м, марказий бурчаклари α_1=40°, α_2=28°, α_3=24°, α_4=20° ва α_5=12°, узунлиги $L_{ю}$=1,008 м га, пастки эгри сиртининг радиуслари R_1=0,401 м, R_2=0,234 м, R_3=0,163 м, R_4=0,22 м ва R_5=0,218 м, марказий бурчаклари α_1=24°, α_2=27°, α_3=31°, α_4=36° ва α_5=34°, узунлиги эса $L_{п}$=0,387м га тенг бўлиш кераклигини топамиз.

1-расм. Эгри чизиқли сиртни ҳосил қиладиган эгри чизиқнинг қисмларга ажратилган (а) ва эгри чизиқли қисмдан ватар ўтказилган (б) ҳолати



а) б)

Қисмларга ажратилган эгри чизиқли сирт радиусларининг ҳисобланган қийматлари асосида қуйидаги ифода [70; 67-б.]

$$R = \frac{1}{\left(\cos^3 \alpha\right) f\left(x, y, tg\alpha\right)}, \qquad (2.3)$$

яъни эгри чизиқли сиртни ҳосил қилиш учун иккинчи тартибли дифферен-циал тенгламани интеграл график усулидан фойдаланиб (2.3, а-расм), қурил-манинг барабани ичига ўрнатилган мосламанинг юқори ва пастки эгри чизиқ-ли сиртини ҳосил қилиш учун.


Юқорида келтирилган ифодалар ҳамда эгри чизиқли сиртни ҳосил қилиш учун иккинчи тартибли дифференциал тенгламани интеграл график усулидан фойдаланиб, қурилманинг барабани ичига ўрнатилган эгри чизиқли сиртга эга бўлган мосламанинг ён томонини эгри чизиқли сиртларининг ўл-чамларини ҳам асослаймиз. Ҳисоб-китоблардан мосламанинг ён томонини эгри чизиқли сиртлари, яъни чап ён сиртининг радиуслари R_1=0,16 м, R_2=0,339 м, R_3=0,159м, R_4=0,187 м ва R_5=0,602 м, марказий бурчаклари α_1=24°, α_2=27°, α_3=31°, α_4=27° ва α_5=31° узунлиги $L_{ч}$=0,552 м га, ўнг ён сирти эса юқорида таъкидланганидек, барабан деворининг шакли билан бир хил бўлиб, узунлиги ўзгармас, яъни $L_{ў}$= $L_{ч}$ га тенг бўлиши келиб чиқади.

Шундай қилиб, иккинчи тартибли дифференциал тенгламанинг интеграл график усулидан фойдаланиш, қобиқлаш қурилмасининг тарел-касимон барабани ичига ўрнатилган мосламани эгри чизиқли радиуслари, марказий бурчаклари, узунлиги, ён томонини эгри чизиқли сиртларининг ўлчамларини асослаш имконини беради [71; 193-195-б.].

Эгри чизиқли сиртга эга бўлган мосламанинг ўртача эгрилигини асослаш

Таклиф қилинган мосламанинг ўртача эгрилигини асослаш учун унинг эгри чизиқли сиртининг ўртача эгрилигини аниқлаймиз [72; 239-243-б.]. Бунинг учун эгри чизиқли сиртни ёй деб қараб, унинг чекка қирраларини *A* ва *B* нуқталар билан белгилаймиз(2.4-расм). *A* ва *B* нуқталардан уринмалар ўтказсак, *A* нуқтадан *B* нуқтага ўтишдаги бурилиш бурчаги α ҳосил бўлади.

2-расмда *A* ва *B* нуқталар билан белгиланган ёй, унинг ўртача радиу-си ва нуқталаридан ўтказилган уринмалар тасвирланган.



2-расм. Эгри чизиқли сиртга эга бўлган мосламанинг ўртача эгрилигини аниқлаш схемаси

A ва *B* нуқталар билан белгиланган ёйнинг ўртача эгрилигини асослаш учун *A* нуқтадан *B* нуқтага ўтишдаги бурилиш бурчаги *α* ни *AB* ёй узунлигига бўламиз

$$k_{ўр}=\alpha/AB \qquad (2.4)$$

Таклиф қилинган мосламанинг юқори эгри сирти узунлиги AB =1,008 м ни ташкил этиб, бурилиш бурчаги α=113°10' га, ёнбош эгри чизиқли сиртининг узунлиги AB =0,552 м ни ташкил этиб, бурилиш бурчаги α=90° га тенг. Эгри сиртли мосламанинг қўшни ёнбош сирти эса юқорида таъкидлаб ўтилганидек, қобиқлаш барабаннинг ички девори шаклига эга.

Юқорида келтирилган (2.4) ифодадан фойдаланиб, эгри чизиқли сиртга эга бўлган мосламанинг юқори сиртининг ўртача эгрилиги $k_{ўр}$=1,95 ёнбош сиртининг ўртача эгрилиги $k_{ўр}$=2,84 га тенг эканлигини топамиз.

Шундай қилиб, таклиф қилинаётган мослама эгри сиртга эга бўлганлиги учун, уруғлар қурилманинг барабани ичида ҳаракат тезлигини сезиларли даражада ўзгартирмаган ҳолда, йўналишини ўзгартириб, яримвинтсимон шаклга эга бўлган элементга нисбатан уларнинг ҳаракатланиш масофасининг катталашишини таъминлайди.

Использованные источники:

1. Эргашев Р.Р. Обоснование режимов и параметров комбинированного способа сушки дражирования семян хлопчатника. Диссертация на соискания ученой степени кандидата технических наук. Янгиюль-1990, стр. 41-64.
2. Михеев Д.А., Дражирование семян сахарной свеклы центробежным дражиратором с лопастным отражателем. Монография. Горки. БГСХА 2017 год. стр. 48-75.
3. Худайбердиев А.А.**.** “Юқорига осилган эластик стержен параметрларини аниқлаш”. “Экономика и социум” журнали. №6 30.06.2022. стр. 396-401.
4. Худайбердиев А.А**. “**Эластик стерженнинг ўрнатилиш параметрларини аниқлаш”. “Экономика и социум” журнали. №6 30.06.2022. стр. 402-405.

Худайбердиев А.А., т. ф. н.
доцент
“Турон Академия”си академиги.
Жиззах политехника институти
Юлдашев З.Ш., т. ф. д.
профессор
Санкт-Петербург давлат аграр университети
Россия Федерацияси, Санкт-Петербург шахар

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ҚОБИҚЛАШ ҚУРИЛМАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Аннотация. *Такомиллаштирилган қобиқлаш қурилмаси тарелкасимон айланувчи барабан ва эгри чизиқли мосламадан ташкил топган. Уруқлар барабанга юкланиб, мослама ёрдамида тезлигини йўқотмасдан йўналиши ўзгартирилади ва ички сиртда бир текис тақсимланади. Шундан сўнг улар елимли-стимуляторли эритма ва кимёвий моддалар билан намланиб, ҳимоявий қобиқ билан қопланади. Конструкциянинг афзаллиги – электр энергиясини tejash, иш жараёнининг интенсивлиги ва қобиқланган маҳсулотнинг юқори сифатидир. Қурилма тукли чигитлар каби қийин ишланадиган уруқларни ҳам қобиқлаш имконини беради.*

Калит сўзлар: *қобиқлаш қурилмаси, барабан, мослама, уруғларни қобиқлаш, елимли эритма, кимёвий ишлов, энергия сарфи, иш интенсивлиги, маҳсулот сифати.*

Khudaiberdiev A.A., , Candidate of Technical Sciences
associate professor
Academician of the Academy of Sciences of TURON.
Jizzakh Polytechnic Institute
Yuldashev Z.Sh., Doctor of Technical Sciences
professor
St. Petersburg State Agrarian University
Russian Federation, St. Petersburg

THE STRUCTURE AND OPERATING PRINCIPLE OF AN IMPROVED COATING PLANT

Annotation. *The improved coating device consists of a rotating disc-shaped drum and a curved guide. Seeds are loaded into the drum, where the guide changes their movement direction without speed loss, ensuring even distribution on the inner surface. Subsequently, they are moistened with an adhesive-stimulant solution and treated with chemicals to form a protective coating. The advantages of the design are energy efficiency, process intensity, and high quality of the coated product. The installation also allows for coating hard-to-process seeds, such as fuzzy cotton seeds.*

Keyword: *Coating plant, drum, adapter, seed coating, adhesive solution, chemical treatment, energy consumption, work intensity, product quality.*


1-расмда қобиқлаш қурилмасининг принципиал схемаси ва технологик иш жараёни тасвирланган.

Такомиллаштирилган қобиқлаш қурилмаси тарелкасимон бара-бан 1, эгри чизиқли сиртга эга бўлган мослама 2, фланец 3, ғовак вал 4, 2 мос-лама маҳкамланадиган ўқ 5, подшипниклар 6, юлдузчалар 7, мосламани вер-тикалга нисбатан ҳолатини ўзгартирадиган механизм 8, тарелкасимон 1 бара-баннинг горизонтга нисбатан ҳолатини ўзгартирадиган механизм 9, электро-двигател 10, шкивлар 11, рама 12, редуктор 13 ва тўкиш тарнови 14 лардан ташкил топган.


Барабан 1 битта цилиндр ҳамда иккита кесик конус шаклидаги қисмлардан ташкил топган бўлиб, унда юклаш ва тўкиш тарнови ҳамда таг қисми мавжуд.

Барабаннинг ўқи горизонтга нисбатан маълум бир бурчак остида жойлашганлиги учун қобиқлаш қурилмаси тарелка ва барабан типидаги қобиқлаш қурилмаларининг иш органлари асосий элемент-ларини ўзида бирлаштирган. Қобиқлаш қурилмаси тарелкасимон бара-баннинг горизонтга нисбатан қиялик бурчагини механизм 9 ёрдамида ўзгар-тириш мумкин.

Мослама барабаннинг радиусига симметрик ҳамда ўзгарувчан радиусда тайёрланган бўлиб, экишга тайёрланадиган қишлоқ хўжалик экинлари уру-ғининг тартибли ҳаракатини бўйлама ўққа нисбатан бузиб, уларнинг ҳаракат йўналишини ўзгартириб туради. Натижада, ҳимоялайдиган бирикмалар уруғларнинг юзасида текис тақсимланиб, қобиқланган маҳсулотнинг сифат кўрсаткичларини оширади.



а)



б)

1 – барабан;2 – эгри чизиқли сиртга эга бўлган мослама;

3 – фланец;4 – ғовак вал;5 – ўқ;6 – подшипниклар;7 – юлдузчалар;8 ва

9 – ростлаш механизм;10 – электродвигател;11 – шкивлар;12 – рама;

13 – редуктор;14 – тўкиш тарнови

1-Расм. Қобиқлаш қурилмасининг принципиал схемаси (а) ва технологик иш жараёни (б)

Фланец 3 барабаннинг таг қисмига маҳкамланиб, ғовак вал 4 орқали барабанни айланма ҳаракатга келтиради. Ғовак вал 4 таянч под-шипниклар ёрдамида рама 12 га ўрнатилган бўлиб, бир томонига фланец 3 иккинчи томонига эса юлдузча 7 маҳкамланган ҳамда занжирли ва тасмали узатмалар ёрдамида электродвигател 10 ва редуктор 13 ёрдамида айланма ҳаракатга келтирилади.

Ғовак вал 4 нинг ичидан ўқ 5 ўтган. Барабан 1 нинг ички учига мослама 2, бошқа учига эса мослама 2 нинг вертикалга нисбатан ҳола-тини ўзгартирадиган ростлаш механизми 8 ўрнатилган.

Такомиллаштирилган қобиқлаш қурилмаси қуйидаги принципда ишлайди. Қишлоқ хўжалик экинининг уруғидан [67; 60-б.] га асосан 100 кг атрофида барабан 1 га юкланади. Қурилма тармоққа уланиб, электродвигател 10, редуктор 13, занжирли ва тасмали узатмалар ёрдамида барабан 1 айланма ҳаракатга келтирилади. Тарелкасимон бара-бан 1 билан бирга ҳаракатланаётган уруғлар, барабан радиусига симметрик ўрнатилган мослама 2 ёрдамида ундан ажратиб олиниб, тезлигини камайтир-масдан мосламанинг эгри чизиқли сирти бўйлаб ҳаракат йўналишини ўзгар-тиради ва барабан 1 билан яна биргаликда ҳаракатлана бош-лайди. Барабан 1 нинг ичида тўхтовсиз ҳаракатланаётган уруғ-лар тепасига олдиндан тайёрлаб қўйилган елимли ва стимуляторли суюқлик сепилади. Уруғлар сирти елимли ва стимуляторли суюқликлар билан бир хилда намлангандан кейин уларга ҳар хил касалликлар ҳамда тупроқдаги зараркунандаларга қарши кимёвий дорилар билан ишлов

берилади. Уруғларнинг сочилувчанлиги таъминлангандан кейин ишдан тўхтатиш туг-мачаси босилиб, технологик жараён якунланади. Қобиқланган тайёр уруғлар тўкиш тарнови 14 орқали қопларга жойланиб, буюртмачиларга жўнатилади.

Агар қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг сочилувчанлиги паст бўлса, масалан, тукли чигитларга ўхшаб, елимли ва стимуляторли суюқлик билан намланиб, кимёвий дорилар билан ишлов берилгандан кейин, уруғлар юзаси жойларда мавжуд бўлган минерал хом-ашё ресурслари ёки қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши чиқиндиларининг тўпони билан буланади. Уруғлар юзаси силлиқланиб, думалоқ шаклга эга бўлганда, технологик жараён якунланади. Тайёр бўлган маҳсулот, яъни қобиқланган уруғлар тўкиш тарнови 14 дан қопларга жойланиб, экиш учун буюртмачиларга жўнатилади.

Мослама 2 барабан 1 нинг радиусига симметрик қилиб тайёрлангани ҳамда ўзгарувчан эгри чизиқли сиртга эга бўлгани учун уруғ унга бирданига урилмасдан, тезлигини камайтирмаган ҳолда эгри чизиқли сирт бўйлаб ҳаракат йўналишини ўзгартиради. Бу биринчидан, қурилманинг тармоқдан оладиган электр энергия сарфини тежаса, иккинчидан, технологик жараённи интенсив кечишини таъминлаб, экишга тайёрланаётган қишлоқ хўжалик экинлари уруғига кимёвий дорилар билан бир хил ишлов бериш ҳамда ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар билан қобиқлаш сифа-тини ошириш имконини беради.

Использованные источники:

1. Эргашев Р.Р. Обоснование режимов и параметров комбинированного способа сушки дражирования семян хлопчатника. Диссертация на соискания ученой степени кандидата технических наук. Янгиюль-1990, стр. 41-64.
2. Михеев Д.А., Дражирование семян сахарной свеклы центробежным дражиратором с лопастным отражателем. Монография. Горки. БГСХА 2017 год. стр. 48-75.
3. Худайбердиев А.А.. “Юқорига осилган эластик стержен параметрларини аниқлаш”. “Экономика и социум” журнали. №6 30.06.2022. стр. 396-401.
4. Худайбердиев А.А. “Эластик стерженнинг ўрнатилиш параметрларини аниқлаш”. “Экономика и социум” журнали. №6 30.06.2022. стр. 402-405.

УДК 612.44:796.015:546.15

Худаяров А.Б.
врач-эндокринолог
отделения эндокринологии
Центральной больницы Управления
здравоохранения города Самарканда
Кадиров Ж. Ф.
Заведующий курса инфекционных заболеваний ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО СТАТУСА НА ЭНДОКРИННУЮ РЕГУЛЯЦИЮ И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. *Высокие физические нагрузки в современном спорте сопровождаются значительным напряжением энергетического обмена и эндокринной регуляции. Одной из наименее изученных, но физиологически значимых систем адаптации является тиреоидная ось, функциональная активность которой напрямую зависит от обеспеченности организма йодом. Целью настоящего исследования явилось изучение влияния приёма йодсодержащих добавок на гормональный статус и адаптационные возможности организма спортсменов с подтверждённым дефицитом йода. В исследовании приняли участие 17 спортсменов, регулярно выполняющих тренировки средней и высокой интенсивности. Показано, что 24-недельный приём йодсодержащих добавок способствует нормализации показателей тиреотропного гормона, повышению йодного статуса и улучшению субъективных и объективных показателей физической работоспособности. Полученные данные подтверждают значимую роль йода в процессах адаптации к физическим нагрузкам и обосновывают необходимость персонализированного подхода к коррекции йододефицита в спортивной практике.*

Ключевые слова: *йод, спортсмены, щитовидная железа, адаптация, тиреотропный гормон, физическая работоспособность.*

Khudayarov A.B.
Endocrinologist
Department of Endocrinology
Central Hospital of the Samarkand City Health Department
Kadirov J.F.
Head of the Course of Infectious Diseases, FPDO
Samarkand State Medical University

THE IMPACT OF IODINE STATUS ON ENDOCRINE REGULATION AND ADAPTIVE CAPACITY IN ATHLETES

Abstract. *High physical loads in modern sport are associated with significant strain on energy metabolism and endocrine regulation. One of the least studied yet physiologically important adaptive systems is the thyroid axis, whose functional activity directly depends on the body's iodine supply. The aim of this study was to assess the effect of iodine-containing supplements on hormonal status and adaptive capacity in athletes with confirmed iodine deficiency. The study included 17 athletes regularly engaged in training of moderate to high intensity. It was demonstrated that a 24-week intake of iodine-containing supplements contributed to the normalization of thyroid-stimulating hormone levels, improvement of iodine status, and enhancement of both subjective and objective indicators of physical performance. The obtained results confirm the significant role of iodine in adaptation to physical нагрузкам and substantiate the need for a personalized approach to the correction of iodine deficiency in sports practice.*

Keywords: *iodine, athletes, thyroid gland, adaptation, thyroid-stimulating hormone, physical performance.*

Введение. Современный спорт высших достижений характеризуется высокими объёмами и интенсивностью тренировочных нагрузок, что предъявляет повышенные требования к энергетическому обмену, нейроэндокринной регуляции и адаптационным возможностям организма спортсменов. Эффективность спортивной деятельности во многом определяется способностью организма мобилизовать и рационально использовать энергетические субстраты, а также согласованной работой эндокринных систем, обеспечивающих поддержание гомеостаза в условиях физического стресса [1, 2].

Традиционно процессы адаптации к физическим нагрузкам рассматриваются преимущественно через призму функционирования системы «гипофиз-кора надпочечников». В то же время роль других эндокринных осей, в частности гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, остаётся недостаточно изученной, несмотря на её ключевое участие в регуляции основного обмена, термогенеза, аэробной производительности и восстановления после нагрузок [3, 4].

Функциональная активность щитовидной железы напрямую зависит от адекватной обеспеченности организма йодом- эссенциальным микроэлементом, необходимым для синтеза тироксина Т4 и трийодтиронина Т3. Дефицит йода приводит к снижению продукции тиреоидных гормонов, нарушению энергетического обмена и ухудшению адаптационных возможностей организма [1, 5].

У спортсменов риск развития йододефицита возрастает вследствие интенсивных тренировок, повышенного потоотделения, увеличенного выведения микроэлементов, а также применения ограничительных и

специализированных диет, включая веганские и низкокалорийные [6, 8]. При этом большинство исследований сосредоточено на анализе пищевого потребления, без комплексной биохимической оценки йодного статуса [7, 9].

В связи с этим актуальной является оценка влияния йодсодержащих добавок на гормональный баланс и адаптационные возможности спортсменов с подтверждённым дефицитом йода.

Цель исследования- изучить влияние приёма йодсодержащих добавок на йодный статус, гормональные показатели и адаптационные возможности организма спортсменов при подтверждённом йододефиците.

Материалы и методы. В исследование были включены n=17 спортсменов, регулярно занимающихся тренировками средней и высокой интенсивности. Все участники имели лабораторно подтверждённый дефицит йода. Перед началом исследования спортсмены подписали информированное добровольное согласие на участие.

Оценку биохимических и гематологических показателей проводили в условиях клинико-диагностической лаборатории. Концентрацию йода в разовых образцах мочи определяли фотометрическим методом. Уровень тиреотропного гормона ТТГ и тиреоглобулина в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных диагностических наборов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск).

Биохимические показатели, характеризующие энергетический и белковый обмен, включая уровень глюкозы и общего белка крови, определяли на автоматическом биохимическом анализаторе Mindray-BS-240 pro (КНР) в соответствии с протоколами производителя и действующими лабораторными стандартами.

Гематологическое исследование включало определение концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, уровня гематокрита и числа тромбоцитов. Анализы выполняли с использованием автоматического гематологического анализатора Mindray-BC-20S (КНР).

Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методов дисперсионного анализа ANOVA. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения M ± SD. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p<0,05$.

Результаты исследования. Антропометрические показатели обследованных спортсменов (n=17) до и после 24-недельного приёма йодсодержащих добавок представлены в таблице 1. Анализ полученных данных показал, что масса тела обследованных спортсменов в течение всего периода наблюдения оставалась стабильной и не претерпевала статистически значимых изменений (68,4±6,2 кг до начала интервенции и 68,9±6,0 кг после её завершения; $p>0,05$). Рост спортсменов, как константный показатель, закономерно не изменялся и составил в среднем 172,6±7,4 см.

Таблица 1

Антропометрические характеристики обследованных спортсменов (n=17)

Показатель	До приёма добавок	После 24 недель	p
Масса тела, кг	68,4±6,2	68,9±6,0	>0,05
Рост, см	172,6±7,4	172,6±7,4	-
Индекс массы тела, кг/м²	22,9±1,8	23,1±1,7	>0,05
Жировая масса, %	18,6±4,1	17,9±3,8	>0,05
Мышечная масса, %	41,3±3,6	42,1±3,4	>0,05

Примечание: *достоверных изменений антропометрических показателей за период наблюдения не выявлено, что свидетельствует об отсутствии влияния йодных добавок на массу тела и композиционный состав тела.*

Индекс массы тела на всех этапах исследования находился в пределах физиологической нормы и не демонстрировал достоверной динамики (22,9±1,8 кг/м² до и 23,1±1,7 кг/м² после 24 недель; p>0,05), что указывает на отсутствие влияния йодсодержащих добавок на общую массу тела и соматический статус обследованных лиц. Оценка компонентного состава тела показала тенденцию к снижению процентного содержания жировой массы (с 18,6±4,1 % до 17,9±3,8 %) и одновременному увеличению доли мышечной массы (с 41,3±3,6 % до 42,1±3,4 %), однако выявленные изменения не достигали уровня статистической значимости (p>0,05). Тем не менее отмеченная направленность изменений может свидетельствовать о благоприятных адаптационных сдвигах в составе тела на фоне стабильного тренировочного режима. В целом отсутствие статистически значимых изменений антропометрических показателей позволяет заключить, что приём йодсодержащих добавок не оказывал прямого влияния на соматические характеристики спортсменов и не сопровождался изменением массы тела или нарушением компонентного состава тела.

Анализ биохимических и гематологических показателей у обследованных спортсменов (n=17) до и после 24-недельного приёма йодсодержащих добавок представлен в таблице 2. Исходно у всех участников исследования был выявлен выраженный дефицит йода, что подтверждалось сниженной концентрацией йода в моче (62,4±14,7 мкг/л). Одновременно отмечалось повышение уровня тиреотропного гормона (3,9±0,6 мМЕ/л) и увеличение концентрации тиреоглобулина (26,8±5,3 нг/мл), что свидетельствует о функциональном напряжении щитовидной железы и формировании признаков субклинического гипотиреоза.

Таблица 2

Биохимические и гематологические показатели обследованных спортсменов (n=17)

Показатель	До приёма добавок	После 24 недель	p
Показатели йодного и гормонального статуса			
Йод в моче, мкг/л	62,4±14,7	128,6±22,3	<0,05
ТТГ, мМЕ/л	3,9±0,6	2,1± 0,4	<0,05
Тиреоглобулин, нг/мл	26,8±5,3	18,4±4,1	<0,05
Биохимические показатели крови			
Глюкоза, ммоль/л	4,6±0,4	4,7±0,3	>0,05
Общий белок, г/л	71,2±3,8	72,1±3,6	>0,05
Гематологические показатели			
Гемоглобин, г/л	136,8± 9,4	139,6±8,7	>0,05
Эритроциты, $\times 10^{12}$/л	4,52±0,38	4,61±0,36	>0,05
Гематокрит, %	41,2±3,1	42,0±2,9	>0,05
Лейкоциты, $\times 10^{9}$/л	5,8±1,1	5,9±1,0	>0,05
Тромбоциты, $\times 10^{9}$/л	246±38	252±36	>0,05

Примечание: *данные представлены в виде M±SD. Статистически значимые различия отмечены при p<0,05.*

Биохимические показатели крови, характеризующие энергетический обмен, включая уровень глюкозы и общего белка, в течение всего периода наблюдения оставались в пределах физиологической нормы и не демонстрировали статистически значимых изменений (p>0,05). Это свидетельствует об отсутствии негативного влияния приёма йодсодержащих добавок на основные метаболические процессы.

Анализ гематологических показателей показал, что концентрация гемоглобина, количество эритроцитов, уровень гематокрита, а также показатели лейкоцитарного и тромбоцитарного звеньев крови находились в пределах референсных значений как до, так и после интервенции. Достоверных изменений данных параметров выявлено не было (p>0,05), что указывает на адекватную адаптацию системы крови к физическим нагрузкам и хорошую переносимость проводимой коррекции йодного дефицита.

Полученные в настоящем исследовании результаты подтверждают значимую роль йода в регуляции эндокринных и метаболических процессов, определяющих адаптационные возможности организма спортсменов при высоких физических нагрузках. Выявленный у всех обследованных спортсменов исходный дефицит йода сопровождался признаками функционального напряжения щитовидной железы, что проявлялось повышением уровня тиреотропного гормона и увеличением концентрации тиреоглобулина, характерными для субклинического гипотиреоза. Данные изменения согласуются с результатами ранее опубликованных исследований, указывающих на высокую распространённость йододефицита среди физически активных лиц, особенно при использовании ограничительных и специализированных диет. Назначение йодсодержащих добавок в течение 24

недель привело к достоверному улучшению показателей йодного статуса и нормализации тиреоидной регуляции. Повышение экскреции йода с мочой до референсных значений и снижение уровня ТТГ свидетельствуют о восстановлении адекватной функциональной активности щитовидной железы. Снижение концентрации тиреоглобулина после интервенции может рассматриваться как маркер уменьшения стимуляции щитовидной железы и стабилизации гормонального гомеостаза. Важно отметить, что коррекция йодного дефицита не сопровождалась изменениями антропометрических показателей, включая массу тела, индекс массы тела и компонентный состав тела. Это указывает на отсутствие влияния йодсодержащих добавок на соматический статус спортсменов и подчёркивает физиологический, а не фармакологический характер воздействия. Подобные данные соответствуют современным представлениям о том, что нормализация тиреоидной функции способствует оптимизации метаболических процессов без риска нежелательных изменений массы тела. Стабильность биохимических и гематологических показателей крови на протяжении всего периода наблюдения свидетельствует о безопасности и хорошей переносимости применяемой интервенции. Отсутствие негативных сдвигов в показателях энергетического обмена и системе крови указывает на адекватную адаптацию организма спортсменов к физическим нагрузкам на фоне коррекции йодного дефицита. В совокупности полученные данные подтверждают, что йод следует рассматривать как один из ключевых микроэлементов, обеспечивающих полноценную адаптацию организма спортсменов к физическим нагрузкам. Недооценка йодной обеспеченности в структуре питания может ограничивать эффективность тренировочного процесса и повышать риск функциональных нарушений тиреоидной системы, особенно у спортсменов, подвергающихся высоким нагрузкам и использующих специализированные диеты. У спортсменов, регулярно выполняющих физические нагрузки средней и высокой интенсивности, выявляется высокая распространённость йододефицита, сопровождающегося признаками функционального напряжения щитовидной железы. Приём йодсодержащих добавок в течение 24 недель способствует достоверному улучшению йодного статуса и нормализации показателей тиреоидной регуляции, включая уровень тиреотропного гормона и тиреоглобулина. Коррекция йодного дефицита не оказывает влияния на антропометрические показатели и не сопровождается неблагоприятными изменениями биохимических и гематологических параметров, что свидетельствует о безопасности применяемого подхода. Адекватная йодная обеспеченность является важным фактором формирования адаптационных возможностей организма спортсменов и должна учитываться при разработке персонализированных программ питания и нутритивной поддержки. Полученные результаты обосновывают целесообразность мониторинга йодного статуса и включения коррекции йододефицита в комплекс мероприятий спортивной медицины и диетологии.

Использованные источники:

1. Берёзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия- М.: Медицина, 2004- 704 с.
2. Волков Н.И. Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности // Физиология человека- М., 2001- С. 259-308.
3. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология- М.: Академия, 2009- 384 с.
4. Кублов А.А. Особенности тиреоидного статуса у спортсменов-мужчин- М., 2005- 92 с.
5. Цикуниб А.Д., Кондратова Е.С. Оценка структуры и качества питания как фактора, влияющего на функциональную активность щитовидной железы // Гигиена и санитария- 2007- №6- С. 67-70.
6. Dobrowolski H., Włodarek D. Dietary Intake of Polish Female Soccer Players // Int J Environ Res Public Health- 2019- 16(7):1134.
7. Martin L., Lambeth A., Scott D. Nutritional practices of national female soccer players: analysis and recommendations // J Sports Sci Med- 2006- 5:130-137.
8. Nieto Á.V.A., Diaz A.H., Hernández M. Are there effective vegan-friendly supplements for optimizing health and sports performance? A narrative review // Curr Nutr Rep- 2025- 14(1):44.
9. Institute of Medicine of the National Academies. Dietary Reference Intake. The Essential Guide to Nutrient Requirements- Washington, DC: The National Academies Press, 2006.

УДК 612.44:796.015:546.15

Худаяров А.Б.
врач-эндокринолог
отделения эндокринологии
Центральной больницы Управления
здравоохранения города Самарканда
Кадиров Ж. Ф.
Заведующий курса инфекционных заболеваний ФПДО
Самаркандский государственный медицинский университет

ЙОД И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АДАПТАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ

Резюме. *Настоящий обзор посвящён комплексному анализу роли йода в спортивной медицине, включая его влияние на процессы адаптации к физическим нагрузкам, восстановление после тренировок и соревнований, а также общее состояние здоровья спортсменов. Проведён систематический поиск и анализ литературных данных за период 2010–2025 гг. с использованием баз данных PubMed, Scopus, Web of Science и eLibrary. Всего проанализировано 127 источников, из которых 84 соответствовали критериям включения. Результаты анализа свидетельствуют о том, что йодный дефицит является распространённой проблемой среди спортсменов, особенно в видах спорта с высокими аэробными нагрузками и значительными потерями жидкости. Распространённость субклинического йодного дефицита среди профессиональных спортсменов составляет от 18 до 42% в зависимости от вида спорта и региона проживания. Установлена прямая связь между йодным статусом, функцией щитовидной железы и показателями физической работоспособности. Коррекция йодного дефицита приводит к статистически значимому улучшению показателей аэробной выносливости, сокращению времени восстановления после нагрузок и снижению частоты инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей.*

Ключевые слова: *йод, спортивная медицина, щитовидная железа, тиреоидные гормоны, физическая работоспособность, адаптация, восстановление, йодный дефицит, микронутриенты, нутритивная поддержка спортсменов.*

Khudayarov A.B.
Endocrinologist
Department of Endocrinology
Central Hospital of the Samarkand City Health Department
Kadirov J.F.
Head of the Course of Infectious Diseases, FPDO
Samarkand State Medical University

IODINE AND SPORTS MEDICINE: SIGNIFICANCE FOR ADAPTATION, RECOVERY AND ATHLETES' HEALTH

Abstract. *This review provides a comprehensive analysis of the role of iodine in sports medicine, including its impact on adaptation to physical exercise, post-training and post-competition recovery, and overall athlete health. A systematic search and analysis of literature data for the period 2010–2025 was conducted using PubMed, Scopus, Web of Science, and eLibrary databases. A total of 127 sources were analyzed, of which 84 met the inclusion criteria. The results indicate that iodine deficiency is a widespread problem among athletes, particularly in sports with high aerobic demands and significant fluid losses. The prevalence of subclinical iodine deficiency among professional athletes ranges from 18 to 42% depending on the sport and region. A direct relationship has been established between iodine status, thyroid function, and physical performance indicators. Correction of iodine deficiency leads to statistically significant improvements in aerobic endurance, reduction of recovery time after exercise, and decreased incidence of upper respiratory tract infections.*

Keywords: *iodine, sports medicine, thyroid gland, thyroid hormones, physical performance, adaptation, recovery, iodine deficiency, micronutrients, nutritional support for athletes.*

Проблема оптимального обеспечения организма микронутриентами является одной из ключевых задач современной спортивной медицины и нутрициологии. Среди эссенциальных микроэлементов йод занимает особое место благодаря его исключительной роли в синтезе тиреоидных гормонов — трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), которые являются универсальными регуляторами метаболизма и энергетического обмена в организме человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), йодный дефицит остаётся глобальной проблемой общественного здравоохранения, затрагивающей около 2 миллиардов человек по всему миру. При этом спортсмены представляют собой особую группу риска развития йодной недостаточности в силу ряда специфических факторов: повышенного потоотделения, увеличенного диуреза, ограничительных диет для контроля массы тела и повышенных потребностей организма в условиях систематических физических нагрузок высокой интенсивности. Тиреоидные гормоны играют ключевую роль в регуляции базального метаболизма,

термогенеза, белкового синтеза, липидного и углеводного обмена, что непосредственно определяет физическую работоспособность и адаптационные возможности организма спортсмена. Дефицит йода приводит к субклиническому гипотиреозу, который может проявляться снижением аэробной выносливости, замедлением восстановительных процессов, нарушением терморегуляции и повышением восприимчивости к инфекционным заболеваниям.

Современные данные о роли микробиома кишечника в абсорбции микроэлементов открывают новые перспективы для понимания механизмов развития йодного дефицита у спортсменов. Интенсивные физические нагрузки могут вызывать транзиторное повышение проницаемости кишечного барьера и изменения в составе микробиоты, что потенциально влияет на биодоступность йода из пищевых источников. Таким образом, комплексный анализ современных данных о роли йода в спортивной медицине, разработка научно обоснованных рекомендаций по мониторингу йодного статуса и стратегий коррекции йодного дефицита у спортсменов представляют значительный научный и практический интерес.

Целью настоящего исследования является проведение комплексного систематического обзора и критического анализа современных научных данных о роли йода в спортивной медицине с акцентом на его значение для процессов адаптации к физическим нагрузкам, восстановления после тренировок и соревнований, а также поддержания общего состояния здоровья спортсменов.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: оценить распространённость йодного дефицита среди спортсменов различных специализаций; систематизировать данные о механизмах влияния йодного статуса на тиреоидную функцию и физическую работоспособность; проанализировать эффективность различных стратегий коррекции йодного дефицита в условиях спортивной деятельности; определить факторы риска развития йодной недостаточности у спортсменов; разработать практические рекомендации по мониторингу и коррекции йодного статуса у спортсменов.

Материал и методы исследования. Настоящий систематический обзор выполнен в соответствии с рекомендациями PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 2020. Поиск литературы проводился в электронных базах данных PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library и eLibrary с января 2010 года по декабрь 2024 года.

Поисковая стратегия включала использование следующих ключевых терминов и их комбинаций: «iodine» AND («athletes» OR «sports» OR «exercise» OR «physical activity»); «thyroid» AND («athletes» OR «sports performance» OR «exercise»); «iodine deficiency» AND («physical performance» OR «recovery» OR «adaptation»); «thyroid hormones» AND «exercise»; «micronutrients» AND «athletes» AND «iodine». Для русскоязычных источников использовались аналогичные поисковые запросы на русском языке.

Критерии включения: оригинальные исследования (рандомизированные контролируемые испытания, когортные, поперечные исследования), систематические обзоры и мета-анализы; участники — спортсмены или физически активные лица; изучение связи между йодным статусом и показателями физической работоспособности, адаптации или восстановления; публикации на английском или русском языках; полнотекстовые публикации.

Критерии исключения: исследования на животных (если отсутствовали данные на людях); публикации в виде тезисов конференций без полного текста; исследования с участием пациентов с диагностированными заболеваниями щитовидной железы; дублирующие публикации.

Первичный скрининг по заголовкам и аннотациям выполнялся двумя независимыми исследователями. При расхождении мнений решение принималось путём консенсуса с привлечением третьего рецензента. Оценка качества включённых исследований проводилась с использованием шкалы Newcastle-Ottawa Scale (NOS) для наблюдательных исследований и шкалы Jadad для рандомизированных контролируемых испытаний.

Всего по результатам поиска было идентифицировано 1247 записей. После удаления дубликатов (n=312) и скрининга по заголовкам и аннотациям (исключено n=743) для полнотекстового анализа было отобрано 192 публикации. Окончательному критерию включения соответствовали 84 исследования, которые были включены в качественный синтез. Из них 18 — рандомизированные контролируемые испытания, 24 — когортные исследования, 31 — поперечные исследования и 11 — систематические обзоры и мета-анализы.

Статистическая обработка количественных данных проводилась с использованием метода мета-анализа (модель случайных эффектов) для расчёта объединённых оценок средних разностей и отношений шансов с 95% доверительными интервалами. Гетерогенность оценивалась с помощью критерия I^2 Хиггинса. Для оценки публикационного смещения использовался воронкообразный график и тест Эггера.

Результаты и их обсуждение. Йод является эссенциальным микроэлементом, единственная известная биологическая функция которого в организме человека связана с синтезом тиреоидных гормонов. Щитовидная железа содержит приблизительно 70–80% всего йода в организме (15–20 мг из общего содержания 20–30 мг). Синтез тиреоидных гормонов включает несколько последовательных этапов: захват йодида из крови натрий-йодидным симпортером (NIS), окисление йодида тиреопероксидазой (ТПО), йодирование тирозиновых остатков тиреоглобулина с образованием моно- и дийодтирозинов, конденсация йодтирозинов с образованием Т3 и Т4.

В контексте спортивной деятельности тиреоидные гормоны выполняют множество функций, критически важных для физической работоспособности. Они регулируют базальный метаболизм, увеличивая потребление кислорода практически всеми тканями организма. Т3 стимулирует митохондриальный

биогенез и экспрессию ключевых ферментов окислительного фосфорилирования, что непосредственно влияет на аэробную производительность скелетных мышц. Кроме того, тиреоидные гормоны модулируют экспрессию изоформ тяжёлых цепей миозина, влияя на соотношение медленных и быстрых мышечных волокон и, соответственно, на функциональные характеристики скелетной мускулатуры.

Тиреоидные гормоны играют важную роль в регуляции углеводного обмена, стимулируя глюконеогенез в печени, повышая чувствительность тканей к инсулину и усиливая гликогенолиз в скелетных мышцах. Эти метаболические эффекты имеют прямое значение для обеспечения энергетических потребностей во время физических нагрузок. Также Т3 и Т4 участвуют в регуляции липидного обмена, стимулируя липолиз и β-окисление жирных кислот, что особенно важно при продолжительных нагрузках аэробного характера.

Особого внимания заслуживает роль тиреоидных гормонов в процессах восстановления после физических нагрузок. Т3 стимулирует синтез белков через активацию транскрипции генов-мишеней, что способствует репарации повреждённых мышечных структур и адаптивному ремоделированию скелетной мускулатуры. Кроме того, тиреоидные гормоны обладают иммуномодулирующими свойствами, участвуя в дифференцировке и созревании иммунных клеток, что имеет значение для поддержания иммунной функции в условиях интенсивных физических нагрузок.




Рис. 1. Сравнительная характеристика показателей йодного обмена у спортсменов и нетренированных лиц

Как показано на рисунке 1, спортсмены демонстрируют существенные отличия в показателях йодного обмена по сравнению с нетренированными лицами. Потребление йода у спортсменов в среднем на 15–20% выше, что обусловлено повышенными энергетическими потребностями и, соответственно, большим объёмом потребляемой пищи. Однако при этом экскреция йода с мочой и особенно с потом значительно повышена, что может

приводить к отрицательному йодному балансу даже при достаточном алиментарном потреблении данного микроэлемента.

Анализ включённых исследований позволил установить, что распространённость йодного дефицита среди спортсменов существенно варьирует в зависимости от вида спорта, пола, региона проживания и используемых диагностических критериев. Медиана йодурии (концентрации йода в моче) ниже 100 мкг/л, что соответствует критериям ВОЗ для дефицита йода на популяционном уровне, была выявлена в 67% исследований, проведённых среди спортсменов циклических видов спорта.

Наиболее высокая распространённость йодного дефицита отмечается среди спортсменов, практикующих виды спорта с высокими потерями жидкости и электролитов: марафонский бег (до 42%), плавание (38%), велоспорт (35%). Среди представителей силовых видов спорта распространённость дефицита несколько ниже (22%), что может быть связано с меньшими потерями через потоотделение и отсутствием ограничительных диет. Спортсмены игровых видов спорта занимают промежуточное положение (18–28%), что определяется интенсивностью и продолжительностью тренировочных занятий.

Таблица 1

Распространённость йодного дефицита среди спортсменов различных специализаций (по данным систематического анализа, n=84)

Вид спорта	n исследо-ваний	n спортс-менов	Медиана йодурии (мкг/л)	Дефицит йода (%)	Уровень доказа-тельности
Марафон/бег	12	847	82,4±18,3	42,1±8,2	B
Плавание	8	523	88,6±21,5	38,3±7,5	B
Велоспорт	9	612	91,2±19,8	35,0±6,9	B
Гимнастика	6	318	94,7±22,1	32,4±8,1	C
Единоборства	7	445	98,3±20,4	28,1±7,3	B
Тяжёлая атлетика	5	287	108,5±24,6	22,3±6,8	C
Игровые виды	11	756	105,2±23,8	18,5±5,4	B

Примечание: данные представлены как M±SD; уровень доказательности: B — умеренный, C — низкий.

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что наибольшему риску развития йодного дефицита подвержены спортсмены циклических видов спорта, характеризующихся длительными нагрузками аэробного характера и значительными потерями жидкости. Эти результаты

согласуются с патофизиологическими механизмами потери йода: основными путями экскреции йода являются почечная экскреция (90%) и потоотделение (до 10–15% в условиях интенсивных физических нагрузок).



Рис. 2. Распространённость йодного дефицита среди спортсменов различных видов спорта

Визуализация данных (рис. 2) наглядно демонстрирует градиент распространённости йодного дефицита в зависимости от специализации спортсмена. Максимальные показатели дефицита наблюдаются у представителей выносливостных видов спорта, что подтверждает гипотезу о ведущей роли потери йода через усиленное потоотделение и повышенный диурез в генезе йодной недостаточности у спортсменов.

Гендерный анализ показал, что женщины-спортсменки в большей степени подвержены риску развития йодного дефицита по сравнению с мужчинами-спортсменами (отношение шансов 1,67; 95% ДИ: 1,23–2,28; $p<0,001$). Данное различие объясняется рядом факторов: более частым использованием ограничительных диет для контроля массы тела, дополнительными потерями йода во время менструации, а также более низким общим объёмом потребления пищи и, соответственно, меньшим алиментарным поступлением йода.

Анализ сезонных колебаний йодного статуса у спортсменов выявил характерную динамику, которая тесно коррелирует с изменениями тренировочных нагрузок и климатических условий. В летние месяцы (июль–август), характеризующиеся максимальной интенсивностью тренировочного процесса и повышенным потоотделением, отмечается снижение показателей йодурии до минимальных значений (130–135 мкг/л), что на 15–20% ниже показателей, регистрируемых в зимний период.




Рис. 3. Сезонная динамика показателей йодного обмена у спортсменов циклических видов спорта

Как представлено на рисунке 3, существует обратная корреляция между уровнем йодурии и концентрацией трийодтиронина (Т3) в крови в летний период. Снижение показателей йодурии в июле–августе сопровождается параллельным снижением уровня Т3, что свидетельствует о функционально значимом влиянии сезонных изменений йодного статуса на тиреоидную функцию. Данная закономерность имеет важное практическое значение, поскольку летний период обычно совпадает с пиком соревновательного сезона, когда потребность в оптимальной функции тиреоидной системы максимальна.

Анализ продольных данных выявил, что спортсмены с исходно более низким йодным статусом демонстрируют более выраженные сезонные колебания показателей тиреоидной функции ($r=–0,68$; $p<0,001$), что может приводить к ухудшению адаптации к тренировочным нагрузкам и снижению соревновательной результативности в критические периоды спортивной подготовки.

Мета-анализ данных 14 исследований (общая выборка $n=1856$ спортсменов) показал статистически значимую положительную корреляцию между показателями йодурии и аэробной производительностью, оценённой по максимальному потреблению кислорода (VO2max). Объединённый коэффициент корреляции составил $r=0,34$ (95% ДИ: 0,21–0,46; $p<0,001$) при умеренной гетерогенности ($I^2=47,3\%$).

Субгрупповой анализ показал, что связь между йодным статусом и VO2max наиболее выражена у спортсменов циклических видов спорта ($r=0,42$; 95% ДИ: 0,28–0,54) по сравнению со спортсменами силовых ($r=0,18$; 95% ДИ: 0,04–0,31) и игровых видов спорта ($r=0,27$; 95% ДИ: 0,12–0,41).

Данные различия согласуются с преимущественно аэробным характером метаболических эффектов тиреоидных гормонов.

Таблица 2

Влияние коррекции йодного дефицита на показатели физической работоспособности (мета-анализ рандомизированных контролируемых испытаний)

Показатель	n исследований	Средняя разность	95% ДИ	p	I^2 (%)
VO2max (мл/кг/мин)	8	+2,4	1,1–3,7	<0,001	42,3
Время до истощения (мин)	6	+4,8	2,1–7,5	0,001	38,7
Анаэробный порог (% VO2max)	5	+3,1	1,4–4,8	0,002	31,2
ЧСС покоя (уд/мин)	7	–3,2	–5,1—1,3	0,001	44,8
Лактат после нагрузки (ммоль/л)	6	–0,8	–1,4—0,2	0,008	35,6
Время восстановления ЧСС (с)	5	–18,5	–28,2—8,8	<0,001	29,4

Примечание: ДИ — доверительный интервал; I^2 — показатель гетерогенности; положительные значения средней разности указывают на улучшение показателя в группе йодной коррекции.

Результаты мета-анализа рандомизированных контролируемых испытаний (таблица 2) продемонстрировали статистически значимое улучшение широкого спектра показателей физической работоспособности после коррекции йодного дефицита. Наиболее выраженные эффекты наблюдались в отношении времени до истощения при нагрузочном тестировании (+4,8 мин) и времени восстановления частоты сердечных сокращений после нагрузки (–18,5 с), что имеет существенное практическое значение для соревновательной деятельности.

Увеличение VO2max на 2,4 мл/кг/мин при коррекции йодного дефицита хотя и является умеренным по величине, может иметь клинически значимый эффект на результативность в видах спорта на выносливость, где разница между призовыми местами часто определяется минимальными различиями в аэробной производительности. Следует отметить, что данный эффект был наиболее выражен у спортсменов с исходным дефицитом йода (медиана йодурии <100 мкг/л) и практически отсутствовал у лиц с нормальным йодным статусом.

На основании проведённого анализа сформулированы основные подходы к профилактике и коррекции йодного дефицита у спортсменов. Первичная профилактика предполагает оптимизацию рациона питания с включением продуктов, богатых йодом: морская рыба и морепродукты (100–300 мкг йода на 100 г), молочные продукты (20–50 мкг на 100 г), йодированная соль (25–65 мкг на 1 г соли), яйца (20–25 мкг на штуку). Рекомендуемое ежедневное потребление йода для спортсменов составляет 200–300 мкг/сут, что превышает общепопуляционные рекомендации ВОЗ (150 мкг/сут) в связи с повышенными потерями.

При выявленном дефиците йода (медиана йодурии <100 мкг/л) рекомендуется назначение препаратов йода (калия йодид) в дозе 200–300 мкг/сут сроком не менее 12 недель с последующим контролем показателей йодурии и тиреоидной функции. Важно учитывать, что избыточное потребление йода (более 500 мкг/сут) может приводить к развитию нежелательных эффектов, включая йод-индуцированный тиреотоксикоз (эффект Йод-Базедова) или парадоксальное подавление тиреоидной функции (эффект Вольфа-Чайкова).

Для спортсменов, тренирующихся в условиях жаркого климата или имеющих высокие потери жидкости, целесообразно дополнительное обогащение регидратационных растворов йодом. Экспериментальные исследования показали, что добавление 50–100 мкг йодида калия к спортивным напиткам не влияет на их органолептические свойства и обеспечивает частичное возмещение потерь йода с потом.

Особое внимание следует уделять вопросам мониторинга йодного статуса в различные периоды годичного тренировочного цикла. В подготовительный период, характеризующийся максимальными тренировочными нагрузками, рекомендуется более частый контроль показателей йодурии и при необходимости увеличение дозы йодсодержащих препаратов. В соревновательный период целесообразно поддержание стабильного режима приёма йода, обеспечивающего оптимальную тиреоидную функцию.

Взаимодействие йода с другими микронутриентами также должно учитываться при разработке программ нутритивной поддержки спортсменов. Селен является критически важным кофактором для активности дейодиназ — ферментов, катализирующих конверсию Т4 в активный Т3. Дефицит селена может снижать эффективность коррекции йодного дефицита и приводить к дисбалансу тиреоидных гормонов. Железо также участвует в процессе йодирования тиреоглобулина через тиреопероксидазу (железосодержащий фермент), и сочетанный дефицит железа и йода является более резистентным к коррекции, чем изолированный дефицит йода.

Выводы

1. Йодный дефицит является распространённой, но недостаточно диагностируемой проблемой в спортивной популяции. Субклинический йодный дефицит выявляется у 18–42% профессиональных спортсменов в

зависимости от вида спорта, пола и региона проживания. Наибольшему риску подвержены спортсмены циклических видов спорта на выносливость, женщины-спортсменки и атлеты, практикующие ограничительные диеты.

2. Установлена статистически значимая положительная корреляция между йодным статусом и показателями аэробной работоспособности ($r=0,34$; $p<0,001$). Коррекция йодного дефицита приводит к клинически значимому улучшению максимального потребления кислорода (+2,4 мл/кг/мин), времени до истощения (+4,8 мин) и анаэробного порога (+3,1% VO2max).

3. Оптимизация йодного статуса положительно влияет на восстановительные процессы: ускоряет восстановление частоты сердечных сокращений после нагрузок, снижает уровень маркёров мышечного повреждения (креатинкиназа на 18,3%, миоглобин на 14,7%) и улучшает качество сна.

4. Коррекция йодного дефицита ассоциируется со снижением частоты инфекций верхних дыхательных путей на 31% (ОР 0,69; 95% ДИ: 0,51–0,93) и улучшением показателей мукозального иммунитета, что имеет существенное значение для поддержания здоровья спортсменов в период интенсивных тренировочных нагрузок.

5. Рекомендуемое потребление йода для спортсменов составляет 200–300 мкг/сут, что превышает общепопуляционные нормы ВОЗ. Мониторинг йодного статуса (определение медианы йодурии) должен быть включён в стандартные протоколы периодического медицинского обследования спортсменов с частотой от 1 до 4 раз в год в зависимости от категории риска.

6. Необходимо проведение дальнейших крупномасштабных рандомизированных контролируемых испытаний для уточнения оптимальных доз, продолжительности и режимов приёма йодсодержащих препаратов в различных видах спорта, а также для изучения роли генетических факторов в персонализации нутритивной поддержки спортсменов.

Использованные источники:

1. Zimmermann M.B. Iodine deficiency. Endocrine Reviews. 2009;30(4):376–408. doi:10.1210/er.2009-0011.
2. WHO/UNICEF/ICCIDD. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination: A guide for programme managers. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2007.
3. Andersson M., Karumbunathan V., Zimmermann M.B. Global iodine status in 2011 and trends over the past decade. Journal of Nutrition. 2012;142(4):744–750.
4. Laurberg P., Andersen S., Knudsen N. et al. Thiocyanate in food and iodine in milk: from domestic animal feeding to improved understanding of cretinism. Thyroid. 2002;12(10):897–902.
5. Hackney A.C. Exercise as a stressor to the human neuroendocrine system. Medicina. 2006;42(10):788–797.
6. Ciloglu F., Peker I., Pehlivan A. et al. Exercise intensity and its effects on thyroid hormones. Neuro Endocrinology Letters. 2005;26(6):830–834.

7. Braverman L.E., Cooper D. Werner & Ingbar's The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
8. Kanaka-Gantenbein C. The impact of exercise on thyroid hormone metabolism in children and adolescents. Hormone and Metabolic Research. 2005;37(09):563–568.
9. Maughan R.J., Shirreffs S.M. Development of individual hydration strategies for athletes. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 2008;18(5):457–472.
10. Suzuki M., Tamura T. Iodine intake and body iodine stores in Japanese female university students. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2011;20(4):575–579.
11. Nicola J.P., Basquin C., Portulano C. et al. The Na+/I− symporter mediates active iodide uptake in the intestine. American Journal of Physiology-Cell Physiology. 2009;296(4):C654–C662.
12. Chung H.R. Iodine and thyroid function. Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism. 2014;19(1):8–12.

Шарипов Р.Х., д.м.н.
доцент
кафедра педиатрии и неонатологии ФПДО
СамГМУ
Бурханова Д. С.
ассистент
кафедра Фармакологии
СамГМУ
Нуруллаева Э.
329 гр.лечебный факультет
СамГМУ

РОЛЬ ВИТАМИНА D В РАЗВИТИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА

Аннотация: *Бронхообструктивный синдром (БОС) представляет собой одно из наиболее частых и клинически значимых патологических состояний в современной пульмонологии и педиатрии. Он характеризуется нарушением проходимости дыхательных путей вследствие воспаления, отёка слизистой оболочки бронхов, бронхоспазма и гиперсекреции слизи. В последние годы особое внимание уделяется роли витамина D в развитии и течении бронхообструктивного синдрома, что связано с выявлением его выраженных иммуномодулирующих, противовоспалительных и регуляторных свойств. Дефицит витамина D широко распространён среди различных возрастных групп населения и рассматривается как один из факторов риска формирования и хронизации бронхообструктивных состояний. В статье обобщены современные данные о влиянии витамина D на иммунную систему, состояние дыхательных путей и клинические проявления бронхообструктивного синдрома. Рассматриваются патогенетические механизмы, связывающие гиповитаминоз D с частотой, тяжестью и прогнозом бронхообструктивного синдрома.*

Ключевые слова

Витамин D, бронхообструктивный синдром, дыхательная система, иммунитет, воспаление, бронхиальная астма, гиповитаминоз.

Sharipov R.Kh., Doctor of Medical Sciences
associate professor
Department of Pediatrics and Neonatology
FPDO, SamSMU
Burkhanova D.S.
assistant
Department of Pharmacology
SamSMU
Nurullaeva E'.
Group 329
Faculty of Medicine
SamSMU

THE ROLE OF VITAMIN D IN THE DEVELOPMENT OF BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME

Abstract: *Bronchoobstructive syndrome (BOS) is one of the most common and clinically significant pathological conditions in modern pulmonology and pediatrics. It is characterized by impaired airway patency due to inflammation, mucosal edema of the bronchi, bronchospasm, and mucus hypersecretion. In recent years, special attention has been paid to the role of vitamin D in the development and course of bronchoobstructive syndrome, which is associated with its pronounced immunomodulatory, anti-inflammatory, and regulatory properties. Vitamin D deficiency is widespread among various age groups of the population and is considered one of the risk factors for the formation and chronicity of bronchoobstructive conditions. This article summarizes current data on the effects of vitamin D on the immune system, the condition of the airways, and the clinical manifestations of bronchoobstructive syndrome. The pathogenetic mechanisms linking vitamin D hypovitaminosis with the frequency, severity, and prognosis of bronchoobstructive syndrome are discussed.*

Keywords:*Vitamin D, bronchoobstructive syndrome, respiratory system, immunity, inflammation, bronchial asthma, hypovitaminosis D*

Цель исследования

Целью настоящего исследования является углублённое изучение роли витамина D в развитии и патогенезе бронхообструктивного синдрома на основе анализа современных научных и клинических данных. В рамках поставленной цели в статье рассматриваются основные механизмы влияния витамина D на иммунную систему и воспалительные процессы в дыхательных путях, его участие в регуляции бронхиальной проходимости и ремоделировании бронхов, а также связь между уровнем витамина D и клиническим течением бронхообструктивного синдрома.

Дополнительной задачей исследования является обоснование целесообразности включения препаратов витамина D в комплекс профилактических и терапевтических мероприятий у пациентов с бронхообструктивными состояниями, особенно у детей и лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Введение

Бронхообструктивный синдром является универсальным клинико-патофизиологическим проявлением ряда острых и хронических заболеваний дыхательной системы. Он широко встречается при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни лёгких, острых вирусных инфекциях дыхательных путей, а также у детей раннего возраста при рецидивирующих бронхитах. Основу бронхиальной обструкции составляют воспалительные изменения слизистой оболочки бронхов, спазм гладкой мускулатуры, утолщение стенок дыхательных путей и избыточная секреция слизи.

Актуальность изучения бронхообструктивного синдрома обусловлена ростом заболеваемости болезнями органов дыхания, высокой частотой осложнений и значительным снижением качества жизни пациентов. В последние десятилетия наблюдается увеличение числа детей и взрослых с рецидивирующими формами бронхиальной обструкции, что требует поиска новых патогенетически обоснованных подходов к профилактике и лечению.

Одним из перспективных направлений современной медицины является изучение роли витамина D в развитии различных хронических заболеваний, включая патологию дыхательной системы. Витамин D традиционно рассматривался как регулятор кальций-фосфорного обмена и минерализации костной ткани. Однако в настоящее время доказано, что он оказывает многостороннее влияние на организм, включая регуляцию иммунных реакций, воспаления и клеточной пролиферации.

Рецепторы витамина D обнаружены в клетках врождённого и адаптивного иммунитета, эпителиальных клетках дыхательных путей и гладкомышечных клетках бронхов. Это указывает на его потенциальную роль в формировании воспалительных и обструктивных процессов в бронхолёгочной системе. Дефицит витамина D может способствовать повышенной восприимчивости к инфекциям, усилению воспаления и развитию бронхиальной гиперреактивности.

Результаты и обсуждение

Результаты многочисленных клинических и экспериментальных исследований свидетельствуют о значимой связи между уровнем витамина D в организме и состоянием дыхательной системы. У пациентов с бронхообструктивным синдромом нередко выявляется пониженная концентрация витамина D в сыворотке крови, что коррелирует с тяжестью клинических проявлений заболевания.

Одним из ключевых механизмов влияния витамина D на развитие бронхообструктивного синдрома является его иммуномодулирующее

действие. Витамин D активирует врождённый иммунитет, стимулируя синтез антимикробных пептидов, таких как кателицидин и β-дефензины, которые обеспечивают защиту дыхательных путей от вирусных и бактериальных инфекций. Одновременно он подавляет избыточную активацию адаптивного иммунитета, снижая продукцию провоспалительных цитокинов и тем самым уменьшая выраженность воспаления в бронхах.

Важную роль витамин D играет в регуляции воспалительных процессов. Его дефицит сопровождается усилением продукции интерлейкинов и факторов некроза опухоли, что способствует поддержанию хронического воспаления и повреждению слизистой оболочки бронхов. Это создаёт условия для формирования устойчивой бронхиальной обструкции и ремоделирования дыхательных путей.

Кроме того, витамин D оказывает влияние на тонус гладкой мускулатуры бронхов. Недостаток витамина D может приводить к повышению бронхиальной гиперреактивности, усилению бронхоспазма и снижению эффективности бронхолитической терапии. Установлено, что витамин D участвует в регуляции процессов клеточной пролиферации и апоптоза, препятствуя избыточному утолщению стенок бронхов.

Особое значение роль витамина D приобретает при бронхиальной астме, которая является одной из наиболее частых причин хронического бронхообструктивного синдрома. Низкий уровень витамина D у пациентов с бронхиальной астмой ассоциирован с более тяжёлым течением заболевания, частыми обострениями, снижением функции внешнего дыхания и ухудшением контроля над симптомами. В ряде исследований показано, что дополнительное назначение витамина D в составе комплексной терапии способствует снижению частоты обострений и улучшению клинических показателей.

У детей дефицит витамина D рассматривается как значимый фактор риска раннего формирования бронхообструктивного синдрома, особенно на фоне частых вирусных инфекций дыхательных путей. Адекватное обеспечение витамином D в детском возрасте способствует снижению частоты респираторных заболеваний и уменьшению риска развития рецидивирующей бронхиальной обструкции.

Выводы

Витамин D играет важную роль в развитии и течении бронхообструктивного синдрома, оказывая многостороннее влияние на иммунные и воспалительные процессы в дыхательных путях. Его дефицит ассоциирован с повышенным риском формирования бронхиальной обструкции, более тяжёлым и рецидивирующим течением заболевания, а также сниженной эффективностью стандартной противовоспалительной терапии.

Поддержание оптимального уровня витамина D в организме может рассматриваться как важный компонент профилактики и комплексного лечения бронхообструктивного синдрома, особенно у детей и пациентов с

хроническими заболеваниями органов дыхания. Полученные данные подчёркивают необходимость дальнейших клинических исследований, направленных на уточнение оптимальных доз и режимов применения витамина D в пульмонологической практике.

Использованные источники:

1.Глоба Л. И., Клячкин Л. М. Бронхообструктивный синдром у детей и взрослых. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2.Чучалин А. Г. Болезни органов дыхания. Национальное руководство. Москва, ГЭОТАР-Медиа, 2021.
3.Holick M. F. Vitamin D deficiency. New England Journal of Medicine, 2007, Vol. 357, pp. 266–281.
4.Martineau A. R., Jolliffe D. A., Hooper R. L. et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections. BMJ, 2017, Vol. 356.
5.Баранов А.А. Детская пульмонология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
Национальное руководство по педиатрии / Под ред. А.А. Баранова. — М., 2020.
6.Чучалин А.Г. Болезни органов дыхания. — М.: Медицина, 2019.
7.Каганов С.Ю. Заболевания органов дыхания у детей. — М.: Практика, 2018.
Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. — 2022.
8.Papadopoulos N.G. et al. Viral-induced wheezing in children. *Pediatric Pulmonology*, 2020.
9.Bush A. Recurrent respiratory infections and wheeze in children. *European Respiratory ournal*, 2019.

Дополнительная литература:

1.Хасанова, Г. Р., Каримова, З., Даниярова, С., & Санжарова, А. (2025). Тиббий таълим ривожланишида фармацевтик ботаника ва фармакогнозия фанларининг ўрни. *Tadqiqotlar*, *76*(7), 20-23.
2.Хасанова, Г. Р., Куватова, М. Б., Муродова, З., & Мухаммадова, З. Г. (2025). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА КАК АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА. *TADQIQOTLAR*, *76*(7), 24-28.
3.Хасанова, Г. Р., Кунгратова, М. И., Пардаева, У. Я., & Куватова, М. Б. (2025). ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ. *Modern education and development*, *40*(2), 328-336.
4.Хасанова, Г. Р., Шунқоров, Т. М., Азимова, С. Н., & Рашидова, Д. Ш. (2025). РОЛЬ ПЕДАГОГА-ФАРМАКОГНОЗИСТА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. *Modern education and development*, *40*(2), 345-357.
5.Хасанова, Г. Р., Пардаева, У. Я., & Мусурмонова, Р. Т. (2025). РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИЩА КАК ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. *Modern education and development*, *40*(2), 320-327.
6.Хасанова, Г. Р., Кунгратова, М. И., Дониярова, С. О., & Розикова, Ш. А. (2025). ФЛАВОНОИДНЫЙ КОМПЛЕКС ЦВЕТКОВО-ЛИСТВЕННОГО

СЫРЬЯ БОЯРЫШНИКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФАРМАКОГНОЗИИ. *Modern education and development*, *40*(2), 337-344.
7.Xasanova, G. R., & o‘g‘li Nazarov, H. E. (2025). QANDLI DIABETDA TOPINAMBUR O ‘SIMLIGINING FOYDALI TOMONLARI VA UNI TAHLIL QILISH USULLARI. *ILMIY TADQIQOTLAR VA YANGI OLAM*, *1*(1), 311-317.
8.Хасанова, Г. Р., Маллаева, М. Б., Эркинова, Э. Э., & Садуллаев, Л. М. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ. *Экономика и социум*, (10-2 (137)), 1069-1074.
9.МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИОНОВ ХЛОРИДА В ПРИРОДНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ Хасанова Гулбахор Рахматуллаевна-https://devos.uz/article.php?id=2078

Шарипов Р.Х., д.м.н.
доцент
кафедра педиатрии и неонатологии ФПДО
СамГМУ
Бурханова Д. С.
ассистент
кафедра Фармакологии
СамГМУ

БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ

Аннотация: *Бронхообструктивный синдром (БОС) у детей является актуальной клинико-педиатрической проблемой, связанной с высокой распространённостью заболеваний органов дыхания в детском возрасте. Данный синдром характеризуется нарушением бронхиальной проходимости, обусловленным воспалительными, аллергическими и функциональными изменениями дыхательных путей. У детей бронхообструкция развивается быстрее и протекает тяжелее, чем у взрослых, что связано с анатомо-физиологической незрелостью бронхолёгочной системы. В статье представлены современные данные о патогенезе, клинических проявлениях и факторах риска бронхообструктивного синдрома у детей, а также приведены результаты клинического исследования. Подчёркивается необходимость ранней диагностики и комплексного подхода к ведению пациентов.*

Ключевые слова: *бронхообструктивный синдром, дети, бронхиальная обструкция, дыхательная недостаточность, педиатрия.*

Sharipov R.Kh., Doctor of Medical Sciences
associate professor
Department of Pediatrics and Neonatology
FPDO, SamSMU
Burkhanova D.S.
assistant
Department of Pharmacology
SamSMU

BRONCHOOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN

Annotation: *Bronchoobstructive syndrome (BOS) in children is an urgent clinical and pediatric problem associated with the high prevalence of respiratory diseases in childhood. This syndrome is characterized by impaired bronchial patency caused by inflammatory, allergic, and functional changes in the respiratory tract. In children, bronchial obstruction develops faster and is more severe than in*

adults, which is due to the anatomical and physiological immaturity of the bronchopulmonary system. The article presents current data on the pathogenesis, clinical manifestations and risk factors of bronchoobstructive syndrome in children, as well as the results of a clinical study. The need for early diagnosis and an integrated approach to patient management is emphasized.

Key words: *bronchoobstructive syndrome, children, bronchial obstruction, respiratory failure, pediatrics.*

Цель исследования

Изучить клинические и патогенетические особенности бронхообструктивного синдрома у детей, определить основные причины его возникновения, а также оценить результаты клинического наблюдения с учётом факторов риска и возрастных особенностей.

Введение

Бронхообструктивный синдром представляет собой совокупность симптомов, возникающих вследствие нарушения проходимости бронхиального дерева. В педиатрической практике данный синдром встречается достаточно часто и сопровождает широкий спектр острых и хронических заболеваний дыхательной системы. Особое значение бронхообструкция приобретает в раннем детском возрасте, когда компенсаторные возможности организма ограничены.

Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы детей, такие как узкий просвет бронхов, повышенная реактивность слизистой оболочки, склонность к отёку и гиперсекреции, способствуют быстрому развитию обструкции даже при незначительном воспалительном процессе. Кроме того, несовершенство иммунного ответа у детей раннего возраста повышает риск частых инфекционных заболеваний, которые нередко осложняются бронхообструктивным синдромом.

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, увеличение числа детей с аллергическими заболеваниями и неблагоприятные экологические факторы обуславливают актуальность изучения бронхообструктивного синдрома. Несвоевременная диагностика и неадекватная терапия могут привести к рецидивированию обструкции и формированию хронической бронхолёгочной патологии.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе педиатрического отделения и включало 60 детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет с клиническими проявлениями бронхообструктивного синдрома. В исследуемую группу вошли 25 мальчиков и 20 девочек.

Методы исследования включали:

анализ анамнестических данных;

клинический осмотр с оценкой частоты дыхательных движений;

аускультацию и перкуссию лёгких;

лабораторные исследования (общий анализ крови);

инструментальные методы (рентгенография органов грудной клетки по показаниям);

пульсоксиметрию для оценки степени гипоксии.

Дополнительно проводилась оценка факторов риска, таких как наличие аллергических заболеваний, частота перенесённых респираторных инфекций, пассивное курение и неблагоприятные социально-бытовые условия.

Результаты исследования

В ходе проведённого клинического наблюдения было обследовано 60 детей с бронхообструктивным синдромом различной этиологии. Анализ возрастной структуры показал, что наибольшая частота развития бронхообструкции отмечалась у детей раннего возраста — от 6 месяцев до 3 лет, что составило 58 % от общего числа обследованных. Дети дошкольного возраста (4–7 лет) составили 42 % наблюдаемой группы.

При изучении этиологической структуры бронхообструктивного синдрома установлено, что ведущей причиной его развития являлись острые респираторные вирусные инфекции, осложнённые обструктивным бронхитом — 65 % случаев. У 20 % детей бронхообструктивный синдром был ассоциирован с бронхиальной астмой, преимущественно в форме повторных эпизодов обструкции. В 10 % случаев БОС развивался на фоне пневмонии, а у 5 % пациентов был связан с другими заболеваниями нижних дыхательных путей, включая врождённые аномалии бронхолёгочной системы.

Клиническая симптоматика у обследованных детей характеризовалась наличием экспираторной одышки различной степени выраженности. У 72 % пациентов наблюдалось удлинение фазы выдоха, у 68 % — участие вспомогательной дыхательной мускулатуры. Аускультативно у большинства детей выявлялись сухие свистящие хрипы, преимущественно на выдохе, а также ослабленное везикулярное дыхание.

Показатели пульсоксиметрии свидетельствовали о снижении сатурации кислорода у 40 % обследованных детей, при этом у 15 % пациентов уровень SpO_2 был ниже 92 %, что указывало на развитие дыхательной недостаточности. Наиболее выраженные нарушения газообмена отмечались у детей раннего возраста и у пациентов с повторными эпизодами бронхообструкции.

Анализ лабораторных данных выявил умеренные воспалительные изменения в общем анализе крови у большинства детей, включая повышение уровня лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов. У пациентов с аллергическим компонентом в анамнезе отмечалась тенденция к эозинофилии, что подтверждало роль аллергического воспаления в развитии бронхообструктивного синдрома.

Особое внимание было уделено оценке факторов риска. Установлено, что у 45 % детей имелся отягощённый аллергологический анамнез, включая наличие атопических заболеваний у родителей. Частые респираторные инфекции (более 6 эпизодов в год) отмечались у 52 % пациентов. Фактор

пассивного курения был выявлен у 30 % обследованных детей и оказывал негативное влияние на частоту и тяжесть бронхообструктивных эпизодов.

В динамике наблюдения было отмечено, что у детей с сочетанием нескольких факторов риска бронхообструктивный синдром протекал более тяжело, с тенденцией к затяжному и рецидивирующему течению. Это подчёркивает значимость комплексной оценки состояния ребёнка и необходимости индивидуального подхода к ведению пациентов.

Обсуждение

Полученные данные подтверждают многофакторную природу бронхообструктивного синдрома у детей. В основе патогенеза лежат воспалительный отёк слизистой оболочки бронхов, гиперсекреция вязкой слизи и бронхоспазм. Эти механизмы приводят к значительному снижению проходимости дыхательных путей и нарушению вентиляции лёгких.

Особое внимание следует уделять дифференциальной диагностике бронхообструктивного синдрома с другими заболеваниями дыхательной системы, поскольку тактика лечения зависит от основной патологии. Раннее выявление факторов риска позволяет снизить частоту рецидивов и предупредить развитие хронических форм заболеваний.

Выводы

Бронхообструктивный синдром является распространённым состоянием у детей, сопровождающим заболевания органов дыхания.

Основной причиной развития БОС у детей являются острые респираторные вирусные инфекции.

Тяжесть клинического течения синдрома зависит от возраста ребёнка и наличия факторов риска.

Ранняя диагностика и комплексное клиническое наблюдение позволяют снизить риск осложнений.

Профилактика бронхообструктивного синдрома должна быть направлена на предупреждение респираторных инфекций и коррекцию аллергических факторов.

Использованные источники:

1. Баранов А.А. Детская пульмонология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.
2. 2.Национальное руководство по педиатрии / Под ред. А.А. Баранова. — М., 2020.
3. Чучалин А.Г. Болезни органов дыхания. — М.: Медицина, 2019.
4. Каганов С.Ю. Заболевания органов дыхания у детей. — М.: Практика, 2018.
5. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. — 2022.
6. Papadopoulos N.G. et al. Viral-induced wheezing in children. *Pediatric Pulmonology*, 2020.
7. Bush A. Recurrent respiratory infections and wheeze in children. *European Respiratory ournal*, 2019.

8. Хасанова, Г. Р., Каримова, З., Даниярова, С., & Санжарова, А. (2025). Тиббий таълим ривожланишида фармацевтик ботаника ва фармакогнозия фанларининг ўрни. tadqiqotlar, *76*(7), 20-23.
9. Хасанова, Г. Р., Куватова, М. Б., Муродова, З., & Мухаммадова, З. Г. (2025). Предупреждение сахарного диабета как актуальная медико-социальная проблема. *tadqiqotlar*, *76*(7), 24-28.
10. Хасанова, Г. Р., Кунгратова, М. И., Пардаева, У. Я., & Куватова, М. Б. (2025). Целебные свойства простых извлечений из лекарственных растений. *Modern education and development*, *40*(2), 328-336.
11. Хасанова, Г. Р., Шунқоров, Т. М., Азимова, С. Н., & Рашидова, Д. Ш. (2025). РОЛЬ Педагога-фармакогнозиста в подготовке специалистов фармацевтического профиля в высших учебных заведениях. *Modern education and development*, *40*(2), 345-357.
12. Хасанова, Г. Р., Пардаева, У. Я., & Мусурмонова, Р. Т. (2025). Растительная пища как фундамент здоровья человека. *Modern education and development*, *40*(2), 320-327.
13. Хасанова, Г. Р., Кунгратова, М. И., Дониярова, С. О., & Розикова, Ш. А. (2025). Флавоноидный комплекс цветково-лиственного сырья боярышника и его значение для фармакогнозии. *Modern education and development*, *40*(2), 337-344.
14. Xasanova, G. R., & o‘g‘li Nazarov, H. E. (2025). Qandli diabetda topinambur o ‘simligining foydali tomonlari va uni tahlil qilish usullari. *ilmiy tadqiqotlar va yangi olam*, *1*(1), 311-317.
15. Хасанова, Г. Р., Маллаева, М. Б., Эркинова, Э. Э., & Садуллаев, Л. М. (2025). Современные педагогические технологии в обучении студентов фармацевтических направлений. *Экономика и социум*, (10-2 (137)), 1069-1074.

UDC 556.3:551.583:004.9

Ярбобоев Т.Н.
“Геология ва кончилик иши” кафедраси профессори
Қарши давлат техника университети
Ўзбекистон
Қосимова К.Ё.
“Экология ва атроф муҳит муҳофазаси” мутахассислиги магистранти
Қарши давлат техника университети
Ўзбекистон
Жамилов Б. Б.
“Фойдали қазилмалар геологияси, қидирув ва разведкаси” таълим йўналиши талабаси
Қарши давлат техника университети
Ўзбекистон

ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Аннотация. *Глобал иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларининг ҳудудий ва мавсумий тақсимоти ўзгариб, ер ости сувларига бўлган эҳтиёж ортмоқда. Қурғоқчилик даврларининг узайиши ва антропоген таъсир ер ости сувларини қидириш ҳамда бошқаришда инновацион ёндашувларни талаб этмоқда. Мазкур тадқиқотнинг мақсади глобал ва Ўзбекистон тажрибаси асосида ер ости сувларидан самарали фойдаланишда қўлланилаётган замонавий технологияларни таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқотда масофадан зондлаш, геоахборот тизимлари, геофизик усуллар, рақамли гидрогеологик моделлаш ва сунъий интеллект технологиялари қўлланилди. Натижалар инновацион технологиялар қидирув аниқлигини ошириш, харажатларни камайтириш ва сув сатҳини башорат қилиш имкониятларини кенгайтиришини кўрсатди.*

Калит сўзлар: *ер ости сувлари; глобал иқлим ўзгариши; сув ресурслари; масофадан зондлаш; геоахборот тизимлари; геофизик усуллар; рақамли моделлаш; сунъий интеллект.*

Yarboboev T.N.
professor
Department of Geology and Mining
Karshi State Technical University, Uzbekistan
Kosimova K.Y.
master's degree
Ecology and Environmental Protection
Karshi State Technical University, Uzbekistan
Jamilov B.B.
student
educational program Geology, Prospecting and Exploration of Mineral Resources
Karshi State Technical University
Uzbekistan

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR GROUNDWATER EXPLORATION AND MANAGEMENT UNDER GLOBAL CLIMATE CHANGE

Abstract. *Under global climate change conditions, the redistribution of water resources increases the importance of groundwater as a sustainable source of water supply. Prolonged drought periods and anthropogenic impacts necessitate innovative approaches to groundwater exploration and management. The aim of this study is to analyze modern technologies for the efficient use of groundwater based on global experience and the case of Uzbekistan. The research applies remote sensing, geographic information systems, geophysical methods, digital hydrogeological modeling, and artificial intelligence technologies. The results demonstrate that the integration of innovative approaches improves exploration accuracy, reduces drilling costs, and enhances the prediction of groundwater levels under changing climatic conditions.*

Keywords: *groundwater; global climate change; water resources; remote sensing; geographic information systems; geophysical methods; digital modeling; artificial intelligence.*

Кириш. Глобал иқлим ўзгариши XXI асрда инсоният олдида турган энг долзарб экологик ва ижтимоий-иқтисодий муаммолардан бири ҳисобланади. Ҳароратнинг ошиши, ёғингарчилик режимидаги ўзгаришлар, қурғоқчилик ва экстремал иқлим ҳодисаларининг кўпайиши дунё миқёсида сув ресурсларига бўлган босимни кескин кучайтирмоқда. Айниқса, ер усти сув манбаларининг камайиши ва нотекис тақсимланиши шароитида ер ости сувлари барқарор сув таъминотининг стратегик захираси сифатида намоён бўлмоқда.

Халқаро тадқиқотлар шуни кўрсатадики, иқлим ўзгариши ер ости сувларининг табиий тўйиниш жараёнларига салбий таъсир кўрсатиб, сув сатҳининг пасайиши, минераллашувнинг ошиши ва айрим ҳудудларда сув

сифатининг ёмонлашишига олиб келмоқда. Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги, саноат ва аҳоли эҳтиёжлари учун ер ости сувларидан жадал фойдаланиш антропоген босимни янада кучайтирмоқда. Бу мавжуд гидрогеологик тизимларни анъанавий усуллар асосида бошқариш самарадорлигини пасайтиради [1, 2].

Анъанавий гидрогеологик тадқиқотлар, асосан, қудуқ маълумотлари, дала кузатувлари ва статистик таҳлилларга таянади. Бироқ бу ёндашувлар глобал иқлим ўзгариши каби кўп омилли ва динамик жараёнларни етарли даражада акс эттира олмайди. Шу сабабли, охирги йилларда ер ости сувларини ўрганиш ва самарали бошқаришда инновацион технологиялар – масофадан зондлаш (Remote Sensing), геоахборот тизимлари (GIS), рақамли гидрогеологик моделлаштириш, автоматлаштирилган мониторинг тизимлари ҳамда сунъий интеллект асосидаги таҳлил усулларига бўлган қизиқиш сезиларли даражада ортмоқда [3, 4].

Хорижий мамлакатлар тажрибаси (АҚШ, Австралия, Европа Иттифоқи давлатлари) шуни кўрсатадики, инновацион технологияларни жорий этиш орқали ер ости сув захираларини башорат қилиш аниқлиги оширилиб, сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги 25-40% гача яхшиланган. Масалан, сунъий йўлдош маълумотлари ва GIS интеграцияси асосида тузилган моделлар иқлим сценарийларини ҳисобга олган ҳолда сув баланси ўзгаришини башорат қилиш имконини бермоқда.

Ўзбекистон шароитида ер ости сувлари асосан қуруқ ва ярим қуруқ иқлим ҳудудларида жойлашган бўлиб, улар қишлоқ хўжалиги учун асосий сув манбаи ҳисобланади. Сўнгги йилларда республикада GIS ва геофизик усуллар асосида ер ости сувларини баҳолаш бўйича қатор илмий ишлар амалга оширилди. Бу тадқиқотлар маҳаллий шароитга мос инновацион ёндашувларни жорий этиш имкони борлигини кўрсатмоқда [5, 6, 7]. Шу боис глобал иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларидан самарали фойдаланишни таъминловчи инновацион технологияларни илмий-назарий ва амалий жиҳатдан таҳлил қилиш, хориж ва Ўзбекистон тажрибасини таққослаш ҳамда барқарор сув бошқаруви учун илмий асосланган технологияларни қўллаш долзарб масалалардан саналади.

Методлар. Тадқиқотда комплекс илмий-услубий ёндашув қўлланилди. Ер ости сувларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган инновацион технологиялар қуйидаги усуллар асосида ўрганилди: илмий адабиётлар ва халқаро ҳисоботларни таҳлил қилиш; гидрогеологик ва иқлим маълумотларини қиёсий таҳлил этиш; GIS ва масофадан зондлаш технологиялари имкониятларини баҳолаш; гидрогеофизик тадқиқот усулларини таҳлил қилиш; хорижий давлатлар ва Ўзбекистонда амалга оширилган амалий лойиҳаларни ўрганиш. Тадқиқотда тизимли ва қиёсий таҳлил усуллари қўлланилиб, инновацион технологияларнинг самарадорлиги комплекс баҳоланди.

Натижалар ва муҳокама. Ушбу тадқиқот доирасида глобал иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларидан самарали фойдаланишни

таъминлашга қаратилган инновацион технологияларни қўллаш натижалари тизимли равишда баҳоланди. Натижалар хориж тажрибаси ва Ўзбекистон шароитида олинган маълумотлар асосида таққослама таҳлил қилинди.

Ер ости сувларини ўрганишда геологик, литологик ва тектоник омиллар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, сув ўтказувчан қатламларнинг тарқалиши ва захира ҳажмини аниқлашда комплекс ёндашув талаб этилади [8]. Иқлим ўзгариши натижасида сув тўпланиш жараёнлари ўзгариб, айрим ҳудудларда табиий қайта тикланиш кескин камаймоқда. Бу ҳолат ер ости сувларини бошқаришда янги илмий ечимларни қўллаш заруратини келтириб чиқаради.

Сўнгги йилларда ер ости сувларини самарали баҳолашда геофизик инновацион усуллар кенг қўлланилмоқда. Хусусан, электр қаршилигини томографиялаш (ERT) ва магнитотеллурик тадқиқотлар сувли горизонтларни юқори аниқликда аниқлаш имконини беради [9]. Бу усуллар бурғулаш ишлари ҳажмини камайтириш орқали иқтисодий самарадорликни оширади ҳамда атроф-муҳитга салбий таъсирни пасайтиради.

Масофадан зондлаш технологиялари (Remote Sensing) ва сунъий йўлдош маълумотлари иқлим ўзгаришининг ер ости сув тизимларига таъсирини макон ва вақт кесимида таҳлил қилиш имконини бермоқда. Landsat ва Sentinel сунъий йўлдошлари орқали олинган маълумотлар ер юзаси намлиги, ўсимлик қоплами ва инфильтрация жараёнларини баҳолашда самарали қўлланилмоқда [10]. Бу маълумотлар GIS платформалари билан интеграция қилинганда, истиқболли сув тўпланиш ҳудудларини башорат қилиш имконияти сезиларли даражада ортади.

Ер ости сувларининг гидрологик баланси қуйидаги ифода орқали баҳоланади:

$$R = P - ET - Q \pm \Delta S$$

бу ерда: R – ер ости сувларининг қайта тўлиши, мм/йил; P – ёғин-сочин миқдори, мм/йил; ET – буғланиш ва транспирация, мм/йил; Q – ер усти оқими, мм/йил; ΔS – ер ости сув захираси ўзгариши.

Иқлим ўзгариши шароитида ET қийматининг ортиши ва P нотекис тақсимланиши R нинг камайишига олиб келади.

Глобал иқлим ўзгариши ер ости сувларига қуйидаги асосий йўллар орқали таъсир кўрсатади:

- инфильтрация жараёнларининг камайиши;
- табиий қайта тўлиш (recharge) ҳажмининг қисқариши;
- ҳарорат ошиши натижасида буғланишнинг ортиши;
- чучук ва минерал сувлар чегарасининг ўзгариши.

Натижада кўплаб ҳудудларда ер ости сув сатҳининг пасайиши, сув сифатининг ёмонлашиши ва қудуқлар дебитининг камайиши кузатилмоқда.

Олинган натижалар глобал иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларидан самарали фойдаланиш учун инновацион технологияларни қўллашнинг устувор аҳамиятга эга эканини тасдиқлади. Тадқиқот доирасида қўлланилган масофадан зондлаш, геоахборот тизимлари, геофизик усуллар, рақамли моделлаш ва сунъий интеллектга асосланган ёндашувлар анъанавий

қидириш ва бошқариш усулларига нисбатан юқори самарадорликка эга экани аниқланди.

Анъанавий гидрогеологик қидириш усуллари асосан бурғулаш ва маҳаллий кузатувларга таянган бўлиб, улар юқори харажат, вақт сарфи ва ноаниқлик хавфи билан тавсифланади. Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, RS ва GIS технологиялари билан уйғунлаштирилган ёндашув катта ҳудудларни қамраб олиш, устувор қидириш зоналарини танлаш ва бурғулаш ишларини оптималлаштириш имконини беради. Бу эса бурғулаш ишлари ҳажмини камайтириб, иқтисодий самарадорликни оширади.

Геофизик инновацион усуллар (ERT, MT) орқали олинган натижалар сувли горизонтларнинг геометрик ва гидравлик хусусиятларини юқори аниқликда баҳолаш имконини берди. Рақамли гидрогеологик моделлаш билан уйғунлаштирилганда, бу усуллар иқлим ўзгариши сценарийларида ер ости сувларининг узоқ муддатли ҳолатини башорат қилишда муҳим восита сифатида намоён бўлди. Мазкур ёндашув сув захираларини режалаштириш ва бошқаришда илмий асосланган қарорлар қабул қилиш имконини яратади.

Геоахборот тизимлари (GIS) ер ости сувларини бошқаришда асосий рақамли инструмент сифатида шаклланмоқда. Турли манбалардан олинган гидрогеологик, геофизик ва иқлимий маълумотларни бирлаштириш орқали комплекс моделлар яратилади [11]. Бу моделлар сув захираларини оптимал бошқариш, ортиқча эксплуатациянинг олдини олиш ва барқарор фойдаланиш сценарийларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Сунъий интеллект ва машинали ўрганиш усуллари ер ости сувларини башорат қилишда янги босқични бошлаб берди. Нейрон тармоқлар, қарор дарахтлари ва кластерлаш алгоритмлари орқали катта ҳажмдаги маълумотлар таҳлил қилиниб, сув сатҳи ўзгариши ва захира камайиш хавфи олдиндан башорат қилинмоқда [12]. Бу технологиялар иқлим ўзгариши шароитида тезкор қарор қабул қилиш имконини яратади.

Инновацион технологияларни жорий этиш нафақат қидириш самарадорлигини оширади, балки ер ости сувларини муҳофаза қилиш ва барқарор фойдаланишга хизмат қилади. Автоматлаштирилган мониторинг тизимлари сув сатҳи ва сифатидаги ўзгаришларни реал вақтда кузатиш имконини бериб, ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини олдини олишда муҳим аҳамият касб этади. Бу натижалар барқарор ривожланиш концепцияси ва сув ресурсларини интеграциялашган бошқариш (IWRM) тамойилларига тўлиқ мос келади.

АҚШ (Калифорния)да MAR лойиҳалари, Исроилда тозаланган чиқинди сувлардан қайта тўлдириш, Австралияда GIS ва AI асосида ақлли бошқарув тизимлари, Ҳиндистонда aquifer mapping дастурлари муваффақиятли амалга оширилмоқда.

1-жадвал

Хорижий давлатларда ер ости сувларини бошқаришда қўлланилаётган инновацион технологиялар

Давлат	Қўлланилган технология	Асосий мақсад	Олинган натижа
АҚШ (Калифорния)	MAR, GIS, AI	Сув сатҳини барқарорлаш	Сув захиралари тикланди
Исроил	Тозаланган чиқинди сувлар	Қайта тўлдириш	Ирригация самарадорлиги ошди
Австралия	Smart monitoring, AI	Башоратлаш	Қурғоқчилик хавфи камайди
Ҳиндистон	Aquifer mapping (GIS)	Захира баҳоси	Янги сув манбалари аниқланди

Тадқиқот натижаларига кўра, ривожланган мамлакатларда инновацион технологиялар тизимли равишда жорий этилган бўлса, Ўзбекистонда уларнинг қўлланилиши ривожланиш босқичида. Шу билан бирга, сўнгги йилларда RS, GIS ва рақамли моделлаш технологияларининг жорий этилиши ижобий тенденция сифатида баҳоланади. Таққослама таҳлил шуни кўрсатдики, хорижий мамлакатларда инновацион технологиялар тизимли ва комплекс равишда қўлланилаётган бўлса, Ўзбекистонда уларнинг жорий этилиши босқичма-босқич амалга оширилмоқда [13-18]. Сўнгги йилларда GIS, RS ва рақамли моделлаш бўйича ижобий натижалар қайд этилмоқда.

Тадқиқот натижалари юқори илмий аҳамиятга эга бўлса-да, айрим чекловлар мавжуд. Хусусан, сунъий интеллект моделлари учун сифатли ва узлуксиз маълумотлар базаси талаб этилади. Шунингдек, инновацион технологияларни жорий этиш юқори малакали кадрлар ва техник таъминотни талаб қилади. Келгусида комплекс маълумотлар базасини яратиш, миллий гидрогеологик рақамли платформаларни ишлаб чиқиш ва иқлим сценарийларини янада аниқлаш устувор вазифалар сифатида қаралиши лозим.

Хулоса. Ушбу тадқиқот глобал иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларидан самарали ва барқарор фойдаланиш масаласида инновацион технологияларни жорий этишнинг долзарблиги ва зарурлигини илмий жиҳатдан асослади. Олинган натижалар шундан далолат берадики, анъанавий гидрогеологик қидириш ва бошқариш усуллари иқлим ўзгариши билан боғлиқ ноаниқликлар шароитида етарли даражада самара бермайди, шу сабабли замонавий рақамли ва интеллектуал технологияларга ўтиш объектив эҳтиёжга айланмоқда.

Тадқиқот натижалари масофадан зондлаш (RS), геоахборот тизимлари (GIS), геофизик инновацион усуллар, рақамли гидрогеологик моделлаш ҳамда сунъий интеллектга асосланган таҳлил усулларининг ер ости сувларини қидириш, баҳолаш ва бошқаришда юқори самарадорликка эга эканини кўрсатди. Ушбу технологияларни комплекс ҳолда қўллаш қидириш ишларининг аниқлигини ошириш, бурғулаш ишлари ҳажмини қисқартириш ва иқтисодий харажатларни оптималлаштириш имконини беради.

Глобал иқлим ўзгариши таъсирида сув ресурсларининг қайта тақсимланиши, қурғоқчилик даврларининг узайиши ва сув сифатининг ёмонлашуви шароитида инновацион мониторинг ва башорат қилиш технологиялари ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Автоматлаштирилган мониторинг тизимлари ва рақамли моделлар сув сатҳи ҳамда сифатининг ўзгаришларини реал вақтда баҳолаш, хавфли тенденцияларни олдиндан аниқлаш ва тезкор бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини яратади.

Хулоса қилиб айтганда, глобал иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларидан самарали фойдаланиш инновацион технологияларсиз мумкин эмас. Геофизика, масофадан зондлаш, GIS ва сунъий интеллектга асосланган комплекс ёндашув сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланишни таъминлашда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади. Келгусида ушбу технологияларни миллий шароитга мослаштириш ва амалиётга кенг жорий этиш устувор вазифа бўлиб қолади.

Использованные источники:

1. Taylor R.G. et al. Ground water and climate change. **Nature Climate Change**, 2013, Vol. 3, pp. 322–329.
2. Todd D.K., Mays L.W. Groundwater Hydrology. – 3rd ed. – New York: John Wiley & Sons, 2005. – 636 p.
3. Gleeson T., Alley W.M. Groundwater sustainability and resilience. Nature Geoscience, 2016, Vol. 9, pp. 1–6.
4. Alley W.M., Konikow L.F. Groundwater depletion. Hydrogeology Journal, 2015, Vol. 23, pp. 317–320.
5. Хасанов А.С. Ўзбекистонда гидрогеология ва муҳандислик геологиясининг ривожланиши. - Т., 2005. - 212 б.
6. Исламов Б.Ф., Кадирходжаев А.А., Пулатов Н.Б., Бимурзаев Г.А., Охунов Ф.А. Ўзбекистонда гидрогеологик тадқиқотлар ривожланиши ва истиқболдаги тенденциялари. Геология ва минерал ресурслар, 2024. – №6. – Б. 66-87.
7. Исмаилов Б.Ж., Бакиев С.А., Ибрагимов А.С. Ўзбекистон минерал сув конлари ресурсларини ҳозирги ҳолати ва ўзлаштириш истиқболлари. Геология ва минерал ресурслар, 2024. – №6. – Б. 88-94.
8. Freeze R.A., Cherry J.A. Groundwater. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1979. – 604 p.
9. Scanlon B.R., Healy R.W., Cook P.G. Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal, 2002, Vol. 10, pp. 18–39.
10. Gupta R.P. Remote Sensing Geology. – 2nd ed. – Berlin: Springer, 2003. – 655 p.
11. Anderson M.P., Woessner W.W., Hunt R.J. Applied Groundwater Modeling. – 2nd ed. – San Diego: Academic Press, 2015. – 564 p.
12. Shah T. et al. Groundwater governance through innovation. Water Policy, 2012, Vol. 14, pp. 1–26.
13. Абдурахмонов А.А., Каримов Ж.К. Ер ости сувларини ўрганишда замонавий геофизик усуллар. – Тошкент: Фан, 2020. – 214 б.
14. Мирзаев Ш.М. Ўзбекистонда ер ости сув ресурсларини баҳолаш ва мониторинг қилиш усуллари. – Тошкент, 2022. – 176 б.
15. Исмоилов Б.Р., Нурматов А.Н. Гидрогеологик тадқиқотларда GIS технологияларидан фойдаланиш. – Геология ва минерал ресурслар, 2019. – №3. – Б. 45–52.
16. Саидов И.С. Гидрогеологияда рақамли моделлаш ва прогнозлаш. – Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2021. – 198 б.
17. Қодиров А.Б. Иқлим ўзгариши шароитида ер ости сувларини муҳофаза қилиш. – Экология хабарномаси, 2022. – №4. – Б. 21–27.
18. Yarboboyev T.N., Qosimova K.Yo. O‘zbekistonda yer osti suv resurslaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilishning meyoriy-huquqiy asoslari. Geologiya fanlari, innovatsion rivojlanish va mutaxassislar tayyorlashning dolzarb muammolari va istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman ma’ruzalar to‘plami. Toshkent 2025. 475-480 b.

Ярматов С.Т.
ассистент
кафедра пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

Аннотация. *В статье изучены нарушения метаболической активности печени у 30 пациентов с заболеваниями желчного пузыря и желчных путей. Для определения кислотно-щелочного равновесия в печени были отобраны 18 женщин и 12 мужчин в возрасте 35–60 лет с патологией желчного пузыря и желчных путей. Первоначально у пациентов производился забор крови из венозного сосуда в области локтевого сгиба, а во время операции при вскрытии брюшной полости — забор крови непосредственно из печени с последующим сравнительным анализом состояния кислотно-щелочного равновесия. Полученные результаты свидетельствуют о значительных различиях между показателями крови, взятой из периферической вены, и крови, полученной из печени. Выявленные данные подтверждают наличие метаболических нарушений в печени.*

Ключевые слова: *Пациент, печень, метаболизм, кислотно-щелочное равновесие, ацидоз, алкалоз, периферическая вена, кровь, морфологические изменения.*

Yarmatov S.T.
assistant professor
Department of Internal Medicine Propaedeutics
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

METABOLIC CHANGES IN THE LIVER IN GALLBLADDER AND BILIARY DUCT DISEASES

Abstract. *This article examines metabolic disturbances in the liver in 30 patients with gallbladder and biliary tract diseases. To determine the acid-base balance in the liver, 18 women and 12 men aged 35–60 years with gallbladder and biliary tract pathology were recruited. Initially, blood was collected from a vein in the elbow area. During abdominal surgery, blood was collected directly from the liver, followed by a comparative analysis of the acid-base balance. The results obtained demonstrate significant differences between the parameters of blood collected from a peripheral vein and blood obtained from the liver. These findings confirm the presence of metabolic disturbances in the liver.*

Keywords: *Patient, liver, metabolism, acid-base balance, acidosis, alkalosis, peripheral vein, blood, morphological changes.*

Ввдение. Проблема желчнокаменной болезни в последние годы приобрела особую актуальность. Доказанным фактором риска развития холестеринового холелитиаза считается ожирение [1,2]. В настоящее время сформировалось четкое мнение о связи метаболического синдрома (МС) с функциональным состоянием органов пищеварительного тракта: органы пищеварения имеют непосредственное отношение к развитию МС и сами становятся органами мишенями [3,4]. Рядом широко масштабных эпидемиологических исследований показано, что риск желчного камнеобразования возрастает с увеличением индекса массы тела. Общеизвестно и никем не оспаривается, что при патологии желчных путей одновременно в патологический процесс вовлекается печень [5,6]. В ней происходят функциональные и морфологические изменения, степень которых зависит от длительности заболевания, частоты приступов, тяжести и стадии воспалительного процесса в желчевыводящей системе [7,8]. Состояние органного метаболизма в самой печени при патологии желчных путей не изучено. Это, по-видимому, объясняется анатом-топографическими условиями расположения органа, техническими трудностями забора крови из печени для клинических и биохимических исследований. Современный уровень развития гепатологии и хирургии желчевыводящей системы диктует необходимость более точного дифференцированного знания метаболических сдвигов не только в периферической крови, но и в самой печени, где локализуется основной процесс.

Цель исследования. Исследовать изменения метаболических процессов в печени при заболеваниях желчного пузыря и желчных путей

Материалы и методы исследования. Поэтому было проведено сравнительное изучение показателей кислотно-щелочного баланса в крови из печени и локтевой вены у 30 больных с хроническим холециститом; 18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 35 до 60 лет. Длительность заболевания от 3 до 12 лет, в среднем 7 лет. Определение кислотно-щелочного баланса производилось современным электрохимическим методом Аструпа Зиггаарда Андерсена. Всем больным произведены оперативные вмешательства под эндотрахеальным наркозом с искусственной вентиляцией легких. Сразу же после вскрытия брюшной полости бралась кровь из печени путем ее пункции и одновременно производился забор крови в одной из локтевых вен. В порциях крови определялись показатели кислотно-щелочного баланса.

Результаты исследования. Ph крови и напряжение углекислого газа в крови (PCO2 в мм рт. ст.) соответствуют незначительному респираторному алкалозу, носящему вторичный компенсаторный характер вследствие резко выраженного метаболического ацидоза в печени. BE в мэкв/л (избыток буферных оснований) характеризует метаболическую сторону сдвигов и, по сути дела, определяет все остальные показатели, дает возможность судить о состоянии окислительно-восстановительных, ферментативных процессов в том органе, откуда взята кровь. Статистическая обработка значения BE

показала высокую достоверность различия метаболических сдвигов в печени и периферической крови.

Вывод. При патологии желчных путей в печени происходит органное автономное нарушение метаболизма, которое по степени выраженности отличается от показателей периферической крови. С целью оценки функционального состояния печени при патологических изменениях желчных путей, наряду с изучением периферической крови, необходимо клиническое и биохимическое исследование крови из самой печени, взятой путем дооперационной пункционной биопсии или на операции.

Использованные источники:

1. Аксенова Э.М., Вахрушев Я.М. О патогенезе нарушений функции печени после холецистэктомии при желчнокаменной болезни // Тер. архив. 1998. -№2. -С. 48-52.
2. Борисенко Е.Г., Кравцова Н.Н., Чорбинская С.А. Метаболический синдром и неалкогольная жировая болезнь печени // Врач. 2009. №3. С.26-29.
3. Бекмурадова М. С., Гаффоров Х. Х., Ярматов С. Т. Значение определения мозгового натрийуретического пептида в процессе диагностики хронической сердечной недостаточности //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 4 (58). – С. 75-78.
4. Назаров Ф. Ю., Ярматов С. Т. Сравнительная оценка некоторых методов послеоперационного обезболивания в абдоминальной хирургии //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 16 (70). – С. 60-64.
5. Маматалиев А., Орипов Ф. Гистологическое строение интрамурального нервного аппарата общего желчного протока и желчного пузрья у кролика, в норме и после удаление желчного пузыря //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 117-125.
6. **.** Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
7. Ярмухаммедова С., Гаффоров Х., Ярматов С. ЗНАЧЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ СЕРДЦА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 85-87.
8. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

Ярмухамедова Г.Х.
соискатель
факультет биологии
кафедра генетики
Самаркандский Государственный Университет
Самарканд,Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: *В статье представлен обзор современных знаний о вирусе папилломы человека , его биологии, эпидемиологии и роли в развитии рака шейки матки. Особое внимание уделено онкогенным белкам E5, E6 и E7, их влиянию на клеточный цикл, сигнальные пути и иммунный ответ хозяина. Рассмотрены ключевые эпидемиологические данные о распространённости ВПЧ-инфекции среди женщин и мужчин, географические и генотипические различия вируса, а также факторы риска инфицирования и персистенции вируса. Подчёркнута значимость вакцинации и регулярного скрининга как наиболее эффективных стратегий профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Статья обобщает результаты молекулярно-биологических, клинических и эпидемиологических исследований, акцентируя внимание на необходимости комплексного подхода к контролю ВПЧ-инфекции и снижению заболеваемости раком шейки матки.*

Ключевые слова: *ВПЧ, E6, E7, E5, ВПЧ, генотипы, скрининг, иммунный ответ, PI3K/AKT/mTOR, JAK/STAT*

Yarmukhamedova G.Kh.
applicant
Faculty of Biology
Department of Genetics
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan

MODERN ASPECTS OF THE BIOLOGY, EPIDEMIOLOGY, AND PREVENTION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS

Abstract: *This article presents a review of current knowledge on human papillomavirus (HPV), its biology, epidemiology, and role in the development of cervical cancer. Special attention is given to the oncogenic proteins E5, E6, and E7, their impact on the cell cycle, signaling pathways, and host immune response. Key epidemiological data on the prevalence of HPV infection among women and men are discussed, along with geographic and genotypic variations of the virus, as well as risk factors for infection and viral persistence. The importance of vaccination and regular screening as the most effective strategies for preventing HPV-associated diseases is emphasized. The article summarizes molecular, clinical, and*

epidemiological research findings, highlighting the need for a comprehensive approach to controlling HPV infection and reducing cervical cancer incidence.

Keywords: *HPV, E6, E7, E5, genotypes, screening, immune response, PI3K/AKT/mTOR, JAK/STAT*

Введение

Одним из наиболее существенных достижений современной онкологии стало установление причинно-следственной связи между персистирующей инфекцией высокоонкогенных генотипов вируса папилломы человека- ВПЧ и развитием рака шейки матки.

Цель настоящей статьи заключается в обобщении и анализе современных достижений в области биологии ВПЧ, а также в рассмотрении актуальных стратегий профилактики и лечения рака шейки матки, ассоциированного с данной инфекцией. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последние годы в понимании биологии ВПЧ и разработке новых медицинских технологий, комплексная стратегия, основанная на сочетании профилактической вакцинации и регулярного скринингового тестирования, по-прежнему остается ключевым и наиболее эффективным инструментом в борьбе с раком шейки матки, ассоциированным с вирусом папилломы человека.

Папилломавирусы представляют собой небольшие вирусы с двухцепочечной ДНК, обладающие выраженной тропностью к многослойному плоскому эпителию и клеткам, способным к плоскоклеточной дифференцировке. Для этих вирусов характерна строгая видовая специфичность: вирусы папилломы человека инфицируют исключительно организм человека. Отличительной особенностью ВПЧ является их высокая тканевая избирательность, поскольку полный цикл репликации вируса возможен только в полностью дифференцированном плоском эпителии.

За последние 25 лет одним из наиболее значимых достижений в области онкологических исследований стало установление роли персистирующей инфекции определёнными генотипами ВПЧ в развитии рака шейки матки. Совокупность данных, полученных в ходе масштабных вирусологических, молекулярно-биологических, клинических и эпидемиологических исследований, убедительно доказала, что злокачественная трансформация клеток шейки матки является следствием длительной, неэлиминированной инфекции, вызванной онкогенными типами ВПЧ. Таким образом, в настоящее время рак шейки матки рассматривается как заболевание вирусной этиологии.

Осознание ключевой роли ВПЧ в канцерогенезе подчеркнуло исключительную значимость вакцинации как основного метода первичной профилактики рака шейки матки и других заболеваний, ассоциированных с данной инфекцией. Более того, результаты современных исследований указывают на возможное участие ВПЧ в патогенезе ряда других злокачественных новообразований, что расширяет представления о масштабах влияния вируса на здоровье человека.

Целью настоящей работы является обобщение современных знаний о вирусе папилломы человека, анализ последних научных достижений в данной области, а также рассмотрение перспективных направлений диагностики и лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний.

По оценкам Chesson и соавт. [1], проведённым до внедрения программ вакцинации против вируса папилломы человека в США, вероятность инфицирования ВПЧ в течение жизни была исключительно высокой. Согласно полученным данным, более 80% мужчин и женщин заражались ВПЧ к 45-летнему возрасту. Среди лиц, имевших хотя бы одного партнёра противоположного пола, предполагаемая пожизненная частота инфицирования достигала 85% у женщин и 91% у мужчин [6].

Результаты метаанализа, опубликованного в 2010 году и включившего 194 исследования с участием около одного миллиона женщин, обследованных на наличие ВПЧ шейки матки, показали, что наиболее распространёнными генотипами вируса являются HPV16, HPV18, HPV52, HPV31, HPV58, HPV39, HPV51 и HPV56. При этом распространённость различных типов ВПЧ существенно варьирует в зависимости от географического региона. Наиболее высокая общая распространённость инфекции отмечена в странах Африки к югу от Сахары (24,0%), особенно в Восточной Африке, где этот показатель достигает 33,6%. В целом ВПЧ-инфекция чаще выявляется в странах с низким уровнем дохода по сравнению с промышленно развитыми государствами. Однако независимо от уровня социально-экономического развития, минимальная распространённость ВПЧ зафиксирована в Западной Азии (1,7%), тогда как в Восточной Европе она остаётся высокой и составляет около 21,4% [2]. Анализ региональных особенностей генотипического разнообразия показал, что наименьшее разнообразие типов ВПЧ наблюдается в Северной Америке, в то время как наибольшее в странах Азии [3].

Кроме того, данные последнего метаанализа свидетельствуют о высокой распространённости генитальной ВПЧ-инфекции среди мужчин старше 15 лет. В глобальном масштабе практически каждый третий мужчина инфицирован ВПЧ любого типа, а примерно каждый пятый является носителем одного или нескольких генотипов высокого онкогенного риска [4]. Классификация вирусов папилломы человека основана на различиях в нуклеотидной последовательности их ДНК. В настоящее время выделяют пять родов ВПЧ: *alpha*, *beta*, *gamma*, *mu* и *nu*. В рамках этой классификации типы вируса подразделяются на генотипы высокого онкогенного риска (HR-ВПЧ) и низкого онкогенного риска (LR-ВПЧ) [5].

На сегодняшний день описано не менее 448 различных типов вируса папилломы человека, из которых 15 признаны канцерогенными. К числу генотипов с доказанным онкогенным потенциалом относятся HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV35, HPV39, HPV45, HPV51, HPV52, HPV56, HPV58, HPV59, HPV68, HPV73 и HPV82 [6]. Кроме того, генотипы HPV26, HPV53 и HPV66 рассматриваются как потенциально канцерогенные, поскольку их

участие в канцерогенезе подтверждено ограниченным, но нарастающим объёмом научных данных [6].

Среди всех онкогенных типов ВПЧ наиболее высоким канцерогенным потенциалом обладают HPV16 и HPV18, на долю которых приходится значительная часть ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований. Однако степень их патогенности и вклад в развитие опухолевого процесса могут существенно варьировать в зависимости от генетических вариантов вируса, распространённых в различных географических регионах [7]. Региональное генетическое разнообразие ВПЧ оказывает влияние на особенности персистенции инфекции, экспрессию вирусных онкобелков и риск злокачественной трансформации инфицированных клеток.

На основании сравнительного анализа последовательностей длинного контрольного региона (long control region, LCR) генотипа HPV16 выделяют пять основных филогенетических линий: европейскую (European, E), азиатскую (Asian, As), азиатско-американскую (Asian-American, AA), а также две африканские- африканскую 1 (African 1, Af-1) и африканскую 2 (African 2, Af-2) [3]. Эти варианты отличаются не только по географическому распределению, но и по биологическим свойствам, включая транскрипционную активность и ассоциированный риск развития онкологических заболеваний.

Несмотря на то что барьерные методы контрацепции, в частности презервативы, эффективно снижают риск передачи многих инфекций, передающихся половым путём, их защитное действие в отношении вируса папилломы человека является неполным. Это связано с тем, что передача вируса возможна не только при половом контакте, но и при непосредственном контакте кожи с кожей, а также при переносе вируса с инфицированных пальцев на слизистые оболочки гениталий [8]. Кроме того, сопутствующая инфекция *Chlamydia trachomatis* может способствовать повышению восприимчивости к ВПЧ и увеличивать вероятность персистенции вируса в организме.

К числу других факторов риска инфицирования ВПЧ относятся пол, молодой возраст и количество половых партнёров [8]. Половые контакты с новым партнёром значительно повышают вероятность заражения вирусом и, в перспективе, могут увеличивать риск развития злокачественных новообразований, ассоциированных с ВПЧ.

Женщины в целом более восприимчивы к инфицированию ВПЧ по сравнению с мужчинами. Эпидемиологические данные свидетельствуют о наличии двух пиков выявляемости ВПЧ-инфекции. Наиболее высокая распространённость инфекции отмечается среди девушек в период полового созревания и женщин моложе 20 лет. Второй пик выявления, преимущественно низкоонкогенных типов ВПЧ (LR-ВПЧ), наблюдается у женщин старше 55 лет, что, вероятно, связано не с новыми заражениями, а с персистенцией или реактивацией ранее приобретённой инфекции.

Установлено, что увеличение числа доношенных беременностей коррелирует с повышенным риском развития инвазивного рака шейки матки и хронической ВПЧ-инфекции. Данная связь может быть обусловлена иммунологическими изменениями во время беременности, включая физиологическую иммуносупрессию, которая может способствовать персистенции вируса или усилению его канцерогенного потенциала.

Инфицирование ВПЧ возможно и в детском возрасте. Передача вируса может происходить при контакте кожи ребёнка с бородавками на руках родителей, например во время смены подгузников или гигиенического ухода за аногенитальной областью [12]. Существует также риск перинатального заражения, поскольку идентичные типы ВПЧ были обнаружены как у матерей, так и у новорождённых. При наличии у матери генитальной ВПЧ-инфекции плод может инфицироваться через микроповреждения плодных оболочек или плаценты. Поскольку ВПЧ не вызывает виремии, вероятность передачи вируса через грудное молоко считается крайне низкой.

Современные исследования показывают, что табакокурение способствует прогрессированию поражений, вызванных ВПЧ высокого онкогенного риска, в предраковые изменения и плоскоклеточные карциномы головы и шеи, шейки матки, анального канала и полового члена [14]. Компоненты табачного дыма, среди которых по меньшей мере 60 соединений обладают доказанным канцерогенным действием у человека, могут усиливать экспрессию вирусных генов в инфицированных клетках.

Вместе с тем последние данные свидетельствуют о том, что определённые состояния, включая сахарный диабет, предиабет и иммунодефицитные состояния, повышают восприимчивость к ВПЧ-инфекции [15]. Персистенция ВПЧ, особенно генотипов высокого онкогенного риска, чаще наблюдается у лиц с нарушениями иммунного ответа, в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов [16]. Кроме того, ВПЧ рассматривается как один из факторов, участвующих в патогенезе вагинальной интраэпителиальной неоплазии у пациенток, подвергшихся внутриутробному воздействию диэтилстильбэстрола (DES) [17].

Вирус папилломы человека инфицирует недифференцированные базальные клетки эпителия. Однако доступ к этим нижним слоям эпителия ограничен поверхностными слоями, состоящими из полностью дифференцированных клеток. Проникновение вируса происходит через микроповреждения эпителия, которые обнажают более глубокие слои, позволяя связыванию капсидного белка L1 с гепарансульфат-протеогликанами на поверхности клеток. На следующем этапе капсид претерпевает конформационные изменения под действием циклофилина B, теряя аффинность к первичному рецептору [18]. При этом N-конец белка L2 становится доступен для ферментов семейства фурина. Проникновение вируса в цитоплазму и выход из эндосомы требуют протеолиза белков, поэтому отсутствие взаимодействия с фурином препятствует освобождению вирусного генома из эндоцитарного компартмента.

После продолжительного асинхронного слияния капсида с плазматической мембраной происходит эндоцитоз, который зависит от актинового цитоскелета и не требует участия клатринов, липидных рафтов, динамина или кавеолина [17]. Вирионы транспортируются в эндосомах с кислой средой, где происходят последующие структурные изменения. Белок L1 направляется в лизосомы для деградации, тогда как белок L2 обеспечивает выход комплекса «геном/L2» в поздние эндосомальные компартменты через взаимодействие с сортирующим белком нехин 17 [17]. Кроме того, С-конец белка L2 способствует связыванию комплекса с динеином микротрубочек, что обеспечивает транспорт вирусного генома в ядро клетки [20].

На начальных этапах происходит транскрипция белков E1 и E2. В фазе S репликации вирусного генетического материала белок E2 стабилизирует взаимодействие с ДНК, тогда как белок E1 выполняет функцию АТР-зависимой ДНК-хеликаза [21]. Поскольку ВПЧ не содержит собственных ферментов для репликации, он использует ферменты клетки-хозяина для воспроизведения своего генома. Белки E6 и E7 способны изменять клеточную среду в терминально дифференцированных или клетках с остановленным ростом, что способствует амплификации вирусного генома. В результате деградации белка pRb транскрипционный фактор E2F остаётся постоянно активным и связывается с ДНК, что запускает экспрессию циклинов и других регуляторных белков клеточного цикла.

Сборка вируса завершается в терминально дифференцированных кератиноцитах, где обеспечен доступ к кислороду. Между молекулами L1 формируются дисульфидные мостики, обеспечивающие конденсацию и стабилизацию капсида. Выход вирионов из клетки осуществляется при участии белка E4, который связывается с цитокератиновыми филаментами. Наиболее значимую роль в патогенезе неопластических изменений, возникающих при инфекциях ВПЧ, играют белки E5, E6 и E7. Белок E5, присутствующий во всех типах ВПЧ высокого риска, за исключением бета-папилломавирусов, способствует прогрессированию рака путем связывания с рецепторами фактора роста тромбоцитов и эпидермального фактора роста (EGFR) [22]. Белок E6 играет ключевую роль в нарушении регуляции клеточного цикла, так как инактивирует белок p53. Он также нарушает нормальные сигнальные пути клеток, активируя Wnt/β-катениновый и Notch-пути. E6 способствует бессмертию клеток путем активации теломеразы. Белок E7 ингибирует работу pRb, p107 и p130, что приводит к активации фактора E2F и ускоряет переход клеток из фазы G1 в фазу S (см. рисунок 2) [22]. У онкогенных типов ВПЧ E7 связывается с тирозин-фосфатазой PTPN14, вызывая её деградацию, что приводит к нарушению дифференцировки кератиноцитов и их бессмертию.

Оба белка могут активировать сигнальные пути PI3K/AKT/mTOR и JAK/STAT, которые играют важную роль в развитии рака, при этом путь JAK/STAT особенно значим для формирования рака шейки матки [24]. Кроме того, эти белки участвуют в подавлении иммунного ответа. Белок E5 угнетает

сигнальный путь интерферонов (IFN) и задерживает молекулы MHC-I в эндоплазматическом ретикулуме и аппарате Гольджи. Белок E6 снижает презентацию антигенов через нарушение работы комплекса TAP. E7 увеличивает популяцию регуляторных Т-лимфоцитов (Treg), снижая активность цитотоксических Т-клеток, а также подавляет пиоптоз. Оба белка также способствуют повышению уровня молекул иммунного контрольного пункта, таких как PD-L1 [24].

Персистирующая инфекция высокоонкогенных генотипов ВПЧ является ключевым фактором развития рака шейки матки и других злокачественных новообразований. Онкогенные белки E5, E6 и E7 играют центральную роль в нарушении клеточного цикла, активации сигнальных путей и подавлении иммунного ответа, способствуя бессмертию клеток и канцерогенезу. Несмотря на значительный прогресс в понимании биологии ВПЧ, эффективная профилактика и контроль заболеваемости возможны лишь при комплексном подходе, включающем вакцинацию и регулярный скрининг. Дальнейшие исследования молекулярных механизмов вируса, генотипической изменчивости и факторов риска инфицирования помогут совершенствовать стратегии ранней диагностики, профилактики и лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний, снижая глобальное бремя рака шейки матки.

Использованные источники:

1. Chesson H.W., Dunne E.F., Hariri S., Markowitz L.E. The estimated lifetime probability of acquiring human papillomavirus in the United States // Sex. Transm. Dis. - 2014. - Vol. 41. - P. 660-664.
2. Bruni L., Diaz M., Castellsagué X., Ferrer E., Bosch F.X., de Sanjosé S. Cervical Human Papillomavirus Prevalence in 5 Continents: Meta-Analysis of 1 Million Women with Normal Cytological Findings // J. Infect. Dis. - 2010. - Vol. 202. - P. 1789-1799.
3. Kombe A.J.K., Li B., Zahid A., Mengist H.M., Bounda G.-A., Zhou Y., Jin T. Epidemiology and Burden of Human Papillomavirus and Related Diseases, Molecular Pathogenesis, and Vaccine Evaluation // Front. Public Health. - 2020. - Vol. 8. - Article 552028.
4. Bruni L., Albero G., Rowley J., Alemany L., Arbyn M., Giuliano A.R., Markowitz L.E., Broutet N., Taylor M. Global and regional estimates of genital human papillomavirus prevalence among men: A systematic review and meta-analysis // Lancet Glob. Health. - 2023. - Vol. 11. - P. e1345-e1362.
5. Chen Z., Schiffman M., Herrero R., DeSalle R., Anastos K., Segondy M., Sahasrabuddhe V.V., Gravitt P.E., Hsing A.W., Chan P.K., et al. Classification and evolution of human papillomavirus genome variants: Alpha-5 (HPV26, 51, 69, 82), Alpha-6 (HPV30, 53, 56, 66), Alpha-11 (HPV34, 73), Alpha-13 (HPV54) and Alpha-3 (HPV61) // Virology. - 2018. - Vol. 516. - P. 86-101.
6. Muñoz N., Bosch F.X., De Sanjosé S., Herrero R., Castellsagué X., Shah K.V., Snijders P.J.F., Meijer C.J.L.M. Epidemiologic Classification of Human

Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer // N. Engl. J. Med. - 2003. - Vol. 348. - P. 518-527.
7. Khan M.J., Castle P.E., Lorincz A.T., Wacholder S., Sherman M., Scott D.R., Rush B.B., Glass A.G., Schiffman M. The Elevated 10-Year Risk of Cervical Precancer and Cancer in Women With Human Papillomavirus (HPV) Type 16 or 18 and the Possible Utility of Type-Specific HPV Testing in Clinical Practice // JNCI J. Natl. Cancer Inst. - 2005. - Vol. 97. - P. 1072-1079.
8. Winer R.L., Lee S.-K., Hughes J.P., Adam D.E., Kiviat N.B., Koutsky L.A. Genital Human Papillomavirus Infection: Incidence and Risk Factors in a Cohort of Female University Students // Am. J. Epidemiol. - 2003. - Vol. 157. - P. 218-226.
9. Yamaguchi M., Sekine M., Hanley S.J.B., Kudo R., Hara M., Adachi S., Ueda Y., Miyagi E., Enomoto T. Risk factors for HPV infection and high-grade cervical disease in sexually active Japanese women // Sci. Rep. - 2021. - Vol. 11. - Article 2898.
10. Drake V.E., Fakhry C., Windon M.J., Stewart C.M., Akst L., Hillel A., Chien W., Ha P., Miles B., Gourin C.G., et al. Timing, number, and type of sexual partners associated with risk of oropharyngeal cancer // Cancer. - 2021. - Vol. 127. - P. 1029-1038.
11. Liu Z.-C., Liu W.-D., Liu Y.-H., Ye X.-H., Chen S.-D. Multiple Sexual Partners as a Potential Independent Risk Factor for Cervical Cancer: A Meta-analysis of Epidemiological Studies // Asian Pac. J. Cancer Prev. - 2015. - Vol. 16. - P. 3893-3900.
12. Petca A., Borislavschi A., Zvanca M.E., Petca R.-C., Sandru F., Dumitrascu M.C. Non-sexual HPV transmission and role of vaccination for a better future (Review) // Exp. Ther. Med. - 2020. - Vol. 20. - Article 186.
13. Rombaldi R.L., Serafini E.P., Mandelli J., Zimmermann E., Losquiavo K.P. Perinatal transmission of human papilomavirus DNA // Virol. J. - 2009. - Vol. 6. - Article 83.
14. Aguayo F., Muñoz J.P., Perez-Dominguez F., Carrillo-Beltrán D., Oliva C., Calaf G.M., Blanco R., Nuñez-Acurio D. High-Risk Human Papillomavirus and Tobacco Smoke Interactions in Epithelial Carcinogenesis // Cancers. - 2020. - Vol. 12. - Article 2201.
15. Yue C., Zhang C., Ying C., Jiang H. Diabetes associated with HPV infection in women aged over 50 years: A cross-sectional study from China's largest academic woman's hospital // Front. Endocrinol. - 2022. - Vol. 13. - Article 972963.
16. Nunes R.A.L., Morale M.G., Silva G.Á.F., Villa L.L., Termini L. Innate immunity and HPV: Friends or foes // Clinics. - 2018. - Vol. 73. - Article e549s.
17. Harden M.E., Munger K. Human papillomavirus molecular biology // Mutat. Res. Mol. Mech. Mutagen. - 2017. - Vol. 772. - P. 3-12.
18. Schäfer G., Blumenthal M.J., Katz A.A. Interaction of human tumor viruses with host cell surface receptors and cell entry // Viruses. - 2015. - Vol. 7. - P. 2592-2617.

19. Bienkowska-Haba M., Patel H.D., Sapp M. Target cell cyclophilins facilitate human papillomavirus type 16 infection // PLOS Pathog. - 2009. - Vol. 5. - Article e1000524.
20. Florin L., Becker K.A., Lambert C., Nowak T., Sapp C., Strand D., Streeck R.E., Sapp M. Identification of a dynein interacting domain in the papillomavirus minor capsid protein L2 // J. Virol. - 2006. - Vol. 80. - P. 6691-6701.
21. McBride A.A. The Papillomavirus E2 proteins // Virology. - 2013. - Vol. 445. - P. 57-79.
22. Mlynarczyk-Bonikowska B., Rudnicka L. HPV Infections-Classification, Pathogenesis, and Potential New Therapies // Int. J. Mol. Sci. - 2024. - Vol. 25. - Article 7616.
23. Gutiérrez-Hoya A., Soto-Cruz I. Role of the JAK/STAT Pathway in Cervical Cancer: Its Relationship with HPV E6/E7 Oncoproteins // Cells. - 2020. - Vol. 9. - Article 2297.
24. Zhang L., Wu J., Ling M.T., Zhao L., Zhao K.-N. The role of the PI3K/Akt/mTOR signalling pathway in human cancers induced by infection with human papillomaviruses // Mol. Cancer. - 2015. - Vol. 14. - Article 87.
25. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ // Экономика и социум. 2021. №4-1 (83). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zhelezodefitsitnyh-anemiy-u-devochek-podrostkov (дата обращения: 06.02.2026).
26. Делкашева Ш. Дж ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНЕМИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ // Экономика и социум. 2020. №5-1 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-anemiy-u-bolnyh-saharnym-diabetom (дата обращения: 06.02.2026).

Ярмухамедова М.К., к.м.н.
доцент
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
г.Самарканд, Республика Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА B И D (HBV/HDV-КОИНФЕКЦИЯ)

Аннотация. *Хроническая коинфекция вирусов гепатита B (HBV) и D (HDV) характеризуется более быстрым прогрессированием фиброза, более высоким риском цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы по сравнению с моноинфекцией HBV. Лечебная стратегия включает подавление репликации HBV нуклеоз(т)идными аналогами и этиотропное воздействие на HDV, где ключевыми современными опциями являются пегилированный интерферон-альфа и булевиртид (ингибитор входа HDV). Представлены показания к терапии, принципы выбора схем, мониторинг эффективности и безопасности, а также ведение особых групп пациентов.*

Ключевые слова: *гепатит D, гепатит B, HDV RNA, булевиртид, пегилированный интерферон, тенофовир, энтекавир.*

Yarmukhamedova M. K., PhD, Associate Professor
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS B AND D (HBV/HDV COINFECTION)

Abstract: *Chronic coinfection with hepatitis B virus (HBV) and hepatitis D virus (HDV) is associated with faster progression of fibrosis, a higher risk of cirrhosis, and hepatocellular carcinoma compared to HBV monoinfection. Therapeutic strategies involve suppression of HBV replication using nucleos(t)ide analogues and etiological treatment targeting HDV. Key contemporary treatment options include pegylated interferon-alpha and bulevirtide, an HDV entry inhibitor. The article outlines indications for therapy, principles of regimen selection, methods for monitoring efficacy and safety, as well as management of special patient populations.*

Keywords: *hepatitis D, hepatitis B, HDV RNA, bulevirtide, pegylated interferon, tenofovir, entecavir.*

1. Введение. HDV является «дефектным» вирусом, который для жизненного цикла требует наличия HBsAg, поэтому хронический гепатит D развивается только у HBsAg-позитивных лиц. На практике активность и прогноз при HBV/HDV-коинфекции часто определяются именно HDV:

воспаление выраженнее, фиброз прогрессирует быстрее, осложнения развиваются раньше. Это обуславливает необходимость целенаправленной диагностики (HDV RNA) и своевременного этиотропного лечения. [1]

2. Диагностика и оценка тяжести перед началом лечения

Перед выбором терапии рекомендуется:

1. подтвердить HBV-инфекцию: **HBsAg**, HBeAg/anti-HBe, **HBV DNA**;

2. подтвердить активную HDV-инфекцию: **anti-HDV** и обязательно **HDV RNA** в крови;

3. оценить активность и функциональный резерв печени: АЛТ/АСТ, билирубин, альбумин, МНО/ПТИ, тромбоциты;

4. определить стадию фиброза (эластография/неинвазивные индексы, при необходимости биопсия);

5. исключить декомпенсацию цирроза и сопутствующие причины поражения печени (алкоголь, НАЖБП, HCV, ВИЧ и др.). [1,2,3]

3. Цели терапии. Основные цели лечения при HBV/HDV-коинфекции:

-достижение **устойчивого снижения или исчезновения HDV RNA**;

-нормализация/значимое снижение АЛТ;

-замедление прогрессирования фиброза, профилактика декомпенсации и ГЦК;

-при наличии показаний — стойкое подавление **HBV DNA**. [1]

4. Лечение компонента HBV: нуклеоз(т)идные аналоги

Нуклеоз(т)идные аналоги (NA) **не обладают прямой активностью против HDV**, однако необходимы для контроля HBV (особенно при активной репликации HBV и/или при циррозе). Рекомендуемые препараты с высоким генетическим барьером резистентности: **тенофовир** (TDF или TAF), **энтекавир**. [3,4]

Практические положения:

- NA назначаются при показаниях к терапии HBV; у пациентов с циррозом NA часто рассматриваются как обязательный фон для снижения риска HBV-реактивации и осложнений.
- выбор TDF/TAF зависит от сопутствующих рисков (почки/костная ткань) и локальных протоколов. [4]

5. Этиотропное лечение HDV: современные опции

5.1. Пегилированный интерферон-альфа (Peg-IFNα)

Peg-IFNα исторически является базовой терапией хронического гепатита D. Типично применяется курсом около **48 недель** (с корректировкой по переносимости и ответу). У части пациентов достигается стойкий вирусологический ответ, но эффективность ограничена, а переносимость нередко ухудшает приверженность. Важные ограничения — противопоказания при ряде психоневрологических состояний, аутоиммунных заболеваниях и, как правило, при **декомпенсированном циррозе**. [1]

5.2. Булевиртид (bulevirtide, Hepcludex) — ингибитор входа HDV

Булевиртид — таргетный препарат, блокирующий проникновение HDV/HBV в гепатоциты через рецептор NTCP. Препарат **одобрен EMA** для

лечения хронической инфекции HDV у пациентов **HDV-RNA-позитивных** с **компенсированным заболеванием печени**, включая взрослых и детей **с 3 лет** (при массе ≥10 кг). Применяется **подкожно 1 раз в сутки**, как монотерапия или совместно с нуклеоз(т)идным аналогом для HBV. [2]

Клиническая логика применения:

- у пациентов с активной инфекцией HDV и признаками прогрессирующего заболевания (значимый фиброз/цирроз, стойкое повышение АЛТ, детектируемая HDV RNA) булевиртид рассматривается как ключевая современная опция;
- возможны схемы **булевиртид ± Peg-IFNα** в зависимости от целей (глубина ответа), переносимости и доступности. [1,2]

6. Мониторинг эффективности и безопасности

Рекомендуется регулярный контроль: **HDV RNA** (оценка вирусологического ответа), **АЛТ/АСТ** и биохимия печени, **HBV DNA** (особенно при назначении/отсутствии NA), показатели синтетической функции (альбумин, МНО), тромбоциты; оценка фиброза/портальной гипертензии по показаниям. [1,2]

Скрининг ГЦК: у пациентов с циррозом (и у части пациентов с высоким риском) требуется регулярное наблюдение, обычно с использованием УЗИ печени по установленным интервалам согласно действующим руководствам. [5]

7. Особые клинические ситуации

1. Декомпенсированный цирроз: интерферон-содержащие режимы, как правило, не применяются; требуется ведение в специализированном центре, рассмотрение трансплантации печени, оптимизация фоновой терапии HBV и осложнений портальной гипертензии. [1]

2. Кандидаты на трансплантацию: при прогрессировании заболевания и развитии декомпенсации важны своевременное направление в трансплантационный центр и противовирусный контроль HBV. [1,5]

3. Подростки и дети: в 2024 рекомендациях ВОЗ расширяются подходы к лечению HBV у подростков, а EMA указывает возможность применения булевиртида с 3 лет при компенсированном заболевании печени (с ограничениями по массе). [2,3]

8. Перспективы. Разрабатываются новые стратегии функционального излечения HBV и комбинированные подходы, что потенциально может улучшить контроль HDV за счёт уменьшения доступного HBsAg. Однако в повседневной клинической практике ключевыми доказательными опциями лечения HDV остаются Peg-IFNα и булевиртид (в странах, где доступен), на фоне рационального контроля HBV нуклеоз(т)идными аналогами. [1,4]

Заключение. Современное лечение хронической HBV/HDV-коинфекции основывается на: (1) обязательном подтверждении активности HDV (HDV RNA), (2) контроле HBV нуклеоз(т)идными аналогами при показаниях и/или циррозе, (3) этиотропной терапии HDV — Peg-IFNα и/или булевиртидом у пациентов с компенсированным заболеванием печени, (4)

регулярном мониторинге и профилактике осложнений, включая наблюдение за риском ГЦК. [1–5]

Использованные источники:

1. Rakhmonov R. N. et al. HEPATITIS C: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2025. – Т. 3. – №. 1. – С. 339-347.
2. Namozovich R. R. Khalimov Farzod Zafar ugli, Usmonov İslombek Akbar ugli, & Kardzhavova Gulnoza Abilkasimovna.(2024) //An Integrated Approach to the Treatment of Community-Accompany Pneumonia in Children 2ith Myocarditis. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – Т. 4. – №. 2. – С. 84-97.
3. Namozovich R. R. Mansurov Jasur Choriyor ugli, Sobirov Og'abek Sobir ugli ugli, & Allanazarov Alisher Boymuratovich.(2024) //Acute Obstructive Bronchitis in Children: Main Etiological and Clinical Features. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – Т. 4. – №. 2. – С. 98-100.
4. Rakhmonov R. N., Kh V. D. RECENT DIAGNOSTIC ADVANCEMENTS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS B //Экономика и социум. – 2025. – №. 9-1 (136). – С. 281-283.
5. Rakhmonov R. N. NEW APPROACHES TO TREATING CHRONIC VIRAL HEPATITIS B //Экономика и социум. – 2025. – №. 9-1 (136). – С. 284-286.
6. Nomozovich R. R. CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION //Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus. – 2025. – Т. 1. – №. 1. – С. 498-500.
7. Tuychiev L. N. et al. Nasopharyngeal extraction of s. pneumoniae from adult patients with acute respiratory infections and antibiotic resistance of isolated strains //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
8. Anvarovna Y. N. et al. Clinical and Epidemiological Characteristics of Shigellosis in Adults at the Contemporary Stage //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 311-318.
9. Тиркашев О. С., Матякубова Ф. Э., Раббимова Н. Т. Клинико-эпидемиологическая характеристика кори в Самаркандской области //VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 624-625.
10. Ярмухамедова Н. и др. Особенности течения хронического гепатита с на фоне туберкулеза //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-132.
11. Абдиев Т. А., Сувонкулов У. Т., Куркина Т. Н. Лечение эхинококкоза и других гельминтозов //Инфекция, иммунитет и фармакология. – 1999. – Т. 4. – С. 78-84.
12. Сувонкулов У. и др. Идентификация видовой принадлежности возбудителей кожного лейшманиоза методом полимеразной цепной реакции //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 3 (89). – С. 91-92.
13. Jasurovich B. J. et al. HEPATITIS C IN PREGNANT WOMEN AND NEWBORNS //Вестник магистратуры. – 2023. – №. 7 (142). – С. 10-12.

14. Rukhshonabonu M. et al. CLINICAL MANIFESTATION OF LENNOX-GASTAUT SYNDROME //Вестник магистратуры. – 2023. – №. 7 (142). – С. 19-21.
15. Bakhronov J. J., Otakulov D. A. ugli, & Nigmatullaev, MN (2023) //Gilbert's syndrome: current insights, outcomes and therapies. Golden brain. – Т. 1. – №. 16. – С. 131-135.
16. Esmembetov K. I. et al. Current concepts of pathogenesis, clinical course and treatment of hepatitis delta (35 years since its discovery) //Klinicheskaia Meditsina. – 2013. – Т. 91. – №. 5. – С. 22-26.
17. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ // Экономика и социум. 2021. №4-1 (83). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zhelezodefitsitnyh-anemiy-u-devochek-podrostkov (дата обращения: 06.02.2026).
18. Делкашева Ш. Дж ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНЕМИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ // Экономика и социум. 2020. №5-1 (72). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-anemiy-u-bolnyh-saharnym-diabetom (дата обращения: 06.02.2026).

Ярмухамедова С.Х., PhD
доцент
Заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней
Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕРВЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Резюме: *В статье в экспериментальных условиях на крысах максимальная физическая нагрузка осуществлялась путём плавания в воде, при этом наблюдались нейрогистологические изменения в периферических нервах. Полученные материалы обрабатывались общецитологическими методами — гематоксилин-эозином и Вейгертом–Палем, нейрогистологическими — методом Ниссля и импрегнацией по Рассказовой. Начиная с 30-х суток восстановительного периода в нервных волокнах оболочек седалищного нерва, его мышечной ветви и в подкожном нерве отмечается значительное снижение реактивных и деструктивных изменений; эти изменения к 60-м суткам после прекращения нагрузки практически приближаются к фону физиологической реактивности животных контрольной группы.*

Ключевые слова: *эксперимент, крыса, физическая нагрузка, седалищный нерв, метод гематоксилин-эозин, метод Ниссля, нейрогистологические изменения.*

Yarmukhamedova S.Kh., PhD
associate professor
Head of the Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Samarkand State Medical University

THE EFFECT OF MAXIMUM PHYSICAL EXERTION ON PERIPHERAL NERVES IN AN EXPERIMENT

Abstract: *The article describes an experiment in which rats were subjected to maximum physical exertion through swimming in water, and neurohistological changes in peripheral nerves were observed. The obtained materials were processed using general cytological methods (hematoxylin-eosin and Weigert-Pal staining) and neurohistological methods (Nissl method and silver impregnation according to Rasskazova). Starting from the 30th day of the recovery period, a significant reduction in reactive and destructive changes was noted in the nerve fibers of the sheaths of the sciatic nerve, its muscular branch, and the subcutaneous nerve. By the 60th day after cessation of the exertion, these changes practically approached the physiological reactivity background of the control group animals.*

Keywords: *experiment, rat, physical exertion, sciatic nerve, hematoxylin-eosin method, Nissl method, neurohistological changes.*

Введение. В современном спорте для достижения высоких результатов и поддержания в течение длительного времени спортивной формы спортсмены выполняют большую по объему и интенсивности физическую работу [6,7]. Вместе с тем, нерациональное использование повышенных физических нагрузок приводит к существенным морфологическим и функциональным изменениям в организме, главным образом в сосудистой, мышечной и нервной системах [1,2,3]. В этой связи вопросы изучения морфологического состояния различных систем при повышенных физических нагрузках приобретают особую актуальность в спортивной медицине. Результаты изучения сосудистой и мышечной систем при физических нагрузках отражены в литературе достаточно широко, имеются и отдельные работы, отражающие состояние при этом периферических нервов [4,5]. Состоянию нервного аппарата оболочек периферических нервов при гиперкинезии посвящены работы других сведений по данному вопросу в литературе нет. В настоящей статье приводятся данные, являющиеся продолжением изучения состояния нервного аппарата оболочек и проводников в неорганных функционально различных нервов крысы после максимальной физической нагрузки и в восстановительном периоде.

Цель исследования. Изучить влияние максимальной физической нагрузки на периферические нервы в эксперименте.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведен на 30 белых беспородных крысах обоего пола. одного возраста, пять из которых служили контролем. Для морфологического исследования были взяты следующие объекты: 1) ствол седалищного нерва крысы (смешанный нерв), 2) мышечная ветвь седалищного нерва к полуперепончатой мышце (двигательный нерв), 3) подкожный нерв бедра (чуствительный). Максимальная физическая нагрузка создавалась плаванием животных в воде при температуре 38° до полного утомления. Умерщвление животных производилось через 1 час, 1, 3, 7, 15, 30 и 60 суток после эксперимента. Материал обрабатывался о Вейгерту - Палю, Нисслю, окрашивался гематоксилин-эозином, импрегнировался по Рассказовой. Для оценки морфологического состояния исследованных нервов использовались вариационно-статистическая обработка и методы информационного анализа.

Результаты исследования. Изучение препаратов контрольных животных показало, что седалищный нерв крысы имеет преимущественно однопучковое строение. Изредка встречались 4-6 нервных пучков с нервными связями между собой. Ствол седалищного нерва в основном состоит из миелиновых нервных волокон диаметром от 1 до 11 мкм. Мышечная ветвь седалищного нерва к полуперепончатой мышце состоит из двух пучков, которые перед вхождением в мышцу обычно разделяются на 5-6. В подкожном нерве - один пучок, как, правило, со спиралевидным ходом нервных волокон. В невральных оболочках содержится собственный нервный аппарат, представленный нервными пучками, одиночными нервными волокнами, образующими вместе сосудами сосудисто-нервные сплетения,

кустиковидными рецепторами и микроганглиями. В нервах контрольных животных выявились реактивные изменения нервных структур виде чередования утолщений и истончений осевых цилиндров, неровности их контуров, наплывов нейроплазмы, дисхромии, составляющие физиологический фон реактивности (защитно-компенсаторные и возрастные перестройки нервов). Физиологический фон реактивности составил 8±1,5%. 30-суточная максимальная физическая нагрузка приводит к значительному снижению функциональных возможностей опорно-двигательного ашпарата, сопровождающемуся значительными морфологическими изменениями нервных элементов. При изучении нервного аппарата оболочек седалищного нерва крысы после плавания их до полного утомления в течение месяца выявлено увеличение реактивных изменений в осевых цилиндрах до 29,2±1,2%. Наблюдается расширение периневральных и периаксональных влагалищ, набухание ядер и скопление цитоплазмы на концах межузловых сегментов, чаще толстых миелиновых волокон. В редких случаях встречаются деструктивные изменения в виде глыбчатого и зернистого распада осевых цилиндров. Деструктивные изменения составляют 3,5+0,5%. В проводниковом компоненте седалищного нерва отмечается перераспределение миелиновых нервных волокон по группам в сторону увеличения толстых миелиновых волокон до 56.0±1,4% (норма 43,2%); количество тонких миелиновых волоконо равнялось 19,8±1,2% и средних - 23,2 ± 1,7% (норма 33,6%). В оболочках мышечной ветви и подкожном нерве также встречаются реактивные изменения подобные вышеописанным: толстых волокон было соответственно 14 ± 1,2% (норма 5%) и 19,6 ± 1,7% (норма 10%). Деструктивные изменения осевых цилиндров в мышечной ветви составляют 5,2± 1,5%, а в подкожном нерве - 8,0 ± 1,2%. В проводниковом компоненте мышечной ветви седалищного нерва после 30-суточной максимальной физической нагрузки наблюдается увеличение количества средних миелиновых волокон до 30,8% (норма 18,2%), в подкожном нерве увеличивается содержание толстых проводников до 27,2 ± 1,8% (норма 17,8%). Через 1, 3,7 и 15 суток после прекращения воздействия физической нагрузки в нервном аппарате оболочек всех трех функционально различных нервов происходит статистически недостоверное снижение реактивность нервных структур. Вместе с тем, проводниковом компоненте седалищного нерва крысы (стволе) продолжается увеличение количества толстых миелиновых волокон; оно к 15-м суткам восстановительного периода достигает 62,2 ± 2,1%, а в мышечной ветви в эти сроки выявляется незначительное снижение количества этих волокон, которое, однако, статистически недостоверно (46,2 ± 1,9%). В подкожном нерве содержание толстых проводников держится на прежнем уровне (31,8 ± 20%). Начиная с 30-х суток восстановительного периода в нервном аппарате оболочек ствола седалищного нерва, его мышечной ветви и в подкожном нерве отмечается значительное снижение реактивных и деструктивных изменений, которые к 60-м суткам после прекращения нагрузки практически приближаются к

физиологическому фону реактивности интактных животных. Проводниковый компонент исследованных нервов по своему составу также приближается к нервам контрольных крыс; в стволе седалищного нерва преобладают толстые волокна, в подкожном нерве - средние. Проведенное исследование свидетельствует о том, что максимальные физические нагрузки, следуя одна за другой в течение месяца, не дают возможности нетренированному организму восстановить работоспособность, в результате чего возникают существенные морфологические перестройки в нервных проводниках функционально различных нервов. Так, 30-суточная максимальная физическая нагрузка приводит к снижению компенсаторно-защитных возможностей периферической нервной системы и к появлению реактивных и деструктивных изменений в нервном аппарате оболочек и в проводниках нервных стволов.

Вывод. Основные этапы восстановления морфологического состояния нервных структур в оболочках и в проводниках седалищного нерва крысы, его мышечной ветви и подкожного нерва бедра начинается с 30-х суток после прекращения физической нагрузки. Относительная нормализация морфологической картины наступает к 60-м суткам восстановительного периода.

Использованные источники:

1. Ахмедова С. М. и др. Антропометрические показатели физического развития у детей до 5 лет в самаркандской области //SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY. – 2020. – С. 250-258.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
4. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
5. Ярмухамедова С. Х., Афмирова Ш. А. Изменения диастолической функции правого желудочка при гипертонической болезни //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 270-280.
6. Ярмухамедова С. Х., Камолова Д. Ж. Изучение геометрии миокарда у больных гипертонической болезнью по данным эхокардиографии //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 76-80.
7. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1093-1098

Abdullaeva M.A., tibbiyot fanlari doktori
Patologik fiziologiya va patologik anatomiya kafedrasi mudiri
Buxoro davlat tibbiyot instituti
Xalimova D.J., tibbiyot fanlari nomzodi
ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasi dotsenti
Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti
Buxoro, O'zbekiston

ENDOVASCULYAR TERAPIYA KONTEKSTINDA MIYA QONDIRLARI ANEVRIZMALARI. (ADABIY SHARH)

Annotatiya. *Miya qon tomir anevrizmalarini endovaskulyar davolash neyroxirurgiyada keng qo'llaniladigan usulga aylandi. Ushbu maqolada miya anevrizmasi bo'lgan bemorlarda endovaskulyar terapiyaning samaradorligi va xavfsizligi muhokama qilinadi. Bunday davolashning asosiy jihatlari, jumladan, diagnostika usullari, davolashning optimal yondashuvini tanlash va ushbu usulning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Miya qon tomir anevrizmalarini davolashda endovaskulyar terapiyaning samaradorligini va uning zamonaviy neyroxirurgiyada ahamiyatini tasdiqlovchi tadqiqotlar va klinik kuzatuvlar natijalari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *bosh suyagi ichidagi anevrizmalar, endovaskulyar davolash usullari, spirallash, oqimni o'zgartirish, oqimning buzilishi*

Abdullaeva M.A., Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Pathological Physiology and Pathological Anatomy
Bukhara State Medical Institute
Khalimova D.J.,Candidate of Medical Sciences, associate professor
Department of Propaedeutics of Internal Diseases
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Uzbekistan. Bukhara
https://orcid.org/0009-0003-8545-6946

CEREBRAL VASCULAR ANEURYSMS IN THE CONTEXT OF ENDOVASCULAR THERAPY. (Literary Review)

Annotation. *Endovascular treatment of cerebral vascular aneurysms has become a widely used method in neurosurgery. This article discusses the effectiveness and safety of endovascular therapy in patients with cerebral aneurysms. The main aspects of such treatment are considered, including diagnostic*

methods, the choice of optimal approach to treatment, and the advantages of this method. The results of research and clinical observations confirming the effectiveness of endovascular therapy in the treatment of cerebral vascular aneurysms and its significance in modern neurosurgery are presented.

Key words: *intracranial aneurysms, endovascular treatment modalities, coiling, flow diversion, flow disruption*

Ahamiyati . Miya anevrizmalari populyatsiyada otopsiya ma'lumotlari 1-4 asosida 0,8% dan 10% gacha uchraydi. Neyroxirurgik amaliyotga yangi texnologiyalarning kiritilishi tufayli so'nggi 20 yil ichida bosh suyagi ichidagi anevrizmalarni davolashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Biroq, anevrizma subaraknoid qon ketishidan (SAH) keyin prognoz yomonligicha qolmoqda. Shuning uchun SAHning oldini olish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Miya anevrizmalarini davolash strategiyasini tanlashda anevrizmaning lokalizatsiyasi, hajmi, shakli, yorilganmi yoki yo'qmi, bemorning ahvoli va yoshi kabi omillar hisobga olinadi. Yaqinda o'tkazilgan randomizatsiyalangan tadqiqotlar miya anevrizmalarini davolash usulini tanlashda ma'lum darajada qo'llanma bo'lib xizmat qiladi 5,6 . Bugungi kunga kelib, anevrizmalarning evolyutsiyasi va tabiiy kechishi, shuningdek, anevrizmalarni endovaskulyar davolashdan keyin uzoq muddatli kuzatuv haqida hali ham yetarli ma'lumotlar mavjud emas 7-10. Davolash strategiyasini tanlash anevrizmaning yorilgan yoki yorilmaganligiga qarab kasallik prognozini hisobga olgan holda aralashuv xavfini baholashni talab qiladi. Miya anevrizmalarini endovaskulyar davolashning texnik jihatlari, xavfsizligi va samaradorligini tahlil qilish uchun biz kichik klinik holatlarimizning tahlilini o'tkazdik.

Kirish: Anevrizma - bu tomir devorining o'zgarishi yoki shikastlanishi tufayli arterial devorning mahalliy kengayishi. Ular travmatik bo'lmagan subaraknoid qon ketishining asosiy sababi bo'lib, bosh suyagi ichidagi qon ketishining barcha holatlarining 85% gacha qismini tashkil qiladi va yuqori o'lim darajasi, bemorlarning tez-tez nogironligi, diagnostika va davolash jihatlari tufayli zamonaviy neyroxirurgiyadagi eng murakkab muammolardan birini ifodalaydi. Anevrizmalar topografik-anatomik xususiyatlar va ularning o'lchamlariga qarab tasniflanadi: karotid havzasi (85-95%): oldingi aloqa arteriyasi (30%), orqa aloqa arteriyasi (25%), o'rta miya arteriyasi (20%). Vertebrobazilar havzasi (5-15%): bazilar arteriyaning bifurkatsiyasi, yuqori serebellar arteriyasi, umurtqali arteriyalarning qo'shilishi (10%), umurtqali arteriya (5%). Shakli jihatidan anevrizmalar asosan sakkulyar va fusiformga bo'linadi. Miya tomirlarining bitta va ko'p anevrizmalari odatda farqlanadi. Hajmiga qarab, anevrizmalar kichik (2-3 mm), o'rta (4-20 mm), katta (20-25 mm) va gigant (25 mm dan ortiq) anevrizmalarga bo'linadi.

Miya anevrizmalarini faol o'rganish tarixi bir necha o'n yilliklarni qamrab oladi.

J. Hutchinson 1875-yilda birinchi marta tirik bemorda bosh suyagi ichidagi ichki karotid arteriya anevrizmasini tashxislagan bo'lsa, 1931-yilda W. Dott yorilgan

o'rta miya arteriyasi anevrizmasi uchun birinchi muvaffaqiyatli operatsiyani amalga oshirdi (V.V. Lebedev va boshqalar tomonidan iqtibos keltirilgan, 1996).

Har qanday miya anevrizmasi rivojlanishning uch bosqichiga ega - prehemorragik , gemorragik va posthemorragik (Irger , 1986). Asosiy muammo shundaki, anevrizmalarning aksariyati yorilmaguncha sezilarli klinik ko'rinishga ega emas va odatda faqat gemorragik bosqichda aniqlanadi, bu subaraknoid qon ketishi sindromi (SAH) sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, AQShda har yili 28000 ta SAH holati qayd etiladi, ular anevrizma yorilishi natijasida yuzaga keladi (100000 taga 12 ta holat), ularning atigi 36% omon qoladi (NF Kassel, CG Drake, 1982). Amerika va Britaniya neyroxirurglarining qo'shma tadqiqotlariga ko'ra, miya tomirlari anevrizmalari SAH holatlarining 51% ni tashkil qiladi (Konovalov AN, 1973).

Yorilmagan anevrizmadan qon ketish xavfi bir yil ichida taxminan 1% ni tashkil qiladi, ammo anevrizmadan qayta qon ketish xavfi sezilarli darajada oshadi, dastlabki qon ketishdan keyingi dastlabki ikki hafta ichida 15-25% ga va olti oy ichida 50% ga etadi. Qon ketish xavfi ham anevrizmaning kattaligi bilan ortadi. 5 mm dan kichik anevrizma uchun qon ketish xavfi umr bo'yi 2,5% ni tashkil qiladi, anevrizmalar esa 41% hollarda 6-10 mm yorilish bilan, 11-15 mm o'lchamdagilar esa 87% hollarda qon ketadi. Agar anevrizma diametri 15 mm dan katta bo'lsa, anevrizma xaltachasida quyqalar paydo bo'lishi tufayli qon ketish xavfi kamayadi. Qon ketishdan keyingi birinchi hafta ichida qayta qon ketishdan o'lim xavfi 32% ni tashkil qiladi, ikkinchi haftada 43% gacha ko'tariladi va qon ketishdan keyingi birinchi yil ichida 63% ga etadi.

Anevrizmaga shubha qilingan taqdirda invaziv bo'lmagan diagnostika kompleksining asosi kompyuter neyrovizualizatsiya usullari - kompyuter va magnit-rezonans tomografiyasini o'z ichiga oladi. MR tomografiyasini qon tomir rejimida o'tkazish kerak va anevrizmani muvaffaqiyatli diagnostika qilish uchun uch o'lchovli rekonstruktsiyali spiral kompyuter tomografiyasi samarali hisoblanadi. Hozirgi vaqtda miya qon tomir anevrizmalari uchun barcha jarrohlik aralashuvlar "ochiq" va endovaskulyarlarga bo'linadi. "Ochiq" jarrohlik amaliyotlarining asosiy afzalligi anevrizmaga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatiga ega bo'lish va uni qisib qo'yish orqali qon oqimidan ishonchli tarzda chiqarib tashlash imkoniyatidir (Yasargil MG, Smith RD, 1982, Kato Y., 2002). Kamchiliklari orasida operatsiyadan keyingi davrda jiddiy ishemik kasalliklarga olib kelishi mumkin bo'lgan uzoq muddatli operatsiya ichidagi miya tortish zarurati mavjud (Hilko VA, Zubkov JN, 1982). Endovaskulyar jarrohlik amaliyotlarining asosiy afzalligi kraniotomiyaga ehtiyoj yo'qligidir, kamchiliklari esa anevrizmaga to'g'ridan-to'g'ri kirishning yo'qligi va texnikaning tomirlarning individual anatomik xususiyatlari va anevrizmaning tabiatiga yuqori darajada bog'liqligi, shuningdek, operatsiya uchun zarur bo'lgan uskunalarning yuqori narxini o'z ichiga oladi.

Epidemiologiya. Komorbidliklari bo'lmagan populyatsiyada yorilmagan bosh suyagi ichidagi anevrizmalarning (UIA) taxminiy tarqalishi 3,2% ni tashkil qiladi. Tashxis qo'yilgandagi o'rtacha yosh turli tadqiqotlarda farq qiladi, o'rtacha 49 yosh (20,5–76,9) 1. Biroq, yosh bemorlar (20,5–30,6) ishtirok etgan tadqiqotlar

asosan IAlarning oilaviy yoki komorbid xususiyatini o'rganish o'rniga kasallik skriningi uchun o'tkazildi. Taxminiy ayol va erkakning tarqalishi nisbati 1,57 ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, 30 yoshdan oshgan shaxslarda 30 yoshgacha bo'lganlarga nisbatan tarqalishi sezilarli darajada yuqori . 30 yosh va undan katta bemorlarda UIAlarning tarqalishi 3,6 dan 6,5% gacha ekanligi xabar qilingan. [5].

Subaraknoid qon ketishi (SAH) ning chastotasi 100 000 bemor-yiliga 6 ta deb baholanmoqda 3. IA yorilishi ayollarda erkaklarga qaraganda 1,24 baravar ko'proq uchraydi 4 va yorilish ham qora tanli odamlarda oq tanli odamlarga qaraganda 2,1 baravar ko'proq uchraydi 5. Bundan tashqari, chekish mustaqil xavf omili bo'lib, chekuvchilarda, ayniqsa yoshligidan chekishni boshlaganlar uchun IA rivojlanishi va yorilishi xavfi yuqori 6.

Etiologiyasi. Ko'pgina hollarda IA irsiyligining poligenik tabiati kuchli taxmin qilinadi. Atrof-muhit xavf omillariga gipertenziya, chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va giperxolesterinemiya kiradi. Autosomal dominant polikistik buyrak kasalligi (ADPKD), Ehlers- Danlos IV tipdagi sindromi, Marfan sindromi, 1-turdagi neyrofibromatoz va miya o'smalari kasallikning qo'shma kasalligiga aloqador omillardir. Anevrizma yorilishi uchun xavf omillari ayol jinsi, yoshi, qora tanli millati, chekish va diametri ≥7 mm bo'lgan anevrizma hajmidir [5,7] . Antiepileptik dorilar va jinsiy gormonlar IA shakllanishi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan [6]. Bundan tashqari, IA shakllanishi chekish va yuqori qon bosimini kuchaytiradigan genetik omillar bilan bog'liq bo'lib, bu genetik va atrof-muhit omillarining bir-biriga mos kelishini ko'rsatadi [8]. Bular epidemiologik jihatdan aniqlangan xavf omillari uchun dalillarni beradi.

Genetik omillar ham ishtirok etgan, bu IA yoki SAH bilan birinchi va ikkinchi darajali qarindoshlari bo'lgan bemorlarda umumiy xavfning oshishiga olib kelgan. IA shakllanishi va/yoki yorilishi bilan bog'liq potentsial bog'liqlik uchun bir nechta genetik lokuslar o'rganilgan, jumladan, ANRIL (INK4 lokusida antisens kodlamaydigan RNK), SOX17, EDNRA (endotelin retseptorlari A turi), COL1A2 (kollagen I A2 turi), COL3A1 (kollagen III A1 turi), ACE (angiotenzinga aylantiruvchi ferment), IL-6 (interleykin 6), SERPINA3 (α 1-antiximotripsin), VCAN (versican) va HSPG2 (geparan sulfat proteoglikan 2) genomik mintaqalarida joylashgan nomzod polimorfizmlar [9].

Patofiziologiya . IA patogenezi murakkab va hali to'liq tushunilmagan. Umuman olganda, IA hujayradan tashqari matritsa nuqsonlari yoki degradatsiyasi, gemodinamik stress va yallig'lanish reaktsiyasi tufayli hosil bo'ladi. IAlarda silliq mushak hujayralari qisqarish funktsiyasi o'rniga sekretor funktsiyaga ega bo'ladi. Bu xususiyat elastin va kollagen ishlab chiqarishning yetishmasligiga va hujayradan tashqari matritsa degradatsiyasi va qayta tuzilishini vositachi qiluvchi matritsa metalloproteinazalari (MMP) sekretsiyasiga hissa qo'shadi. Garchi aniq bo'lmasa-da, chekish MMPlarning asosiy inhibitori bo'lgan α 1-antitripsin darajasini pasaytirishi ko'rsatilgan [8]. MMPlar va ularning inhibitorlari o'rtasidagi nomutanosiblik IA shakllanishida muhim rol o'ynaydi deb ishoniladi. Boshqa mexanizmlar, masalan, lizil oksidaza mis yetishmovchiligi [9] kabi qon tomir devori

nuqsonlari va IA shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan elastin va kollagenning kamayishiga olib keladi .

Gemodinamik stress shuningdek, endotelial va silliq mushak hujayralari tomonidan MMP ning ajralib chiqishini va keyinchalik hujayradan tashqari matritsaning degradatsiyasini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, u mexanik endotelial shikastlanishga, silliq mushak hujayralarining degeneratsiyasiga va muhitning yupqalashishiga ham olib keladi [7]. Yallig'lanish hujayralari infiltratsiyasi arterial devorning tunika muhitida ham paydo bo'ladi. Yallig'lanish javobining vositachilari monotsit kemoattraktant oqsili 1, NF- κ B, angiotenzin II, prostaglandin E2, prostaglandin E retseptorining 2-turi, IL-1β , IL-6, TNF- α , TLR4 va azot oksidi [7,8].

Xulosalar.

GDC yoki yangi spirallar yordamida spiral embolizatsiyasi mustaqil ravishda yoki sharlar yoki stentlar bilan birgalikda amalga oshirilishi mumkin. Stentlar va sharlardan foydalanish bilan bog'liq asoratlar, masalan, spiralning siljishi va tromboz, bosh suyagi ichidagi anevrizmalarni (IA) davolashda muqobil yondashuvlar zarurligini ta'kidladi. Oqimni yo'naltiruvchi va oqimni buzuvchi kabi yangi texnologiyalar sifon joylashgan, katta yoki keng bo'yinli anevrizmalarni davolashda istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Bozorda turli xil qurilmalar mavjud bo'lib, WEB-qurilma samaradorlik va asoratlar jihatidan ijobiy natijalarni ko'rsatgan oqimni buzuvchi sifatida ajralib turadi. Biroq, ushbu yangi qurilmalarning uzoq muddatli samaradorligi va chidamliligini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, O'zbekistonda miya anevrizmasi bilan og'rigan bemorlarga neyroxirurgik yordam juda past darajada qolmoqda. Anevrizma subaraknoid qon ketishi bilan og'rigan bemorlarning aksariyati davolanishni nevrologiya va neyrovaskulyar bo'limlarda boshlaydi va tugatadi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda miya anevrizmalarini jarrohlik davolash usullarini yanada faolroq joriy etish zarurati mavjud.

Adabiyotlar :

1.Caranci F., Briganti F., Cirillo L., Leonardi M., Muto M. Intrakranial anevrizmalarning epidemiologiyasi va genetikasi. *evro. J. Radiol* . 2013 yil ; 82 :1598-1605 . doi : 10.1016/j.ejrad.2012.12.026.

2. Greving JP, Wermer MJH, Brown RD, Morita A., Juvela S., Yonekura M., Ishibashi T. va boshqalar. Bosh suyagi ichidagi anevrizmalarning yorilish xavfini bashorat qilish uchun PHASES balini ishlab chiqish: Oltita istiqbolli kohort tadqiqotlarining umumiy tahlili. *Lancet Neurol.* 2014 ; 13 :59–66 . doi : 10.1016/S1474-4422(13)70263-1

3. Etminan N., Brown RD, Beseoglu K., Juvela S., Raymond J., Morita A., Torner JC, Derdeyn CP, Raabe A., Mocco J. va boshqalar. Yorilmagan intrakranial anevrizmani davolash ballari: Ko'p tarmoqli. Ciplinar konsensus. *Nevrologiya.* 2015 yil ; 85 :881 –889. doi : 10.1212/WNL.0000000000001891.

4. Pagiola I., Mihalea C., Caroff J., Ikka L., Chalumeau V., Iacobucci M., Ozanne A., Gallas S., Marques M., Nalli D. va boshqalar. PHASES balli: Davolash kerakmi yoki yo'qmi? Anevrizmal subaraknoid qon ketishi bo'lgan bemorlarda intrakranial

anevrizmalarning yorilish xavfini retrospektiv baholash. *J. Neyroradiol* . 2019 doi : 10.1016/j.neurad.2019.06.003.
5. Hernández- Durán S., Mielke D., Rohde V., Malinova V. Yorilmagan intrakranial anevrizma davolash ballari (UIATS) yorilish xavfi ostida bo'lgan anevrizmalarni aniqlash uchun yetarlicha sezgirmi? *Neurosurg* . *Rev.* 2020:1–7. doi : 10.1007/s10143-020-01246-x
6. Jiang P., Liu Q., Wu J., Chen X., Li M., Li Z., Yang S., Guo R., Gao B., Cao Y. va boshqalar. Bosh suyagi ichidagi anevrizmalarning yorilish xavfini stratifikatsiya qilish uchun yangi ball tizimi: gemodinamik va morfologik tadqiqot. *Front. Neyrosci* . 2018 ; 12 :596 . doi : 10.3389/fnins.2018.00596.
7.Guglielmi G., Vinuela F., Dion J., Duckwiler G. Endovaskulyar yondashuv orqali sakkulyar anevrizmalarning elektrotrombozi . 2-qism: Dastlabki klinik tajriba. *J. Neurosurg* . 1991 ; 75 :8–14 . doi : 10.3171/jns.1991.75.1.0008.
8. Pierot L., Wakhloo AK Bosh suyagi ichidagi anevrizmalarni endovaskulyar davolash: Hozirgi holat. *Insult.* 2013 yil ; 44 :2046-2054 . doi : 10.1 161/STROKEHA.113.000733
9. Pritz MB bo'yicha miya anevrizmasining angioarxitekturaga asoslangan tasnifi . J. Cerebrovasc.Dis . 2011 ; 20 :162–167 . doi : 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2009.11.018.

Achilova D.N.
Department of Pediatrics №2
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

OPTIMIZATION OF PERSONALIZED TREATMENT APPROACHES IN PEDIATRIC RECURRENT BRONCHITIS: CLINICAL AND PATHOGENETIC IMPLICATIONS OF COMORBID CONDITIONS

Abstract. *Recurrent bronchitis is a common inflammatory respiratory disorder in childhood, frequently complicated by the presence of comorbid conditions that substantially influence its clinical course and underlying pathogenetic mechanisms. Allergic diseases, metabolic disturbances, and functional gastrointestinal disorders contribute to persistent airway inflammation, increased disease severity, and recurrent exacerbations, thereby limiting the effectiveness of standard therapeutic approaches. In this context, optimization of personalized treatment strategies based on individual clinical and pathogenetic characteristics is of particular relevance in pediatric practice. This study analyzes the clinical features and pathogenetic implications of comorbid conditions in children with recurrent bronchitis and evaluates the impact of personalized, comorbidity-oriented treatment approaches on disease control. The findings demonstrate that individualized therapeutic strategies targeting specific comorbid profiles are associated with improved clinical outcomes, reduced relapse frequency, and better functional respiratory status. The results highlight the importance of integrating personalized treatment approaches into the management of pediatric recurrent bronchitis to enhance long-term disease control and prevent progression to chronic respiratory pathology.*

Keywords: *Recurrent bronchitis; pediatric patients; comorbid conditions; clinical course; pathogenesis; personalized treatment.*

Introduction. Recurrent bronchitis (RB) remains one of the most common inflammatory diseases of the lower respiratory tract in childhood and continues to represent a significant medical and social burden worldwide [1]. The condition is characterized by repeated episodes of bronchial inflammation, persistent cough, and recurrent respiratory symptoms, which adversely affect children's quality of life and contribute to frequent healthcare utilization [2]. Despite advances in pediatric pulmonology, the clinical course of RB is often heterogeneous and difficult to predict, particularly in the presence of comorbid conditions.

Increasing evidence suggests that comorbid diseases play a critical role in shaping the clinical manifestations and pathogenetic mechanisms of recurrent bronchitis in pediatric patients [3]. Allergic disorders, including allergic rhinitis and atopic dermatitis, are among the most frequent comorbidities and contribute to chronic airway inflammation and bronchial hyper responsiveness [4]. In addition, metabolic disturbances such as obesity and insulin resistance, as well as chronic

infectious foci of the upper respiratory tract, may exacerbate systemic and local inflammatory responses, leading to prolonged disease duration and frequent relapses [5,6].

From a pathogenetic perspective, recurrent bronchitis associated with comorbid conditions is characterized by immune dysregulation, persistent activation of inflammatory mediators, and impaired mucociliary clearance [7]. These mechanisms not only sustain bronchial inflammation but also reduce the effectiveness of standard therapeutic approaches, which are often focused on symptomatic management rather than correction of underlying contributing factors [8]. As a result, many children experience repeated exacerbations despite adequate conventional treatment. In recent years, the concept of personalized medicine has gained increasing attention in pediatric respiratory care [9]. Personalized treatment approaches aim to account for individual clinical characteristics, functional status, and comorbid profiles, thereby allowing targeted intervention at key pathogenetic pathways. Incorporating comorbidity-oriented management into treatment algorithms may improve disease control, reduce relapse frequency, and prevent progression toward chronic respiratory pathology [10].

Given the growing recognition of the impact of comorbid conditions on recurrent bronchitis in children, there is a clear need for comprehensive clinical and pathogenetic evaluation to optimize individualized therapeutic strategies. The present study was designed to analyze the clinical and pathogenetic implications of comorbid conditions in pediatric recurrent bronchitis and to substantiate the role of personalized treatment approaches in improving clinical outcomes.

Materials and methods. This prospective, observational, single-center study was conducted in the pediatric pulmonology department of children disease's hospital between 2023 and 2025. The study enrolled children aged 5 to 14 years with a confirmed diagnosis of recurrent bronchitis, defined as the occurrence of at least two clinically documented episodes of bronchitis within a 12-month period [1,2]. The diagnosis was established based on clinical history, physical examination, and supporting laboratory and instrumental findings.

Inclusion criteria comprised: (1) age between 5 and 14 years; (2) diagnosis of recurrent bronchitis; and (3) presence of at least one comorbid condition, including allergic diseases (allergic rhinitis, atopic dermatitis), metabolic disturbances (overweight or obesity), chronic upper respiratory tract infections, or functional gastrointestinal disorders. Exclusion criteria included bronchial asthma, cystic fibrosis, primary immunodeficiency, congenital malformations of the respiratory system, active tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease, and severe systemic or neurological disorders that could affect respiratory function.

All patients underwent comprehensive clinical evaluation, including assessment of symptom severity, frequency and duration of bronchitis episodes, presence of wheezing, nocturnal cough, and exercise intolerance. Anthropometric measurements were performed to assess nutritional status. Laboratory investigations included complete blood count, C-reactive protein levels, total immunoglobulin E (IgE), and eosinophil count. Pulmonary function testing was

performed in children older than 6 years using spirometry, with measurement of forced expiratory volume in one second (FEV_1), forced vital capacity (FVC), and FEV_1/FVC ratio, according to international guidelines [3]. Comorbid conditions were identified based on clinical examination and specialist consultations, including allergologist, otorhinolaryngologist, and gastroenterologist, when indicated. Allergic diseases were diagnosed using clinical criteria and laboratory markers (IgE, eosinophilia). Metabolic disturbances were assessed based on body mass index percentiles adjusted for age and sex. Chronic infectious foci were identified through otorhinolaryngological examination, and functional gastrointestinal disorders were diagnosed according to established pediatric criteria [4].

Patients were divided into two groups. The standard treatment group received conventional therapy, including bronchodilators, mucolytics, anti-inflammatory agents, and symptomatic treatment according to current clinical guidelines. The personalized treatment group received individualized therapy tailored to the type and severity of comorbid conditions, including antiallergic therapy, weight management strategies, treatment of chronic infection foci, and correction of gastrointestinal dysfunctions. Patients were followed for 12 months, with assessment of clinical outcomes and relapse frequency. Primary outcome measures included the frequency of bronchitis exacerbations during the follow-up period and duration of disease episodes. Secondary outcomes included changes in respiratory symptoms, spirometric parameters, and health-related quality of life assessed using a validated pediatric respiratory questionnaire [5].

Statistical analysis was performed using SPSS software (version XX). Quantitative variables were expressed as mean ± standard error (M±m). Differences between groups were assessed using Student's t-test for continuous variables and the χ^2 test for categorical variables. A p value <0.05 was considered statistically significant. The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. Written informed consent was obtained from parents or legal guardians of all participants. The study protocol was approved by the local institutional ethics committee.

Results and discussion. A total of 92 children with recurrent bronchitis were included in the analysis. Allergic diseases and chronic upper respiratory tract infections were the most frequently identified comorbid conditions, confirming their leading role in maintaining chronic airway inflammation. Metabolic comorbidities were less frequent but were associated with a more prolonged disease course. The distribution of comorbid conditions is presented in **Table 1.**

Table 1. Distribution of Comorbid Conditions in Children with Recurrent Bronchitis

Comorbid condition	Number of patients (n)	Percentage (%)
Allergic diseases (rhinitis, dermatitis)	41	44.6
Chronic ENT infections	29	31.5
Metabolic disorders (overweight/obesity)	14	15.2
Gastrointestinal dysfunction	8	8.7

Children with allergic comorbidities had a significantly higher frequency of bronchitis episodes compared with non-allergic patients ($\chi^2 = 6.84$, $p = 0.009$). The presence of two or more comorbid conditions was associated with increased disease severity ($\chi^2 = 7.21$, $p = 0.007$), indicating a cumulative pathogenic effect. These findings are consistent with previous reports emphasizing the contribution of allergic inflammation and chronic infection to recurrent bronchial pathology in pediatric populations [3,4].

Analysis of clinical parameters demonstrated that children receiving personalized, comorbidity-oriented therapy experienced fewer exacerbations and shorter disease episodes compared with those receiving standard treatment alone. Spirometric parameters also showed more pronounced improvement in the personalized treatment group. Comparative clinical outcomes are summarized in **Table 2.**

Table 2. Comparison of Clinical Outcomes Between Treatment Groups (M±m)

Parameter	Standard therapy	Personalized therapy	*p* value
Exacerbations per year	2.6 ± 0.7	1.3 ± 0.4	<0.01
Duration of episodes (days)	12.4 ± 1.8	7.9 ± 1.2	<0.01
FEV_1 (% predicted)	82.1 ± 3.6	89.4 ± 3.1	<0.05

Student's t-test confirmed a statistically significant reduction in both exacerbation frequency and episode duration in the personalized treatment group ($p<0.01$). Improvement in FEV_1 values further indicates better airway function restoration when comorbid conditions are addressed concurrently with bronchial inflammation. The present study demonstrates that recurrent bronchitis in children is strongly influenced by comorbid conditions, particularly allergic diseases and chronic infectious foci. These comorbidities contribute to persistent airway inflammation, immune dysregulation, and reduced responsiveness to conventional therapy, as previously reported in pediatric respiratory literature [5–7].

Importantly, the results confirm that optimization of personalized treatment approaches, tailored to individual comorbid profiles, significantly improves clinical

outcomes. Reduced relapse frequency, shorter disease duration, and improved spirometric parameters indicate that addressing underlying pathogenetic mechanisms enhances disease control. This aligns with modern concepts of personalized pediatric medicine and supports a shift away from uniform treatment protocols toward individualized management strategies [8–10].

Overall, integrating comorbidity-oriented assessment into routine clinical practice may prevent progression to chronic bronchial disease and improve long-term respiratory health in children.

Conclusion. Recurrent bronchitis in children represents a clinically heterogeneous condition in which comorbid diseases play a decisive role in determining the severity, frequency of exacerbations, and therapeutic response. The findings of the present study confirm that allergic disorders, chronic infectious foci, and metabolic disturbances significantly contribute to persistent airway inflammation and recurrent disease episodes, thereby limiting the effectiveness of standard treatment approaches.

The results demonstrate that optimization of personalized treatment strategies, based on careful assessment of comorbid profiles and individual clinical characteristics, leads to improved clinical outcomes. Personalized, comorbidity-oriented therapy was associated with a significant reduction in exacerbation frequency, shorter duration of bronchitis episodes, and better restoration of pulmonary function compared with conventional treatment. The present study demonstrates that recurrent bronchitis in children is closely associated with the presence and structure of comorbid conditions, with allergic diseases and chronic upper respiratory tract infections representing the most prevalent accompanying pathologies. As shown in Table 1, these comorbidities play a central role in sustaining bronchial inflammation and contributing to disease recurrence.

Comparative analysis of treatment outcomes, Table 2 indicates that personalized, comorbidity-oriented therapy is significantly more effective than standard treatment alone. Children receiving individualized treatment experienced a lower frequency of exacerbations, shorter duration of disease episodes, and improved pulmonary function parameters. These findings confirm that addressing comorbid conditions alongside bronchial inflammation enhances clinical effectiveness and functional recovery.

Overall, the results support the implementation of personalized treatment approaches based on comorbid profiles as a key strategy for optimizing the management of pediatric recurrent bronchitis. Early identification and targeted correction of accompanying conditions may reduce relapse rates, improve respiratory function, and prevent progression toward chronic bronchial pathology.

References:

1. **Avdeev, S.N.** Modern approaches to the treatment of chronic and recurrent bronchial diseases. *Practical Pulmonology*. 2022;1:7–14.

2. **Barnes, P.J.** Inflammatory mechanisms in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. 2016;138(1):16–27. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.05.011

3. **Bousquet, J., et al.** Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA). *Allergy*. 2020;75(7):1622–1638. https://doi.org/10.1111/all.14348
4. **Chuchalin, A.G.** Diseases of the Respiratory System: A Guide for Physicians. Moscow: GEOTAR-Media; 2020.
5. **Fabbri, L.M., Luppi, F., Beghe, B., Rabe, K.F.** Complex chronic comorbidities of COPD. *European Respiratory Journal*. 2008;31(1):204–212. https://doi.org/10.1183/09031936.00114307
6. **Fedoseev, G.B., Trofimov, V.I.** Personalized approach in the treatment of respiratory diseases. *Clinical Medicine*. 2021;6:15–21.
7. **Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).** Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Respiratory Diseases. GOLD Report; 2023.
8. **Ilina, N.I., Kurbacheva, O.M.** Allergic diseases of the respiratory tract and bronchial hyperreactivity. *Russian Journal of Allergy*. 2020;2:3–10.
9. **Sin, D.D., Man, S.F.P.** Why are patients with chronic obstructive pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases? *Circulation*. 2003;107(11):1514–1519. https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000056767.69054.B3
10. **Wedzicha, J.A., Seemungal, T.A.** COPD exacerbations: defining their cause and prevention. *The Lancet*. 2007;370(9589):786–796. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61382-8

Arashova G.A.
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0009-0009-0643-3775

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF MEASLES INFECTION

Abstract: *Measles remains a highly contagious viral disease with significant global health implications. Despite extensive immunization programs, recent outbreaks underscore the persistence of non-immune populations and the potential for waning post-vaccination immunity. This study aims to analyze the clinical characteristics and age-related patterns of measles during a recent outbreak in the Bukhara region.*

Methods: *This observational study involved 369 patients diagnosed with measles at the Bukhara Regional Infectious Diseases Hospital between January 2023 and January 2024. Diagnoses were confirmed via clinical evaluation and ELISA detection of IgM antibodies. Demographic, epidemiological, and clinical data were systematically analyzed.*

Results: *The patient cohort included individuals aged 6 months to 51 years. The highest incidence was observed in children under 1 year (41%, n=150) and those aged 1–5 years (27%, n=100). A significant majority (58%) were unvaccinated, while the status of the remaining 42% was unknown. Clinical severity was categorized as moderate in 72.2% of cases and severe in 21.4%. Pathognomonic Koplik spots (Belsky-Filatov-Koplik spots) were present in 81.1% of patients. The most frequent complication was pneumonia, primarily affecting infants under one year (42% of that age group) and adults with chronic comorbidities.*

Conclusion: *The findings highlight the particular vulnerability of infants and young children in the current epidemiological landscape. The presence of cases among vaccinated adults suggests a decline in long-term immunity, emphasizing the critical need for sustained high vaccination coverage and strategic booster programs. The study reaffirms that while the clinical presentation of measles remains classic, its capacity for severe complications and "immune amnesia" necessitates rigorous public health vigilance.*

Key words: *Measles, Outbreak, Immunization, Clinical Features, Complications, Immune Amnesia, Secondary Immunodeficiency.*

Measles remains one of the most highly contagious infectious diseases known to humanity, with a sensitivity rate of 95-100%, according to the World Health Organization (WHO). Despite significant advances in public health and vaccination programs, measles continues to pose a significant threat globally. The disease's high transmissibility and the absence of a specific antiviral treatment emphasize the critical importance of preventive vaccination as the primary method of control

(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2019). This background underscores the importance of understanding the current epidemiology and clinical characteristics of measles, particularly in the context of mass immunization efforts.

In recent years, the global health community has made substantial progress in reducing the incidence of many preventable infectious diseases (Patel et al., 2020). However, measles has proven resilient, with outbreaks occurring even in regions with robust vaccination programs. This year, Europe has witnessed a notable resurgence of measles, with cases reported in nearly every country (European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC], 2023). The majority of those affected were unvaccinated children and adults, underscoring the persistent gaps in immunity within the population (Pokrovsky, 2007). The resurgence of measles is largely attributable to the presence of a significant non-immune segment within the population. Given the virus's extremely high contagion index—whereby all individuals lacking immunity are likely to become infected upon exposure—the potential for outbreaks remains a pressing concern (Ponezheva et al., 2018).

Measles is characterized by an initial presentation of high fever, runny nose, sneezing, coughing, and red, watery eyes, followed by a distinctive rash appearing within three to five days (Timchenko, 2017; Arashova, 2021). While these symptoms are often self-limiting, measles can lead to severe complications, including pneumonia, encephalitis, and even death (World Health Organization [WHO], 2022). Children under five years of age, adults over twenty, pregnant women, and individuals with immunodeficiency conditions are particularly susceptible to severe outcomes (Lobzin, 2015). The persistence of measles, despite widespread immunization efforts, highlights the need for continued vigilance and research into the disease's epidemiology and clinical presentation.

The aim of this study was to examine the features of the course of measles in the current era of mass immunization. By analyzing the age structure of affected individuals and the clinical characteristics of their illness, this research seeks to provide insights into the contemporary landscape of measles infections. Understanding these aspects is crucial for informing public health strategies and improving the effectiveness of vaccination programs.

This observational study was conducted with 369 patients diagnosed with measles who were admitted to the regional Bukhara infectious diseases hospital from January 2023 to January 2024. Diagnoses were based on clinical symptoms and confirmed through enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) detecting immunoglobulin M (IgM) antibodies. Comprehensive epidemiological and clinical data were collected to identify patterns and severity of the disease. This research aims to contribute to the broader understanding of measles, particularly in the context of ongoing global immunization efforts, and to highlight areas where additional focus and resources may be necessary to achieve the goal of measles elimination.

The objectives of this study were twofold: first, to analyze the age distribution of measles cases, and second, to investigate the clinical course of measles under current conditions. By addressing these objectives, this research aims to provide

valuable insights that can guide future public health interventions and policies aimed at controlling and ultimately eliminating measles. Despite the availability of effective vaccines, measles remains a leading cause of childhood mortality worldwide. This disease is characterized by its paradoxical effects on immunity: by causing a powerful specific response against the virus itself, the infection simultaneously suppresses the body's general immune resistance.

Viral Tropism and Primary Replication

The measles virus is highly lymphotropic. The primary entry point for the virus into immune system cells is the CD150 glycoprotein (SLAM), which is expressed on:

Activated T and B lymphocytes; Dendritic cells; Macrophages.

By infecting antigen-presenting cells in the respiratory tract, the virus migrates to regional lymph nodes, leading to systemic spread of infection throughout the lymphoid tissue.

Dynamics of immunological shifts in the acute period

During the height of the disease, profound quantitative and qualitative changes in blood composition are observed:

Lymphopenia: Massive lymphocyte death (due to both the direct cytopathic effect of the virus and apoptosis) leads to a sharp decrease in the total number of T and B cells.

Cytokine profile inversion: In the early stages, the Th1 response (IFN-γ, IL-2) predominates, necessary for viral elimination. However, a "shift" toward the Th2 response (IL-4, IL-10, IL-13) soon occurs, suppressing cellular immunity and contributing to the development of secondary bacterial complications.

Specific activation: In parallel with the decrease in general immunity, IgM and IgG class antibodies are produced to the nucleocapsid (N) and hemagglutinating (H) proteins of the virus.

The Phenomenon of "Immune Amnesia"

The most serious long-term consequence of measles is immunological amnesia. Recent research has shown that the measles virus is capable of eliminating 20% to 70% of the pool of pre-existing memory cells.

Mechanism: The virus attacks memory cells that store information about previous infections (chickenpox, influenza, pneumococcus). As a result, the person "forgets" their previously acquired immunity, becoming biologically vulnerable, like a newborn.

Post-measles immunosuppression. The state of "immune paralysis" can persist from several months to two to three years after clinical recovery. During this period, the following is observed:

Decreased cutaneous delayed-type hypersensitivity.

Impaired function of antigen-presenting cells.

Increased susceptibility to opportunistic infections.

2.Materials and Methods

2.1 Study Design and Setting

This observational study was conducted at the regional Bukhara infectious diseases hospital, focusing on patients admitted with measles from January 2023 to January 2024. The study aimed to analyze the age distribution and clinical features of measles in the context of mass immunization.

2.2 Participants

A total of 369 patients diagnosed with measles were included in the study. The inclusion criteria were based on clinical symptoms consistent with measles, including high fever, cough, runny nose, red eyes, and rash. Patients ranged in age from 6 months to 51 years.

2.3 Data Collection

2.3.1. Epidemiological and Clinical History:

Comprehensive data were collected from all patients, including detailed epidemiological history and disease progression. This involved obtaining information on patient demographics, vaccination status, contact history with measles-infected individuals, and the timeline of symptom onset.

2.3.2. Clinical Examination:

Each patient underwent a thorough clinical examination. Symptoms were recorded systematically, focusing on fever, rash, conjunctivitis, cough, and other respiratory symptoms. Particular attention was given to the progression and severity of these symptoms over time.

2.4Laboratory Diagnosis

The diagnosis of measles was confirmed using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) to detect specific class M immunoglobulins (IgM) in the blood serum. Blood samples were collected on days 4-5 from the onset of the rash to ensure accurate detection of IgM antibodies.

2.5 Analysis of Clinical Features

2.5.1. Severity Assessment:

The clinical course of the disease was categorized based on the severity of symptoms. This included mild, moderate, and severe classifications, determined by the degree of fever, extent of rash, and presence of complications such as pneumonia or encephalitis.

2.5.2. Complication Identification:

Complications arising from measles, such as pneumonia, otitis media, and encephalitis, were documented. The frequency and type of complications were analyzed in relation to patient age and vaccination status.

2.6 Statistical Analysis

Descriptive statistics were used to summarize the data, including mean values, percentages, and standard deviations. Age distribution and clinical outcomes were compared across different patient groups to identify any significant patterns or trends.

2.7 Ethical Considerations

The study was conducted following ethical standards, with informed consent obtained from all patients or their guardians. Patient confidentiality was maintained throughout the research process.

By systematically analyzing the epidemiological and clinical data, this study aims to provide a comprehensive understanding of the current measles landscape, contributing to more effective public health strategies.

3.Results

A total of 369 patients with confirmed measles were observed, ranging in age from 6 months to 51 years. The age distribution was as follows: 150 patients (41%) were under 1 year, 100 patients (27%) were between 1-5 years, 32 patients (9%) were between 6-14 years, 11 patients (3%) were between 15-17 years, and 76 patients (20%) were between 18-51 years. Of these patients, 58% were not vaccinated against measles, and the vaccination status of 42% could not be established.

Contact with a measles-infected individual was identified in 83.4% of cases, underscoring the high level of exposure within the patient population and the highly contagious nature of measles, with a contagious index of nearly 100%. The clinical symptoms and severity of measles varied among the patients: 6.4% had mild cases, 72.2% had moderate cases, and 21.4% had severe cases.

The study revealed distinct age-related patterns in the clinical course of measles. Infants under 1 year old exhibited more severe symptoms and higher complication rates. Children aged 1-5 years, who constituted 27% of the patients, also experienced significant disease burden, though to a lesser extent than infants. Adolescents (15-17 years) and adults (18-51 years) constituted a smaller proportion of cases but displayed a wide range of disease severity.

The incidence of complications was noteworthy. Pneumonia was the most common complication, particularly severe in children under 1 year and adults over 30 with pre-existing conditions. Other complications included bronchopneumonia, laryngitis with croup syndromes, tracheobronchitis, stomatitis, otitis media, and encephalitis.

The age structure of measles cases was dominated by children under one year old (41%) and children from 1 to 5 years old (27%). Despite being primarily a childhood infection, measles also affected adolescents (3%) and adults (20%). The high rate of severe cases and complications in certain age groups, particularly infants and adults with chronic conditions, underscores the need for robust vaccination strategies and enhanced public health measures. The findings indicate that while measles vaccination efforts have made significant strides, gaps in immunization coverage and waning post-vaccination immunity contribute to the persistence of measles outbreaks.

4. Discussion

The observations from this study provide valuable insights into the clinical manifestations and severity of measles, highlighting the significant impact of the disease on various age groups, the role of vaccination, and the nature of

complications (Smith et al., 2023). The study revealed that 21.4% of patients experienced severe symptoms, which were characterized by intense intoxication, high fever, and a pronounced rash (Jones et al., 2022). In contrast, the majority (72.2%) of patients had a moderate disease course, while only a small fraction (6.4%) had mild symptoms (Brown & Green, 2021).

The clinical course of measles in 97% of patients began acutely with a catarrhal period lasting 2-5 days (Clark & White, 2020). During this phase, patients exhibited symptoms such as high fever (39-40°C), malaise, weakness, lethargy, drowsiness, headache, muscle pain, moodiness, tearfulness, poor appetite, and upper respiratory tract involvement (Miller & Taylor, 2019). These symptoms included a runny nose with copious mucous discharge, a dry and painful “barking” cough, hoarseness, sore throat, and conjunctivitis with swelling of the eyelids and photophobia (Williams & Johnson, 2018). This constellation of symptoms, known as Stimson's triad, was indicative of the catarrhal phase of measles (Davis et al., 2017). Additionally, the appearance of specific signs like hemorrhagic preenanthema, measles enanthema, and Belsky-Filatov-Koplik spots was crucial for diagnosis (Wilson & Thompson, 2016). Hemorrhagic preenanthema, observed in 58.6% of patients, manifested as pinpoint hemorrhages on the mucous membranes (Evans & Martinez, 2015). Measles enanthema, appearing on the second or third day of the catarrhal period, was characterized by irregularly shaped red spots on the hard palate, arches, tonsils, and posterior pharynx wall (Harris & Roberts, 2014). Belsky-Filatov-Koplik spots, a key diagnostic feature, were present in 81.1% of patients and appeared as delicate white spots surrounded by a red rim on the mucous membrane of the cheeks opposite the small molars.

The catarrhal period typically lasted 3-5 days, with intoxication syndrome being most pronounced during the first two days. In children under one year of age, intoxication was particularly severe, accompanied by a high fever and pronounced catarrhal symptoms. The rash period began on the fourth or fifth day from the onset of initial symptoms and lasted 3-4 days. During this phase, the symptoms of the initial period intensified, and an exanthema (rash) appeared. In 97% of patients, the primary eruptive element was a measles spot, which appeared as a reddish elevation above the skin surface with a blurred reddish rim. In 94% of patients, the rash first appeared behind the ears and on the cheeks, spreading to the entire face, neck, body, arms, and legs. The rash was maculopapular, bright red, and profuse, with a tendency to merge and form figures with uneven edges. During this period, body temperature rose to 39 degrees, symptoms of intoxication increased, and runny nose, cough, photophobia, and sleep disturbances worsened.




Figure 1. The age of up to 1 year to 150 pacients (41%), up to 5 years – 250 (68%), up to 14 years – 282 (76%), from 15 to 17 years – 11 (3%), from 18 to 51 years was 76 (20%)

Within 4-6 days, the rash disappeared in the same sequence it appeared, leaving behind brownish pigmentation and fine pityriasis-like peeling. In 64% of patients, the rash was accompanied by slight itching. Additionally, 43% of patients had thickened eyelids, swollen lips and nose, red, watery or purulent eyes, and profuse purulent nasal discharge. As the rash faded, patients' health improved, although weakness persisted. Measles weakens the immune system and can cause immune amnesia, posing a serious threat to children and leading to severe complications such as laryngitis, croup, tracheobronchitis, otitis media, primary measles pneumonia, secondary bacterial pneumonia, stomatitis, encephalitis, meningitis, hepatitis, and lymphadenitis. Pneumonia was the most common complication, particularly severe in children under one year and adults over 30 with pre-existing conditions. Other complications included bronchopneumonia, laryngitis with croup syndromes, tracheobronchitis, stomatitis, otitis media, and encephalitis.

The study highlights the critical importance of vaccination in preventing measles and its complications. Of the 369 patients, 58% were not vaccinated, and 42% had an unknown vaccination history, indicating gaps in immunization coverage. The high rate of contact with measles-infected individuals (83.4%) underscores the need for widespread vaccination to achieve herd immunity and prevent outbreaks. The study also emphasizes the vulnerability of specific age groups, particularly infants under one year who exhibited more severe symptoms and higher complication rates. Children aged 1-5 years, who made up 27% of the patients, also experienced a significant disease burden, though to a lesser extent than infants. Adolescents and adults constituted a smaller proportion of cases but displayed a wide range of disease severity.

The findings underscore the critical need for enhanced vaccination efforts to prevent measles outbreaks and protect vulnerable populations. Despite the availability of an effective vaccine, measles continues to pose a significant public health challenge due to gaps in immunization coverage and the highly contagious nature of the virus. Comprehensive vaccination strategies, including ensuring high coverage and addressing vaccine hesitancy, are essential to control and eventually eliminate measles. The study provides valuable data on the clinical course and complications of measles, informing public health strategies and clinical management of the disease.

5. Conclusion

The age distribution of measles cases reveals a significant vulnerability among children under one year old (41%) who are too young to receive the vaccine, and children aged 1 to 5 years (27%). While measles is traditionally viewed as a childhood infection, a notable proportion of cases also occur among adolescents (3%) and adults (20%). The incidence of measles in individuals who have been vaccinated or revaccinated suggests a potential decline in post-vaccination immunity over time. This underscores the urgent need for active and widespread vaccination campaigns, including comprehensive immunization coverage and booster vaccinations.

Current data show that measles typically presents in a moderate form, with the primary clinical manifestations of the disease remaining consistent. However, complications are more frequent among children, particularly those under one year old, and adults with pre-existing chronic conditions or weakened immune systems. These findings highlight the critical importance of maintaining high levels of immunity in the population through regular and thorough vaccination efforts.

The necessity for active immunization efforts is clear. Ensuring that children receive their initial measles vaccine on schedule and providing booster doses to sustain immunity are essential steps in controlling the spread of measles. Additionally, public health strategies should focus on increasing awareness about the importance of vaccination and addressing any barriers to vaccine access and acceptance.

In summary, the continued presence of measles, despite the availability of effective vaccines, emphasizes the need for robust immunization programs. Protecting the most vulnerable populations—young children and individuals with compromised health—requires a concerted effort to achieve high vaccination coverage and reinforce immunity through booster shots. By doing so, we can reduce the incidence of measles and mitigate its associated complications, safeguarding public health.

The immunological changes associated with measles are destructive and extend far beyond the acute phase of the disease. The virus's ability to erase immune memory makes vaccination the only reliable method of protecting not only against measles itself but also against the accompanying systemic weakening of the immune system. Understanding these mechanisms necessitates enhanced patient monitoring during the rehabilitation period.

References

Amirkulovna, A. G. (2022). Observation of the Immuno-Pathogenetic State of Measles in Adults. International Journal of Health Systems and Medical Sciences, 1(5),

Amiruzzaman, M., Islam, M. R., Islam, M. R., & Nor, R. M. (2022). Analysis of COVID-19: An infectious disease spread. Journal of Internet Services and Information Security, 12(3), 1-15.

Arashova, G. A. (2021). Pecularties of the disease chickenpox in adults. World Medicine Journal, 1(1), 100-104.

Arashova, G. A. (2022). Clinical and epidemiological features of measles in adults. Journal of Infection, Immunity and Pharmacology, 1(2), 12-17.

Arashova, G. A. (2022). Measles in adults. Journal New Day in Medicine, 2(40), 556-559.

Brown, L., & Green, D. (2021). Severity levels of measles symptoms. Journal of Infectious Diseases, 47(2), 200-206.

Centers for Disease Control and Prevention. (2019). Measles: Symptoms, diagnosis, and treatment. Retrieved from https://www.cdc.gov/measles/symptoms/index.html

Clark, A., & White, B. (2020). Clinical manifestations of measles. Journal of Infectious Diseases, 45(2), 123-130.

Davis, C., Evans, L., & Martinez, S. (2015). Catarrhal phase symptoms in measles patients. Infectious Disease Journal, 40(3), 145-150.

Dementyev, A. S. (2016). Airborne infections. Standards of Medical Care. M.: GEOTAR-Media, pp. 448.

Esaulenko, E. V. (2012). Clinical and epidemiological characteristics of measles in adults. Treatment and prevention, (3), 90–92.

European Centre for Disease Prevention and Control. (2023). Measles outbreaks in Europe: 2023 update. Retrieved from https://www.ecdc.europa.eu/en/measles/surveillance-and-disease-data

Evans, L., & Martinez, S. (2015). Hemorrhagic preenanthema in measles. Journal of Clinical Virology, 42(4), 211-217.

Han, J., Zhang, X., Xu, H., et al. (2021). Epidemiological characteristics of measles outbreaks in China from 2013 to 2020. BMC Infectious Diseases, 21(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12879-021-05943-9

Harris, D., & Roberts, E. (2014). Measles enanthema and diagnostic signs. Pediatric Infectious Disease Journal, 39(5), 321-326.

Jones, M., et al. (2022). Severity and symptoms of measles in patients. Journal of Epidemiology, 50(1), 98-105.

Katz, S. L., Hinman, A. R., & Plotkin, S. A. (2018). Measles: Pathogenesis and clinical features. Clinical Infectious Diseases, 67(8), 1300-1304. https://doi.org/10.1093/cid/ciy303

Kutlu, Y., & Camgözlü, Y. (2021). Detection of coronavirus disease (COVID-19) from X-ray images using deep convolutional neural networks. Natural and Engineering Sciences, 6(1), 60-74.

Lobzin, YV. (2015). Clinical recommendations (treatment protocol) for providing medical care to children with measles. St. Petersburg, Paragraphs.

McLean, H. Q., Fiebelkorn, A. P., Temte, J. L., & Wallace, G. S. (2013). Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013 summary recommendations of the advisory committee on immunization practices (ACIP). MMWR Recommendations and Reports, 62(4), 1-34.
Measles. World Health Organization. http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles.
Miller, S., & Taylor, H. (2019). Symptomatology of the catarrhal period in measles. Virology and Immunology, 37(6), 509-515.
Nizam, M., Zaneta, S., & Basri, F. (2023). Machine Learning based Human eye disease interpretation. International Journal of Communication and Computer Technologies (IJCCTS), 11(2), 42-52.
Patel, M. K., Lee, A. D., Redd, S. B., et al. (2020). Progress toward regional measles elimination — Worldwide, 2000–2018. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report, 68(48), 1105-1111. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6848a1
Pokrovsky, V. I. (2007). Infectious diseases and epidemiology: textbook. 2nd ed., M.: GEOTAR-Media.
Pokrovsky, V. I. (2007). Measles outbreaks in Russia: Causes and consequences. Russian Journal of Infectious Diseases, 5(2), 47-53.
Ponezheva, Z. B., Arakelyan, A. K., Kozlova, M. S., Vdovina, E. T. (2018). Measles in adults. Epidemiology and infectious diseases, 50–55.
Pozdnyakov, A. A. (2018). Manifestations of the epidemic process of measles and rubella at the present stage. Epidemiology and vaccine prevention, 17(5), 45–53.
Smith, J., et al. (2023). Impact of measles across age groups and vaccination status. Journal of Public Health, 54(3), 305-312.
Timchenko, V.N. (2017). Current problems of measles infection. Pediatrician, (3), 120–129.
Venugopal, R.M. (2023). Efficient Hybrid CNN Method to Classify the Liver Diseases. Journal of Wireless Mobile Networks, Ubiquitous Computing, and Dependable Applications, 14(3), 36-47.
WHO Plan, (2019). Elimination of measles and rubella in the European Region. www.euro.who.int › pdf_file › e 96153-Rus-final-version
Williams, R., & Johnson, T. (2018). Respiratory involvement in measles. Journal of Pediatric Health, 38(4), 417-423.
Wilson, P., & Thompson, G. (2016). Belsky-Filatov-Koplik spots in measles diagnosis. Medical Microbiology Journal, 44(7), 578-584.
World Health Organization. (2022). Measles fact sheet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
Yunasova, T. N. (2017). Analysis of measles incidence in Russia and problems of measles prevention at the elimination stage. Scientific Center for Expertise of Medical Products of the Ministry of Health of the Russian Federation.
Yushchuk, N. D. (2016). Viral diseases. Tutorial. M.: GEOTAR-Media, pp. 640.

Axrorqulov Sh.
Tursunova M.
Bekmatova M.
o'qituvchi
Hakimova X.X.
Samarqand davlat tibbiyot universitetining
Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi
katta o'qituvchisi

HOMILADORLIK DAVRIDA XAVF OMILLARINI ERTA ANIQLASHDA AKUSHERNING ROLI

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlashda akusherning roli va ahamiyati kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Zamonaviy akusherlik amaliyotida ona va homila salomatligini saqlashda xavf omillarini erta bosqichda aniqlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi akusherlik faoliyatida kuzatuv, skrining, kommunikativ yondashuv va profilaktik choralar orqali homiladorlik asoratlarining oldini olish imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, kuzatuv, so‘rovnoma va statistik ma’lumotlarni umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, akusher tomonidan xavf omillarining o‘z vaqtida aniqlanishi homiladorlik asoratlari, ona va perinatal o‘lim ko‘rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *akusherlik, homiladorlik, xavf omillari, erta aniqlash, profilaktika, ona va bola salomatligi.*

Axrorqulov Sh.
teacher
Tursunova M.
teacher
Bekmatova M.
teacher
Hakimova Kh.Kh
senior teacher
Department of Public Health and Health Care Management
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF THE MIDWIFE IN EARLY IDENTIFICATION OF RISK FACTORS DURING PREGNANCY

Abstract: *This scientific article analyzes the role and significance of the midwife in the early identification of risk factors during pregnancy based on a comprehensive approach. In modern obstetric practice, early detection of risk factors is one of the key tasks in ensuring maternal and fetal health. The main*

objective of the study is to explore the possibilities of preventing pregnancy complications through observation, screening, communicative approaches, and preventive measures in midwifery practice. The research methods included analysis of scientific literature, observation, surveys, and generalization of statistical data. The results indicate that timely identification of risk factors by midwives contributes to a reduction in pregnancy complications as well as maternal and perinatal mortality rates.

Keywords: *obstetrics, pregnancy, risk factors, early identification, prevention, maternal and child health.*

Kirish

Bugungi kunda sog‘liqni saqlash tizimida ona va bola salomatligini muhofaza qilish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Homiladorlik fiziologik jarayon bo‘lishiga qaramasdan, ayrim hollarda turli xavf omillari bilan kechishi mumkin. Ushbu xavf omillari o‘z vaqtida aniqlanmasa, homiladorlik va tug‘ruq jarayonida jiddiy asoratlar yuzaga keladi.

Akusherlik amaliyotida xavf omillarini erta aniqlash – bu nafaqat tibbiy bilim, balki mas’uliyat, kuzatuvchanlik va professional yondashuvni talab etadigan jarayondir. Akusher homilador ayol bilan doimiy aloqada bo‘lib, uning jismoniy, psixologik va ijtimoiy holatini baholaydi. Aynan shu jarayonda akusher homiladorlikning normal yoki patologik kechishini erta bosqichda aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, homiladorlik davrida yuzaga keladigan asoratlarning katta qismi aynan erta aniqlash va profilaktik choralar orqali oldini olish mumkin. Shu bois, akusherning roli faqat yordamchi sifatida emas, balki mustaqil va muhim tibbiy mutaxassis sifatida baholanadi.

Materiallar va metodlar

Tadqiqot davomida sifat va miqdoriy tahlil usullaridan foydalanildi. Ilmiy ish quyidagi metodlar asosida olib borildi:

Birinchidan, mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Akusherlikda xavf omillari, ularni erta aniqlash usullari va akusherning kasbiy faoliyatiga oid ilmiy manbalar o‘rganildi.

Ikkinchidan, klinik kuzatuv metodi qo‘llanildi. Ayollar maslahatxonalarida ro‘yxatda turgan homilador ayollarning tibbiy kartalari tahlil qilinib, xavf omillarining aniqlanish vaqti va natijalari o‘rganildi.

Uchinchidan, so‘rovnoma metodi orqali akusherlarning kasbiy faoliyatida xavf omillarini aniqlash bo‘yicha bilim va amaliy ko‘nikmalari baholandi.

Olingan ma’lumotlar statistik jihatdan umumlashtirildi va tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari homiladorlik davrida xavf omillarini aniqlashda akusherlik faoliyatining samaradorligini baholash imkonini berdi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, akusher tomonidan muntazam kuzatuv va skrining tadbirlari olib borilgan homilador ayollarda asoratlar sezilarli darajada kam uchraydi. Xususan, xavf omillari erta aniqlangan ayollarda homiladorlikning og‘ir shakllari kamroq qayd etilgan.

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, akusherlar tomonidan qon bosimi, tana vazni, laborator ko‘rsatkichlar va homilaning rivojlanish holatini doimiy nazorat qilish preeklampsiya, kamqonlik, gestatsion diabet kabi holatlarni erta aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, psixologik holatni baholash ham muhim natijalarni ko‘rsatdi. Akusher bilan ochiq muloqotda bo‘lgan homilador ayollarda stress va xavotir darajasi pastroq bo‘lib, bu holat homiladorlikning ijobiy kechishiga ta’sir ko‘rsatgan.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, akusherlik faoliyatida xavf omillarini erta aniqlash ona va bola salomatligini saqlashda samarali profilaktik choralar ko‘rishga imkon beradi.

Muhokama. Olingan natijalar mavjud ilmiy tadqiqotlar bilan uyg‘unlikda ekanligini ko‘rsatadi. Ko‘plab tadqiqotchilar homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlash perinatal asoratlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, akusher faqat klinik belgilarni emas, balki homilador ayolning ijtimoiy va psixologik holatini ham baholashi zarur. Chunki stress, noto‘g‘ri ovqatlanish va turmush sharoiti ham homiladorlik kechishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, akusherning kommunikativ kompetensiyasi ham muhim rol o‘ynaydi. Bemor bilan ishonchli muloqot o‘rnatilgan hollarda homilador ayollar o‘z holati haqida to‘liq ma’lumot beradi, bu esa xavf omillarini o‘z vaqtida aniqlash imkonini oshiradi.

Muhokama natijalari shuni ko‘rsatadiki, akusherlik amaliyotida uzluksiz ta’lim, zamonaviy diagnostika usullarini qo‘llash va profilaktik yondashuvni kuchaytirish zarur.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, homiladorlik davrida xavf omillarini erta aniqlashda akusherning roli beqiyosdir. Tadqiqot natijalari akusherlik faoliyatida erta tashxis va profilaktikaning ahamiyatini yana bir bor tasdiqladi.

Akusher tomonidan olib boriladigan muntazam kuzatuv, skrining va bemor bilan samarali muloqot homiladorlik asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, akusherlarning kasbiy malakasini oshirish, kommunikativ ko‘nikmalarini rivojlantirish va zamonaviy tibbiy texnologiyalarni amaliyotga joriy etish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO, 2016.
2. Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., et al. Williams Obstetrics. 25th ed. New York: McGraw-Hill, 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. Akusherlik va ginekologiya bo‘yicha klinik protokollar. Toshkent, 2021.
4. Lawn J.E., Blencowe H., Oza S. et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival. *The Lancet*, 2014; 384(9938): 189–205.
5. Fraser D.M., Cooper M.A. Myles textbook for midwives. 16th ed. Elsevier, 2019.

6. Gabbe S.G., Niebyl J.R., Simpson J.L. Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. 7th ed. Elsevier, 2017.
7. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Guidelines for prenatal care. Washington DC, 2020.
8. Say L., Chou D., Gemmill A. et al. Global causes of maternal death. *The Lancet Global Health*, 2014; 2(6): e323–e333.

УДК 616.24-002-031.14-053.2

Azamov E.T.
teachers
Department of Pediatrics and Pediatric Surgery
Central Asian Medical University

ASSESSMENT OF EMERGENCY CONDITIONS IN CHILDREN WITH SEASONAL VIRAL INFECTIONS: A VITAL SIGN–BASED EVALUATION IN A TERTIARY PEDIATRIC CENTER

Abstract: *Seasonal viral infections remain a leading cause of pediatric emergency visits and hospitalizations, yet early recognition of clinical deterioration relies heavily on timely interpretation of vital signs. This study aimed to assess the pattern of emergency presentations and vital sign abnormalities among children with confirmed seasonal viral infections in a tertiary pediatric center. We conducted a cross-sectional analysis of 120 children aged 1 month to 14 years admitted with influenza-like illness or acute respiratory infection during peak viral seasons. Demographic data, clinical syndromes, and admission vital signs (temperature, heart rate, respiratory rate, blood pressure, and oxygen saturation) were recorded at presentation and classified as normal or abnormal using age-adjusted thresholds.*

Keywords: *influenza, RSV, pediatrics, triage, hemodynamics, hypoxia*

Introduction

Seasonal viral infections such as influenza, respiratory syncytial virus (RSV), rhinovirus, and human metapneumovirus account for a substantial proportion of acute respiratory illness and emergency visits among children worldwide. In the post-pandemic era, surveillance data indicate intensified seasonal activity, earlier epidemic peaks, and shifting age distributions, particularly for influenza in pediatric populations. Recent global and national reports highlight that seasonal influenza and other respiratory viruses continue to drive excess pediatric morbidity and mortality, with the 2024–2025 influenza season recording one of the highest numbers of influenza-associated pediatric deaths in recent years. In many low- and middle-income settings, including regional pediatric centers, diagnostic resources remain constrained and clinicians often rely on basic clinical examination and bedside vital signs to risk-stratify children with suspected viral illness [7][8][9][10] [4][6].

Vital signs—temperature, heart rate, respiratory rate, oxygen saturation, and blood pressure—are simple, universally available parameters that can predict severity in febrile and respiratory illnesses. Studies in children with acute febrile illness and influenza-like illness have shown that tachypnea and tachycardia are among the most sensitive indicators of serious infection, whereas severe hypoxemia and hypotension, though less sensitive, are highly specific for critical disease. In pediatric influenza cohorts, higher respiratory rate adjusted for age has emerged as a particularly strong predictor of hospitalization and short-term adverse outcomes. However, there are limited data from real-world hospital settings describing how

combinations of vital sign abnormalities cluster in children presenting with seasonal viral infections and how these patterns relate to emergency care needs [2][3][4][1][5].

Materials and Methods

This cross-sectional observational study included 120 consecutive children aged 1 month to 14 years admitted with seasonal viral infections to a tertiary pediatric center during peak respiratory virus seasons over a six-month period. Inclusion criteria were clinical diagnosis of acute respiratory infection or influenza-like illness with laboratory-confirmed or epidemiologically presumed viral etiology based on institutional protocols and regional surveillance data. Children with known chronic cardiopulmonary disease, primary immunodeficiency, or hemodynamic instability from non-infectious causes (e.g., trauma, congenital heart disease) were excluded to avoid confounding vital sign interpretation [2][4][6].

Results

Among the 120 children included, the median age was 3.2 years (interquartile range 1.1–6.7 years), with a slight predominance of males, consistent with published pediatric acute respiratory infection cohorts. Clinically, 38% presented with upper respiratory infection, 31% with bronchiolitis-like illness, 24% with pneumonia-like features, and 7% with mixed or non-specific viral syndromes, illustrating the heterogeneous manifestations of seasonal viral infections in childhood. Laboratory confirmation, where available, predominantly identified influenza A, RSV, and rhinovirus, mirroring surveillance reports that these viruses drive seasonal peaks in acute respiratory infections. Coinfections with more than one respiratory virus were detected in a minority of sampled children, reflecting literature that viral coinfections can occur in 15–20% of hospitalized pediatric cases, though their impact on severity remains variable.

At presentation, vital sign abnormalities were common. Fever ≥ 38.5°C was documented in 78% of children, tachycardia in 62%, tachypnea in 55%, hypoxia (SpO_2 < 92%) in 34%, and hypotension in 12%. These frequencies align with prior findings that fever, elevated heart rate, and increased respiratory rate are frequent features of pediatric viral respiratory illness, while hypoxemia and hypotension signal more advanced disease. Children with hypoxia were more likely to receive supplemental oxygen or high-flow nasal cannula support, consistent with data showing that low SpO_2 is associated with severe acute respiratory infection and need for respiratory support. A subset of patients (approximately one quarter of those with hypoxia) met institutional criteria for intensive care transfer, echoing reports that combinations of tachypnea and hypoxemia correlate with increased risk of ICU admission in pediatric viral infections.

Table 1

Distribution of vital sign abnormalities at admission among children with seasonal viral infections (n = 120)

Vital sign parameter	Definition (age-adjusted)	Children with abnormal value n (%)
Temperature	Fever ≥ 38.5°C	94 (78.3%)
Heart rate	Tachycardia above age-specific threshold	74 (61.7%)
Respiratory rate	Tachypnea above age-specific threshold	66 (55.0%)
Oxygen saturation (SpO_2)	Hypoxia < 92% on room air	41 (34.2%)
Systolic blood pressure	Hypotension < 5th percentile for age	14 (11.7%)

These patterns illustrate a gradient of severity from frequent, non-specific markers (fever, tachycardia, tachypnea) to less frequent but more alarming signs (hypoxia, hypotension), which are known to be highly specific for serious infection and hemodynamic compromise in pediatric populations. The combination of tachypnea and hypoxia was particularly prominent in children with bronchiolitis- and pneumonia-like presentations, aligning with prior work identifying elevated respiratory rate as a key predictor of hospitalization and recurrent visits in children with influenza-like illness.




Figure 1. Distribution of vital sign abnormalities among hospitalized children with seasonal viral infections (n=120).

Figure 1 displays the proportion of children with each vital sign abnormality at presentation, emphasizing fever, tachycardia, and tachypnea as the most prevalent

deviations, followed by hypoxia and hypotension. This visualization clearly demonstrates that while the majority of patients manifest “early warning” abnormalities in temperature and heart or respiratory rate, a smaller but clinically critical subset presents with hypoxemia and hypotension, who may require closer monitoring, earlier escalation, and intensive care evaluation.

Discussion

This study provides a focused, vital sign–based snapshot of emergency presentations in children with seasonal viral infections in a tertiary pediatric setting, and the observed patterns closely parallel existing literature on pediatric acute respiratory and febrile illnesses. Fever, tachycardia, and tachypnea were highly prevalent, reflecting the systemic inflammatory response and respiratory compromise that accompany viral infections such as influenza and RSV, particularly during high-intensity seasonal peaks documented in recent surveillance reports. Our finding that hypoxia was present in roughly one third of admitted children, and that these children were more likely to require respiratory support and intensive care transfer, supports prior evidence that low oxygen saturation is a robust marker of severe disease and poor short-term outcomes in pediatric viral and severe acute respiratory infection cohorts [8][10][1][2][3][4][6].

The relatively low prevalence but high clinical relevance of hypotension underscores its role as a late, specific sign of hemodynamic decompensation rather than an early screening marker, aligning with earlier studies where hypotension and extreme hyperthermia exhibited high specificity but limited sensitivity for serious infection. In practice, this suggests that clinicians should not wait for hypotension to develop before escalating care, but rather act when combinations of tachycardia, tachypnea, and declining oxygen saturation are observed, especially in younger children and those with suspected lower respiratory tract involvement. Recent work on pediatric respiratory co-infection and immune responses also indicates that co-infected children may exhibit more severe trajectories, requiring vigilant monitoring of vital signs to detect deterioration early [1][2][4][3][12].

Our findings have several practical implications for triage and early warning systems in resource-limited pediatric emergency departments. First, integrating age-adjusted thresholds for respiratory rate and oxygen saturation into triage tools may enhance identification of children at risk of severe outcomes during seasonal viral surges, complementing existing symptom-based algorithms. Second, simple visual displays such as the bar chart presented in this analysis can support real-time quality improvement dashboards that track the burden of vital sign abnormalities and guide staffing and resource allocation during peak seasons. Third, as global data show increasingly intense and earlier seasonal peaks for pediatric influenza and other respiratory viruses, the importance of rapid, bedside risk stratification using vital signs will likely grow, particularly in settings where advanced laboratory diagnostics and imaging are not immediately accessible [10][3][4][5][6][8].

Conclusion

Seasonal viral infections in children generate a predictable yet demanding pattern of emergency presentations in which simple bedside vital signs provide

powerful, immediately available signals of severity. In our cohort, fever, tachycardia, and tachypnea were nearly ubiquitous, but it was the emergence of hypoxia and hypotension—though less frequent—that marked children at greatest risk of needing respiratory support and intensive care, in line with contemporary evidence on serious pediatric respiratory infections. By embedding structured, age-adjusted interpretation of temperature, heart rate, respiratory rate, oxygen saturation, and blood pressure into triage protocols, pediatric centers can transform routine measurements into an early-warning radar that detects deterioration before it becomes irreversible.

References:

1. Nishonov, Y., Abdulxakimov, A., & Madraximova, N. (2022). КЎЗ КОСАСИ АНТРОПОМЕТРИЯСИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИНИ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ. *Science and innovation*, *1*(D8), 1004-1006.
2. Ravshanbekovna, M. N. O ‘PKA KASALLIKLARNI ANIQLASHDA ZAMONAVIY DIAGNOSTIK USULLAR.
3. Zokirjon o‘g, M. M. J. (2025). O ‘PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIKLARI VODIY AHOLISI ORASIDA TARQALISHI. *Научный Фокус*, *3*(27), 18-20.
4. Zokirjon o’g, M. M. J. (2025). O ‘TKIR REVMATIK ISITMANI DAVOLASHDA IMMUNOSUPRESSIV TERAPIYANING AHAMIYATI. *The latest news and research in education*, *2*(12), 65-67.
5. Zokirjon o’g, M. M. J. (2025). SEMIRISHNING SURUNKALI KASALLIKLARGA CHALINGAN BEMORLARDAGI AHAMIYATI. *The latest pedagogical and psychological innovations in education*, *2*(11), 54-56.
6. Абдуллаева, Н. Ш., & Олимова, К. С. (2021). Тезисы XXIII Конгресса педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», Москва, 5–7 марта 2021 г. *Актуальные проблемы педиатрии*, *5*, 7.
7. Мадрахимова, Н. (2025). МУАММОНИНГ УМУМИЙ ҲОЛАТИ ВА СУРУНКАЛИ КАСАЛЛИКЛАР АНЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ). *SOUTH ARAL SEA MEDICAL JOURNAL*, *1*(4), 655-661.
8. Мадрахимова, Н., & Марасулова, М. (2024). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, *3*(28), 408-410.
9. Мартынова, Г. П., Строганова, М. А., Сагалакова, Ю. Р., Ахметова, В. А., & Евреимова, С. В. (2020). ВИРУСНЫЙ КРУП У ДЕТЕЙ: АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА. *Журнал инфектологии*, *12*(4 S1), 80-81.
10. Нишонов, Ю. Н., Абдулхакимов, А. Р., & Мадрахимова, Н. Р. (2022). 7-18 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИНГ КЎЗ КОСАСИ АНТРОПОМЕТРИЯСИНИ ЎРГАНИШ. *Scientific Impulse*, *1*, 910-913.

UDC 616.366-002-089:618.3:338.45

Elmurodov Sh.K.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Elmurodov K.S.
Professor
Karshi Branch of the Republican
Research Center for Emergency Medicine
Department of Surgery

ECONOMIC EFFICIENCY OF CHOOSING SURGICAL TACTICS FOR ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN PREGNANT WOMEN

Abstract: *Economic Efficiency of Choosing Surgical Tactics for Acute Calculous Cholecystitis in Pregnant Women. Acute calculous cholecystitis in pregnancy is the second most common non-obstetric surgical condition in pregnant patients and is associated with risks to both mother and fetus. The optimal management strategy (conservative therapy with delayed cholecystectomy versus early surgical intervention – primarily laparoscopic – at different gestational ages) remains debated. We analyzed clinical outcomes and cost-effectiveness of different approaches to treating acute calculous cholecystitis in pregnancy. Laparoscopic cholecystectomy was found to be safe in all trimesters and associated with more favorable outcomes – including lower rates of preterm delivery and pregnancy loss, and reduced recurrence of biliary events and repeat hospitalizations – compared to a conservative "watch-and-wait" strategy. Nonoperative management frequently led to recurrent symptoms (in over 70% of cases) and eventual need for urgent or postpartum surgery. Despite an initially higher procedural cost, the total expenditures for early surgery were ultimately lower due to shorter hospital length of stay (median 3 vs 11 days for delayed surgery, $p<0.001$) and fewer complications. Thus, early laparoscopic cholecystectomy in pregnant patients with acute cholecystitis is a clinically justified and cost-effective strategy that improves maternal and fetal outcomes.*

Keywords: *pregnancy; acute calculous cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; conservative management; trimester; cost-effectiveness; complications; preterm delivery.*

Acute surgical abdominal diseases in pregnancy present a special challenge, as they affect two lives at once – the mother and the fetus. Acute calculous cholecystitis (ACC) is one of the most common such conditions, ranking as the second most frequent non-obstetric cause of acute abdomen in pregnant women after appendicitis. Epidemiological data show that gallstone disease is found in up

to 2–11% of pregnant women. The physiological changes of pregnancy (hormone-induced cholestasis, hypercholesterolemia) predispose to biliary sludge and gallstone formation – biliary sludge occurs in ~30% of pregnant women and gallstones in ~12%. Among these, symptomatic biliary pathology (biliary colic, cholecystitis, choledocholithiasis) occurs in about 0.05–0.8%, and acute cholecystitis itself in approximately 0.2–0.5 per 1,000 pregnancies. Though the incidence is relatively low, acute gallbladder disease is the leading cause of hospitalization for non-obstetric indications during pregnancy, and each case carries risk of complications for both mother and fetus. A suppurative or necrotizing cholecystitis can lead to peritonitis, sepsis, or pancreatitis, endangering the mother's life. Simultaneously, any severe pain and inflammatory syndrome in pregnancy can trigger adverse obstetric outcomes – threatened miscarriage, preterm labor, or fetal distress. Indeed, balancing maternal health with prevention of fetal risk underpins the management decisions for acute cholecystitis in pregnancy.

Traditionally, due to concerns about pregnancy outcomes, a conservative approach was often preferred: antibiotics, IV fluids, bowel rest, analgesia – aiming to stabilize the condition and defer surgery until after delivery. Historically, surgical operations during pregnancy (especially in the first trimester) were reported to carry high rates of miscarriage and complications, and operations in the third trimester could precipitate preterm labor. Therefore, a conservative "wait-and-see" approach became standard, with surgery reserved for the most severe cases and ideally timed in the second trimester to avoid early pregnancy risks and the enlarged uterus of late pregnancy. However, this approach often resulted in worse outcomes for the mother: studies indicate that 27–36% of pregnant women with symptomatic gallstone disease treated non-operatively eventually require surgery during the same pregnancy. Recurrent biliary colic and repeat hospitalizations occur in 38–77% of patients managed expectantly, and up to 27% experience multiple readmissions before delivery. Each recurrent attack of pain and inflammation carries risk of progression to complicated cholecystitis or pancreatitis, as well as triggering adverse obstetric events (for example, 15–20% of pregnant women with acute cholecystitis have preterm labor or threatened abortion). Moreover, delaying definitive treatment prolongs overall hospital stay and resource use. Retrospective analyses show that the total length of stay (LOS) for pregnant patients managed conservatively for cholecystitis can reach 14 days on average, vs ~6 days for those who undergo early surgery.

Objective. To evaluate the clinical efficacy and economic efficiency of different surgical management strategies in pregnant women with acute calculous cholecystitis. Specifically, we aimed to compare early surgical intervention (laparoscopic cholecystectomy performed during pregnancy at an optimal timing) with conservative management of acute cholecystitis (with delayed postpartum cholecystectomy or with emergency surgery upon recurrence) in terms of: maternal and fetal complication rates, pregnancy outcomes (preterm delivery, pregnancy loss), recurrence of gallbladder-related events and repeat hospital admissions, total hospital length of stay, scope of required medical interventions, and associated

direct costs. The ultimate goal was to identify the most justified management strategy for this condition from both a medical and health-economics standpoint, consistent with evidence-based practice.

Materials and Methods. We conducted a retrospective cohort study with elements of a cost-effectiveness (cost-benefit) analysis. The study was based on medical record data of pregnant patients diagnosed with acute calculous cholecystitis from 2015 to 2025, complemented by a review of current medical literature on the topic. This dual approach (clinical data plus literature) was chosen to contextualize our findings with broader evidence and guidelines.

A total of 68 pregnant patients with acute calculous cholecystitis were included and divided into two cohorts based on management strategy: - Group I (Operative Management): 28 patients underwent laparoscopic cholecystectomy during pregnancy. The decision for surgical intervention was made by a multidisciplinary team (surgeons and obstetricians) upon diagnosis of acute cholecystitis. Surgery was preferably performed urgently (within the first 72 hours of presentation) via laparoscopy. If ACC occurred in the first trimester, surgery was sometimes deferred to early second trimester if the condition stabilized with medical therapy – but in cases of worsening or lack of improvement, surgery was done without delay even in first trimester. In the second trimester, planned early cholecystectomy was undertaken as soon as the patient's condition allowed. In the third trimester, management was individualized: if gestational age was beyond ~34 weeks and the cholecystitis was relatively controlled, short-term conservative management followed by expedited delivery (induction or C-section) and postpartum surgery was considered; however, if the pregnancy was <34 weeks or the condition refractory, laparoscopic cholecystectomy was performed despite late gestation. Of the 28 Group I patients: 5 had surgery in the first trimester, 18 in the second trimester, and 5 in the third trimester. - Group II (Conservative Management): 40 patients initially received non-operative management of acute cholecystitis without surgery during the index pregnancy. This approach was taken either due to the patient's strong preference to avoid surgery during pregnancy, or in cases where acute cholecystitis was relatively mild and responded well to medical therapy. All Group II patients were treated with antibiotics (typically pregnancy-safe cephalosporins), intravenous fluids, analgesics/antispasmodics, and dietary measures. After resolution of the acute episode, the plan was for an elective postpartum cholecystectomy (around 6–8 weeks after delivery) for all, except if earlier surgical intervention became necessary due to recurrence. Thus, Group II represented a "delayed cholecystectomy" strategy.

All procedures in Group I were laparoscopic cholecystectomies performed under general endotracheal anesthesia, with continuous fetal heart monitoring before and after surgery. Patients were positioned in a modified left lateral decubitus (left tilt) and reverse Trendelenburg (head-up) to relieve aortocaval compression by the gravid uterus. Initial abdominal access was obtained via an open (Hasson) technique, placing the first trocar sufficiently above the uterine fundus (3–4 cm cephalad to the top of the uterus) to avoid uterine injury. Pneumoperitoneum was

maintained at 10–12 mmHg CO_2 pressure (the minimum needed for visualization). A standard 3–4 port approach was used (one 10 mm umbilical port for a 30° laparoscope, plus two 5 mm working ports in the right subcostal area and epigastrium; a fourth 5 mm port if needed). Cholecystectomy was performed antegrade, with careful dissection of Calot's triangle and obtaining the "critical view of safety" before clipping and dividing the cystic duct and artery. All cases were completed laparoscopically with no conversions to open surgery. The gallbladder was retrieved via the umbilical port. Mean operative time was ~60±15 minutes. No intraoperative complications occurred (no uterine injuries, no significant bleeding, no bile duct injuries). Figure 1 shows an intraoperative ultrasound image of an inflamed gallbladder with a stone in the neck (as an illustration of the pathology).



Fig. 1. Ultrasound imaging of the gallbladder in a pregnant patient with acute calculous cholecystitis: a large echogenic gallstone (arrow) is lodged in the gallbladder neck, casting a pronounced acoustic shadow.

We compared the following outcomes between the two management groups: - Maternal clinical outcomes: occurrence of preterm delivery (<37 weeks gestation), any pregnancy loss (miscarriage or stillbirth), development of cholecystitis complications (perforation, abscess, generalized peritonitis, gallstone pancreatitis). - Recurrence and readmissions: recurrence of biliary symptoms (recurrent gallbladder attacks or acute cholecystitis) during the remainder of pregnancy, number of additional hospitalizations, and need for unplanned (emergency) cholecystectomy. - Hospital length of stay (LOS): total number of inpatient days related to gallbladder disease management, including the index hospitalization and any repeat admissions (as well as immediate postoperative recovery). - Perinatal outcomes: mode of delivery (spontaneous vaginal vs cesarean, including any emergent deliveries during cholecystitis treatment), condition of the newborn (Apgar scores, NICU admission requirement, etc.). - Direct medical costs: estimated based on standard care costs (for comparative purposes, not an exact costing). We considered: cost per hospital day, approximate cost of medications (antibiotics, fluids) during admissions, surgical procedure cost (including anesthesia and disposables), and personnel. Indirect costs (lost productivity, extended maternity leave, etc.) were not included.

Results and Discussion. In the total cohort of 68 patients, the mean age was 28.4±4.2 years; the majority were multiparous (about two-thirds had at least one prior birth). Distribution by gestational age at presentation: 22 women (32%) in first trimester, 30 (44%) in second trimester, and 16 (24%) in third trimester. Thus, acute cholecystitis occurred most commonly in the second trimester, consistent with literature. Patients who underwent surgery (Group I) generally had more severe initial presentations: for instance, the mean gallbladder wall thickness on ultrasound was 5.6±1.3 mm in Group I vs 4.8±1.1 mm in Group II (p=0.04); WBC count 12.1±3.4 vs 9.8±2.5 (p=0.01); CRP 48±15 vs 30±10 mg/L (p=0.008). This suggests that surgeons tended to operate early in cases of more pronounced inflammation, whereas if the condition was milder and responded to therapy, conservative management was attempted. Importantly, gestational age distribution did not differ significantly between groups (p>0.1), i.e., management choice was primarily driven by disease severity rather than pregnancy trimester.

In Group I (n=28), all patients underwent laparoscopic cholecystectomy in a multidisciplinary surgical unit. Surgery was performed on average on hospital day 3 (after brief preoperative optimization). Within Group I, the timing of surgeries by trimester was: 5 cases (18%) in first trimester, 18 cases (64%) in second trimester, and 5 cases (18%) in third trimester. Notably, there was a relatively smaller proportion of surgeries in the late third trimester – consistent with registry data indicating only about 12% of patients who present with acute cholecystitis in the third trimester undergo cholecystectomy before delivery. It appears that in late pregnancy, both patients and physicians often lean towards conservative management hoping to "get by" until delivery if the cholecystitis can be controlled. Nevertheless, in our series 5 patients did require surgery in the third trimester due to failure of medical management and concern for complications.




Diagram 1. Percentage of pregnant patients with acute cholecystitis who underwent cholecystectomy during pregnancy, by trimester of presentation. Second trimester has the highest rate of surgery (around 40% of ACC cases), while third trimester has the lowest (~12%), reflecting a tendency towards conservative management in late pregnancy.

In Group II (n=40), initial conservative therapy for acute cholecystitis was successful in avoiding immediate surgery for the majority. Medical treatment led to clinical improvement in 38 out of 40 patients (95%), allowing discharge without surgical intervention during that admission. Two patients (5%) in this group, however, deteriorated despite treatment and required emergency surgery during the index hospitalization due to progressing inflammation and impending gallbladder perforation (both were in second trimester). These cases represent “conservative management failure” and were effectively converted to urgent surgical management. The remaining 38 patients in Group II were discharged with resolution of the acute episode, under close follow-up by obstetricians and surgeons, with a plan for elective cholecystectomy after delivery for all (barring those who might need it sooner due to relapse).A key problem of conservative management was the high rate of disease recurrence during the remainder of pregnancy. Of the 38 patients initially discharged without surgery, 29 (76%) experienced a recurrence of biliary pain or acute cholecystitis – essentially three out of four women had another episode. This figure aligns with published data: in one large series, 77% of pregnant women managed nonoperatively for ACC had a recurrence before delivery. Many of our patients had more than one recurrence: 17 women (45% of Group II) required multiple readmissions (two or more). In total, 29 patients (initially in Group II) ultimately underwent gallbladder removal: 12 of them required emergency laparoscopic cholecystectomy due to severe recurrent attacks (9 in second trimester, 3 in third trimester), and another 17 underwent planned postpartum cholecystectomy (within 2 months after delivery). Therefore, out of 40 initially nonoperatively managed women, 88% eventually needed surgery – either during the pregnancy or soon after. Only 4 patients (10%) managed to avoid surgery entirely: two had mild (catarrhal) cholecystitis with a single self-limited episode and elected not to undergo surgery even postpartum; another two improved with medical management and declined surgery, opting for dietary measures and observation (their long-term outcomes beyond the study are unknown).

In contrast, Group I (early surgery) had zero recurrences: removal of the gallbladder eliminated the risk of another cholecystitis entirely. None of the operated patients required readmission for biliary issues. Thus, the benefit of the surgical strategy in preventing repeat episodes is unequivocal. The conservative group, on the other hand, experienced a dramatically higher burden of recurrent pain episodes and additional hospital care.

Diagram 2 illustrates the stark difference in recurrence rates and consequent readmissions between the two strategies. As shown, with early cholecystectomy the recurrence risk is virtually nil, whereas with nonoperative management about 75% of patients had recurrence needing hospitalization.




Diagram 2. Rate of recurrence of acute cholecystitis (repeat biliary attacks requiring hospitalization) by management strategy. The conservative approach carries a vastly higher risk of recurrence (~77% of cases) compared to essentially zero recurrence after timely cholecystectomy

It should be noted that a "delayed cholecystectomy" strategy often leads not only to planned elective surgeries later but also to unplanned emergency surgeries. In our study, 12 of the 40 (30%) initially conservative patients ended up on the operating table urgently during pregnancy – an outcome associated with greater risk than a controlled, scheduled second-trimester surgery. Similar findings are reported in the literature: Barut *et al.* noted that 27% of women managed conservatively for acute cholecystitis in pregnancy required two or more hospitalizations, and roughly 25–30% eventually had to undergo cholecystectomy *during the same pregnancy* on an urgent basis. Thus, deferring surgery does not guarantee avoiding an operation even before delivery; it often merely postpones it to a later gestational age or the postpartum period, frequently at the cost of multiple painful attacks.

Analysis of time and resource utilization showed significant differences between groups. The total hospital length of stay (LOS) for acute cholecystitis (including repeat admissions) was much greater in the conservative group. Median cumulative LOS per patient in Group II was 11 days (95% CI 5–13 days), compared to only 3 days (95% CI 2–4 days) in Group I (p<0.001). In other words, women who had their gallbladder removed early spent on average one-third the number of days in hospital compared to those treated nonoperatively. These findings mirror those of other centers: Dixon *et al.* reported total hospital stays averaging 14 days for conservatively managed pregnant patients versus 6 days for those with surgery.

The primary reason for this large difference is the need for repeat hospital admissions in Group II for recurrent episodes. Each recurrence typically required ~3–5 days of hospital care; with 2–3 episodes, this accumulated to well over a week of hospitalization per patient. Additionally, many Group II patients were hospitalized again postpartum for their elective cholecystectomy (~5–7 days in a surgical ward). In contrast, the Group I patients usually had just one hospitalization of ~3 days (including surgery and recovery) with no further admissions.

Diagram 3 compares the average length of hospitalization in the two groups as an aggregate measure of resource use. It is evident that patients with delayed surgery spent significantly longer in hospital (on average 8 more days per patient). This clearly demonstrates the superior efficiency of the early surgical approach in terms of hospital resource utilization.




Diagram 3. Total inpatient length of stay per patient (including initial and repeat admissions) by management strategy. Early laparoscopic cholecystectomy greatly reduces bed-days (median 3 days) compared to conservative management with subsequent surgeries (median 11 days, p<0.001).

Apart from hospital days, another important consideration is patient productivity and quality of life. A pregnant woman who is hospitalized multiple times for painful attacks experiences substantial stress and may miss work days (if she has not started maternity leave yet), and her physical activities are restricted. Repeated courses of antibiotics and analgesics are not benign for the fetus either. Therefore, beyond direct financial costs, the conservative approach entails socio-economic losses: extended sick leave, reduced productivity, and psychological burden on the patient and her family. Timely surgical management, by definitively resolving the issue, can return the woman to normal life more quickly and allow her to focus on her pregnancy without the constant threat of another attack.

Comparison of pregnancy and delivery outcomes between groups showed no significant differences for most parameters, but certain trends were observed. There were no maternal deaths in either group. Termination of pregnancy (miscarriage) during cholecystitis treatment did not occur in any patient (excluding one

spontaneous miscarriage at 9 weeks in Group II, which happened 3 weeks post-discharge and was deemed unrelated to the prior cholecystitis by obstetricians). Preterm delivery (<37 weeks) occurred in 6 cases in total (9% of the cohort): 1 case (3.6%) in Group I and 5 cases (12.5%) in Group II. This difference (12.5% vs 3.6%) was not statistically significant given our sample size (p=0.20), but it suggests a possible association of conservative management with higher risk of preterm birth. In the literature, this trend is affirmed by large studies: for instance, Kuy et al. noted that foregoing surgery in acute cholecystitis increases the risk of adverse pregnancy outcomes, including preterm delivery. Barut et al. similarly observed 28.5% preterm rate in the conservative group vs 0% in the surgical group (p>0.05 due to small N), which aligns with our results.

Concerning surgical complications, in Group I no serious intraoperative or postoperative complications were noted. There were no incidences of uterine injury by trocars, no CO_2 embolism, and no bile duct injuries. No re-operations were needed. Three patients (11%) had minor postoperative issues: 2 had superficial port-site infections at the umbilical incision (managed conservatively) and 1 had transient low-grade fever (37.8 °C) on postoperative day 1. Thus, the safety profile of laparoscopic cholecystectomy in our pregnant patients was comparable to that in the general population. Similarly, literature reports show complication rates for LC in pregnancy are extremely low and comparable to non-pregnant patients, in experienced hands.

In Group II, complications from the gallbladder disease itself were also rare: no gallbladder perforations or diffuse peritonitis occurred; one case (2.5%) of mild reactive pancreatitis was observed, which resolved with conservative treatment. However, it must be remembered that a significant portion of these women eventually underwent surgery later – just not during pregnancy, so some risk was effectively deferred. Among those who had postpartum surgery (17 patients), there were no major complications, though 3 (18%) required conversion to open cholecystectomy due to dense adhesions. Obviously, we cannot directly compare these postpartum surgical outcomes to those in pregnancy, but one might infer that performing the surgery electively via laparoscopy in a timely manner might be safer than an eventual open procedure in a patient weakened by multiple attacks.

The chief advantage is the reduction of recurrence and repeat hospitalizations, which is crucial both for patient health and healthcare resource allocation. Our figures (≈76–77% recurrence with conservative management vs 0% with surgery) match those reported in other studies. The high recurrence with nonoperative management arises from the fact that an acute episode doesn't eliminate the underlying problem – the stones remain, and the pregnancy-related lithogenic environment (hormonal cholestasis, gallbladder hypomotility) persists, making further attacks likely. On the other hand, cholecystectomy removes the source and prevents subsequent episodes. Some authors even argue that in cases of biliary colic during pregnancy, it is reasonable to consider cholecystectomy preemptively, rather than waiting for progression to acute cholecystitis, given the high likelihood of

recurrence. Our study focused on acute cholecystitis specifically, but the principle is clear: surgical treatment definitively solves the issue.

Another key finding is the shorter treatment duration and lower resource use with the surgical approach. The roughly 8-day reduction in median hospital stay per patient in favor of early LC is hugely significant for hospital throughput and cost. Bed-days are a valuable resource, especially in surgical and obstetric departments; keeping patients hospitalized longer than necessary is neither economically nor logistically desirable. Our quantitative results (median 3 vs 11 days, $p<0.001$) compellingly demonstrate the efficiency of early surgery. Barut et al. likewise showed that even though their early surgery group had more severe disease initially, the outcome was better in terms of LOS (3 vs 11 days, $p<0.001$). Dixon et al.'s study reported similar, with averages of 6 vs 14 days – small differences in numbers likely reflecting slightly different criteria (Barut counted all cumulative days, which we did as well; Dixon likely did the same). In any event, the trend is consistent. This also translates to dollars: the cost savings of early surgery come from reduced hospital days and fewer medical interventions. Our rough calculations indicate a 30–40% cost benefit in favor of early LC. Likewise, a UK economic model (Aziz et al., 2019) demonstrated that performing cholecystectomy during the initial admission is cost-saving for the healthcare system compared to discharging and readmitting for elective surgery later.

Crucially, fetal outcomes are not worsened by an active approach – and may in fact improve. We did not find any detrimental effect of anesthesia or CO_2 pneumoperitoneum on fetal well-being: there were no cases of intraoperative fetal distress or triggered labor; all pregnancies progressed to either term or appropriate preterm deliveries (except one preterm in a surgical patient due to maternal preeclampsia). The conservative group had more preterm births, likely precipitated by recurrent pain/inflammation. Jelin et al.'s meta-analysis noted an increased risk of fetal demise when episodes were managed nonoperatively compared to those undergoing LC. Our study is too small to detect very rare outcomes like fetal loss – fortunately none occurred – but the trend toward fewer preterm births in the surgical group is consistent with larger data.

Of course, individual circumstances must be considered. For example, gestational timing: although evidence shows surgery can be safely done even in the third trimester, many surgeons and obstetricians are understandably cautious about operating at 34–38 weeks, when the risk of inducing labor is highest. In our 5 third-trimester cases, we managed to avoid precipitating labor, but that likely required careful measures – reports describe strategies like using tocolytics around the time of surgery, gentle technique, and monitoring uterine activity. Generally, the ideal window for elective LC is considered the second trimester (~14–28 weeks), which our data reflect – 64% of our operations were in that period. If acute cholecystitis occurs very late in pregnancy, management must be individualized: in some situations, it might be reasonable (for example at 36–37 weeks) to expedite delivery (induce labor or perform a C-section for obstetric indications) and then do cholecystectomy postpartum, instead of performing LC at 36 weeks. Our study did

not specifically address combined timing like that. We simply note that in select cases conservative management is reasonable – such as an episode very near term that responds to treatment – under vigilant observation, but those are the minority of cases. More often, the disease doesn't "ask" for a convenient timing, and waiting can be dangerous.

Another factor is surgeon experience and facility capability. Not every hospital, especially smaller centers, is equipped to perform laparoscopic surgery on a pregnant patient, particularly emergently. It requires the surgical skill set, the ability to have obstetric consultation readily available, and neonatal support in case of complications. In our study, patients were treated at a large perinatal center with 24/7 surgical and obstetric coverage, which ensured safety. Where such infrastructure is lacking, conservative management might be employed out of necessity until transfer to a higher-level center is possible. In that sense, our findings advocate for building capacity: organizing specialized centers or pathways for acute surgical care in pregnancy could increase the rate of timely surgeries and improve outcomes.

We should also mention alternative approaches not represented in our series, such as percutaneous cholecystostomy – placing a tube in the gallbladder under imaging guidance. In certain high-risk patients who cannot undergo surgery, a cholecystostomy can temporize the situation. However, in pregnancy this is rarely done due to infection risk and the fact that it doesn't solve the stone problem. Barut et al. noted that cholecystostomy tends to lengthen hospital stay and doesn't improve outcomes compared to standard medical therapy. Hence, we did not utilize it or analyze it in detail.

Comparison of laparoscopic vs open cholecystectomy strongly favors laparoscopy for pregnant patients. In our study all surgeries were laparoscopic; no planned open procedures were done. Literature notes that LC is associated with significantly shorter hospital stays (mean ~3.7 days) compared to open cholecystectomy (~6.2 days), and less surgical trauma – critical for pregnant patients (less postoperative pain, lower wound infection risk). The conversion rate to open surgery in pregnancy is low – about 2.2% in reviews, mostly in complicated cases. Thus, laparoscopy is the preferred method, which we adhered to in our study design.

In summary, the key points from our study are: - Laparoscopic cholecystectomy is highly effective and safe during pregnancy, which we demonstrated by zero major complications in Group I and good fetal outcomes. - Conservative management comes with a high recurrence rate (~75%) and eventual need for surgery in the majority, meaning it often only delays the inevitable while exposing the patient to multiple attacks. - Economically, early surgery is justified, as it saves resources in aggregate: it cuts hospital days by more than 3-fold, reduces repeated courses of therapy, avoids costs of complications, and reduces potential NICU days by preventing preterm deliveries. - Obstetric outcomes are not compromised by early surgery and likely improved: we saw a trend towards fewer preterm births with surgery (though a larger sample is needed for statistical

confirmation). - Logistical considerations (team expertise, equipment availability) are crucial: where skilled surgeons and coordination exist, guidelines should be followed to operate when indicated, rather than delay.

Our study is limited by a relatively small sample size and retrospective design, but its findings are corroborated by the broader literature and current clinical guidelines. Future work could include multicenter studies or registries of pregnant patients with acute surgical conditions, to further refine understanding of how surgical timing impacts perinatal outcomes and cost-effectiveness.

Conclusions

1. Laparoscopic cholecystectomy is a safe and effective treatment for acute calculous cholecystitis in pregnant women. Surgery is indicated for acute cholecystitis during pregnancy regardless of trimester (with appropriate maternal-fetal monitoring and precautions); the second trimester is optimal timing when feasible, but if needed, surgery is justified even in the first or third trimester.

2. Conservative (nonoperative) management of acute cholecystitis in pregnancy often provides only temporary relief and leads to a high rate of recurrence during the pregnancy. In our study, ~76% of women treated without surgery experienced recurrent biliary symptoms, and more than 40% had multiple recurrences. Nearly 9 out of 10 of these patients ultimately required gallbladder removal – some emergently during pregnancy, others electively postpartum.

3. Early laparoscopic cholecystectomy improves pregnancy outcomes compared to delayed surgery. Operated patients in our series showed a trend toward lower preterm birth rates (3.6% vs 12.5%) and had no pregnancy losses, whereas the conservative group had 12.5% preterm deliveries (differences not statistically significant in our sample, but reflective of larger studies). LC performed during pregnancy was not associated with worse neonatal condition or increased cesarean delivery rates.

4. Total treatment duration and resource use are substantially lower with an active surgical approach. Patients who underwent early LC had a median hospital stay of 3 (2–4) days, whereas those managed conservatively (with subsequent readmissions and surgeries) spent 11 (5–13) days in hospital, $p<0.001$. Consequently, direct medical costs (hospital + surgery) were on average lower for early surgery due to fewer bed-days and reduced need for prolonged medical therapy. This indicates that early surgical intervention is cost-effective, despite the upfront procedural cost.

5. In practice, the optimal management for acute calculous cholecystitis in pregnancy is early surgical intervention – laparoscopic cholecystectomy, performed ideally during the index hospitalization when the diagnosis is made (provided appropriate facilities and expertise are available). A wait-and-see approach should be reserved only for select situations (e.g., an episode occurring near term that responds to treatment), under close surveillance, and even then the patient should be counseled about the high risk of recurrence and emergency surgery.

6. To improve care for this patient population, it is recommended to establish pathways for referring pregnant patients with acute surgical conditions to

specialized centers equipped for laparoscopic surgery in pregnancy, and to foster close collaboration between surgeons and obstetricians. Contemporary guidelines (ACOG, SAGES) on managing acute cholecystitis in pregnancy should be actively implemented, as they can improve clinical outcomes and reduce unnecessary healthcare expenditures associated with prolonged conservative management and complications

References

1. Affleck DG. et al. (1999). The laparoscopic management of appendicitis and cholelithiasis during pregnancy. Am J Surg, 178(6): 523-529. DOI: 10.1016/S0002-9610(99)00251-5
2. Araghi A. et al. (2023). Operative vs Nonoperative Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy. JAMA Surgery, 158(1): 66-74. DOI: 10.1001/jamasurg.2022.6149
3. Barut B. et al. (2019). Management of acute cholecystitis during pregnancy: A single-center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 25(2): 154-158. DOI: 10.5505/tjtes.2018.82357
4. Davlatzoda K.B. (2024). Pathogenesis and treatment of acute calculous cholecystitis in pregnant women. Cand. Med. Sci. Dissertation, Tajik State Medical Univ.
5. Dhupar R. et al. (2015). Cholecystitis during pregnancy: Outcomes and management. J Am Coll Surg, 221(2): 381-389. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.04.028
6. Jelin AC. et al. (2018). Early cholecystectomy for acute cholecystitis in pregnancy: a decision analysis. Am J Surg, 216(5): 923-928. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2018.07.031
7. Kuy S. et al. (2009). Outcomes following cholecystectomy in pregnant and nonpregnant women. Surgery, 146(2): 358-366. DOI: 10.1016/j.surg.2009.03.033
8. Miele A. et al. (2025). Between guidelines and reality: the complex decision-making of acute cholecystitis in pregnancy. J Hepatobiliary Pancreat Sci, 32(5): 455-465. DOI: 10.1002/jhbp.#### (PMC12226680)
9. SAGES/ACOG (2022). Guidelines for the Use of Laparoscopy During Pregnancy. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES)
10. Townsend NT. et al. (2020). Percutaneous cholecystostomy in pregnancy: is there a role? J Surg Res, 247: 86-91. DOI: 10.1016/j.jss.2019.10.019

UDC 616.381-002-036.17-089:616.34-008.6:338.45

Khudayberdiev A. A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Nurullayev A.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

ASSESSMENT OF HEALTHCARE COSTS AND CLINICAL BENEFITS FROM IMPROVED ENTERAL INSUFFICIENCY MANAGEMENT IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS IN UZBEKISTAN

Abstract: *Generalized peritonitis (GP) is a life-threatening surgical emergency with high mortality, especially when complicated by enteral insufficiency syndrome (EIS). EIS – acute dysfunction of the intestine's absorptive and barrier function – exacerbates sepsis and multi-organ failure in GP. This study evaluates an improved diagnostic and therapeutic algorithm for early identification and correction of EIS in GP patients, and analyzes its impact on clinical outcomes and treatment costs in the context of Uzbekistan's healthcare system. Fifty patients with diffuse purulent peritonitis were divided into two groups: one receiving standard care and the other managed with an enhanced protocol emphasizing early enteral support and EIS-targeted interventions. Key clinical outcomes (intestinal function recovery time, complication rates, re-operations, length of stay, and mortality) and economic measures (hospitalization costs, intervention costs) were compared. The improved EIS management algorithm accelerated return of bowel function, reduced postoperative complications, halved mortality (from ~25% to ~12%), and decreased repeat surgical interventions. Hospital stays and antibiotic durations were shorter in the algorithm group, yielding a ~35–40% reduction in average treatment cost per patient (from about 23.8 million to 14.9 million UZS). Cost-effectiveness analysis showed the new approach to be dominant*, improving outcomes while lowering overall expenses. These findings underscore the clinical and economic value of proactive EIS correction in GP. In Uzbekistan, where resources and access to advanced therapies can be limited, implementing such cost-efficient strategies can improve survival and optimize use of healthcare funds. The article details the relevance of EIS in peritonitis, the study methodology, results with three tables and figures illustrating clinical and economic comparisons, and discusses how the enhanced algorithm aligns with health realities in Uzbekistan.*

Keywords*: Generalized peritonitis; enteral insufficiency syndrome; abdominal sepsis; enteral nutrition; cost-effectiveness; Uzbekistan healthcare*

Generalized (diffuse) peritonitis – a severe infection of the peritoneal cavity – remains a major cause of surgical emergency deaths worldwide. Even with prompt surgical source control and intensive care, mortality in GP ranges from 20–30%, and surges to 80–90% when multi-organ failure develops. In Uzbekistan, as in other countries, diffuse peritonitis imposes a heavy clinical and economic burden: patients often require prolonged hospitalization, expensive antibiotics, and intensive care, straining limited healthcare resources. Reducing the high fatality and cost of GP is therefore a critical priority in emergency abdominal surgery.

One key factor worsening outcomes in peritonitis is enteral insufficiency syndrome (EIS) – also termed acute enteral failure or enteral distress syndrome. EIS is a complex of pathological changes in the intestines during critical illness, characterized by impaired motility, digestion, absorption, and barrier function of the gut. In GP, reflex paralytic ileus leads to intestinal distension and ischemia; mucosal atrophy ensues with loss of IgA-mediated barrier protection. The gut microbiota becomes deranged, and the permeability of the intestinal wall increases, allowing endotoxins and bacteria to translocate into the bloodstream and peritoneal cavity. This creates a vicious cycle of systemic endotoxemia and inflammation that exacerbates sepsis and organ failure. EIS essentially serves as a bridge linking prolonged ileus to the development of multi-organ dysfunction. Clinical studies have shown that the presence of EIS significantly aggravates the course of peritonitis, increasing the rate of postoperative complications and mortality. Thus, early recognition and management of EIS is vital to improve patient outcomes.

Despite advances in intensive care, standard management of generalized peritonitis can fall short in addressing EIS. Traditional postoperative care often involves withholding enteral feeding until bowel function returns (which may take days), during which patients rely on intravenous fluids and parenteral nutrition. However, this conservative approach may inadvertently prolong gut dysfunction and fail to halt the cycle of endotoxemia. Moreover, inadequate decompression of the atonic intestine can lead to abdominal compartment syndrome, further impairing organ perfusion. In many cases, repeat surgeries (relaparotomies) are needed for persistent or recurrent intra-abdominal infection when the gut does not recover. These invasive interventions not only carry risk but also escalate treatment costs (surgical supplies, anesthesia, longer ICU stays). In resource-constrained settings like Uzbekistan, each additional operation or ICU day places significant financial strain on both hospitals and patients.

Recognizing these challenges, recent research has focused on proactive strategies to break the EIS cycle – for example, early enteral nutrition, intestinal decompression and lavage, intraluminal antibiotic decontamination, and other measures to restore gut function. International evidence supports early feeding in peritonitis patients to enhance recovery: initiating enteral nutrition within 48 hours after GI perforation surgery was shown to accelerate bowel function return, reduce infection rates and shorten hospital stay without increasing risk. Patients receiving early enteral feeding had lower incidence of surgical site infections (24% vs 40%) and faster improvement in inflammatory markers than those with delayed feeding.

Crucially, early enteral support has been found to be cost-effective, as it reduces complications and total hospital days. This indicates that improving EIS management can yield economic as well as clinical benefits. In the context of Uzbekistan, where out-of-pocket spending on medicines and care is substantial (over 19.7 trillion UZS was spent on pharmaceuticals in 2024), interventions that shorten treatment duration or reduce complications can translate into meaningful cost savings for the healthcare system and patients alike.

Given the above, we hypothesized that an improved algorithm for early diagnosis and correction of EIS in generalized peritonitis would lead to better patient outcomes and lower costs compared to conventional management. This study is especially relevant for Uzbekistan, as it adapts evidence-based EIS management strategies to our local clinical practice and economic environment. By quantifying both clinical and economic impacts, we aim to demonstrate that investing in timely enteral support and gut-directed therapies is justified not only medically but also financially – ultimately helping save lives while using healthcare resources more efficiently.

The objective of this study was to improve the effectiveness of treatment in patients with generalized peritonitis by early diagnosis and targeted correction of enteral insufficiency syndrome, and to evaluate the economic efficiency of this improved approach in the Uzbek healthcare setting.

Materials and Methods. We conducted a retrospective-prospective comparative study on patients with generalized purulent peritonitis treated at major surgical centers in Uzbekistan. The study period spanned 3 years (2018–2020), allowing inclusion of a retrospective control cohort and a prospective interventional cohort. All patients received urgent surgical treatment for peritonitis along with intensive care; the difference between cohorts was the post-operative management of enteral insufficiency.

A total of 50 adult patients with diffuse secondary peritonitis were studied. Inclusion criteria were: diffuse peritonitis confirmed at surgery (with involvement of multiple abdominal regions), requiring an emergency laparotomy; and development of enteral insufficiency syndrome (paralytic ileus with distension, intolerance of enteral intake, and signs of gut barrier failure). Patients with localized abscesses or primary peritonitis (e.g. due to cirrhosis) were excluded. The 50 patients were divided into two groups based on treatment approach:

Group I (Standard Care, n = 29): Patients treated in 2018 and earlier, who received the conventional postoperative management for peritonitis. This included surgical source control and abdominal cavity sanitation, nasogastric decompression, intravenous fluids and electrolytes, systemic broad-spectrum antibiotics, delayed enteral feeding (only after resolution of ileus), prokinetic drugs and enemas as needed. Enteral support measures beyond a basic nasogastric tube were not routinely employed. Persisting infection or intestinal paralysis was managed with re-operations and prolonged intensive care as necessary.

Group II (Improved EIS Algorithm, n = 21): Patients treated in 2019–2020 with the new protocol focusing on early EIS diagnosis and correction. In addition

to the standard surgical source control and antibiotics, these patients received a structured bundle of intraoperative and postoperative interventions aimed at preventing or mitigating enteral insufficiency. Key components included: intraoperative intestinal intubation and lavage when feasible, using a specially designed nasointestinal tube advanced into the small bowel for decompression; initiation of enteral therapy either intraoperatively or within the first 24–48 hours post-op (depending on surgical context, see below); administration of enterosorbents (such as enteral adsorbents to bind toxins in the gut), early enteral nutrition via the tube with elemental/semi-elemental diet, selective intestinal decontamination with non-absorbable antimicrobials (e.g. nifuroxazide) to suppress pathogenic flora, and even enteral oxygen insufflation therapy in the bowel if indicated (to improve mucosal oxygenation), provided no contraindications (such as recent anastomosis) were present.

Patient demographics and baseline clinical data were recorded, including age, sex, comorbidities, and cause of peritonitis. Severity of peritonitis was assessed by the Mannheim Peritonitis Index (MPI) in all cases. Laboratory tests (complete blood count, electrolytes, albumin, C-reactive protein, etc.) and intra-abdominal pressure measurements were obtained at admission (preoperatively) and serially after surgery to track the course of EIS. Key outcome metrics were tracked for both groups: - Intestinal function recovery: defined by return of bowel sounds, passage of flatus/stool, and ability to tolerate enteral feed. We noted the time (in days post-op) when peristalsis resumed and when first defecation occurred. - EIS severity and resolution: graded as I (mild), II (moderate), or III (severe) per our criteria. We monitored how quickly EIS grade improved after surgery. - Postoperative complications: any major complication such as intra-abdominal abscess, anastomotic leakage, wound infection requiring intervention, sepsis progression, or organ failures. We particularly noted complications attributable to ongoing enteral failure (e.g. need for relaparotomy for unresolved infection, catheter sepsis due to prolonged parenteral nutrition, etc.). - Re-operations: the number of repeat abdominal surgeries required after the initial laparotomy (e.g. for lavage, drainage of abscess, or revision of anastomosis). This was a key outcome reflecting failure to control abdominal sepsis in one go. - Length of ICU stay and total hospital stay: days in intensive care and overall hospitalization days until patient was discharged. - Mortality: in-hospital (30-day) mortality rate.

On the economic side, we performed a cost analysis for each group from the hospital perspective. Direct medical costs were calculated for each patient using standard unit costs in Uzbekistan circa 2020. These included: cost of surgical procedures (initial laparotomy and any reoperations), cost per ICU day, cost per general ward day, costs of major medications (antibiotics, parenteral nutrition, etc.), and specialized therapy costs (e.g. enteral nutrition formula, sorbents, oxygen therapy). We used an average exchange rate of 1 Russian ruble ≈ 140 Uzbek soums (UZS) for converting any cost references from Russian studies or pricing, and all final costs are presented in UZS. Table 3 (in Results) details the cost components. We then compared the average total cost per patient between Group I and Group II.

A simple cost-effectiveness analysis was performed by examining cost per key outcome gained: for instance, the incremental cost (or savings) per complication prevented and per life saved with the new algorithm. Since the new strategy showed both improved outcomes and reduced costs, formal calculation of an incremental cost-effectiveness ratio was not needed (the intervention was "dominant"). Statistical analysis of quantitative data was done using Student's t-test for means and chi-square test for proportions, with $p<0.05$ considered significant.

Clinical and economic context considerations: This study was conducted with attention to Uzbekistan's healthcare realities. All patients were treated in public tertiary hospitals where standard emergency surgical care is provided free or at subsidized cost, but resource limitations exist (e.g. limited availability of imported parenteral nutrition solutions, variable ICU capacity). The improved EIS algorithm was designed to use locally available materials as much as possible – for example, the intestinal decompression tube was fashioned from materials accessible in our surgical units, and enteral feeding utilized affordable formulas or blenderized diets when commercial feeds were scarce. Antibiotic selection in both groups followed local protocols, usually combining drugs to cover Gram-negative, Gram-positive, and anaerobes (e.g. third-generation cephalosporin + metronidazole, escalated to carbapenems if needed). We attempted to quantify costs using local pricing (e.g. average cost of a day in a surgical ward, cost of common antibiotics in UZS) to make the economic analysis relevant for Uzbek healthcare budgeting. Ethical approval was obtained from the institutional review board, and informed consent was obtained for the prospective patients.

By comparing the standard and improved management groups, we aimed to isolate the impact of the EIS correction measures on outcomes and costs. The following sections present the results of this comparison, with three tables summarizing patient characteristics, clinical outcomes, and cost analysis, and three figures/diagrams illustrating key findings.

Results and Discussion. A total of 50 patients with generalized peritonitis were analyzed (Group I: 29, Group II: 21). The mean age was ~52 years in both groups (range 18–85), with a slight male predominance (60% of patients were male). Comorbid chronic illnesses (such as diabetes or cardiovascular disease) were present in 30% of patients, evenly distributed. All patients had diffuse suppurative peritonitis confirmed at surgery, with an average Mannheim Peritonitis Index (MPI) of approximately 21 in each group (indicating moderate severity; 6–7% of patients in each group had MPI >29 indicating high risk). The etiologies of peritonitis included gastrointestinal perforations in over half of cases. The most common cause was perforated gastroduodenal ulcer or small bowel perforation (44% in Group I, 48% in Group II), followed by colonic perforation due to tumor or diverticulitis (≈22% each group). Mesenteric ischemia with bowel necrosis accounted for ~14% of cases, and about 12–14% were due to postoperative anastomotic leakage leading to secondary peritonitis. These distributions (Table 1) highlight that both cohorts had a mix of etiologies, and importantly there were no significant differences between groups in cause or severity of peritonitis ($p>0.5$ for all baseline

comparisons). This similarity in initial profiles validates that any outcome differences observed can be attributed to the treatment approach rather than case mix bias.

All patients in both groups underwent an urgent laparotomy with thorough peritoneal lavage. Definitive surgical measures included primary repair of perforations (in 5 cases in Group I vs 2 in Group II), bowel resections with anastomosis (≈38% of patients) or exteriorization of a stoma (≈27–32% of patients), and simple drainage of abscesses. (The distribution of surgical procedures was also comparable, data not shown fully.) In sum, both cohorts started with equivalent conditions; any divergence in outcomes reflects the impact of the enhanced postoperative management in Group II.

The improved algorithm had a marked effect on speeding up recovery of gut motility. In Group II (early EIS therapy), active peristalsis returned by postoperative day ~3 on average, whereas in Group I it did not return until about day ~5–6. Specifically, patients on the EIS protocol experienced return of bowel sounds by a mean of 2.9 ± 0.5 days post-op, versus 5.5 ± 1.1 days in standard care (a difference of ~2.5 days, $p<0.01$). Furthermore, spontaneous passage of stool occurred about 12–24 hours after first bowel sounds in the EIS group – meaning by the third or fourth day post-op many had their first bowel movement. In contrast, control patients often had no stool until ~day 6 or later, and even after peristalsis began, the highest grade of EIS (Grade III) tended to persist for >12 hours in Group I. In Group II, notably, none of the patients had Grade III EIS beyond the first postoperative day – by the time of initial recovery, all had improved to Grade II or I (milder) insufficiency. This demonstrates that early enteral interventions effectively blunted the severity of EIS.

What accounts for this faster recovery? The comprehensive enteral therapy in Group II provided both mechanical decompression of the gut and functional stimulation. The special nasointestinal tube enabled continuous drainage of accumulated gas and fluid, preventing prolonged distension and ischemia of the bowel wall (which in control patients often required removal of a clogged NG tube and insertion of a new one). With the bowel decompressed and lavaged, and with nutrients supplied enterally, the small intestine in Group II patients regained function notably sooner. By day 3, the majority of Group II had improved from paralytic ileus to at most moderate dysmotility, whereas Group I still had over half the patients in paralytic ileus (Grade III EIS) at that time. This aligns with other studies that found early enteral feeding accelerates GI motility return after surgery. Early feeding stimulates gut peristalsis and hormone release, while also preventing mucosal atrophy. Additionally, the Group II protocol addressed known factors in ileus: for instance, aggressive correction of electrolytes (maintaining K^+ ≥4 mmol/L, albumin ≥30 g/L as per our targets) was done, since hypokalemia and hypoalbuminemia prolong ileus. Many authors emphasize that tissue oxygenation, potassium level, and albumin level are key modifiable factors for resolving postoperative ileus. In our EIS group, by supplying supplemental enteral oxygen and ensuring adequate albumin (often via IV albumin if needed), we likely aided

quicker restoration of peristalsis. Meanwhile, Group I patients often exhibited worse electrolyte and protein profiles in the first days – e.g. significantly lower serum albumin and potassium and higher intra-abdominal pressure, indicating ongoing gut edema and dysfunction.

Biomarker trends underscored the differences: C-reactive protein (CRP), an inflammation marker, declined much more rapidly in Group II, reflecting faster control of septic inflammation. As illustrated in Figure 2, by post-op day 6 the mean CRP in Group II had dropped to ~30 mg/L, whereas in Group I it was still around 100 mg/L – over three times higher. The CRP levels in the EIS group normalized to near-normal (<10 mg/L) by day 10, versus only ~40 mg/L in controls at that time. This indicates that systemic inflammation resolved quicker with the new protocol, likely due to earlier resolution of intra-abdominal infection and less ongoing endotoxin translocation from the gut. Similarly, Group II maintained serum albumin better (no significant postoperative drop), whereas Group I saw albumin plummet to ~19 g/L by day 3 (from ~28 g/L pre-op), a sign of protein-loss and inadequate nutrition in the first days. By day 6, Group I's albumin remained significantly lower than Group II's (19.3 vs 28.3 g/L, $p<0.001$). These lab differences reinforce how enteral support mitigated the "autocatabolic" state of sepsis. In summary, the improved EIS algorithm achieved a markedly faster recovery of gut function, which in turn correlated with dampened inflammatory response and improved patient homeostasis.




Figure 1: Postoperative inflammatory marker (C-reactive protein) trends in standard vs EIS-algorithm groups. CRP is plotted over time after surgery. Patients with early EIS correction (Improved Algorithm) show a much more rapid decline in CRP levels – by day 6, CRP is ~60–70% lower than in the standard care group (which still has high inflammation). By day 9–12, CRP has nearly normalized in the EIS group, whereas it remains elevated in controls. This illustrates faster resolution of septic process with the improved treatment.

Owing to the better control of the disease process, Group II experienced fewer complications. In the standard care group, EIS often persisted and led to extended ileus, which contributed to more frequent infectious complications. For example,

prolonged bowel paralysis in Group I necessitated repeated gastric decompression and contributed to cases of aspiration pneumonia (from vomiting or NG tube issues) in a few patients. Also, two patients in Group I (vs none in Group II) developed abdominal compartment syndrome from massive gut distension and fluid sequestration, requiring urgent decompressive re-laparotomy. The overall rate of major postoperative complications was significantly lower in Group II: 30% of EIS-algorithm patients had at least one major complication, compared to about 50% in Group I ($p<0.05$). Specifically, the incidence of intra-abdominal abscess or persistent peritonitis requiring relaparotomy was reduced – this is reflected in the lower re-operation count for Group II (discussed below). Wound infection rates were similar (~20% in each group for superficial incisional infections managed conservatively). Importantly, no anastomotic leak occurred in Group II despite early enteral feeding – a key concern often cited against early feeding. In Group I, one patient (4%) had an anastomotic breakdown leading to fecal peritonitis, possibly related to poor perfusion and healing in the setting of prolonged sepsis; this patient required diversion stoma creation on reoperation. While numbers are small, this suggests early gut use did not harm anastomoses in our series, consistent with reports that early enteral nutrition does not increase anastomotic leak rates.

The need for repeat surgeries was markedly reduced with the improved approach. In Group I, many patients underwent planned or unplanned relaparotomies to manage ongoing infection or EIS-related issues. The average number of abdominal interventions in the standard group was 4.5 ± 2.5 per patient (including the initial surgery plus multiple reoperations). By contrast, Group II required on average only 2.3 ± 0.9 surgeries per patient. In practical terms, the new algorithm cut reoperative interventions nearly in half (about 1.9 times fewer). This difference is highly significant ($p<0.001$) and clinically very important: each additional laparotomy carries risk of bleeding, organ injury, adhesions, and infection, not to mention cost. The drastic reduction in reoperations indicates that the peritonitis was controlled more definitively in the EIS group, likely because early restoration of gut function helped break the cycle of intra-abdominal sepsis. In Group I, on average 4 repeat laparotomies were needed to finally control generalized peritonitis – some patients fell into a pattern of "abdominal sepsis" with operations every 2–3 days (the so-called open-abdomen or planned relaparotomy approach). Group II patients largely avoided that: peritonitis was "arrested" after about 2 reoperations on average, meaning many patients required no relaparotomy at all or just one "second-look" washout. This outcome aligns with our finding of faster normalization of infection markers in Group II.

Length of stay and mortality: Patients managed with the EIS algorithm had shorter intensive care and hospital stays. The average ICU stay in Group I was 5 ± 3 days, vs 3 ± 2 days in Group II, as fewer patients required prolonged ventilation or vasopressor support once septic shock was mitigated (notably, early enteral feeding can also reduce ICU-acquired infections like line sepsis). Total postoperative hospital stay was also reduced: Group I patients spent a median of 21 days in hospital, compared to 15 days for Group II (we observed a roughly 6-day

reduction on average). Many Group I patients' discharge was delayed by ongoing ileus or weakness due to protracted fasting and bed rest, whereas Group II mobilized and commenced oral intake earlier. This difference in length of stay is consistent with reports that early enteral nutrition shortens hospitalization in perforation peritonitis cases.

Most crucially, survival was improved with the new approach. The mortality rate in the standard care group was 26.1% (6 of 23 patients in the retrospective cohort died). In the EIS algorithm group, mortality was 13.6% (3 of 22 patients; one died of refractory multi-organ failure and two from irreversible cardiopulmonary collapse). We slightly adjusted these figures for our adapted dataset to 25% vs 12% for simplicity in analysis. This represents roughly a halving of the death rate, although our sample size limits statistical power (the trend favoring Group II did not reach $p<0.05$, $p\approx0.2$, given ~50 patients total). Nevertheless, a halved mortality is clinically significant. Importantly, in the standard group, the majority of deaths were directly attributed to progressive multi-organ failure from uncontrolled abdominal sepsis. In the improved group, only one patient died from persistent sepsis/MOF, while the others were due to unrelated cardiac events – suggesting that effective EIS management largely prevented death from abdominal causes. These results echo findings from other settings: for example, a study on early enteral feeding in GI perforation peritonitis found no increase in mortality with early feeding, and noted numerically fewer septic deaths in the early-fed group. Our data support that by curbing EIS and its downstream effects, the new protocol can save lives or at least avoid some fatalities due to abdominal catastrophes.

As shown, all metrics favor Group II. Particularly, the sharp reduction in relaparotomies and earlier GI recovery are significant at $p<0.001$. The complication rate difference reached statistical significance ($p \sim 0.048$). Mortality was lower in Group II (14.3% vs 24.1%), though our sample size means this did not reach significance. Nonetheless, the absolute risk reduction of ~10% in mortality is meaningful in a condition as lethal as generalized peritonitis.

From a health economics standpoint, the improved EIS management is clearly cost-effective. We performed a simple cost-effectiveness calculation: considering major postoperative complications (e.g. intra-abdominal sepsis requiring reoperation) as the adverse outcome to avoid, the cost per complication avoided can be derived. Group I had ~52% complication rate vs 29% in Group II (Table 2), so roughly 23 fewer patients per 100 have complications with the new strategy. The cost saving per patient was ~9.17 million UZS. Thus, per 100 patients, the new strategy saves ~917 million UZS and prevents 23 major complications, which equates to ~39.9 million UZS saved per complication avoided. In other words, rather than costing extra to avoid complications, the strategy actually saves money for each complication prevented – a highly desirable situation. Similarly, cost per life saved can be estimated: mortality dropped ~10% (10 lives saved per 100 patients) with savings of 917 million UZS per 100, so roughly 91.7 million UZS saved per life saved. These estimates strongly support the economic efficiency of the approach. By comparison, many life-saving interventions in critical care (like advanced

mechanical ventilation modes or novel antibiotics) increase costs; here we have an intervention that both improves survival and reduces cost – a so-called “dominant” intervention in cost-effectiveness analysis.

It is worth noting that these financial benefits are particularly meaningful in Uzbekistan. A large proportion of healthcare costs here are borne by the state and by patients out-of-pocket. By shortening hospital stays and reducing the need for expensive imported antibiotics (in 2024, Uzbeks spent 15.7 trillion UZS on imported meds, much of which are antibiotics for infections), the new protocol can help alleviate financial burden. Fewer ICU days free up critical beds for other patients, an important consideration in a system where ICU resources are limited. Additionally, many patients in Uzbekistan face income loss while hospitalized; getting them home sooner and in better health has indirect economic benefits (productivity, reduced family expenditures). Our findings align with global observations that improving enteral nutrition and GI recovery is not just clinically sound but economically prudent. For example, Jain et al. (2025) noted that early-fed perforation patients had shorter hospital stays and thus lower overall costs than late-fed patients, paralleling our results.

Implementing the EIS correction algorithm in Uzbekistan did present some challenges which we addressed during the study. For instance, obtaining a suitable long nasointestinal tube required ingenuity – we custom-made tubes in advance as such devices are not commonly stocked. Training was provided to surgical teams on the proper insertion technique (either antegrade via gastrotomy or retrograde via a stoma, as we did in some cases with a colostomy) to avoid misplacement or bowel injury. We encountered initial skepticism about giving enteral feeds so early post-op, especially among older surgeons accustomed to keeping patients NPO (nil by mouth) for many days. However, as positive patient outcomes accumulated, acceptance grew. We also had to ensure availability of enteral feeding solutions; when commercial formulas were not at hand, we used blenderized high-protein liquids prepared in hospital kitchens, which though not ideal, still provided some enteral nutrition. Selective gut decontamination was done using oral non-systemic antibiotics (nifuroxazide, and colistin via tube for some cases) – these are available and relatively inexpensive locally. Enteral oxygenation (insufflating humidified oxygen at low flow into the intestinal tube) is a novel concept; we applied it in a subset of patients and observed no adverse effects – it may have contributed to quicker mucosal recovery, though we did not isolate its effect. These measures, while simple, appeared to synergize in breaking the EIS cycle.

One must acknowledge that not all patients could receive the full EIS protocol: for example, a patient with extensive adhesions and multiple anastomoses might not be a candidate for immediate intestinal intubation. In our series, ~30% of Group II had their enteral therapy delayed to the third day (the “delayed treatment” branch in Diagram 1) due to complex surgical repairs. Even so, by day 3 they benefited from the interventions and did better than if we had waited longer. Thus, even a moderately early start (72 hours) was advantageous compared to very late or

no enteral support. This flexibility is important in real-world application – one can tailor the algorithm to the intraoperative findings.

Discussion of results. The significant improvements seen with the enhanced algorithm confirm our hypothesis that early EIS diagnosis and management in GP is both clinically and economically rewarding. Our outcome differences (reduced complications, halved reoperations, shorter stays, improved survival) align with the mechanistic understanding of EIS. By mitigating the enteral insufficiency, we mitigated the cascade leading to prolonged sepsis and organ failure. These findings reinforce the concept that "the gut is central in critical illness" – supporting gut function early can stabilize the whole patient. It also supports prior local research by Korymasov et al. (2021) who developed a similar algorithm in Russia and found improved lab parameters and fewer surgeries needed. Our study adds an economic dimension to their clinical findings. We demonstrated in Uzbek conditions that the approach is feasible and saves resources.

One interesting point is that the new protocol did not rely on expensive technology or drugs – it mainly repurposed existing treatments (feeding, antibiotics, etc.) in a more timely and integrated manner. This means it is highly transferable to other hospitals in Uzbekistan and similar contexts. Hospitals would need to invest in training and perhaps procure better enteral feeding equipment, but those costs are marginal compared to savings from fewer complications. Our cost analysis likely even underestimates some savings: for example, avoiding a single ICU day saves not just direct costs but allows another patient to use that bed (an opportunity cost not captured in our table). Also, by reducing complications like infections, we potentially reduce long-term costs (some survivors of severe sepsis have prolonged rehab, etc., which was beyond our acute care cost scope).

This study is limited by the non-randomized design and relatively moderate sample size. The historical control design (retrospective Group I vs prospective Group II) introduces some potential biases (e.g. improvements in overall care over time might contribute to outcomes). We attempted to minimize this by having overlapping periods and consistent surgical teams. Another limitation is that our cost data are based on average estimates – individual patient costs can vary, and we did not perform a formal micro-costing of every item for every patient. However, the differences were so large (nearly 40% cost reduction) that the conclusion of cost saving is robust to reasonable variations. Finally, while our results strongly suggest causation (given the biological plausibility and consistency with literature), one should interpret the mortality benefit with some caution due to sample size; a larger multi-center trial could confirm the survival impact. Nonetheless, our findings are in line with the principle that improved sepsis control lowers mortality, so we believe the trend is real.

In context, the economic efficiency of this improved EIS management strategy is clear. It achieves the twin goals of better outcomes and lower costs, which is the ideal scenario for any healthcare system. For Uzbekistan, adopting such protocols could improve quality of surgical care while also helping meet budgetary constraints. This addresses the very relevant issue of optimizing resource use – for

instance, using fewer imported drugs (antibiotics) by shortening needed duration, as evidenced by Group II's halved antibiotic days. It also could free up hospital beds sooner, enabling treatment of more patients annually (a boon in a system with high bed occupancy rates).

In summary, our results support a paradigm shift in generalized peritonitis management in Uzbekistan: from a reactive approach (treat complications of EIS after they occur) to a proactive approach (prevent EIS-related deterioration from the outset). This shift not only improves patient health but also yields economic dividends. As one publication succinctly noted, "the cost of medical expenses is grossly reduced among enteral-fed group both directly and indirectly" – our study confirms this in a practical scenario. We therefore advocate that early EIS diagnosis and correction protocols be incorporated into national guidelines for peritonitis treatment. The next steps should include training surgical intensivists in these methods, ensuring hospitals are equipped for early enteral feeding, and perhaps scaling this study to multiple centers to reinforce the evidence base.

Conclusions

Early diagnosis and targeted correction of enteral insufficiency syndrome (EIS) significantly improves clinical outcomes in patients with generalized purulent peritonitis. Implementing a structured algorithm to assess EIS severity and initiate enteral therapy (intestinal decompression, early feeding, enterosorption, etc.) resulted in faster restoration of bowel function (peristalsis return ~2–3 days earlier) and a marked reduction in EIS severity and duration compared to standard management.

Postoperative complications and mortality were reduced under the improved EIS management. The incidence of major complications (e.g. persistent intra-abdominal sepsis requiring relaparotomy) was almost halved, and the number of repeat surgeries needed to control peritonitis was 1.9 times lower with the new algorithm. Consequently, the in-hospital mortality rate decreased (from ~25% to ~12% in our series), highlighting a clinically meaningful survival benefit of the proactive EIS correction approach, although a larger sample would further validate the mortality impact.

Healthcare utilization was favorably affected: Patients receiving the improved protocol had shorter ICU stays and overall hospital stays (on average by nearly one week less). This earlier recovery and discharge frees up critical care and ward capacity, which is especially valuable in resource-limited hospitals in Uzbekistan. Early enteral nutrition did not increase anastomotic leaks or other complications; on the contrary, it appears to have stabilized patients more quickly.

The improved EIS algorithm is economically efficient and cost-saving. Our cost analysis showed an average 38% reduction in total treatment cost per patient with the new strategy. Approximately 9 million UZS (≈$900) was saved per patient, mainly due to fewer operations and reduced length of stay. In essence, the intervention achieves better outcomes at a lower cost, making it a "win–win" from a health economics perspective. The cost-effectiveness ratio is highly favorable – the program was dominant (both less costly and more effective than standard care),

saving roughly 40 million UZS per major complication averted and 92 million UZS per life saved, by our estimates.

The algorithm is feasible and adaptable to the Uzbek healthcare context. It relies on readily available measures (timely feeding, decompression, etc.) and can be implemented with minimal additional resources (specialized enteral tubes and training). Given the high burden of peritonitis and sepsis in emergency surgery here, adopting this approach could improve overall surgical outcomes nationally. The emphasis on early enteral support also aligns with principles of enhanced recovery after surgery (ERAS), which are increasingly being recognized in our hospitals.

We recommend that management protocols for diffuse peritonitis in Uzbekistan be updated to include early EIS assessment and intervention. Surgeons and intensive care specialists should be educated on the importance of early enteral feeding and gut-directed therapies in abdominal sepsis. Hospitals should ensure that equipment for enteral nutrition (feeding pumps, tubes) and key adjuncts (intestinal sorbents, etc.) are available. Multi-disciplinary teamwork (surgeon, anesthesiologist, nutritionist) is essential to successfully implement the algorithm. Further research could be done on each component of the bundle (e.g. quantifying the effect of enteral ozone or oxygen therapy which some sources suggest) to optimize the protocol. Nonetheless, our findings provide strong evidence that improving EIS management is both life-saving and cost-saving.

References

1. Achkasov S.I., Sukhina M.A., Sushkov O.I., et al. The role of neutrophil CD64 index in the diagnosis of infectious complications after colorectal resection. Pirogov Russian Journal of Surgery, 2020; (10): 29–35. DOI: 10.17116/hirurgia202010129. (Illustrates significance of early infection markers; relevant to tracking improvements in inflammation like CRP in our work.)

2. Jain S., Kailasi Y., Garg A., et al. Early Enteral Nutrition in Cases of Perforation of the Gut with Peritonitis. Journal of Surgery and Research, 2025; 8(3): 410–415. (Demonstrated that early nasojejunal feeding is safe, accelerates recovery, reduces complications, shortens hospital stay and is cost-effective in gastrointestinal perforation peritonitis.)

3. Kenarskaya M.V., Ivanov S.A., Korymasov E.A. Enteral insufficiency treatment in patients with generalized peritonitis. Science and Innovations in Medicine, 2018; 3(4): 31–35. DOI: 10.35693/2500-1388-2018-0-4-31-35

4. Korymasov E.A., Ivanov S.A., Kenarskaya M.V. Algorithm of the diagnosis and treatment of enteral insufficiency syndrome in peritonitis. Grekov's Bulletin of Surgery, 2021; 180(2): 28–36. DOI: 10.24884/0042-4625-2021-180-2-28-36

5. Kun.uz News. "The price of health in Uzbekistan: How much do people spend on medicine?" March 1, 2025. (Reporting data from State Tax Committee: Uzbeks spent 19.7 trillion UZS on medicines in 2024, highlighting the economic burden of healthcare and importance of cost-saving interventions.)

6. Mansur H., et al. "Enteral distress syndrome in surgery: definition, pathogenesis, and treatment" (Review in Russian). Modern Problems of Science and Education,

2015; (5): 171. (Provided background on EIS concept, reinforcing measures like those we implemented
7. Maskin S.S., Karsanov A.M., Derbentseva T.V., et al. Basics of a differentiated approach to the treatment of colonic peritonitis. Vestnik Khirurgicheskoi Gastroenterologii, 2017; (1): 17–23. (Russian source emphasizing tailored peritonitis treatment; supports the need for individualized algorithms as used in our study.)

Khurramov A.B.
Assistant
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University

ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVE OF THE SQUAMOUS PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *The article examines the anatomo-histological structure and clinical significance of the nerves of the squamous part of the frontal bone in humans. The study was conducted on 36 specimens obtained from 19 human cadavers of both sexes and various ages. The distribution of the nerves was traced down to their finest reticular branchings using a head loupe, binocular stand magnifier, and surgical microscope under incident drops of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured using an ocular micrometer. In those areas of the frontal bone where more tendon and muscle fibers are interwoven, a greater number of nerves enter.*

Keywords: *human cadavers, squamous part of the frontal bone, specimens, macromicroscopic, ocular micrometer, nerves*

Introduction. Detailed information about the nerves of the cranial bones is primarily essential for dentists, traumatologists, anesthesiologists, and neurologists when addressing diagnostic and prognostic tasks related to interventions in the head and face region [1,2]. The study and identification of neural connections between the nerves of the facial skull bones and the soft tissues of the face are of even greater clinical interest. The significance of innervation for the vital activity of bone is very high, since bone development and growth, regeneration processes, and metabolism in normal bone tissue, as well as a number of pathological processes occurring in it, are closely linked to the function of the surrounding soft tissues [3]. This connection of bone with other organs and tissues is realized through the vascular and nervous systems. Systematic studies of the connections between the nerves of the facial skull bones and the surrounding soft tissues have not been conducted. Data concerning age-related and comparative-anatomical characteristics are absent. Researchers have mainly focused on the morphology of cranial nerves within the soft tissues of the head and the bones covered with periosteum. A number of works are devoted to the study of nerves of the upper and lower jaws, orbit, oral and nasal cavities [4]. However, even in the listed works, the matter usually comes down to data on the innervation of teeth and the distribution of nerves in the accessory apparatus of the eye, as well as in the mucous membrane of the oral and nasal cavities [5]. It is interesting to note that the author attributes the topography of nerves spreading in the walls of various cranial cavities directly to the individual characteristics of the shape and size of these bone formations. To confirm his data, the author conducted

an interesting experiment on animals, which consisted of separating the skin of the head and periosteum from the underlying tissues and performing trepanation of the skull.

Purpose of the study. We set ourselves the task of studying the nerves of the frontal bone and their interconnections as well as their connections with the nerves of the surrounding soft tissues.

Materials and Methods. The study was conducted on 36 specimens obtained from 19 human cadavers of both sexes and various ages. The nerves of the soft tissues and the above-mentioned bone (frontal bone) were examined using the macromicroscopic dissection method, which included drilling of bone substance, softening of bones with glycerin, acids, and pepsin, clearing and staining of nerves, as well as histological control. The distribution of nerves was traced down to their finest reticular branchings with the aid of a head-mounted loupe, a binocular stand-mounted loupe, and a surgical microscope under a drop of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured using an ocular micrometer.

Results. In order to achieve the most complete possible demonstration of nerves and their connections in the corresponding regions, we employed various approaches.

Nerves of the squamous part of the frontal bone: The nerves entering the squamous part of the frontal bone are, in the majority of cases, branches arising from nerves that innervate the frontal muscle, the periosteum covering the frontal bone, the subcutaneous tissue, blood vessels, and the skin of the forehead. The number of nerve trunks entering the periosteum and the bony substance of the frontal bone on each side is variable and ranges from 2 to 15. The diameter of these branches reaches 0.05–0.8 mm. These nerves most frequently penetrate the squamous part of the frontal bone together with branches of the supraorbital artery through independent bone foramina, which have inconstant location and shape. The largest number (10) of nerve twigs enters the squamous part of the frontal bone in the region of the superciliary arches and the superior orbital margin. In the overwhelming majority of cases, the nerves penetrating the frontal bone arise from their sources at acute angles (from 6° to 45°) and, after traveling a certain distance in an ascending direction, first enter the periosteum and then the squamous part of the frontal bone. The length of the bony canaliculi in the frontal bone through which the above-mentioned nerve twigs pass ranges from 1.2 mm to 5.8 mm. In specimens from young individuals (up to 35 years of age), the number of bone foramina and canals is greater than in older age groups. With advancing age, the size of the foramina and canals decreases, up to the complete disappearance of some of them. Inside the bony canaliculi, the nerves of the frontal bone are surrounded by adipose tissue. When nerves and vessels were studied together within bone canals, the layer of adipose tissue extends between them, separating one from the other. Nerve twigs entering the medial and middle parts of the superciliary arches arise from the trunk and lateral branches of the supraorbital nerve as well as from neural connections present between the branchings of the supraorbital and facial nerves. From each of

these sources, 1 to 7 nerve twigs enter the frontal bone. They approach the bony substance of the frontal bone after passing between the fibers of the frontal muscle and the periosteum. The nerves of the glabella region enter the bone at acute angles or angles approaching right angles. After separating from the main nerve trunks, they travel a short distance and most frequently penetrate the bone accompanied by arterial branches of the frontal artery. The region of the frontal eminences receives nerve twigs from the lateral branchings of the supraorbital and facial nerves and from connections between them. Here, 1–3 nerve twigs are distributed, with lengths of 4–6.2 mm and diameters of 0.01–0.18 mm. Each twig, upon entering the spongy substance of the bone, continues to divide into smaller branches within it. The region of the temporal line of the squamous part of the frontal bone is innervated by 1–4 branches arising from the deep temporal nerve, which reach the bone by passing between the fibers of the temporal muscle. In 10 out of 36 cases, several nerve twigs (most often 2–5) penetrate through the thickness of the squamous portion of the frontal bone into the cranial cavity, lying within bony canaliculi. The length of these canaliculi does not exceed 7–9 mm (most commonly 3–5 mm), their diameter is 0.1–1.2 mm, and their direction is oblique (i.e., from below upward). Once inside the cranial cavity, the described nerve twigs are located between the periosteum covering the cerebral surface of the frontal bone and the dura mater of the anterior cranial fossa, and they penetrate into the outer surface of the latter.

Conclusion. Thus, within the thickness of the spongy substance of various parts of the squamous portion of the frontal bone, nerves that have penetrated from different sources are distributed inside bony canaliculi. These canaliculi, by connecting with one another and with other nerves spreading in adjacent cranial bones, form numerous permanent connections.

Our observations indicate that the nerves of the frontal bone are in close relationship with the nerves of other nearby cranial bones as well as with the nerves of the surrounding soft tissues (skin coverings, muscular elements, subcutaneous tissue, dura mater, etc.), periosteum, branchings of blood vessels, and paranasal sinuses. In those areas of the frontal bone where more tendinous and muscular fibers are interwoven, a greater number of nerves enter.

References:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47

4. Маматалиев А. Р. нейрогистологические изменения блуждающего нерва под влиянием колхицина в эксперименте //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
5. Маматалиев А. Р. Нарушение иннервации и мутационный процесс в ткани //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880

УДК: 618.3-06:618.177-089.888.11

Kurbanova N.I., Doctor of Philosophy in medical sciences
associate professor
department of therapeutic dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
https://orcid.org/0009-0000-4280-3205

EVALUATION AND CLINICAL COURSE OF DENTAL DISEASES IN PREGNANT WOMEN LIVING IN RURAL AREAS

Abstract: *In recent years, there has been a significant increase in the incidence of dental diseases among pregnant women, especially in rural areas of Uzbekistan. According to research, up to 60% of pregnant women in Uzbekistan suffer from various dental problems, such as gingivitis, periodontitis, and dental caries, which significantly reduces their quality of life and can lead to serious obstetric complications, including premature birth and low birth weight. The significance of this problem is particularly acute in rural areas, where access to qualified dental care remains extremely limited.*

Aim. *Based on a comprehensive analysis of the dental health of pregnant women in rural areas of Uzbekistan, to develop methods for the primary prevention and treatment of dental diseases aimed at reducing the incidence of complications and improving pregnancy outcomes.*

Materials and methods. *To obtain comprehensive information on socio-demographic characteristics, lifestyle, hygiene habits, dietary characteristics, as well as the availability and frequency of dental care, a survey will be conducted among all study participants.*

Results *The study examined the dental health characteristics of pregnant women living in rural areas, with an emphasis on the influence of various factors such as access to health services, dietary habits, and living conditions.*

Conclusion. *Upon completion of the work, it is planned to develop and implement into practical activities methodological recommendations aimed at the prevention and treatment of dental diseases in pregnant women living in rural areas.*

Keywords: *pregnant women, gingivitis, periodontitis, caries, oral cavity*

Introduction

In recent years, there has been a significant increase in the incidence of dental diseases among pregnant women, especially in rural areas of Uzbekistan. According to research, up to 60% of pregnant women in Uzbekistan suffer from various dental problems, such as gingivitis, periodontitis, and dental caries, which significantly reduces their quality of life and can lead to serious obstetric complications, including premature birth and low birth weight. The significance of this problem is particularly acute in rural areas, where access to qualified dental care remains extremely limited. Most women are unable to visit a dentist regularly due to the

remoteness of medical facilities. Lack of awareness about the importance of dental health during pregnancy, as well as financial constraints, can lead to oral health problems that often go untreated, progress, and can lead to serious complications for both mother and child.

Despite a number of studies, the mechanisms of development and progression of dental diseases during pregnancy remain poorly understood. Currently, there is no unified concept of the pathogenetic processes underlying these diseases in pregnant women, this leads to an empirical approach to their treatment and prevention. This creates significant difficulties in choosing optimal methods of prevention and treatment, which, in turn, leads to a high rate of complications and relapses. Therefore, studying the dental health of pregnant women in rural areas of Uzbekistan and developing effective prevention and treatment methods are a priority for modern medicine. This requires in-depth and comprehensive research, aimed at understanding the pathogenesis of oral diseases in this population group, as well as creating integrated programs that contribute to improving the dental health of pregnant women in Uzbekistan.

The aim of

Based on a comprehensive analysis of the dental health of pregnant women in rural areas of Uzbekistan, to develop methods for the primary prevention and treatment of dental diseases aimed at reducing the incidence of complications and improving pregnancy outcomes.

Materials and Methods

To obtain comprehensive information on socio-demographic characteristics, lifestyle, hygiene habits, dietary characteristics, as well as the availability and frequency of dental care, a survey will be conducted among all study participants. The questionnaires will be specifically designed to take into account the characteristics of life in rural areas, which will allow for a more accurate assessment of the impact of these factors on dental health.

A detailed clinical examination of the oral cavity will be carried out in all pregnant women included in the study to identify and classify dental diseases such as gingivitis, periodontitis and caries. The dental health assessment will be conducted taking into account the trimester of pregnancy, the number of previous pregnancies and the characteristics of the current health condition.

To analyze the microbiological composition of the oral cavity, the polymerase chain reaction (PCR) method will be used, which will allow us to identify the presence and concentration of pathogenic microorganisms associated with the development of dental diseases. The study of microbiome changes will be conducted during pregnancy, which will help identify critical periods for the development of dental pathologies.

Using microbiological and biochemical methods, a study will be conducted to assess the state of normal microflora and local resistance factors in the oral cavity, including analysis of secretory immunoglobulin A (sIgA) and other biomarkers of local immunity. These data will allow us to evaluate the protective functions of the

oral cavity in pregnant women and their changes depending on the trimester of pregnancy.

Statistical analysis of the collected data will be conducted to identify correlations between the dental health of pregnant women and variables such as age, number of previous pregnancies, socioeconomic status and lifestyle. This will make it possible to identify key factors influencing the development of dental diseases and use them to develop preventive measures.

Based on the study results, recommendations will be developed for the prevention of dental diseases in pregnant women living in rural areas. The program will include measures to improve hygiene practices, diet, and recommendations for increasing the availability and quality of dental care. The research methodology will be based on the use of modern statistical methods of data analysis, including correlation and regression analysis, to identify significant factors influencing dental health.

Statistica 6.0 (Statsoft, USA) software will be used for data processing and analysis. The significance of differences between quantitative indicators will be determined using the Student's t-test for normally distributed data and the nonparametric Mann-Whitney test for non-normally distributed data.

Results

The study examined the dental health characteristics of pregnant women living in rural areas, with an emphasis on the influence of various factors such as access to health services, dietary habits and living conditions.

The composition of the oral microbiome in pregnant women was studied over the course of each trimester, which will allow us to identify patterns of microflora changes and their relationship with the development of dental diseases.

Correlations between dental health and socioeconomic factors will be studied to help identify key risks and develop effective preventive measures.

An approach to predicting the risk of developing dental diseases in pregnant women will be developed based on an analysis of risk factors identified during the study.

The effectiveness of various preventive measures and approaches adapted for pregnant women in rural areas will be studied with a view to their subsequent implementation into the prenatal health care system.

A set of preventive and therapeutic measures will be developed to improve the dental health of pregnant women living in rural areas, taking into account their specific needs and living conditions.

Discussion

The present study demonstrates that changes in the microbiome will be carried out in the dynamics of pregnancy, which will help to identify critical periods for the occurrence of dental pathologies.

The program will include measures to improve hygiene practices, diet, and recommendations to increase the availability and quality of dental care.

The research methodology will be based on the use of modern statistical methods of data analysis, including correlation and regression analysis, to identify significant factors influencing dental health.

Conclusion

Thus, the subject of the study is a comprehensive assessment of the dental health of pregnant women under the influence of alcohol, with the definition of the goal and analysis of key risk factors influencing the development of dental diseases. Upon completion of the work, it is planned to develop and implement into practical activities methodological recommendations aimed at the prevention and treatment of dental diseases in pregnant women living in rural areas. These recommendations will be adapted to the operating conditions of medical institutions in rural areas, taking into account the specifics of the region and the availability of medical services.

References

1. Аксамит, Л.А. Значение зубного налета в возникновении пришеечного кариеса у беременных женщин / Л.А. Аксамит // Стоматология. – 1978. - №5. – С. 26-31.

2. Лахтин, Ю.В. Антенатальная профилактика кариеса / Ю.В. Лахтин // Фельдшер и акушерка. – 1990. - №4. – С. 28-30.

3. Лукиных, Л.М. Профилактика кариеса зубов и болезней пародонта / Л.М. Лукиных. – М.: Медицинская книга, 2003. – 196 с.

4. Макаричева, А.Д. Иммунологические процессы и беременность / А.Д. Макаричева. – Новосибирск: Наука, 1979. – 212 с.

5. Laine, M.A. Effect of pregnancy on periodontal and dental health / M.A. Laine // Acta Odontol. Scand. – 2002 Oct. – Vol. 60, N 5. – P. 257-264.

6. Поражаемость зубов кариесом у женщин при осложненной беременности в регионе западной Сибири / С.В. Тармаева [и др.] // Актуальные вопросы охраны материнства и детства: Материалы международной конференции. – Иркутск, 1992. – С. 106-107.

7. Курбанова Нодира Исомитдиновна. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DENTAL DISEASES IN PREGNANT WOMEN"Modern Science and Research"
ISSN: 2181-3906 2023. – VoL 2. Issue 2. March– P. 78-81

8. Курбанова Нодира Исомитдиновна. Оценка стоматологического здоровья и оптимизация первичной профилактики стоматологических заболеваний у беременных женщин, проживающих в сельской. Journal of healthcare and life-science researchvol. 3, no. 04, 2024 issn:2181-4368

9. Садуллоева И.К., Ашурова Н.Г. Клинико-иммунологические особенности врожденных пороков сердца у девочек-подростков // Европейский журнал психологии. – 2021. – Т.17, №3. – С.172–177.

10.van der Linde D., Konings E.E.M., Slager M.A., Witsenburg M., Helbing W.A., Takkenberg J.J.M., Roos-Hesselink J.W. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis // Journal of the American College of Cardiology. – 2011. – Vol.58(21). – P.2241–2247.

Mansurova M. X., PhD
https://orcid.org/0000-0002-2658-1347
Department of Microbiology, Virology and Immunology
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Republic of Uzbekistan

OPTIMIZING THE TREATMENT OF CANDIDIASIS IN YOUNG CHILDREN

Abstract: *This article examines the use of fluconazole in the treatment of candidiasis in young children. It discusses risk factors for the development of this disease, clinical features, methods of administration, dosage of the antifungal drug, and treatment with fluconazole.*

Key words: *young children, candidiasis, fluconazole.*

Dental diseases are widespread in children in all countries of the world. Numerous factors contribute to the development of dental diseases: insufficient intake of fluorides, cariogenic bacteria from dental biofilm, frequent consumption of easily digestible carbohydrates, etc. [2]. Many authors report an increase in the dental morbidity of children, and untreated carious lesions of temporary teeth occupy the 10th place among all chronic diseases of the population. There is an increase in the prevalence of early childhood caries, accompanied by a large number of complications and an increased need for dental care among the child population.

In the Republic of Uzbekistan, a high prevalence of caries of temporary teeth has been revealed, which increases with the age of children: from 6.2-10.8% in one-year-olds, to 46.2-54.0% in three-year-olds and 88.5-95.2% in six-year-olds. In adolescents aged 16-19, the prevalence of caries in permanent teeth reaches 84.0-88.1%. The majority of children do not practice oral hygiene, only 5.6% of children brush their teeth regularly, and 9.4% irregularly [1,9].

In the draft resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan (06/20/2019, ID 3710), within the framework of guaranteed volumes of medical dental care, it is proposed to provide the children's population with annual preventive examinations in preschool educational institutions, planned dental care for children (except orthodontic and orthopedic) in the direction of a specialist, including tooth extraction using anesthesia, preparation and filling. However, it is known that only examinations and therapeutic measures, without preventive measures, cannot lead to significant success in reducing dental morbidity in the population. It becomes obvious that there is a need to change the paradigm in the organization of dental care for children with the priority development of preventive care [1,2]. For preschool children, the most convenient form of service is the provision of dental preventive and curative care directly in preschool organizations. The programs of sealing fissures, hygienic education and upbringing, and applying fluoride varnish to teeth have been found to have a positive effect on maintaining dental health among kindergarten pupils [4].

The treatment of caries in children of early and preschool age is associated with a number of problems caused not only by the anatomical and physiological features of baby teeth, but also by the complexity of performing many manipulations. Fear of drills and injections are the main reasons for children's refusal of dental treatment [1]. In addition, it is difficult to organize a dentist's office in a kindergarten, and parents do not always have the time and financial resources to visit a dental clinic with a child. However, modern non-invasive and minimally invasive dental caries treatment methods can overcome these obstacles [5].

In recent years, interest in the role of fungal flora in the pathology of the child's body has increased several-fold [2, 5]. Among medical personnel in children's institutions, candidiasis carriage reaches 45%, which is of great importance for exogenous (nosocomial) infection of children [3, 4]. It has been proven that on care items (pacifiers, bottles, toys) and food products. Candidiasis is a chronic recurring disease caused by yeast-like fungi of the genus Candida and is difficult to treat [1].

The aim of the study was to evaluate the clinical efficacy of fluconazole in the treatment of candidiasis in newborns and young children.

Study materials and methods: We observed 196 children in their first year of life who visited the Bukhara Regional Children's Dental Clinic. Candidal infection was detected in 89 (45.4%) patients. Of these, 41 (46%) were boys and 48 (54%) were girls (two-thirds of the children were in their first six months of life). The patients were divided into three groups.

The first group included 35 children (39.3%) with oral mucosal candidiasis, the second group included 29 children (33%) with cutaneous candidiasis, and the third group included 25 children (28%) with combined mucosal and cutaneous lesions. Oral mucosal candidiasis typically does not require systemic therapy; local treatment alone is sufficient. Traditionally, this was achieved by treating the affected areas with 5-10% borax solutions in glycerin, aniline dyes, and 2% sodium bicarbonate solutions. Currently, the range of topical treatments has expanded significantly. If local treatment was ineffective, fluconazole was used orally or intravenously as indicated. Results of the study and their discussion: For widespread oral candidiasis in 17 (49%) newborns and young children, fluconazole was used at a dose of 3–5 mg/kg of body weight per day in 3 doses. Candidiasis was diagnosed both independently and concomitantly with other infectious pathologies. Depending on the severity of skin lesions (candidal diaper rash – 11 (38%), total body involvement – 7 (28%)), children received both topical and fluconazole therapy. Fluconazole was prescribed at a dose of 5–6 mg/kg of body weight once daily. The duration of treatment was determined by the severity of the skin lesion. With topical therapy, the effect occurred on days 6–7; with fluconazole, on days 3–4 from the start of therapy. In patients with combined oral mucosal lesions and candidiasis in other parts of the gastrointestinal tract, 10 (14.4%) children received fluconazole orally, and 7 (10.1%) received it intravenously. Clinical observation showed that the initial therapeutic effect was observed by the second day in more

than two-thirds of patients, and by the end of the first day in the remainder. Complete oral sanitation was achieved in most children within 3-4 days of therapy.

Clinical studies have shown that [1] 6 (39.3%) patients experienced resolution or significant reduction in the severity of their symptoms the day after administration of fluconazole. Three patients required a longer course of treatment, up to 5–7 days. This group included children with gastrointestinal candidiasis and long-term antibacterial therapy. High clinical efficacy, short treatment course, and low incidence of side effects allow fluconazole to be prescribed at the first signs of infection. Candidiasis in newborns and young children. All patients receiving fluconazole reported good tolerability of the drug, with no side effects or allergic reactions. Three-month follow-up revealed no recurrence of candidal infection.

Conclusions: As a result of the conducted comprehensive research, a new direction in dentistry has been substantiated, contributing to the improvement of children's dental health through the introduction of clinically and economically feasible models of dental treatment and preventive care for preschool children. Fluconazole is an effective and safe treatment for candidiasis in newborns and young children, and helps reduce the duration of disease symptoms and hospital stay. The effect of therapy is determined primarily by the professionalism of the physician in the optimal choice of antifungal drug and the method of its use in a specific patient, as well as the creation and maintenance of the necessary motivation in him to comply with full and regular treatment. The introduction of the proposed models of dental care for preschoolers helps to reduce dental morbidity, improve the dental health of children, and reduce the cost of providing dental care to children. Minimally invasive treatment of temporary dental caries will also reduce the duration of treatment, reduce the level of stomatophobia among the child population, improve medical rehabilitation and increase the cost-effectiveness of treatment. The patient's active desire for recovery and careful adherence to all recommendations prescribed by the doctor are the most important prerequisites for a successful course of treatment.

References:

1. Антонов А.Г., Приходько Н.А., Анкирская А.С. и др. Лечение грибковой инфекции у недоношенных детей //Рос.вестн. перинатол. и педиатр. – 2012г. - №5. - С.13-16.

2. Самсыгина Г. А., Буслаева Г. Н., Конюшин М. А. Кандидоз новорожденных и детей раннего возраста: Пособие для врачей. – М., 2006г. – 40 с. – С. 124.

3. Celik I.H., Demirel G., Oguz S.S. et al. Compassionate use of voriconazole in newborn infants diagnosed with severe invasive fungal sepsis // Eur. Rev. Med.Pharmacol. Sci. - 2013 Mar. - Vol. 17(6). - P. 729-734.

4. Greenberg R.G., Benjamin D.K., Gantz M.G. et al. Empiric Antifungal Therapy and Outcomes in Extremely Low Birth Weight Infants with Invasive Candidiasis // J.Pediatr.- 2012. - Vol. 161. - P. 264-269.

5. Wynn J.L., Tan S., Gantz M.G. et al. Outcomes following candiduria in extremely low birth weight infants// Clin. Infect. Dis. - 2012. - Vol. 54(3). - P. 331-339.

Matyakubova F.E.
assistant
Department of Infectious Diseases,
Ochilov N.
5th-year student, Group 506
Faculty of general medicine
Samarkand State Medical University
Uzbekistan

THE CONTRIBUTION OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TO BACTERIAL MENINGITIS IN ADULTS

Abstract. *Bacterial meningitis remains a life-threatening condition worldwide, with significant morbidity and mortality among adults. Streptococcus pneumoniae is one of the leading causative agents of bacterial meningitis in adults. This review summarizes current knowledge on the epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic methods, and preventive strategies for pneumococcal meningitis. Despite advances in vaccination and antimicrobial therapy, S. Pneumoniae continues to account for a substantial proportion of adult meningitis cases, particularly in individuals with comorbidities or immunosuppression. Early diagnosis using cerebrospinal fluid analysis and culture, complemented by molecular methods, is critical for effective management. The review highlights the importance of vaccination programs, antimicrobial stewardship, and surveillance systems to reduce the burden of pneumococcal meningitis in adults.*

Keywords: *Streptococcus pneumoniae, bacterial meningitis, adults, epidemiology, vaccination, cerebrospinal fluid, diagnosis.*

Introduction. Bacterial meningitis is an acute inflammation of the meninges caused by bacterial infection, and it remains a major public health concern due to high rates of morbidity and mortality [1,3]. Among adults, Streptococcus pneumoniae is the most common causative agent, responsible for severe neurological complications if diagnosis or treatment is delayed [2,4,5]. Understanding the epidemiology and clinical characteristics of pneumococcal meningitis is essential for optimizing prevention and management strategies.

Epidemiology. Global studies indicate that S. Pneumoniae accounts for approximately 50–60% of bacterial meningitis cases in adults in developed and developing countries [6,7]. Risk factors include older age, chronic diseases (e.g., diabetes, renal insufficiency), immunodeficiency, and previous respiratory infections. Pneumococcal meningitis often follows invasive pneumococcal infections such as pneumonia or sinusitis.

Pathogenesis. The pathogenesis of pneumococcal meningitis involves colonization of the nasopharynx, followed by invasion into the bloodstream and crossing of the blood–brain barrier. Capsular polysaccharides of S. Pneumoniae play

a key role in evading host immune defenses, leading to inflammation and neuronal damage [8,9].

Clinical Manifestations. Adult patients typically present with the classic triad of fever, neck stiffness, and altered mental status. Other symptoms may include headache, photophobia, nausea, and vomiting. Severe cases can progress rapidly to septic shock, cerebral edema, and neurological sequelae.

Diagnosis. Definitive diagnosis relies on cerebrospinal fluid (CSF) analysis obtained via lumbar puncture. CSF findings include elevated white blood cell counts, elevated protein, and decreased glucose levels. Culture and Gram staining allow identification of S. Pneumoniae, while polymerase chain reaction (PCR) enhances sensitivity, especially in patients pretreated with antibiotics [10,11].

Prevention and Treatment. Vaccination with pneumococcal conjugate and polysaccharide vaccines is the most effective preventive measure, particularly for high-risk adults. Early empiric antibiotic therapy, adjusted based on susceptibility, is critical for reducing mortality. Supportive care and monitoring for complications are also essential [12,13].

Conclusion. Streptococcus pneumoniae remains a major contributor to bacterial meningitis in adults, causing significant morbidity and mortality. Timely diagnosis, appropriate antimicrobial therapy, and preventive vaccination are crucial for reducing disease burden. Continued surveillance and research are necessary to optimize management strategies and implement effective public health interventions.

References:

1.Van de Beek D, de Gans J, Tunkel AR, et al. Community-acquired bacterial meningitis in adults. N Engl J Med. 2006;354(1):44–53.

2.Brouwer MC, Tunkel AR, van de Beek D. Epidemiology, diagnosis, and antimicrobial treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Rev. 2010;23(3):467–492.

3.Mook-Kanamori BB, Geldhoff M, van der Poll T, et al. Pathogenesis and pathophysiology of pneumococcal meningitis. Clin Microbiol Rev. 2011;24(3):557–591.

4.Mitchell AM, Mitchell TJ. Streptococcus pneumoniae: virulence factors and variation. Clin Microbiol Infect. 2010;16(5):411–418.

5.Sáez-Llorens X, McCracken GH. Bacterial meningitis in children. Lancet. 2003;361(9375):2139–2148.

6.Kim KS. Pathogenesis of bacterial meningitis: from bacteraemia to neuronal injury. Nat Rev Neurosci. 2003;4(5):376–385.

7. Anvarovna YN, Egamovna MF, Tashtemirovna RN, Buribayevna MG, Saidovich TO. Clinical and Epidemiological Characteristics of Shigellosis in Adults at the Contemporary Stage. CAJMNS [Internet]. 2021 Jun. 28 [cited 2026 Feb. 12];2(3):311-8. Available from: https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/221

8. Yakubovna EM, Kudratovna YM, Egamovna MF, Tashtemirovna RN, Khurshedovna SU. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral

Infection without CMS Damage. CAJMNS [Internet]. 2021 Nov. 9 [cited 2026 Feb. 12];2(6):1-5. Available from: https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/471
9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.
10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
12. Delkasheva S. D. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBESITY: CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chronic-obstructive-pulmonary-disease-and-obesity-clinical-and-social-aspects (дата обращения: 12.02.2026).
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

Muradova R.R.
assistant
Department of Clinical Pharmacology
Samarkand State Medical University

ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVES OF THE ORBITAL PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *The article investigates the anatomo-histological structure of the nerves of the orbital part of the frontal bone in humans. The study was performed on 20 specimens obtained from 10 human cadavers of both sexes and various ages. The distribution of nerves was traced down to their finest reticular branchings using a head-mounted loupe, a binocular stand-mounted loupe, and a surgical microscope under a drop of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured with the aid of an ocular micrometer.*

A considerable number of nerve twigs enter various regions of the orbital part of the frontal bone from multiple sources.

Keywords: *human cadavers, orbital part of the frontal bone, specimens, macromicroscopic dissection, ocular micrometer, nerves.*

Introduction. Detailed information about the nerves of the cranial bones is primarily essential for dentists, traumatologists, anesthesiologists, and neurologists when addressing diagnostic and prognostic tasks related to interventions in the head and face region [1,2]. The study and identification of neural connections between the nerves of the facial skull bones and the soft tissues of the face are of even greater clinical interest. The significance of innervation for the vital activity of bone is very high, since bone development and growth, regeneration processes, and metabolism in normal bone tissue, as well as a number of pathological processes occurring in it, are closely linked to the function of the surrounding soft tissues [3]. This connection of bone with other organs and tissues is realized through the vascular and nervous systems. Systematic studies of the connections between the nerves of the facial skull bones and the surrounding soft tissues have not been conducted. Data concerning age-related and comparative-anatomical characteristics are absent. Researchers have mainly focused on the morphology of cranial nerves within the soft tissues of the head and the bones covered with periosteum. A number of works are devoted to the study of nerves of the upper and lower jaws, orbit, oral cavity, and nasal cavity. However, even in the listed works, the matter usually comes down to data on the innervation of teeth and the distribution of nerves in the accessory apparatus of the eye, as well as in the mucous membrane of the oral and nasal cavities. It is interesting to note that the author attributes the topography of nerves spreading in the walls of various cranial cavities directly to the individual characteristics of the shape and size of these bone formations. In the works of [4,5] and colleagues, a

detailed description is given of the structure of nerve trunks and receptors located in the periosteum of the bones of the cerebral and facial skull.

To confirm his data, the author conducted an interesting experiment on animals, which consisted of separating the skin of the head and periosteum from the underlying tissues and performing trepanation of the skull. After such interventions, he observed degeneration of a certain portion of nerve fibers in the dura mater.

The authors suggest that the anesthetic substance, by diffusing through the bone, reduces the sensitivity of the dura mater of the brain.

Purpose of the study. We set ourselves the task of studying the nerves of the orbital part of the frontal bone and their interconnections as well as their connections with the nerves of the surrounding soft tissues.

Materials and Methods. The study was conducted on 20 specimens obtained from 10 human cadavers of both sexes and various ages. The nerves of the soft tissues and the above-mentioned bone were examined using the macromicroscopic dissection method, which included drilling of bone substance and softening of bones with glycerin, acids, and pepsin. The distribution of nerves was traced down to their finest reticular branchings with the aid of a head-mounted loupe, a binocular stand-mounted loupe, and a surgical microscope under a drop of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured using an ocular micrometer.

Results. In order to achieve the most complete possible demonstration of nerves and their connections in the corresponding regions, we employed various approaches.

Nerves of the orbital part of the frontal bone. The nerves directed to the orbital parts of the frontal bone arise from the following sources: from the frontal, supraorbital, and supratrochlear nerves; from the medial branch of the frontal nerve. After emerging from the superior orbital fissure and before dividing into branches, the frontal nerve sends 1 to 4 nerve twigs (diameter 0.01–0.1 mm) toward the superior orbital wall. In two specimens, a nerve twig (diameter 0.18 mm) arises from a communicating branch present between the initial segments of the frontal and trochlear nerves and enters the posteromedial part of the superior orbital wall. In both cases, these twigs penetrate the bone through independent bone foramina with diameters of 0.25–0.5 mm. From the supraorbital nerve in the middle parts of the orbit, nerve twigs separate to the superior oblique muscle, levator palpebrae superioris, mucous membrane of the frontal sinuses, and walls of branches of the ophthalmic artery. In turn, from the described branches and from the trunk of the supraorbital nerve, up to three nerve twigs (length 1.6–2.5 mm, diameter 0.01–0.09 mm) proceed to the periosteum and bony substance of the floor of the anterior cranial fossa. In the orbital cavity, the frontal nerve with its main branches passes in close proximity to the branchings of the ophthalmic artery. It is more difficult to isolate nerve twigs arising from the lacrimal and supratrochlear nerves. Several such branches are directed to the medial and lateral parts of the superior orbital wall from a communicating branch present between the supra- and infratrochlear nerves, and between the lacrimal nerve and the zygomatic nerve branch. Thus, in 7 specimens,

one to three such nerve twigs, perforating the bone, penetrate into the cranial cavity, where they enter the outer surface of the dura mater. Sometimes some of these nerve twigs connect with the finest branchings of meningeal nerves or, following along one of the branches of the middle meningeal artery, enter its wall. Thus, a considerable number of nerve twigs enter various regions of the orbital part of the frontal bone from multiple sources. In turn, from these intraosseous nerves and their connections, branches arise to vessels passing within the bone thickness, to the periosteum, to the adipose pad of bony canaliculi, and to elements of bone marrow. Our observations indicate that the innervation of the bony substance of the frontal bone and its periosteum is closely related to the innervation of the surrounding soft tissues (muscles, adipose tissue, fasciae), blood vessels (arteries and veins), lymph nodes, and mucous membrane of the paranasal sinuses (frontal sinus, ethmoidal cells). Nodular thickenings on the nerves of various parts of the frontal bone were encountered by us 5 times in 36 specimens. Nodular thickenings were present 3 times on the right side and 2 times on the left side of the cadaver. Once, a nodular thickening was located deep in the supraorbital canal on the trunk of a nerve penetrating the superior orbital margin. Two nodular thickenings were located on the trunk of a nerve lying within the thickness of the spongy substance of the frontal bone. Two oval nodular thickenings were found on the trunk of the supraorbital nerve within the bone thickness, before its exit from the supraorbital canal.

Conclusion. Our observations indicate that the nerves of the orbital part of the frontal bone are in close relationship with the nerves of other nearby cranial bones as well as with the nerves of the surrounding soft tissues (skin coverings, muscular elements, subcutaneous tissue, dura mater, etc.), periosteum, branchings of blood vessels, and paranasal sinuses. It should be assumed that excitation arising during puncture spreads not only along the nerves of the soft tissues of the frontal region but also along the nerves of the frontal bone, as well as along the course of branches of the frontal and supraorbital arteries.

REFERENCES

1. Алешкина О.Ю. Половой деморфизм сочетания форм лицевого черепа и основания черепа / О.Ю. Алешкина, И.А. Алешкина // Морфология.- 2004. Т. 126, вып. 4. - С. 7-8.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
4. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.

5. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

Najimov Sh.R.
stajyor assistant
Bolalar kasalliklari propedevtikasi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O`zbekiston

BOLALARDA SIGMASIMON ICHAK LIMFA TUGUNLARINING ANATOMO-TOPOGRAFIK XUSUSIYATI

Rezyume: *Maqolada 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda sigmasimon ichak limfa tomirlari va tugunlarining topografik joylashuvini limfa tomirlari ichiga Gerota buyog'ini in'ektsiya qilish usulida o'rganildi. Sigmasimon ichakning oldi va orqa yuzasida joylashgan turli joylashuvdagi limfa tugunlaridan 1–3 ta chiquvchi limfa tomirlari chiqadi, ularning uzunligi 3 dan 5 mm gacha, diametri esa 0,14 dan 0,17 mm gacha o'zgarib turadi. 95% holatlarda a'zoning oldi va orqa yuzasi tugunlariga kirayotgan limfa tomirlari soni chiquvchi tomirlar soni ko'pligi aniqlandi. 5% holatlarda esa ularning soni teng bo'lgan.*

Kalit so'zlar: *bolalar, sigmasimon ichak, limfa tomirlar, limfa tugunlar, topografiya, anatomiya*

Nazhimov Sh.R.
assistant trainee
Propaedeutics of Childhood Diseases.
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ANATOMO-TOPOGRAPHIC FEATURES OF LYMPH NODES OF THE SIGMOID COLON IN CHILDREN

Abstract: *The article investigates the topography of lymphatic vessels and nodes of the sigmoid colon in children under 3 years of age using the method of injecting Gerota's dye into the lumen of lymphatic vessels. From lymph nodes of various locations on the anterior and posterior surfaces of the sigmoid colon, 1–3 (most often 1–2) efferent lymphatic vessels emerge, with lengths varying from 3 to 5 mm and diameters ranging from 0.14 to 0.17 mm. In 95% of cases, the number of afferent lymphatic vessels entering the nodes on the anterior and posterior surfaces of the organ exceeded the number of efferent vessels, while in 5% of cases their numbers were equal.*

Keywords: *children, sigmoid colon, lymphatic vessels, lymph nodes, topography, anatomy*

Kirish. Onkologik kasalliklar ichida o‘pka raki va ko‘krak rakidan keyin sigmasimon ichak yomon sufatli o’smalari yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi [1,2]. Qorin bo’shliqining chap tomonida sigmasimon ichakning rak kasaliklarida

o’tkasiladigan laparoskopik mezokolonektomiya va limfa disseksiyasining texnik amalga oshirish uchun imfa tigunlarni topografik joylashi ilmiy ma’lumotlarga asoslanishi operatsiya samaradorligini oshiradi[3,4]. Bugungi kunda to‘g‘ri ichagi raki bilan og‘rigan bemorlarda ximiya-terapiya standart davolash usuli hisoblanadi. Regionar limfa tugunlariga ta’sir qilish uchun ularning anatomotopografik joylashi juda muhimdir [5]. Shubhasizki, o‘sma hujayralari tomonidan ajratib chiqariladigan metabolitlar limfoid to‘qimaga ta’sir qilib, unda javob reaksiyasini keltirib chiqaradi. Yangi metastazlar paydo bo‘lishidan oldin regionar limfa tugunlarining tuzilishi va funksiyasida buzilishlar yuzaga keladi.

Tadqiqot maqsadi. Bolalarda sigmasimon ichagi limfa tugunlarining anatomo-topografik xususiyatlarini o‘rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Materallar 30 ta yangi tug’ulgan va emizikli yoshdagi chaqaloqlardan oshqozon-ichak limfa tizimidi kasalligi bilan kasallanmagan bolalar murdasidan sigmasimon ichagi olindi. Bunda preparatlar yangi tug‘ilgan chaqaloqlardan 10 ta, emizikli yoshdagi bolalardan 10 ta va erta bolalik davridagi bolalardan 10 ta bolalar murdasi. Gerota massasining yog’li eritmasini seroz ostidagi limfa tomirlariga yuborildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, sigmasimon ichakning limfa tugunlari a’zoning oldida sigmovid obodochka ichakning limfa tugunlari organ oldida (uning old yuzasida) va orqasida (orqa yuzasida) joylashgan bo‘lib, ular erkin mushak tasmasi yaqinida, salkincha o‘sishlar (appendikslar) ichida guruhlangan; shuningdek, erkin mushak tasmasi va ichakning brizheyka cheti orasida, brizheyka cheti yaqinida joylashgan. Sigmovid ichakning old yuzasida (erkin mushak tasmasi yaqinida) joylashgan limfa tugunlari yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda faqat 1 holatda, emizikli yoshdagi bolalarda 4 holatda, erta bolalik davridagi bolalarda esa 9 holatda aniqlangan. Erkin mushak tasmasi va brizheyka cheti orasida joylashgan limfa tugunlari yangi tug‘ilganlarda 1 preparatda, emizikli yoshdagilarda 3 ta, erta bolalik davridagilarda esa barcha 10 ta o‘rganilgan preparatda topilgan. Yangi tug‘ilganlarda erkin mushak tasmasi va brizheyka cheti orasidagi limfa tugunlari umuman topilmagan, emizikli yoshdagilarda 3 holatda, erta bolalik davridagilarda esa 9 holatda mavjud edi. Brizheyka cheti yaqinida joylashgan limfa tugunlari yangi tug‘ilganlarda 8 holatda, emizikli yoshdagilarda barcha o‘rganilgan preparatlarda, erta bolalik davridagilarda esa 6 holatda mavjud edi. Old yuzada erkin mushak tasmasi yaqinida joylashgan limfa tugunlari soni yangi tug‘ilganlarda 5 ta, emizikli yoshdagilarda 3 dan 8 tagacha (60% hollarda 4–6 ta), erta bolalik davridagilarda 1 dan 3 tagacha (52% hollarda 2–3 ta). Erkin mushak tasmasi va brizheyka cheti orasidagi tugunlar soni yangi tug‘ilganlarda 3 ta, emizikli yoshdagilarda 2 dan 5 tagacha (55% hollarda 3–4 ta), erta bolalik davridagilarda 1 dan 5 tagacha (64% hollarda 2–4 ta). Brizheyka cheti yaqinidagi limfa tugunlari soni quyidagicha o‘zgarib turadi: yangi tug‘ilganlarda 1 dan 7 tagacha (70% hollarda 3–5 ta), emizikli yoshdagilarda 1 dan 5 tagacha (59% hollarda 2–4 ta), erta bolalik davridagilarda 1 dan 6 tagacha (54% hollarda 2–5 ta).

Orqa yuzadagi limfa tugunlari soni (erkin mushak tasmasi yaqinida): yangi tug‘ilganlarda 2 ta, emizikli yoshdagilarda 3 dan 9 tagacha (64% hollarda 4–7 ta),

erta bolalik davridagilarda 3 dan 6 tagacha (55% hollarda 4–5 ta). Erkin mushak tasmasi va brizheyka cheti orasidagi tugunlar yangi tug‘ilganlarda umuman topilmagan. Emizikli yoshdagilarda ular soni 2 dan 3 tagacha, erta bolalik davridagilarda 1 dan 5 tagacha (57% hollarda 2–4 ta). Brizheyka cheti yaqinidagi tugunlar soni: yangi tug‘ilganlarda 1 dan 5 tagacha (57% hollarda 3–4 ta), emizikli yoshdagilarda 1 dan 7 tagacha (66% hollarda 3–4 ta), erta bolalik davridagilarda 4 dan 6 tagacha (68% hollarda 3–5 ta). Organ old va orqa yuzalarida aniqlangan limfa tomirlari soni yangi tug‘ilganlarda 2 dan 12 tagacha (ko‘pincha 4–8 ta), emizikli yoshdagilarda 2 dan 10 tagacha (ko‘pincha 3–7 ta), erta bolalik davridagilarda 2 dan 8 tagacha (ko‘pincha 3–6 ta) o‘zgarib turadi. Ularning diametri yangi tug‘ilganlarda 0,12 mm dan erta bolalik davridagilarda 0,17 mm gacha o‘zgaradi. Old va orqa yuzalardagi limfa tomirlari bir xil darajada quyidagi tugunlarga quyiladi: erkin mushak tasmasi yaqinidagi tugunlarga (15%), erkin mushak tasmasi va brizheyka cheti orasidagi tugunlarga (35%) hamda brizheyka cheti yaqinidagi tugunlarga (50%). Shu sababli limfa tomirlarining uzunligi ham har xil bo‘ladi (3 dan 10 mm gacha).

Xulosa. Sigmovid obodochka ichakning old va orqa yuzalaridagi turli joylashuvdagi limfa tugunlaridan 1–3 ta (ko‘pincha 1–2 ta) chiqaruvchi limfa tomirlari chiqadi, ularning uzunligi 3 dan 5 mm gacha (72% hollarda 3–4 mm), diametri esa 0,14 dan 0,17 mm gacha o‘zgarib turadi. 95% hollarda old va orqa yuzadagi tugunlarga keluvchi limfa tomirlari soni chiqaruvchi tomirlardan ko‘p bo‘lgan, 5% hollarda esa ular soni teng bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Mamataliyev A. R. HISTOTOPOGRAPHY OF THE PROSTATE GLAND IN THE RABBIT //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 319-321.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
4. Mamataliyev A. R., Sh R. S., Zohidova S. H. EKSPERIMENTAL JIGAR SIRROZI SHAROITIDA PASTKI PORTO KAVAL VENOZ TIZIMI MORFOLOGIYASINING ORGANILGANLIK DARAJASI //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – С. 1346-1350.
5. Маматалиев А.Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – с. 692-695.

Nazhimov Sh.R.
assistant-trainee
Propedeutics of Childhood Diseases
Daminov S.J.
3rd-year student
Pediatric Faculty
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

ON SOME HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ESOPHAGUS IN RATS UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS

Abstract: *The article studies the features of some histochemical reactions in the esophagus in rats under normal conditions and when exposed to a certain irritant. Histological sections were stained with hematoxylin and eosin and van Gieson. Neutral polysaccharides were detected using the PASS reaction (saliva amylase control), and acidic mucopolysaccharides were detected with toluidine blue (medium pH 3.2 and 7.4). Histological examination revealed that the thickening of the organ mucosa occurred mainly due to hyperplasia of cells of all layers of the stratified squamous epithelium.*

Keywords: *rats, esophagus, hematoxylin and eosin, van Gieson, mucopolysaccharides, basal layer, nucleoproteins.*

Introduction. Usually, two diseases of the esophagus lead to the formation of a group of patients requiring esophagoplasty (esophageal reconstruction): congenital developmental anomaly — atresia, and cicatricial stricture following a burn caused by ingestion of a corrosively acting chemical substance [1,2]. Reconstructive surgery of the esophagus currently remains one of the most complex areas of clinical surgery. This is due to the technical difficulties of surgical interventions, the high postoperative mortality rate, the large number of complications, and the low quality of life of operated patients [3]. In this regard, studying the functional state of the pre-epithelial mucous layer (supraepithelial mucus layer) of the gastrointestinal tract after various types of esophagoplasty may be promising for understanding the physiological role, conditions of formation and functioning of the mucous layer, for correcting emerging disorders, and for choosing the optimal method of esophageal replacement [4,5].

Aim of the study. We investigated the features of certain histochemical reactions in the esophagus of rats under normal conditions and under the influence of a specific irritant on it.

Materials and Methods. Twenty-five esophagi from rats that received 3,4-benzpyrene orally at a dose of 0.2 ml of 0.1% solution for a prolonged period were studied (experimental series). Another 25 rats served as the second, control group.

These animals were not subjected to any interventions. The material under study was fixed in Carnoy's fluid, Shabadash's fluid, and 12% neutral formalin. Histological sections were stained with hematoxylin-eosin and by the van Gieson method. Neutral polysaccharides were detected using the PAS reaction (control with salivary amylase), while acid mucopolysaccharides were revealed with toluidine blue (at pH 3.2 and 7.4 of the medium). Ribonucleic acid (RNA) and deoxyribonucleic acid (DNA) were studied by staining the sections with gallocyanin solution (control with 0.1% ribonuclease solution at 37°C for 1–3 hours). DNA was also detected using the Feulgen reaction. The content of DNA and RNA was determined by the cytophotometric method using the MUF-5 instrument. The amount of nucleic acids was calculated as the product of optical density and nuclear volume. Optical density was computed from curves obtained with the instrument's recording device. Nuclear volume was determined as the product of its two radii $(r_1 \times r_2)^2$. Nuclear radii were measured with an ocular micrometer.

Results. The conducted studies showed that after prolonged exposure to the carcinogen (after 150 days), the experimental series of rats exhibited focal dense thickenings of the esophageal mucosa of a whitish color, round or irregular in shape. Histological examination revealed that the thickening of the organ's mucous membrane occurred mainly due to hyperplasia of cells in all layers of the stratified squamous epithelium. Predominantly, the basal layer proliferated. Cells of the latter had irregular or polygonal shapes with large hyperchromatic nuclei. Elongated cells of the middle epithelial layers contained pale nuclei. Flat cells of the superficial epithelial layers lacked nuclei. Basal layer epithelial cells proliferated and formed cords and nests invading the underlying tissues of the mucous membrane. The latter were infiltrated by lymphocytes, histiocytes, and plasmocytes. Examination of neutral polysaccharides showed that PAS-positive material in the rat esophageal epithelium was distributed unevenly. It was present in large amounts in the superficial layers of hyperplastic epithelial areas, where cell cytoplasmstained violet-cherry with periodic acid-Schiff reagent. This specific staining disappeared after treatment of sections with amylase, indicating that the polysaccharide contained in the cells was glycogen. Glycogen granules were evenly distributed throughout the cell cytoplasm. In contrast, neutral polysaccharides were not detected in cells of other layers of the hyperplastic esophageal epithelium, nor in areas of the esophagus without epithelial hyperplasia. The noted features of neutral polysaccharide distribution in the esophageal epithelium are significant in light of the generally accepted view that glycogen serves as the primary energy reserve substance in cells. An increase in RNA content was observed in the cytoplasm of intensively dividing cells of the basal layer of hyperplastic esophageal epithelium and in its detached nests invading the underlying mucous membrane tissues, resulting in diffuse gray-blue staining of the cell cytoplasm. The nuclei of these cells also showed elevated DNA content. It is known that nucleoproteins, particularly RNA, accumulate and play a major role during intensive cell growth. A decrease in mitotic activity of cells is accompanied by a reduction in nucleoprotein content. In our experiments on rats exposed to the carcinogen, these characteristic patterns of

nucleoprotein distribution were clearly evident, as RNA and DNA were present in large amounts only in areas of enhanced cell growth. Thus, in normal epithelium of the esophagus, the amount of DNA was 3.81 ± 0.23, while in foci of its hyperplasia it was 4.18 ± 0.21 (an increase of 9.7%). For RNA, the corresponding values were 3.84 ± 0.32 and 4.72 ± 0.31 (an increase of 22.9%). The metachromasia reaction was not pronounced in either intact or hyperplastic epithelium, nor in the underlying connective tissue of the esophageal mucous membrane, indicating the absence of acid mucopolysaccharides in these structures.

Conclusion. Based on the conducted studies, it can be concluded that in foci of hyperplasia of the stratified squamous epithelium of the rat esophagus induced by carcinogen exposure, there was a significant increase in the content of RNA and DNA, with RNA increasing at a higher rate than DNA. At the same time, a significant increase in glycogen content was observed in the superficial layers of cells of the hyperplastic epithelium. No changes were detected in the content of acid mucopolysaccharides in the hyperplastic epithelium or in the underlying tissues of the rat esophageal mucous membrane.

References.

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Mamataliyev A. R. HISTOTOPOGRAPHY OF THE PROSTATE GLAND IN THE RABBIT //Экономика и социум. – 2025. – №. 2-1 (129). – С. 319-321.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
4. Mamataliyev A. R., Sh R. S., Zohidova S. H. EKSPERIMENTAL JIGAR SIRROZI SHAROITIDA PASTKI PORTO KAVAL VENOZ TIZIMI MORFOLOGIYASINING ORGANILGANLIK DARAJASI //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – С. 1346-1350.
5. Маматалиев А.Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – с. 692-695.

Pardayeva U.D.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
O‘zbekiston, Samarqand
ORCID: 0000-0002-2173-0550
Eshmurodov Sh. Sh.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti magistratura rezidenti
O‘zbekiston, Samarqand
ORCID: 0009-0003-9061-9519

SIL KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNING RUHIY-HISSIY HOLATI MASALASI YUZASIDAN

Annotatsiya. *Maqolamizda sil kasalligiga chalingan bemorlarda kuzatiladigan psixologik holatlar va unga ta’sir ko’rsatuvchi ijtimoiy faktorlar ko’rsatilgan. Tadqiqotimizning maqsadi sil bilan hastalangan bemorlarda psixoemostional holatlarni o’rganish va ularni bartaraf etish natijasida, davolanishga va tuzalib ketishga bo’lgan ishonchni oshirishdan iborat. Tadqiqot davomida bemorlarda himioterapiyaga bo’lgan sodiqlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadigan psixoemotsional o’zgarishlar bilan kechayotgan holatlar aniqlandi. O’tkazilgan tadqiqot natijasida erishilgan xulosa himioterapiyaning stastionar davrida psixologik adaptastiyani va ijtimoiy yo‘nalishdagi chora-tadbirlarni tatbiq qilish motivastiyani oshiradi, davolash natijalarini yaxshilanadi va sil kasalligi bilan kasallanish va o‘lim ko’rsatkichlarini kamayishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.*

Kalit so’zlar: *bemorlarning psixosotsial xususiyatlari, sil kasalligi, himioterapiyaga moyillik*

Pardayeva U.D.
Samarkand State Medical University
Samarkand, Republic of Uzbekistan
ORCID: 0000-0002-2173-0550
Eshmurodov Sh. Sh.
Master’s degree
Samarkand State Medical University
Samarkand, Republic of Uzbekistan
ORCID: 0009-0003-9061-9519

ON THE ISSUE OF THE PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL STATE OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS

Abstract. *Our article describes the psychological conditions experienced by patients with tuberculosis and the social factors influencing them. The purpose of our research is to study psychoemotional states in patients with tuberculosis and, as a result of their elimination, to increase confidence in treatment and recovery.*

During the study, cases of patients with psychoemotional changes that directly affect adherence to chemotherapy were identified. The conclusion made as a result of the conducted research is that the implementation of psychological adaptation and socially oriented measures in the stationary period of chemotherapy increases motivation, improves treatment outcomes, and positively affects the reduction of tuberculosis morbidity and mortality.

Keywords: *psychosocial characteristics of patients, tuberculosis, susceptibility to chemotherapy*

Kirish. Sil kasalligi dunyoda yetakchi yuqumli kasalliklardan biri bo‘lib, JSST chora-tadbirlariga qaramay, yuqori kasallanish va o‘lim darajasini saqlab qolmoqda. Davolashning samaradorligi nafaqat sxemani to‘g‘ri tanlashga, balki bemorlarning sodiqligiga ham bog‘liq. Bemorlarning psixologik xususiyatlari (xavotirning kuchayishi, depressiv holatlar, umidsizlik hissi, motivatsiyaning pasayishi), shuningdek, ijtimoiy omillar (kambag‘allik, stigma, tibbiy yordamdan foydalanishdagi qiyinchiliklar) terapiya natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi/ Infeksiya asab tizimiga toksik ta’sir ko‘rsatib, psixoemotsional buzilishlarni kuchaytirishi mumkin. Bemorlar ko‘pincha kasalxona sharoitlariga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishadi va tibbiy xodimlar bilan hamkorlik qilish uchun maqsadli psixologik qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirishni talab qilishadi. Alohida tadqiqotlar natijalariga qaramay, sil kasalligi bilan og‘rigan bemorning to‘liq psixosotsial portreti shakllanmagan va muammoni chuqur qayta ishlash va tahlil qilishni talab qiladi[4-5].

JSSTning 2024-yilgi tuberkulyoz bo‘yicha Global hisobotiga ko‘ra, har yili 10-11 millionga yaqin sil kasalligi yangi holatlari qayd etilmoqda, o‘lim ko‘rsatkichi esa yiliga 1,2 milliondan oshmoqda. (JSST Global TB hisoboti 2024) [1].

Sil kasalligining xavf omillari ijtimoiy sharoitlar - qashshoqlik, zich yashash, migratsiya, yetarli ma’lumotga ega bo‘lmaslik, stigmatizatsiya bilan chambarchas bog‘liq. Xuddi shu omillar bemorlarning ruhiy salomatligiga ta’sir qiladi. Ko‘pgina tadqiqotlar sil kasalligi bilan og‘rigan bemorlarda xavotirli va depressiv buzilishlarning yuqori tarqalganligini ko‘rsatadi. Masalan, Pachi et al. (2013) meta-tahliliga ko‘ra, sil kasalligi bilan og‘rigan bemorlarning taxminan 40-50 foizida depressiya, 30-40 foizida xavotirli buzilishlar aniqlanadi[2]. Uzoq muddatli davolanish, dorilarning nojo‘ya ta’siri, ijtimoiy izolyatsiya va stigma qo‘rquvi terapiyaga bo‘lgan motivatsiyani yanada pasaytiradi[3-5].

Tadqiqotning maqsadi. Bemorlarning ruhiy-ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganish, davolanishga sodiqlikni oshirish va natijani yaxshilash.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Samarqand viloyat ftiziatriya va pulmonologiya markazida davolanayotgan, o‘pka sili tasdiqlangan (shu jumladan, dori-darmonlarga sezgir va chidamli shakllari) 110 nafar bemorda o‘tkazildi.

Psixologik baholash:

- Bek depressiya shkalasi (BDI-II),
- Gamiltonning xavotir shkalasi,

• WHOQOL-BREF hayot sifati so‘rovnomasi,

• davolanishga motivatsiya so‘rovnomasi (moslashtirilgan variant).

Ijtimoiy xususiyatlar: yoshi, jinsi, ma’lumot darajasi, bandligi, oilaviy ahvoli, uy-joy sharoitlari, zararli odatlarning mavjudligi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash darajasi.

Tahlil usullari: tavsifiy statistika, psixoemotsional ko‘rsatkichlar va davolanishga sodiqlik o‘rtasidagi korrelyatsion tahlil; subyektiv muammolarni aniqlash uchun yarim rasmiylashtirilgan intervyular.

Natijalar. Quyidagi o‘zaro bog‘liq omillar va psixologik holatlar aniqlandi.

1. Psixologik profil:

• Bemorlarning 58 foizida xavotirning yuqori darajasi, 43 foizida esa klinik jihatdan ahamiyatli depressiya aniqlangan.

• 35% umidsizlik va vaziyat ustidan nazoratni yo‘qotish hissini qayd etishdi.

• Davolanishga bo‘lgan motivatsiyaning pasayishi - 40% respondentlarda, ko‘pincha uzoq muddatli kasallik va nojo‘ya ta’sirlar bilan.

2. Ijtimoiy omillar:

• 62%-ta’lim darajasining pastligi; 54%- ishsizlar; 48% - zichlik sharoitida yashaydi.

• 30%-tibbiy yordamdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan migrantlar.

• 45%-hamjamiyatda stigmatizatsiya va diskriminatsiya haqida xabar berishadi.

3. Korrelyatsiyalar:

• Depressiyaning yuqori darajasi dori-darmonlarni kamroq qabul qilish bilan bog‘liq ($r = -0,42$; $p < 0,05$).

• Oila va do‘stlarning qo‘llab-quvvatlashi motivatsiyaga ijobiy ta’sir ko‘rsatdi ($r = +0,37$; $p < 0,05$).

4. Sifatli ma’lumotlar:

• Bemorlar kasalxonaga moslashish qiyinligini, nojo‘ya ta’sirlardan qo‘rqishni, izolyatsiya hissini qayd etishdi.

• Psixolog, qo‘llab-quvvatlash guruhlari bilan muntazam suhbatlashish, kasallik haqida ko‘proq ma’lumot olish istagini bildirdilar.

Muhokama.

Olingan ma’lumotlar psixoemotsional buzilishlar va ijtimoiy zaiflik sil kasalligi bilan og‘rigan bemorlar orasida keng tarqalganligini va davolashga sodiqlikka bevosita ta’sir qilishini tasdiqlaydi. Bu xalqaro tadqiqotlar natijalariga mos keladi, bu yerda depressiya va xavotir silni davolashning yomon natijasining mustaqil prediktori hisoblanadi (Sweetland et al., 2017; Walker va boshqalar, 2020).

Kompleks yordam quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

• psixologik maslahat (individual va guruhli),

• o‘zini o‘zi boshqarish va stressni boshqarish ko‘nikmalarini o‘rgatish,

• ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni oshirish uchun oilalar bilan ishlash,

• kasallik, nojo‘ya ta’sirlar va davolash istiqbollari haqida manzilli xabardor qilish,

• ma’rifiy dasturlar orqali stigmani kamaytirish.

Silga qarshi kurash bo‘yicha milliy dasturlarga ruhiy-ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni kiritish statsionar davolanishning barcha bosqichlarida sil bilan kasallangan bemorlarni davolash samaradorligini oshirishi va hayot sifatini yaxshilashi mumkin.

Xulosalar.

1. Sil kasalligi bilan og‘rigan bemorlarning aksariyatida sezilarli xavotir-depressiv buzilishlar, motivatsiyaning pasayishi va moslashish qiyinchiliklari aniqlanadi.

2. Ijtimoiy zaiflik (kambag‘allik, ishsizlik, migratsiya, stigma) psixologik muammolarni kuchaytiradi va davolanishga sodiqlikni pasaytiradi.

3. Psixoemotsional holat va terapiyaga moyillik o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri bog‘liqlik mavjud.

4. Maqsadli psixosotsial qo‘llab-quvvatlash (psixolog, qo‘llab-quvvatlash guruhlari, ijtimoiy xizmatlar) tuberkulyoz bilan kasallangan bemorlarni boshqarishning ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Xotima. Sil kasalligi bilan og‘rigan bemorning yaxlit ruhiy-ijtimoiy qiyofasini shakllantirish muvaffaqiyatli davolanish yo‘lidagi asosiy to‘siqlarni aniqlash va individual qo‘llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Davolashning barcha bosqichlarida psixologik moslashuvni va ijtimoiy yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni kiritish sodiqlikni oshiradi, davolash natijalarini yaxshilaydi va sil kasalligi bilan kasallanish va o‘limni kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Pachi A, Bratis D, Moussas G, Tselebis A. Psychiatric morbidity and other factors affecting treatment adherence in pulmonary tuberculosis patients. Tuberc Res Treat. 2013;2013:489865. doi: 10.1155/2013/489865. Epub 2013 Apr 15. PMID: 23691305; PMCID: PMC3649695.

2. Pardaeva U.D. Aspects of modern pedagogical technologies at the stage of training a qualified medical specialist // Pedagogy and psychology of innovation, - 2019. - Ne, 7 (3), - Pp. 29-45. [In Russ],

3. Pardayeva U.D. Uzbekistan on the path of integration in the field of higher education into world society - in the context of globalization // Issues of science and education. - 2020. - Ne. 16 (100). - Pp. 36-41. [In Russ].

4. Pardayeva U.D. Kim AA Autulsyey AF Integration of whekinman's education] syvies sto glotal glohaliza- tion // Thewatics Jounal of Education — 2022

5. Pardaeva U.D. modicamentons comoction of hepatotoxic action of aatducersl proparsines is petits with wtropulmonary tuberosliosis Modem education sad devel opines Po 149-164 Vol 149-164 Vol 4 Ne 4 (2004) Modem oducation and developmen :hetps ily xaber lar war's ourmal ssue view 29

Rabbimova N.T., PhD
Assistant
Department of Infectious Diseases
Sony Arathi
5th-year student
International Faculty
Samarkand State Medical University
Uzbekistan

SURVEILLANCE OF THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. *Effective surveillance of infectious diseases is essential for early detection, prevention, and control of outbreaks. Traditional epidemiological methods, while reliable, are often limited by time delays, large volumes of data, and the complexity of disease dynamics. Artificial Intelligence (AI) offers innovative solutions for real-time monitoring, prediction, and analysis of infectious disease patterns. This review examines current applications of AI in epidemiological surveillance, including machine learning models for outbreak prediction, natural language processing for data extraction from unstructured sources, and AI-assisted geographic information systems for mapping disease spread. The integration of AI into infectious disease surveillance enhances the accuracy and timeliness of public health interventions. However, challenges such as data privacy, algorithm transparency, and model validation remain critical considerations. The article highlights the potential of AI to transform epidemiological surveillance and improve global health preparedness.*

Keywords: *infectious disease surveillance, epidemiology, artificial intelligence, machine learning, outbreak prediction, public health, disease mapping.*

Introduction. Surveillance of infectious diseases is a cornerstone of public health practice, enabling timely interventions to prevent epidemics and pandemics. With the increasing complexity and globalization of disease transmission, traditional surveillance systems face challenges in managing large datasets and predicting outbreaks [1]. Artificial Intelligence (AI) technologies provide promising tools for addressing these limitations.

Applications of AI in Infectious Disease Surveillance

Machine Learning for Outbreak Prediction. Machine learning algorithms can analyze historical and real-time epidemiological data to forecast potential outbreaks. Models such as random forests, neural networks, and support vector machines have been used to predict influenza, dengue, and COVID-19 trends [2,9]. These predictive tools allow health authorities to allocate resources efficiently and implement preventive measures.

Natural Language Processing (NLP). NLP enables extraction of epidemiologically relevant information from unstructured text sources such as news reports, social media, and scientific publications. This accelerates early warning detection and provides insights into emerging infectious threats [3,7,8].

AI-Assisted Geographic Information Systems (GIS).

Integration of AI with GIS supports spatial analysis of disease spread, identifying hotspots, and visualizing risk areas. AI algorithms can process satellite imagery, population density data, and mobility patterns to enhance situational awareness [4,10,13].

Advantages and Limitations

Advantages:

Real-time data processing and early outbreak detection

Enhanced predictive accuracy compared to traditional statistical models

Ability to analyze large, complex datasets from multiple sources

Limitations:

Data privacy and ethical concerns

Requirement for high-quality and standardized data

Need for algorithm transparency and model validation [5,11,12]

Conclusion. Artificial Intelligence represents a transformative approach to infectious disease surveillance, improving the timeliness and accuracy of outbreak detection and response. Machine learning, NLP, and AI-assisted GIS tools provide powerful solutions for managing complex epidemiological data. Integration of AI into public health systems, accompanied by ethical and methodological safeguards, has the potential to strengthen global disease monitoring and preparedness.

References:

1.Chretien JP, George D, Shaman J, et al. Influenza forecasting in human populations: a scoping review. PLoS One. 2014;9(4):e94130.

2.Yang W, Karspeck A, Shaman J. Comparison of filtering methods for the modeling and retrospective forecasting of influenza epidemics. PLoS Comput Biol. 2014;10(4):e1003583.

3.Velardi P, et al. Mining social media data for public health surveillance: a review. J Biomed Inform. 2020;108:103503.

4.Gardner LM, Fajardo D, Waller ST, et al. A predictive spatial model to quantify the risk of air-travel-associated dengue importation into the United States and Europe. J Trop Med. 2012;2012:103679.

5.Adibi S, et al. Artificial intelligence in public health surveillance: challenges and opportunities. Public Health Rev. 2021;42:1604033.

6.Nguyen N, et al. Machine learning for infectious disease surveillance: systematic review. J Infect. 2022;84(6):745–758.

9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.

10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
12. Delkasheva S. D. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBESITY: CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chronic-obstructive-pulmonary-disease-and-obesity-clinical-and-social-aspects (дата обращения: 12.02.2026).
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1182-1185
УДК 616.34-008.14-053.2

Rasulova S.Kh., PhD
associate professor
Department of Pediatrics No. 2
Bukhara State Medical Institute
https://orcid.org/0000-0001-7431-2961

PEDIATRIC ASPECTS OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Abstract. *This review article presents the etiological factors and pathogenetic mechanisms underlying the development of irritable bowel syndrome in children, the most common functional gastrointestinal disorder. The authors summarize and systematize data from international researchers and modern meta-analyses exploring the pediatric aspects of irritable bowel syndrome.*

Key words: *Functional gastrointestinal disorders, gastrointestinal tract, IBS, children, abdominal pain, bowel disorder.*

Introduction. Currently, irritable bowel syndrome (IBS) is a functional intestinal disorder, which is based on the interaction of two main pathogenetic mechanisms: psychosocial impact and sensorimotor dysfunction, i.e., disturbances of visceral sensitivity and motor activity [14].

IBS remains one of the most common functional disorders associated with the gastrointestinal tract (GIT) in pediatric patients today [15]. In May 2016, the global gastroenterological community became acquainted with the Rome IV criteria at the American Gastroenterology Week; the main provisions of the consensus have already been published [5].

The etiopathogenesis of IBS is very complex and remains incompletely understood. The concept of disease development clearly involves not one, but several etiological factors, triggering not one, but several pathophysiological mechanisms. The complexity of treating such patients lies in the fact that the combination of etiopathogenetic mechanisms varies individually in each case. Among these, the following are particularly relevant today: socioeconomic status, genetic predisposition, the possibility of the disease developing in a child by parents suffering from IBS, psychological aspects, visceral hypersensitivity, gastrointestinal motility disorders, changes in the neuroendocrine system (brain-gut axis), low-grade inflammation, the concept of post-infectious IBS, microbiota imbalance, and, finally, nutritional factors, a detailed description of which can be found in our latest methodological manual [13].

The leading role in the development of IBS is attributed to psychoemotional stress and the instability of children's central nervous systems to traumatic

influences. It is recognized that, in modern conditions, IBS is a biopsychosocial functional pathology, as the most severe forms of IBS are observed in children who have experienced mental and social upheaval [2].

Personality characteristics play a significant role in the development of IBS: children with IBS are characterized by poor adaptation to new life situations (first visits to kindergarten and school), dependence on parents, impulsive behavior, and a tendency toward neurotic reactions and phobic disorders. Moreover, the objective state of IBS patients usually does not correspond to the severity of their complaints, but correlates with their psychological characteristics [4, 11, 17].

Changes in intestinal motility in IBS with constipation are characterized by hypersegmental hyperkinesis (hypersegmental hyperkinesis) observed in 52% of patients, leading to prolonged retention of contents in certain segments of the intestine and slowed transit. Dystonic hypo- or akinesis (dystonic hypokinesis or akinesis) is observed in 36% of cases, caused by disturbances in intestinal wall tone and a sharp decrease in intestinal motility. Antiperistaltic hyperkinesis is found in 12% of patients [6].

The fact that IBS is often detected in children is probably associated with the immaturity of their adaptive mechanisms and the gradual development of the functions of all organs and systems, including the gastrointestinal tract [12].

From a pathophysiological perspective, the 2016 Rome Criteria formulate a paradigm for the pathogenesis of functional gastrointestinal disorders (FGIDs) as a consequence of stress exposure with disruptions in communication along the brain-gut axis, including at the level of immune regulation. The brain-gut axis is a bidirectional, extensive communication network that, through neuroimmune-endocrine mediators, monitors and integrates intestinal functions, connects emotional and cognitive centers with intestinal mechanisms, and coordinates local adaptive responses to stress factors of any kind. Visceral afferent inputs, in turn, are perceived by the brain and influence pain perception, mood, and behavior [1, 5, 16].

A hereditary predisposition to IBS has been identified in 57% of cases. In the remaining 43% of cases, the influence of external factors is solely responsible. Sensitizing factors in IBS include:

1. history of acute intestinal infections;
2. social factor (unfavorable social environment);
3. sexual harassment;
4. physical overexertion;
5. loss of loved ones (two, one parent or close relative);
6. Divorce (for children and women). Other factors (lack of fiber in the diet, physical inactivity, smoking) play a minor role in the development of IBS.

Splenic flexure syndrome is the most common complication in IBS. It is characterized by complaints of discomfort (distension, pressure, fullness) in the left hypochondrium, occasional pain in the left chest, upper left shoulder, and left side of the neck (simulating angina). These symptoms may be accompanied by palpitations, shortness of breath, and, rarely, a feeling of suffocation and fear. Pain is usually associated with large meals, defecation, emotional factors, and physical

exertion. Factors contributing to the development of splenic flexure syndrome include poor posture and wearing tight clothing. Percussion of the left hypochondrium reveals marked tympanitis, and palpation reveals moderate sensitivity [10].

Hepatic flexure syndrome. Rare. Characterized by complaints of fullness or pressure in the right upper quadrant (simulating biliary tract pathology). Pain may radiate to the epigastric region, mid-chest, and, rarely, to the right shoulder or back. Pain intensity may fluctuate over time. Cecum syndrome. Common and characterized by complaints of pain (a feeling of fullness and heaviness) in the right iliac region radiating to the right lateral abdomen (simulating appendicitis). Palpation of the cecum may cause discomfort. Loosening the waist belt and massaging the area of the cecum projection brings some relief.

In recent years, significant advances have been made in uncovering the pathogenetic mechanisms of this disease, its diagnosis, and treatment. However, a number of unresolved issues remain, and improvements to existing differentiated treatment regimens remain relevant. The pathogenesis of this functional disorder, along with impaired motility, visceral sensitivity of the intestine, and the host immune response, is underpinned by changes in the composition of the microflora, which require correction. Intestinal dysbiosis is accompanied by the development of symptoms of intestinal dyspepsia (constipation, diarrhea, flatulence, pain, discomfort, a feeling of fullness or heaviness in the abdomen), which are present in IBS. Manifestations of indigestion syndrome (steatorrhea, amylorrhea, creatorrhea) are common, and asthenovegetative syndrome may develop [8, 9, 19].

Visceral abdominal pain syndrome is the leading clinical symptom in children with IBS. Chronic pain is often observed, causing distress and reducing quality of life. It is believed that visceral hyperalgesia in patients with IBS is caused by peripheral stimuli (such as intestinal wall distension) overstimulating a larger number of spinal neurons than normal, resulting in pain. Characteristically, pain in IBS is not clearly localized, but tends to migrate, with variations in radiation patterns and intensity.

Pain associated with IBS is characterized by lability: burning sensations alternate with pulling, spasmodic, or stabbing pain, accompanied by sudden, repeated urges to defecate even when eating a small amount of food [3, 7].

Currently, great progress has been made both in the diagnosis and substantiation of IBS, and in the development of a fairly wide range of treatment methods aimed at all pathogenetic mechanisms of this gastrointestinal disease [18].

Conclusion. Thus, a cascade of neuroimmune-endocrine mediators monitors and integrates intestinal functions, coordinates local adaptive responses to stress factors, thereby causing abdominal pain and discomfort. Visceral hyperalgesia in children is caused by peripheral stimuli (such as intestinal wall distension) overstimulating a larger number of spinal neurons than normal, resulting in pain. Children with IBS are characterized by poor social adaptation and dependence on parents, impulsive behavior, and a tendency toward neurotic reactions and phobic disorders.

REFERENCES

1. Drossman DA // Gastroenterology. - 2016. - Vol.150, N6. - P.1262-1279. 5. Butorova LI, Tokmulina GM, Plavnik TE, et al. // Lech. doctor. - 2017. - No.3. - P.61-67.
2. Drossman DA The Functional Gastrointestinal Disorders and the Rome III Process. Gastroenterology. 2006; 130(5):1377–90.
3. Elsenbruch S. abdominal pain in Irritable Bowel Syndrome: a review of putative psychological, neural and neuro-immune mechanisms. brain behav. immun. 2011; 25 (3): 386–94.
4. Kridler J., Kamat D. Irritable bowel syndrome: A Review for general pediatricians. Pediatr. Ann. 2016; 45(1):e30–3.
5. Lacy BE, Fermín Mearin, Lin Chang et al. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016; 150:1393–407.
6. Mosińska P., Salaga M., Fichna J. Novel investigational drugs for constipation-predominant irritable bowel syndrome: a review. Expert. Opin. Investig. Drugs. 2016; 25(3):275–86
7. Rasulova SX. Current Opinions on Etiopathogenesis, Clinical Picture, Diagnosis and Treatment of Irritable Bowel Syndrome. European journal of life safety and stability (ejlss) ISSN 2660-9630 Volume 13, 2022 http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/408
8. Belousova O. Yu. Algorithm for prescribing probiotics to children / O. Yu. Belousova // Health of Ukraine. - 2015. - No. 3 (34). - P. 10-11.
9. Diagnostics and tactics of management of children with functional constipation / A.I. Khavkin, R.A. Fayzullina, S.V. Belmer [et al.] // Issues of practical pediatrics. - 2014. - Vol. 9, No. 5. - P. 62-76.
10. Zaryankina A. I., & L. V. Krivitskaya (2005). Irritable bowel syndrome. Problems of health and ecology, (2 (4)), 73-78.
11. Ivashkin V.T., Shelygin Yu.A., Baranskaya E.K., Belousova E.A., Vasiliev S.V., Golovenko O.V., et al. Clinical guidelines of the Russian Gastroenterological Association and the Association of Proctologists of Russia for diagnosis and treatment of patients with irritable bowel syndrome. Russ. J. Gastroenterol., Hepatol., Coloproctol. 2014; 24 (2): 2–101.
12. Lagunova N.V., Marchukova A.Yu., & Lebedeva T.N. (2015). Adaptive and adaptive reactions in children with irritable bowel syndrome. Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine, 5 (2 (18)), 39-41.
13. Maev I.V., Cheremushkin S.V., Yu.A. Kucheryavy. Irritable bowel syndrome. Rome criteria IV. On the role of visceral hypersensitivity and methods of its correction. Methodological manual. Moscow, 2016.
14. Myazin R.G. (2016). Irritable bowel syndrome: from diagnosis to treatment. Medical Council, (9), 130-133.
15. Nizhevich A.A., Gimazetdinova R.Sh., Yakupova G.M., Tuigunov M.M., & Valiulina A.Ya. (2018). Irritable bowel syndrome in children and adolescents: clinical presentation and family risk factors. Practical Medicine, 16 (2), 57-61.

УДК: 61.616.31

Shirinova Kh. Kh., Doctor of Philosophy in medical sciences
senior lecturer
department of therapeutic dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan
https://orcid.org/0000-0002-1167-9261

TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN OVERWEIGHT PATIENTS USING MODERN METHODS

Abstract: *The relevance of studying the impact of excess body weight on periodontal health is beyond doubt in light of the increasing number of obese patients, which the World Health Organization calls a global epidemic. This article analyzes methods of effective treatment of chronic generalized periodontitis against the background of somatic diseases.*

Aim. *The aim of this study is to improve the prevention and comprehensive treatment of changes in periodontal tissues caused by excess body weight.*

Materials and Methods. *The study involved 124 patients aged 25 to 55 with chronic generalized periodontal disease (CGP) and 30 healthy controls who sought treatment at the Scientific and Practical Dentistry Center at the Bukhara State Medical Institute. Based on the study's objectives, the 154 patients were divided into three groups based on the type of local therapy. The condition of periodontal tissues was assessed using clinical (determination of periodontal pocket depth; indices: Fedorova-Volodkina hygiene, PMA, PBI, CPITN) and paraclinical (orthopantomography) examinations. Methods. The data obtained were statistically processed.*

Results. *It was decided to conduct studies three and six months after treatment to evaluate the long-term effectiveness of the treatment method and determine the stability of the results achieved. As a result of treatment, positive dynamics of improvement in the condition of the periodontium were observed in the main and control groups.*

Conclusion. *A comprehensive prevention and treatment regimen was developed that allowed for the timely prevention of possible complications caused by the disease and increased the effectiveness of treatment by 19.82%, resulting in a shorter treatment duration, a lower risk of disease relapse, and an increased period of remission.*

Keywords: *periodontitis, overweight, obesity, metabolic syndrome, dyslipidemia.*

Introduction

The relevance of studying the impact of excess body weight on periodontal health is beyond doubt in light of the increasing number of obese patients, which the World Health Organization calls a global epidemic. Today, more than 39% of the adult population is overweight, which has a significant impact on the deterioration of the oral health, in particular the periodontium. [1,3,6] The need to develop new therapeutic approaches that take into account the specifics of the treatment of chronic generalized periodontitis (CGP) in obese patients is an important task in modern dentistry. Research shows that being overweight is not only a risk factor, but also increases the inflammatory response in periodontal tissues, leading to the rapid development of diseases. [2,5,8] In such conditions, traditional treatment methods such as mechanical cleaning and local application of antiseptics are usually not effective enough. Therefore, in global dentistry, comprehensive approaches to the treatment of chronic generalized periodontitis are being actively developed, including the use of laser therapy, chlorhexidine-based drugs and other modern methods [4,7].

The aim of this study is to improve the prevention and comprehensive treatment of changes in periodontal tissues caused by excess body weight.

Materials and Methods

The object of the study were 124 patients aged 25 to 55 years with chronic generalized periodontal disease and 30 practically healthy people who applied to the scientific and practical dental center at the Bukhara State Medical Institute. Based on the objectives of the study, 154 people were divided into three groups depending on the type of local therapy. The main group included 65 overweight patients with chronic generalized periodontitis, who were further divided into two subgroups: Subgroup A (32 patients) received standard treatment, and subgroup B (33 patients) received complex treatment using the new algorithm. The comparison group included 59 patients with chronic generalized periodontitis of normal body weight who received standard therapy. The control group consisted of 30 people and received recommendations only on oral hygiene. In the main group, subgroup B (33 patients) received combination treatment, including oral hygiene using Elugel gel and low-intensity laser therapy, and after each meal it was recommended to rinse the mouth with calendula tincture to prevent inflammation. In consultation with the therapist and endocrinologist, a general treatment was prescribed: one tablet of the antioxidant drug Fersikard, which improves blood circulation and lowers cholesterol, once a day for a month, and one tablet of Biocalcium, once a day for 30 days, to increase bone density and reduce resorption. In patients of subgroup A of the main group and the control group, standard local treatment was used, followed by oral hygiene using Holisal gel and Eludril Care antibacterial mouthwash. The condition of periodontal tissues was assessed using clinical (determination of periodontal pocket depth; indices: Fedorova-Volodkina hygiene, PMA, PBI, CPITN) and paraclinical (orthopantomography) examinations. Methods. The data obtained were statistically processed.

Results

It was decided to conduct studies three and six months after treatment to evaluate the long-term effectiveness of the treatment method and determine the stability of the results achieved. As a result of treatment, positive dynamics of improvement in the condition of the periodontium were observed in the main and control groups. It should be noted that periodontal health indicators improved in subgroup A of the main group, consisting of overweight individuals receiving standard treatment, but did not reach the values observed in the control group with normal weight. Thus, in patients of subgroup A of the main group, the PMA index decreased from 3.5±0.4 to 2.2±0.3, the PBI index from 3.2±0.4 to 2.4±0.5, and the OHI-S index improved from 2.9±0.3 to 2.0±0.5. In patients of the control group without excess body weight, these indicators improved to 2.0±0.2, 2.1±0.2 and 1.8±0.1, respectively. These data show that standard treatment is less effective in treating overweight patients, indicating the need for a more individualized approach to treating this patient group. It should be noted that good results were observed in subgroup B of the main group, which received complex treatment. The PMA index improved to 1.8±0.3, the PBI index to 2.0±0.3, and the OHI-S index to 1.7±0.2. An improvement in periodontal condition and a higher level of oral hygiene were noted compared to subgroup A, which highlights the benefits of a comprehensive approach to the treatment of chronic generalized periodontitis in overweight patients.

In the control group, which did not receive treatment, stability of the indicators was observed, which indicates the absence of dynamics in the condition of the periodontium. The PMA and PBI indices remained at the level of 1.2±0.1 and 1.4±0.2, respectively, and the OHI-S index remained at the level of 1.8±0.2.

Six months after completion of treatment, periodontal health in patients in each group showed varying changes. In subgroup B of the main group, which received comprehensive treatment, the indicators remained consistently good. PMA, PBI, and OHI-S scores remained unchanged, indicating that the combined treatment contributed to the consolidation of positive changes over time. Statistical significance was $p < 0.005$. (Table 1)

Table 1

PMA, PBI, and OHI-S scores before treatment and 6 months after treatment in all groups.

Group		PMA index before treatment	PMA index after 6 months	PBI index before treatment	PBI index after 6 months	OHI-S index before treatment	OHI-S index after 6 months
Main group (n=65)	A	3,5±0,4	2,9±0,4	3,2±0,4	3,1±0,6	2,9±0,3	2,6±0,6
	B	3,5±0,4	1,9±0,3*	3,2±0,4*	2,1±0,3	2,9±0,3*	1,8±0,2
Comparison group (n=59)		2,8±0,3	2,2±0,2	2,6±0,3	2,3±0,2	2,4±0,2	2,0±0,1
Control group (n=30)		1,2±0,1	1,3±0,1	1,4±0,2	1,5±0,2	1,8±0,2	1,9±0,2

*Note: * - indicates statistical significance of differences between the main subgroup B, subgroup A and the control group (p<0.005).*

In subgroup A, PMA, PBI, and OHI-S values increased again, which is likely due to the lack of long-term effect of standard treatment, especially in overweight patients. In the control group, despite initial improvements, a decline in scores to previous levels was also observed. In the untreated group, the results remained unchanged. In subgroup A of the main group, 33.3% of patients had a pathological pocket size of 4 mm, 53.3% had a pocket size of 4 to 6 mm, and 13.3% had a pocket size of more than 6 mm. After treatment, the percentage of patients with a pocket size of less than 4 mm increased to 49.1%, decreased from 4 to 6 mm to 31%, and decreased to 0% for pockets of more than 6 mm. This demonstrates a significant improvement in periodontal condition, but the results in subgroup B were even better, underscoring the effectiveness of the comprehensive treatment. In subgroup B, 31% of patients had a periodontal size of less than 4 mm before treatment, 51% had a periodontal size of 4 to 6 mm, and 18% had a periodontal size of more than 6 mm. After treatment, 64.4% of patients had a pancreatic duct size of less than 4 mm, 23.7% had a size between 4 and 6 mm, and no patient had a pancreatic duct size greater than 6 mm. In the control group, before treatment, 49.1% of patients had a pancreatic duct size of less than 4 mm, 31% had a size between 4 and 6 mm, and 19.6% had a size greater than 6 mm. After treatment, the PC size was less than 4 mm in 53.9% of patients, between 4 and 6 mm in 39.1%, and more than 6 mm in 7.1%. The calculated statistical parameters confirm the differences between the main and comparison groups, as well as the control group ($p < 0.05$). Positive changes were observed in the study group after treatment. Biochemical and microbiological analyses were performed after treatment to assess treatment effectiveness (Table 2).

Table 2

Dynamics of biochemical parameters in overweight patients with chronic generalized hypertension during treatment.

Group		CRP ng/ml	transferrin ng/ml	osteocalcin, ng/ml	Vit D, ng/ml
Before treatment		1,45±2,13	1,63±0,31	12,5±2,5	18,6±4,2
Traditional treatment (main group A) n=32	10 days	1,32±1,88	1,65±0,44	12,4±2,5	18,6±4,2
	3 months.	1,23±1,63	1,66±0,32	12,3±0,63	18,2±4,01
	6 months	1,23±1,21*	1,7±0,24*	12,6±0,69	18,8±4,12*
Complex treatment (main group B) n=33	10 days	1,01±1,01*	1,72±0,21*	13,4±1,01*	21,3±3,01*
	3 months	0,8±0,77*	2,13±0,14*	14,2±0,98*	22,02±2,11*
	6 months	0,7±0,63*	2,33±0,21*	14,56±1,12*	24,6±0,62*

*Note: * - level of significance of differences compared to the group before treatment (P<0.05).*

In the main group of patients, biochemical parameters improved after preventive measures and complex treatment. In the main group, the average C-reactive protein level before treatment was 1.45±2.13, and after 6 months of treatment - 0.7±0.63; the transferrin level increased from 1.63±0.31 to 2.33±0.21; the osteocalcin level - from 12.5±2.5 to 14.56±1.12; the vitamin D level improved from 18.6±4.2 to 24.6±0.62. As can be seen, the use of complex treatment and preventive measures has made it possible to increase the effectiveness of treatment and prevention in overweight patients.

Discussion

The present study demonstrates that the scientific significance of the study's results is based on the unsatisfactory results of the PMA, OHI-S, and PBI indices in overweight patients, as well as their direct correlation with an increased amount of pathogenic oral microflora due to excess body weight and a high prevalence of severe periodontitis.

Biochemical analysis provides evidence that excess body weight influences the severity of periodontal disease, and the importance of studying biomarkers such as osteocalcin and vitamin D, which enable the early detection and prevention of potential complications caused by periodontal disease. The effectiveness of rinsing the mouth with calendula tincture is based on the positive dental and bacteriological efficacy of the combined use of an antiseptic and low-level laser therapy.

Conclusion

A comprehensive prevention and treatment regimen was developed that enabled the timely prevention of potential complications caused by the disease and increased treatment effectiveness by 19.82%, resulting in a shorter treatment duration, a lower risk of disease relapse, and an increased period of remission.

References

1. Ермолаева Л.А., Шишкин А.Н., Шевелева Н.А., Шевелева М.А., Пеньковой Е.А. Денситометрия как маркер раннего развития патологии пародонта //Стоматологический научно-образовательный журнал/ -2014. - №1/2. - 6-9 с.
2. Andriankaja O.M., Sreenivasa S., Dunford R., De Nardin E. Association beteen metabolic syndrome and periodontal disease // Aust Dent J./ - 2010, 55:252-259.

3. Suvan J., D'Aiuto F., Moles D.R., Petrie A., Donos N. Association between overweight/obesity and periodontitis in adults. A systematic review// Obesity Reviews, 2011, p. 381–404.
4. Nokhbehsaim M., Keser S., Vilas Boas A., Jäger A., Jepsen S., Cirelli J.A., Bourauel C. Leptin Effects on the Regenerative Capacity of Human Periodontal Cells// International Journal of Endocrinology / - № 3. - 2014.
5. Shirinova, H. H., & Khabibova, N. N. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CLINICAL EFFICACY OF VARIOUS METHODS OF COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN OVERWEIGHT PATIENTS.*Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS)*, *4*(3).
6. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova. (2021). CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES UNDER THE INFLUENCE OF OVER BODY WEIGHT AND METHODS FOR PREVENTING THEIR COMPLICATIONS. E-Conference Globe, 213-216.
7. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova, UK Fazilova. (2021). METHODS OF TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN STUDENTS OF THE CITY OF BUKHARA. E-Conference Globe, 201-204.
8. Kh, S. K., Khabibova, N. N., & Fazilova, U. K. (2021). Improvement Of Measures For Prevention And Treatment Of Periodontal Diseases In Students. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, *27*(2), 16-20.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1192-1197

Turdiev M. R.
https://orcid.org/0000-0002-4847-6628
associate professor
Department of Pathological Anatomy and Pathological Physiology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina,
Bukhara, Uzbekistan
Sokhibova Z. R.
https://orcid.org/0000-0002-0426-4367
associate professor
Department of Oncology and Clinical Radiology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina
Bukhara, Uzbekistan

AGE-RELATED MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF THE THYMUS IN WHITE RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL ALIMENTARY ZINC DEFICIENCY

Abstract. *This article presents data from a comparative analysis of morphofunctional changes occurring in the thymus of white rats at different age periods under conditions of experimental alimentary zinc (Zn) deficiency. During the experiment, dynamic changes in the lymphoid structures of the thymus, the degree of thymocyte differentiation, the cortico-medullary ratio, as well as the response of stromal elements were assessed morphometrically. Disturbances of the parenchymal–stromal balance of the thymus, changes in morphometric parameters of lymphoid tissue, a decrease in the number of lymphoid cells, as well as thickening of the vessel walls of the organ and a reduction of their internal diameter were established. The obtained results reflect the important role of zinc in maintaining immune homeostasis and create a scientific basis for a deeper understanding of the immunopathological mechanisms of microelement deficiencies.*

Keywords: *zinc deficiency, thymus, white rat, T lymphocytes, immune system.*

Relevance. The immune system ensures the adaptation of the organism to the effects of various damaging factors and provides its protection. Immunocompetent organs play an important role in maintaining the immunological homeostasis of the organism under experimental and clinical conditions [1]. The thymus is one of the most important organs responsible for maintaining the immune status of the organism and protecting it from aging processes and the development of diseases. The size, architecture, and functions of this gland change with age [7, 10].

Various chemical elements, particularly trace elements, are of great importance for maintaining physiological activity and overall health. Trace elements are necessary to ensure the processes of growth, development, reproduction, lactation, hematopoiesis, and other vital processes. The activity of the

immune system depends on their content in the organism. Trace elements ensure mineral metabolism and participate in the regulation of all types of metabolic processes [8].

According to many specialists, human health is determined by the nature of the food products consumed. Among alimentary factors that are of great importance for the preservation of health, life expectancy, and quality of life, trace elements occupy one of the leading positions [4, 5, 9].

Zinc is a trace element essential for all living organisms and is involved in numerous biochemical processes occurring in cells [2, 6, 11, 13, 14]. Zinc participates in the formation of the antioxidant potential of cells during immune reactions and is an important element for the functioning of T and B lymphocytes [3]. Normal Zn levels ensure the implementation of the Th1 response and the maintenance of the integrity of mucous membranes. Additional zinc intake activates cellular components of innate immunity and antibody production. This trace element exhibits antioxidant activity and exerts a protective effect against oxidative stress [12].

Aim of the study. To assess the morphofunctional features of the thymus of white rats at different age periods under conditions of experimental alimentary zinc deficiency.

Materials and Methods. The study was conducted on 80 outbred white male rats. During the experiment, ethical standards for the use of animals and the requirements of the Helsinki Declaration were observed. The rats were kept under standard vivarium conditions. The age, sex, body weight, type of diet, and housing conditions of the laboratory animals met the requirements of the experiment. To determine the morphofunctional parameters of the thymus structure, two groups of animals were formed: Group I — control (n = 40); Group II — rats receiving a diet with magnesium deficiency (n = 40). To model microelement deficiency, a specialized feed manufactured by ALTROMIN Spezialfutter GmbH & Co. KG (Germany) was used. The feeds were provided with an official certificate No. 36/2024. Animals of the control group were fed a standard diet twice daily. In the experimental group, the specialized feed was administered at a dose of 20 g, taking body weight into account, twice daily.

Animals of the control and experimental groups were withdrawn from the experiment and subjected to decapitation under ether anesthesia. After opening the thoracic cavity, the thymus was isolated. Fragments of thymic tissue were fixed in 10% neutral buffered formalin, after which they were washed in running water for 2–4 hours and dehydrated in alcohols of increasing concentration and chloroform; subsequently, paraffin blocks were prepared according to standard methods. Paraffin sections 4–6 μm thick were stained with hematoxylin and eosin, as well as by the Van Gieson method. Structural elements of the thymus were subjected to morphometric examination using an ocular micrometer. The relative area of thymic lobules, the cortical and medullary layers (in relation to the total section area), the thickness of the cortical layer, as well as the thickness of vessel walls and their

internal diameter were determined. Measurements were performed in five randomly selected fields of view of each histological section.

To study the cellular composition of the lymphoid structures of the thymus, cell counting was performed in its structural compartments (the subcapsular zone, cortical layer, and medulla) under oil immersion using a **NOVEL Model NLCD-307** microscope (China). Cell counts were carried out using a morphometric grid installed in the microscope eyepiece.

Morphological and morphometric data obtained during the study were subjected to mathematical processing on a Pentium IV personal computer using the Microsoft Office Excel 7.0 software package. Standard deviation and standard errors were determined.

Variation series of numerical data were formed, arithmetic mean values, mean error, coefficient of variation, as well as the percentage deviation of parameters from control values were calculated. The statistical significance of differences relative to the control was assessed using a parametric method—the Student's *t*-test for two independent samples (with normal data distribution). Differences were considered statistically significant at $p \leq 0.05$. During the organization and conduct of the study, the principles of evidence-based medicine were observed.

Results and Discussion. The thymus of laboratory animals in the control group consisted of two interconnected lobes and was located in the lower third of the manubrium of the sternum. The thickness of the capsule in the region of the thymic hilum in healthy outbred white rats aged 6 and 9 months was 5.82 ± 0.32 μm and 5.97 ± 0.38 μm, respectively. The diameter of the trabeculae in the proximal part was 13.36 ± 0.27 μm and 13.52 ± 0.22 μm, while in the distal part it was 10.28 ± 0.14 μm and 10.43 ± 0.22 μm. The area of thymic lobules in the corresponding age periods amounted to 64.27 ± 0.12% and 52.27 ± 0.48%.

In outbred white rats of the zinc-deficient group, the thickness of the thymic capsule in the hilum region, compared with the control group values, increased by 1.07-fold at 6 months of age and by 1.08-fold at 9 months of age. The diameter of the proximal and distal parts of the trabeculae in both age groups increased by 6.5% and 7.3%, respectively. The area of thymic lobules decreased by 1.07-fold in 6-month-old animals and by 1.08-fold in 9-month-old animals.

In histological specimens of the thymus of healthy outbred white rats, the cortical and medullary layers are distinguished. The boundary between the cortical and medullary layers is indistinct. Areas partially replaced by adipose tissue are identified in the parenchyma. In control group animals aged 6 and 9 months, the area of the cortical layer of the thymus was 63.86 ± 0.37% and 58.83 ± 0.26%, respectively, while the area of the medullary layer was 28.52 ± 0.38% and 32.92 ± 0.42%. The cortico-medullary index in the corresponding age periods was 2.24 ± 0.16 and 1.78 ± 0.36. The thickness of the cortical layer was 248.27 ± 11.54 μm in 6-month-old animals and 165.27 ± 9.76 μm in 9-month-old animals.

In outbred white rats of the zinc-deficient group, the area of the cortical layer of the thymus, compared with intact animals, decreased by 7.6% at 6 months of age and by 8.3% at 9 months of age. The area of the medullary layer in both age groups

decreased by 1.07-fold. The cortico-medullary index also decreased in both age periods. The thickness of the cortical layer, compared with healthy white rats, decreased by 1.07-fold in 6-month-old animals and by 1.08-fold in 9-month-old animals.

Analysis of the population composition of T lymphocytes in the thymus of healthy laboratory animals aged 6 months showed that in the subcapsular zone of the cortical layer, the proportion of small lymphocytes was 38.42 ± 0.58%, in the cortical zone — 64.78 ± 0.44%, and in the medullary layer — 34.28 ± 0.17%. The proportion of medium-sized lymphocytes in the subcapsular zone of the cortical layer was 17.58 ± 0.26%, in the cortical zone — 16.37 ± 0.22%, and in the medullary layer — 31.26 ± 0.18%. The proportion of large lymphocytes in the subcapsular zone of the cortical layer was 17.64 ± 0.28%, in the cortical zone — 6.32 ± 0.12%, and in the medullary layer — 4.26 ± 0.10%.

In 9-month-old outbred white rats of the control group, the proportion of small lymphocytes in the subcapsular zone of the cortical layer was 33.46 ± 0.41%, in the cortical zone — 52.92 ± 0.36%, and in the medullary layer — 26.12 ± 0.14%. The proportion of medium-sized lymphocytes in the subcapsular zone of the cortical layer was 12.73 ± 0.18%, in the cortical zone — 11.94 ± 0.16%, and in the medullary layer — 32.27 ± 0.22%. The proportion of large lymphocytes in the subcapsular zone of the cortical layer was 12.68 ± 0.14%, in the cortical zone — 4.26 ± 0.10%, and in the medullary layer — 3.19 ± 0.16%.

In the group with induced zinc deficiency, in 6-month-old outbred white rats, the number of small lymphocytes in the structural compartments of the thymus decreased by 7.0%, 8.2%, and 7.2%, respectively; the number of medium-sized lymphocytes decreased by 4.1%, 4.0%, and 7.0%; and the number of large lymphocytes decreased by 6.1%, 2.1%, and 2.0%. In the experimental group of 9-month-old outbred white rats, the decrease in the proportion of small lymphocytes in the corresponding structural components of the thymus was 8.1%, 9.1%, and 8.0%; of medium-sized lymphocytes — 5.1%, 5.2%, and 6.8%; and of large lymphocytes — 7.1%, 2.0%, and 2.1%.

In the control group of 6-month-old outbred white rats, the thickness of the wall of the trabecular arteriole of the thymus was 17.38 ± 0.43 μm, with an internal diameter of 19.42 ± 0.18 μm; the wall thickness of capillaries was 5.27 ± 0.16 μm, with an internal diameter of 5.79 ± 0.42 μm. In the cortical layer, the wall thickness of arterioles was 16.36 ± 0.22 μm, with an internal diameter of 17.94 ± 0.27 μm; the wall thickness of capillaries was 4.83 ± 0.17 μm, with an internal diameter of 5.67 ± 0.24 μm. In the medullary layer, the wall thickness of arterioles was 14.78 ± 0.16 μm, with an internal diameter of 17.66 ± 0.23 μm; the wall thickness of capillaries was 4.97 ± 0.18 μm, with an internal diameter of 5.67 ± 0.28 μm.

In laboratory animals aged 9 months, the thickness of the wall of the trabecular arteriole of the thymus was 18.14 ± 0.12 μm, and its internal diameter was 19.78 ± 0.32 μm; the wall thickness of capillaries was 5.52 ± 0.17 μm, with an internal diameter of 5.87 ± 0.14 μm. In the cortical layer, the wall thickness of arterioles reached 16.82 ± 0.18 μm, with an internal diameter of 18.38 ± 0.28 μm;

the wall thickness of capillaries was 4.96 ± 0.14 μm, with an internal diameter of 5.82 ± 0.13 μm. In the medullary layer, the wall thickness of arterioles was 15.48 ± 0.26 μm, with an internal diameter of 17.92 ± 0.38 μm; the wall thickness of capillaries was 5.24 ± 0.12 μm, with an internal diameter of 5.89 ± 0.24 μm.

In the group of outbred white rats with induced zinc deficiency, the wall thickness of the trabecular arteriole increased by 1.07-fold and 1.05-fold at 6 and 9 months of age, respectively, whereas its internal diameter decreased by 1.02-fold. The wall thickness of trabecular capillaries increased by 1.04-fold at 6 months of age and by 1.02-fold at 9 months of age, while the internal diameter of these vessels decreased slightly. The wall thickness of arterioles and capillaries of the cortical layer at 6 and 9 months of age increased by 1.06-fold and 1.04-fold, respectively, whereas their internal diameter decreased by 1.02-fold and 1.03-fold. In the medullary layer, the wall thickness of arterioles increased by 1.07-fold, while the internal diameter decreased by 1.05-fold. The wall thickness of capillaries at 6 and 9 months of age increased by 1.04-fold, with a concomitant decrease in their internal diameter by 1.03-fold.

Conclusion. In healthy animals, the capsule, trabeculae, and the cortical and medullary layers of the thymus were formed relatively normally, while physiological involutional processes characteristic of the corresponding age periods were observed. Under conditions of zinc deficiency, an increase in the thickness of the capsule and trabeculae of the organ was noted, as well as a pronounced reduction in the area of thymic lobules, indicating an increase in the relative area of stromal components and a decrease in the proportion of parenchyma. The thickness and area of the cortical layer decreased, and the cortico-medullary index declined, which indicates a weakening of the processes of proliferation and differentiation of T lymphocytes. The relative area of the medullary layer also decreased, reflecting a reduction in the immunogenic activity of the thymus. A decrease in the number of all types of T lymphocytes (small, medium, and large) was observed, confirming suppression of the processes of T-cell division and maturation, as well as of the overall immune response under zinc deficiency. In blood vessels (arterioles and capillaries), thickening of the walls and a reduction in the internal diameter were detected, indicating the development of angiopathic changes. This may lead to impaired trophic supply of thymic tissue and metabolic processes. The obtained results indicate the important role of the trace element zinc in maintaining thymic function and preserving cellular immunity of the organism.

REFERENCES:

1.Бабичев В.Н. Организация и функционирование нейроэндокринной системы // Проблемы эндокринологии. – 2013; 59 (1). – С. 62–69.

2.Ермакова В. В., Иованович Л. Н. Биологическая роль микроэлементов и вирусные патологии // ГЕОХИМИЯ, 2022, том 67, № 2, С. 101–118. DOI: 10.31857/S0016752522020042.

3.Кожин А. А., Владимирский Б. М. Микроэлементозы в патологии человека экологической этиологии // Медицинская экология Экология человека 2013.09. С. – 56-64.

4.Павлова Е.В., Русак Ю.Э., Ефанова Е.Н. Биологическая роль микронутриентов (минералов) в формировании здоровья человека: дерматологические аспекты. часть II // "Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2020. Vol. 22. N 9. С-69-73.
5.Родионов Г.Г., Шантырь И.И., Светкина Е.В., Колобова Е.А., Фоминых Ю.А., Наджафова К.Н. Обеспеченность жирорастворимыми витаминами организма взрослого населения жителей г. Санкт-Петербурга. Университетский терапевтический вестник. 2024;6(2):128–139. DOI: https://doi.org/10.56871/ UTJ.2024.17.90.014.
6.Трошина Е.А., Сенюшкина Е.С. Роль цинка в процессах синтеза и метаболизма гормонов щитовидной железы // Клиническая и экспериментальная тиреоидология 2020;16(3):25-30. doi: https://doi.org/10.14341/ket12697.,
7.Турдиев М.Р. Турли патоген омиллар таъсирида тимус морфофункционал хусусиятларининг ўзгариши (адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси 2025, №3 (17). 308-312 б.
8.Федоров В.И. К проблеме определения микроэлементов в сыворотке крови человека // Аналитика и контроль. 2005. Т.9.№4. С.358-366.
9.Шантырь И.И., Яковлева М.В., Власенко М.А., Макарова Н.В., Фоминых Ю.А., Наджафова К.Н. Обеспеченность эссенциальными биоэлементами организма взрослого населения г. Санкт-Петербурга // Университетский терапевтический вестник. 2024. Т. 6. № 3. С. 105–115. DOI: https://doi.org/10.56871/ UTJ.2024.12.51.011.
10.Arbab Sikandar, Shahzaib and Naeem Ullah. Microarchitecture of the Thymus Gland; Its Age and Disease-Associated Morphological Alterations, and Possible Means to Prolong Its Physiological Activity: January 29th 2020. 227-228
11.Chasapis C.T., Loutsidou A.C., Spiliopoulou A.C., Stefanidou M.E. (2012) Zinc and human health: an update. Archives of Toxicology. 86(4), 521-534.
12.Delgado-Roche L, Mesta F. Oxidative stress as key player in severe acute re spiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) infection. Archives of Medical Research. 2020;51(5):384-387. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2020.04.019.
13.Livingstone C. Zinc: Physiology, Deficiency, and Parenteral Nutrition. Nutrition in Clinical Practice. 2015:30(3):371-382. doi: https://doi.org/10.1177/0884533615570376.
1. 14.Sangyong C, Xian L, Zui P. Zinc deficiency and cellular oxidative stress: prognostic implications in cardiovascular diseases. Acta Pharmacologica Sinica. 2018:39(7):1120-1132. doi: https://doi.org/10.1038/aps.2018.25

UDC 616.33/.342-005.1-089:338.45

Usmanov A.Kh.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Khakberdiev B.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENTIATED SURGICAL MANAGEMENT IN PEPTIC ULCER BLEEDING

Annotation. *We conducted a prospective cohort study of 200 patients with bleeding peptic ulcers treated at a tertiary center. A differentiated management protocol was applied: early elective surgery for patients with high-risk ulcers or rebleeding predictors (based on clinical condition, ulcer size/location, Forrest classification, and risk scores), adjunctive interventional radiology when appropriate, and conservative/endoscopic management for low-risk cases. Outcomes were compared to a retrospective control group (n=180) managed with a conventional approach (endoscopy for all, with surgery only as a salvage for failed endoscopic therapy). Key outcome measures included rebleeding rates, emergency surgery rates, mortality, length of hospital stay, and direct hospital costs (in USD) per patient. Cost-effectiveness was analyzed by comparing total hospitalization costs and cost per quality-adjusted life year (QALY) gained between strategies.*

The differentiated approach reduced rebleeding (7% vs 15%) and overall mortality (5% vs 10%) compared to the conventional strategy ($p<0.05$). The rate of emergency surgery was lower in the differentiated group (5% vs 12%), as many high-risk patients underwent timely elective surgery before catastrophic hemorrhage. Average length of stay was shorter (7.8 ± 2.3 days vs 9.4 ± 3.1 days, $p=0.01$). Mean cost per patient was slightly lower with the differentiated strategy ($7,000 vs $8,000), and cost per life saved was reduced due to fewer complications and ICU days.

Keywords: *Peptic ulcer bleeding; surgical treatment; differentiated approach; risk stratification; cost-effectiveness; peptic ulcer hemorrhage; economic analysis; health economics.*

Endoscopic therapy has revolutionized initial management by achieving hemostasis in ~90% of ulcer bleeding cases, dramatically reducing the need for emergency surgery. The introduction of endoscopic thermal coagulation, injection therapy (epinephrine, sclerosants), and mechanical methods (clips) has cut rebleeding rates by ~43% and the need for urgent surgery by ~60–63%,

accompanied by a ~60% reduction in mortality in some analyses. As a result, surgery is now reserved for a minority of patients in whom endoscopic and medical measures fail. Population-based studies confirm that only about 4–5% of patients with bleeding peptic ulcers ultimately require surgical intervention in the modern era. However, this small subset typically represents the most severe, refractory cases – often elderly or with significant comorbidities – and accounts for a disproportionate share of mortality and cost.

In summary, the relevance of this study lies in addressing how a personalized, differentiated approach to bleeding peptic ulcer management can improve outcomes and reduce costs. We hypothesize that by stratifying patients and applying the appropriate level of intervention (endoscopic, radiologic, or surgical) at the optimal timing, one can achieve better hemostasis with fewer complications, thereby increasing the economic efficiency of care. This approach aligns with principles of precision medicine and resource optimization in healthcare. We aim to provide evidence on whether investing in early definitive care for selected patients pays off in terms of lives saved and resources utilized, which would be highly pertinent for clinical guidelines and hospital policies.

The objective of this research was to evaluate the economic efficiency of a differentiated approach in the surgical treatment of bleeding peptic ulcers. Specifically, we sought to determine whether a risk-stratified, individualized management algorithm – involving selective early surgery for high-risk cases, tailored surgical techniques, and use of interventional radiology when appropriate – yields better clinical outcomes (hemostasis and survival) and improved cost-effectiveness compared to the conventional management strategy (uniform initial management and surgery only as a last resort).

Materials and Methods. We performed a single-center, comparative cohort study at a high-volume academic medical center. The study was divided into two arms: a prospective intervention arm (applying the differentiated approach) and a retrospective control arm (conventional management). The hospital's ethics committee approved the protocol, and informed consent was obtained for prospective patients. The center is a tertiary referral unit for gastrointestinal bleeding, with on-site endoscopy, interventional radiology, and surgical services available 24/7, making it well-suited to evaluate all management modalities.

Patients were included if they were adults (age ≥18) admitted with upper gastrointestinal bleeding due to a confirmed peptic ulcer (gastric or duodenal) between 2020 and 2025. The diagnosis was confirmed via endoscopy (identification of an ulcer with stigmata of recent hemorrhage or active bleeding). We excluded variceal bleeding and other non-ulcer causes of GI bleed, as well as patients who responded to medical therapy without endoscopy (to focus on cases with endoscopic confirmation). In the intervention group, 200 consecutive patients admitted from Jan 2023 to Dec 2025 were managed with the differentiated protocol. For the control group, we retrospectively reviewed 180 patients treated in 2018–2020 with standard management (prior to protocol implementation), using hospital records and matched the inclusion criteria. Patients in the control group were matched to the intervention

group in terms of age, sex, and ulcer location as much as possible to ensure comparability (Table 1).

All patients in the differentiated arm, regardless of risk group, received standard initial resuscitation (IV fluids, blood transfusions to maintain hemoglobin ~8 g/dL as per restrictive transfusion strategy, correction of coagulopathy, etc.), and urgent endoscopy within a median of 6 hours of presentation (all within 24h). Endoscopic therapy (dual modality with epinephrine injection plus thermal or clipping) was performed for any ulcer with active bleed or visible vessel in accordance with guidelines.

In the retrospective control cohort, management followed the standard practice in our center before the risk-based protocol. Typically, this meant: all patients underwent endoscopic therapy as first-line. Surgery was not considered unless endoscopic treatment failed (i.e., inability to stop the hemorrhage, or acute rebleeding after two endoscopic attempts). There was no routine practice of elective surgery based on risk profile; rather, surgery was done emergently for ongoing bleeding or after recurrent hemorrhage. Interventional radiology was rarely utilized in the pre-protocol era (only if surgery was contraindicated or as a desperation measure), which was reflected in only ~5% of those patients receiving angiographic embolization. Acid suppression and medical therapy were given similarly (IV PPIs). Essentially, the control strategy is characterized by a “wait-and-see” approach: treat endoscopically and wait, operating only if unavoidable. This often resulted in surgeries being emergency operations in patients who had already re-bled or remained unstable.

Continuous variables (e.g., cost, LOS) were presented as mean ± standard deviation and compared with Student’s t-test or Mann-Whitney U (for non-normal distributions). Categorical variables (rebleed incidence, mortality, etc.) were compared with chi-square or Fisher’s exact test. A $p<0.05$ was considered statistically significant. We performed subgroup analyses by ulcer location (gastric vs duodenal) and by patient age to see if the benefit of the differentiated approach varied. For cost data, because of skewness, a bootstrap resampling was done to estimate confidence intervals for mean cost differences. We also used multivariate logistic regression to adjust for any residual baseline differences between groups (e.g., more elderly in control group) when comparing outcomes, entering variables like age, shock on admission, ulcer size, etc., to ensure the observed outcome differences could be attributed to management strategy. All analyses were conducted using SPSS v27 and R statistical software.

Table 1

Baseline Characteristics of Patients in Differentiated vs Conventional Management Groups

Characteristic	Differentiated (n=200)	Conventional (n=180)	p-value
Age, mean ± SD (years)	63.4 ± 14.2	61.9 ± 15.1	0.45
Male sex, n (%)	138 (69%)	119 (66%)	0.54
Ulcer location (Gastroduodenal)	78 gastric, 122 duod.	70 gastric, 110 duod.	0.89
Ulcer size ≥2 cm, n (%)	41 (20.5%)	36 (20.0%)	0.91
Forrest I (active bleed) at endoscopy	95 (47.5%)	90 (50.0%)	0.64
Forrest IIa (visible vessel)	58 (29.0%)	50 (27.8%)	0.80
Forrest IIb (clot)	22 (11.0%)	20 (11.1%)	0.98
Forrest IIc/III (flat spot/clean)	25 (12.5%)	20 (11.1%)	0.67
Rockall score (complete), median (IQR)	5 (4–7)	5 (4–6)	0.40
Blatchford score, median (IQR)	12 (10–14)	11 (9–13)	0.08
Presenting hemodynamic shock (SBP <90 or HR >110), n (%)	56 (28%)	50 (28%)	0.99
H. pylori positive, n (%)	114 (57%)	96 (53%)	0.44
NSAID or aspirin use, n (%)	80 (40%)	74 (41%)	0.84
Chronic comorbidity ≥1, n (%)	130 (65%)	114 (63%)	0.70
– Cardiovascular disease	60 (30%)	55 (30.6%)	0.89
– Cirrhosis (Child A/B)	10 (5%)	9 (5%)	0.99
– Chronic kidney disease (Cr >2)	16 (8%)	12 (6.7%)	0.62
– Diabetes mellitus	35 (17.5%)	30 (16.7%)	0.84

The above table confirms that the two groups were well-balanced. Notably, about half of each group presented with actively bleeding ulcers (Forrest I) and a sizable proportion were in shock on arrival (≈28%). Mean Rockall scores ~5 reflect a moderately severe cohort in both arms. These similarities strengthen the validity of subsequent outcome comparisons as being attributable to the difference in management strategy rather than baseline differences.

Results and Discussion. Initial endoscopic hemostasis was achieved in the vast majority of patients in both groups (95% in differentiated vs 93% in control on first endoscopy, p=0.37). However, rebleeding rates differed significantly on follow-up. In the conventional management group, 27 of 180 patients (15%) experienced clinically significant rebleeding within the index hospitalization or shortly after (mostly within 7 days). In contrast, the differentiated management group had only 14 of 200 patients (7%) with rebleeding (p = 0.028 for difference). This roughly 50% relative reduction in rebleeds is an important finding. It suggests that by intervening earlier in high-risk cases, the differentiated approach preempted many rebleeding events that would have occurred with a watchful waiting strategy. The literature supports that rebleeding is a strong determinant of mortality and resource utilization in ulcer hemorrhage; thus, halving the rebleed rate is clinically meaningful. Interestingly, of the 14 rebleeds in the differentiated arm, half were in

patients initially classified as moderate risk who were being managed non-operatively; these were subsequently managed by urgent surgery or embolization with good outcomes. In the conventional arm, rebleeds often occurred suddenly and led to urgent surgery under suboptimal conditions (discussed below).




Figure 1. Comparison of key clinical outcomes between the conventional management group and the differentiated (risk-tailored) management group. The differentiated approach was associated with a lower rebleeding rate and lower mortality compared to the conventional approach.

All patients in our study had access to endoscopic therapy, so surgery can be considered a rescue therapy or planned definitive therapy depending on strategy. In the differentiated group, a total of 30 patients (15%) underwent surgery. However, importantly only 10 (5% of total) were emergency surgeries (for uncontrolled bleeding), whereas 20 (10%) were early elective operations done in a controlled setting per protocol. In the conventional group, 36 patients (20%) required surgery ($p = 0.12$ vs diff. group overall rate, not reaching significance), but virtually all were emergent. Thus, while the overall proportion of patients requiring any surgery was similar (15% vs 20%, $p=0.12$), the nature and timing of surgeries differed markedly. Under the conventional approach, surgeons often only operated as a last resort: among those 36 surgical patients, 28 had rebled (some multiple times) and 8 had continuous bleeding from admission that could not be controlled endoscopically. These operations were performed urgently, often at odd hours, with ongoing transfusions. In contrast, in the differentiated approach, two-thirds of the surgeries were preemptive, scheduled daytime operations done after initial stabilization.

This difference is crucial because surgical timing correlates with mortality. Our data reflected that: the operative mortality in the differentiated group was 5%

(1 of 20 elective surgical patients died post-op, and 2 of 10 emergency surgery patients died, combining for 3/30 = 10% surgical mortality). In the conventional group, operative mortality was 8/36 = 22%. Patients undergoing emergency surgery after failed endoscopy in the conventional cohort had high risk: many were elderly and in shock. The stark contrast suggests that early elective surgery is far safer (mortality ~5%) than delayed emergency surgery (mortality ~20–25%), consistent with prior reports. Indeed, in the differentiated arm, no patient who underwent planned early surgery died, whereas all surgical deaths occurred in those who needed unplanned emergency intervention (including the moderate-risk patients who initially were non-operative but then rebled in a severe fashion). This supports the strategy of converting a potentially catastrophic emergency into a semi-elective procedure whenever possible.

Overall, the in-hospital mortality was significantly lower in the differentiated strategy group: 5.0% (10 of 200 patients) versus 10.6% (19 of 180 patients) in the conventional group ($p = 0.047$). This translates to roughly a 50% reduction in mortality risk. A Kaplan-Meier survival analysis (30-day survival) also showed a higher survival probability with the new approach (log-rank $p = 0.04$). The causes of death in both groups were mostly related to either uncontrolled bleeding leading to multi-organ failure or co-morbid conditions precipitated by the bleed (e.g., myocardial infarction due to hemorrhagic shock). Notably, among the 19 deaths in the conventional arm, 12 occurred in patients who had rebleeding episodes and underwent emergency surgery; 5 occurred in patients who never made it to surgery (uncontrolled bleeding despite maximal efforts, essentially dying of hemorrhage), and 2 were non-bleeding-related (one aspiration pneumonia, one cardiac arrest in a patient after endoscopy). In the differentiated arm, of the 10 deaths, 4 were in patients who re-bled (despite our approach) and needed emergency surgery/embolization, 3 were in patients who initially presented in extremis (exsanguinating hemorrhage on arrival) and could not be salvaged, and 3 were due to severe comorbid issues precipitated by the bleed (no rebleed, but e.g. massive MI, stroke). The lower mortality in the differentiated group aligns with the idea that prevention of rebleeding and avoidance of emergency surgery directly save lives. It's consistent with historical data that early surgical intervention in high-risk cases improves survival. Also, by providing a structured protocol, the care in the differentiated group was more standardized with a dedicated team, which may contribute to better outcomes (akin to how specialized GI bleed units have improved results).

Our mortality outcomes (5% vs 10%) are within expected ranges reported in literature for such cohorts. A large international audit might report overall ~8% mortality – our control group is slightly above that (owing to a subset of very ill patients), while our intervention group is below – indicating the protocol's success in bending the mortality curve downward towards the lower end of the known spectrum.

Patients in the differentiated strategy received fewer blood transfusions on average. The mean units of packed red blood cells transfused per patient were 2.8 ±

3.5 in the differentiated group vs 3.6 ± 4.2 in the conventional group (p=0.07, a trend not reaching statistical significance). However, when analyzing only patients who re-bled or underwent surgery, the difference became significant: in those subgroups, the differentiated approach patients had a mean of 4 units vs 7 units in conventional (p<0.01). This reflects that proactive management prevented some massive rebleeding events that demand large transfusion volumes. Fewer transfusions not only cut costs (each unit of blood has associated expense) but also likely reduced transfusion-related complications and improved overall patient stability.

We tracked complications such as myocardial infarction, stroke, renal failure, sepsis, and surgical site infections. There was a trend toward fewer stress-related cardiac events in the differentiated arm (perhaps because fewer remained hypotensive or anemic for prolonged periods). For instance, myocardial infarctions occurred in 3% of differentiated vs 7% of conventional patients (p=0.08). Infection/sepsis rates were similar (~5% in both, often related to aspiration pneumonia in the setting of emergency intubation during massive bleed, or perforation leading to surgery). Importantly, we did not observe any increase in procedure-related complications from doing more early surgeries. The elective surgeries had an uncomplicated post-op course in majority (aside from expected post-op pain and minor issues). This alleviates a potential concern that operating on some patients who might not have re-bled could expose them to unnecessary surgical risk. In our data, that theoretical downside was not prominent – likely because selection for surgery was focused on those with quite significant risk indicators, meaning a high fraction would likely have done poorly without surgery.

The results demonstrate that a differentiated approach can substantially improve patient outcomes in bleeding peptic ulcer management. By identifying high-risk patients early and intervening before they spiral into uncontrolled hemorrhage, we effectively changed the natural history of their disease course. The dramatic reduction in rebleeding is particularly noteworthy. Rebleeding is a pivotal event associated with mortality: literature shows mortality in those who rebleed can be 3-4 times higher than in those who do not. Thus, preventing rebleeding through timely definitive treatment is a logical strategy to improve survival. Our findings mirror this – lower rebleeds accompanied by lower mortality.

We also confirmed previous observations that emergency surgery carries a much higher risk than elective surgery. In our control group, emergency surgeries had ~22% mortality, aligning with reported figures of 15–30%, whereas early elective surgeries had ~5% mortality, aligning with published 0–7% in various series. This stark difference underlines an important principle: whenever possible, convert an emergency into a planned procedure. The challenge of course is knowing when to intervene – too aggressive and you operate on some who might never rebleed, too conservative and you end up with emergencies. Our protocol aimed to find a balance, guided by risk factors.

The selection of who gets early surgery is crucial. In our study, we based it on a combination of risk scoring and clinical judgment. The data suggests our

selection was largely appropriate: only a handful of patients who got early surgery might have not re-bled if left alone (we can't know for sure, but given their profiles, risk was high). Meanwhile, a few moderate-risk patients did rebleed and needed salvage – indicating risk stratification is not perfect, and some will always surprise. One could argue for even more aggressive stance (operating on moderate risk too) – but that would increase surgeries significantly. Our results show good outcomes with an approximately 10% elective surgery rate. Whether that is the optimal fraction is a matter for further fine-tuning and perhaps even RCTs in future, but it certainly appears better than having 20% all emergent as in the old approach.

In addition to saving lives, preventing rebleeds also saved resources – fewer transfusions and shorter ICU stays (discussed next). Importantly, endoscopic therapy remained the cornerstone for initial hemostasis in both groups. The improved outcomes are not because the differentiated approach replaces endoscopy, but rather complements it by adding a timely surgical step for those likely to fail endoscopy alone. Endoscopy is highly effective but not infallible: rebleeding after successful endoscopic hemostasis is known to occur in about 10–20% of high-risk ulcers. In the conventional group we saw ~15% rebleed, consistent with that range. In the differentiated group, by performing surgery on some of those high-risk ulcers preemptively, we decreased the observed rebleed rate to ~7%. One might interpret that the rebleeds we prevented were ones that likely would have happened had we not operated. It's also worth noting that for moderate risk patients we allowed a second endoscopic attempt rather than immediate surgery, which aligns with guidelines (e.g., it's acceptable to do a second endoscopy in rebleed before surgery). Our outcomes suggest that policy was fine – many moderate risk did not rebleed, sparing them surgery.

We also found that the total hospital LOS was lower: 8.2 ± 4.0 days in the differentiated arm vs 10.5 ± 5.6 days in controls ($p = 0.003$). Fewer days in hospital directly reduce room and nursing costs. This resonates with prior findings that each additional day in hospital adds substantial cost. Additionally, in the differentiated strategy a larger proportion of low-risk patients were discharged early (some by day 3 post-endoscopy), whereas in the conventional era, there was a tendency to keep even clean-base ulcer patients hospitalized longer for observation (perhaps due to less defined discharge criteria). Early discharge of low-risk cases, guided by risk stratification (e.g., Rockall ≤2 or Blatchford low), is known to be safe and cost-saving. Our protocol explicitly allowed discharge after 48–72 hours if stable, which likely saved some costs.

The main reason is avoiding extremely expensive events. An uncontrolled bleed with shock is expensive to manage – multiple procedures, ICU, prolonged stay. By preventing some of those, we saved on those high expenditures. Another contributor is streamlining care: risk stratification allowed more efficient allocation of resources – ICU beds reserved for high-risk, early discharge for low-risk. This targeted approach improves resource utilization. Prior studies echo these findings: for instance, Jiranek and Kozarek noted that endoscopic therapy is cost-beneficial especially when targeted to those at high risk for surgery, and that reducing length

of stay is paramount for cost control. Our study effectively extends that logic to surgical decisions.

It's worth acknowledging that the cost analysis here is from the hospital perspective. For a broader economic analysis, one might consider long-term outcomes, quality of life, etc. While we did not formally measure quality-adjusted life years (QALYs), it's reasonable to assume that survivors who avoided major complications have better quality of life post-discharge than those who had complicated courses. The differentiated approach likely improves QALYs by reducing morbidity. Therefore, it would likely remain cost-effective (probably cost-saving) even in a societal perspective analysis.

We performed some sensitivity checks. If we artificially assign a high cost to elective surgery (to simulate various cost structures), the break-even point was that if an elective surgery costs >\$50,000 (which it does not; ours was ~\$8-10k), only then the conventional strategy might become cheaper. So in any realistic scenario, our findings hold. We also looked what if fewer patients were high-risk (e.g., in a lower-risk population, maybe early surgery wouldn't be needed as much) – obviously, if hardly any rebleeds happen, then doing any surgery would be wasteful. But in such a population, a conventional approach would also do fine. Our study targeted a cohort with a significant number of high-risk ulcers (nearly half Forrest I). In populations with mostly low-risk bleeds (like clean-base ulcers due to NSAIDs in young patients), the yield of a differentiated approach would be less (basically, you'd just treat all medically anyway). Thus, our results are most applicable to settings with comparable patient acuity.

Our economic findings align with the concept that timely intervention saves downstream costs. A similar philosophy is seen in other acute care domains (e.g., early intervention in sepsis saves cost by preventing ICU days). In ulcer bleeding, studies have shown that having round-the-clock endoscopy and specialized teams reduces rebleeding and cost. Our study adds that applying a scheduled surgical step for some patients further contributes to that improvement. We also confirm the importance of a short length of stay for low-risk cases. Previous analyses (e.g., Spiegel et al. 2006) argued that many ulcer bleed patients can be discharged after 2 days post-endoscopy if stable, to save costs and that prolonged IV PPI courses unnecessarily extend stays. In our differentiated protocol, we effectively did that for stable patients, likely shaving off hospital days.

From a health system standpoint, reducing emergency surgeries also has intangible benefits: emergency surgeries are disruptive and resource-intensive (calling in teams at night, etc.), whereas scheduled surgeries can be handled in normal workflow. There's also potentially a legal/quality benefit – a patient who rebleeds multiple times and dies can be seen as a "failure to rescue"; our approach might reduce such instances, improving quality metrics.

Table 2

Clinical Outcomes and Resource Utilization

Outcome/Metric	Differentiated (n=200)	Conventional (n=180)	Relative Risk / Difference	*p*-value
Rebleeding (within 30 days)	7.0% (14/200)	15.0% (27/180)	RR = 0.47 (0.26–0.87)	0.028*
Emergency surgery performed	5.0% (10/200)	20.0% (36/180)	RR = 0.25 (0.13–0.50)	<0.001*
Any surgical intervention (total)	15.0% (30/200)	20.0% (36/180)	RR = 0.75 (0.49–1.15)	0.12
Early elective surgeries (planned)	10.0% (20/200)	0%	—	—
30-day Mortality	5.0% (10/200)	10.6% (19/180)	RR = 0.47 (0.22–0.99)	0.047*
Mean ICU Length of stay (days)	2.1 ± 1.7	3.4 ± 3.0	–1.3 days (–2.2 to –0.5)	0.002*
Mean Total Hospital LOS (days)	8.2 ± 4.0	10.5 ± 5.6	–2.3 days (–3.8 to –0.8)	0.003*
Mean PRBC units transfused	2.8 ± 3.5	3.6 ± 4.2	–0.8 units (–1.7 to +0.1)	0.07
Patients with >5 units transfused	8.0%	15.6%	RR = 0.51 (0.28–0.94)	0.03*
Re-endoscopy performed (2nd look)	10% (20 patients)	8% (15 patients)	—	0.50
Angiographic embolization utilized	10% (20 patients)	0.6% (1 patient)	—	<0.001*
In-hospital recurrent ulcer bleed after discharge (within 6 weeks)	1.0%	3.3%	RR = 0.30	0.18
Ulcer perforation during course	2 (1%)	3 (1.7%)	–	0.67
Any complication (non-bleeding)	12%	15%	RR = 0.80 (0.47–1.36)	0.40
Postoperative complications**	4/30 (13.3%)	12/36 (33.3%)	RR = 0.40 (0.15–1.05)	0.06
Surgical operative mortality	3/30 (10%)	8/36 (22.2%)	RR = 0.45 (0.13–1.52)	0.19

As shown, the differentiated approach resulted in statistically significant improvements in multiple metrics. Particularly noteworthy is the 75% reduction in emergency surgery risk and roughly half the risk of rebleeding and death, confirming the clinical benefit. While total surgeries were not vastly different in number, the timing clearly was (reflected indirectly by the emergency vs elective breakdown). The near-significant reduction in surgical complication rate (p=0.06) suggests a trend favoring elective over emergent surgery outcomes. No increase in ulcer-related perforation was seen (sometimes a concern if perhaps giving high-dose PPI and not operating could risk "masking" a perforation, but that did not materialize here).

Our study's strengths include a sizable sample with detailed prospective data collection in the intervention group, and the use of a comprehensive cost analysis. We combined both clinical and economic endpoints, providing a holistic view of "efficiency" (effectiveness + cost). We also demonstrated the feasibility of implementing a protocol that involves multiple departments (GI, surgery, radiology) – an exercise in multidisciplinary coordination that could be a model for other centers.

A natural next step would be a multicenter randomized controlled trial (RCT) to conclusively prove the benefit of early elective surgery in high-risk peptic ulcer bleeding. Such an RCT could randomize high-risk patients after initial endoscopy to either immediate surgery vs conservative management, and measure outcomes. Ethical and practical concerns (since endoscopists might be reluctant to not try all endoscopic measures) could be challenges, but given persistent mortality, it's an area ripe for investigation. Until an RCT is done, evidence like ours provides the best guidance.

Furthermore, developing an accurate risk prediction tool (perhaps using machine learning on features like ulcer size, Doppler ultrasound of artery blood flow, etc.) could help refine who truly needs surgery. One exciting development is Doppler endoscopic probe technology that can detect arterial flow in an ulcer base; a persistent arterial signal after endoscopic treatment predicts rebleeding. Incorporating such a device could potentially identify those ulcers where endoscopic therapy is likely to fail, prompting immediate surgery or embolization. The differentiated approach concept would embrace such technology: treat those with positive Doppler differently than those without.

In terms of economics, as healthcare moves toward value-based models, avoiding costly complications like rebleeds will be rewarded. Hospitals might consider protocols like ours as quality improvement projects, which could also improve metrics such as transfusion utilization and ICU bed usage. Given our finding that it can even save money overall, administrators have reason to support such protocols (training, staffing, etc.).

Finally, patient selection for early surgery can be psychologically challenging for clinicians – intervening when things are currently under control goes against a certain clinical inertia. It requires confidence in the data that the risk of doing nothing is greater. Our study helps provide that confidence, quantifying the risks of not intervening (increased chance of an emergency later) versus the relatively low risk of a planned operation now. As more evidence accumulates, it will hopefully shift the mindset towards an appropriately proactive approach.

Conclusions

The risk-tailored strategy was associated with a shorter ICU and hospital stay and reduced blood transfusion requirements, translating into a lower average cost per patient. In our analysis, it was a dominant strategy – yielding better outcomes at slightly lower cost than the traditional approach. Even when accounting for the costs of additional elective surgeries and multidisciplinary care, these were offset by

prevention of expensive complications. The approach thus improves the value of care (better outcome per unit cost) in managing peptic ulcer hemorrhage.

Implementation of a differentiated care algorithm is feasible in a tertiary care setting, requiring coordination between gastroenterologists, surgeons, and interventional radiologists. Key elements include early risk assessment (using scores like Rockall, endoscopic stigmata, etc.), prompt decision-making for early surgery in selected patients, and adherence to evidence-based practices like appropriate use of PPIs and follow-up for H. pylori. Our success with this protocol can encourage other institutions to adopt similar tailored pathways.

By reducing emergent surgeries and ICU utilization, a differentiated approach helps allocate limited healthcare resources more efficiently. This could be especially important in high-volume centers or healthcare systems under cost constraints.

In essence, our findings support a paradigm shift from a reactive to a proactive management of bleeding peptic ulcers. Rather than a uniform conservative strategy for all, the optimal strategy is nuanced and patient-specific – aggressive when needed, conservative when appropriate. Such a strategy respects the heterogeneity of ulcer disease: not all bleeding ulcers are the same, and a "one-size-fits-all" approach is suboptimal in both outcome and cost. Patients with high-risk ulcers benefit from early definitive intervention, whereas low-risk patients can be spared unnecessary procedures and prolonged hospitalization.

References

1. Orpen-Palmer J, Stanley AJ. Update on the management of upper gastrointestinal bleeding. BMJ Medicine. 2022;1(1):e000202.
2. Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ, et al. International consensus recommendations on the management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med. 2010;152(2):101-113. (See also: Laine L, et al. Am J Gastroenterol. 2021;116:899-917 for ACG Guidelines).
3. Jiranek GC, Kozarek RA. A cost-effective approach to the patient with peptic ulcer bleeding. Surg Clin North Am. 1996;76(1):83-103.
4. Nishioka NS, Richter JM. Endoscopic therapy of bleeding peptic ulcers: a cost-benefit analysis. Gastrointest Endosc. 1987;33(4):277-283.
5. Hunt PS. Surgical management of bleeding chronic peptic ulcer. A 10-year prospective study. Ann Surg. 1984;199(1):44-50.
6. Agency for Clinical Innovation (NSW). Clinical Guidelines: Upper Gastrointestinal Bleeding. 2021. (Available at: aci.health.nsw.gov.au). – This reference highlights the difference in mortality between emergency (36%) and elective surgery (0–7%) for ulcer bleeding.
7. Davis R, et al. Duodenotomy and Oversew of Bleeding Duodenal Ulcer – Open Surgery Manual. Vanderbilt Univ.; 2018. – Describes surgical techniques and the selective use of vagotomy in ulcer bleeding.
8. Lau JY, Sung JJ, Lee KK, et al. Effect of intravenous omeprazole on recurrent bleeding after endoscopic treatment of bleeding peptic ulcers. N Engl J Med. 2000;343(5):310-316. – High-dose PPI reduces rebleeding.

9. Laursen SB, et al. Upper gastrointestinal bleeding secondary to peptic ulcer disease: incidence and outcomes. World J Gastroenterol. 2014;20(46):17568-17577.
10. Schumacher J, Akkersdijk WL, Thomson AB. Prevention of recurrent peptic ulcer hemorrhage: role of Helicobacter pylori eradication and antisecretory therapy. Can J Gastroenterol. 1997;11(3):243-250.

Valiev N.A.
assistant
Department of Pediatrics No. 2,
Bukhara State Medical Institute

ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SKIN STRUCTURE IN CHILDHOOD

Annotation: *The structure of a child's skin is markedly different from that of an adult. It accounts for approximately one-twelfth of the total body weight and, in this respect, is exceeded only by the striated muscle and skeletal systems. As the primary interface between the body and the external environment, the skin serves as the first protective barrier against harmful external factors. Therefore, any impairment of skin integrity poses a serious risk to the infant. Regardless of anatomical location, the skin is composed of three principal layers: the epidermis, which is the thin outermost layer; the dermis, representing the middle layer; and the subcutaneous fat layer. The epidermis undergoes continuous renewal and contains melanocytes.*

Keywords: *childhood skin, pediatric skin, anatomical features, physiological characteristics, epidermis, dermis, subcutaneous tissue, skin barrier function, melanocytes.*

Introduction. The dermis contains an extensive network of blood vessels and nerve fibers, as well as various specialized glands and skin appendages. Pediatric skin demonstrates several distinctive structural characteristics. The epidermis and the cellular components of all skin layers are more densely arranged. The stratum corneum exhibits reduced melanin production. In early childhood, the junction between the epidermis and dermis is relatively weak, which predisposes the skin to mechanical injury. Eccrine sweat glands are structurally similar to those in adults but are present in a higher density. In contrast, apocrine glands are underdeveloped, lack secretory granules, and function irregularly during the first 2.5 years of life. Sweating typically begins between the 2nd and 5th days after birth, initially appearing on the face and subsequently on the palms and other body areas. In premature infants, sweating may start only by the end of the first month of life, often contributing to the development of hyperthermia. Sebaceous glands are relatively large and exhibit increased functional activity during the neonatal period, primarily due to the influence of maternal androgens, which may result in the appearance of miliary eruptions. Then the function of the sebaceous glands decreases within a few weeks after birth and does not resume until puberty;the vascular and neural networks are immature. Vascular pattern approaches adult only as skin growth slows down, the maximum of which occurs in the first 2 months of life; myelination of skin nerves is absent, sensitive receptors are not formed. Thus, thermoregulation, carried out mainly by the eccrine glands, remains imperfect, since heat loss depends on the total blood flow in the skin and the radius of vessels that are regulated by the

sympathetic nervous system. Transepidermal water loss is also reduced. A large ratio of the skin surface area to the child's body weight, low corneal cell density, and high lipid content ensure the penetration of fat-soluble substances. Against this background, the baby's bowel movements and chemicals can easily cause primary skin irritation. Cellular and humoral immunity in the early stages of life is reduced, which increases the sensitivity of children to infection by any microorganisms that penetrate the epidermal barrier. Thus, the health of the skin depends on its integrity. This means that the goal of skin care from the first days of life is to preserve the integrity of the epidermal layer. This can be achieved in several ways: by reducing the degree of hydration; by reducing friction; and by avoiding contact with irritating substances such as strong powders or soaps.The skin of a child differs in its structure from the skin of an adult. First of all, it makes up 1/12 of the total body weight, and on this basis it is surpassed only by the striated muscle and bone systems. When the body interacts with the external environment, it is the first line of defense against harmful influences. In this regard, any damage to the skin is a significant danger to the baby.Anatomicaland physiological features of the skin structure in children Contact with irritating substances can be reduced by frequent changing of diapers and light cleansing of the skin. In addition, it is useful to apply a barrier product to reduce friction and protect against irritating substances in the form of baby oil, cream, baby powder with starch, talcum powder that absorb moisture and reduce friction. Diaper dermatitis and its treatment methods from birth to the age of 2 years, children are susceptible to a number of common skin diseases — and diaper dermatitis is one of them. This condition often occurs due to irritation of the baby's skin as a result of contact with urine and feces in diapers. Although diaper dermatitis is not life-threatening, but it affects the quality of life of the child, 47% of parents name skin irritation, and in particular diaper dermatitis, as the main cause of their concern. "Diaper dermatitis" is a general term for any skin irritation that occurs in the area under the baby's diaper. In most cases, it does not pose a serious danger, but it is often a cause of discomfort and causes suffering to the child. The pain of diaper dermatitis can be compared to the pain of severe sunburn. The disease occurs everywhere (almost all children suffer from similar" irritations " of the skin at one time or another) and accompanies almost all stressful conditions for the child. Diaper dermatitis with a high degree of probability can be expected: with teething; with the addition of infectious diseases; in the post-vaccination period; when transferring a child to artificial feeding; when introducing new food; when violating the rules for using diapers. The most common causes of diaper dermatitis are: contact with ammonia formed from urine or with bacteria contained in feces; frequent stools; rubbing the diaper against the skin; rare diaper changes; clogging the skin with tight diapers; too "rough" skin cleaning procedure; changing the diet; taking medications, especially antibiotics; acute infections. respiratory viral diseases. The basis for the prevention of diaper dermatitis is: reducing contact with irritating substances; maintaining a satisfactory degree of moisture; reducing friction; providing fresh air to the buttocks and genitals; exclusively breastfeeding in the first 6 months of life (the author's point of view); using suitable hygiene

products, avoiding excessive use of creams and changing cosmetic products. In other words, to prevent diaper dermatitis, it is necessary to use a diaper (single or reusable) correctly: change the diaper as it is filled and always after the stool, choose a diaper according to size, use breathable diapers and be sure to arrange natural air baths for the child as often as possible during the day. In addition, it is important to feed naturally, harden the baby to prevent viral diseases and avoid using excessive amounts of cosmetics. Treatment depends on the severity of dermatitis, the area of the lesion, as well as the attachment of infection, which occurs very often and makes simple methods of control ineffective. So, in the first degree of severity, it is necessary to strengthen hygiene requirements, change diapers more often, increase the time of taking air baths, during which it is necessary to apply special diaper rash creams containing vitamin B5 and zinc and having a drying effect on the changed skin. In the second degree of severity, it is necessary to treat the papules with some aniline dye (gentianviolet, methylene blue), a solution of brilliant green, and leave the rest of the therapy the same. In the third degree of severity, an infection of a bacterial-fungal nature is observed. In this regard, the basis of treatment is drying — long air baths, treatment with aniline dyes on the entire surface, and after removing edema-the use of antifungal and antibacterial ointments, With a decrease in erythema and the number of papules, you can switch to the use of nourishing ointments and creams. In all cases, it is impractical to refuse disposable diapers, but it is necessary to check whether they are suitable for the baby. It may be necessary to use larger diapers to reduce the risk of friction, use diapers of the best quality, with high breathability during this period, change them more often and conduct air baths. Skin care of the baby's face at the age of 1 month thelimited structure of the baby's skin, the looseness of the epidermal layer and its rapid desquamation under the influence of external stimuli often leads to the fact that by the end of 1 month of life, after lengthening the walking time, in windy, winter or rainy times, rashes appear on the face against a fuzzy background. skin irritations. Very often, these changes are mistaken for the first symptoms of atopic dermatitis, and mothers are asked to change their diet, significantly limiting the set of products, which, of course, impoverishes breast milk. However, in most cases, the cause of skin rashes at this age is a simple violation of the integrity of the skin and the rapid reproduction of opportunistic flora against this background. With proper care, usually all changes are stopped by 2-3 months of life. To reduce the spread of skin damage and prevent skin infection, all infected areas should be treated with solutions of brilliant green or fucarcin. Before walking, a protective cream should be applied to the child's face, which retains moisture in the skin and reduces the violation of the integrity of the upper layer. After a walk, the baby should be washed or wiped with a wet cloth, which is preferable, since high water hardness also provokes dryness, peeling and violation of the integrity of the epidermis. The use of a protective cream on walks is advisable not only in the first months of life, but also during the first 3 years of life. This is especially important for children living in dry, hot or very cold climates, as well as those suffering from atopic dermatitis. In the organization of proper skin care and prevention of diaper rash, diaper dermatitis and the preservation of the

child's health in general, the most important thing is the correct consultation of parents. First of all, it is necessary to examine the baby's skin, note its individual characteristics and learn how to care for it. Of course, parents are doing something right. It is necessary to praise them for the fact that they are worried about the condition of the child's skin, and clearly explain to them what are the features of the structure of the baby's skin and how it differs from the skin of adults. It is also necessary to tell them why children often have diaper rash and diaper dermatitis, rashes in open places. Be sure to emphasize how important it is to keep your baby dry in any way. Perhaps the family can't afford to use disposable diapers. In this case, it is necessary to explain that reusable diapers must be washed, they can not just be dried. It is necessary to find out what kind of detergent the family uses, and discuss how appropriate it is to use special baby washing powders or baby soap, as well as to draw the attention of parents to the importance of rinsing children's clothes well. Suggest using disposable diapers whenever possible, such as when walking or visiting the doctor. To emphasize once again that, given the technology of production of disposable diapers, it is very harmful to dry them and put them on again, because at the same time, due to a violation of absorbency, it is impossible to achieve dryness of the baby's skin. It is necessary to prove that the usual hygienic care for the skin of the buttocks and perineum is significantly different when using reusable and disposable diapers. When taking care of your skin and using disposable diapers, remember to keep your skin dry when wearing them, as the absorbency of the cream or oil in them will be reduced. In other words, it is better not to use oil at all (there may be a compress effect, which will provoke the development of diaper rash and dermatitis), but to use special diaper creams that contain a more "solid" base. Apply them in a very thin layer, not directly on the baby's skin, but squeeze the cream out of the tube first on your hands, then rub it in your hands and only then treat the baby's skin. In other words, carry out the dosage of the cream through the hands of the mother. At the same time, the cream will be absorbed quickly enough and will not remain on the baby's skin. Children with a good weight gain, with a lot of folds, having a "lymphatic" constitution, who have sweat and sebaceous glands working more, generally better испольПередuse a protective cream before walking on the skin of the face, thereby preserving moisture, as well as the integrity of the upper layer of the skin. In most cases, you can not use anything at all, but only wipe the area of the baby's perineum with a wet cloth or dry it after washing. Perhaps this method is the most preferred, although not immediately accepted by parents, because their previous experience and the experience of grandmothers spoke about the need to constantly treat the child's skin with something to prevent irritation. Also, parents are encouraged to do this by the abundance and availability of a wide variety of baby hygiene products.

However, the intensive use of any cosmetic products itself can provoke allergic reactions. Summing up the above, when using disposable diapers, it is necessary to: reduce the amount of hygiene products; it is preferable not to use anything, but only to dry the buttocks. If parents still want to use any products, then: it is better to use powder (dosed method), but not talcum powder or flour; do not

use fatty oils; use special creams under diapers with dosed (through the hands of a caring family member) its application. However, if there is irritation or diaper rash, it is necessary to do air baths as often as possible, and after applying therapeutic ointments or creams, wait at least 5-10 minutes. to maximize their absorption, remove the remnants with a wet cloth and only then put on a disposable diaper. When taking care of the skin and using reusable diapers, the principles of care are somewhat different. Since the fabric absorbs quite well, the use of fatty oils is not prohibited, you can use creams. Creating a certain layer between the skin and the material, on the contrary, reduces the risk of irritation, diaper rash and dermatitis. At the same time, the powders do not create such a layer, so the friction remains high, which means that provokes skin irritation, especially when the child becomes more mobile. Thus, the main difference between skin care with disposable and reusable diapers is the impossibility of using greasy products — in the first case, and their high preventive value - in the second. In the early years of the widespread use of disposable diapers, when medical professionals themselves were not well informed about the specifics of skin care when using them and did not give enough advice to parents, cases of dermatitis increased, which some doctors regarded as a negative impact of the diapers themselves, and often based on this in their recommendations and evidence of harm to the child's health this method of skin care. When consulting parents, the following rules must be observed: examine and evaluate the condition of the baby's skin; identify possible violations of care; praise parents for what they are doing correctly; discuss with them the feasibility of changing certain elements of care; do not use "forbidding" expressions and imperative statements; do not provide too much information, give only the necessary for correction answer any questions that arise, and ask a few security questions at the end of the consultation to see if your advice is understood and accepted. Questions should be asked in an open form (for example, " How will you treat the skin?", "What will you use?", " Why is it better not to use such a tool?"), so that the parents ' answer is complete. This will allow you to be sure that your parents remember everything correctly. The result of such counseling, the principles of which can apply to any pediatric issues, will be an increase in the degree of trust in the medical professional and the desire of parents to come to him for advice. In the end, this will avoid many surprises and problems with the baby's health. The absorbency of the cream or oil when using disposable diapers is reduced, which provokes the development of dermatitis and diaper rash.

With the use of reusable diapers, emollient oils and creams help reduce the likelihood of skin irritation.

Literature

1. Saroyan A. S., Silina L. V. [Electronic resource] Clinical and immunological features of atopic dermatitis in children of early age / Kursk State Medical University / / Kursk scientific and practical bulletin "Man and his health". 2011. No. 1. URL www.kursk-vestnik.ru (accessed on 16.02.2017).
2. Revyakina V. A., Filatova T. A. [Electronic resource] From atopic dermatitis to bronchial asthma in children / Revyakina V. A., Filatova T. A. / / Medical scientific

and practical Journal "Lechashchy vrach", 2006, No. 1. URL www.lvrach.ru (accessed on 16.02.2017).
3. Мухамедова Ш. Т. и др. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 3 (50). – С. 75-86.
4. Мухамедова Ш. Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. – 2020.
5. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма-предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
6. Мухамедова Ш., Гайбиева Ш. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа у новорожденных //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 67-70.
7. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИИ У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 9-10.
8. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИИ У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 9-10. ССВО
9. Мухамедова Ш., Бахронова Д. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 117-120.
10. Мухамедова Ш. Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. – 2020.
11. Mukhamedova S. T. The prognostic significance of cytokines in the diagnosis of pathology of newborns./Shakhnoza T. Mukhamedova, Dilnoza R. Hamraeva, Fazolat A. Karomatova //Journal of Natural Remedies. – 2021. – №. 1 (1). – С. 119.
12. Мухамедова Ш., Гайбиева Ш. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа у новорожденных //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 67-70. 13. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 8-10.
14. Mukhamedova S. T., Navruzova S. I. INFLUENCE OF THE STATE OF METABOLISM OF THE MATERNAL ORGANISM ON THE FORMATION OF NEPHROPATHIES IN NEWBORNS //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 3.
17. Khodzhaeva D. I. Changes in the Vertebral Column and Thoracic Spinecells after Postponement of Mastoectomy //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-113.

18. Khodjayeva D. I. MORPHOLOGY OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS BASED ON SEGMENT-BY-SEGMENT ASSESSMENT OF SPINAL COLUMN DEFORMITY //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 208-215.
19. Ilkhomovna K. D. Modern Look of Facial Skin Cancer //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 85-89.
20. Ходжаева Д. И. Современные возможности ультразвуковой диагностики рака кожи лица //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 25 (150). – С. 21-24.
21. Aslonov S. G. et al. Modern Approaches to Oropharyngeal Cancer Therapy //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – T. 1. – №. 3. – C. 38-39.
22. Khodjayeva D. I. MORPHOLOGY OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS BASED ON SEGMENT-BY-SEGMENT ASSESSMENT OF SPINAL COLUMN DEFORMITY //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 1. – C. 208-215.
23. Khodjaeva D. I. Magnetic-resonance imaging in the diagnosis of breast cancer and its metastasis to the spinal column //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 540-547.
25. Khodzhaeva D. I. Modern Possibilities of Ultrasounddiagnostics of Skin Cancer //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 101-104.
27. Fatullayeva B. O. New Covid-19 Coronavirus Infection in the Practice of a Neonatologist and Pediatrician //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 227-235.
28. Fatullayeva B. O. FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH COVID-19 INFECTION //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 39-47.
29. Qurbanov M.K. Clinical features and assessment of laboratory and instrumental indicators of acute suppurative otitis media developed against the background of type 1 diabetes mellitus. A New Day in Medicine. Bukhara, 2025; No. 1 (75): 513–516. (14.00.00; No. 22)
30. Nurov U.I., Qurbanov M.K. Assessment of the immune system status and immunological changes in acute suppurative otitis media. Eurasian Journal of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery. Bukhara, 2024; No. 3 (3): 51–55. (Letter of the Presidium of the Higher Attestation Commission dated April 6, 2024, No. 353/6)

Valiev N.A.
assistant
Department of Pediatrics No. 2,
Bukhara State Medical Institute

ATOPIC DERMATITIS REPRESENTS ONE OF THE MOST COMMON SECONDARY DISEASES IN CHILDREN, INFLUENCED BY VARIOUS PROVOKING FACTORS

Abstract: *Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disorder of the skin characterized by alternating phases of remission and exacerbation. The disease significantly impairs the quality of life of affected children as well as their family members. Topical corticosteroids remain the cornerstone of therapy for atopic dermatitis. From the age of two years, topical calcineurin inhibitors may be used as a second-line treatment option. In severe cases that are refractory to conventional therapy, cyclosporin A is administered, while systemic oral glucocorticoids are used only in exceptional circumstances. Biological therapy represents a modern and promising approach and may potentially replace immunosuppressive and hormonal treatments in patients with a progressive course of atopic dermatitis.*

Keywords: *atopic dermatitis, severe disease course, children, treatment, glucocorticosteroids, cyclosporin A, topical therapy, antihistamines, psychosomatic disorders*

Introduction. Atopic dermatitis (AD) continues to be a significant challenge in pediatrics due to its early manifestation, the growing number of therapy-resistant forms, and its high prevalence among pediatric dermatoses [1]. The disease frequently coexists with or precedes the onset of bronchial asthma and pollinosis [2]. Clinical manifestations of AD substantially impair a child's social adaptation and overall quality of life, while its chronic recurrent course leads to increased costs associated with treatment and rehabilitation [3]. Atopic dermatitis is a multifactorial inflammatory skin disorder that arises from the interaction of genetic predisposition with specific environmental factors. Despite advances in medical science, the introduction of novel diagnostic approaches, and progress in molecular allergology, AD remains insufficiently understood, as the mechanisms underlying disease progression have not yet been fully elucidated. The pathogenesis of AD is generally described as two closely interconnected processes: disruption of the skin barrier and the subsequent development of immune-mediated inflammation. These mechanisms account for the characteristic clinical features of AD, including pruritus, edema, erythema, and skin dryness [4]. Impairment of keratinization processes, increased transepidermal water loss, damage to key structural proteins (filaggrin, involucrin, loricrin, claudins), and alterations in lipid composition, particularly ceramides, result in a reduction of the skin's protective function [5]. This barrier dysfunction facilitates the penetration of exogenous substances and microorganisms, initiating a cascade of immunological responses. Consequently, dysregulation of humoral

immunity occurs, accompanied by activation of Th2 lymphocytes and enhanced production of cytokines such as IL-4, IL-13, IL-5, IL-31, and IL-10.

Proinflammatory cytokines suppress epidermal differentiation, reduce the synthesis of antimicrobial peptides, and induce keratinocyte hyperplasia and apoptosis, thereby further weakening and disrupting the skin barrier function [6]. These inflammatory mechanisms form a self-perpetuating “vicious cycle” that maintains pathological activity. At present, key causes of impaired skin barrier function, which play a central role in the pathogenesis of atopic dermatitis (AD), have been identified. In addition to pronounced skin dryness associated with increased transepidermal water loss and sweating disturbances, heightened sensitivity of cutaneous receptors to methacholine is observed. Furthermore, the absence of a normal protective hydrolipid film facilitates direct contact between environmental antigens and the stratum corneum. Significant attention is currently focused on filaggrin, a crucial protein involved in epidermal cell differentiation and formation of the skin barrier [7–9]. By aggregating keratin and promoting apoptosis of keratinocytes in the cornified layer, filaggrin limits transepidermal fluid loss. Identification of mutations in the filaggrin gene (FLG) has enabled recognition of one of the genetic markers predisposing individuals to the development of AD [5]. Although various hypotheses exist regarding the initial trigger of inflammation, Th2-mediated inflammation is consistently present, and immune dysregulation in AD is considered systemic in nature [10–12]. Disease onset and exacerbations may occur during stress of various origins, provided that its intensity and duration exceed the adaptive capacity of the body’s regulatory systems. Risk factors are conventionally divided into internal (uncontrolled), external (controlled), and conditionally controlled categories. External factors often act as triggers of disease exacerbations, with biological and social factors having the greatest clinical relevance. Biological factors contributing to AD include exoallergens, which comprise non-infectious agents (household, epidermal, pollen, food, industrial) as well as infectious agents (bacterial, fungal, and viral). Based on routes of exposure, allergens may be classified as food-related, airborne, injectable, or contact. Interaction between internal factors, such as hereditary predisposition to allergic reactions, and external factors, including prolonged exposure and excessive antigenic load, leads to sensitization and the development of allergic inflammation. Another pathogenic combination involves reduced hereditary tolerance to psychological stress together with external stressors, resulting in neurogenic inflammation and characteristic skin changes seen in AD [13–15]. Studies have demonstrated a positive correlation between stress levels and serum eosinophil counts and IgE concentrations, as well as a significantly higher prevalence of anxiety and depressive disorders in patients with AD compared to healthy control subjects [16, 17]. Chronic stress contributes to dysfunction of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis, exerts immunosuppressive effects, inhibits cellular immunity, and shifts immune responses toward Th2 dominance [18, 19]. Various combinations of external factors ultimately determine the severity and frequency of AD exacerbations. In recent years, the role of food allergy in the development of

atopic dermatitis has been actively discussed. If in early childhood it really plays a key role (approximately 30-40% of children with moderate to severe AD have proven sensitization to food allergens), then in older age, in adolescents, there is no connection between the exacerbation of the disease and the consumption of food even obligate allergens. Unjustified restriction of children's nutrition can lead in these cases to a violation of their quality of life and exacerbation of dermatitis due to the chronic stress that develops in the child. Treatment of children with advanced forms of AD is a complex task. This is due not only to the clinical polymorphism of the disease and the involvement of various organs and systems in the pathological process, but also to the early onset of AD (in the first months of life), when the doctor's choice is limited to a certain number of medications used at this age that can stop the symptoms of the disease, as well as the risk of developing systemic side effects with uncontrolled use of hormonal drugs. anti-inflammatory external medications. AD therapy is based on a specific plan and includes: diet therapy, systemic pharmacotherapy (antihistamines, enterosorbents), external therapy (antiseptic external agents, corticosteroids, nonsteroidal drugs), in rare cases, immunosuppressive therapy (cyclosporin A). After achieving remission of the disease, anti-relapse treatment with membrane stabilizers (ketotifen for children under 6 years of age) is used, cosmetics are constantly applied to the skin to soften the skin. Therapeutic nutrition of children with AD is based on an individual plan based on age, clinical manifestations of allergies, the spectrum of sensitization detected, the nutritional status of the patient and the functional state of the digestive system. The main principle of diet therapy in the period of severe clinical manifestations of the disease is elimination diets. At the same time as elimination measures, an extremely important point is the adequate replacement of eliminated products with natural or specialized ones, since regardless of the period of illness, the diet should meet the child's physiological needs for energy, basic nutrients and micronutrients [20, 21]. In cases where the child is on natural or mixed feeding, breast milk is kept in the maximum volume, and the nursing mother is prescribed a hypoallergenic diet. If there is a lack or absence of breast milk, it is important to choose the right formula. According to current recommendations, in the period of severe clinical manifestations of allergies (acute period of AD, gastrointestinal manifestations – blood and mucus in the stool, abdominal pain, regurgitation) if there is a confirmed allergy to cow's milk proteins, it is advisable to prescribe therapeutic mixtures based on highly hydrolyzed milk protein, which is practically devoid of antigenic properties, or amino acid mixtures [40, 41]. External therapy is the gold standard for treating AD. The search for the causes of acute AAD sometimes delays the appointment of external treatment. Without it, the inflammatory process progresses, the skin is colonized by Staphylococcus aureus strains that have a toxin producing properties, which can lead to various serious consequences. External treatment of chronic skin inflammation is a complex task. Patients are prescribed fluoridated corticosteroids containing drugs with an antibiotic for a short period of time to stop inflammation and reduce the degree of colonization of the affected skin with Staphylococcus. After 10-14 days, treatment

is stopped, using further drugs of the middle class of biological activity. In cases of severe disease with severe exacerbations of the disease, systemic therapy with corticosteroids is resorted to. Most often, the question of their appointment arises when the SCORAD index, which characterizes the severity of AD exacerbation, exceeds 60. Treatment with systemic corticosteroids in children and adolescents with severe AD is carried out at a dose not exceeding 1.5 mg per 1 kg of body weight of the child once a day for 3-5 days, by parenteral (intramuscular) administration. In rare cases, systemic corticosteroids are administered orally; usually, the decision to use this method of treatment is made by a council of specialists [22, 23,29]. In such cases, the dose of prednisone is 1 mg / kg /day, which allows you to achieve the maximum anti-inflammatory effect. On the one hand, it is necessary to achieve remission of AD quickly enough, and on the other hand, to eliminate the risk of serious side effects both during treatment and after its termination. The use of antihistamines in the period of acute AD is pathogenetically justified. Over the long period of existence of these medicines on the pharmaceutical market (since the middle of the last century), a rich positive experience has been accumulated. In practice, first-and second-generation drugs are used. First generation drugs, along with antihistamines, have antiseroton in activity, anabolic effect and are allowed for children starting from the first month of life. Short courses of treatment (up to 14 days) are usually recommended during acute AD [24]. Antihistamines are prescribed to young children, sick adolescents often draw the doctor's attention to the fact that this group of drugs does not help them. This is due to the fact that in the development of pruritus in older children, it is not histaminoliberation of mast cells that takes part, but neurogenic inflammation. The use of anxiolytics in severe cases helps the child avoid sleepless nights and improve the quality of life. External treatment is based on anti-inflammatory drugs containing corticosteroids and external catsineurin inhibitors: pimecrolimus and tacrolimus. External treatment of corticosteroids is carried out in stages, using corticosteroids with high biological activity when the severity of the clinical course of the disease increases in the acute period of the disease, followed by the use of drugs with lower activity when the inflammatory process subsides [25]. The mechanism of action of immunosuppressive drugs is associated with the suppression of calcineurin, a molecule necessary to trigger the transcription of pro – inflammatory cytokine genes. In the USA, Europe, and Russia, topical calcineurin inhibitors are widely used in children's practice; extensive experience in their use has been accumulated abroad. In Russia, pimecrolimus 1% cream is approved for use in children from three months of age (in the USA and Europe - from two years). The cream is used only in the moderate course of AD and only as a second line of therapy when the treatment of corticosteroids is ineffective. Tacrolimus ointment 0.03% has been successfully introduced into the treatment regimen for AD in various countries (it was introduced in Russia in April 2011) and, like CORTICOSTEROIDS, it is used for both moderate and severe cases of the disease, since it has a greater anti-inflammatory effect than pimecrolimus [26]. A 6-week course of treatment in the acute period is recommended, followed by its appointment during remission 2 times

a week. Systemic antibacterial therapy is carried out only in cases of complicated course of AD, with infection with St.. aureus. The drugs of choice include macrolide preparations, clarithromycin 250 mg 2 times a day. Usually, the course of treatment is 7-10 days. Plasmapheresis and systemic immunosuppressive therapy are rarely performed and only in patients with severe forms of AD in the absence of a positive effect of traditional therapy. During plasmapheresis , it is recommended to remove 30-40% of the circulating plasma volume per session; 3 sessions are performed, 1 time in 4 days; plasma is replaced with protein solutions [27,37]. Systemic immunosuppressive therapy is carried out with cyclosporine A, which belongs to the group of drugs for which the correct choice of the drug dose is critically important due to the risk of developing severe side effects if the therapeutic dose is exceeded, and the low effectiveness of therapy with an insufficient dose of cyclosporine A. Usually prescribed from 2.5 to 5 mg/kg/day in two doses. The minimum course of treatment is 6 weeks, the maximum is 12 months. The usual course of treatment is 12 weeks. During treatment, the level of creatinine, liver enzymes, and electrolytes is monitored, and blood pressure is measured daily [28-30,39]. Recently, there have been data on conducting phase III clinical trials of the biological therapy drugdupilumab, which has shown its high effectiveness in the treatment of moderate and severe forms of AD in adults. Dupilumab is a biologic drug based on monoclonal antibodies directed against the interleukin-4 alpha subunit receptor (IL-4RA). Through this effect, it blocks Th2-lymphocyte (Th2) production of IL4 and IL-13, which play a key role in the pathogenesis of atopic dermatitis

LITERATURE

1. Saroyan A. S., Silina L. V. [Electronic resource] Clinical and immunological features of atopic dermatitis in children of early age / Kursk State Medical University / / Kursk scientific and practical bulletin "Man and his health". 2011. No. 1. URL www.kursk-vestnik.ru (accessed on 16.02.2017).
2. Revyakina V. A., Filatova T. A. [Electronic resource] From atopic dermatitis to bronchial asthma in children / Revyakina V. A., Filatova T. A. / / Medical scientific and practical Journal "Lechashchy vrach", 2006, No. 1. URL www.lvrach.ru (accessed on 16.02.2017).
3. Мухамедова Ш. Т. и др. Внутрибольничная инфекция у новорожденных детей //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 3 (50). – С. 75-86.
4. Мухамедова Ш. Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. – 2020.
5. Мухамедова Ш. Т., Юлдашева Г. Г. Состояние материнского организма-предиктор развития неонатальной дезадаптации новорожденных //Global science. Development and novelty. – 2016. – С. 37-39.
6. Мухамедова Ш., Гайбиева Ш. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа у новорожденных //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 67-70.

7. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИИ У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 9-10.
8. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИИ У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 9-10.
9. Мухамедова Ш., Бахронова Д. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ССВО У НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 117-120.
10. Мухамедова Ш. Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. – 2020.
11. Mukhamedova S. T. The prognostic significance of cytokines in the diagnosis of pathology of newborns. /Shakhnoza T. Mukhamedova, Dilnoza R. Hamraeva, Fazolat A. Karomatova //Journal of Natural Remedies. – 2021. – №. 1 (1). – С. 119.
12. Мухамедова Ш., Гайбиева Ш. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа у новорожденных //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 67-70.
13. Мухамедова Ш., Мухитдинов Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 8-10.
14. Mukhamedova S. T., Navruzova S. I. INFLUENCE OF THE STATE OF METABOLISM OF THE MATERNAL ORGANISM ON THE FORMATION OF NEPHROPATHIES IN NEWBORNS //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 3.
17. Khodzhaeva D. I. Changes in the Vertebral Column and Thoracic Spinecells after Postponement of Mastoectomy //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 109-113.
18. Khodjayeva D. I. MORPHOLOGY OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS BASED ON SEGMENT BY SEGMENT ASSESSMENT OF SPINAL COLUMN DEFORMITY //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 208-215.
20. Ходжаева Д. И. Современные возможности ультразвуковой диагностики рака кожи лица //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 25 (150). – С. 21-24.
21. Aslonov S. G. et al. Modern Approaches to Oropharyngeal Cancer Therapy //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 38-39.
22. Khodjayeva D. I. MORPHOLOGY OF IDIOPATHIC SCOLIOSIS BASED ON SEGMENT BY SEGMENT ASSESSMENT OF SPINAL COLUMN DEFORMITY //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 208-215.

23. Khodjaeva D. I. Magnetic-resonance imaging in the diagnosis of breast cancer and its metastasis to the spinal column //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 540-547.
25. Khodzhaeva D. I. Modern Possibilities of Ultrasounddiagnostics of Skin Cancer //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 101-104.
27. Fatullayeva B. O. New Covid-19 Coronavirus Infection in the Practice of a Neonatologist and Pediatrician //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 227-235.
28. Fatullayeva B. O. FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH COVID-19 INFECTION //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 39-47.
29. Qurbanov M.K. Clinical features and assessment of laboratory and instrumental indicators of acute suppurative otitis media developed against the background of type 1 diabetes mellitus. A New Day in Medicine. Bukhara, 2025; No. 1 (75): 513–516. (14.00.00; No. 22)
30. Nurov U.I., Qurbanov M.K. Assessment of the immune system status and immunological changes in acute suppurative otitis media. Eurasian Journal of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery. Bukhara, 2024; No. 3 (3): 51–55. (Letter of the Presidium of the Higher Attestation Commission dated April 6, 2024, No. 353/6)

Valiyeva M.U.
kata o'qituvchisi
Epidemiologiya kafedrasi
Davolash ishi fakulteti talabalari:
Samiyev D.X.
Musaylamov T.N.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PARAZITLAR GENOTIPIK XILMA-XILLIGINING POPULYATSIYALARARO TARQALISH DINAMIKASIDAGI ROLI: MOLEKULYAR-EPIDEMIOLOGIK YONDASHUV

Annotatsiya: *Ushbu maqolada parazitar agentlarning genotipik polimorfizmi va ularning turli geografik populyatsiyalararo tarqalish dinamikasi o'rtasidagi bog'liqlik molekulyar-epidemiologik jihatdan tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida parazit DNKsining mitoxondrial (cox1, nad1) va yadroviy markerlari yordamida genetik xilma-xillik ko'rsatkichlari (H_d, π) hamda populyatsiyalararo genlar oqimi (N_m) tahlil qilindi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, genotipik xilma-xillik darajasi yuqori bo'lgan o'choqlarda parazitning yangi xo'jayin turlariga moslashishi va dori vositalariga rezistentligi (chidamliligi) sezilarli darajada tezlashadi. Matematik modellashtirish orqali parazit genotiplarining migratsiya vektorlari va epidemik xavf darajasi bashorat qilingan. Tadqiqot xulosalari parazitar kasalliklarni nazorat qilishda molekulyar monitoring tizimini joriy etish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *parazitologiya, genotipik polimorfizm, mitoxondrial markerlar, cox1, nad1, genlar oqimi (N_m), dori rezistentligi, molekulyar monitoring.*

Valiyeva M.U.
senior teacher
Department of Epidemiology
Samiev D. Kh.
student
Musaylamov T.N.
student
Faculty of Medicine
Samarkand State Medical University

ROLE OF GENOTYPIC DIVERSITY OF PARASITES IN THE DYNAMICS OF INTER-POPULATION TRANSMISSION: A MOLECULAR-EPIDEMIOLOGICAL APPROACH

Abstract: *This paper investigates the relationship between the genotypic polymorphism of parasitic agents and their inter-population distribution dynamics using a molecular-epidemiological approach. Genetic diversity indices (H_d, π) and*

gene flow (N_m) were analyzed that high genotypic diversity within foci significantly accelerates parasite adaptation to new host species and enhances drug resistance. Through mathematical modeling, migration vectors of parasite genotypes and epidemic risk levels were predicted. The findings provide a scientific basis for implementing molecular surveillance systems in the control and prevention of parasitic diseases.

Keywords: *parasitology, genotypic polymorphism, mitochondrial markers, cox1, nad1, gene flow (Nm), drug resistance, molecular monitoring*

Kirish. Zamonaviy tibbiyot va veterinariya parazitologiyasi oldida turgan eng murakkab muammolardan biri — parazitar agentlarning o‘zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga va antropogen ta’sirlarga yuqori darajada moslashuvchanligidir. Ushbu mavzuning dolzarbligi quyidagi bir necha fundamental va amaliy omillar bilan belgilanadi:

Global iqlim o‘zgarishi va areal kengayishi: Sayyoramizdagi haroratning ko‘tarilishi ilgari faqat tropik va subtropik mintaqalarga xos bo‘lgan parazitlar va ularning tashuvchilari (chivinlar, kanalar, mollyuskalar) areallarining shimoliy kengliklarga qarab siljishiga sabab bo‘lmoqda. Bu esa parazitlarning yangi geografik populyatsiyalari shakllanishiga va genetik drift (genlar dreyfi) natijasida yangi genotiplarning paydo bo‘lishiga zamin yaratmoqda.

- **Antgelmintik rezistentlik muammosi:** Ko‘p yillar davomida parazitlarga qarshi bir xil turdagi kimyoviy preparatlarning qo‘llanilishi populyatsiyalar ichida kuchli selektiv bosimni yuzaga keltirdi. Natijada, dori vositalariga chidamli genotiplar ajralib chiqmoqda. Parazit agentlarning genetik polimorfizmini o‘rganish, qaysi hududlarda "rezistent genlar" to‘planib qolganini va ularning tarqalish tezligini aniqlash imkonini beradi.
- **Molekulyar-epidemiologik monitoringning zaruriyati:** An’anaviy morfologik usullar parazit turlari ichidagi genetik xilma-xillikni va mikroturli o‘zgarishlarni aniqlashda yetarli emas. Zamonaviy molekulyar markerlar (masalan, mitoxondrial $cox1$ va $nad1$ genlari) parazitning "molekulyar imzosini" aniqlashga yordam beradi. Bu esa kasallik o‘choqlarining kelib chiqish manbasini (infeksiya qayerdan kelganini) va uning tarqalish yo‘nalishlarini (migratsiya vektorlarini) aniq belgilash imkonini beradi.
- **Xo‘jayin-parazit tizimidagi evolyutsion siljishlar:** Parazitlarning yuqori genotipik polimorfizmi ularga o‘zining immunogenlik xususiyatlarini o‘zgartirish orqali xo‘jayin (odam yoki hayvon) immun tizimidan qochish imkonini beradi. Genetik xilma-xillik qanchalik yuqori bo‘lsa, parazitning yangi xo‘jayin turlariga (zoonoz infeksiyalarning odamga o‘tishi) moslashish ehtimoli shunchalik ortadi..

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot ishi 2022–2025-yillar davomida turli geografik va ekologik mintaqalardan yig‘ilgan parazitologik namunalar asosida olib borildi. Metodologiya parazitning genomik fragmentlarini ajratishdan tortib, matematik modellashtirishgacha bo‘lgan bosqichlarni qamrab oladi.

Namunalar yig'ish va taksonomik identifikatsiya: Tadqiqot uchun material sifatida turli lan dshaft-iqlim zonalaridan (tekislik, tog‘ va tog‘oldi hududlari) jami 500 dan ortiq parazit namunalari yig‘ildi.

- **Identifikatsiya:** Namunalar dastlab an'anaviy mikroskopik va morfometrik usullar yordamida taksonomik tahlil qilindi.
- **Saqlash:** Genetik tahlil uchun ajratilgan namunalar 96% li etil spirtida yoki -80°C haroratda suyuq azotda konservatsiya qilindi.

Genomik DNKni ajratish va markerlarni tanlash: DNKni ekstraktsiya qilish "CTAB" usuli yoki maxsus tijorat to‘plamlari (masalan, Qiagen DNeasy) yordamida amalga oshirildi. Ajratilgan DNKning kontsentratsiyasi va tozaligi spektrofotometrik usulda (NanoDrop) tekshirildi.

Tadqiqotda quyidagi genetik markerlar tanlab olindi:

- **cox1 va nad1:** Mitoxondrial DNKning ushbu fragmentlari parazitlar o‘rtasidagi filogenetik aloqalarni va populyatsiyalararo migratsiyani o‘rganish uchun ishlatildi.
- **ITS1 va ITS2:** Yadro DNKning ushbu hududlari turlararo va tur ichidagi variatsiyalarni aniqlashga xizmat qildi.

Polimeraza zanjirli reaktsiyasi (PCR) va Sekvenirlash: Tanlangan gen fragmentlarini ko‘paytirish uchun maxsus praymerlar yordamida PCR reaktsiyasi o‘tkazildi. Reaktsiya aralashmasi va termotsikllash tartibi (denaturatsiya, praymerlarning birikishi va elongatsiya) har bir marker uchun optimallashtirildi.

- **Vizualizatsiya:** PCR mahsulotlari 1.5% li agaroza gel-elektroforezida tekshirildi.
- **Sekvenirlash:** Sifatli amplikonlar Sanger usuli bo‘yicha avtomatik sekvenatorda tahlil qilindi.

Bioinformatik va Statistik tahlil: Olingan nukleotid ketma-ketliklari "BioEdit" va "MEGA" dasturlari yordamida tahrir qilindi va xalqaro ma'lumotlar bazasi (GenBank) bilan solishtirildi.

- **Genetik xilma-xillik:** Haplotip (H_d) va nukleotid (π) xilma-xilligi "DnaSP v6" dasturi orqali hisoblandi.
- **Populyatsiyalararo struktura:** Genlar oqimi (N_m) va tabaqalanish indeksi (F_{st}) "Arlequin" dasturi yordamida tahlil qilindi.
- **Modellashtirish:** Parazitlarning geografik tarqalish dinamikasi va dori rezistentligi ehtimoli "MaxEnt" va Bayes tahlili asosida matematik modellashtirildi.

Tadqiqot natijasi va muhokamasi. Tadqiqot davomida turli geografik hududlardan olingan parazit izolyatlarining molekulyar tahlili ularning genetik strukturasi va dori vositalariga sezgirligi o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri korrelyatsiya mavjudligini ko‘rsatdi.

Genetik xilma-xillik va Wright fiksatsiya indeksi (F_{st}): Populyatsiyalararo genetik differensiallanish darajasini aniqlash uchun Wrightning fiksatsiya indeksi (Fst) hisoblab chiqildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ayrim hududlar o‘rtasidagi genetik masofa minimal (Fst<0.05), bu esa ushbu hududlar orasida parazitlar almashinuvi juda faolligini anglatadi.

Genlar oqimi (N_m) quyidagi formula yordamida aniqlandi: $N_m=1-F_{st}/4F_{st}$

Tahlillar natijasida aniqlangan N_m>1.0 ko‘rsatkichi populyatsiyalar orasida genetik bir xillikni saqlab turuvchi migratsion jarayonlar mavjudligini tasdiqlaydi. Bu, ayniqsa, chorva mollari va odamlar migratsiyasi yuqori bo‘lgan tranzit hududlarda yaqqol namoyon bo‘ldi.

Antigelmintik rezistentlikning genetik determinatsiyasi: Dori vositalariga (masalan, benzimidazollar) chidamlilik darajasi yadroviy DNKdagi beta-tubulin geni mutatsiyalari bilan solishtirildi. Matematik modellashtirish natijasida quyidagilar aniqlandi:

- **Polimorfizm yuqori bo‘lgan nuqtalarda:** Rezistentlikni belgilovchi allellarning tarqalish tezligi nazorat guruhlariga nisbatan **35-40%** ga yuqori.
- Haplotip xilma-xilligi (H_d): H_d>0.85 bo‘lgan o‘choqlarda parazitlar yangi dori vositalariga 2-3 yil ichida adaptatsiya hosil qilishi bashorat qilindi.

Migratsiya vektorlari va epidemik xavf tahlili: Bayes algoritmlari asosida parazit genotiplarining tarqalish yo‘nalishlari (vectors) vizuallashtirildi. Tadqiqot hududidagi markaziy nuqtalardan biri "genetik donor" vazifasini o‘tab, atrof hududlarga dori vositalariga chidamli shtammlarni tarqatayotgani ma'lum bo‘ldi.

$P(G|M)= P(M|G)P(G)/ P(M)$ Bu yerda G — genotipik variant, M — geografik migratsiya ehtimolligi. Ushbu formula yordamida epidemik xavf darajasi yuqori bo‘lgan "issiq nuqtalar" (hotspots) aniqlandi.

Xulosa: Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, parazitlarning faqat fenotipik ko‘rsatkichlariga (masalan, tuxum miqdori) qarab xulosa chiqarish epidemiologik jihatdan xatodir. Genetik tahlil bizga parazitning "yashirin imkoniyatlarini" — uning kelajakdagi dori vositalariga chidamliligini va yangi xo‘jayinlarga o‘tish potentsialini ko‘rib chiqish imkonini berdi. Yuqori genlar oqimi (Nm) sharoitida bir hududda o‘tkazilayotgan noto‘g‘ri davolash choralari qo‘shni hududlar uchun ham "genetik xavf" tug‘diradi. Ushbu tadqiqot parazitar agentlarning genotipik polimorfizmi va ularning geografik tarqalish dinamikasi o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni molekulyar-epidemiologik jihatdan isbotlab berdi. Olingan natijalar va tahlillar asosida quyidagi fundamental xulosalarga kelindi:

Genetik xilma-xillik — adaptatsiyaning asosi: Tadqiqot davomida aniqlangan yuqori darajadagi haplotip xilma-xilligi (H_d > 0.80) parazit populyatsiyalarining tashqi muhit bosimiga, ayniqsa antgelmintik preparatlarning selektiv ta’siriga nisbatan yuqori darajada moslashuvchan ekanligini ko‘rsatdi. Mitoxondrial markerlar (cox1, nad1) parazitning nafaqat joriy holatini, balki uning evolyutsion o‘tmishi va kelajakdagi tarqalish tendensiyalarini aniqlashda eng ishonchli vosita ekanligi o‘z tasdig‘ini topdi.

Genlar oqimi va migratsion xavf-xatarlar: Populyatsiyalararo genlar oqimi (N_m > 1.0) tahlili geografik jihatdan uzoq bo‘lgan o‘choqlar o‘rtasida ham faol genetik almashinuv mavjudligini ko‘rsatdi. Bu holat parazitlarning nafaqat tabiiy migratsiya (yovvoyi hayvonlar orqali), balki antropogen omillar — chorva mollari savdosi va aholi migratsiyasi orqali ham shiddat bilan tarqalayotganidan dalolat beradi. Wright fiksatsiya indeksining (F_{st}) past ko‘rsatkichlari turli hududlardagi parazitlar genetik jihatdan bir-biriga yaqinlashayotganini va bu dori

vositalariga chidamli "global shtammlar" shakllanishi uchun zamin yaratayotganini ko‘rsatadi.

Dori rezistentligini bashorat qilish: Matematik modellashtirish natijalari shuni tasdiqladiki, genetik polimorfizm darajasi yuqori bo‘lgan o‘choqlarda parazitlarning dori vositalariga rezistentligi (chidamliligi) genetik jihatdan barqaror populyatsiyalarga nisbatan 2 baravar tezroq shakllanadi. Bu esa parazitar kasalliklarga qarshi kurashda bir xil (shablon) davolash usullaridan voz kechib, har bir hududning genetik profiliga asoslangan individual (differensial) yondashuvni talab etadi.

Molekulyar monitoringning amaliy ahamiyati: Tadqiqot xulosalari sog‘liqni saqlash va veterinariya tizimiga zamonaviy **"Molekulyar monitoring"** tizimini joriy etish zarurligini ilmiy asoslab beradi. Bunday monitoring tizimi parazitning tarqalishini u klinik oqibatlarga yoki ommaviy epidemiya darajasiga yetmasidan ancha oldin, ya’ni genetik darajada aniqlash va epidemik xavfni kamida 1.5–2 yil oldin bashorat qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, parazit genomidagi mikroturli o‘zgarishlarni tahlil qilish zamonaviy epidemiologiyaning eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u parazitar kasalliklar ustidan to‘liq biologik nazorat o‘rnatishning va samarali dori vositalarini ishlab chiqishning yagona ilmiy yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Thompson, R. C. A.** (2017). *Molecular Epidemiology of Parasitic Diseases*. CRC Press, Taylor & Francis Group. (Parazitar kasalliklar molekulyar epidemiologiyasi bo‘yicha fundamental qo‘llanma).
2. **Archie, E. A., & Ezenwa, V. O.** (2011). Population genetic structure and history of a generalist parasite: helminth genetics in a dynamic host environment. *Molecular Ecology*, 20(10), 2134-2147.
3. **Anderson, T. J.** (2001). The molecular epidemiology of anthelmintic resistance: overcoming the problems of genetics, population biology and sample size. *Expert Reviews in Molecular Medicine*, 3(19), 1-17.
4. **Criscione, C. D., Anderson, J. D., & Blouin, M. S.** (2005). Molecular genetics of helminth parasites: real world approaches to genome-wide analyses. *Trends in Parasitology*, 21(10), 445-450.
5.**Excoffier, L., & Lischer, H. E.** (2010). Arlequin suite ver 3.5: a new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows. *Molecular Ecology Resources*, 10(3), 564-567. (Genetik tahlil dasturlari metodologiyasi).
6. **Rozas, J., et al.** (2017). DnaSP v6: DNA Sequence Polymorphism Analysis of Large Data Sets. *Molecular Biology and Evolution*, 34(12), 3299-3302.

UDC 616.381-002-036.17-089:616.34-008.6:338.45

Yusupov T.A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Salikhov D.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

ECONOMIC SUSTAINABILITY OF PRECISION-GUIDED HEMIHEPATECTOMY

Annotation. *This article has examined the dual aspects of economic efficiency and technological advancements in hemihepatectomy (half-liver resection). We reviewed current evidence on clinical outcomes, costs, and the impact of modern innovations such as laparoscopic and robotic surgery, advanced imaging/navigation, and ERAS protocols. The findings indicate that minimally invasive techniques (laparoscopic and robotic hemihepatectomies) achieve equivalent or better clinical results compared to the open approach – including shorter recovery times, similar or lower complication rates, and maintained oncological effectiveness. Economically, laparoscopic surgery is shown to be cost-effective, yielding improved quality of life and faster return to work for a modest increase in direct costs. Robotic surgery, while incurring higher intraoperative expense, can offset costs by reducing hospital stays and complications, particularly in complex cases. Enhanced recovery programs further contribute to cost reduction and efficient care by accelerating patient convalescence. Technological innovations such as 3D planning, fluorescence-guided resection, and better transection devices have improved surgical precision and safety, translating into fewer postoperative interventions and complications. In summary, modern advancements in surgical hepatology have made hemihepatectomy safer and more patient-friendly, while also delivering high value. Hospitals that invest in these technologies and protocols often see acceptable or improved cost-benefit outcomes, as savings from shorter hospitalizations and avoided complications counterbalance the upfront expenditures. The continued evolution of surgical techniques – guided by rigorous outcome and cost evaluations – is essential to further enhance the efficacy and efficiency of liver cancer surgery.*

Keywords. *hemihepatectomy; liver resection; cost-effectiveness; laparoscopic surgery; robotic surgery; surgical technology; enhanced recovery; liver surgery outcomes*

Hemihepatectomy – the surgical removal of approximately half of the liver (right or left lobe) – is a cornerstone treatment for various liver tumors, including

hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma, and colorectal liver metastases. This procedure is highly relevant in modern surgical hepatology as it offers the chance of cure or long-term survival for patients with otherwise lethal liver malignancies. Over the past several decades, there have been dramatic improvements in the safety and outcomes of liver resections, thanks to advances in surgical techniques, perioperative care, and technology. Early in the 20th century, major hepatectomies carried prohibitive risks, but today, in high-volume centers, the perioperative mortality for elective hemihepatectomy is often in the low single digits (on the order of 2–5%). This progress is attributable to better understanding of liver anatomy, improved anesthesia and critical care, refined surgical skills, and innovations such as vascular control methods and parenchymal transection devices. Patients who were once deemed unresectable can now be offered surgery with curative intent, reflecting the evolving capabilities of hepatic surgery.

In addition to clinical outcomes, the economic impact of hemihepatectomy has become increasingly important. Liver surgeries are resource-intensive, involving prolonged operative time, advanced equipment, and specialized postoperative care. The costs to healthcare systems are significant, and there is a growing need to ensure that innovations in surgical technique also translate into cost-effective care. For instance, the adoption of minimally invasive approaches (laparoscopic and robotic hepatectomy), while improving patient recovery, must be justified by overall value. Economic efficiency in this context refers to achieving the best possible clinical outcomes (e.g. higher survival or quality of life) per unit cost, or even reducing costs without compromising outcomes. Stakeholders – including hospitals, insurers, and patients – are interested in whether new surgical technologies actually reduce hospital stay, complications, and downstream expenses. Thus, the topic of how technological advancements influence both the clinical outcomes and the cost-benefit profile of hemihepatectomy is highly pertinent. With liver cancer incidence rising globally and more patients eligible for surgical intervention, optimizing both the effectiveness and the efficiency of hemihepatectomy has broad implications for healthcare systems.

Modern surgical hepatology has seen a surge of innovations: laparoscopic liver resection (LLR) has become widely performed for minor resections and is increasingly applied to major resections (right/left hemihepatectomies); robot-assisted surgery offers enhanced dexterity for complex liver resections; advanced imaging techniques (3D reconstructions, intraoperative ultrasound, fluorescence imaging) and navigation systems are being integrated to guide precise tumor removal; and perioperative care pathways like Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) are shortening recovery time. All these advancements aim to improve patient outcomes such as lower morbidity, faster return to normal activity, and improved survival – but they also come with costs (e.g. expensive equipment, training requirements). Evaluating the cost-effectiveness of these innovations is essential for evidence-based adoption. In summary, the relevance of this topic lies in its dual focus: ensuring that technological progress in hemihepatectomy translates

into tangible health benefits while also maintaining or improving the economic efficiency of care delivery.

The objective of this research is to analyze and evaluate the economic efficiency and technological advancements in hemihepatectomy, with a focus on recent evidence from modern surgical practice. Specifically, this article aims to:

Materials and Methods. This article is structured as a narrative review and analysis. We gathered information from a wide range of sources, including clinical trials, systematic reviews, retrospective studies, and meta-analyses related to hemihepatectomy, published in the last 10–15 years. Particular emphasis was placed on studies published since 2020 to capture recent advancements in technology and their impacts on clinical practice and economics in liver surgery. Key sources of data included:




Figure 1: Segmental anatomy of the liver showing the functional left and right hemilivers divided by Cantlie's line (middle hepatic vein). Understanding this anatomy is fundamental for planning hemihepatectomy resections

Literature searches were conducted on databases such as PubMed, PMC, and Google Scholar using keywords like "hemihepatectomy", "laparoscopic liver resection cost", "robotic liver surgery economics", "liver resection outcomes", and "ERAS liver surgery". Articles were screened for relevance to economic or technological aspects. We also manually searched reference lists of pertinent papers (snowball method) to identify additional studies. For the technological advancements section, we included not only clinical outcome studies but also engineering and feasibility studies to cover emerging tools.

Extracted data were organized into thematic categories: (1) Clinical outcomes of hemihepatectomy by surgical approach; (2) Cost and cost-effectiveness comparisons; (3) Technological innovations (with subtopics like minimally invasive surgery, imaging/navigation, and perioperative protocols). Within each category, we

synthesized quantitative outcomes (e.g. complication rates, cost figures) and qualitative insights (e.g. surgeon learning curve considerations, system-level implications). We present results in a combination of text, tables, and figures for clarity. Three tables summarize key data (outcomes comparison, cost breakdowns, and impacts of specific technologies), and three charts illustrate important comparisons (such as cost differences and recovery times). Three illustrative figures are included to help visualize anatomical and technological points.

No new patient data were collected for this article; all analyses are based on published literature (thus IRB approval was not required). Where numerical data from studies are reported, we provide citations to the original source. Cost figures are presented in original currency (with context if needed, e.g. Euros for European studies, US dollars for American studies). For consistency, when discussing "economic efficiency", we interpret it in terms of cost relative to outcomes (e.g. cost per QALY or overall cost savings with equal outcomes).

By combining evidence from multiple high-quality sources and recent studies, this review method allows a comprehensive overview of the current state of economic and technological considerations in hemihepatectomy. Any limitations (such as heterogeneity between studies, differences in healthcare systems affecting costs) are acknowledged in the discussion. The results below integrate these findings, and the discussion interprets their significance in the context of modern liver surgery.

Results and Discussion. The advent of laparoscopic techniques has significantly influenced patient recovery and outcomes in liver surgery. The ORANGE II PLUS randomized trial provides robust evidence in the context of hemihepatectomy. In this international multicenter RCT, 332 patients were randomized to laparoscopic hemihepatectomy (LH) or open hemihepatectomy (OH). The laparoscopic approach demonstrated a shorter time to functional recovery: median 4 days vs 5 days with open surgery ($p < 0.001$). This metric of "functional recovery" typically includes factors like pain control, mobilization, and resumption of oral intake, so a one-day improvement is clinically meaningful. Importantly, this faster recovery did not come at the cost of higher morbidity – the rate of major complications was similar between laparoscopic and open groups (approximately 14.5% vs 16.9%, $p = 0.58$, no significant difference). Oncologic efficacy was preserved as well: in patients with malignancies, R0 resection (negative margin) rates were equivalent (about 78% vs 84%, $p = 0.14$), indicating that the minimally invasive approach did not compromise tumor clearance. Short-term mortality was low in both arms (around 3% 90-day mortality in each, with no difference) – reflecting the general safety improvements in modern liver surgery.

The laparoscopic group showed distinct advantages in patient-centered outcomes. Health-related quality of life (qol) scores, measured by standardized questionnaires, were better after laparoscopic surgery: global health status was higher by a small but significant margin in the LH group. Patients also reported better body image in the minimally invasive group (as expected, due to smaller incisions). Additionally, for those with cancer, laparoscopic surgery enabled earlier

initiation of adjuvant chemotherapy – a median of ~46 days post-op vs ~63 days after open surgery (a difference of over two weeks). This is a crucial finding: delays to chemotherapy can adversely affect oncologic outcomes, so the ability to start systemic therapy sooner is a potential long-term benefit of the laparoscopic approach.

Beyond the trial data, numerous observational studies and meta-analyses have echoed these trends. Laparoscopic liver resection in general is associated with less postoperative pain, lower incidence of wound complications (e.g. Infections or hernias), and shorter hospital stays. A systematic review noted that laparoscopic liver resections had a significantly shorter length of hospital stay compared to open resections (by roughly 2–3 days on average) in multiple studies. Major liver resections (like hemihepatectomies) performed laparoscopically remain a challenging endeavor (requiring significant expertise), but experienced centers have reported favorable outcomes: low conversion rates to open surgery and perioperative mortality under 5%, even for complex laparoscopic hepatectomies.

Robotic Hemihepatectomy: Robotic-assisted surgery is an extension of minimally invasive technique that has gained traction in hepatobiliary surgery. The robotic platform (e.g. The da Vinci Surgical System) addresses some limitations of straight laparoscopy by providing articulated instruments, magnified 3D vision, and improved ergonomics for the surgeon. These enhancements can be particularly useful in liver resections of the postero-superior segments and other challenging locations that are difficult to visualize or access laparoscopically. According to recent multicenter analyses, robotic liver surgery (RLS) offers comparable or improved perioperative outcomes relative to open and even laparoscopic approaches. In a 2024 study by Ingallinella et al., which compared 47 robotic, 101 laparoscopic, and 124 open major liver resections, both minimally invasive modalities (robotic and laparoscopic) showed reduced intraoperative blood loss, lower overall complication rates, and shorter hospital stays compared to open surgery. The robotic group had zero 90-day mortality in that series, whereas open surgery had a small number of mortalities – suggesting at least equivalent safety, if not an advantage for RLS in experienced hands.

One notable observation was that the robotic approach achieved a lower conversion rate (fewer cases needing to switch to open) compared to laparoscopy in this context. This implies that the robot's technical advantages (wristed instruments, better stability) can enable surgeons to complete minimally invasive resection even in anatomically difficult cases that might otherwise require conversion when done laparoscopically. As a result, robotic surgery expands the range of patients who can benefit from minimally invasive hepatectomy, including some with large posterior tumors or cirrhotic livers where delicate dissection is needed. The trade-off is that robotic surgery tends to have longer operative times and higher intraoperative resource utilization (discussed further under economics). Nevertheless, the study concluded that robotic liver resection "offers economic advantages over open" in that the better perioperative outcomes (fewer complications, shorter length of stay) offset the higher upfront costs. It also emphasized that as the technology matures

and becomes more widely available, the cost of robotic instrumentation is expected to decrease, potentially making RLS more routinely cost-effective.

In terms of long-term outcomes like survival or oncologic clearance, data are still maturing. Early reports indicate that robotic and laparoscopic approaches do not compromise oncological efficacy for malignant tumors, provided the surgical principles (achieving negative margins, proper lymphadenectomy when needed) are adhered to. Ongoing trials and registries will better clarify any differences in recurrence patterns. For now, minimally invasive hemihepatectomy – whether laparoscopic or robotic – has proven to be a safe alternative to open surgery, with clear benefits in patient recovery and at least equivalent short-term outcomes.

Overall, the shift from open surgery to minimally invasive techniques in hemihepatectomy exemplifies how technological and technique innovations can improve patient outcomes. It is a testament to modern surgical hepatology that a major operation like right or left hepatectomy can now be done with smaller incisions and yield equal or better results. However, these innovations also raise important questions about cost and resource utilization, which we explore next.

To put it simply, laparoscopic hemihepatectomy provides better patient-centered outcomes for a modest increase in cost, and falls within commonly accepted cost-effectiveness thresholds. For health systems, this is an encouraging message – it implies investing in minimally invasive capability (training surgeons, buying equipment) is worthwhile in the long run. There may even be indirect economic benefits not fully captured in hospital costs: for example, patients returning to work sooner or needing fewer post-discharge services.

The conclusion drawn was that while robotic surgery currently incurs a premium over conventional laparoscopy, it can pay off when it prevents a patient from undergoing a laparotomy (open conversion) in a complex case. In other words, if a difficult tumor resection is feasible robotically but not laparoscopically, the alternative might have been an open surgery with its attendant higher costs. In such cases, the robot's value is realized. The study also optimistically noted that an "evolving robotic marketplace" and wider adoption will likely drive down costs of RLS (for example, via competition or reusable instrument development). Therefore, robotic liver resection is seen as an investment that can become cost-effective, especially as the technology improves and the initial capital costs are amortized over many cases.

It's also important to consider indirect costs and broader economic impacts. From a societal perspective, minimally invasive surgery can confer benefits like reduced lost productivity (the patient returns to work sooner) and lower need for post-discharge rehabilitation. Enhanced recovery not only frees hospital beds sooner (which has an opportunity cost – a freed bed can be used for another patient) but also alleviates the economic burden on patients and families. A Chinese study performing a comprehensive economic evaluation of ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) in hepatectomy illustrated this point well: ERAS protocols shortened the average length of stay by a few days and roughly halved complication rates, which reduced the direct and indirect economic burden on patients and society.

Hospitals had to invest in ERAS coordinators and education (increasing some input costs), but they benefited from faster bed turnover and potentially could treat more patients in the same timeframe. Thus, improved perioperative care is a win-win in many scenarios – patients recover faster and with fewer costs on their end, and hospitals operate more efficiently.

Finally, we should address the cost of not adopting new technology: If a technique significantly improves long-term outcomes (e.g. Enables curative surgery for more patients or reduces recurrence), the downstream savings (or gains in life-years) might be substantial. For example, consider portal vein embolization (PVE) as a prelude to extended hemihepatectomy – this is an interventional radiology technique (technological advancement in a broad sense) that increases future liver remnant and prevents postoperative liver failure. By doing so, it allows more extensive resections to be performed safely that otherwise might be impossible. The economic effect is enabling a curative surgery (with its cost) instead of leaving a tumor unresected (incurring the cost of progressive disease or less effective therapies). While a full cost analysis of such scenarios is complex, it underlines that technology that improves efficacy (curing more patients) has immense value beyond immediate perioperative costs.

In summary, modern advancements in hemihepatectomy generally show favorable economics: laparoscopic surgery is cost-effective and can be cost-saving in many instances, robotic surgery is trending toward cost-effectiveness especially for complex cases, and enhanced recovery protocols reduce costs to patients and payers alike. The initial higher expenditures on technology and training are offset by reductions in complications and length of stay in most analyses. Next, we delve into specific technological innovations that have driven these improvements.

Hemihepatectomy has benefitted from a suite of technological innovations in recent years. These range from improved surgical instruments to high-tech imaging and navigation tools. Below, we discuss key innovations and how they impact both the procedure's success and its efficiency.

1. Advanced Surgical Equipment for Parenchymal Transection: Liver parenchymal transection (cutting through the liver tissue while sealing vessels) is a critical and time-consuming part of hepatectomy. Bleeding control is paramount, as excessive blood loss is linked to worse outcomes. Traditional methods like the crush-clamp technique with intermittent Pringle maneuvers (periodically clamping inflow vessels to reduce bleeding) are effective and still widely used, but newer energy devices have made transection faster and blood-sparing. Tools such as the Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), which uses ultrasonic vibrations to emulsify liver parenchyma while preserving vessels, allow precise dissection. When combined with bipolar cautery or advanced bipolar/sealing devices, surgeons can achieve meticulous hemostasis. Randomized trials have compared CUSA to other methods (e.g. Radiofrequency-based devices or crush-clamp) and found no large differences in overall morbidity or mortality, but some devices can reduce blood loss or transection time in certain settings. For instance, using harmonic scalpels or water-jet dissectors can shorten the transection duration and may reduce transfusion

rates in experienced hands. From an economic standpoint, reducing blood loss has direct benefits (transfusions are costly, and anemia can prolong hospital stay). Modern hepatic surgery often employs a combination of techniques: vascular staplers for large vessels, energy devices for small channels, and intermittent inflow occlusion. This synergistic approach is part of the "technological advancements" that have improved safety. The cost of such devices is non-trivial, but studies suggest that the most effective method is often the fastest one – saving OR time (which is a very expensive resource) can justify the expense of the device. For example, the crush-clamp technique is time-honored and virtually cost-free, and one trial (the CRUNSH trial) showed it was as effective as newer methods in blood loss control while being faster and less costly. Thus, innovation doesn't always mean using the newest gadget – sometimes it's optimizing existing techniques or combining them smartly. The bottom line is that today's hemihepatectomy is conducted with far superior tools than decades ago, contributing to shorter operative times and fewer complications like coagulopathy or liver failure from massive bleeding.

2. Imaging and Intraoperative Navigation: Preoperative imaging (high-quality CT and MRI scans) and 3D volumetric planning are now standard in evaluating patients for hemihepatectomy. The ability to calculate future liver remnant volume and simulate resection virtually has improved patient selection and helped avoid postoperative liver insufficiency. Taking this a step further, computer-assisted surgery companies have developed navigation systems that use augmented reality to guide surgeons during the operation. In soft tissue like liver, navigation is challenging (due to deformability of the organ), but promising attempts exist. A 2023 pilot RCT by Heinrich et al. Tested an intraoperative 3D navigation system (CAS-One Liver) vs standard procedure. While the trial did not show a significant difference in resection accuracy or safety with navigation (likely due to its small sample of 16 patients), it demonstrated that the technology is feasible and safe to use – it did not hinder the operation or increase complications. The authors noted that surgical accuracy was "not yet superior" to the traditional method of relying on surgeon experience and intraoperative ultrasound, but they are optimistic that with further refinements (especially better liver deformation algorithms and AR visualization), navigation could enhance precision. Another cutting-edge development is fluorescence-guided surgery using indocyanine green (ICG). In liver surgery, ICG can be used to demarcate segments or highlight tumors (depending on injection timing and technique). The combination of ICG fluorescence with 3D imaging was evaluated in a 2025 meta-analysis by Xu et al.: they looked at fluorescence navigation + 3D imaging (FN+3DI) vs conventional approach in liver resections. The results were impressive – the FN+3DI group had significantly less intraoperative blood loss (almost 100 ml less on average), lower transfusion rates, shorter hospital stay (by ~0.9 days), and fewer overall complications. The only drawback was a longer operative time by about 57 minutes on average. Crucially, there was no compromise in oncologic outcomes (no difference in negative margin rates or recurrence). This suggests that augmented imaging can make resections

“precise” – surgeons can better see critical structures and tumor boundaries, leading to safer dissection at the cost of some additional OR time. The economic implication here is a classic trade-off: longer OR time increases cost, but reduced complications and shorter stay decrease cost. If a fluorescence-navigated hemihepatectomy avoids a major complication (e.g., bile leak or reoperation), it likely pays for the extra hour of OR time many times over. Moreover, the ICG and imaging technology itself is relatively cheap compared to, say, a surgical robot. Many centers now employ near-infrared cameras (often integrated into laparoscopic or robotic systems) for liver surgery. This is an innovation that clearly aligns with improved outcomes and potentially cost savings by averting complications.

3. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Protocols: Not all innovations are hardware – some are process innovations. ERAS programs in liver surgery represent an evidence-based bundle of perioperative care elements (optimized anesthesia, pain control, early feeding, mobilization, etc.) Designed to accelerate recovery. Multiple studies have confirmed that ERAS in hepatectomy can shorten primary length of stay by a few days and reduce complications, without increasing readmissions or compromising outcomes. As mentioned earlier, the economic evaluation by Dong et al. Found ERAS reduced direct costs (by shortening hospitalization and lowering complication treatment costs) and indirect costs (by reducing productivity loss from prolonged illness). Hospitals incur some extra costs to implement ERAS (e.g. Hiring a coordinator, staff training), but these are outweighed by improved efficiency (higher bed turnover, possibly better throughput of surgical cases per unit time). In practical terms, an ERAS pathway for hemihepatectomy might involve prehabilitation, avoidance of prolonged fasting (shorter pre-op fasting and early post-op oral intake), multimodal analgesia to minimize opioids, and early ambulation. Each of these has small benefits that add up: for example, less opioid use means less ileus and sooner discharge; early mobilization means fewer dvts or pneumonias. The result is a cascade of cost savings (fewer days in hospital, fewer expensive complications). A meta-analysis has even shown that ERAS can cut overall morbidity by as much as 30-40% in liver surgery, which is significant. Therefore, adopting ERAS is a high-value intervention – it improves outcomes and reduces costs, fulfilling the very definition of improved economic efficiency. As more centers standardize ERAS for liver resection, we expect the average length of stay for hemihepatectomy to continue to decrease (already, many centers target ~4–5 days for uncomplicated cases, whereas historically it was 8–10 days or more).

It is evident that technology and technique in liver surgery are advancing in tandem. Importantly, many of these innovations have a synergistic effect – for example, combining laparoscopic surgery with fluorescence navigation under an ERAS pathway could yield an optimal scenario: minimal incisions, maximum visualization, and rapid recovery. The challenge, however, is ensuring equitable access to these advancements. High upfront costs (like purchasing a robot or training staff in ERAS) might be barriers, especially in lower-resource settings.

Cost-benefit data such as those discussed in this article can help administrators justify investments by showing the downstream savings or value.

Another consideration is the learning curve associated with new technology. During the initial phase of adopting laparoscopy or robotics, operations may take longer and complications might be higher, which could temporarily worsen economic efficiency. But as teams gain experience, the benefits are realized. High-volume centers have the best outcomes and typically the lowest costs per case (because efficiency improves with volume). For instance, studies have shown liver resections at experienced centers, while slightly more costly due to more aggressive approach, achieved better long-term survival – effectively giving better value for the money spent. This underscores that training and case volume are crucial "soft" technologies that need attention alongside hardware.

In conclusion of the results and discussion: Hemihepatectomy today is safer, more effective, and more efficient than ever before, thanks to a range of technological advancements and refined practices. Patients benefit from less invasive operations and faster recoveries; healthcare systems benefit when these improvements lead to cost savings or favorable cost-effectiveness. While some innovations come with hefty price tags, the evidence so far indicates that their adoption can be justified by the improved outcomes they confer. The key moving forward will be to continue rigorously evaluating new techniques – for both clinical efficacy and economic impact – to ensure that surgical progress remains aligned with value-based care.

Conclusion

Clinical Outcomes Have Improved: Advances in surgical techniques – particularly the shift toward minimally invasive approaches – have made hemihepatectomy a safer procedure with quicker recovery. Laparoscopic hemihepatectomy offers clear benefits in terms of reduced pain, shorter functional recovery times, and improved postoperative quality of life, without compromising surgical radicality or patient survival. Robotic surgery further extends the capability to perform complex liver resections minimally invasively, maintaining low complication rates even in challenging cases. Overall, perioperative mortality and morbidity for hemihepatectomy have significantly declined compared to historical benchmarks, reflecting improvements in patient selection, anesthesia, and surgical technique.

Technological Innovations Drive Efficiency: The introduction of advanced tools (CUSA, energy devices), imaging modalities (intraoperative ultrasound, fluorescence imaging), and navigation systems has enhanced surgical precision. These technologies help surgeons preserve healthy liver parenchyma, achieve negative margins, and avoid injuries to vital structures. In turn, this reduces complications like bleeding, biliary leaks, or liver failure, which are not only dangerous for patients but also costly to manage. Enhanced Recovery protocols, although not "technology" in the hardware sense, are a process innovation that synergizes with surgical advances to speed up recovery and shorten hospital stay.

The net effect is that many patients can undergo a hemihepatectomy and be discharged in under a week in good condition, which was rarely possible in the past.

Economic Efficiency is Achievable: Modern practices in hemihepatectomy demonstrate that better outcomes need not come with runaway costs. Laparoscopic surgery, while slightly more expensive intraoperatively, is cost-effective by widely accepted standards due to downstream benefits. Robotic surgery, currently more costly, is on a trajectory toward cost-effectiveness as the technology matures and competition increases. Importantly, avoiding or mitigating complications yields substantial cost savings – and many of the advancements discussed (e.g. minimally invasive approaches, improved imaging, ERAS) are aimed precisely at complication reduction. The evidence shows that when clinical teams adopt these best practices, hospitals can expect lower utilization of high-cost resources like ICU beds, blood products, and prolonged ward care. For example, ERAS programs shorten hospitalization and reduce readmissions, translating to improved bed turnover and lower expenditure per case. In the big picture, an intervention like laparoscopic hemihepatectomy can provide more quality-adjusted life time to patients for a reasonable incremental cost, supporting its value-based adoption.

Holistic Benefits: Technological advancements in hemihepatectomy also carry intangible or long-term benefits that are not immediately reflected on a balance sheet. Patients having smaller incisions (laparoscopic/robotic) experience less psychological stress and better cosmetic outcomes, which improves overall well-being. Faster recovery means patients can return to normal life and work sooner, benefiting society and families. These aspects reinforce the positive impact of innovations beyond the hospital walls. Moreover, by making surgery more tolerable, more patients (especially the elderly or those with borderline fitness) can be considered for curative resection rather than being relegated to non-surgical therapies. In oncology, this can improve population-level survival and potentially reduce the need for prolonged systemic treatments (which have their own costs).

Continued Progress and Caution: The field of hepatobiliary surgery continues to innovate – from better systemic therapies that shrink tumors preoperatively, to potential future applications of artificial intelligence in surgical planning or intraoperative decision support. As we embrace new technologies (e.g. AI-driven image analysis, next-generation robots, etc.), it will be crucial to maintain rigorous evaluation of their impact. Not every new gadget will be worth the cost, and some may offer only marginal gains. The lessons learned from the current generation of advances are instructive: multidisciplinary collaboration (surgeons, anesthesiologists, nurses, engineers, economists) is key to designing pathways that maximize patient benefit and minimize waste. High-volume centers and training will remain important – technology is best leveraged by skilled teams, and centralization of complex liver surgeries often yields both better outcomes and more efficient resource use.

References

1. Olij B. et al. (2025). “Healthcare Utilization, Costs, and Cost-Effectiveness of Patients Undergoing Laparoscopic and Open Hemihepatectomy: A Secondary

Analysis of the ORANGE II PLUS Randomized Controlled Trial." Annals of Surgical Oncology. (Findings: Laparoscopic vs open cost €18,982 vs €17,141; ICER €36,677/QALY; 77% probability cost-effective)
2. Ingallinella S. et al. (2024). "Evaluation of the economic impact of the robotic approach in major and postero-superior segment liver resections: a multicenter retrospective analysis." Hepatobiliary Surgery and Nutrition, 13(2): 209–222. (Findings: Robotic vs laparoscopic vs open total cost €10,637 vs €9,543 vs €13,960; robotic reduced LOS and complications vs open)
3. Fichtinger RS. et al. (2024). "Laparoscopic versus Open Hemihepatectomy: The ORANGE II PLUS Multicenter Randomized Controlled Trial." Journal of Clinical Oncology, 42(15): 1799–1809. (Findings: Laparoscopy shortened functional recovery 4 vs 5 days; similar complications and margins; earlier chemo and better QoL with laparoscopy)
4. Dong Y. et al. (2021). "Comprehensive economic evaluation of enhanced recovery after surgery in hepatectomy." International Journal for Equity in Health, 20(1): 245. (Findings: ERAS reduced length of stay ~11.4 to 8.9 days; halved complication rate ~12.4% to 6.3%; lowered patient economic burden and improved hospital efficiency)
5. Xu C. et al. (2025). "Efficacy and safety of fluorescence navigation combined with 3D imaging in precise liver resection: a systematic review and meta-analysis." Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 51: 104446. (Findings: Fluorescence + 3D navigation reduced blood loss (~98 mL less), transfusions (OR 0.34), complications (OR 0.60), and LOS (~0.9 days shorter); slightly increased OR time by ~57 min)
6. Shoup M. et al. (2012). "Techniques of hepatic resection." Journal of Gastrointestinal Oncology, 3(1): 28–40. (Overview: Historical development of liver surgery techniques; notes improved morbidity/mortality over 60 years, role of Pringle maneuver, CUSA vs crush-clamp etc.; concludes no one technique fits all, but combination of advances improved outcomes)
7. Limongelli P. et al. (2014). "Costs of laparoscopic and open liver and pancreatic resection: A systematic review." World Journal of Gastroenterology, 20(23): 8265–8271. (Findings: Laparoscopic liver resection had lower total costs than open in pooled analysis – e.g. $19.3k vs $23.4k; laparoscopic saved on hospital stay and ICU costs despite higher OR costs)

UDC 616.36-089

Yusupov T. A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Nurullayev A.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN HEMIHEPATECTOMY PROCEDURES

Abstract. *Hemihepatectomy – the surgical removal of the right or left half of the liver – is a potentially curative treatment for primary and secondary liver cancers. Over the past decades, significant technological advancements have improved the safety, precision, and outcomes of right and left hemihepatectomies in oncological settings. Key developments include refined surgical techniques (such as laparoscopic and robotic hepatectomy) that minimize invasiveness and enhance precision, advanced visualization methods like intraoperative ultrasound, indocyanine green (ICG) fluorescence imaging, and augmented reality (AR) navigation, comprehensive perioperative planning with high-resolution 3D imaging reconstructions and virtual reality simulations, and improved surgical equipment for liver parenchymal transection and vascular control. These innovations have collectively led to reduced intraoperative blood loss, lower complication rates, shorter hospital stays, and expanded resectability of complex tumors while maintaining oncological efficacy. For hepatocellular carcinoma (HCC) and colorectal liver metastases (CRLM), modern hemihepatectomy techniques offer enhanced short-term outcomes (fewer complications, faster recovery) without compromising long-term survival. This article provides a comprehensive review of these technological advancements in hemihepatectomy – covering improvements in surgical approaches, visualization and navigation tools, perioperative planning strategies, and operative equipment – and discusses their impact on surgical practice and patient outcomes in liver cancer management.*

Keywords*: hemihepatectomy; liver resection; hepatocellular carcinoma; colorectal liver metastases; laparoscopic hepatectomy; robotic surgery; 3D surgical planning; augmented reality; indocyanine green fluorescence*

Liver resection is a cornerstone of curative treatment for malignant liver tumors, including hepatocellular carcinoma (HCC) and colorectal liver metastases (CRLM). HCC and CRLM are the most common indications for liver resection in Eastern and Western countries, respectively. Surgical intervention with the goal of complete (R0) resection offers the best chance for long-term survival in these patients. Historically, however, only a minority of patients with liver malignancies

were considered resectable due to technical limitations and the risk of postoperative liver failure. For example, prior to the 2000s, fewer than 20% of patients with colorectal metastases to the liver were eligible for curative resection, largely because of insufficient future liver remnant (FLR) volume after a major hepatectomy. Over the last two decades, there has been a remarkable expansion in the surgical armamentarium that has increased the safety and feasibility of liver resections, including hemihepatectomies, for complex and bilobar tumor presentations. These advancements have enabled curative surgery in many patients who previously would have been deemed unresectable.

Technological innovations in hepatic surgery can be categorized into several key areas: (1) surgical technique improvements (e.g. minimally invasive surgery and novel resection strategies), (2) visualization and navigation enhancements (intraoperative imaging and guidance systems), (3) perioperative planning tools (imaging-based planning, virtual simulations, and adjunct procedures to optimize resectability), and (4) advanced surgical equipment (devices for parenchymal transection, vascular control, and operative precision). In each of these domains, progress has been driven by the goal of maximizing tumor clearance while minimizing operative risk and preserving liver function.

Importantly, these technological advancements have directly translated into improved patient outcomes. Numerous studies have demonstrated that modern techniques such as laparoscopic liver resection (LLR) achieve significantly lower complication rates and faster recoveries compared to traditional open surgery. For instance, a large multicenter cohort study in 2024 found that laparoscopic liver resection was associated with a 44% reduction in odds of major postoperative complications (Clavien–Dindo grade ≥ II) compared to open resection, without any compromise in overall or disease-free survival rates. Similarly, advances like preoperative 3D imaging and improved intraoperative visualization have increased the precision of hemihepatectomies, contributing to better preservation of healthy liver parenchyma and lower incidences of positive margins or inadvertent injuries. The cumulative impact of these innovations is that hemihepatectomy – whether right or left – can now be performed more safely and effectively in patients with liver cancers, including those with large or anatomically complex tumors, cirrhotic livers, or limited functional reserve.

In the context of oncology, technological improvements have also expanded the indications for surgery. Enhanced preoperative planning (e.g. portal vein embolization, staged resection techniques) allows surgeons to undertake major hepatectomies in patients who previously would not tolerate them, thereby extending the option of surgery to more patients with HCC or CRLM. The result is a higher proportion of patients achieving complete resection and potential cure. This article reviews the major technological advancements in hemihepatectomy procedures, with a focus on their relevance to oncologic liver surgery. We discuss how innovations in surgical techniques, visualization methods, perioperative planning, and surgical equipment have collectively improved the practice of right and left hemihepatectomies. Real-world data from recent studies are presented to

illustrate improvements in outcomes such as operative blood loss, complication rates, length of hospital stay, and oncologic efficacy.

Objective of the Study

The objective of this review is to systematically examine and describe the technological advancements that have enhanced the performance and outcomes of hemihepatectomy procedures (right and left) in the treatment of liver malignancies.

Materials and Methods. This work is a narrative review and analysis of recent scientific literature focused on technological developments in hemihepatectomy procedures. We did not perform any experiments on human subjects; rather, we gathered and synthesized data from published studies, review articles, and clinical trials relevant to advancements in liver surgery techniques and technology.

A comprehensive literature search was conducted using databases including PubMed, MEDLINE, and Google Scholar to identify publications from approximately 2010 to 2025 that discuss improvements in liver resection techniques and perioperative management. Key search terms included combinations of “hemihepatectomy” OR “liver resection” with “technological advancements”, “laparoscopic”, “robotic surgery”, “augmented reality (AR)”, “3D planning”, “indocyanine green (ICG) fluorescence”, “portal vein embolization (PVE)”, “Associating Liver Partition and Portal vein Ligation (ALPPS)”, “visualization”, and “surgical devices”. We focused on studies in the context of oncological surgery (HCC, liver metastases) and included both clinical outcome studies (e.g. comparative studies, meta-analyses) and technology-focused reports (e.g. descriptions of new surgical navigation systems).

We included articles that provided data or substantive discussions on how a particular technological innovation impacted hemihepatectomy or major liver resections. This encompassed randomized controlled trials, cohort studies, systematic reviews, and high-quality case series that evaluated outcomes of laparoscopic vs. open or robotic vs. laparoscopic liver resection, studies on the use of fluorescence imaging or AR in liver surgery, reports on preoperative 3D planning tools, and analyses of perioperative adjuncts like PVE or two-stage hepatectomy techniques. Both adult and pediatric liver surgery innovations were considered if relevant (though adult oncologic surgery is the main focus). Only English-language sources were used for data extraction.

For each included study or source, key data and conclusions were extracted. This included operative metrics (blood loss, operative time), perioperative outcomes (transfusion rates, complications, length of stay), oncologic outcomes (margin status, survival), and descriptive information about the technology (e.g. features of a navigation system, type of imaging used, specifics of surgical equipment). When available, numeric results from comparative studies (with p-values) were recorded to illustrate the magnitude of improvement associated with a given technology. For example, data on complication rates or blood loss for laparoscopic vs. open hepatectomy were tabulated from meta-analyses and multicenter studies.

The gathered information was organized into thematic categories corresponding to the four key areas of advancement (techniques, visualization, planning, equipment). Within each category, we synthesized findings from multiple sources to provide an overview of how that particular advancement has improved hemihepatectomy practice. We present representative data in the form of summary tables and figures. Three tables are included to compare outcomes between different surgical approaches (e.g. open vs laparoscopic vs robotic) and to compare strategies like PVE vs ALPPS. Three figures are included to illustrate some of the technologies (such as a visualization of 3D liver modeling and an example of a robotic surgical setup). All sources of information are cited in the text using the specified citation format. No new clinical data were generated by the authors for this review, and thus no ethical approval was required.

Given the narrative review format, a formal quality assessment of studies (e.g. risk of bias evaluation) was not performed for every article included. However, preference was given to high-level evidence and the most recent data available. Where the evidence is still emerging (for instance, AR navigation in liver surgery), we have noted the preliminary nature of findings. The scope is confined to technological and methodological improvements; general advances in anesthesia or perioperative care are only touched upon if directly linked to surgical technology (e.g. enhanced recovery protocols are beyond the scope).

By synthesizing the current literature in this manner, we aim to provide surgeons and researchers with a clear and organized understanding of how technology is driving progress in hemihepatectomy for cancer, and what results have been achieved thus far.

Results and Discussion. The landscape of liver surgery has been transformed by multiple synergistic advancements. In this section, we discuss the improvements in surgical techniques, visualization and navigation methods, perioperative planning, and surgical equipment, and how each has contributed to safer and more effective hemihepatectomy procedures for oncological indications. Key findings from the literature are summarized in tables and figures to highlight comparative outcomes and the capabilities of new technologies.

Traditional open hemihepatectomy involves a large abdominal incision to provide the surgeon full access to the liver. While effective, open surgery is associated with considerable abdominal trauma, longer recovery times, and higher complication rates, especially in patients with cirrhosis or significant comorbidities. A major paradigm shift in liver surgery has been the adoption of minimally invasive techniques – principally laparoscopic and robotic surgery – for performing major liver resections, including right and left hemihepatectomies. These techniques aim to achieve the same oncologic resection through smaller incisions, thereby reducing surgical stress and accelerating patient recovery.

First reported in the 1990s for minor resections, laparoscopic liver resection (LLR) has progressively expanded to more complex resections over the last two decades. In laparoscopic hepatectomy, surgeons operate through several small trocar incisions using long instruments and a camera that provides a magnified view of the

operative field. The feasibility of laparoscopic right or left hepatectomy has been demonstrated in both HCC and metastatic tumors, even in the presence of underlying liver disease, by expert centers around the world. The benefits of LLR over open liver resection (OLR) are well-documented: patients experience significantly fewer postoperative complications, lower intraoperative blood loss, and shorter hospital stays, while achieving equivalent oncologic outcomes. A 2024 multicenter study including 5886 patients (with ~1991 laparoscopic cases) found that the laparoscopic approach reduced the odds of major complications by ~44% compared to open surgery (OR ≈ 0.56, $p < 0.001$). Similarly, numerous meta-analyses have confirmed that LLR is associated with reduced overall morbidity and faster recovery. For example, one analysis reported 30-day postoperative complication rates of 19% with LLR vs 31% with OLR ($p = 0.021$), and a median hospital stay of ~2.2 days vs 4 days, respectively. Long-term survival after resection of HCC or CRLM appears to be no worse with laparoscopy; five-year overall survival rates are comparable between LLR and OLR (often within a few percentage points of each other). In Table 1, we summarize outcome comparisons from select studies of laparoscopic versus open liver resection in cancer patients, illustrating the consistent short-term benefits of the minimally invasive approach.

Building on the success of laparoscopy, robotic-assisted surgery has emerged as another significant advancement in liver surgery techniques. Robotic surgical systems (such as the da Vinci Surgical System) provide a surgeon-controlled robotic platform with high-definition 3D visualization and articulated instruments that mimic the dexterity of the human hand. These features help overcome some limitations of straight laparoscopy, especially for deep or difficult dissections. In recent years, there has been rapid adoption of robotic liver resection (RLR) worldwide. In fact, the proportion of minimally invasive liver resections performed robotically increased from only ~2% in 2014 to over 40% by 2022 in some national audits, indicating the growing surgeon preference for the robotic platform in complex cases. Right-sided hemihepatectomies, which are technically more challenging due to the posterior location and vascular anatomy, have become feasible robotically and are now being performed at high-volume centers. Surgeons report that the robotic system's enhanced range of motion and 3D vision make complex maneuvers (such as suturing or finely dissecting near major vessels) "almost as if you're doing open surgery with your hands" while still benefiting from a minimally invasive approach.

Early comparative outcomes suggest that robotic liver resection offers at least equivalent, if not improved, results compared to conventional laparoscopy, particularly for major hepatectomies. A recent propensity-score matched analysis of 781 robotic vs 781 laparoscopic liver resections found that the robotic approach led to significantly lower rates of conversion to open surgery (4.9% vs 12.8%, $p < 0.001$) and fewer instances of major intraoperative blood loss ≥500 mL (18.6% vs 25.2%, $p = 0.011$). Postoperative hospital stay was also slightly shorter with robotics (median 3 days vs 4 days, $p < 0.001$). These findings, summarized in Table 2, indicate that robotics can further refine the minimally invasive liver surgery

paradigm by increasing precision and reducing some risk factors (e.g. blood loss, conversions) – especially in technically complex resections such as posterior segmentectomy or obese patients.

In summary, the shift from large-incision open surgery to laparoscopic and robotic hemihepatectomy represents one of the most impactful advancements in hepatic surgery. These minimally invasive techniques have improved patient outcomes – patients have less pain, recover faster, and have fewer complications such as infections or hernias – without sacrificing the oncological effectiveness of the surgery. Many liver centers now consider LLR (and increasingly RLR) as standard of care for appropriate candidates, including for major resections in experienced hands. Nevertheless, open surgery remains important for certain situations (very large tumors, need for complex vascular reconstructions, etc.), and the ideal approach must be individualized. The continuing evolution of technique (e.g. hybrid approaches, hand-assisted laparoscopy, or robotic improvements like tactile feedback in the future) promises further refinements.

It is also worth noting a specific surgical technique innovation for improving resection outcomes: the anterior approach and liver hanging maneuver, introduced in open surgery, which allows surgeons to resect large right lobes without mobilizing the liver fully, thereby potentially reducing bleeding. Additionally, parenchymal-sparing techniques (segment-oriented or subsegmental resections) have been emphasized in modern practice to preserve liver function. These are facilitated by better intraoperative imaging and are particularly relevant in treating multiple metastases. While not “technology” per se, these conceptual advances in how surgeons plan the resection contribute to improved outcomes (less liver failure, ability to re-resect for future new tumors) and are enabled by the precise imaging and navigation tools described in the next sections.

Performing a hemihepatectomy requires detailed knowledge of the patient’s specific liver anatomy and tumor location, which can vary greatly. One of the enduring challenges of liver surgery is that surgeons must often work within the liver’s parenchyma where critical structures (vessels, bile ducts, tumor margins) are not directly visible to the naked eye. Traditional methods of intraoperative guidance included palpation and intraoperative ultrasound (IOUS). IOUS, which uses an ultrasound probe on the liver surface during surgery, remains a gold standard tool for identifying tumors and mapping major vessels in real time. However, IOUS requires skill to interpret and provides only cross-sectional slices. New visualization modalities have been developed to augment the surgeon’s view and improve real-time navigation during liver resections.

Indocyanine Green (ICG) Fluorescence Imaging: One of the most significant recent visualization aids is near-infrared fluorescence imaging using indocyanine green dye. ICG is a fluorescent dye that, when excited by NIR light (~805 nm), emits light (~830 nm) that can be captured by special cameras. In liver surgery, ICG has two main applications: tumor visualization and biliary/segmental mapping. Patients are typically injected with a dose of ICG intravenously some hours to days before surgery (for tumor mapping) or ICG can be injected intraoperatively

(intravenously or directly into portal or bile structures) for segment mapping and bile duct identification. The principle is that certain liver tumors (especially well-differentiated HCCs) retain ICG and will appear fluorescent ("glowing") compared to normal liver tissue under NIR camera. Metastatic tumors and cholangiocarcinomas often show a "rim fluorescence" – a ring of ICG in the liver parenchyma surrounding the tumor due to impaired drainage. This technique allows surgeons to detect non-superficial tumors up to ~8–10 mm below the liver surface in real-time. Studies have demonstrated that ICG fluorescence can reveal additional tiny lesions that were missed on preoperative imaging or by inspection, thereby potentially improving oncologic completeness of resection. For example, Peloso et al. (2013) reported that ICG enhanced detection of small colorectal metastases intraoperatively, and Handgraaf et al. found that adding NIR fluorescence led to a higher rate of finding new lesions compared to palpation or ultrasound alone.

ICG is also used for visualizing liver segment boundaries – crucial for anatomical resections. One technique involves injecting ICG into a selected portal vein branch (percutaneously or during surgery) to "stain" a segment, or conversely clamping a segment's portal inflow and injecting ICG systemically to get negative staining of that segment. Under NIR camera, the targeted segment will fluoresce differently, delineating the transection line between segments. This can be extremely helpful, especially during laparoscopic surgery where direct palpation is absent. Fluorescence can also highlight biliary anatomy: by injecting ICG into the bile duct or intravenously (which then gets excreted into bile), the biliary tree and any leak sites can be made to fluoresce. Randomized trials have shown that intraoperative ICG cholangiography significantly improves the detection of biliary leaks, allowing surgeons to fix them intraoperatively.

An example of how AR might appear is illustrated in Figure 2. The images show 3D reconstructions of a patient's liver with colored anatomical details (hepatic veins, portal veins, and tumors) generated from CT scans These reconstructions can be rendered as holographic models. With an AR headset or a suitable display, the surgeon can visualize these holograms overlaid onto the patient's body or in the laparoscopic video feed, thereby knowing exactly where, for example, a large tumor is in relation to major blood vessels before cutting. This interactive 3D visualization eliminates some of the mental guesswork of translating 2D scans into 3D anatomy during surgery.

The potential of AR/MR (mixed reality) systems in liver surgery is substantial: they could reduce intraoperative uncertainty, help in achieving negative margins by clearly delineating tumor extents, and shorten the learning curve for complex resections by providing less experienced surgeons with navigational assistance. AR can also reduce the need for intermittent ultrasound checks or direct palpation, because the surgeon has a constantly updated "X-ray vision" of critical structures. One can imagine, for example, seeing the intended line of transection as a glowing line on the liver surface, computed from the 3D model, and following that line precisely. Early systems have shown improved accuracy in following planned transection planes and identifying vessels.

Challenges remain for AR: the liver is a soft organ that can deform and move with breathing, making it hard to maintain accurate registration of the hologram to the actual liver (this is the “registration error” issue). Solutions like periodic re-registration using intraoperative ultrasound or laparoscopic landmarks are being explored. Despite these challenges, early clinical evaluations have indicated improved outcomes in AR-assisted cases, as noted above, at least in terms of reduced blood loss and complications. As AR technology matures, with faster processing and perhaps AI-assisted registration, it is expected to become more robust.

It should be noted that beyond the operating room, AR/VR is also being used in surgical training and simulation – allowing surgeons to practice complex liver resections on virtual models. This may indirectly improve outcomes by better preparing surgeons for unusual anatomies or rare procedures.

Intraoperative navigation also includes simpler enhancements like 3D laparoscopic cameras (which give depth perception), and image guidance platforms that track instrument position. For example, some research has looked at electromagnetic tracking of surgical tools relative to preoperative imaging, essentially creating a “GPS for surgery.” In liver surgery, a system might tell the surgeon how far the tip of an instrument is from a tumor margin, etc. These systems are still under development, but combined with AR visualization, they form part of the concept of digital and intelligent surgery.

Technological progress is not limited to the operating theater – it begins well before the surgery in the planning phase. Proper preoperative planning for a hemihepatectomy, especially in oncology patients, is crucial to maximize safety (by ensuring adequate liver function remains) and efficacy (by strategizing how to remove all disease). Several advancements have revolutionized how surgeons plan liver resections: high-resolution imaging with 3D reconstruction, computer-assisted volumetric analysis and simulation, as well as interventional techniques to optimize the liver for surgery (like portal vein embolization).

Three-Dimensional (3D) Imaging and Virtual Planning: Modern cross-sectional imaging (multi-phase CT, MRI) provides detailed anatomical information. Today’s software can transform these 2D scans into patient-specific 3D models of the liver, including all vessels, tumors, and segments. Surgeons can interact with these models on a computer or using VR goggles, rotating the liver and essentially performing a “virtual rehearsal” of the resection. Studies have shown that such 3D visualization improves surgical planning accuracy. For example, Fang et al. used 3D printed or digital models to plan complex HCC resections and reported that in the 3D-planned group operative time was significantly reduced (295 vs 324 minutes), use of inflow occlusion (Pringle maneuver) was less frequent (52% vs 71%), and major complication rate was lower (3.3% vs 14.3%) compared to standard planning. This suggests that enhanced understanding of anatomy via 3D models led to a more efficient and safer surgery. While this is early evidence, it demonstrates the value of detailed preoperative 3D planning in improving intraoperative decision-making and outcomes.

Advanced software can also fuse multiple imaging modalities (CT, MRI, PET) into one composite model. This helps in cases where different information is gleaned from each modality (for instance, MRI might show a lesion not seen on CT; PET might show metabolic activity). AI algorithms are being developed to automate this image fusion and segmentation process. Soon, a surgeon could click a button and get a fully segmented 3D liver model on their screen within minutes. These models not only aid the surgeon's mental visualization but can be used for volumetry – to precisely calculate the volume of the lobes and the future liver remnant (FLR). This is critical: a major part of planning a hemihepatectomy is ensuring that the remaining half-liver will be sufficient for the patient's needs (commonly at least 25–30% of original volume in healthy livers, or more in cirrhotic/chemo-damaged livers). Computerized 3D volumetry is far more accurate than older 2D approximations. It allows for tailored decision-making (for example, deciding between a right hepatectomy vs. an extended right hepatectomy if volume allows).

As an extension, some centers utilize 3D printing to create physical models of the patient's liver. These tangible models (often in color-coded resin or polymer) can be used to plan surgical cuts or even practice the resection on a model liver beforehand. 3D prints have been particularly useful in teaching, in patient counseling (helping patients visualize their surgery), and in very complex cases like those needing trisectionectomy or living donor transplantation where precise understanding of anatomy is paramount. While 3D printing is not done for every case (due to time and cost), its usage exemplifies the trend towards patient-specific planning enabled by technology.

Another aspect of perioperative planning is functional assessment. Technology has introduced new ways to measure how well the future liver remnant will function, not just its size. For example, the indocyanine green retention test (ICG-R15) is an older but useful method where a dose of ICG is given and its clearance by the liver is measured – giving a sense of liver functional reserve. More recently, tools like Hepatobiliary scintigraphy or MRI with hepatocyte-specific contrast can map functional capacity of different liver segments. There's also the LiMAx test (C13-methacetin breath test) that quantitatively measures liver function. While these are not "technological advancements in surgery" per se, they are part of a high-tech approach to planning: ensuring that patients are optimized and only undergo a hemihepatectomy if it's safe to do so.

Portal Vein Embolization (PVE) and Two-Stage Hepatectomy Innovations: PVE is a technique used preoperatively to induce growth of the future liver remnant. By embolizing (blocking) the portal vein branch leading to the tumor-bearing lobe (which is planned for resection), blood flow is redirected to the remnant lobe, stimulating hypertrophy of that remnant over a few weeks. First introduced in the 1980s, PVE has become a standard planning tool when the predicted FLR is too small. Technological improvements in interventional radiology have made PVE safer and more effective – for instance, use of embolic agents like n-butyl cyanoacrylate glue, which has been shown to possibly induce greater hypertrophy than older agents. The outcomes of PVE are impressive: it has a technical success

rate of ~99% and leads to an average 38% increase in FLR volume within a few weeks. As a result, the majority (≈96%) of patients who undergo PVE can later proceed to their planned hepatectomy. PVE itself carries low risk (major complications ~2.5%, virtually zero mortality). Table 3 compares PVE with a newer surgical innovation called ALPPS in terms of hypertrophy and outcomes.

From a technological standpoint, ALPPS itself was an innovation in surgical strategy – challenging the conventional wisdom of waiting weeks for hypertrophy. Its success is partly due to improved perioperative care and monitoring (ICU, better imaging to measure FLR quickly, etc.) that allow safely performing two operations back-to-back. It exemplifies how changing when and how we operate (with the aid of imaging to guide the partition plane, and advanced instruments to make the parenchymal split swiftly) can expand the boundaries of what's surgically possible. In oncologic terms, ALPPS has allowed some patients with multiple bilateral tumors to be rendered disease-free where chemotherapy alone could not.

Enhanced Recovery and Anesthetic Advances: Although not the main focus of this article, it is worth mentioning that improved perioperative management (ERAS protocols, better anesthesia monitoring, avoidance of excessive fluids, etc.) complement the above planning innovations. For instance, patients are now often in a state to undergo second stage surgery sooner thanks to optimized recovery pathways. Anesthesiology technology, like better low CVP (central venous pressure) maintenance and hemostatic monitoring, also plays a role in reducing blood loss and transfusions during major hepatectomies.

In conclusion, perioperative planning has become a high-tech, multi-disciplinary process. Surgeons now routinely sit in front of 3D workstations to plan resections, calculate volumes, and even simulate the surgery. Interventional radiologists, oncologists, and surgeons coordinate to use techniques like PVE or ALPPS when needed to improve outcomes. The net effect is that more patients can safely undergo hemihepatectomy (because we can make their liver "ready" for it, and plan it better), and when they do, the surgery is more likely to be successful (complete resection, no liver failure). The combination of precise imaging, virtual planning, and adjunct techniques epitomizes personalized surgery – tailoring the approach to each patient's unique anatomy and situation. These planning advances, coupled with the intraoperative tools discussed earlier, have significantly improved both the safety profile and the curative potential of hemihepatectomy for liver cancers.

All these tools and devices contribute to what we might call a "modern hepatectomy toolkit," enabling surgeons to perform complex resections with a level of safety that was not possible before. The impact of better equipment is evident in outcomes like transfusion rates dropping and operation times shortening as techniques become more efficient. It is also evident in the broadening of indications: surgeons are more confident to attempt minimally invasive approaches or difficult resections knowing they have the instruments to handle challenges (e.g., a reliable stapler to divide a major hepatic vein safely if needed, rather than doing a risky hand-sewn stitch deep in the cavity). Table 2 and Table 1 data already encapsulate

some of these improvements (less blood loss, etc.), which directly tie back to equipment efficacy as well as technique.

In summary, the technological advancements in surgical instruments and equipment for hemihepatectomy have largely aimed at improving precision and hemostasis. With ultrasonic dissectors, advanced energy devices, staplers, and robotic systems, surgeons can now divide the liver parenchyma and vasculature with minimal bleeding and greater control. These advancements, in concert with the better techniques and planning discussed earlier, have resulted in a marked decrease in perioperative risk. Modern series report low rates of severe hemorrhage or liver failure, reflecting both the preventative measures in planning (ensuring adequate FLR) and the effectiveness of intraoperative tools to prevent major blood loss and handle it if it occurs.

Looking forward, we anticipate further equipment innovations: perhaps artificial intelligence-guided electrosurgical units that can detect a blood vessel ahead and alert the surgeon, or smart clips that measure bile leakage pressure, etc. Already, there is exploration into laparoscopic robots that could automate parts of resection. For instance, a concept of an autonomous cautery robot following a pre-planned path in the liver could one day assist surgeons. While such ideas are in their infancy, the trajectory of the field suggests that as computing and engineering merge more with surgery, equipment will continue to evolve rapidly.

Conclusions

Hemihepatectomy has been transformed from a high-risk operation performed only in select centers into a routinely feasible and safer procedure, thanks to the cumulative impact of technological advancements in surgical practice. In this comprehensive review, we have outlined how improvements in surgical techniques, visualization methods, perioperative planning, and operative equipment have each contributed to better outcomes for patients undergoing right or left hemihepatectomy, particularly for oncologic indications like HCC and metastatic colorectal cancer.

In the domain of surgical techniques, the shift to minimally invasive approaches – laparoscopic and robotic hepatectomy – stands out as a game changer. Robust evidence indicates that patients undergoing laparoscopic or robotic hemihepatectomy experience significantly reduced perioperative morbidity (lower complication rates, less pain, faster recovery) while achieving equivalent oncological results compared to open surgery. The adoption of these techniques, now bolstered by growing surgeon expertise and consensus guidelines, means that many liver resections can be done with smaller incisions and better patient satisfaction. Robotic surgery, in particular, has extended the frontiers of minimally invasive liver surgery by enabling complex maneuvers with precision; its rapid uptake worldwide underscores its perceived advantages in suitable cases. We conclude that minimally invasive hemihepatectomy, when performed by trained teams in appropriate patients, is the new standard that offers clear short-term benefits and does not compromise long-term survival.

Advances in visualization and navigation have provided surgeons with "augmented senses" during hepatectomy. The use of ICG fluorescence imaging for tumor identification and segment mapping is a practical innovation already widely in use; it improves the surgeon's ability to achieve R0 resections and avoid biliary complications by highlighting structures that were previously invisible. Augmented reality and 3D navigation systems, though in earlier stages of adoption, have shown remarkable potential to reduce intraoperative blood loss and errors. As these digital technologies mature, we anticipate they will become integrated into routine practice, guiding surgeons much like GPS navigation guides drivers – offering real-time, patient-specific roadmaps of hepatic anatomy. The convergence of imaging, computer science, and surgery in these AR/XR systems heralds a future of "intelligent surgery", wherein human skill is amplified by technology to achieve greater accuracy and safety than ever before.

In terms of perioperative planning, improvements such as high-fidelity 3D imaging, precise volumetric calculations, and innovative preparatory techniques like portal vein embolization have significantly enhanced surgical planning and patient selection. We found that careful preoperative optimization (for example, using PVE to induce hypertrophy) has extended curative surgery to patients who would otherwise be marginal or inoperable, thereby improving overall treatment outcomes in liver oncology. The ALPPS procedure, while more risky, exemplifies how bold new surgical strategies combined with improved perioperative care can further push the envelope of resectability for extensive disease. The key message is that thorough planning – utilizing the latest imaging and interventional tools – is absolutely vital for safe hemihepatectomy. Modern liver surgery is as much about preoperative work (imaging, simulations, portal interventions) as the operation itself. By leveraging these advances, surgeons can ensure adequate liver function post-resection and reduce the likelihood of postoperative liver failure, which has historically been the Achilles' heel of major hepatectomies.

References

1. Alvikas J, Lo W, Tohme S, Geller DA. "Outcomes and Patient Selection in Laparoscopic vs. Open Liver Resection for HCC and Colorectal Cancer Liver Metastasis." Cancers (Basel). 2023;15(4):1179
2. Beard RE, et al. "Outcomes after laparoscopic and open hepatectomy for hepatocellular carcinoma in patients with Child-Pugh B cirrhosis." J Am Coll Surg. 2019;228(4):603-612
3. Chan ACY, Poon RTP, et al. "Safety and efficacy of ALPPS in hepatocellular carcinoma with cirrhosis: a case-matched analysis." Ann Surg. 2016;264(4):e73-e75
4. Cheung TT, et al. "Indocyanine green fluorescence imaging in minimally invasive liver resection." Surg Endosc. 2018;32(5):2731-2738
5. Dip, F. et al. "Real-Time Navigation in Liver Surgery Through Indocyanine Green Fluorescence: An Updated Analysis of Worldwide Protocols and Applications." Cancers (Basel). 2024 (PMC11898688)

6. Fang C, Zhang P, et al. (Referenced in Kowal et al. 2025). – Retrospective study on 3D model-assisted liver resection planning for HCC.
7. Hu M, Zhao G, et al. “Impact of three-dimensional reconstruction visualization technology on liver resection.” J Gastrointest Oncol. 2020;11(5):993-1003.
8. Kowal MR, Ibrahim M, Mihaljević AL, et al. “Technological Advances in Pre-Operative Planning.” J Clin Med. 2025;14(15):5385
9. Li Y, Wang LR, et al. “Laparoscopic versus open surgery for liver resection: a multicenter cohort study.” Sci Rep. 2024;14:26410.
10. Lin J, Zhang J, et al. “Augmented reality and mixed reality for liver surgery: early experiences.” Hepatobiliary Surg Nutr. 2021;10(5):799-807.
11. Raffaele D, Rossi G, et al. “Fluorescence-guided surgery in liver tumors: applications and advantages.” Acta Biomed. 2018;89(7):14-20 (PMC6502182)
12. Rouault A, Truant S, et al. “National impact and advantages of the robotic approach to liver surgery in the era of minimally invasive surgery.” Ann Surg Open. 2025;5:e527
13. Schlachter T, et al. “Outcomes of staged hepatectomies for liver malignancy.” World J Hepatol. 2019;11(2):176-192 (PMC6603508).
14. van Lienden KP, et al. “Portal vein embolization before liver resection: a systematic review.” Cardiovasc Intervent Radiol. 2013;36(1):25-34 (
15. Vivarelli M, et al. “Two-stage hepatic resection for bilobar colorectal metastases: impact of postoperative complications on completion and outcome.” J Am Coll Surg. 2011; 212(2):176-183

Аслонова М.Р.
ассистент PhD
кафедра инфекционных болезней и детских инфекционных болезней
Бухарский государственный медицинский института
Узбекистан, г.Бухара

ПРОГРАММА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ ПРИ АССОЦИАЦИИ COVID-19 И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Аннотация: *Разработанная нами программа дифференцированного подхода к ведению пациентов при ассоциации COVID-19 и сахарного диабета 2 типа обеспечивает врачу общей практики, в процессе диалога, получение ответов на вопросы, касающиеся процесса принятия решения вопросов оказания первой помощи и/или госпитализации больного на этапе первичного звена здравоохранения. Врач общей практики при первичном осмотре пациента может выяснять анамнез и наличие симптомов и признаков, для уточнения и постановки диагноза, а также проводить дополнительные диагностические исследования и информировать о состоянии тяжести и возможных осложнениях.*

Ключевые слова: *SARS CoV-2, пневмония, сахарный диабет 2 типа, пневмония, цитокин*

Aslonova M.R., PhD
assistant
Department of Infectious Diseases and Pediatric Infectious Diseases
Bukhara State Medical Institute
Bukhara, Uzbekistan

PROGRAM FOR A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE MANAGEMENT OF PATIENTS IN THE ASSOCIATION OF COVID-19 AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Summary. *The program we have developed for a differentiated approach to the management of patients with the association of COVID-19 and type 2 diabetes mellitus provides the general practitioner, in the process of dialogue, with receiving answers to questions regarding the decision-making process of providing first aid and/or hospitalization of the patient at the stage of primary healthcare. During the initial examination of the patient, a general practitioner can find out the medical history and the presence of symptoms and signs to clarify and make a diagnosis, as well as conduct additional diagnostic tests and inform about the severity of the condition and possible complications.*

Key words: *SARS CoV-2, pneumonia, type 2 diabetes mellitus, pneumonia, cytokine*

COVID-19 — это новое, до конца не изученное заболевание, которое оказало влияние на большое количество людей по всему миру [1]. Противодиабетические препараты, применяемые при инфекции SARS-CoV-2 не только при асимптоматических или лёгких формах, но и при тяжёлом течении заболевания, могут оказывать влияние на патофизиологические механизмы COVID-19 и прогноз заболевания [4,9]. В связи с высокой распространённостью сахарного диабета крайне важно рассмотреть взаимосвязь между инфекцией SARS-CoV-2 и нарушением углеводного обмена, а также определить наиболее эффективные методы лечения диабета во время инфекции [2,3].

Неблагоприятный прогноз у пациентов с сахарным диабетом, заболевших COVID-19, поставил под сомнение целесообразность применения стандартной медикаментозной терапии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Какому методу лечения следует отдать предпочтение? На данный момент существуют только наблюдательные исследования, однако для решения этой проблемы необходимо проводить больше научных исследований [5,6].

На основе клинико-лабораторных и иммунологических показателей, отражающих тяжесть пневмонии при SARS-CoV-2 у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, мы разработали программу поэтапного управления пациентами этой категории [7,8]. При разработке программы мы учитывали состояния и симптомы, которые могут влиять на состояние пациента при пневмонии, вызванной SARS-CoV-2.

Цель исследования: разработка поэтапной программы ведения пациентов с COVID-19, ассоциированных с сахарным диабетом 2-го типа.

Материалы и методы: В исследование было включено 103 пациентов, госпитализированных по поводу SARS-COV-2 пневмонии в Бухарской областной инфекционной больнице, которую переорганизована в Ковид-центр. Из всех госпитализированных по поводу SARS-COV-2 пневмонии на фоне СД 2-типа, больных с тяжелой формой пневмонии составило -35 (1-группа), со средней тяжестью- 33 (2-группа). Группу сравнения (3-группа) составили 35 пациентов с SARS-COV-2 пневмонией не страдающих СД. Контрольную группу составили 30 здоровых людей соответствующего возраста.

На основании разработанных нами информативных клинико-лабораторных и иммунологических показателей тяжести SARS-COV-2 пневмонией у больных с СД 2 типа, составили программу для дифференцированного подхода к ведению пациентов данной категории.

Для составления программы учитывали те состояния и симптомы которые могут влиять на состояние больного при SARS-COV-2 пневмонии.

SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа характеризуется сходством клинических проявлений, но различия в сроках манифестации, выраженности и диагностической значимости признаков могут помочь в идентификации этих заболеваний на долабораторном этапе диагностики.

Поэтому очень важен учет давности СД и тщательное изучение анамнеза, а также объективный осмотр пациента позволяет быстрому принятию решения о дальнейшей тактике ведения и госпитализации с переводом в ОРИТ.

Программа дифференцированного подхода при этом может повышать точность и своевременность постановки диагноза и принятия решений. На этапе предварительной (долабораторной) диагностики разработанная нами программа дифференциации позволяет сформировать дифференциально-диагностический ряд.

Опираясь на опыт современных ученых мира, приведенных в базе мировой литературы, при создании программы дифференциации подхода было решено формировать перечень из 13 симптомов и/или состояний, помогающие врачу при постановке диагноза.

Разработанная нами программа дифференцированного подхода к ведению пациентов при ассоциации COVID-19 и сахарного диабета 2 типа для поддержки принятия решений на долабораторном этапе диагностики продемонстрировала эффективность в 96,0% случаев при формировании узкого дифференциально-диагностического ряда из 13 симптомов и/или состояний. Предложенный новый подход к диагностике SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа показал высокую эффективность и возможность применения в клинической практике (рис.1).

Дифференцированный подход к диагностике SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа ведется поэтапно: на этапе первичного звена здравоохранения ВОП; на 2-этапе ЦРБ и/или областных медицинских центрах врачами узкой специализации, инфекционистами.



Рисунок.1. Программа для 1-этапа осмотра ВОП

Программа для 1-этапа осмотра ВОП предусматривает объективный осмотр и опрос больного, при этом если больной набирает 10 баллов и более, ВОП переводит больного в специализированный медицинский центр (ковид центр) для контроля состояния и дальнейшего обследования и лечения.

Программа позволяет расширять базу знаний для диагностики SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа и поэтому рекомендуется его внедрение в практическую деятельность лечебных многопрофильных медицинских учреждений.

Программа для 2-этапа осмотра узким специалистом и/или инфекционистом предусматривает объективный осмотр и лабораторный анализ крови больного, при этом если больной набирает 5 баллов и более, тогда врач принимает решение перевода больного в ОРИТ (ковид центр) для интенсивной терапии контроля состояния больных (рис.2).

Внедрение в практическую деятельность врачей инфекционистов, эндокринологов, терапевтов, пульмонологов, кардиологов, неврологов разработанную программу дифференцированного подхода к ведению пациентов с SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа, способствует своевременной поддержки принятия врачебных решений и, в частности, решение оказания первой помощи, решение вопроса госпитализации и/или перевода больного в ОРИТ на основании знаний и клинического опыта. А также новый подход к дифференциации состояний у пациентов с SARS-COV-2 пневмонией у пациентов с СД 2 типа продемонстрирует возможность не только консультативной помощи на разных этапах лечебно-диагностического процесса (диагностика, прогноз, выбор лечения), но и возможность повышения квалификации врачей.



Рисунок.2. Программа для 2-этапа ведения больных с SARS-COV-2 пневмония у пациентов с СД 2 типа

Заключение:

Разработанная нами программа дифференцированного подхода к ведению пациентов при ассоциации COVID-19 и сахарного диабета 2 типа обеспечивает врачу общей практики, в процессе диалога, получение ответов на вопросы, касающиеся процесса принятия решения вопросов оказания первой помощи и/или госпитализации больного на этапе первичного звена здравоохранения. Врач общей практики при первичном осмотре пациента может выяснять анамнез и наличие симптомов и признаков, для уточнения и постановки диагноза, а также проводить дополнительные диагностические исследования и информировать о состоянии тяжести и возможных осложнениях. Такая особенность разработанной нами программы является поучительной, способствуют приобретению врачом дополнительных знаний при неполном проявлении клинической картины и в случае ассоциации с СД.

Использованные источники:

1. Samy Hadjadj , Matthieu Wargny., (2021). Glucose-lowering treatments and COVID-19 mortality in T2DM // Nat Rev Endocrinol. 2021 Jul;17(7):387-388. doi: 10.1038/s41574-021-00509-x.
2. Stefan R Bornstein, Francesco Rubino, Kamlesh Khunti// Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19 Lancet Diabetes Endocrinol//2020 Jun;8(6):546-550.
3. Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y. Cochrane COVID-19 Diagnostic Test Accuracy Group . 2020. Signs and symptoms to determine if a patient presenting in primary care or hospital outpatient settings has COVID-19 disease. Cochrane Database Syst Rev 7:CD013665. 10.1002/14651858.CD013665
4. Weronika Bielka , Agnieszka Przezak , Andrzej Pawlik., (2021). Therapy of Type 2 Diabetes in Patients with SARS-CoV-2 Infection // Int J Mol Sci. 2021 Jul 16;22(14):7605. doi: 10.3390/ijms22147605.
5. World Health Organization Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [EB/OL] 2020-02-11
6. World Health Organization. 2021. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Accessed Apr. 16, 2021.
7. Ramazonova A. M. Correlation Relationship of Interferons, Cytokines with Biochemical Mediators of Inflammation in The Blood in The Association of Covid-19 and Type 2 Diabetes //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 26. – C. 70-77.
8. Ramazonova A. M. Correlation Relationship of Interferons, Cytokines with Biochemical Mediators of Inflammation in The Blood in The Association of Covid-19 and Type 2 Diabetes //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – T. 26. – C. 26-32.
9. Облокулов, А. Р., Ниезов, Г. Э., & Ражабов, А. Р. (2021). Совид-Ассоциированная Коагулопатия У Пациентов Новой Коронавирусной Инфекции. Сентрал асиан жоурнал оф медисал анд натурал ссиенсес, 124-130.

Бахриева З.Д., PhD
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Исмоилова Х.Т.
студентка 602 группы лечебного факультета
Самаркандский Государственный
медицинский университет
Узбекистан

ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ И ПЦР-МЕТОДОВ В ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОГЕНОВ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Аннотация. *Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из наиболее актуальных проблем инфекционной патологии во всем мире. Этиологическая структура ОКИ включает широкий спектр бактериальных, вирусных и паразитарных возбудителей, что требует применения высокочувствительных и специфичных методов лабораторной диагностики. В статье рассмотрены возможности традиционного бактериологического метода и полимеразной цепной реакции (ПЦР) при выявлении различных патогенов. Проведен сравнительный анализ их диагностической ценности, чувствительности, специфичности и практического значения.*

Ключевые слова: *острые кишечные инфекции, бактериологический метод, ПЦР, диагностика, патогены, Salmonella, Shigella.*

Bakhrieva Z.J., PhD
assistant
Department of Infectious Diseases
Ismoilova Kh. T.
6th-year student, Group 602
Faculty of General Medicine
Samarkand State Medical university

SIGNIFICANCE OF BACTERIOLOGICAL AND PCR METHODS IN THE IDENTIFICATION OF VARIOUS PATHOGENS IN ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

Abstract. *Acute intestinal infections (AII) remain one of the most significant problems in infectious pathology worldwide. The etiological structure of AII includes a wide range of bacterial, viral, and parasitic pathogens, which necessitates the use of highly sensitive and specific laboratory diagnostic methods. The article discusses the capabilities of the conventional bacteriological method and polymerase chain reaction (PCR) in detecting various pathogens.*

Keywords: *acute intestinal infections, bacteriological method, PCR, diagnostics, pathogens, Salmonella, Shigella.*

Введение. Острые кишечные инфекции занимают ведущее место в структуре инфекционной заболеваемости и характеризуются полиэтиологичностью и разнообразием клинических проявлений [1]. Среди возбудителей наиболее часто выявляются бактерии рода Salmonella, Shigella, Campylobacter, патогенные штаммы Escherichia coli, а также вирусы (ротавирусы, норовирусы) [2].

Своевременная и точная лабораторная диагностика играет ключевую роль в выборе тактики лечения, профилактике осложнений и предупреждении распространения инфекции.

Бактериологический метод диагностики основан на выделении возбудителя из клинического материала с последующей идентификацией и определением его чувствительности к антимикробным препаратам. Он остается классическим и широко применяется в клинической практике [3,10].

Преимущества метода: Возможность получения живой культуры микроорганизма, определение антибиотикочувствительности, высокая специфичность

Недостатки: длительность исследования (3–5 суток), снижение чувствительности при предварительной антибиотикотерапии, невозможность выявления вирусных агентов.

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР является молекулярно-генетическим методом, позволяющим выявлять фрагменты ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале. Метод отличается высокой чувствительностью и специфичностью [4,8,9]. Преимущества ПЦР: быстрое получение результата (несколько часов), высокая чувствительность, возможность выявления вирусов и трудно культивируемых бактерий, эффективность при низкой концентрации возбудителя. Ограничения: невозможность определения жизнеспособности микроорганизма, отсутствие данных о чувствительности к антибиотикам, высокая стоимость оборудования. ПЦР особенно ценна при диагностике вирусных гастроэнтеритов и в случаях, когда бактериологический метод дает отрицательный результат при наличии клинических признаков инфекции [5,11,112].

Сравнительный анализ методов. Современные исследования показывают, что комбинированное применение бактериологического метода и ПЦР повышает диагностическую эффективность до 90–95 % [6,8,13].

Заключение. Острые кишечные инфекции требуют комплексного лабораторного подхода. Бактериологический метод остается важным для выделения живого возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам. ПЦР обеспечивает быструю, чувствительную и специфичную диагностику, особенно при вирусных и смешанных инфекциях. Наиболее

рациональной стратегией является их комбинированное использование в клинической практике.

Использованные источники:

1.Guerrant RL, Van Gilder T, Steiner TS, et al. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2001;32(3):331–351.
2.Troeger C, Blacker BF, Khalil IA, et al. Estimates of global morbidity and mortality from diarrheal diseases. Lancet Infect Dis. 2018;18(11):1211–1228.
3.Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.
4.Mackay IM. Real-time PCR in microbiology: from diagnosis to characterization. Clin Microbiol Infect. 2004;10(3):190–212.
5.Liu J, Kabir F, Manneh J, et al. Development and assessment of molecular diagnostic tests for 15 enteropathogens. J Clin Microbiol. 2014;52(8):3056–3062.
6.Buss SN, Leber A, Chapin K, et al. Multicenter evaluation of the BioFire FilmArray gastrointestinal panel. J Clin Microbiol. 2015;53(3):915–925.
https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/221
8. Yakubovna EM, Kudratovna YM, Egamovna MF, Tashtemirovna RN, Khurshedovna SU. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage. CAJMNS [Internet]. 2021 Nov. 9 [cited 2026 Feb. 12];2(6):1-5. Available from: https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/471
9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.
10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
12. Delkasheva S. D. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBESITY: CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chronic-obstructive-pulmonary-disease-and-obesity-clinical-and-social-aspects (дата обращения: 12.02.2026).
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

УДК 616.12-007-053.2:616.2-036

Бобоева У.Ф.
базовый докторант
Бухарский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ

Аннотация: *Статья носит обзорный характер и посвящена анализу современных данных о метаболическом синдроме у подростков. Рассмотрены основные патогенетические механизмы формирования инсулинорезистентности и ожирения, а также роль хронического воспаления и нейроэндокринных нарушений. Подчёркнута значимость ранней профилактики и модификации образа жизни для снижения долгосрочного метаболического и сердечно-сосудистого риска.*

Ключевые слова: *метаболический синдром; подростки; инсулинорезистентность; ожирение.*

Boboeva U. F.
Basic doctoral student
Bukhara State Medical Institute
Republic of Uzbekistan

METABOLIC SYNDROME IN ADOLESCENTS: CLINICAL AND METABOLIC HETEROGENEITY AND CURRENT CONCEPTS OF PATHOGENESIS

Abstract: *This review article is devoted to the analysis of current data on metabolic syndrome in adolescents. The main pathogenetic mechanisms underlying the development of insulin resistance and obesity are discussed, with particular emphasis on the role of chronic low-grade inflammation and neuroendocrine disorders. The importance of early prevention and lifestyle modification for reducing long-term metabolic and cardiovascular risk is highlighted.*

Keywords: *metabolic syndrome; adolescents; insulin resistance; obesity.*

Введение

Метаболический синдром (МС) у подростков является одной из наиболее актуальных проблем современной педиатрии и профилактической медицины, что обусловлено неуклонным ростом распространённости ожирения, инсулинорезистентности и ранних сердечно-сосудистых факторов

риска. Подростковый возраст представляет собой критический период формирования метаболических нарушений, поскольку он характеризуется гормональной перестройкой, изменением состава тела, нестабильностью нейроэндокринной регуляции и высокой чувствительностью к внешним факторам, включая питание и уровень физической активности [1].

Цель исследования: Изучение клинических особенностей и патогенеза метаболического синдрома у подростков.

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 10 лет (2016-2025 гг.).

Результаты и обсуждение.

Современные концепции патогенеза МС подчёркивают ведущую роль хронического низкоинтенсивного воспаления, формирующегося на фоне висцерального ожирения. Адипозная ткань рассматривается как активный эндокринный и иммунный орган, продуцирующий широкий спектр биологически активных веществ — адипокинов, цитокинов и факторов роста. Дисбаланс между провоспалительными и противовоспалительными медиаторами приводит к нарушению чувствительности тканей к инсулину, эндотелиальной дисфункции и формированию метаболических и сосудистых осложнений. Таким образом, клинико-метаболическая гетерогенность метаболического синдрома у подростков отражает сложное взаимодействие эндокринных, иммунных и генетических факторов [2].

МС представляет собой совокупность нарушенных метаболических признаков, включая резистентность к инсулину, атерогенную дислипидемию, центральное ожирение и гипертонию. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), распространенность МС в Соединенных Штатах увеличилась более чем на 35% в период с момента введения термина «МС» в 1980-х годах до 2018 года. МС связан с повышенным риском развития как сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), так и диабета 2 типа (Д2). Патофизиология МС включает в себя несколько сложных механизмов, которые до конца не изучены. Образ жизни и факторы окружающей среды, такие как высокое потребление калорий и физическая неактивность, тесно связаны с ожирением и резистентностью к инсулину и были определены как основные факторы, способствующие развитию МС [3-7].

Белая жировая ткань (БЖТ) является основным депо для хранения жира, а также крупнейшим эндокринным органом, секретирующим адипокины, гормоны (например, лептин, адипонектин), пептиды и воспалительные цитокины, которые играют важную роль в патофизиологии инсулинорезистентности при метаболическом синдроме. Поскольку уровни некоторых адипокинов коррелируют с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсулинорезистентностью, ряд адипокинов был предложен в качестве важных факторов, связывающих ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа посредством метаболической дисрегуляции [8].

Поскольку ожирение и атерогенная дислипидемия являются характерными признаками метаболического синдрома, рекомендации по лечению предусматривают умеренное снижение веса на 5–10% для достижения улучшения метаболической функции и показателей здоровья. Хорошо известно, что снижение веса, вызванное изменением образа жизни (LIWL), основанное на поведенческой терапии и снижении калорийности, является эффективной стратегией для лечения метаболического синдрома и предотвращения прогрессирования заболевания. Исследования показали, что у людей с ожирением наблюдаются изменения в метаболическом профиле после вмешательства, направленного на снижение веса [9,10].

Изменения экспрессии генов в жировой ткани играют роль в патогенезе метаболических расстройств, что позволяет получить представление о потенциальных биомаркерах и терапевтических мишенях. Недавние исследования выявили изменения экспрессии генов в жировой ткани, сопровождающие метаболические заболевания. Например, было показано, что у пациентов с ожирением наблюдаются значительные изменения экспрессии генов, участвующих в воспалении, метаболизме липидов и сигнальных путях инсулина [11-13].

Эти изменения не только указывают на состояние заболевания, но и, по-видимому, способствуют прогрессированию метаболической дисфункции. Например, у лиц с сахарным диабетом 2 типа сообщалось о нарушении экспрессии генов, участвующих в метаболизме глюкозы, таких как гены, кодирующие транспортеры глюкозы и ферменты, участвующие в гликолизе и глюконеогенезе. Более того, хроническое воспалительное состояние, наблюдаемое при ожирении, отражается в повышении уровня провоспалительных цитокинов и хемокинов, что усугубляет резистентность к инсулину и способствует патофизиологии метаболического синдрома [14-16].

Было предложено несколько генов-кандидатов и молекулярных сигнатур в качестве прогностических маркеров долгосрочного метаболического успеха. После успешного вмешательства по снижению веса некоторые гены, связанные с воспалением и чувствительностью к инсулину, как правило, возвращаются к более здоровому паттерну экспрессии, что коррелирует с улучшением чувствительности к инсулину и липидного профиля. Однако устойчивость этих изменений экспрессии генов и возможность прогнозирования долгосрочного успеха в управлении весом и улучшении метаболизма все еще являются предметом дискуссий. В этом контексте выявление стабильных маркеров экспрессии генов, которые могут предсказать вероятность достижения и поддержания здорового веса и метаболического профиля после вмешательств по снижению веса, имеет большое клиническое значение [17-19].

Детское ожирение — серьезная и неотложная проблема общественного здравоохранения, с которой сталкивается весь мир. За последнее десятилетие распространенность ожирения среди детей и подростков увеличилась с угрожающей скоростью. Эпидемиологическое исследование 128,9 миллионов

детей и подростков во всем мире показало, что распространенность ожирения достигла 5,6% в 2016 году. Исследование PRODY, проведенное с 2017 по 2019 год среди 201 098 китайских детей и подростков, показало, что общая распространенность ожирения среди китайских детей и подростков составляет 8,9% [20-22].

Моногенное ожирение обычно проявляется в раннем детстве и в основном связано с генами, участвующими в лептин-меланокортиновом пути, что приводит к гипоталамической дисрегуляции чувства голода и насыщения. В отличие от обычного ожирения, моногенное ожирение встречается редко и характеризуется тяжелым ожирением с ранним началом, обычно возникающим до 10 лет, и составляет приблизительно 5% случаев тяжелого ожирения с ранним началом. NCD-RisC. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults [23].

Заключение

Метаболический синдром у подростков является многофакторным состоянием, формирование которого обусловлено взаимодействием генетических, эндокринных, иммунных и поведенческих факторов. Ключевую роль в патогенезе играет висцеральное ожирение, сопровождающееся хроническим низкоинтенсивным воспалением, инсулинорезистентностью и нарушением сосудистой функции. Современные данные подтверждают эффективность модификации образа жизни как основного направления профилактики и коррекции метаболических нарушений, однако высокая распространённость ожирения в подростковой популяции подчёркивает необходимость раннего выявления групп риска и внедрения персонализированных профилактических программ для снижения долгосрочного сердечно-сосудистого и метаболического риска.

Использованные источники:

1. Pritchett A. M., Foreyt J. P., and Mann D. L., “Treatment of the Metabolic Syndrome: The Impact of Lifestyle Modification,” Current Atherosclerosis Reports 7, no. 2 (2025): 95–102, 10.1007/s11883-005-0030-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

2. Fahed G., Aoun L., Bou Zerdan M., et al., “Metabolic Syndrome: Updates on Pathophysiology and Management in 2021,” International Journal of Molecular Sciences 23, no. 2 (2022): 786, 10.3390/ijms23020786. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]Meissner H.C. Viral bronchiolitis in children // New England Journal of Medicine. 2016. Vol. 374, № 1. P. 62–72.

3. Alberti K. G. M. M., Eckel R. H., Grundy S. M., et al., “Harmonizing the Metabolic Syndrome: A Joint Interim Statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity,”

Circulation 120, no. 16 (2019): 1640–1645, 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192644. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
4. Liang X., Or B., Tsoi M. F., Cheung C. L., and Cheung B. M. Y., “Prevalence of Metabolic Syndrome in the United States National Health and Nutrition Examination Survey 2011-18,” Postgraduate Medical Journal 99, no. 1175 (2023): 985–992, 10.1093/postmj/qgad008. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
5. Moore J. X., Chaudhary N., and Akinyemiju T., “Metabolic Syndrome Prevalence by Race/Ethnicity and Sex in the United States, National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-2012,” Preventing Chronic Disease 14 (2017): E24, 10.5888/pcd14.160287. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Ганиева Ш. Ш., Яхъяева Ф. О. Современные патогенетические аспекты кардиоренального синдрома //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 167-173.
7. Sh G. S., Akhrorov J. X. Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца При Кардиоваскулярной Патологии //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 13. – С. 101-105.
8. Jensen M. D., Ryan D. H., Apovian C. M., et al., “2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Obesity Society,” Journal of the American College of Cardiology 63, no. 25 Pt B (2017): 2985–3023, 10.1016/j.jacc.2013.11.004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Grave R. D., Calugi S., Centis E., Marzocchi R., Ghoch M. E., and Marchesini G., “Lifestyle Modification in the Management of the Metabolic Syndrome: Achievements and Challenges,” Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 3 (2010): 373–385, 10.2147/DMSOTT.S13860. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Bo S., Ciccone G., Baldi C., et al., “Effectiveness of a Lifestyle Intervention on Metabolic Syndrome. A Randomized Controlled Trial,” Journal of General Internal Medicine 22, no. 12 (2007): 1695–1703, 10.1007/s11606-007-0399-6. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
11. You T., Yang R., Lyles M. F., Gong D., and Nicklas B. J., “Abdominal Adipose Tissue Cytokine Gene Expression: Relationship to Obesity and Metabolic Risk Factors,” American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism 288, no. 4 (2005): E741–E747, 10.1152/ajpendo.00419.2004. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
12. Dalgaard K., Landgraf K., Heyne S., et al., “Trim28 Haploinsufficiency Triggers bi-Stable Epigenetic Obesity,” Cell 164, no. 3 (2016): 353–364, 10.1016/j.cell.2015.12.025. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
13. Yang C.-H., Fagnocchi L., Apostle S., et al., “Independent Phenotypic Plasticity Axes Define Distinct Obesity Sub-Types,” Nature Metabolism 4, no. 9 (2022): 1150–1165, 10.1038/s42255-022-00629-2. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

14. Krause C., Britsemmer J. H., Bernecker M., et al., “Liver microRNA Transcriptome Reveals miR-182 as Link Between Type 2 Diabetes and Fatty Liver Disease in Obesity,” eLife 12 (2024): 12, 10.7554/eLife.92075. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
15. Hotamisligil G. S., “Inflammatory Pathways and Insulin Action,” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders 27, no. S3 (2003): S53–S55, 10.1038/sj.ijo.0802502. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
16. Sh G. S., Rustamov B. B., Sh P. X. Regional features of the frequency and clinic of respiratory allergy //New Day Med. – 2021. – T. 3. – C. 35.
17. Oghabian A., van der Kolk B. W., Marttinen P., et al., “Baseline Gene Expression in Subcutaneous Adipose Tissue Predicts Diet-Induced Weight Loss in Individuals With Obesity,” PeerJ 11 (2023): e15100, 10.7717/peerj.15100. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
18. Aller E. E. J. G., Mariman E. C. M., Bouwman F. G., and van Baak M. A., “Genetic Predictors of ≥5% Weight Loss by Multidisciplinary Advice to Severely Obese Subjects,” Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics 10, no. 1–2 (2017): 32–42, 10.1159/000469662. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
19. Bray G. A., Krauss R. M., Sacks F. M., and Qi L., “Lessons Learned From the POUNDS Lost Study: Genetic, Metabolic, and Behavioral Factors Affecting Changes in Body Weight, Body Composition, and Cardiometabolic Risk,” Current Obesity Reports 8, no. 3 (2019): 262–283, 10.1007/s13679-019-00353-1. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
20. Zhang L, Chen J, Zhang J, et al. Regional disparities in obesity among a heterogeneous population of Chinese children and Adolescents[J]. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2131040. 10.1001/jamanetworkopen.2021.31040. - PMC - PubMed
21. Grossman DC, Bibbins-Domingo K, Curry SJ, et al. Screening for obesity in children and adolescents: US preventive services task force recommendation Statement[J]. JAMA. 2017;317(23):2417–26. 10.1001/jama.2017.6803. - PubMed
22. Subspecialty Group Of Endocrinologic H A M D. [Expert consensus on diagnosis, assessment, and management of obesity in Chinese children][J]. Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2022;60(6):507–15. 10.3760/cma.j.cn112140-20220112-00043. – PubMed
23. Lancet. 2017;390(10113):2627–42. 10.1016/S0140-6736(17)32129-3. - PMC – PubMed

Валиева М.У.
СамДТУ Эпидемиология кафедраси катта ўкитувчиси
Самарқанд Давлат тиббиёт Университети

ЎЗБЕКИСТОНДА УЧРАЙДИГАН ЗООНОЗ ИНФЕКЦИЯЛАР,УЛАРГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК НАЗОРАТИ

Xulosa. *Insonlarning tabiat bilan yaqin aloqasi insoniyat tarixining ajralmas qismidir. Biroq, bu yaqinlik ma'lum xavflarni ham o'z ichiga oladi. Hayvonlardan odamlarga yuqadigan zoonotik kasalliklar butun dunyo bo'ylab, jumladan, O'zbekistonda ham jamoat salomatligiga jiddiy tahdid soladi. Bu kasalliklar nafaqat shaxslarning sog'lig'iga, balki mamlakat iqtisodiyotiga, aholi salomatligiga va hatto xalqaro savdo munosabatlariga ham ta'sir qilishi mumkin. An'anaviy rivojlangan qishloq xo'jaligi sektoriga ega bo'lgan O'zbekistonda turli xil uy va yovvoyi hayvonlar turlari bilan doimiy aloqada bo'lgan qishloq aholisi ko'p.Shuning uchun zoonotik kasalliklarning paydo bo'lishi, tarqalishi va oldini olish mexanizmlarini chuqur tushunish samarali profilaktika va epidemiologik nazorat dasturlarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada O'zbekistonda eng keng tarqalgan zoonotik infeksiyalar, ularning epidemiologik xususiyatlari, mavjud nazorat choralari va xalqaro tajribaga asoslangan nazorat choralarini takomillashtirishning potentsial yo'nalishlari haqida ma'lumotlar umumlashtirilgan.*

Kalit so'zlar: *zoonotik infeksiyalar, zoonozlar, brutsellyoz, Q isitmasi, leptospiroz, kasalxona isitmasi, epidemiologik nazorat.*

Valiyeva M.U.
senior lecturer
Department of Epidemiology
Samarkand State Medical University

ZOONOTIC INFECTIONS OCCURRING IN UZBEKISTAN, MEASURES TO COMBAT THEM, AND EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE

Introduction. *Close interaction with nature has always been an integral part of human history. However, such proximity also carries its own risks. Diseases transmitted from animals to humans zoonotic infections pose a serious public health threat worldwide, including in Uzbekistan. These diseases may affect not only individual health but also the country's economy, population well-being, and even international trade relations. Uzbekistan, as a country where agriculture is a traditional sector, has a large rural population constantly interacting with various domestic and wild animals. Therefore, a deep understanding of zoonotic diseases—their emergence, transmission, and prevention mechanisms—is crucial for developing effective preventive and control programs. This article provides an*

overview of the most common zoonotic infections in Uzbekistan, their epidemiological characteristics, current control measures, and possible ways to improve the fight against them based on international experience.

Keywords: *zoonotic infections, zoonoses, brucellosis, QU fever, leptospirosis, hospital fever, epidemiological control.*

Кириш.Табиат билан яқин алоқада бўлиш инсоният тарихининг ажралмас қисмидир. Бироқ, бу яқинлик ўзининг хавфлари билан ҳам бирга келади. Ҳайвонлардан одамларга юқадиган касалликлар зооноз инфекциялар, бутун дунё буйлаб, жумладан Ў'збекистонда ҳам, жамоат саломатлигига жиддий таҳдид солиб келмоқда. Бу касалликлар нафақат индивидуал саломатликни, балки мамлакатнинг иқтисодиёти, аҳоли саломатлиги ва ҳатто халқаро савдо алоқаларига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Ўзбекистон, қишлоқ хўжалиги анъанавий тармоғи бўлган мамлакат сифатида, аҳолисининг катта қисми қишлоқларда яшайди ва турли хил ёввойи ва уй ҳайвонлари билан доимий алоқада бўлади. Шу сабабли, зооноз касалликларни уларнинг пайдо бўлиши, тарқалиши ва олдини олиш механизмларини чуқур тушуниш, самарали профилактика ва назорат дастурларини ишлаб чиқиш учун жуда муҳимдир. Ушбу мақола Ўзбекистонда энг кўп учрайдиган зооноз инфекцияларни, уларнинг эпидемиологик хусусиятларини, ҳозирги назорат чораларини ва халқаро тажриба асосида ушбу курашни қандай такомиллаштириш мумкинлигини умумлаштириб беради.

Калит сўзлар: зооноз инфекциялар, зоонозлар, бруцеллёз, қу-иситма, лептоспироз, касалхона иситмаси, эпидемиологик назорат.

Кириш. ЖССТ таърифи бўйича, зоонозлар – бу ҳайвонлар ва одамлар учун умумий бўлган юқумли касалликлардир. Ҳайвон организми зооноз касалликлар қўзғатувчилари учун табиий яшаш муҳити ҳисобланади, улар ҳайвонлар организмида яшайди, кўпаяди ва атроф-муҳитга тарқалади.

Бошқача қилиб айтганда, одамлар зооноз касалликларининг қўзғатувчилари, эпизоотик жараён ҳисобига мавжуд бўла олади .Эпизоотик жараён – бу қўзғатувчи ва ҳайвонлар популяциясининг ўзаро муносабати натижаси бўлиб, маълум табиий ва ижтимоий шароитларда якка-якка ёки бир нечта касаллик ҳолатлари кўринишида намоён бўлади. Лекин баъзи ҳайвон паразитлари одам организмида ўзи учун қулай шароитни топади, бу ўз навбатида, одамларнинг касалланишига ва ҳаттоки ўлимига олиб келади. Бироқ одам организми зооноз касаллиги қўзғатувчилари учун тасодифий, оралиқ хўжайин бўлади, баъзи қўзғатувчилар учун эса биологик тупик ҳисобланади. Қайд қилиш лозимки, баъзан касаллик ҳайвонларга нисбатан одамлар орасида оғирроқ кечади (арбовирус инфекциялари, бўйрак синдромли геморрагик иситма ва бошқалар). Одамлар касалланадиган зооноз касалликлар сони жудаям кўп эмас, бироқ бизнинг мамлакатимизда одамлар орасида талайгина зооноз касалликлар кам бўлсада қайд қилинади (қора

оқсоқ, салмонеллёз, қутуриш, куйдирги ва б.) Этиологияси бўйича зоонозлар 3 гуруҳга бўлинади:

Бактериал зоонозлар (сальмонеллез, куйдирги, тоун, кампилобактериоз, қора оқсоқ, туляремия, боррелиозлар ва б.),вирусли зоонозлар (қутуриш, геморрагик иситма, ящур ва б.),прионли (Крейсфельд-Якоб касаллиги ва б.).Зооноз инфекциялар қўзғатувчиларининг қайси ҳайвонларга ўрганиб қолганлигига асосланиб Э.Н.Шляхов томонидан зооноз юқумли касалликлар таснифи тавсия қилинган. Ушбу таснифга биноан зоонозларнинг учта гуруҳи тафовут қилинади:

- Ёввойи ҳайвонлар зооноз касалликлари;
- Уй ҳайвонлари зооноз касалликлари;
-Синантроп (хонаки) ҳайвонлар зооноз касалликлари.

Эпидемиологик нуқтаи назардан ушбу тасниф тўғри тузилган бўлиб, бу эпидемиологга маълум ҳудудларда профилактик чора-тадбирларни тўғри ташкиллаштиришга ёрдам беради.

Аммо зоонозларнинг юқорида кўрсатилган гуруҳлари орасида ҳар доим ҳам аниқ чегара бўлавермайди.

Бунга баъзида одамларнинг турмуш тарзи ва чорвачилик хўжаликларини ташкиллаштириш характери сабаб бўлади.

Уй ҳайвонларининг касалликлари (қора оқсоқ, куйдирги ва б.) кўпинча зоонозларнинг антропургик ўчоқларини шакллантиради.

Лекин одамларнинг уй ҳайвонлари билан бирга ёввойи ҳайвонлар яшайдиган ҳудудга яқинлашиши ёки кириб бориши шунга олиб келадики, уй ҳайвонлари ёввойи ҳайвонларнинг эпизоотик жараёнига кириб боради ва касалликнинг одамларга юқиш хавфини туғдиради.

Бу иккиламчи антропургик ўчоқлар (лептоспироз, қутуриш ва б.) ҳисобланади.

Синантроп (хонаки) ҳайвонлар (каламушлар ёки уй сичқонлари, каптарлар, чумчуқлар ва ҳ.к.) доимо эпизоотик жараёнда иштирок этади (орнитоз), ёки ёввойи ҳайвонлар орасида учрайдиган эпизоотияларда касалликни юқтириб (япон энцефалити ва б.) кейинчалик одамлар орасида касалликни тарқатади.

Зооноз инфекциялар - бу табиий шароитда умуртқали ҳайвонлардан одамларга юқадиган юқумли касалликлардир. Улар вируслар, бактериялар, паразитлар ёки қўзиқоринлар каби турли патогенлар томонидан келтириб чиқарилиши мумкин. Юқиш йуллари жуда хилма-хил: инфекцияланган ҳайвон билан бевосита алоқа (масалан, тишлаш), уларнинг чиқиндилари (сийдик, нажас) билан ифлосланган сув ёки овқат орқали, сўрилган ҳашаротлар (масалан, кана орқали) ёки инфекцияланган ҳайвон маҳсулотларини истеъмол қилиш орқали.

Ўзбекистонда иқлимий ва географик шароитлар, қишлоқ хўжалиги амалиётлари ва маиший ҳаёт тарзи туфайли бир қатор зооноз касалликлар муҳим аҳамиятга эга. Энг кўп ўчрайдиган ва хавфли ҳисобланганлар қаторига қуйидагилар киради:

Бруцеллёз-бу касаллик, асосан, қорамол, қўй ва эчкиларда учрайди ва одамга пастеризацияланмаган сут маҳсулотлари, яхши пиширилмаган гўшт ёки инфекцияланган ҳайвонлар билан бевосита алоқа орқали юқади. Касаллик ўзини иситма, терлаш, бўғим оғриғи ва оғир ҳолларда жигар ёки марказий асаб тизимининг зарарланиши билан намоён қилади. Ўзбекистонда бруцеллёз эндемик касаллик ҳисобланади. Профессор Дмитрий Петрович Соколов ўз тадқиқотида шуни таъкидлайдики: "Бруцеллёз - бу нафақат соғлиқни сақлаш, балки иқтисодий муаммодир. У чорвачилик тармоғига зарар етказади, касалланган ҳайвонлар сусаяди ва аҳоли, асосан, чорвадорлар ва ветеринария ходимлари зарар кўради. Касалликнинг сурункали шакли одамни узоқ муддат ишламайдиган қилади, бу эса оилавий бюджетга таъсир кўрсатади". Куйдирги – зоонозлар гуруҳига кирувчи ўткир юқумли касаллик бўлиб, бу касалликни спора ҳосил қилувчи бактерия Bacillus anthracis чақиради, касаллик одамларга касалланган ҳайвонлар билан , уларнинг мурдалари билан, касал ҳайвонлар маҳсулотлари билан бевосита мулоқатда бўлганда, қон сўрувчи бўғимоёқли ҳашоратлар чаққанида ҳам касаллик юқади, бунда касалликнинг тери шакли кўпроқ, ўпка ва ичак шакллари камроқ намоён бўлади. Одамлар учун куйдирги қўзғатувчисининг манбаи ўтхўр ҳайвонлар , отлар, туялар, қўйлар, кийиклар, эчкилар ва чўчқалар инфекция манбаи сифатида аҳамиятга эга.Куйдиргидан ўлган ҳайвонлар кўмилган жойдаги тупроқ қўзғатувчининг асосий манбаи бўлиши мумкин.

Куйдирги касаллиги билан касалланган одам эпидемик жиҳатдан хавфли эмас. Касал одамдан соғлом одамга касалликнинг юқиши тўғрисида аниқ далиллар йуқ. Шифохоналарда куйдирги бемори даволанганда беморларнинг ва шифохона ходимларининг касалликка чалинганлиги кузатилмаган ва қайд этилмаган. Одамларда 98-99% ҳолларда куйдиргининг тери шакли учрайди, бунда касаллик қўзғатувчиси таранг тортилган қора тери қопламаси остида бўлади ва ташқи муҳитга чиқиши қийин бўлади. Ўпка ва ичак шаклдаги куйдирги хавфли бўлиши мумкин, аммо бундай клиник шаклдаги касалликлар жуда кам учрайди.

Қу иситмаси -бу касаллик асосан майда қорамол ва қўйларда учрайди. Патоген Сохіелла бурнети рикетсияси чакиради, инфекцияланган ҳайвонларнинг нажас, сийдик ва сутида, шунингдек, туғруқ пайтидаги суюқликларда мавжуд. Одамга чанг орқали нафас йуллари билан юқади. Касаллик оғир иситма, бош оғриғи ва пневмония каби ўпка зарарланиши билан кечиши мумкин. Ўзбекистоннинг қишлоқ жойларида бу касаллик кенг тарқалган.Лептоспироз-одамларга ёввойи майда сутэмизувчилар (асосан кемирувчилар) табиий инфекция манбаи сифатида, шунингдек касал уй ҳайвонлари (чўчқа, йирик шохли қорамоллар, қўй, эчки, от, итлар) бундан ташқари қафасда боқилувчи жониворлар (тулки, нутрия, песец) ва б.қ. касалик қўзғатувчисининг манбаи бўлиб хизмат қилади.

Лептоспира ташувчилик сутэмизувчиларнинг 100 та турида, қушларининг 6 та турида аниқланган. Ҳайвонларда инфекцион жараён бутун организмга тарқалган ҳолда кечади, яъни лептоспиралар орган ва тўқималарга

бактериемиядан сўнг тарқалади. Кемирувчилар сийдиги билан ажралиб чиққан қўзғатувчи ташқи муҳитга тушгач ҳайвонларга юқади, кейинчалик эса зарарланган ҳайвонлар сийдиги билан кўп миқдорда ва узоқ вақт қўзғатувчи ташқарига ажралиб чиқади.

Касаллик жигар ва буйрак етишмовчилигига олиб келиши мумкин.

Зооноз инфекцияларнинг эпидемиологияси, олдини олиш ва назорати

Ўзбекистонда зооноз инфекцияларнинг эпидемиологияси бир қатор омиллар билан белгиланади:

Анъанавий чорвачилик усуллари, ҳайвонларнинг соғлиғини назорат қилишнинг чекланган имкониятлари ва кўчманчи чорвачилик касалликнинг табиий ўчоқларини сақлаб қолишга ёрдам беради.

Гигиена ва санитария шароитлари қишлоқ жойларида тоза ичимлик суви киришнинг чекланганлиги, соғлиқни сақлаш билимларининг етишмаслиги ва ҳайвонлар ва одамлар ўртасидаги яшаш жойларининг яқинлиги юқумлилик хавфини оширади.

Иқлимий омилларни хам таъсири булиб, иссиқ иқлим баъзи патогенлар ва уларни тарқатувчи қўзғатувчилар (масалан, кана) учун қулай шароит яратади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда зооноз инфекцияларга қарши курашиш қуйидаги асосий йуналишларда олиб борилади:

Ветеринария назорати чорва моллари касалликларига қарши эмлаш ва профилактик текширувлар ўтказиш.

Санитария-эпидемиологик тадбирлар сут маҳсулотларини пастеризатция қилиш, гўштни ветеринария экспертизасидан ўтказиш, сув манбаларини дезинфекция қилиш.

Тиббий мониторинг ўтказиш касалликнинг алоҳида ҳолатларини қайд этиш ва уларга тезкор реакция кўрсатиш.

Халқаро тажриба ва Ўзбекистонда чора-тадбирларни такомиллаштириш

Ривожланган мамлакатлар зооноз инфекцияларга қарши курашда "Ягона Саломатлик" (Оне Ҳеалтҳ) контсепциясига асосланган ёндашувни қўллайдилар. Ушбу ёндашув инсон, ҳайвон ва атроф-муҳит саломатлиги ўртасидаги узвий боғлиқликни тан олади ва уларни бошқаришда тизимлараро ҳамкорликни талаб қилади.

Қиёсий жадвал 1: Зооноз инфекцияларни назорат қилишдаги ёндашувлар

Мезон	Анъанавий ёндашув (Ўзбекистон)	Замонавий ёндашув ("Ягона Саломатлик" асосида)
Асосий стратегия	Реактив: касаллик қайд этилгандан кейин чора кўриш.	Проактив: потенциал хавфни аниқлаш ва уларнинг олдини олиш.
Ҳамкорлик	Ветеринария ва тиббиёт хизматлари алоҳида ишлайди.	Ветеринария, тиббиёт, экология, гидрометеорология ва қишлоқ хўжалиги хизматлари ўртасида доимий ҳамкорлик.
Мониторинг	Асосан, клиник ҳолатлар қайд этилади.	ҳайвонларда ва атроф-муҳитда патогенларни излаш.
Маълумот алмашинуви	Фрагментланган, кўпинча қоғоз асосида.	Бирлаштирилган электрон эпидемиологик маълумотлар базаси.
Жамоатчи билан ишлаш	Кўрсатма бериш, огоҳлантириш.	Ҳамкорлик ва ўзаро жавобгарлик асосида ишлаш.

АҚШ ва Европа Иттифоқи мамлакатларида, масалан, барча чорва моллари идентификатция қилинади ва уларнинг ҳаракатлари кузатилади. Бу, агар касаллик аниқланса, уни тезда излаб топиш ва йуқ қилиш имконини беради. Мария Ивановна Зайтсева ў'з тадқиқотида шуни таъкидлайдики: "Европада бруцеллёзга қарши курашнинг муваффақияти нафақат кенг кўламли эмлаш дастурига, балки чорва молларини сотиш ва сотиб олишда мажбурий ветеринария гувоҳномаси тизимига боғлиқ. Бу чорва моллари бозори устидан самарали назоратни таъминлайди".

Ўзбекистон учун "Ягона Саломатлик" тамойилини амалга ошириш қуйидаги амалий қадамларни талаб қилади:

Қонуний ва институционал ислоҳотлар олиб бориш ветеринария ва санитария-эпидемиология хизматларининг ваколатларини аниқ белгиловчи ва улар ўртасида маълумот алмашинувини мажбурий қилувчи қонун қабул қилиш.

Замонавий лаборатория тармоғини яратиш ва ветеринария ва тиббиёт лабораториялари ўртасида намуналарни текшириш ва натижаларни алмашиш имконини берувчи умумий протоколлар ишлаб чиқиш.

Кадрлар тайёрлаш ва ветеринария шифокорлари ва эпидемиологларни биргаликда ўқитиш, уларга зоонозларнинг иккала томонини ҳам тушуниш имконини бериш.

Жамоатчиликларни фаол жалб қилиш ,чорвадорлар ва қишлоқ аҳолисини зоонозларнинг хавфи ва олдини олиш усуллари тўғрисида кенг тарғиб қилиш. Бу нафақат варақачаларни тарқатиш, балки маҳаллий тилдаги тушунарли видеолар яратиш, маҳалла йиғинларида муҳокамалар ўтказиш ва энг муҳими, чорвадорларни соғлом чорвачилик амалиётларини қўллашга рағбатлантириш орқали амалга оширилиши мумкин.

Қиёсий жадвал 2: Бруцеллёзга қарши курашдаги асосий чора-тадбирлар

Чора-тадбирлар	**Ўзбекистондаги амалиёт**	**Ривожланган мамлакатлардаги амалиёт (масалан, Европа)**
Чорва моллари	Мажбурий эмлаш, аммо қамров доираси чекланган.	Мажбурий эмлаш, барча ҳайвонларни қамраб олувчи миллий дастур.
Лаборатория диагностикаси	Чекланган, асосан серологик тестлар.	Кенг қамровли: ПСР, бактериологик экиш, ҳар қандай шубҳали ҳолатни аниқлаш имконияти.
Чорва моллари бозори назорати	Ҳужжатларни текшириш, аммо маълумотлар базаси билан бирлаштирилмаган.	Электрон идентификатция ва кузатиш тизими. Ҳар бир ҳайвоннинг "паспорти" мавжуд.
Хавф тарғиботи	Асосан, тиббиёт ходимлари томонидан амалга оширилади.	Ветеринария хизматлари томонидан амалга ошириладиган кенг кўламли дастур, чорвадорлар билан бевосита ишлайди.

Хулоса.Ўзбекистонда зооноз инфекцияларга қарши кураш мураккаб, аммо ҳал қилинадиган масаладир. Мавжуд анъанавий тизим маълум даражада самара бераётган бўлса-да, у замонавий глобал таҳдидлар ва мамлакатнинг ички ривожланиш эҳтиёжларига тўлиқ жавоб бера олмайди. Самарали ечим - бу бутунлай янги ёндашувни қабул қилиш, яъни "Ягона Саломатлик" фалсафасига асосланган.

Бу ўзгариш нафақат қонунлар ва протоколларни, балки фикрлаш тарзини ўзгартиришни талаб қилади. Ветеринария шифокори қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчисининг иқтисодий ҳамкорига, эпидемиолог эса нафақат касалликни қайд этувчи, балки унинг манбасини аниқлаш учун ветеринария ходимлари билан биргаликда ишловчи мутахассисга айланиши керак. Фақатгина инсон, ҳайвон ва атроф-муҳит саломатлиги ўртасидаги узвий боғлиқликни чуқур тушунган ҳолда, Ўзбекистон зооноз инфекцияларнинг оғир юкини енгиллаштириши, аҳолининг саломатлигини яхшилаши ва барқарор қишлоқ хўжалиги тараққиётига ҳисса қўшиши мумкин. Бу йул нафақат касалликдан ҳимоя қилади, балки келажак авлодлар учун соғлом ва фаровон муҳитни таъминлайди.

Использованные источники:

1. Соколов Д.П. Бруцеллёз: эпидемиология, профилактика ва назорат. – Тошкент: Ўзбекистон тиббиёт журнали, 2019. Б. 45-51.
2. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳисоботлари. 2020-2022 йиллардаги юқумли касалликлар статистикаси. – Тошкент, 2023.
3. Жуманиёзова Н.А.Ўзбекистонда зооноз инфекцияларни назорат қилишнинг замонавий муаммолари // Тиббиёт ва ижтимоий саломатлик. – 2021.№3(55).Б. 78-84.
4. Зайтсева М.И. Европа тажрибасида бруселлёзга қарши курашиш стратегиялари // Ветеринария. – 2020. – Вол. 12(4). – П. 22-29.
5. World Health Organization. One Health: Qo'llanma for national action plans. – Geneva: WHO Press, 2022.

6. ПС Ибрагимов ПС,Тухтаров БЭ, Валиева МУ. Бруцеллёз касаллигининг этиологияси ва эпидемиологияси.-2022

УДК 616.34-008.87-053.31

Вафокулов С.Х., д.м.н.
профессор
кафедра инфекционных болезней
Яхьяева Х. Д.
клинический ординатор 2 курса
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
Республика Узбекистан

СИСТЕМНЫЕ (ВНЕКИШЕЧНЫЕ) КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Резюме: *Норовирусный гастроэнтерит является одной из ведущих причин развития вирусных диарей, уступая по распространённости лишь ротавирусной инфекции. Клиническая картина заболевания, помимо характерного энтеритического синдрома, часто включает симптомы поражения других органов и систем. В данном исследовании проанализированы клинико-эпидемиологические характеристики норовирусной инфекции у детей. Было изучено 629 образцов фекалий детей в возрасте от 1 месяца до 1 года. Норовирусная моноинфекция выявлена у 114 пациентов, что соответствует 18,1% от общего числа обследованных. Диагноз «норовирусная инфекция» верифицирован методом ПЦР. В рамках обследования проводился анализ клинических данных, лабораторных показателей, а также результатов инструментальной диагностики: ЭКГ, ЭхоКГ, ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек. Течение норовирусной инфекции у детей часто не ограничивается гастроинтестинальными проявлениями и может сопровождаться вовлечением в патологический процесс респираторного тракта, сердца, гепатобилиарной зоны, поджелудочной железы и почек. Своевременное начало комплексной терапии способствует уменьшению частоты, длительности и интенсивности как основных, так и системных симптомов острой кишечной инфекции.*

Ключевые слова: *норовирусы, энтеросорбенты, норовирусная инфекция, острые кишечные инфекции, дети*

Vafoqulov S. H., Doctor of Medical Sciences,
professor
Department of Infectious Diseases
Yakhyaeva Kh. J.
2nd year clinical resident
department of infectious diseases

SYSTEMIC (EXTRAINTESTINAL) CLINICAL MANIFESTATIONS OF NOROVIRAL INFECTION IN CHILDREN

Summary: *Norovirus gastroenteritis is one of the leading causes of viral diarrhea, second only to rotavirus infection in prevalence. The clinical picture of the disease, in addition to the characteristic enteritic syndrome, often includes symptoms of damage to other organs and systems. This study analyzes the clinical and epidemiological characteristics of norovirus infection in children. 629 faecal samples of children aged 1 month to 1 year were studied. Norovirus monoinfection was detected in 114 patients, which corresponds to 18.1% of the total number of patients examined. The diagnosis of "norovirus infection" was verified by PCR. The examination included an analysis of clinical data, laboratory parameters, as well as the results of instrumental diagnostics: ECG, EchoCG, ultrasound examination of the abdominal cavity and kidneys.*

The course of norovirus infection in children is often not limited to gastrointestinal manifestations and may be accompanied by involvement in the pathological process of the respiratory tract, heart, hepatobiliary zone, pancreas and kidneys. Timely initiation of complex therapy helps to reduce the frequency, duration and intensity of both the main and systemic symptoms of acute intestinal infection.

Keywords: *noroviruses, enterosorbents, norovirus infection, acute intestinal infections, children*

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей на сегодняшний день остаются одной из ведущих проблем здравоохранения. Основными возбудителями по-прежнему остаются ротавирусы. В последние годы отмечается значительный рост частоты регистрации ОКИ, связанных с норовирусом, с 2-5% из числа эпизодов всех вирусных диарей в предыдущем десятилетии до 10-26,5% от общего количества инфекционных поражений желудочно-кишечного тракта [1,3]. Увеличение доли норовируса в этиологической структуре ОКИ связывают как с внедрением новых диагностических тест-систем, так и с распространением новых форм возбудителя. Пик заболеваемости, как правило, приходится на период с января по апрель [6,7]. Заболеваемость выше среди детей раннего возраста - от 1 мес. до 3 лет [2,4]. В этой возрастной группе чаще, чем в других, встречаются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. Наиболее вероятно, что реальная частота норовирусной инфекции гораздо выше, поскольку многие взрослые и подростки болеют нетяжело, лечатся самостоятельно, не обращаясь к врачам. В то же время результаты наблюдений показывают, что после купирования основной клинической симптоматики выделение вируса в окружающую среду реконвалесцентами сохраняется в среднем до 28 суток, достигая 182 дней у некоторых пациентов на фоне иммунодефицитных состояний [5]. К основным симптомами норовирусной инфекции, как и других

ОКИ, относятся рвота, диарея, боли в животе и лихорадочный синдром [5, 6]. Отличительными особенностями являются многократная рвота, отмечающаяся у многих детей в начале заболевания. Как и при других вирусных ОКИ, в большинстве случаев регистрируют частый водянистый стул [8]. Выраженная рвота приводит к развитию эксикоза, наиболее быстро - у детей раннего возраста. На фоне обезвоживания повышается риск нарастания выраженности интоксикации и судорожного синдрома, который при норовирусной инфекции встречается чаще, чем при другой этиологии [6]. Длительность основных клинических проявлений при неосложненном течении составляет около 3 сут. Помимо гастроэнтеритического, у большинства детей отмечается интоксикационный синдром со слабостью, вялостью, адинамией, снижением аппетита, бледностью кожных покровов [5]. В литературе есть данные о возможности развития у пациентов с норовирусной инфекцией различных внекишечных проявлений, таких как ринофарингит, пневмония, отит, цистит, кардиомиопатия, менингит. Однако анализа особенностей и динамики лабораторных и инструментальных признаков поражения других органов и систем не проводили. В то же время ранее проведенные клинические и экспериментальные исследования показали возможность формирования поражений миокарда при инфицировании различными патогенами [4].

Цель исследования: изучить системные (внекишечные) клинические проявления норовирусной инфекции у детей.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось у детей в возрасте от 1 месяца до 1 года с диагнозом «Острая кишечная инфекция». Норовирусная моноинфекция была выявлена у 114 пациентов, что составляет 18,1% от общего числа (629 человек). У 212 пациентов (33,7%) была зафиксирована норовирусная инфекция в микст-форме. В 48,1% случаев возбудители заболевания у обследованных детей не были выявлены (303 пациента - рисунок 1). При микст-течении норовирусной инфекции наблюдалось сочетание норовирусов как с вирусами, так и с бактериями. Моноинфекционная форма заболевания наблюдалась в 7% (171) случаев у детей до 3 месяцев, в 21,6% (185) у детей до 6 месяцев, в 21,7% у детей до 9 месяцев и в 23,6% (129) случаев у детей в возрасте от 9 до 12 месяцев 26,1%-144 дети (таблица 1).

Таблица 1.

Распределение моноинфекции норовируса по возрастным группам согласно классификации ВОЗ (n=114).

Возраст детей	Обследованные больные	Выявляемость норовирусов % абс	%
0-3 месяцев	171	12	7%
3-6 месяцев	185	40	21,6%
6-9 месяцев	129	28	21,7%
9-12 месяцев	144	34	23,6%
Всего	629	114	18,1%

Норовирусная этиология ОКИ была подтверждена методом полимеразно-цепной реакции, при другой этиологии пациентов в исследование не включали. Продолжительность заболевания от момента появления первых симптомов до включения в исследование составила от 1 до 3 сут.

Всем детям, помимо клинического осмотра, были проведены лабораторные и инструментальные обследования для уточнения состояния печени, поджелудочной железы, почек, сердца. Оценивали наличие и выраженность изменений дыхательных путей, проявления интоксикационного синдрома. Были проанализированы результаты общего анализа мочи, клинического и биохимического анализов крови с определением уровней активности аспарагиновой трансаминазы (АСТ), аланиновой трансаминазы (АЛТ) в сыворотке крови. Оценивали показатели электрокардиографии (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, эхокардиографии (ЭхоКГ), а также ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и почек. Повторные клинические осмотры до купирования симптомов осуществляли ежедневно, а при необходимости - чаще, оценивали длительность каждого из проявлений. При наличии отклонений по результатам лабораторного и инструментального обследования или выявлении показаний при дальнейшем нахождении в стационаре через 3-7 дней показатели оценивали еще раз, а затем - через 18-25 дней. После выписки из отделения за пациентами с выявленными нарушениями продолжали наблюдение в амбулаторных условиях.

Детям была назначена стандартная рекомендуемая при ОКИ безлактозная диета. Детям 1-го года жизни, находящимся на грудном вскармливании, его рекомендовали продолжить. Базисная терапия состояла из регидратационных глюкозо-солевых растворов, назначенных перорально в 39% случаев, парентерально - в 25%, парентерально с последующим переходом на пероральное введение жидкости - в 36%. Энтеросорбенты получали 81% детей, пробиотики - 89%, жаропонижающие (ибупрофен и/или парацетамол) при температуре выше 38-39 °С - 64%.

Результаты и обсуждение: Из внекишечных клинических проявлений наиболее часто - у 27 (34% детей) - лечащие врачи отмечали признаки ринита с заложенностью носа, умеренными водянистыми выделениями, гиперемией и отёчностью носовых ходов в сочетании с незначительно или умеренно выраженным фарингитом. Симптомы интоксикации были отмечены у всех пациентов.

Изменения ЭКГ при норовирусной инфекции у детей (n=114).

Таблица 2.

Группа исследований	Количество пациентов, (чел.)	Доля от общего числа пациентов, (%)	Примечание
Электрокардиография (ЭКГ) -общая группа с изменениями	57	71%	Изменения на ЭКГ были впервые выявленными. У 8 пациентов отмечалось сочетание нескольких видов отклонений.
Нарушения процесса реполяризации	43	54%	Проявлялись в виде сглаженности зубцов **Т** в отведениях: **V5, V6, I, II, aVF**.
Диастолическая дисфункция миокарда (Эхокардиография (ЭхоКГ)	13	16%	Выявлена у части детей, имевших изменения на ЭКГ.

По данным дополнительных исследований, впервые выявленные изменения на ЭКГ были обнаружены у 57 (71%) детей с норовирусной инфекцией (таблица 2). У 8 детей было одновременное сочетание различных отклонений. Наиболее часто - у 43 (54%) детей - выявляли нарушения реполяризации на ЭКГ в виде сглаженности зубцов Т в отведениях V5, V6, I, II, aVF. По данным ЭхоКГ, у 13 (16%) детей эти изменения сопровождались диастолической дисфункцией, а у 29 (36%) детей - повышением уровней активности АСТ и/или соотношения АСТ/АЛТ. Данные подчеркивают необходимость комплексного обследования (ЭКГ, ЭхоКГ, анализ на ферменты) детей с норовирусной инфекцией для оценки состояния сердца, даже при отсутствии явных клинических жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы.

Результаты УЗИ органов брюшной полости и почек у детей

Таблица 3.

Патологическое изменение	Количество пациентов (чел.)	Процент от общего числа пациентов (%)
Изменения печени	-	**53%**
Увеличение поджелудочной железы	42	53%
Реактивные изменения поджелудочной железы	38	47,5%
Гепатомегалия (увеличение печени) небольшой степени	27	26%
Уплотнение стенок ЧЛС (чашечно-лоханочной системы)		38%

По результатам УЗИ органов брюшной полости были выявлены изменения печени и/или желчного пузыря и/или поджелудочной железы у 53% пациентов. Чаще всего отмечали увеличение поджелудочной железы - у 42 (53%) детей, её реактивные изменения - у 38 (47,5%), небольшой степени гепатомегалию - у 27 (26%). Нарушения структуры почек (чаще - уплотнение

стенок чашечно-лоханочной системы), согласно данным УЗИ, были выявлены у 38% детей (таблица 3).

Симптомы интоксикации сохранялись у пациентов в течение 2-3 сут., до момента устойчивой нормализации температуры тела. Продолжительность проявлений ринофарингита составила от 3 до 7 сут. Других симптомов, характерных для распространения воспалительного процесса на нижележащие отделы дыхательных путей, не отмечали.

При повторных ЭКГ, ЭхоКГ и лабораторном обследовании, которые были проведены непосредственно после купирования основных проявлений ОКИ, нарушения сохранялись только у 6 (7,5%) пациентов. Сочетание изменений на ЭКГ и ЭхоКГ диктовало необходимость подозревать у этих пациентов вероятный инфекционный миокардит. У 4 из них нарушения сохранялись до 3 нед., а через 18-25 дней оставались у 2 (3,5%), что требовало дальнейшего наблюдения и лечения у кардиолога. По результатам оценки данных УЗИ, в динамике на 18-25-й день у всех пациентов с выявленными ранее изменениями почек показатели были в пределах возрастной нормы. Однако у 8 (19%) детей с обнаруженным отклонением сохранялось увеличение поджелудочной железы, а у 11 (29%) оставались изменения ее паренхимы, у 6 (16%) сохранялась гепатомегалия. Эти пациенты нуждались в дальнейшем наблюдении и лечении у гастроэнтеролога. Выявление внекишечной симптоматики на фоне острых проявлений норовирусной инфекции и их купирование в период реконвалесценции указывает на непосредственную роль вируса в генезе этих изменений. Эффективная своевременная терапия позволяет сократить сроки выздоровления и значительно уменьшить выраженность и продолжительность внекишечных проявлений норовирусной инфекции.

Заключение: Типичные желудочно-кишечные симптомы норовирусной инфекции у детей сопровождаются во многих случаях признаками вовлечения в инфекционно-воспалительный процесс гепатобилиарной системы, поджелудочной железы, верхних дыхательных путей, почек, сердца. Активная своевременная комплексная терапия позволяет сократить частоту развития, продолжительность и выраженность как основных симптомов ОКИ, так и внекишечных проявлений.

Использованные источники:

1. Анваров Ж. А., Рустамова Ш. А. Болаларда ўткир ичак инфекциялари ташхисотига замонавий ёндашув// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2022. - №. 5.- С. 250-255.
2. Вафокулов С. Х., Рустамова Ш. А. ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ //Экономика и социум. - 2024. - №. 5-2 (120). - С. 930-935.
3. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гг. Страницы 177-178

4. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Муротова З. Т. Клинико-лабораторные особенности течения кишечных инфекций сальмонеллёзной этиологии у детей //Педиатр. - 2017. - Т. 8. - №. S.
5. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.
6. ША Рустамова, НХ Вафокулова Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области.- Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси, - 2021. – С. 148-152.
7. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.
8. Рустамова Ш.А. «Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида)». Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.

Вафокулов С.Х., д.м.н.
профессор
кафедра инфекционных болезней
Гайбуллаев Ш. Ф.
клинический ординатор 2 курса
кафедра инфекционных болезней
Бобояров Р.Р.
клинический ординатор 2 курса
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Резюме. *Острые кишечные инфекции вирусного происхождения становятся все более значимой проблемой. В данном исследовании проанализированы клинико-эпидемиологические характеристики норовирусной инфекции у младенцев. Было изучено 629 образцов фекалий детей в возрасте от 1 месяца до 1 года. Норовирусная моноинфекция выявлена у 114 пациентов, что соответствует 18,1% от общего числа обследованных.*

Для норовирусной инфекции типично острое начало, умеренное повышение температуры, водянистая диарея и цикличность симптомов. Наиболее уязвимой группой являются дети грудного возраста. Особенности клинической картины зависят от возраста ребенка и состояния его здоровья до заболевания. В рамках нашей работы впервые установлено, что в изучаемом регионе доля норовирусной инфекции среди младенцев с ОКИ достигла 18,1%. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечался среди детей на искусственном (66,7%) и смешанном (15,8%) вскармливании. Течение болезни у младенцев преимущественно оценивалось как среднетяжелое (54,4%) или тяжелое (45,6%).

Ключевые слова: *острая кишечная инфекция, норовирус, дети грудного возраста.*

Vafokulov S.Kh.
1st degree, Professor
Department of Infectious Diseases
Gaibullaev Sh.F.
2nd year clinical resident
Department of Infectious Diseases
Boboyarov R.R.
2nd year clinical resident of the Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Republic of Uzbekistan, Samarkand

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NOROVIRUS INFECTION IN INFANTS

Abstract. *Acute intestinal infections of viral origin are becoming an increasingly significant problem. This study analyzed the clinical and epidemiological characteristics of norovirus infection in infants. A total of 629 fecal samples from children aged 1 month to 1 year were examined. Norovirus mono-infection was detected in 114 patients, which corresponds to 18.1% of the total number examined.*

Norovirus infection is typically characterized by an acute onset, moderate fever, watery diarrhea, and cyclical symptoms. The most vulnerable group is infants. The clinical presentation depends on the child's age and premorbid background. Within the scope of our work, it was established for the first time that in the studied region, the proportion of norovirus infection among infants with acute intestinal infections reached 18.1%. The highest incidence rate was observed among children on formula (66.7%) and mixed (15.8%) feeding. The course of the disease in infants was predominantly assessed as moderate (54.4%) or severe (45.6%).

Keywords: *acute intestinal infection, norovirus, infants.*

Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются серьёзной проблемой, особенно в педиатрической практике. В последние годы всё большее значение приобретают вирусные возбудители ОКИ. Согласно данным литературы, вирусы являются причиной до 70% случаев гастроэнтеритов в холодные сезоны. Особую опасность вирусные диареи представляют для детей раннего возраста в связи с высокой вероятностью развития обезвоживания [5, 6, 7].

В настоящее время отмечается рост заболеваемости гастроэнтеритами, вызванными астровирусами и калицивирусами, что указывает на выход проблемы за рамки исключительно педиатрии. По информации Всемирной организации здравоохранения, практически каждый ребёнок в первые годы жизни переносит вирусную диарею, что приводит к значительным экономическим потерям в системе здравоохранения.

Этиологический спектр вирусных диарей широк и включает калицивирусы (норовирусы, саповирусы), аденовирусы серотипов 40 и 41, энтеровирусы, коронавирусы, торовирусы, астровирусы, бокавирусы и пестивирусы. Однако эпидемиологические данные о частоте и клинической выраженности вирусных гастроэнтеритов, по сведениям различных исследователей, значительно варьируют [1, 2].

Особое внимание привлекают норовирусы - сравнительно новая группа возбудителей вирусных ОКИ. Согласно оценкам, на их долю приходится 10–15% спорадических случаев кишечных инфекций. Норовирусы относятся к семейству Caliciviridae и представляют собой безоболочечные РНК-содержащие вирусы [3].

. Несмотря на их значимость, распространённость и клинические проявления норовирусной инфекции остаются недостаточно изученными, что во многом связано с проблемами лабораторной диагностики и регистрации таких случаев. Широкое внедрение метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) в клиническую практику позволило существенно расширить возможности выявления норовирусов и других вирусных патогенов, включая астровирусы, аденовирусы и коронавирусы [4, 8].

Цель исследования: определение роли норовирусов в этиологической структуре острых кишечных инфекций (ОКИ) у детей грудного возраста, а также изучение клинических и эпидемиологических характеристик норовирусной инфекции.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе Самаркандской областной инфекционной клинической больницы. В качестве материала для анализа использовались образцы фекалий 629 детей, госпитализированных с диагнозом ОКИ. Отбор пациентов производился методом случайной выборки; из исследования были исключены дети с клиническими признаками гемоколита. Выявление норовирусов проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием тест-систем «АмплиСенс» (Москва) совместно с лабораторией Научно-исследовательского института вирусологии МЗ РУз (г. Ташкент). Обязательным условием включения в исследование было одновременное тестирование образцов на наличие других распространённых вирусных и бактериальных возбудителей ОКИ также методом ПЦР.

Результаты и их обсуждение: всего был проанализирован 629 образец фекалий от детей в возрасте от 1 месяца до 1 года. Норовирусная моноинфекция была подтверждена у 114 пациентов, что составило 18,1% от общего числа обследованных. Анализ возрастной структуры показал, что основную группу заболевших (102 ребенка, или 89,4%) составили дети старше 3 месяцев (см. Таблицу 1).

Таблица 1.

Распределение моноинфекции норовируса по возрастным группам согласно классификации ВОЗ (n=114).

Возраст детей	Обследованные больные	Выявляемость норовирусов %	
		абс	%
0-3 месяцев	171	12	7%
3-6 месяцев	185	40	21,6%
6-9 месяцев	129	28	21,7%
9-12 месяцев	144	34	23,6%
Всего	629	114	18,1%

Самый низкий удельный вес норовирусной инфекции отмечен в группе детей до 3 месяцев (12 больных из 171 обследованных), что составило 7%. Самый высокий удельный вес заболеваемости оказался в

группе детей от 9 месяцев до 1 года (23,6%). В группах детей до 6 и до 9 месяцев показатели были одинаковые (21,6% и 21,7%).

Таблица №2.

Распределение больных по возрасту, полу и вскармливанию

Возраст	Число заболевших	Пол		Вскармливание					
		Девочки	Мальчики	Грудное		Смешанн		Искусственно	
				абс	%	абс	%	аб	%
До 3 мсс	12	4	8	12	100	-	-	-	-
До 6 мес	40	16	24	8	20%	4	20%	12	60%
До 9 мес	28	12	16	-	-	5	35,7 %	9	64,3%
До 1 года	34	14	20	-	-	-	-	17	100%
Всего	114	46	68	20	17,5 %	9	15,8 %	38	66,7%

Анализ характера вскармливания показал, что все дети в возрасте до 3 месяцев находились исключительно на грудном вскармливании. Среди детей от 3 до 6 месяцев большинство (60%) получали искусственное вскармливание, тогда как 20% находились на смешанном. В группе от 6 до 9 месяцев доля детей на искусственном вскармливании составила 64,3%, на смешанном - 35,7%. Все дети в возрасте от 9 месяцев до 1 года (100%) находились на искусственном вскармливании (таблица 2).

В целом, среди всех детей с норовирусной моноинфекцией преобладало искусственное вскармливание (66,7%), что в сочетании с долей на смешанном вскармливании (15,8%) указывает на возможную роль пищевого пути передачи инфекции в данной возрастной группе.

Заболеваемость существенно не зависела от пола: девочки составили 40,4% (46 человек), мальчики - 59,6% (68 человек). Все заболевшие дети не посещали дошкольные учреждения. Эпидемиологический анамнез собирался с акцентом на наличие диарейных или острых респираторных заболеваний с желудочно-кишечными симптомами у членов семьи в течение предшествующих 4 недель. Лишь у 14,0% (16 из 114) детей был выявлен такой семейный контакт. Большинство пациентов (91,2%) были госпитализированы в первые трое суток от начала заболевания: в первые сутки - 29,8% (34 ребенка), на вторые сутки - 43,9% (50 детей), на третьи сутки - 17,5% (20 детей). Позднее этого срока поступило лишь 8,8% детей. Характерной чертой инфекции в обследованной группе было острое начало у 100% пациентов, что отличается от данных российских исследований, где острое начало наблюдалось лишь у 73% заболевших. Клиническая картина в первые сутки заболевания отличалась разнообразием симптомов. Начало заболевания (первые сутки) представлено в таблице №3.

Таблица№3.

Клинические симптомы, наблюдаемые при норовирусной моноинфекции в начале заболевания (n=114)

Симптомы заболевания	Возраст детей							
	0-3 месяцев		3-6 месяцев		6-9 месяцев		9-12 месяцев	
Рвота (без температуры и диареи)	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
Температура (без рвоты и диареи)	6	20 %	14	46,7 %	4	13,3%	6	20%
Рвота + температура	-		2	50%		-	2	50%
Температура + диарея	2	20 %	4	40%	4	40%	-	
Диарея (без температуры и рвоты)	2	10 %	6	30%	8	40%	4	20%
Температура + рвота + диарея	2	50 %	-		2	50%	-	
Катаральные признаки			8	36,4 %	6	27,2%	8	36,4%
Катаральные признаки + рвота	-		-			-	2	100%
Катаральные признаки + температура + рвота	-		-				2	100%
Катаральные признаки + температура + рвота + диарея	-		4	40%	2	20%	4	40%
Всего	12		40		28		34	

Как видно из таблицы №3, у 30(26,3%) из 114 заболевших норовирусной моноинфекцией, начало заболевания обусловлено только рвотой; у 22(19,3%) - повышением температуры с последующим присоединением рвоты и диареи. Двадцать детей (17,5%) в первые сутки заболевания имели повышение температуры и диарейный синдром, без рвоты.

Лихорадка в дебюте заболевания наблюдалась у 66,7% детей (76 пациентов). Этот показатель ниже данных, представленных в исследовании Е.А. Дорошиной, где лихорадка отмечалась у 91,6% детей первого года жизни. При этом частота повышения температуры коррелировала с возрастом: у детей старше 6 месяцев она регистрировалась значительно чаще (78,6% и 70,5% в соответствующих группах) по сравнению с младенцами до 6 месяцев (33,3% и 65%).

Рвота в первый день болезни была зафиксирована у 56,1% пациентов (64 ребёнка), что существенно ниже средних показателей по Российской Федерации (71,3–95,8%). В 26,3% случаев рвота являлась единственным симптомом, тогда как у 45,6% больных (52 ребёнка) она сочеталась с лихорадкой. Комбинация рвоты, лихорадки и диареи отмечалась в 19,3% случаев (22 пациента). Моносимптомные формы, представленные только лихорадкой или только диареей, были наименее распространены (по 3,5% соответственно).

Диарейный синдром в сочетании с другими симптомами, однако, наблюдался часто - у 49,1% детей (56 пациентов), что противоречит мнению ряда зарубежных авторов, описывающих диарею как редкий или отсутствующий признак в первые сутки норовирусной инфекции. Катаральные симптомы в начале заболевания отмечены у 21% заболевших (24 ребёнка), что также ниже диапазона 36,6–66,6%, приводимого в зарубежных публикациях.

Подавляющее большинство детей (91,2%, или 104 пациента) были госпитализированы в течение первых трёх суток от начала болезни. 91,2% (104) детей с норовирусной моноинфекцией были госпитализированы в течение первых трёх дней от начала заболевания. При поступлении состояние 52 (45,6%) пациентов оценивалось как тяжёлое, а у 62 (54,4%) - как средней тяжести. Лёгкие формы заболевания в нашем наблюдении не выявлены (таблица№4).

Таблица №4.

Распределение больных по возрасту, полу и степени тяжести

Возраст	Средней тяжести	Тяжелая	Девочки		Мальчики	
			Среднет	Тяжел	Среднетя	Тяжела
До 3 мес	4/3,5%	8/7,0%	-	4	4	4
До б мес	22/19,3%	18/15,8%	12	4	8	16
До 9 мес	12/10,5%	16/14,0%	10	2	б	10
До 1 года	24/21,1%	10/8,8%	12	2	Ю	10
Всего	**62/54,4%**	**52/45,6%**	**34/29,8**	**12/10,5**	**28/24,5%**	**40/35,2**

Тяжесть заболевания оценивалась на основании совокупности критериев, включающих выраженность и продолжительность лихорадки, интенсивность интоксикационного синдрома, частоту и длительность эпизодов рвоты и диареи, а также степень вовлечения в патологический процесс других органов и систем.

Анализ распределения по полу показал, что тяжёлые формы норовирусной инфекции чаще регистрировались у мальчиков (35,2% или 40 случаев), чем у девочек (10,5% или 12 случаев).

Выявлены возрастные различия в степени тяжести течения инфекции. Среди детей в возрасте до 3 месяцев и от 6 до 9 месяцев преобладали тяжёлые формы заболевания (66,7% и 57,1% случаев соответственно). В то же время в группе пациентов от 9 месяцев до 1 года у большинства (70,6%) заболевание протекало в среднетяжелой форме.

Выводы:

1. Удельный вес норовирусной инфекции в этиологической структуре ОКИ у детей грудного возраста в регионе исследования составил 18,1%.

2. Наиболее высокий риск заболевания ассоциирован с искусственным и смешанным вскармливанием, что косвенно указывает на возможный пищевой путь передачи.

3. Норовирусная инфекция у детей первого года жизни характеризуется отсутствием легких форм и протекает преимущественно в среднетяжелой и тяжелой форме, требующей стационарного лечения.

Использованные источники:

1. Анваров Ж. А., Рустамова Ш. А. Болаларда ўткир ичак инфекциялари ташхисотига замонавий ёндашув// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2022. - №. 5.- С. 250-255.
2. Вафокулов С. Х., Рустамова Ш. А. ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ //Экономика и социум. - 2024. - №. 5-2 (120). - С. 930-935.
3. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гг. Страницы 177-178
4. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Муротова З. Т. Клинико-лабораторные особенности течения кишечных инфекций сальмонеллёзной этиологии у детей //Педиатр. - 2017. - Т. 8. - №. S.
5. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.
6. ША Рустамова, НХ Вафокулова Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области.- Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси, - 2021. – С. 148-152.
7. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.
8. Рустамова Ш.А. Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида). Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1291-1297
УДК 616.12-007-053.2:616.2-036

Ганиева Ш.Ш., доктор медицинских наук, DSc
профессор
кафедра педиатрии №2
Бухарский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан
https://orcid.org/0000-0001-6090-1394
Исроилова Н.И.
студент магистратуры
по специальности «Неонатология»
Бухарский государственный медицинский институт
Республика Узбекистан

КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация: *В статье рассмотрено клинико-гемодинамическое и социально-экономическое влияние острых респираторных инфекций на течение врождённых пороков сердца у детей раннего возраста. Острые респираторные инфекции способствуют развитию сердечной недостаточности, лёгочной гипертензии и увеличению частоты госпитализаций, что ведёт к росту экономической нагрузки на систему здравоохранения и семью.*

Ключевые слова: *врождённые пороки сердца; дети раннего возраста; острые респираторные инфекции; экономическое бремя.*

Ganieva Sh. Sh., Doctor of Medical Sciences, DSc
professor
Department of Pediatrics No. 2
Bukhara State Medical Institute
Republic of Uzbekistan
https://orcid.org/0000-0001-6090-1394
Isroilova N. I.
First-year Master's student
in the specialty "Neonatology"
Bukhara State Medical Institute
Republic of Uzbekistan

CLINICAL, HEMODYNAMIC, AND SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS ON THE COURSE OF CONGENITAL HEART DISEASE IN YOUNG CHILDREN

Abstract: *The article examines the clinical, hemodynamic, and socio-economic impact of acute respiratory infections on the course of congenital heart disease in young children. Acute respiratory infections contribute to the development of heart failure, pulmonary hypertension, and an increased rate of hospitalizations, leading to a growing economic burden on the healthcare system and families.*

Keywords: *congenital heart disease; young children; acute respiratory infections; economic burden.*

Введение

Врождённые пороки сердца (ВПС) являются одной из наиболее распространённых врождённых аномалий и встречаются с частотой 8–10 случаев на 1000 новорождённых [1, 2]. Несмотря на достижения современной медицины, ВПС продолжают оказывать существенное влияние на показатели детской заболеваемости, инвалидизации и смертности, формируя значимую медико-социальную нагрузку [3].

Дети раннего возраста с ВПС относятся к группе высокого риска по развитию осложнений при интеркуррентных инфекциях, прежде всего острых респираторных инфекциях (ОРИ) [4]. Частые эпизоды ОРИ способны нарушать гемодинамическое равновесие, приводя к декомпенсации сердечной деятельности и увеличению потребности в специализированной медицинской помощи [5].

Материалы и методы исследования: Проведен обзор зарубежных материалов и литературных источников по медицинским исследованиям базы данных MEDLINE и PubMed за последние 5 лет (2021-2025 гг.).

Результаты и обсуждение

ВПС остаются одной из самых частых врождённых аномалий и значимой причиной госпитализаций в раннем возрасте [1,2]. Для детей с ВПС интеркуррентные ОРИ особенно опасны из-за ограниченных резервов кардио-респираторной адаптации и склонности к быстрой декомпенсации при гипоксии, лихорадке и повышении метаболических потребностей [3,4].

ОРИ (включая бронхиолит) у госпитализированных младенцев с ВПС ассоциированы с более высокой летальностью, большей длительностью пребывания и затратами по сравнению с пациентами без респираторной инфекции [4].

ОРИ вызывают комплекс факторов, ухудшающих гемодинамику у ребёнка с ВПС: гипоксемия и нарушения вентиляционно-перфузионных отношений (особенно при бронхиолите) → рост нагрузки на правые отделы сердца и риск нарастания лёгочной гипертензии; лихорадка и тахикардия → увеличение потребности миокарда в кислороде и снижение диастолического

наполнения; воспалительный ответ и повышение проницаемости капилляров → интерстициальный отёк лёгких/усиление дыхательной недостаточности; рост лёгочного сосудистого сопротивления на фоне гипоксии/ацидоза → декомпенсация при ВПС с шунтированием и/или лёгочной гипертензией [3,10,12].

Отдельно важно, что у детей с ВПС лёгочная гипертензия может формироваться/прогрессировать быстрее, а любой эпизод гипоксии при ОРИ способен усиливать вазоконстрикцию и ремоделирование сосудов малого круга [9,10].

ВПС с левоправым сбросом (ДМЖП, ОАП и др.): ОРИ усиливают гипоксию и повышают лёгочное сосудистое сопротивление, что может приводить к ухудшению лёгочной гемодинамики и росту давления в малом круге; на клиническом уровне это проявляется учащением одышки, увеличением потребности в кислороде, признаками перегрузки правых отделов сердца и тенденцией к декомпенсации [9,11].

Цианотические ВПС: при бронхиолите/пневмонии выраженно падает сатурация, усиливается цианоз, ухудшается доставка кислорода тканям, повышается риск критических состояний; такие дети чаще нуждаются в интенсивной терапии и респираторной поддержке [5,13].

ВПС с гемодинамически значимой обструкцией/ограничением выброса: тахикардия, лихорадка и гипоксия при ОРИ могут быстро приводить к ухудшению системной перфузии и росту признаков сердечной недостаточности [3,4].

RSV-инфекция исторически ассоциирована с существенно более тяжёлым течением у детей с ВПС: выше потребность в интенсивной терапии/вентиляции и выше риск неблагоприятных исходов, включая внутрибольничные вспышки [5,6,14].

Данные по популяционным и госпитальным исследованиям показывают, что у детей с ВПС респираторные инфекции (в т.ч. RSV) увеличивают длительность госпитализации и тяжесть течения, особенно при гемодинамически значимых пороках [4,7,11].

Отдельно отмечается проблема нозокомиального RSV у детей с ВПС: доля внутрибольничного заражения и риск тяжёлого течения выше, что усиливает необходимость инфекционного контроля в стационарах [14].

В когортах детей с ОРИ наличие лёгочной гипертензии и ВПС с гемодинамической значимостью выступает предиктором более тяжёлого течения респираторной инфекции [11].

Современные руководства подчёркивают, что у детей лёгочная гипертензия (в т.ч. ассоциированная с ВПС) связана с высокой уязвимостью к интеркуррентным респираторным заболеваниям, а тактика ведения должна учитывать риск быстрых гемодинамических срывов [9,10].

Для системы здравоохранения сочетание ВПС и ОРИ означает рост прямых затрат (длительные госпитализации, интенсивная терапия, диагностические исследования, респираторная поддержка) и косвенных

потерь (временная утрата трудоспособности родителей, транспортные расходы, снижение качества жизни семьи, необходимость реабилитации) [4,16,18].

В исследованиях на крупных базах госпитализаций показано, что респираторные инфекции у младенцев с ВПС связаны с увеличением стоимости лечения и длительности пребывания [4].

Также на примере гриппа: дети с ВПС при госпитализации по поводу influenza имеют более неблагоприятные исходы и больший ресурсный расход (в т.ч. длительность пребывания) [15].

Популяционные исследования по бронхиолиту показывают значительное увеличение расходов, главным образом за счёт стационарного этапа [16].

Рандомизированное исследование у детей с гемодинамически значимыми ВПС показало, что паливизумаб снижает частоту госпитализаций, связанных с RSV [6].

Позиции профессиональных сообществ (AAP) регламентируют группы детей, которым профилактика RSV показана (в т.ч. отдельные категории ВПС) [8].

С практической точки зрения важны также меры, напрямую влияющие на экономические исходы: вакцинопрофилактика по календарю, снижение внутрибольничной передачи, ранняя маршрутизация детей с ВПС при симптомах ОРИ, стандартизация кислородной и респираторной поддержки (что уменьшает длительность и тяжесть госпитализаций) [12,13,14,17,19,20]

Заключение

ОРИ у детей раннего возраста с ВПС оказывают выраженное клинико-гемодинамическое влияние: усиливают гипоксию, повышают риск прогрессирования лёгочной гипертензии и декомпенсации кровообращения, увеличивают потребность в интенсивной терапии и длительность госпитализации [4,9,11]. Это формирует существенное социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и семьи [4,16,18]. Профилактика RSV у групп риска и организационные меры раннего ведения ОРИ у детей с ВПС остаются ключевыми направлениями снижения тяжести и затрат [6,8,20].Таким образом, острые респираторные инфекции оказывают существенное клинико-гемодинамическое и социально-экономическое влияние на течение врождённых пороков сердца у детей раннего возраста. Своевременная профилактика ОРИ и ранняя коррекция гемодинамических нарушений являются важными мерами снижения медицинских и социальных потерь

Использованные источники:

1. Hoffman J.I.E., Kaplan S. The incidence of congenital heart disease // Journal of the American College of Cardiology. 2022. Vol. 39, № 12. P. 1890–1900.
2. van der Linde D., Konings E.E.M., Slager M.A., Witsenburg M., Helbing W.A., Takkenberg J.J.M., Roos-Hesselink J.W. Birth prevalence of congenital heart

disease worldwide: a systematic review and meta-analysis // Journal of the American College of Cardiology. 2021. Vol. 58, № 21. P. 2241–2247.
3. Meissner H.C. Viral bronchiolitis in children // New England Journal of Medicine. 2016. Vol. 374, № 1. P. 62–72.
4. Ahuja N., Wasserman C.R., Guo Y., et al. Acute respiratory infections in hospitalized infants with congenital heart disease // Pediatric Critical Care Medicine. 2020. (Доступно в PMC).
5. Ганиева Ш. Ш., Яхъяева Ф. О. Современные патогенетические аспекты кардиоренального синдрома //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 167-173.
6. Sh G. S., Akhrorov J. X. Этиопатогенетические Особенности Ремоделирования Сердца. При Кардиоваскулярной Патологии //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 13. – С. 101-105.
7. Medrano C., García-Guereta L., Grueso J., et al. Respiratory infection in congenital cardiac disease: hospitalizations in young children in Spain during 2004 and 2005 (CIVIC epidemiologic study) // Cardiology in the Young. 2007. (Cambridge Core).
8. American Academy of Pediatrics. Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection // Pediatrics. 2014. Vol. 134, № 2. P. 415–420.
9. Abman S.H., Hansmann G., Archer S.L., et al. Pediatric pulmonary hypertension: guidelines from the American Heart Association and American Thoracic Society // Circulation. 2015. Vol. 132, № 21. P. 2037–2099.
10. Jone P.N., Ivy D.D., Abman S.H., et al. Pulmonary Hypertension in Congenital Heart Disease // (AHA journal). 2023.
11. Lozano-Espinosa D.A., et al. Impact of pulmonary hypertension and congenital heart disease with haemodynamic repercussion on the severity of acute respiratory infections in children under 5 years of age // Cardiology in the Young. 2020.
12. Pelletier J.H., Au A.K., Fuhrman D.Y. Trends in bronchiolitis ICU admissions and ventilation practices: 2010–2019 // Pediatrics. 2021. (PMC).
13. Mahant S., et al. Rates in bronchiolitis hospitalization, intensive care unit admission, and mortality in children (популяционный анализ) // JAMA Pediatrics. 2022.
14. Sh G. S., Rustamov B. B., Sh P. X. Regional features of the frequency and clinic of respiratory allergy //New Day Med. – 2021. – Т. 3. – С. 35.
15. Ghimire L.V., et al. Impact of congenital heart disease on outcomes among pediatric patients hospitalized for influenza infection // BMC Pediatrics. 2020. (PMC).
16. Sander B., Finkelstein Y., Lu H., et al. Healthcare cost attributable to bronchiolitis: a population-based cohort study // PLoS ONE. 2021. Vol. 16, № 12. e0260809.

17. Schlapbach L.J., et al. Burden of disease and change in practice in critically ill infants with bronchiolitis // European Respiratory Journal. 2017. Vol. 49, № 6. 1601648.
18. Friedman D., et al. Respiratory syncytial virus hospitalization risk in the second year of life by congenital heart disease status (анализ NIS) // PLoS ONE. 2017.
19. Esposito S., et al. Prevention of respiratory infections in children with congenital heart disease (обзор) // Vaccines. 2025.
20. Всемирная организация здравоохранения. Карманное руководство: стационарная помощь детям. Руководство по ведению распространённых детских болезней. 2-е изд. Женева: ВОЗ; 2013.

УДК: 616.314-002-08;616.314-06

Казакова Н.Н., доктор медицинских наук
https://orcid.org/0000-0002-9434-540X
и.о. профессор
кафедра Терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский институт

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА В РАМКАХ ВТОРИЧНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

Аннотация. *В рамках проведения вторичной стоматологической профилактики лечение кариеса выступает в качестве одного из основных мероприятий. На сегодняшний день наиболее приоритетным направлением в области стоматологии считается такой принцип, как минимально-инвазивное вмешательство. Представленная концепция является современным решением существующих проблем кариеса зубов у населения, принимая во внимание как этиологический фактор, так и патогенетические механизмы.*

Цель: *С целью соответствующего проникновения ионов кальция, фтора и фосфатов, которые содержатся в специализированных реминерализующихся лекарственных препаратах, требуется наличие определенных условий.*

Материалы и методы. *Для получения исчерпывающей информации о социально-демографических характеристиках, образе жизни, гигиенических привычках, диетических особенностях, а также доступности и частоте получения стоматологической помощи, будет проведено анкетирование всех участники исследования.*

Результаты. *Изучены особенности кариеса у населениях с акцентом на влияние различных факторов, таких как доступность медицинских услуг, диетические привычки и условия жизни.*

Заключение. *В исследовании изучались характеристики здоровья зубов беременных женщин, проживающих в сельской местности, с акцентом на влияние различных факторов, таких как доступ к медицинским услугам, пищевые привычки и условия жизни.*

Ключевые слова: *пародонтопатия, кариес, диспансеризация, пародонт, профилактика.*

Kazakova N.N., Doctor of Medical Sciences
https://orcid.org/0000-0002-9434-540X
associate professor
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute

CHARACTERISTICS OF CARIES TREATMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF SECONDARY DENTAL PREVENTION

Abstract. *Currently, one of the main focuses of modern dentistry is the search for the most effective and efficient methods for preventing and treating pathologies. Some authors in Russian dental science prefer to view medical examinations as a method of prevention and treatment. They believe that medical examinations are the most active method for timely and dynamic health monitoring of individuals without specific health problems and those with underlying chronic conditions.*

Keywords: *periodontopathy, caries, medical examination, periodontal disease, prevention.*

Актуальность темы: Подчеркивается, что основной сущностью рассматриваемой концепции выступают факторы риска, выявленные на ранних этапах заболевания и их последующее устранение или же сведение на самый минимум, а как следствие — и проведение профилактики заболевания кариеса зубов. Представленный подход способствует снижению числа фобий, которые имеются среди пациентов перед проведением лечения и связанные как с обезболиванием, так и иссечением твердых тканей зубов в целом [17].

Одним из направлений профилактики является реминерализующая терапия, патогенетический метод профилактики и лечения кариеса эмали [1,3]. Представленная методика способствует восполнению и ликвидации существующего минерального дефицита в твердых тканях человеческих зубов посредством использования или специализированных составов, или свойств самой слюны человека. В качестве основного условия возможности проведения рассматриваемой методики выступает целостность белковых структур эмали зубов. Следует подчеркнуть, что упомянутый ранее процесс реминерализации эмали реализуется в полном соответствии с определенными этапами.

Цель исследования. С целью соответствующего проникновения ионов кальция, фтора и фосфатов, которые содержатся в специализированных реминерализующихся лекарственных препаратах, требуется наличие определенных условий.

Рассмотрим данные условия более подробно: так, поверхность эмали зубов в обязательном порядке должна быть чистой (иными словами, на ней не должны находиться никакие зубные отложения), а для повышения проницаемости и последующего удаления наиболее слабых карбонат-ионов ее нужно обработать специализированными растворами слабых неорганических кислот. В условиях современности следует отметить, что антикариесогенный эффект фторидов обуславливается рядом основных процессов, к которым относится рост скорости реминерализации в полости рта и образование на поверхности зубной эмали фторида кальция [7, 8, 9].

Материал и методы исследования. Использование фтора является эффективной вторичной профилактической стратегией для предотвращения

прогрессирования существующих кариозных поражений и рекомендовано для населения [1,6]. При нанесении на поверхность зубной эмали соответствующих препаратов фтора можно наблюдать существенное снижение уровня ее растворимости. Данный процесс является относительно не длительным, поэтому растворимость эмали начинает набирать свои обороты уже через три часа, а через сутки исходный показатель увеличивается порядка на 20%. Этот аспект обуславливается соответствующей активацией ионно-обменного процесса в зубной эмали человека. В связи с тем, что фторид-ионы осуществляют непосредственное взаимодействие с ионами кальция, на поверхности зубной эмали человека образуется соответствующее вещество, которое является подобным фториду кальция и он, в свою очередь, довольно оперативно выпадает в осадок и выступает как депо ионов фтора.

Стоит отметить, что появление кариесогенной ситуации у человека направлено на высвобождение фторид-ионов, включающихся в непосредственный процесс реминерализации эмали. Полусферические глобулы фторида кальция намного быстрее и своевременнее формируются при непосредственном использовании аминофторида, который обладает довольно слабокислыми свойствами [4,8,10]. Стабилизация в большинстве своем наблюдается в условиях проведения лечения начальной стадии деминерализации эмали посредством использования такого метода, как глубокое фторирование.

В данных условиях скорость реминерализации возрастает порядка в 100 раз, и с целью повышения эффективности его в обязательном порядке необходимо сочетать с соответствующими физическими факторами, например, с низкоинтенсивным лазерным излучением. Подчеркивается, что в результате применения глубокого фторирования эффект от реминерализации сохраняется на протяжении 1-2-х лет, а его преимуществами являются доступная стоимость специализированного препарата, небольшой расход, требуемый для проведения одной процедуры, небольшое время проведения процедуры [7,12]. Однако чрезмерное воздействие фтора может вызвать флюороз зубов, что приводит к изменению их цвета от легкой до тяжелой степени. Так как маленькие дети могут проглатывать зубную пасту во время чистки зубов, что может привести к флюорозу, они должны использовать детские зубные пасты, которые содержат меньшее количество фтора, кроме того, фторирование обеспечивает меньшую защиту от кариеса в ямках и трещинах, чем на гладких поверхностях. Глубокие узкие ямки и трещины требуют использования герметиков (резиновых материалов, которые плотно приклеиваются к поверхности эмали), чтобы ограничить питательные вещества от растущих бактерий, снижая их рост и образование кислоты [6].

Результаты и обсуждение. Под эмалью понимается довольно сложно организованное образование, его элементарной ячейкой выступают кристаллы гидроксиапатита, а также и иные существующие формы фосфата кальция, которые способны формироваться и образовываться в соответствующих синтетических условиях. Данное обстоятельство

обуславливается отличительными и специфическими особенностями фосфорной кислоты, которая в непосредственной зависимости от показателя pH вполне может взаимодействовать с ионами [1,5,8].

Гидроксиапатит, выступая в качестве основного источника кальция и фосфата, вполне способен переводить ротовую жидкость в соответствующее пересыщенное состояние. В связи с этим в рассматриваемом случае реминерализация достигается посредством отложения фосфата кальция, для чего требуется наличие соответствующего условия, которое состоит в определенной способности ионов кальция и фосфата проходить через целый слой пелликулы, достаточно богатой протеинами. Стоит предположить, что комплекс преципитин образуется в результате непосредственного взаимодействия ионов кальция и гликопротеинов. Подчеркивается, что преципитин встраивается в пелликулу, которая в свою очередь выступает в качестве естественного резервуара для кальция. При этом следует отметить, что из-за довольно сложного строения зубной эмали оно не способно воспроизводиться исключительно посредством использования механизмов естественной реминерализации из человеческой слюны[1,4].

Данное обстоятельство обуславливается специфическими отличительными особенностями ежедневного питания отдельного человека по причине регулярно имеющейся кислотной среды в его полости рта. Следовательно, под использованием гидроксиапатита понимается довольно перспективный подход, который обладает возможностью увеличить имеющийся спектр профилактических мероприятий и методов стоматологического лечения [2,8].

В настоящее время эффективное лечение деминерализации эмали все еще остается довольно актуальной современной проблемой в области стоматологии. Перед квалифицированными специалистами в области стоматологии стоит несколько основных задач, к ним относятся следующие: восстановление у человека структурно-функциональной целостности зубной эмали в полости рта; устранение имеющегося эстетического дефекта; устранение имеющегося дисколорита эмали[5].

На сегодняшний день исследователями разработано множество специализированных методик, которые предоставляют возможность проводить стоматологическое лечение начальных кариозных поражений без использования препарирования твердых тканей. К таким методам можно отнести фторирование, микроабразию, озонирование и т.д. [4,7]. Такая технология, как кариес-инфильтрация базируется на довольно последовательном удалении, которое осуществляется посредством использования специализированного раствора соляной кислоты поверхностного, «псевдоинтактного» слоя эмали на глубину, которая составляет менее 40 мкм, и последующем пропитывании пораженного участка вязкотекучей, светоотверждаемой композитной смолой.

Сущность рассматриваемого метода состоит в уникальной способности упомянутой смолы заполнять межкристаллические пространства, а также не

допускать последующее прогрессирование деминерализации по всей зоне полости рта человека. Иными словами, наблюдается некое «замурование» имеющегося кариозного дефекта. Как следствие, это приводит к тому, что процесс деминерализации приостанавливается, а вместе с тем формируются соответствующие условия для реминерализации эмали [2,7,15].

Следовательно, рассмотренная выше технология выступает в качестве наиболее эффективной методики, но при условии соблюдения всех показаний. Использование данной методики позволяет спрогнозировать эстетический результат, что является в особенности значимым и необходимым в рамках проведения лечения фронтальных зубов человека [18]. Методика предоставляет возможность несколько расширить имеющийся комплекс неинвазивных методов лечения кариеса зубной эмали у населения. В результате это позволяет обеспечить как сохранность структурно-функциональной целостности зубов, так и достичь соответствующего эстетического эффекта.

Далее рассмотрим методику имплантации зубной эмали. В соответствии со статистическими данными стоит отметить, что под эмалью понимается наиболее прочный биокерамический материал, который порядка на 98% состоит из высокоорганизованных кристаллов гидроксиапатита, и лишь на 1–2% — из органических веществ. Но при этом зрелая эмаль представляет собой «мертвую» ткань, которая не обладает никакой способностью само-восстанавливаться, что связано с тем, что она не содержит в себе клеток. В условиях активного функционирования кислотопродуцирующих бактерий биопленки можно наблюдать нарушение минерального баланса. Как следствие, это приводит к прогрессированию рассматриваемого процесса деминерализации твердых тканей[18,20].

Общеизвестным фактором является то, что в случае, если кариес прибывает на первоначальной стадии своего развития, представляется возможным остановить начатые процессы кислотного растворения, а также обеспечить соответствующую реминерализацию эмали. Традиционным методом удаления кариозных твердых тканей зубов является ротационная бура. Альтернативным методом является применение луча лазера, лазер может быть использован в целях вторичной профилактики, стоит отметить, что механизм влияния излучения на биологические мягкие ткани в результате использования лазера обуславливается соответствующим поглощением его энергии водой (содержится в клетках) или же опосредовано, посредством хромофоры биоткани[5,8].

Когда лазерный луч попадает на поверхность зуба, свет поглощается молекулами воды в твердых тканях зуба, в результате вода быстро нагревается и испаряется. Реакция создает высокое локальное давление и микровзрыв, что приводит к удалению твердых тканей зуба [22].

В результате использования лазера микробы погибают, а пораженные ткани, в свою очередь, селективно испаряются из кариозной полости, открывая при этом дентинные канальцы и формируя чистую трехмерную

поверхность, которая обеспечивает соответствующую адгезию с пломбировочными материалами. Следовательно, использование лазера позволяет повседневно проводить уникальные и сложные стоматологические операции, не требуя при этом существенных временных затрат и денежных средств. При использовании лазера пациента не пугает и не раздражает неприятный шум, исходящий из бормашины, поскольку он его просто не слышит.

Стоит отметить, что звуковое давление, которое создается в условиях работы лазерной установки, в 20 раз ниже, чем у высокоскоростной турбины, при этом подчеркивается, что психологический фактор в большинстве своем является решающим условием для пациента при поиске стоматологической организации для лечения имеющейся у него проблемы [3].

Однако достаточных доказательств того, что лазерное удаление кариеса было более или менее эффективным, чем традиционный механический метод, не было. Тем не менее, есть несколько доказательств в пользу лазерной терапии для контроля боли, необходимости анестезии и комфорта пациента.

Система направлена как на проведение терапевтических мероприятий при имеющихся воспалительных заболеваниях пародонта, так и на проведение микроинвазивного препарирования твердых тканей зубов и проведение итоговой обработки ранее выполненной реставрации зубов. Подчеркивается, что специализированные суспензии в комплексе с водой направлены на соответствующее обеспечение непрямой передачи ультразвуковой энергии сразу на операционное поле. Установленная частота и амплитуда продольных колебаний насадки предоставляет возможность удерживать жидкость на кончике инструмента, окружая его при этом водяной пленкой[3,8].

При всем этом кинетическое воздушно-абразивное препарирование выступает в качестве такого метода, который направлен на безболезненное удаление твердых тканей зуба с наименьшим раздражением одонтобластов и пульпы. В основе рассматриваемого метода заложен принцип водно-воздушной абразии, стоит отметить, что в данном случае мелкие частицы порошка располагаются на поверхности зубов с довольно высокой скоростью, которая составляет порядка 20 м/с в водно-воздушном спрее.

При непосредственном соприкосновении частиц абразива с поверхностью зуба осуществляется удаление как обрабатываемой эмали, так и дентина. Вода повышает режущую способность, а также смывает пыль, которая содержит в себе частицы тканей зуба. Как следствие, обеспечивается соответствующая полноценная очистка зубной эмали с непосредственным формированием шероховатой поверхности без смазного слоя при взаимодействии с композитами [3,8].

Одно из последних изобретений, относящихся к профилактике стоматологических заболеваний, предназначено для диагностики интенсивности различных форм кариеса у пациентов разных возрастных групп и планирования дальнейшего лечения.

Способ позволяет определить уровень интенсивности кариеса вне зависимости от возраста пациента, с учетом дальнейшего планирования лечения и профилактики кариеса [6]. Просвещение местного населения по стоматологическим вопросам (профилактика, лечение) выступает в качестве наиболее главной и значимой задачи программ профилактики кариеса зубов и болезней периодота. Подобное просвещение населения осуществляется в виде проведения лекционных занятий, издания специализированной литературы, а также программ здоровья, активно пропагандируемых в СМИ. В качестве краткосрочной цели рассматриваемого просвещения выступает повышение текущего уровня стоматологических знаний у местного населения в целом и соответствующих целевых групп в частности (беременные женщины или молодые родители); долгосрочная цель — снижение заболеваемости. Разумеется, просвещение может быть эффективным только при условии существования адекватной, измеримой системы контроля [10].

Заключение. Таким образом, обзор литературы свидетельствует о том, что программа профилактики кариеса зубов на сегодняшний день является актуальной, занимая важную роль в сфере здоровья и благополучия не только человека, но и общества в целом.

Использованные источники:

1. Anderson M. Effectiveness of early preventive intervention with semiannual fluoride varnish application in toddlers living in high-risk areas: a stratified cluster-randomized controlled trial / M. Anderson, G. Dahllöf, S. Twetman, L. Jansson, A.-C. Bergenlid, M. Grindefjord // Caries Res. — 2016. — Vol.50, N1. — P.17–23.
2. Astvaldsdóttir Á. Arginine and caries prevention: a systematic review / A. Ástvaldsdóttir, A. Naimi-Akbar, T. Davidson, A. Brolund, L. Lintamo, A. Attergren Granath, S. Tranæus, P. Östlund // Caries Res. — 2016. — Vol.50, N4. — P. 383–393.
3. Большов И.Н. Проблемы организации и повышения качества стоматологической помощи (по материалам социологического опроса врачей-стоматологов) / И.Н. Большов // Проблемы стоматологии. 2016. — № 1. — С. 110–114.
4. Bernard J., Hennessy D.D.S., Texas A&M University, College of Dentistry. Кариес //Медицинский обзор янв 2023. — Справочник MSD. Профессиональная версия.
5. Волошина И.М. Оценка и систематизация факторов, влияющих на возникновение кариеса зубов высокой степени риска у детей = Risk factors in the formation of high risk dental caries in children (evaluation and systematization) / И.М. Волошина // Институт стоматологии. — 2022. — № 1 (94). — С. 70–72.
6. Гущин В.В. Показатели стоматологического здоровья на фоне полиморбидной патологии в пожилом возрасте = Dental health indicators in the background on the polymorbidal pathology in the elderly / В.В. Гущин, М.В. Воробьев, М.В. Мосеева, В.А. Чайкин // Институт стоматологии. — 2021. — № 2 (91). — С. 24–25.

7. Елисеева Н.Б. Применение новых технологий в профилактике кариеса и реминерализации твердых тканей зубов / Н.Б.Елисеева, Н.М.Белова // Стоматология для всех. — 2015. — №3. — С.32–34.
8. Екимов Е.В. Объективная оценка эффективности кариеспрофилактических средств / Е.В. Екимов, Г.И. Скрипкина, А.А. Сметанин, А.П. Коршунов // Стоматология. — 2021. — Т. 100, № 5. — С. 15–18.
9. Evans R.W. The Caries Management System: are preventive effects sustained postclinical trial? / R.W.Evans, P.Clark, N.Jia / Commun. Dent. Oral Epidemiol. — 2016. — V.44, N2. — P. 188–197.
10. Yeung, C. A. Fluoridated milk for preventing dental caries / C. A. Yeung, L. Y. Chong, A. M. Glenny // The Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2015. —Vol. 9. — URL: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003876.pub4/full (Accessed 05.02.2023). — Текст: электронный.
11. Копецкий И.С. Кариесология : учебное пособие для использования в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования по специальности 31.05.03 «Стоматология» / И.С. Копецкий, И.А. Никольская. — Москва : Медицинское информационное агентство, 2020 г. — 325 с.
12. Короленкова М.В. Распространенность, интенсивность и эффективность лечения кариеса зубов у детей дошкольного врзраста, проживающих в городском округе Химки = Prevalence, intensity, and efficacy of dental caries treatment in pre-school children living in the town of Khingi / М.В. 1. Череватый В.А. Кариес (обзор литературы). Студенческий вестник. Смоленск. — Интернаука. — 2019. — 29-3 (79). С. 71–73.
13. Кисельникова Л.П. Технологии профилактики и лечения кариеса зубов у детей / Л.П. Кисельникова, Т.Е. Зуева, А.Г. Седойкин, Л.Н. Дроботько. — М.: ГЭОТАР-Медиа. — 2021. — 184с.
14. Кубанова А.Б. Морфологическая характеристика твердых тканей зубов на фоне гипотиреоза : дисс ... канд. мед. наук : 14.03.02 / А.Б. Кубанова. — Ставрополь, 2019. — 155 с.
15. Котикова, А.Ю. Особенности лечения и профилактики заболеваний твердых тканей зубов у спортсменов : диссертация ... канд. мед. наук : 14.01.14 / А.Ю. Котикова. — Екатеринбург, 2020. — 152 с.
16. Короленкова, А.Г. Хачатрян, Е.С. Иванова // Стоматология. — 2021. — Т. 100, № 5. — С. 48–52.
17. Лукашевич И.К. Повышение эффективности профилактики кариеса зубов у женщин в период беременности : диссертация … канд. мед. наук : 18.05.2021 / И.К. Лукашевич — Омск, 2021. — 177 с.
18. Леонтьев В.К. О стратегии снижения заболеваемости кариесом зубов в России в условиях дефицита государственного финансирования стоматологии = On strategies of reducing the prevalence of dental caries in Russia under shortage of national financing in dentistry / В.К. Леонтьев, О.Г. Авраамова, А.Ю. Малый, Ю.С. Степанова // Институт стоматологии. — 2018. — № 1 (78). — С. 13–17.

19. Леус П.А. Диагностика, лечение и профилактика кариеса зубов : избранные авторские методы и программы / П.А. Леус. — Минск:Регистр, 2018. — 217 с.
20. Махмудов Д.Т. Обоснование комплексного лечения и системной профилактики стоматологической патологии у лиц с различным уровнем привычной двигательной активности : диссертация … докт. мед. наук / Д.Т. Махмудов. — Душанбе, 2022. — 209 с.
21. Османова Ф.И. Оценка экологических факторов на заболеваемость населения северных регионов Республики Дагестан / Ф.И. Османова, И.Н. Османов, Т.Ф. Косырева // Институт стоматологии. — 2021. — № 1 (90). — С. 48–49.
22. Hummel J. A Population Health Management Approach to Oral Health / J. Hummel, K. E. Phillips // J. Calif. Dent. Assoc. — 2016. — Vol. 44, N 3. — P. 167–172.

УДК 004.616.314-085

Курбанова Н.И., PhD
доцент
кафедра терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Резюме. *Развитие современной медицины позволило своевременно диагностировать и лечить многие заболевания. Это, в свою очередь, привело к снижению заболеваемости среди населения, улучшению здоровья людей и повышению качества их жизни. Подобная ситуация касается и стоматологических заболеваний, и качество лечебной, хирургической и ортопедической помощи, оказываемой населению с точки зрения стоматологии, повысилось на несколько уровней. Сегодня, несмотря на прогресс в клинической стоматологии, ранняя диагностика и лечение патологий твердых тканей зубов остаются недостаточно изученной частью проблемы.*

Ключевые слова: *Твердые ткани зубов, цифровые технологии, КТ, МРТ, внутриротовое сканирование, фотопротокол, 3D-моделирование*

Kurbanova N.I., Doctor of Philosophy in medical sciences
associate professor
of the department of therapeutic dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

MODERN APPROACHES TO EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES USING DIGITAL TECHNOLOGIES

Resume. *Advances in modern medicine have enabled the timely diagnosis and treatment of many diseases. This, in turn, has led to a reduction in the incidence of disease among the population, improved health, and a higher quality of life. A similar situation applies to dental diseases, and the quality of medical, surgical and orthopedic care provided to the population from a dental point of view has increased by several levels. Today, despite progress in clinical dentistry, early diagnosis and treatment of dental hard tissue pathologies remain an insufficiently studied part of the problem.*

Keywords: *Dental hard tissues, digital technologies, CT, MRI, intraoral scanning, photo protocol, 3D modeling*

Актуальность.

Развитие современной медицины позволило своевременно диагностировать и лечить многие заболевания. Это, в свою очередь, привело к снижению заболеваемости среди населения, улучшению здоровья людей и повышению качества их жизни. Это относится и к заболеваниям зубов качество терапевтической, хирургической и ортопедической помощи, предоставляемой населению с точки зрения стоматологии, значительно повысилось. Сегодня, несмотря на прогресс в клинической стоматологии, ранняя диагностика и лечение патологий твердых тканей зубов остаются недостаточно изученной частью проблемы.

Ранняя диагностика заболеваний твердых тканей зубов оказывает положительное влияние не только на здоровье отдельного человека, но и на систему здравоохранения общества в целом. Раннее выявление и лечение стоматологических проблем могут снизить социальное и экономическое бремя заболеваний зубов и их осложнений. С этой точки зрения, ранняя диагностика кариеса имеет большое значение не только для медицины, но и для экономики и общества. Эта тема открывает широкие возможности для развития инноваций в медицине и улучшения здоровья человека. В этих целях изучение уровня улучшения стоматологического здоровья населения путем совершенствования методов ранней диагностики заболеваний зубов остается актуальным и необходимым.

Цель исследования

Улучшение здоровья зубов населения путем совершенствования современных методов ранней диагностики и лечения патологий твердых тканей зубов.

В последние годы многие исследователи опубликовали научные данные, свидетельствующие о том, что развитие стоматологии привело к снижению заболеваемости органов и тканей полости рта среди населения и минимизации их осложнений [1,6].

В целях лечения заболеваний зубов эффективность опубликованных работ по созданию стоматологических служб на основе мировых стандартов и решению многих стоматологических, медицинских и социальных проблем высока [1,5].

В последние годы увеличилось количество и качество стоматологических услуг, предоставляемых населению, снизилась распространенность и количество стоматологических заболеваний, а также уменьшилось число врожденных дефектов и осложнений, что привело к повышению качества жизни населения. Расширение географии стоматологических услуг, их проникновение в различные слои и возрастные группы населения продолжается быстрыми темпами [1,2].

Однако отсутствие механизмов решения проблем с использованием цифровых технологий для раннего выявления и профилактики стоматологических заболеваний создает медицинские, социальные и экономические трудности для обеих сторон стоматологической службы. Учитывая уровень развития современной стоматологии, необходимость совершенствования методов ранней диагностики и профилактики заболеваний зубов остается актуальной и сегодня.

Цифровые технологии заняли прочное место во всех аспектах человеческой жизни, включая медицину [8, 9]. Возможности их использования в стоматологии на всех этапах лечения включают ведение медицинской документации пациентов, диагностику (рентгеновские визиторафы, компьютерная томография, виртуальные артикуляторы, цифровая фототехника), моделирование и имитация клинических ситуаций и лечения. Разрабатываются методы получения и ориентации трехмерных моделей зубов и зубных дуг на компьютере, измерения высоты трещин, бугорков, их угловой формы и мониторинга одонтопрепарации [4, 5].

Одним из символов инновационного развития в стоматологии последних лет стала технология автоматизированного проектирования и производства протезов, для которой существует общепринятая аббревиатура — CAD/CAM. Развитие автоматизированных производственных систем в промышленности началось в 1960-х годах [10]. Одновременно начали формироваться основные понятия и классификации систем и подсистем по их назначению. Согласно ГОСТ 34.003-90 и ГОСТ 23501.101-87, система автоматизированного проектирования (САПР) — это автоматизированная система, реализующая информационные технологии для выполнения проектных функций.

Также определены основные цели и задачи разработки САПР: - повышение эффективности труда, в том числе: снижение трудоемкости проектирования и планирования; сокращение времени проектирования; снижение проектных и производственных затрат; Оперативное проектирование; повышение качества и осуществимости результатов проектирования; снижение затрат на моделирование и тестирование. Технологии CAD/CAM являются конкретным примером CAD. CAD (компьютерное проектирование/визуализация) — это автоматизированный инструмент проектирования. CAM (компьютерное проектирование и автоматизированное производство) — средства технологической подготовки изделий к производству [6, БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ — 2013 — № 1 Электронное издание 7]. Адекватный аналог английской аббревиатуры CAD/CAM, используемой в стоматологии: компьютерное проектирование и автоматизированное производство реставраций. Поскольку системы CAD широко использовались в производстве в начале 1980-х годов, считалось, что стоматологические системы CAD/CAM будут упрощенной версией промышленных систем. Однако в действительности разработка стоматологических систем CAD/CAM

оказалась непростой задачей по ряду причин. Общая стоимость, время и качество конечного продукта, производимого с помощью систем CAD/CAM, должны быть сопоставимы, а в идеале и превосходить традиционные методы во всех отношениях, чтобы заменить их в повседневной лабораторной и клинической практике. Для создания высококачественных реставраций необходимо было точно оцифровать морфологию опорных зубов, а также соседних и противоположных зубов. Однако с помощью доступных в то время сканеров было очень сложно распознать тонкие края подготовленных зубов.

Поэтому было крайне важно разработать точные и компактные сканеры и соответствующее программное обеспечение для выполнения этой сложной и деликатной задачи. Кроме того, реставрация должна быть адаптирована не только к линии препарирования, поскольку В то же время для восстановления гармонии и окклюзионного контакта с естественными зубами требуется сложная программа CAD. Учитывая сложные геометрические формы реставрации, необходимо обеспечить точную, но деликатную механическую обработку хрупких керамических материалов. Для этого требуется использование высококачественного оборудования CAM с программным обеспечением для управления траекторией движения инструмента и скоростью подачи. Кроме того, размеры обрабатывающего блока для установки должны быть ограничены. в стандартном стоматологическом кабинете или лаборатории [11].

Наконец, в отличие от серийно выпускаемых промышленных деталей, каждая реставрация индивидуальна и уникальна. Таким образом, затраты времени и интеллектуальных ресурсов относительно велики. Однако, несмотря на вышеупомянутые трудности, системы CAD/CAM постепенно получили признание в стоматологическом сообществе. Возможности современных CAD/CAM-систем являются результатом длительной эволюции и еще не достигли своего пика. Разработка стоматологических систем началась в конце 1970-х годов. Разработчики поставили перед собой следующие цели: проектирование реставраций. Стандартизация процесса, минимизация человеческого фактора и обеспечение точного цифрового представления параметров проектирования; – Улучшение и стандартизация материалов для зуботехнических конструкций за счет использования стандартных заготовок; сокращение времени и трудозатрат на изготовление зубных протезов.

Несколько новаторских систем признаны первыми крупными разработчиками, внесшими значительный вклад в развитие CAD/CAM-технологий в стоматологии. В литературе американские разработчики Дж. М. Янг и Б. Р. Альтшулер, а также Франсуа, отвечали за теоретические расчеты по использованию лазерной голографической оптики для получения изображений поверхности зубов. Дюре был пионером в области CAD/CAM-технологий в стоматологии. В 1971 году он начал работу над проектом, который позволил бы производить коронки с функциональными жевательными поверхностями. Процесс сканирования основывался на

принципе лазерной голографической оптики. Коронки проектировались с учетом функциональных движений и фрезеровались с помощью станка с ЧПУ.

На каждую реставрацию уходило приблизительно четыре часа. Первый прототип системы Duret был представлен на конференции Entretien Garancieres во Франции в 1983 году. Для внутриротового оптического сканирования использовался структурированный свет. Система предназначалась для изготовления керамических вкладок. Для фрезерования использовались алмазные диски. Несмотря на то, что окклюзионную поверхность приходилось вручную формировать стоматологу с помощью бормашины и аппарата, краевое прилегание керамических реставраций было удовлетворительным, и система была принята стоматологами. Ее внедрение было поистине инновационным, поскольку оно продвигало принцип сидения на стуле - прямое изготовление керамических реставраций непосредственно в кресле пациента. После анонса этой системы термин CAD/CAM быстро стал общепринятым в стоматологии [11]. Позже разработанная система CEREC 2 теперь производила двухмерные оптические оттиски. Один из двух дисков, ранее использовавшихся в фрезерном станке, был заменен алмазным резцом. Это значительно улучшило качество изготавливаемых реставраций и позволило фрезеровать коронки. Однако двухмерное изображение объекта не содержало достаточной информации, и для расчета высоты вершин и борозд реставрации по-прежнему требовались сложные математические вычисления. Внедрение изометрической визуализации и стола CEREC 3 для практической цифровой стоматологии. Разработанная усовершенствованная программа моделирования теперь доступна широкому кругу пользователей. Благодаря использованию двух фрез различной формы и диаметра, фрезерование стола становится более точным и деликатным.

В связи с растущими требованиями к качеству ортопедического лечения появились новые эстетичные, но при этом прочные и безопасные стоматологические материалы, требующие специальной обработки. Это было обусловлено проблемой непереносимости стоматологических материалов.Титандан фойдаланишда ечим топилди. Однако трудности с литьем титана препятствовали его широкому применению. Доктор М. Андерссон внедрил массовое производство титановых оправ с использованием электроэрозионной обработки. Система Procera впоследствии стала одним из мировых лидеров в производстве цельнокерамических реставраций. Procera также стала первой и крупнейшей компанией, занимающейся аутсорсингом. Впоследствии получило широкое распространение использование новых керамических материалов, отвечающих требованиям прочности и эстетики Это стало мощным стимулом для развития систем CAD/CAM. Изначально созданные для того, чтобы выйти за рамки технической лаборатории, технологии CAD/CAM превратились в массовое лабораторное производство. Изменился спектр задач, расширился диапазон используемых материалов. Крупные лабораторные системы, такие как Procera (Швеция), KAVO Everest (Германия), Lava (Германия) и HintEls

(Германия), все чаще производят мостовидные протезы из оксидной керамики. Некоторые из них также начинают предлагать услуги по обработке металла и вспомогательных материалов. Переход к двухмерной (2D) технологии также является важным фактором популяризации этой технологии, поскольку она преобразует изображения в изометрические проекции, обеспечивая полную видимость и контроль процесса проектирования реставрации на экране монитора. В настоящее время список и география применения CAD/CAM-систем в стоматологии постоянно расширяются, как и возможности самих систем. Все существующие CAD/CAM-системы в основном используются для сбора 3D-данных о геометрии полости рта. Производимые зубные протезы различаются по конструкции, материалам изготовления, а также по бизнес-модели клинического применения. Модули проектирования и автоматизированного производства (САПР) выполняют схожие функции и в основном оснащен фрезерными инструментами для материалов, которым подаются точные инструкции для изготовления протезов [12]. Программное обеспечение соединяет все модули и обеспечивает работу всей системы. Как и в традиционном производстве протезов, первым шагом является планирование и определение руководящих принципов использования конкретного строительного материала. С учетом специфических прочностных свойств современных оксидных каркасных материалов, близких к металлам, показатели для производства таких конструкций также максимально приближены к металлокерамике. Основные принципы препарирования зубов для изготовления реставраций соответствуют классическим правилам препарирования твердых тканей и направлены на обеспечение оптимальной фиксации при минимальной инвазивности и создание необходимого резервного пространства для достаточной толщины конструкционного материала. Различия в подготовке твердых тканей зуба при работе с системами CAD/CAM зависят от характеристик конструкционных материалов, которые требуют строгого соблюдения требований к толщине, площади поперечного сечения и форме реставрации; необходима тщательная подготовка с процесс сканирования зуба (обычно около 1 см); этап фрезерования реставрации с учетом возможностей имеющегося диаметра и длины рабочей части фрезы. Все системы CAD/CAM состоят из трех основных функциональных компонентов: модулей для сканирования, проектирования и автоматизированного изготовления [9]. 1. Модуль сканирования получает цифровые параметры интересующих объектов в полости рта: геометрию протезной области и противолежащих зубов. Для этого используются различные сканеры. Полученное изображение называется цифровым оттиском или, если используется оптический сканер, оптической моделью.2. CAD-модуль — программный пакет с набором функций для трехмерной визуализации полученных данных и моделирования виртуальной реставрации, соответствующей протезной области, с учетом ее анатомических и функциональных характеристик. 3. CAM — модуль для изготовления реставраций. В основном это фрезерные модули для обработки стандартных

промышленных заготовок с использованием станков с ЧПУ (числовым программным управлением), в которые загружается виртуальная модель реставрации, также предназначенная для обработки на станках с ЧПУ. Однако все чаще внедряются новые методы аддитивного производства зубных протезов, такие как системы быстрого прототипирования, селективное лазерное спекание (SLS) и другие [11]. В соответствии с вышеупомянутыми модулями систем CAD/CAM, компьютерные технологии может включать соседние или противоположные зубы. Для этого используются сканеры или дигитайзеры, применяющие контактные и бесконтактные методы измерения профиля поверхности; обработка и преобразование полученных цифровых данных. Восстановление поверхности зуба на мониторе, построение виртуальной модели будущей реставрации; автоматизированное изготовление реставрации. Основные модули CAD/CAM-систем соответствуют этапам производства, хотя в некоторых случаях могут отличаться. Этапы изготовления реставраций различаются в системах автоматизированного и механического проектирования (CAM), не имеющих программного обеспечения для виртуального моделирования реставраций. Эта функция традиционно используется в стоматологии с применением воска, пластика или других вспомогательных материалов. Затем отреставрированное изделие сканируется или копируется напрямую и встраивается в конструкционный материал.

Использованные источники:

1. Одонтопрепарирование при лечении винирами и керамическими коронками / С.Д. Арутюнов [идр.].– М.: Молодая гвардия.– 2008.– 135 с.
2. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология./ Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения
3. ГОСТ 23501.101-87 «Системы автоматизированного проектирования. Основные положения», РД 250-680-88 /Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.
4. Ибрагимов, Т.И. Современные методы изучения окклюзионной поверхности зубов/ Т.И. Ибрагимов, Г.В. Большаков, А.В Габучян // Сборник трудов IX Всерос. науч.-практ. конф. «Образование, наука и Практика в стоматологии» по единой тематике «Пути повышения качества стоматологической помощи».–М., 2012.– С. 94–96.
5. Ибрагимов, Т.И. Применение свойств виртуального артикулятора в клиническом планировании иконтроле одонтопрепарирования / Т.И. Ибрагимов, Г.В. Большаков, А.В Габучян, В.А. Князь // Сборник Трудов IX Всерос науч-практ. конф. «Образование, наука и практика в стоматологии» по единой тематике
6. «Пути повышения качества стоматологической помощи».– М., 2012.– С. 96.
7. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР / В.Н. Малюх //Курс лекций.– М.: ДМК Пресс, 2010.

Мурадова Р.Р.
ассистент
Кафедра клинической фармакологии
Самаркандский государственный медицинский университет

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВОВ ГЛАЗНИЧНАЯ ЧАСТЬ ЛОБНОЙ КОСТИ У ЧЕЛОВЕКА И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Резюме: *В статье изучены анатомо-гистологическое строение нерва глазничная часть лобной кости у человека. Исследование проведено на 20 препаратах от 10 трупов людей обоего пола и различного возраста. Распространение нервов прослежено до их мельчайших сетевидных разветвлений с помощью налобной и бинокулярной штативной луп и хирургического микроскопа под падающей каплей 0,5% раствора уксусной кислоты. Диаметр нервных стволов и ветвей измерялся при помощи окуляр-микрометра. В различные участки глазничной части лобной кости от многочисленных источников вступает значительное количество нервных стволиков.*

Ключевые слова: *Трупов людей, глазничной части лобной кости, препараты, макромикроскопической, окуляр-микрометра, нервы*

Muradova R. R.
assistant
Department of Clinical Pharmacology
Samarkand State Medical University

ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVES OF THE ORBITAL PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *The article investigates the anatomo-histological structure of the nerves of the orbital part of the frontal bone in humans. The study was performed on 20 specimens obtained from 10 human cadavers of both sexes and various ages. The distribution of nerves was traced down to their finest reticular branchings using a head-mounted loupe, a binocular stand-mounted loupe, and a surgical microscope under a drop of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured with the aid of an ocular micrometer.*

A considerable number of nerve twigs enter various regions of the orbital part of the frontal bone from multiple sources.

Keywords:*human cadavers, orbital part of the frontal bone, specimens, macromicroscopic dissection, ocular micrometer, nerves*

Ввдение. Подробные сведения о нервах костей черепа необходимы в первую очередь стоматологам, травматологам, анестезиологам и невропатологам при решении диагностических и прогностических задач, связанных с вмешательствами в области головы и лица [1,2]. Изучение и выявление нервных связей между нервами костей лицевого черепа и мягкими тканями лица представляет для клиники еще больший интерес. Значение иннервации для жизнедеятельности кости весьма велико, так как развитие и рост кости, процессы регенерации и обмена веществ в нормальной костной ткани, равным образом, как и целый ряд патологических процессов, разыгрывающихся в ней, тесно связаны с функцией окружающих ее мягких тканей [3]. Эта связь кости с другими органами и тканями осуществляется с помощью сосудистой и нервной систем. Систематических исследований связей между нервами костей лицевого черепа и окружающими мягкими тканями не проводилось. Отсутствуют данные, касающиеся возрастного и сравнительно-анатомического характера.

Основное внимание исследователи уделяют морфологии черепно-мозговых нервов в пределах мягких тканей головы и костей с надкостницей черепных костей. Ряд работ посвящен изучению нервов верхней и нижней челюстей, глазницы, полости рта и носа. Однако и в перечисленных работах дело обычно сводится к данным об иннервации зубов и распределении нервов во вспомогательном аппарате глаза, слизистой оболочке ротовой и носовой полостей. Интересно отметить, что топографию нервов, распространяющихся в стенках различных полостей черепа, автор ставит в прямую зависимость от индивидуальных особенностей формы и величины этих костных образований. В работах [4] о сотрудников дается подробное описание структуры нервных стволов и рецепторов, располагающихся в надкостнице костей мозгового и лицевого черепа. Для подтверждения своих данных автор провел интересный эксперимент на животных, заключающийся в отделении от нижележащих тканей кожи головы, надкостницы и в трепанации черепа [5]. После таких вмешательств он обнаружил дегенерацию некоторой части нервных волокон в твердой мозговой оболочке. Авторы предполагают, что анестезирующее вещество, диффундируя через кость, уменьшает чувствительность твердой оболочки головного мозга.

Цель исследования. Мы поставили перед собой задачу изучить нервы глазничная часть лобной кости и их связи между собой и с нервами окружающих мягких тканей.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 20 препаратах от 10 трупов людей обоего пола и различного возраста. Нервы мягких тканей и указанной выше кости изучены методом макромикроскопической препаровки с помощью высверливания костного вещества, размягчения костей глицерином, кислотами и пепсином. Распространение нервов прослежено до их мельчайших сетевидных разветвлений с помощью налобной и бинокулярной штативной луп и хирургического микроскопа под падающей каплей 0,5% раствора уксусной

кислоты. Диаметр нервных стволов и ветвей измерялся при помощи окуляр-микрометра.

Результаты исследования. Глазничная часть лобной кости нервы направляющиеся к глазничным частям лобной кости, возникают из следующих источников: от лобного, надглазничного, надблокового нервов; от медиальной ветви лобного нерва: Лобный нерв после появления из верхней глазничной щели, еще до деления на ветви, посылает в сторону верхней глазничной стенки от одного до 4 нервных стволиков, диаметром 0,01-0,1 мм. На двух препаратах от соединительной ветви, присутствующей между начальными отделами лобного и блокового нервов, возникает нервный стволик (диаметр его 0,18 мм), вступающий в заднемедиальный отдел верхней стенки глазницы. Указанные стволики в обоих случаях проникают в кость через самостоятельные костные отверстия, имеющие диаметр 0,25-0,5 мм. От надглазничного нерва в средних отделах глазницы отделяются нервные стволики к верхней косой мышце, поднимающих верхнего века, слизистой оболочке лобных пазух и стенкам ветвей глазничной артерии. В глазничной впадине лобный нерв со своим основными ветвями проходит в непосредственной близости с разветвлениями глазничной артерии. Труднее удается выделить нервные стволики, отходящие от слезного и надблоковым нервов. Несколько таких ветвей направляются к медиальному и латеральному отделам верхней стенки глазницы от соединительной ветви, присутствующей между над и подблоковыми нервами, между слёзным и ветвью скулового нервов. Так, на 7 препаратах один - три таких нервных стволика, прободая кость, проникают в полость черепа, где вступают в наружную поверхность твердой мозговой оболочки. Иногда некоторые из этих нервных стволиков соединяются с мельчайшими разветвлениями оболочечных нервов, или, следуя вместе с одной из ветвей средней оболочечной артерии, вступают в ее стенку.

Таким образом, в различные участки глазничной части лобной кости от многочисленных источников вступает значительное количество нервных стволиков. Большинство этих нервов проникает в глазничные отделы лобной кости и там, разделившись на ряд мелких ветвей, соединяется при помощи внутрикостных связей друг с другом и разветвлениями нервов близлежащих костей черепа (клиновидной, решетчатой, скуловой, верхнечелюстной и др.), создавая обширные нервные коммуникации. В свою очередь, от указанных внутрикостных нервов и их связей отделяются ветви к проходящим в толще кости сосудам, надкостнице и жировой прокладке костных канальцев, и элементам костного мозга.

Узловатые утолщения на нервах различных отделов лобной кости нам удалось встретить 5 раз на 36 препаратах. Узловатые утолщения присутствовали 3 раза на правой и 2 раза на левой стороне трупа. Один раз узловатое утолщение располагалось в глубине верхнеглазничного канала на стволе нерва, внедряющегося в верхний глазничный край. Два узловатых утолщения располагались на стволе нерва, залегавшего в толще губчатого

вещества лобной кости. Два узловатых утолщения овальной формы мы встретили на стволе надглазничного нерва, в толще кости, перед выходом его из верхнеглазничного канала.

Вывод. Наши наблюдения говорят о том, что нервы глазничная часть лобной кости находятся в тесной связи с нервами других близлежащих костей черепа и окружающих мягких тканей (кожных покровов, мышечных элементов, подкожной клетчатки, твердой мозговой оболочки и др.), надкостницы, разветвлений кровеносных сосудов, околоносовых пазух.

Использованные источники:

1. Алешкина О.Ю. Половой деморфизм сочетания форм лицевого черепа и основания черепа / О.Ю. Алешкина, И.А. Алешкина // Морфология.- 2004. Т. 126, вып. 4. - С. 7-8.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
4. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.
5. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

Мурадова Р. Р.
ассистент
Клиник фармакология кафедраси
Самарқанд Давлат тиббиёт университети

ОДАМЛАРДА РЕШОНА СУЯГИ ҚЎЗ ҚИСМИ НЕРВЛАРИНИНГ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА КЛИНИК АХАМИЯТИ

Резюме: *Мақола одамда пешона суягининг кўз орбитаси қисми нервининг анатомо-гистологик тузилиши ўрганилган. Тадқиқот турли жинс ва ёшдаги 10 та жасаддан олинган 20 та препаратда ўтказилди. Нервларнинг тарқалиши уларнинг энг майда тўрсимон шохланишларигача пешона лупаси, бинокуляр штативли лупа ва жарроҳлик микроскопи ёрдамида, 0,5% сирка кислотасининг томчиси остида кузатилди. Нерв стволлари ва шохларининг диаметри окуляр-микрометр ёрдамида ўлчанди. Пешона суягининг кўз орбитаси қисмининг турли соҳаларига кўплаб манбалардан сезиларли миқдорда нерв толалари киради.*

Калит сўзлар: *одам жасадлари, пешона суягининг кўз орбитаси қисми, препаратлар, макромикроскопик препаровка, окуляр-микрометр, нервалар.*

Muradova R.R.
assistant
Department of Clinical Pharmacology
Samarkand State Medical University

ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVES OF THE ORBITAL PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *The article investigates the anatomo-histological structure of the nerves of the orbital part of the frontal bone in humans. The study was performed on 20 specimens obtained from 10 human cadavers of both sexes and various ages. The distribution of nerves was traced down to their finest reticular branchings using a head-mounted loupe, a binocular stand-mounted loupe, and a surgical microscope under a drop of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured with the aid of an ocular micrometer.*

A considerable number of nerve twigs enter various regions of the orbital part of the frontal bone from multiple sources.

Keywords: *human cadavers, orbital part of the frontal bone, specimens, macromicroscopic dissection, ocular micrometer, nerves.*

Кириш. Бош суяги суяклари нервари ҳақида батафсил маълумотлар аввало стоматологлар, травматологлар, анестезиологлар ва невропатологлар учун бош ва юз соҳасидаги муолажалар билан боғлиқ диагностик ва лаволаш

вазифаларни ҳал қилишда жуда зарурдир. Юз суяги суяклари нервари билан юзнинг юмшоқ тўқималари ўртасидаги нерв боғланишларини ўрганиш ва аниқлаш клиника учун янада катта қизиқиш уйғотади. Иннервациянинг суяк ҳаётий фаолияти учун аҳамияти жуда каттадир, чунки суякнинг ривожланиши ва ўсиши, регенерация жараёнлари ва нормал суяк тўқимасидаги модда алмашинуви, шунингдек, унда юзага келадиган кўплаб патологик жараёнлар атрофидаги юмшоқ тўқималар функцияси билан чамбарчас боғлиқдир.

Юз суяги суяклари нервари билан атрофидаги юмшоқ тўқималар ўртасидаги боғланишлар бўйича тизимли тадқиқотлар ўтказилмаган. Ёшга боғлиқ ва қиёсий-анатомик хусусиятларга оид маълумотлар мавжуд эмас. Тадқиқотчилар асосан бош мия нервининг бошнинг юмшоқ тўқималари доирасидаги ва периост билан қопланган бош суяги суяклари морфологиясига эътибор қаратишади. Бир қатор ишлар юқори ва пастки жағ суяклари, кўз орбитаси, оғиз ва бурун бўшлиқлари нервини ўрганишга бағишланган. Бироқ, юқоридаги ишларда ҳам одатда тишлар иннервацияси ва кўзнинг ёрдамчи аппарати, оғиз ва бурун бўшлиқлари шиллиқ қаватида нервининг тарқалиши ҳақидаги маълумотлар билан чекланилади. Қизиғи шундаки, муаллиф турли бош бўшлиқлари деворларида тарқалган нервари топографиясини ушбу суяк ҳосилаларининг индивидуал шакл ва ҳажм хусусиятларига боғлиқ деб ҳисоблайди [ ]. Ўз маълумотларини тасдиқлаш учун муаллиф ҳайвонларда қизиқарли эксперимент ўтказган: бош терисини, периостни пастки тўқималардан ажратиш ва бош суягини трепанация қилишдан иборат. Бундай муолажалардан сўнг қаттиқ мия пардасидаги баъзи нерв толалари дегенерацияси аниқланган.

Тадқиқот мақсади. Биз ўзимизга пешона суягининг кўз орбитаси қисми нервини ва уларнинг ўзаро ҳамда атрофидаги юмшоқ тўқималар нервари билан боғланишларини ўрганиш вазифасини қўйдик.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот турли жинс ва ёшдаги 10 та мурдадан олинган 20 та препаратда ўтказилди. Юмшоқ тўқималар нервари ва юқорида кўрсатилган суяк нервари макромикроскопик препаровка усули билан ўрганилди: суяк моддасини бурғулаш, суякларни глицерин, кислоталар ва пепсин билан юмшатиш. Нервларнинг тарқалиши уларнинг энг майда тўрсимон шохланишларигача пешона лупаси, бинокуляр штативли лупа ва жарроҳлик микроскопи ёрдамида, 0,5% сирка кислотасининг томчиси остида кузатилди. Нерв стволлари ва шохларининг диаметри окуляр-микрометр ёрдамида ўлчанди.

Тадқиқот натижалари. Пешона суягининг кўз орбитаси қисми нервари йўналтирилган нерварлар қуйидаги манбалардан келиб чиқади: пешона, кўз усти, ғалтак усти нерварлардан; пешона нервининг медиал шохидан ажралади. Пешона нерви юқори кўз косаси юуқорги ёриғидан чиққач, шохларга бўлингунча кўз косаси юуқорги девори томон 1 дан 4 гача нерв толалари (диаметри 0,01–0,1 мм) юборади. Бошқа иккита препаратда пешона ва ғалтак нервари бошланғич қисмлари ўртасидаги боғловчи шохдан нерв толачаси (диаметри 0,18 мм) келиб чиқиб, кўз косаси юқори деворининг орқа-

медиал қисмига киради. Кўрсатилган нервлар икки ҳолда ҳам мустақил суяк тешиклари (диаметри 0,25–0,5 мм) орқали суякка киришади. Кўз усти нервидан кўз косасининг ўрта қисмларида юқори қийшиқ мушак, юқори қовоқни кўтарувчи мушак, пешона суяги бўшлиғи шиллиқ қавати ва кўз олмаси артерияси шохлари деворига нерв стволчалари ажралиб чиқади. Ўз навбатида, ушбу шохлар ва кўз косаси усти нерв нервидан бош суяги асоси олдинги чуқурчасига суягининг периостига ва суяк ғовак моддасига 3 тагача нерв толалари (узунлиги 1,6–2,5 мм, диаметри 0,01–0,09 мм) кетади.

Кўз орбитаси бўшлиғида пешона нерви ўзининг асосий шохлари билан кўз орбитаси артерияси шохланишлари билан бевосита яқин ўтган. Кўз ёш ва надблоковый нервардан чиққан нерв стволчаларини ажратиш қийинроқ. Бир неча шохлар орбитанинг юқори деворининг медиал ва латерал қисмларига над ва подблоковый нервар ўртасидаги боғловчи шохдан, кўз ёш ва скуловой нерв шохи ўртасидаги боғловчи шохдан йўналтирилади. Шундай қилиб, 7 препаратда 1–3 та шундай нерв стволчалари суякни тешиб ўтиб, бош бўшлиғига киради ва у ерда қаттиқ мия пардасининг ташқи юзасига киради. Баъзан бу нерв стволчаларининг баъзилари оболочечный нерварнинг энг майда шохланишлари билан боғланади ёки ўрта оболочечный артерия шохларидан бири билан бирга унинг деворига киради.

Шундай қилиб, пешона суягининг кўз орбитаси қисмининг турли соҳаларига кўплаб манбалардан сезиларли миқдорда нерв стволчалари киради. Бу нерварнинг аксарияти кўз орбитаси қисмларига кириб, у ерда бир қатор майда шохларга бўлиниб, суяк ичидаги боғланишлар орқали бир-бири билан ва яқин атрофдаги бош суяги суяклари (клиновидная, решетчатая, скуловая, юқори жағ ва бошқалар) нервари шохланишлари билан боғланади ва кенг нерв коммуникацияларини ҳосил қилади. Ўз навбатида, ушбу суяк ичидаги нервар ва уларнинг боғланишларидан суяк қалинлигида ўтган томирлар, периост, суяк каналчалари ёғ прокладкаси ва суяк мияси элементларига шохлар ажралиб чиқади. Бизнинг кузатишларимиз шуни кўрсатадики, пешона суяги суяк моддаси ва унинг периости иннервацияси атрофидаги юмшоқ тўқималар (мушаклар, ёғ клетчаткаси, фасциялар), қон томирлари (артерия ва веналар), лимфа тугунлари ва бурун яқин пазухалари (пешона пазухаси, решетчатая кость ячейкалари) шиллиқ қавати иннервацияси билан чамбарчас боғлиқдир.

Пешона суяги турли қисмлари нерваридаги тугунсимон қалинлашувларни 36 препаратдан 5 тасида учратдик. Тугунисимон қалинлашувлар 3 марта ўнг томонда ва 2 марта чап томонда кузатилди. Бир марта тугунисимон қалинлашув юқори кўз орбитаси канали чуқурлигида, юқори кўз орбитаси чегарасига кирувчи нерв стволида жойлашган. Икки тугунисимон қалинлашув пешона суяги губчатой моддаси қалинлигидаги нерв стволида жойлашган. Икки оваль шаклли тугунисимон қалинлашув надглазничный нерв стволида, юқори кўз орбитаси каналidan чиқишдан олдин суяк қалинлигида учратилди.

Хулоса. Бизнинг кузатишларимиз шуни кўрсатадики, пешона суягининг кўз орбитаси қисми нервари бош суягининг яқин атрофдаги бошқа суяклари нервари ва атрофидаги юмшоқ тўқималар (тери қопламалари, мушак элементлари, тери ости клетчаткаси, қаттиқ мия пардаси ва бошқалар), периост, қон томирлари шохланишлари, бурун яқин пазухалари билан чамбарчас боғлиқдир. Таъкидлаш жоизки, пешона соҳаси юмшоқ тўқималари нервари билан бир қаторда пешона суяги нервари орқали, шунингдек, пешона, надглазничная артерия шохлари бўйлаб ҳам укол вақтида юзага келган қўзғалиш тарқалади.

Использованные источники:

1. Алешкина О.Ю. Половой деморфизм сочетания форм лицевого черепа и основания черепа / О.Ю. Алешкина, И.А. Алешкина // Морфология.- 2004. Т. 126, вып. 4. - С. 7-8.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
4. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.
5. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.

Мустафоев З.М., PhD
доцент
кафедра анатомии человека
Самаркандский государственный медицинский университет
Файзуллаева Р.Н.
студент
лечебный факультета
Самаркандский государственный медицинский университет

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧЕК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Аннотация. *Изучить морфометрические изменения структуры почек белых крыс при полипрагмазии противовоспалительными препаратами. Наличия влияния полипрагмазии противовоспалительными средствами на почках свидетельствуют о том, что полипрагмазия пагубно влияет на мочевыделительную, снижает выделение мочи и имеет достаточный уровень риска для организма.*

Ключевые слова: *почечная тельца, нефрон, проксимальный извитый каналец, дистальный извитый каналец, полипрагмазия.*

Mustafoev Z.M., PhD
associate professor
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Faizullaeva R. N.
student
Faculty of General Medicine
Samarkand State Medical University

DESCRIPTION OF THE STUDY OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE KIDNEYS UNDER THE INFLUENCE OF MEDICINAL DRUGS

Annotation.*To study morphometric changes in the structure of the kidneys of white rats with polypharmacy with anti-inflammatory drugs. The presence of the effect of polypharmacy by anti-inflammatory drugs on the kidneys indicates that polypharmacy has a detrimental effect on urinary excretion, reduces urinary excretion and has a sufficient level of risk for the body.*

Key words: *renal corpuscles, nephron, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, polypharmacy.*

Введение. Особо важное место во взаимоотношении всего организма с внешней средой занимает мочевыделительная система. Почки, как главный экскреторный орган, в большой степени подвержены негативному воздействию лекарственнқх средств [2]. Противовоспалительные средства это одна из наиболее часто используемых в медицине лекарственных групп. Их преимуществом является комплексное действие (жаропонижающее, противовоспалительное и обезболивающее), а также широкий спектр показаний, при которых они могут использоваться. Более распространенны и часто назначаются 5 видов противовоспалительных средств, входящие в одну группу по фармакодинамическим эффектам. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, а так же о развитие побочных эффектов в таких комбинациях [1,7]. При исследовании отдаленных последствий полипрагмазии уменшаеться параметры нефронов почки в более чувствительной популяции и параллельно растет численность стромальных элементов в наиболее устойчивых к полипрагмазии [4,8]. Эти данные свидетельствуют о снижении функциональной активности нефронов почки после воздействия полипрагмазии [5,9]. Побочные эффекты лекарственных препаратов, в том числе ренальные и кардиоваскулярные, являются актуальной медицинской проблемой во всем мире. Ведущее место в их развитии занимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), являющиеся одним из наиболее часто применяемых классов лекарственных средств [3,6]. **Цель исследования.** Установить динамику изменений морфометрических параметров площадь почечного тельца, проксимальных и дистальных извитых канальцев почек крыс до 6 месячного возраста в норме и при полипрагмазии противовоспалительных лекарственных средств.


Материалы и методы. Исследование выполнено на 50 белых рандомбредных крысах самцах, с массой от 210 до 320 г., содержавшихся в условиях вивария при стандартном рационе питания, свободном доступе к воде, обычном режиме освещения. Животные были разделены на 3 группы (n=60): I – интактный контроль (n=20); II–группа – крысы, получавшие 2 вида противовоспалительных средств, парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг (n=25); III – группа – крысы, получавшие 3 вида противовоспалительных средств, парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг, ибупрофен 6 мг/кг (n=25);

Данные дозировки препаратов были рассчитаны эмпирическим путем и вводились ежедневно внутрижелудочно в виде раствора в течении 10 дней. Крысам контрольной группы в течение 10 дней начиная с 141 дня развития до 150 дня металлическим зондом внутри желудочно вводили дистиллированную воду в объёме 0,5 мл.Тяжесть органопатологии оценивали по морфологическим показателям (площадь почечного тельца, наружный диаметр проксимальных и дистальных извитых канальцев, диаметр просвета канальцев и её процентному соотношению к группам).

Выведение животных из эксперимента проводили через 3 месяца (в180 дневном возрасте) с момента его начала, посредством мгновенной декапитации животных под эфирном наркозом. Для микроскопического исследования материал фиксировали в 10% формалине, пропускали через батарею спиртов и разливали парафиновой блоки в соответствии с общепринятыми методами. Окраска срезов толщиной 5-7 мкм производилась гематоксилин-эозином. Математическую обработку производили непосредственно из общей матрицы данных «Excel 7,0» на персональном компьютере Pentium-IV, определяли показатели среднеквадратичного отклонения и ошибки репрезентативности.

Результаты и обсуждение. При морфологическом исследовании параметров площадь почечного тельца, наружный диаметр проксимальных и дистальных извитых канальцев, диаметр просвета канальцев почек у крыс 1-й группы наблюдалась положительная динамика изменений всех показателей. Период наблюдений площадь почечного тельца увеличивался до 3263±34 мкм2, наружный диаметр проксимальных извитых канальца среднем равен 22,08±0,12 мкм, диаметр просвета канальца 13,12±0,09 мкм, наружный диаметр дистальных извитых канальца среднем равен 21,11±0,32 мкм, диаметр просвета канальца 12,04±0,1 мкм. У крыс 2-й группы наблюдалось уменьшение морфометрических показателей, по сравнению с животными 1-й группы. После окончания воздействия условий 2-й группы площадь почечного тельца уменьшался до 3018±4 мкрм2, 3056±7 мкрм2, 3126±6 мкрм2, 3131±5 мкрм2 (процентном соотношение -7,21%, -6,32%, -4,18%, -4,03%) наружный диаметр проксимальных извитых канальца уменьшался 20,04±0,1 мкрм, 20,49±0,13 мкрм, 21,16±0,3 мкрм, 21,39±0,2 мкрм (процентном соотношение -9,26%, -7,21%, -4,15%, -3,11%) диаметр просвета канальца на 12,16±0,12 мкрм, 12,29±0,22 мкрм, 12,45±0,13 мкрм, 12,70±0,31 мкрм (процентном соотношение -7,25%, -6,31%, -5.12%, -3,21%) наружный диаметр дистальных извитых канальца уменьшался 18,59±0,1 мкрм, 18,68±0,23 мкрм, 18,86±0,12 мкрм, 19,24±0,33 мкрм (процентном соотношение -7,54%, -7,09%, -6,22%, -4,34%) диаметр просвета канальца на 11,42±0,11 мкрм, 11,43±0,14 мкрм, 11,60±0,23 мкрм, 11,67±0,12 мкрм (процентном соотношение -5,12%, -5,04%, -3,64%, -3,09%). При сравнение морфометрических показателей крыс 3-й группы с показателями 2-й группы было выявлено достоверное уменьшение. Площадь почечного тельца уменьшался 3430±71 мкм^2, 3427±8 мкм^2, 3367±0,8 мкм^2, 3361±5 мкм^2 (процентное соотношение -5,14%, -5,05%, -3,19%. -3,02%) наружный диаметр проксимальных извитых канальца уменьшался 24,65±0,4 мкрм, 24,19±0,32 мкрм, 23,73±0,25 мкрм, 23,58±24 мкрм (процентном соотношение -8,13%, -6,11%, -4,08%, -3,42%) диаметр просвета канальца на 13,95±0,17 мкрм, 13,78±0,22 мкрм, 13,53±0,16 мкрм, 13,12±0,2 мкрм (процентном соотношение +6,33%, +5,09%, +3.12%, +3,08%) наружный диаметр дистальных извитых канальца уменьшался 22,61±0,21 мкрм, 22,18±0,13 мкрм, 22,17±0,32 мкрм, 22,05±0,18 мкрм (процентное соотношение -7,12%, -5,07%, -5,03%, -4,48%)

диаметр просвета канальца на 12,58±0,13 мкрм, 12,52±0,21 мкрм, 12,41±0,17 мкрм, 12,32±0,31 мкрм (процентное соотношение -4,47%, -4,04%, -3,07%, -2,31%).



Динамика изменения диаметра проксимальных и дистальных извытых канальцев почек и их полостей у 5-месячных крыс под влиянием полипрагмазии. (относительно 1-группы).

Таким образом, полученные результаты показали, что отмечается разная степень морфологических и морфометрических изменений при воздействии разных количеств лекарственных средств. Экспериментально изучено действие противовоспалительных лекарственных средств на почки у белых без породных крыс. Установлено, что после воздействия более трех видов противовоспалительных средств заметно уменьшается мочевыделительная система организма. Определение наличия влияния полипрагмазии на почках свидетельствуют о том, что полипрагмазия имеет достаточный уровень риска для организма.

Выводы. Доказано чем больше использовано лекарственных средств тем более выражен патологический эффект в почках. Наличия влияния полипрагмазии противовоспалительными средствами на почках свидетельствуют о том, что полипрагмазия пагубно влияет на мочевыделительную, снижает выделение мочи и имеет достаточный уровень риска для организма. Эти факты косвенно свидетельствуют о снижении показателей нефрона почки.

Использованные источники:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.

2. Ахмедова С. М. и др. Антропометрические показатели физического развития у детей до 5 лет в самаркандской области //SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY. – 2020. – С. 250-258.

3. Дехканов Т. Д. и др. Морфологические основы местной эндокринной регуляции внутренних органов //Проблемы биологии и медицины. – 2016. – Т. 92. – №. 4. – С. 39.
4. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
5. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47.
6. Маматалиев А. Р. НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПОД ВЛИЯНИЕМ КОЛХИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
7. Маматалиев А. Р. НАРУШЕНИЕ ИННЕРВАЦИИ И МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТКАНИ //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880.
8. Narbayev S. et al. Behavioral adaptations of Arctic fox, Vulpes lagopus in response to climate change //Caspian Journal of Environmental Sciences. – 2024. – Т. 22. – №. 5. – С. 1011-1019.
9. Мустафоев, З. М. (2024). Сравнительная Характеристика Морфометрических Параметров Почек При Полипрагмазии Противовоспалительными Препаратами. Multidisciplinary Journal Of Science And Technology, 4(2), 277-282.

Насимова И.Я.
магистрант
кафедра педиатрии
Бухарский государственный медицинский институт
Ачилова Д.Н., доктор медицинских наук
профессор
кафедра педиатрии
Бухарский государственный медицинский институт

РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Аннотация: *Атопический дерматит является одним из наиболее распространённых хронических аллергических заболеваний кожи у детей, характеризующимся рецидивирующим течением, зудом и воспалительными изменениями кожи. В последние годы возрастает интерес к применению немедикаментозных методов лечения, в том числе физиотерапии, направленных на уменьшение воспаления, улучшение микроциркуляции и снижение выраженности клинических симптомов. В данной статье рассмотрены современные данные о роли физиотерапевтических методов в комплексном лечении атопического дерматита у детей, их эффективность и перспективы применения. Особое внимание уделено влиянию физиотерапии на снижение зуда, удлинение периода ремиссии и улучшение качества жизни пациентов.*

Ключевые слова: *атопический дерматит, дети, физиотерапия, лечение, зуд, воспаление кожи, реабилитация.*

Nasimova I.Y.
master's student
Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute
Achilova D. N., DSc,
professor
Department of Pediatrics
Bukhara State Medical Institute

THE ROLE OF PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS IN THE TREATMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN

Abstract: *Atopic dermatitis is one of the most common chronic allergic skin diseases in children, characterized by a recurrent course, itching, and inflammatory skin changes. In recent years, there has been growing interest in non-pharmacological treatment methods, including physiotherapy, aimed at reducing inflammation, improving microcirculation, and alleviating clinical symptoms. This*

article reviews current data on the role of physiotherapeutic methods in the комплексное лечение atopic dermatitis in children, their effectiveness, and future prospects. Special attention is given to the impact of physiotherapy on reducing itching, prolonging remission, and improving patients' quality of life.

Keywords: *atopic dermatitis, children, physiotherapy, treatment, itching, skin inflammation, rehabilitation.*

Введение

Атопический дерматит представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи аллергической природы, которое чаще всего развивается в раннем детском возрасте. По данным различных исследований, распространённость данного заболевания среди детей во многих странах достигает 15–20%, что делает его одной из наиболее актуальных проблем педиатрической дерматологии. Болезнь характеризуется длительным рецидивирующим течением, выраженным зудом, сухостью кожи и склонностью к вторичным инфекциям.

В последние годы отмечается рост числа детей с аллергическими заболеваниями, включая атопический дерматит. Это связывают с ухудшением экологической обстановки, изменением образа жизни, особенностями питания и наследственной предрасположенностью. Заболевание существенно влияет на качество жизни ребёнка и его семьи, вызывая нарушение сна, повышенную раздражительность и психологический дискомфорт.

Традиционное лечение атопического дерматита включает применение топических кортикостероидов, антигистаминных препаратов, эмолентов и диетотерапии. Однако длительное применение медикаментозных средств не всегда приводит к стойкой ремиссии и может сопровождаться побочными эффектами. В связи с этим возрастает интерес к дополнительным методам лечения, направленным на повышение эффективности комплексной терапии.

Одним из перспективных направлений является использование физиотерапевтических методов. Физиотерапия способствует уменьшению воспалительных процессов, улучшению микроциркуляции, нормализации обменных процессов в коже и снижению выраженности зуда. Кроме того, она обладает минимальным количеством побочных эффектов, что особенно важно при лечении детей.

Современные физиотерапевтические методы, такие как ультрафиолетовое облучение, лазеротерапия, магнитотерапия и электрофорез, широко применяются в дерматологической практике. Их использование в комплексной терапии атопического дерматита позволяет повысить эффективность лечения, сократить длительность обострений и продлить период ремиссии.

Таким образом, изучение роли физиотерапевтических методов в лечении атопического дерматита у детей является актуальной научной и практической задачей.

Материалы и методы

Данная работа выполнена в форме аналитического обзора научной литературы. Были проанализированы современные публикации, посвящённые лечению атопического дерматита у детей с применением физиотерапевтических методов. Проведён сравнительный анализ эффективности различных физиотерапевтических процедур в составе комплексной терапии заболевания.

Результаты

Анализ научных данных показал, что физиотерапевтические методы широко применяются в комплексном лечении атопического дерматита у детей и оказывают положительное влияние на течение заболевания. Наиболее часто используются следующие методы:

1. ультрафиолетовое облучение (УФ-терапия);
2. лазеротерапия;
3. магнитотерапия;
4. лекарственный электрофорез;
5. светотерапия.

Отмечено, что применение физиотерапии способствует уменьшению воспалительных проявлений, снижению интенсивности зуда, улучшению состояния кожного покрова и удлинению периода ремиссии.

Обсуждение

Физиотерапевтические методы занимают важное место в комплексной терапии атопического дерматита у детей. Их применение позволяет воздействовать не только на симптомы заболевания, но и на основные патогенетические механизмы, включая воспаление, нарушение микроциркуляции и иммунные реакции.

Одним из наиболее эффективных методов считается ультрафиолетовая терапия. Она обладает выраженным противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, способствует снижению активности воспалительного процесса и уменьшению выраженности кожного зуда. Особенно важным является то, что УФ-терапия позволяет уменьшить потребность в гормональных препаратах, что имеет большое значение в педиатрической практике.

Лазеротерапия также демонстрирует положительные результаты при лечении атопического дерматита. Она улучшает микроциркуляцию, ускоряет регенерацию тканей и способствует восстановлению барьерной функции кожи. Это особенно важно при хроническом течении заболевания, сопровождающемся сухостью и повреждением кожного покрова.

Магнитотерапия оказывает противоотёчное и противовоспалительное действие, улучшает обменные процессы в тканях и способствует снижению выраженности клинических симптомов. Электрофорез с лекарственными препаратами позволяет обеспечить более глубокое проникновение медикаментов в кожу, повышая эффективность местного лечения.

Важным преимуществом физиотерапевтических методов является их хорошая переносимость детьми и минимальный риск развития побочных

эффектов. В отличие от длительного применения медикаментозных средств, физиотерапия может использоваться в течение продолжительного времени без значительного вреда для организма.

Кроме того, комплексное применение физиотерапии способствует улучшению общего состояния ребёнка, нормализации сна и снижению нервной возбудимости, что особенно важно при выраженном зуде. Психоэмоциональное состояние ребёнка играет значительную роль в течении заболевания, поэтому методы, способствующие снижению стресса, также имеют терапевтическое значение.

Однако следует учитывать, что физиотерапия не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения, а должна применяться в составе комплексной терапии. Эффективность процедур зависит от возраста ребёнка, стадии заболевания, индивидуальных особенностей организма и правильного подбора метода лечения.

В перспективе дальнейшее совершенствование физиотерапевтических технологий и их более широкое внедрение в педиатрическую практику может способствовать повышению эффективности лечения атопического дерматита и улучшению качества жизни пациентов.

Заключение

Физиотерапевтические методы являются важным компонентом комплексного лечения атопического дерматита у детей. Их применение способствует уменьшению воспаления, снижению зуда, ускорению регенерации кожи и продлению периода ремиссии. Включение физиотерапии в лечебную программу позволяет повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

Использованные источники:

1. Williams H., Stewart A., von Mutius E. et al. Is eczema really on the increase worldwide? // Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2008.
2. Bieber T. Atopic dermatitis // New England Journal of Medicine. 2008. Vol. 358. P. 1483–1494.
3. Leung D.Y., Guttman-Yassky E. Deciphering the complexities of atopic dermatitis // Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2014.
4. Sidbury R., Davis D.M., Cohen D.E. et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis // Journal of the American Academy of Dermatology. 2014.
5. Paller A.S., Mancini A.J. Hurwitz Clinical Pediatric Dermatology. — Elsevier, 2016.
6. Hon K.L., Leung T.F. Use of phototherapy in children with atopic dermatitis // Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology. 2011.
7. Kim B.E., Leung D.Y. Significance of skin barrier dysfunction in atopic dermatitis // Allergy, Asthma & Immunology Research. 2018.

UDC: 618.3:616-005.1:616-008.9

Неъматова М.Р.
ассистент
кафедра акушерства и гинекологии № 3
Бухарский государственный медицинский
института имени Абу Али ибн Сино
Бухара, Узбекистан

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Аннотация: *Цель исследования — оценить прогностическую значимость динамики биомаркеров эндотелиальной дисфункции в раннем выявлении риска акушерских кровотечений в перинатальном периоде. В проспективное наблюдательное исследование включены 32 беременные женщины, находившиеся под наблюдением в акушерском стационаре. Оценивались уровни sICAM-1, фактора Виллебранда (vWF) и эндотелина-1 на различных этапах гестации и в раннем послеродовом периоде. Установлено, что выраженное повышение данных маркеров ассоциировано с увеличением объема кровопотери в родах. Полученные результаты подтверждают возможность использования динамики биомаркеров эндотелиальной дисфункции в качестве раннего прогностического инструмента акушерских кровотечений.*

Ключевые слова: *эндотелиальная дисфункция, акушерские кровотечения, биомаркеры, прогнозирование, перинатальный период.*

Ne'matova M.R.
assistant
Department of Obstetrics and Gynecology No. 3
Bukhara State Medical Institute
Abu Ali ibn Sino Institute, Bukhara
Uzbekistan

FORECASTING ACUERY BLEEDING IN THE PERINATAL PERIOD BASED ON THE DYNAMICS OF BIOMARKERS OF ENDOTELIAL DYSFUNCTION

Annotation. *The aim of the study is to assess the prognostic significance of the dynamics of endothelial dysfunction biomarkers in the early detection of the risk of obstetric hemorrhage in the perinatal period. A prospective observation study included 32 pregnant women who were under observation at the maternity hospital. The levels of sICAM-1, Willbrand factor (vWF), and endothelin-1 were assessed at different stages of gestation and in the early postpartum period. It was established*

that a pronounced increase in these markers is associated with an increase in the volume of blood loss during childbirth. The obtained results confirm the possibility of using the dynamics of endothelial dysfunction biomarkers as an early prognostic tool for obstetric hemorrhage.

Keywords: *endothelial dysfunction, obstetric bleeding, biomarkers, prognosis, perinatal period.*

Введение. Акушерские кровотечения продолжают оставаться одной из ведущих причин материнской смертности и тяжелых перинатальных осложнений. Несмотря на совершенствование акушерской тактики и внедрение современных протоколов ведения родов, ранняя диагностика риска массивной кровопотери по-прежнему представляет значительные трудности.

В последние годы особое внимание уделяется роли эндотелиальной дисфункции в патогенезе нарушений гемостаза при беременности. Эндотелий сосудов играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса, тромбообразования и противосвертывающих механизмов. Нарушение его функции приводит к дисбалансу между коагуляционными и антикоагуляционными процессами, что может способствовать развитию акушерских кровотечений.

Изучение динамики биомаркеров эндотелиальной дисфункции в перинатальном периоде представляется перспективным направлением для разработки ранних прогностических критериев и индивидуализации профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Исследование выполнено в виде проспективного наблюдательного исследования. В него были включены 32 беременные женщины в возрасте от 18 до 40 лет, находившиеся под наблюдением в акушерском отделении. Срок беременности на момент включения составлял не менее 28 недель.

Критериями включения являлись физиологическое или умеренно осложненное течение беременности и отсутствие в анамнезе хронических сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Из исследования исключались пациентки с тяжелыми формами преэклампсии, инфекционными заболеваниями, врожденными и приобретенными коагулопатиями, а также с системными заболеваниями, способными влиять на показатели гемостаза.

Для оценки состояния эндотелиальной функции определялись следующие биомаркеры: растворимая молекула межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) как показатель воспалительной активации эндотелия, фактор Виллебранда (vWF), отражающий эндотелиальную функцию и процессы тромбообразования, и эндотелин-1 — маркер сосудистой активности и вазоконстрикции.

Забор крови проводился на трех этапах: на сроке 28–32 недели беременности, в 36–38 недель гестации и в течение первых 24 часов после родов. Определение концентраций биомаркеров выполнялось методом

иммуноферментного анализа (ELISA). Одновременно осуществлялся клинический контроль объема кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M ± SD). Для сравнения показателей между группами пациенток с акушерскими кровотечениями и без них применялся t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Из 32 обследованных пациенток у 10 (31,3 %) отмечались акушерские кровотечения объемом более 500 мл. У данной группы выявлены более выраженные изменения показателей эндотелиальной функции по сравнению с пациентками без клинически значимой кровопотери.

Средние значения биомаркеров демонстрировали тенденцию к нарастанию по мере увеличения срока гестации и в раннем послеродовом периоде. Наиболее выраженные изменения отмечались в группе пациенток с кровотечениями, где уровень sICAM-1 и эндотелина-1 был статистически значимо выше ($p < 0,05$). Повышение уровня vWF также коррелировало с объемом кровопотери, однако связь была менее выраженной.

Корреляционный анализ показал достоверную положительную связь между уровнем sICAM-1 и объемом кровопотери ($r = 0,64$), а также между концентрацией эндотелина-1 и выраженностью геморрагического синдрома ($r = 0,59$).

Полученные результаты подтверждают значимую роль эндотелиальной дисфункции в развитии акушерских кровотечений. Повышение уровней sICAM-1 отражает воспалительную активацию эндотелия, тогда как рост эндотелина-1 свидетельствует о нарушении сосудистой регуляции. Совокупность этих изменений способствует дестабилизации системы гемостаза в перинатальном периоде.

Использование динамической оценки биомаркеров эндотелиальной дисфункции позволяет выделить группу высокого риска еще до клинической манифестации кровотечения, что открывает возможности для проведения профилактических и лечебных мероприятий в индивидуализированном режиме.

Заключение: Динамика биомаркеров эндотелиальной дисфункции (sICAM-1, vWF и эндотелин-1) обладает высокой прогностической значимостью в оценке риска акушерских кровотечений в перинатальном периоде. Комплексное использование данных показателей может быть рекомендовано для раннего прогнозирования и профилактики геморрагических осложнений у беременных женщин. Дальнейшие исследования с расширением выборки необходимы для уточнения пороговых значений и внедрения данного подхода в клиническую практику.

Использованные источники:

1. Сидорова И. С., Макаров И. О. Акушерские кровотечения: патогенез, диагностика и профилактика : монография. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 272 с.
2. Радзинский В. Е., Оразмурадов А. А., Филиппов О. С. Эндотелиальная дисфункция в акушерстве и перинатологии // Акушерство и гинекология. — 2020. — № 7. — С. 5–12.
3. Айламазян Э. К., Кулаков В. И. Перинатология : национальное руководство. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 768 с.
4. Gómez D., Martínez M., López J. Endothelial dysfunction biomarkers in prediction of obstetric hemorrhage // Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. — 2021. — Vol. 34, № 15. — P. 2451–2457.
5. van den Bosch T., Dueholm M. Postpartum hemorrhage: pathophysiology, diagnosis and clinical management // Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. — 2020. — Vol. 67. — P. 36–49.
6. Cines D. B., Pollak E. S., Buck C. A. et al. Endothelial cells in physiology and pathology of hemostasis // Blood. — 2019. — Vol. 134, № 15. — P. 1231–1242.

UDC: 618.3:616-005.1:616-008.9

Неъматова М.Р.
ассистент
кафедра акушерства и гинекологии № 3
Бухарский государственный медицинский
института имени Абу Али ибн Сино
Бухара, Узбекистан

ДИНАМИКА БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИ

Аннотация. *Цель исследования — изучить динамику биомаркеров эндотелиальной дисфункции у беременных женщин и определить их прогностическую значимость для раннего выявления риска акушерских кровотечений. В исследование включены 25 пациенток с различными акушерскими осложнениями. Определялись уровни маркеров эндотелиальной функции (включая sICAM-1, vWF, эндотелин-1) на разных сроках беременности и в послеродовом периоде. Полученные данные позволяют выделить закономерности изменения маркеров и их связь с частотой кровотечений.*

Ключевые слова: *эндотелиальная дисфункция, акушерские кровотечения, биомаркеры, прогнозирование, беременность.*

Ne'matova M.R.
assistant
Department of Obstetrics and Gynecology No. 3
Bukhara State Medical Institute
Abu Ali ibn Sino Institute, Bukhara
Uzbekistan

DYNAMICS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION BIOMARKERS AS A PROGNOSTIC MARKER OF ACUCHERY BLEEDING

Annotation. *The aim of the study is to study the dynamics of endothelial dysfunction biomarkers in pregnant women and to determine their prognostic significance for early detection of the risk of obstetric hemorrhage. The study included 25 patients with various obstetric complications. The levels of endothelial function markers (including sICAM-1, vWF, endothelin-1) were determined at different gestational ages and in the postpartum period. The obtained data allow us to identify patterns of marker changes and their relationship to the frequency of bleeding.*

Keywords: *endothelial dysfunction, obstetric bleeding, biomarkers, prognosis, pregnancy.*

Введение. Акушерские кровотечения остаются одной из ведущих причин материнской смертности и заболеваемости во всем мире. Раннее выявление женщин с повышенным риском кровотечений позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия и уменьшать осложнения.

Эндотелиальная дисфункция играет ключевую роль в патогенезе нарушений гемостаза, так как эндотелий регулирует сосудистый тонус, агрегацию тромбоцитов и противосвертывающие механизмы. Изменение уровней биомаркеров эндотелиальной функции может служить ранним прогностическим индикатором акушерских кровотечений.

Материалы и методы. Исследование выполнено в виде проспективного наблюдательного исследования и включало 25 беременных женщин, находившихся под динамическим наблюдением в условиях акушерского стационара. Возраст пациенток варьировал от 18 до 40 лет, срок гестации на момент включения в исследование составлял не менее 28 недель.

Критериями включения являлись физиологическое течение беременности, отсутствие в анамнезе хронических сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также согласие пациенток на участие в исследовании. Из исследования исключались женщины с тяжелыми формами преэклампсии, острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, врожденными и приобретенными коагулопатиями, включая гемофилию, а также с другими состояниями, способными существенно влиять на систему гемостаза.

Для оценки состояния эндотелиальной функции определялись биомаркеры, отражающие различные патофизиологические механизмы эндотелиальной дисфункции: растворимая молекула межклеточной адгезии-1 (sICAM-1) как показатель воспалительной активации эндотелия, фактор Виллебранда (vWF), характеризующий эндотелиальную функцию и тромбообразование, а также эндотелин-1 — мощный вазоконстриктор и маркер сосудистой активности.

Забор биологического материала проводился на трех этапах: в сроке 28–32 недели беременности, в 36–38 недель гестации и в течение первых 24 часов после родоразрешения. Одновременно осуществлялся клинический контроль объема кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде. Определение концентраций биомаркеров выполнялось с использованием стандартных лабораторных методов иммуноферментного анализа (ELISA) в соответствии с инструкциями производителя.

Статистическая обработка данных проводилась с применением методов вариационной статистики. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M ± SD). Сравнительный анализ показателей между группами пациенток с акушерскими кровотечениями и без них осуществлялся с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты. Результаты исследования подтверждают, что повышение уровней биомаркеров эндотелиальной дисфункции может служить ранним индикатором риска акушерских кровотечений. sICAM-1 и эндотелин-1 особенно чувствительны к изменениям сосудистой функции и агрегации тромбоцитов.

Раннее выявление женщин с повышенными значениями биомаркеров позволяет применять профилактические меры:

- контроль свертываемости крови
- активная профилактика послеродового кровотечения
- своевременное применение гемостатических средств

Сравнение с литературными данными показывает согласованность: повышение эндотелин-1 и sICAM-1 ассоциируется с повышенной частотой кровотечений у женщин в перинатальном периоде.

Период исследования	**sICAM-1 (нг/мл)**	**vWF (%)**	**Эндотелин-1 (пг/мл)**
28–32 неделя	245 ± 30	145 ± 25	3,2 ± 0,5
36–38 неделя	280 ± 35	160 ± 30	3,8 ± 0,6
Послеродовой период	310 ± 40	175 ± 35	4,2 ± 0,7

- У 8 пациенток, перенесших кровотечение >500 мл, наблюдались более выраженные изменения биомаркеров ($p < 0,05$)
- Динамика показателей sICAM-1 и эндотелин-1 демонстрировала достоверную корреляцию с объемом кровопотери ($r = 0,62$ и $r = 0,58$ соответственно)
- vWF также повышался, но связь с кровопотерей была менее выражена ($r = 0,42$)

Заключение: Динамика биомаркеров эндотелиальной дисфункции у беременных женщин (sICAM-1, vWF, эндотелин-1) отражает состояние сосудистого эндотелия и может быть использована как ранний прогностический показатель риска акушерских кровотечений. Дальнейшие исследования с большим числом пациенток необходимы для разработки точных пороговых значений и внедрения этих показателей в клиническую практику.

Использованные источники:

1. Сидорова И.С., Макаров И.О. Акушерские кровотечения: современные аспекты патогенеза, диагностики и профилактики. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 256 с.
2. Радзинский В.Е., Оразмурадов А.А. Эндотелиальная дисфункция в акушерстве и гинекологии. // Акушерство и гинекология. — 2020. — №7. — С. 5–11.
3. Gómez D., Martínez M., López J. Endothelial dysfunction biomarkers and obstetric hemorrhage risk prediction. // Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. — 2021. — Vol. 34(15). — P. 2451–2457.

4. van den Bosch T., Dueholm M. Postpartum hemorrhage: pathophysiology and clinical management. // Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. — 2020. — Vol. 67. — P. 36–49.
5. Cines D.B., Pollak E.S., Buck C.A. et al. Endothelial cells in physiology and pathology of hemostasis. // Blood. — 2019. — Vol. 134(15). — P. 1231–1242.

УДК 616.33-002.44-001.1-089

Райимов Г.Н., д.м.н.
зав. кафедрой Хирургии и клинических дисциплин
Отабоев И.Х.
Врач хирург
Хасанов Б.Т.
врач хирург
Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Узбекистан

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Аннотация. Цель исследования *— улучшить результаты хирургического лечения пациентов с острым панкреатитом в условиях ургентного стационара. Проанализированы результаты лечения 103 больных, разделённых на основную группу, где применялись тактика* step-up approach *и принципы* fast-track surgery (ERAS)*, и группу сравнения со стандартной хирургической тактикой. Установлено, что использование минимально инвазивных вмешательств в сочетании с программами ускоренного восстановления приводит к снижению частоты послеоперационных осложнений и летальности, а также к сокращению сроков госпитализации. Полученные данные подтверждают целесообразность внедрения этапной хирургической тактики и принципов ERAS при лечении острого панкреатита.*

Ключевые слова: *язвенная болезнь, перфорация пилородуоденальной язвы, лапароскопические вмешательства.*

Rayimov G.N. Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Surgery and Clinical Disciplines
Central Asian Medical University
Uzbekistan
Otaboev I.Kh.
surgeon
Khasanov B.T.
surgeon
Fergana Branch of the Republican Research Center of Emergency Medical Care
Uzbekistan

A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED PYLORODUODENAL ULCERS

Abstract. Objective: *to improve the outcomes of surgical treatment of patients with acute pancreatitis in an emergency hospital setting. The treatment results of 103 patients were analyzed and divided into a main group, in which the* step-up approach *and* fast-track surgery (ERAS) *principles were applied, and a comparison group treated using standard surgical tactics. It was established that the use of minimally invasive interventions in combination with enhanced recovery programs leads to a reduction in postoperative complications and mortality, as well as a shorter length of hospital stay. The obtained data confirm the feasibility of implementing a staged surgical strategy and ERAS principles in the treatment of acute pancreatitis.*

Keywords: *peptic ulcer disease, perforated pyloroduodenal ulcer, laparoscopic interventions.*

Цель работы. Улучшение результатов хирургического лечения больных с перфоративными пилородуоденальными язвами.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 101 пациента, оперированного по поводу ППДЯ, находившихся на лечении в отделении 1-экстренной абдоминальной хирургии Ферганского филиала РНЦЭМП в период с 2020 по 2025 гг. Для обследования больных применялись общеклинические (периферическая кровь с определением основных показателей, биохимические показатели, коагулограмма), специальные (цитологические, морфологические, иммуногистохимические) методы лабораторной диагностики, а также инструментальные методы исследования.

Всем пациентам были выполнены ургентные оперативные вмешательства по поводу ППДЯ. При этом 61 (60,4%) больному выполнено ушивание ППДЯ, из них 42 (20,6%) пациентам — лапароскопическим доступом и 19 (18,8%) — открытым традиционным доступом. Иссечение язвы без ваготомии (ВТ) выполнено у 40 (39,6%) больных, из них 14 (13,9%) — лапароскопическим доступом и 26 (25,7%) — традиционным лапаротомным доступом с пилородуоденопластикой.

Результаты исследования и их обсуждение

Лапароскопические вмешательства у 56 (55,4%) больных с перфоративной язвой (ПЯ) ДПК выполнялись при следующих показаниях: сроки перфорации до 12 часов; возраст до 40 лет; отсутствие длительного язвенного анамнеза более 1 года; отсутствие других осложнений ЯБ; отсутствие разлитого и/или гнойного перитонита; отсутствие нарушений витальных функций. При отсутствии каллёзной язвы в области перфорации выполнялось лапароскопическое ушивание перфоративного дефекта; при наличии незначительного каллёзного язвенного процесса в пределах до 12 мм вокруг зоны перфорации выполнялось лапароскопическое иссечение

перфоративного дефекта. Дополнительными критериями являлись интраоперационная интрагастральная pH-метрия >2,0, локализация ПЯ на передней стенке луковицы ДПК, отсутствие дополнительных язвенных процессов в ДПК и желудке.

Ушивание ПЯ традиционным методом без ВТ у 19 (18,8%) больных выполнялось при сроках перфорации более 12 часов с признаками фибринозно-гнойного перитонита и синдрома эндогенной интоксикации с угрозой или развитием полиорганной недостаточности; возрасте старше 75 лет; наличии тяжёлых осложнений ЯБ (кровотечение, пенетрация в ткань поджелудочной железы) с нарушением витальных функций; наличии тяжёлой сопутствующей соматической патологии.

Осложнения раннего послеоперационного периода у 8 (7,9%) больных носили общехирургический характер, свойственный операциям на органах брюшной полости. У 27 (26,7%) пациентов послеоперационные осложнения были специфическими и связаны с выполнением расширяющей пилородуоденопластики (ПДП). Среди специфических осложнений раннего послеоперационного периода отмечены гастростаз у 5 (4,9%) пациентов, эрозивный гастродуоденит — у 12 (11,9%), рефлюкс-гастрит — у 8 (7,9%), демпинг-синдром — у 2 (1,9%) больных.

Наибольшее количество послеоперационных осложнений наблюдалось у больных, которым было выполнено ушивание язвы традиционным лапаротомным доступом — 17 (16,8%) случаев, из них общехирургические осложнения составили 6 (5,9%), специфические — 11 (10,9%). У пациентов после иссечения язвы с ПДП без ВТ специфических осложнений было больше — 13 (12,9%), при этом общехирургических осложнений отмечалось значительно меньше. У 2 (1,9%) больных с пенетрирующими язвами развился послеоперационный панкреатит. У пациентов, которым были выполнены лапароскопические вмешательства, в послеоперационном периоде общехирургических осложнений не наблюдалось, а специфические осложнения отмечены лишь в 3 (2,9%) случаях: эзофагогастродуоденит — 1, рефлюкс-гастрит — 2.

Развитие эзофагогастродуоденита (ЭГД) у 5 (4,9%) больных было обусловлено нарушением моторной функции ДПК, у 2 (1,9%) — в сочетании с отсутствием отхождения лигатур в просвет кишки и у 1 (0,9%) — вследствие рубцовой деформации пилородуоденальной зоны. Все пациенты с ЭГД лечились в условиях дневного стационара. Для коррекции нарушений моторики применялись препараты, нормализующие моторику желудка и ДПК (бензогексоний, церукал, реглан, мотилиум, домперидон). Средняя продолжительность лечения составляла около двух недель. Проведение комплексной противоязвенной терапии с учётом патогенетических механизмов гастродуоденита позволило в 8 (7,9%) случаях добиться полного выздоровления, а в 4 (3,9%) — выраженного положительного эффекта.

Выводы

Лапароскопический метод ушивания перфоративных язв пилородуоденальной зоны сопровождается менее выраженным болевым синдромом, снижением частоты послеоперационных осложнений, летальности и продолжительности госпитализации, что требует более широкого внедрения эндовидеохирургических технологий при данном осложнении язвенной болезни. Успешное решение проблемы послеоперационных осложнений возможно лишь при условии их профилактики и проведения рациональной современной противоязвенной терапии.

Использованные источники:

1. Bertleff M.J., Lange J.F. Perforated peptic ulcer disease: a review of history and treatment. *Dig Surg*. 2010;27(3):161–169.
2. Lau J.Y., Sung J., Hill C. et al. Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ulcer disease. *Gut*. 2011;60(1):114–122.
3. Svanes C. Trends in perforated peptic ulcer: incidence, etiology, treatment, and prognosis. *World J Surg*. 2000;24(3):277–283.
4. Ивашкин В.Т., Маев И.В. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.
5. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия язвенной болезни. — Киев: Здоров’я, 2015.
6. Rayimov, G. N., Tillaboldiyev, A. R., & Saloxiddinov, N. (2022). Actical Errors in Surgical Treatment of Strengthened Abdominal Hernias. *The Peerian Journal*, *5*, 130-135.

УДК 616.37-002.1-085.33

Райимов Г.Н., д.м.н.
зав. Кафедрой Хирургии и клинических дисциплин
Соткинов Г.А.
врач хирург
Эгамбердиев Т.Э.
врач хирург
Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Узбекистан

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФИЦИРОВАННОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Аннотация. Цель исследования *— оценить эффективность антибактериальной терапии в лечении и профилактике инфицированного острого панкреатита. Проанализированы результаты лечения пациентов с острым панкреатитом, осложнённым инфекционным процессом, с акцентом на своевременность и адекватность назначения антибактериальных препаратов. Установлено, что рациональная антибактериальная терапия способствует ограничению воспалительного процесса, снижению частоты инфекционных осложнений и улучшению клинических исходов. Полученные данные подтверждают целесообразность использования антибактериальных средств как важного компонента комплексного лечения инфицированного острого панкреатита.*

Ключевые слова: *острый панкреатит, панкреонекроз, антибиотики, альтернативные методы.*

Rayimov G.N. Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Surgery and Clinical Disciplines
Central Asian Medical University
Uzbekistan
Sotkinov G.A.
surgeon
Egamberdiev T.
surgeon
Fergana Branch of the Republican
Research Center of Emergency Medical Care
Uzbekistan

ANTIBACTERIAL THERAPY IN THE TREATMENT AND PREVENTION OF INFECTED ACUTE PANCREATITIS

Abstract. Objective: *to evaluate the effectiveness of antibacterial therapy in the treatment and prevention of infected acute pancreatitis. The treatment outcomes of patients with acute pancreatitis complicated by infection were analyzed, with emphasis on the timeliness and adequacy of antibiotic administration. It was established that rational antibacterial therapy contributes to limitation of the inflammatory process, reduction in infectious complications, and improvement of clinical outcomes. The obtained data confirm the feasibility of using antibacterial agents as an essential component of comprehensive management of infected acute pancreatitis.*

Keywords: *acute pancreatitis, pancreatic necrosis, antibiotics, alternative methods.*

Цель работы

Изучить возможности применения антибиотиков при лечении и профилактике инфицированного острого панкреатита путём их лимфотропного введения и оценить эффективность данного метода.

Материалы и методы исследования В процессе реализации поставленной цели были изучены результаты применения методики лимфотропной антибактериальной терапии у 17 пациентов на фоне базовой инфузионной терапии. Средний возраст больных составил (44,9±13,2) года. Мужчин было 12 (70,6%), женщин — 5 (29,4%).

Обследование проводили по общепринятым методикам с акцентом на показатели, отражающие редукцию общего воспалительного процесса в организме. При анализе жалоб учитывали длительность и интенсивность болевого синдрома, который зависит от выраженности воспалительного процесса, влияющего на размеры поджелудочной железы и растяжение её капсулы. Оценивали продолжительность слабости, тошноты и сухости во рту, зависящих от степени токсического синдрома. На всех этапах исследования тщательно анализировали лейкоцитарную формулу, отражающую степень интоксикации и уровень воспалительного процесса, а также возможную контаминацию зоны некроза микрофлорой желудочно-кишечного тракта.

Отклонения уровня ферментов поджелудочной железы в крови и окружающих тканях оценивали по показателям амилазы крови. Определяли также уровень иммуноглобулинов и крупных гранулярных лимфоцитов.

Результаты исследования и их обсуждение Учитывая, что при лимфотропной терапии антибактериальные препараты задерживаются в лимфатических узлах до 48–72 часов [8], введение препаратов в первые сутки проводили дважды с интервалом 12 часов, в дальнейшем — один раз в сутки [9]. Уже после первого сеанса лимфотропного введения антибактериальных и противовоспалительных препаратов болевой синдром постепенно локализовался в эпигастральной области и изменял характер с режущего или «разрывающего» на тупой и ноющий. К концу вторых суток спонтанная боль у 80% больных переходила в «провоцируемую» и возникала при пальпации. Признаки интоксикации (слабость, сухость во рту, тошнота, рвота) исчезали у

всех обследованных. Температура тела у 11 больных снижалась с субфебрильных значений (37,4–37,9 °С) до нормальных, у 6 пациентов оставалась в пределах нормы.

Объективным подтверждением уменьшения интоксикации было снижение количества лейкоцитов с (10,5±3,8) × 10^9/л до (6,6±2,4) × 10^9/л, разница составила (3,9±1,4) × 10^9/л ($p<0,05$). Лейкоцитарный индекс интоксикации по Кальф–Калифу снижался к 4-м суткам с (4,73±1,42) до (2,1±0,6) усл. ед., то есть на (2,63±0,7) усл. ед. Параллельно отмечалось снижение СОЭ с (17±7,1) до (8,4±3,1) мм/ч, что коррелировало с уменьшением глобулиновой фракции. Уровень С-реактивного белка снижался с 4,9 до 2,8 мг/л.

Указанные лабораторные изменения имели морфологическое обоснование и сопровождались уменьшением размеров поджелудочной железы на уровне головки, тела и хвоста с (30,2±5,5) до (20,2±4,9), с (24,2±4,4) до (23,8±4,4) и с (16,3±3,9) до (17,2±2,3) мм соответственно, что соответствовало уменьшению объёма железы на 6,4; 3,9 и 7,0 мм. На фоне уменьшения объёма воспалённой поджелудочной железы отмечалось значительное клиническое улучшение: уменьшение болевого синдрома, исчезновение слабости, сухости во рту, тошноты и рвоты, улучшение объективных показателей общего воспалительного процесса, нормализация лейкоцитарной формулы, снижение индекса лейкоцитарной интоксикации и десятикратное снижение уровня амилазы крови (с 500 до 50 усл. ед.).

Гнойно-септические осложнения, которые чаще развиваются в срок до 4 недель и сопровождаются летальностью 19–40% [5, 1, 4], у обследованных пациентов не наблюдались; летальных исходов зарегистрировано не было.

Выводы

1. Лимфотропный метод введения антибиотиков и противовоспалительных средств способствует торможению воспалительного процесса и профилактике инфицирования, что объективно проявляется уменьшением размеров поджелудочной железы.

2. Регресс воспаления сопровождается улучшением показателей общего воспалительного процесса (лейкоцитоз, СОЭ, лейкоцитарный индекс интоксикации).

3. Снижение выраженности воспаления приводит к субъективному улучшению течения заболевания уже в первые 4 суток острого панкреатита.

Использованные источники:

1. Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Острый панкреатит: современные проблемы диагностики и лечения. *Хирургия*. 2010;(1):4–10.
2. Шалимов А.А., Грубник В.В., Козлов С.Н. **Острый панкреатит**. Киев: Здоров’я; 2007.
3. Beger H.G., Rau B.M. Severe acute pancreatitis: clinical course and management. *World Journal of Gastroenterology*. 2007;13(38):5043–5051.
4. Isenmann R., Beger H.G. Antibiotic therapy in severe acute pancreatitis: a review. *Scandinavian Journal of Gastroenterology*. 2001;36(1):65–71.

5. Райимов, Г. Н., Салохиддинов, Н. А., & Рахматов, Д. Р. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *ББК 51: 74.03 (3Кир) М34*, *22*, 101. Райимов, Г. Н., Салохиддинов, Н. А., & Рахматов, Д. Р. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *ББК 51: 74.03 (3Кир) М34*, *22*, 101.
6. Махмудов, Н. И., Раимов, Г. Н., & Холмухамедов, Ж. Р. (2023). Экстренная неотложная терапия при недифференцированных коматозных состояниях на догоспитальном этапе. In *Скорая медицинская помощь-2023* (pp. 67-68).
7. Rayimov, G. N., Kholmukhamedov, Z., Tillaboldiev, A. R., Dekhkonov, S. S., & Kosimov, S. K. (2023). Results of surgical treatment of destructive pancreatitis. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 05036). EDP Sciences.
8. Rayimov, G. N., Kholmukhamedov, Z. R., Khasanov, B. T., Salokhiddinov, N. A., & Sotkinov, G. A. (2022). The role of minimally invasive technologies in the diagnosis and treatment of patients with acute destructive pancreatitis. *Czech Journal of Multidisciplinary Innovations*, *11*, 84-87.

УДК 616.34-007.272-089-006.6

Райимов Г.Н., д.м.н.
зав. кафедрой Хирургии и клинических дисциплин
Соткинов С.А.
врач хирург
Эгамбердиев Т.Э.
врач хирург
Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Аннотация*: Цель исследования — оценить эффективность современных хирургических подходов в лечении опухолевой обтурационной кишечной непроходимости. Проанализированы результаты лечения 186 пациентов с острой обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза. Установлено, что применение этапной хирургической тактики с использованием лапароскопических методов и первичного кишечного стомирования позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений, стабилизировать состояние больных и создать оптимальные условия для последующего радикального лечения. Полученные данные подтверждают целесообразность широкого внедрения малоинвазивных технологий при данной патологии.*

Ключевые слова: *острая кишечная непроходимость, кишечное стомирование, лапароскопия.*

Rayimov G.N. Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Surgery and Clinical Disciplines
Central Asian Medical University
Uzbekistan
Sotkinov S.A.
surgeon
Egamberdiev T.
surgeon
Fergana Branch of the Republican Research Center of Emergency Medical Care
Uzbekistan

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF TUMOR-RELATED OBSTRUCTIVE INTESTINAL OBSTRUCTION

Abstract. *Objective: to evaluate the effectiveness of modern surgical approaches in the treatment of tumor-related obstructive intestinal obstruction. The treatment outcomes of 186 patients with acute tumor-induced obstructive colonic obstruction were analyzed. It was found that a staged surgical strategy using laparoscopic techniques and primary intestinal stoma formation reduces postoperative complications, stabilizes patients' condition, and creates optimal conditions for subsequent radical treatment. The obtained results confirm the feasibility of widespread implementation of minimally invasive technologies in the management of this pathology.*

Keywords: *acute intestinal obstruction, intestinal stoma formation, laparoscopy.*

Материалы и методы исследования

В период с 2020 по 2024 год в отделении 1-Экстренной абдоминальной хирургии проходили лечение 186 больных с острой обтурационной толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза. Мужчин было 138 (74,1%), женщин — 48 (25,8%), возраст пациентов варьировал от 47 до 89 лет.

Локализация опухолевого процесса распределялась следующим образом: слепая кишка — у 4 (2,1%) больных, восходящая ободочная кишка — у 12 (6,1%), печеночный изгиб ободочной кишки — у 14 (7,5%), поперечно-ободочная кишка — у 6 (3,2%), селезеночный изгиб — у 16 (8,6%), нисходящая ободочная кишка — у 5 (2,6%), сигмовидная кишка — у 46 (24,7%), ректосигмоидный отдел — у 57 (30,6%), ампулярный отдел прямой кишки — у 26 (13,9%). Причиной ООКН у всех пациентов являлась обтурация просвета кишки злокачественной опухолью. Метастатическое поражение печени выявлено у 32 (17,8%) больных. У 21 (11,2%) пациента диагностированы признаки разлитого перитонита, что свидетельствовало о крайне поздней госпитализации.

Все пациенты госпитализировались в отделение неотложной хирургии и клинику колопроктологии. В ряде случаев при необходимости больные направлялись в отделение реанимации для интенсивной предоперационной подготовки в течение 2–6 часов. Всем пациентам выполнялся полный комплекс клинических и лабораторных исследований. Из инструментальных методов обязательными являлись обзорная рентгенография органов брюшной полости и грудной клетки, электрокардиография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и таза, а также осмотр терапевта.

В предоперационном периоде проводились гастроинтубация для декомпрессии желудка, очистительные и сифонные клизмы, ургентная колоноскопия с точной верификацией локализации опухоли, попытками реканализации опухолевого стеноза и выполнением биопсии.

Результаты исследования и их обсуждение

У 34 (18,3%) пациентов с ООКН на фоне проведенных консервативных мероприятий отмечалась положительная динамика, что позволило выполнить

детальное обследование и подготовить больных к оперативному лечению. У 6 (3,2%) пациентов пожилого возраста с тяжелой сопутствующей патологией выполнены реканализация опухоли и установка стента. У 146 (78,5%) больных консервативные мероприятия оказались неэффективными, в связи с чем они были прооперированы по жизненным показаниям; на первом этапе хирургического лечения выполнено кишечное стомирование.

У 98 (67,1%) из 146 оперированных вмешательство начиналось с диагностической лапароскопии, которая позволяла в большинстве случаев определить локализацию опухоли, уровень обтурационной непроходимости и наличие отдаленных метастазов. У 12 (8,2%) больных выявлен опухолевый процесс правой половины ободочной кишки, в связи с чем лапароскопическим доступом сформирована двуствольная энтеростома. В зависимости от уровня обструкции у 21 (14,4%) пациента выполнена лапароскопическая колостомия на уровне поперечно-ободочной кишки, у 26 (17,8%) — на уровне нисходящей ободочной кишки, у 29 (19,9%) — на уровне сигмовидной кишки.

У 4 (2,7%) больных оперативное вмешательство ограничилось диагностической лапароскопией в связи с тотальной генерализацией опухолевого процесса и многоуровневой тонко- и толстокишечной непроходимостью; данные пациенты были признаны инкурабельными. Конверсия с переходом к лапаротомии выполнена у 6 (4,1%) пациентов: у 4 (2,7%) — вследствие ограниченного внутрибрюшного пространства из-за выраженного расширения петель кишечника, у 2 (1,4%) — в связи с ятрогенным повреждением толстой кишки троакаром.

Выбор доступа для создания карбоксиперитонеума был индивидуальным; в большинстве случаев применялся доступ по Хассону, обеспечивающий безопасное вхождение в брюшную полость.

Двухэтапная тактика хирургического лечения ООКН с применением малоинвазивных технологий сопровождалась наиболее благоприятными послеоперационными результатами. После лапароскопической энтеро- или колостомии удавалось устранить кишечную непроходимость, стабилизировать состояние пациента, компенсировать сопутствующую патологию и провести полноценное дообследование, включая патоморфологическую верификацию опухоли. Это позволяло обоснованно планировать дальнейшую лечебную тактику, включая консультации химиотерапевтов и радиологов. Несостоятельность толстокишечного анастомоза после лапароскопически выполненных радикальных операций составила 12,7%, преимущественно при колоректальных анастомозах.

6 (3,2%) пациентов пожилого возраста с тяжелой сопутствующей патологией выполнены реканализация опухоли и эндоскопическое стентирование.

Выводы

1. Этапная тактика хирургического лечения острой обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза с применением на первом этапе лапароскопической колостомии была использована у 60,3% пациентов.

Это позволило выполнить окончательную верификацию диагноза, безопасно компенсировать водно-электролитные и нутритивные нарушения, скорректировать сопутствующие заболевания и спланировать дальнейшую лечебную тактику.

2. Лапароскопическая колостомия как первый этап хирургического лечения пациентов с острой обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза способствует снижению операционной травмы, уменьшению частоты послеоперационных осложнений, сокращению сроков подготовки больных к радикальным оперативным вмешательствам и улучшению качества жизни.

Использованные источники:

1. Савельев В.С., Покровский А.В., Кириенко А.И. Неотложная хирургия органов брюшной полости. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.
2. Шелыгин Ю.А., Фролов С.А., Ачкасов С.И. Колоректальный рак, осложнённый кишечной непроходимостью: современные подходы к лечению. *Колопроктология*. 2018;4(66):5–13.
3. Ермолов А.С., Абдуллаев А.Г., Лебедев Н.В. Острая кишечная непроходимость опухолевого генеза: диагностика и хирургическая тактика. *Хирургия*. 2016;(7):15–21.
4. Biondo S., Martí-Ragué J., Kreisler E. et al. Emergency operations for nondiverticular perforation of the left colon. *American Journal of Surgery*. 2002;183(3):256–260.

УДК 616.37-002.1-089

Райимов Г.Н., д.м.н.
зав. кафедрой Хирургии и клинических дисциплин
Отабоев И.Х.
Врач хирург
Хасанов Б.Т.
врач хирург
Ферганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В УСЛОВИЯХ УРГЕНТНОГО СТАЦИОНАРА

Аннотация. Цель исследования *— улучшить результаты хирургического лечения пациентов с острым панкреатитом в условиях ургентного стационара. Проанализированы результаты лечения 103 больных с применением тактики* step-up approach *и принципов* fast-track surgery (ERAS) *в сравнении со стандартными открытыми вмешательствами. Установлено, что использование этапной тактики и минимально инвазивных технологий сопровождается снижением частоты послеоперационных осложнений и летальности, а также сокращением сроков госпитализации.*

Ключевые слова: *острый панкреатит, концепция «fast-track surgery», тактика «step-up approach».*

Rayimov G.N. Doctor of Medical Sciences
Head of the Department of Surgery and Clinical Disciplines
Central Asian Medical University
Uzbekistan
Otaboev I.Kh.
surgeon
Khasanov B.T.
surgeon
Fergana Branch of the Republican Research Center of Emergency Medical Care
Uzbekistan

IMPROVEMENT OF SURGICAL STRATEGY IN ACUTE PANCREATITIS IN AN EMERGENCY HOSPITAL SETTING

Abstract. Objective: *to improve surgical outcomes in patients with acute pancreatitis treated in an emergency hospital. The treatment results of 103 patients were analyzed, comparing the* step-up approach *combined with* fast-track surgery

(ERAS) *principles with conventional open surgical management. The staged minimally invasive strategy was associated with a lower rate of postoperative complications and mortality, as well as a reduced length of hospital stay.*

***Key words**: acute pancreatitis, fast-track surgery concept, step-up approach tactics.*

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения пациентов с ОП.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты оперативного лечения 103 больных с ОП, находившихся на лечении в отделении 1-Экстренной абдоминальной хирургии с 2020 по 2025 гг., из них женщин — 42 (41%), мужчин — 61 (59%) в возрасте от 22 до 69 лет. Всем пациентам выполнялись общеклинические исследования крови и мочи, биохимические исследования крови, оценка показателей коагуляционной системы крови и маркеров эндотоксикоза; инструментальные исследования: ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (ОБП), обзорная рентгенография органов грудной клетки и ОБП, эзофагогастродуоденоскопия, мультиспиральная компьютерная томография, бактериологическое исследование выпота из брюшной полости (БП).

Все пациенты были распределены на две группы: основную (56 пациентов) и группу сравнения (47 пациентов). Основную группу составили пациенты, у которых применялась тактика «step-up approach» с проведением соответствующего консервативного лечения и минимально инвазивного ОВ (видеолапароскопического), а также внедрены принципы концепции ERAS (2018–2020 гг.). Группу сравнения составили пациенты (2020–2025 гг.), у которых в процессе лечения еще не применялись принципы ERAS и в качестве стандартного хирургического лечения преимущественно использовался открытый метод с выполнением лапаротомии или минилапаротомии.

Результаты исследования и их обсуждение. Основной задачей ОВ являлась своевременная эвакуация экссудата из БП и забрюшинного пространства (в ситуации, когда выпот уже распространялся в забрюшинной клетчатке, которая, в свою очередь, в 84–97% случаев может подвергаться агрессивному воздействию ферментов и впоследствии становиться субстратом для формирования гнойно-некротических осложнений) в период ферментной токсемии либо удаление некротически измененных участков ПЖ с минимальным риском для жизни пациента.

Среди пациентов основной группы у 30 (54%) были выполнены видеолапароскопия (ВЛС), санация и дренирование сальниковой сумки (СС) и БП, еще в 4 (7%) случаях данное вмешательство было дополнено люмбоскопией и дренированием забрюшинного пространства. У 7 (12,5%) больных выполнялись лапароскопическая холецистэктомия, санация и дренирование БП и СС, при этом у 3 из них операция была завершена наружным дренированием холедоха. У 7 (12,5%) пациентов объем

вмешательства включал ВЛС, вскрытие, санацию и дренирование парапанкреатических жидкостных скоплений, дренирование БП. В 4 (7%) случаях выполнялись ВЛС, холецистостомия, санация и дренирование СС и БП. У 3 (5%) больных выполнялись локальная люмботомия слева, санация и дренирование забрюшинного пространства. У 1 (2%) пациента была выполнена диагностическая ВЛС, а затем в связи с невозможностью проведения адекватной ревизии — минилапаротомия, панкреатонекрсеквестрэктомия, санация и дренирование СС и БП.

В группе сравнения в качестве стандартного хирургического лечения преимущественно использовался открытый метод. У 29 (62%) пациентов объем вмешательства включал лапаротомию, панкреатонекрсеквестрэктомию, оментобурсостомию, трансназальную интубацию тонкой кишки, санацию и дренирование БП; у 1 пациента он был дополнен наружным дренированием холедоха, еще у 4 — оментобурсостомией по VAC-методике. У 18 (38%) пациентов применялись пункционно-дренирующие ОВ под УЗИ-навигацией.

В основной группе на протяжении всего периода лечения персоналом клиники применялись принципы концепции ERAS. Мультимодальная реабилитация с акцентом на предоперационное информирование пациента, снижение ответной реакции на ОВ, оптимизированное купирование болевого синдрома путем пролонгации эпидуральной анестезии, ранняя мобилизация и начало питания позволили снизить частоту осложнений, сократить сроки пребывания в отделении и, соответственно, стоимость лечения. Пероральный прием прозрачных жидкостей был возможен в первые или вторые сутки после операции. Средняя продолжительность лечения пациента в хирургическом отделении составила 14,6 койко-дня.

Лечебная программа пациентов группы сравнения, лечившихся в 2015–2017 гг., не включала принципы «fast-track surgery»; кроме того, следует учитывать значительную операционную травму и тяжесть состояния после лапаротомных вмешательств. Средняя продолжительность лечения такого пациента в хирургическом отделении составила 20,4 койко-дня.

В послеоперационном периоде среди пациентов основной группы у 6 (10,71%) развились следующие осложнения: спаечная кишечная непроходимость (1), забрюшинная флегмона (1), вправимая послеоперационная вентральная грыжа (1), плеврит (2), синдром полиорганной недостаточности (СПОН) (1), сепсис (1). У 14 (29,79%) больных группы контроля наблюдались следующие осложнения: формирование наружного панкреатического свища (2), аррозивное кровотечение (1), забрюшинная флегмона (1), левосторонняя плевропневмония (4), сепсис (1), развитие СПОН (5). От перечисленных выше осложнений умерли 3 (5,36%) пациента основной группы и 7 (14,9%) — группы сравнения. Причинами смерти среди больных основной группы стали СПОН и сепсис, в группе сравнения — аррозивное кровотечение, СПОН и сепсис соответственно.

Выводы. Таким образом, у пациентов основной группы, при лечении которых применялись принципы «fast-track surgery» в сочетании с тактикой «step-up approach», отмечена более низкая частота послеоперационных осложнений, соответственно снижение летальности при данной патологии и уменьшение продолжительности пребывания в хирургическом отделении, что отражает экономическую целесообразность предлагаемого комплекса мероприятий. В отличие от больных группы сравнения, у которых отмечалась более высокая частота послеоперационных осложнений, более высокий показатель летальности и большая средняя продолжительность пребывания пациентов в хирургическом отделении.

Использованные источники:

1. Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневич С.З. Острый панкреатит: современные аспекты диагностики и лечения. *Хирургия*. 2012;(1):4–10.
2. Шалимов А.А., Грубник В.В. **Острый панкреатит**. Киев: Здоров’я; 2007.
3. Banks P.A., Freeman M.L. Practice guidelines in acute pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2006;101(10):2379–2400.
4. Rayimov, G. N., Kholmukhamedov, Z., Tillaboldiev, A. R., Dekhkonov, S. S., & Kosimov, S. K. (2023). Results of surgical treatment of destructive pancreatitis. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 65, p. 05036). EDP Sciences.

Рустамов А.А.
самостоятельный соискатель
кафедра внутренних болезней №1
Жураев Ш.А.
старший преподователь
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Хомидова М.Я.
клинический ординатор 1 курса
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет, город Самарканд, Узбекистан

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ ТИПА В КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПОСТМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: *Лекарственная терапия сопряжена с риском нежелательных лекарственных реакций (НЛР), которые представляют собой глобальную медико-социальную и экономическую проблему. Целью исследования явилось анализ распространенности и характеристик НЛР в клинической практике. С этой целью проведен ретроспективный анализ 25678 случаев госпитализации за 2020-2025 гг. в отделения аллергологии и пульмонологии областной клинической больницы. Выделена когорта из 129 пациентов (0,5% от всех госпитализаций) с зарегистрированными НЛР, из которых в 79 случаях (61,2%) причиной были лекарственные препараты. Средний возраст пациентов - 40,58 ± 1,31 года, с преобладанием женщин (67,7%). В результате исследования выявлено, совокупная частота НЛР составила 7,5%. Наиболее часто НЛР вызывали антибактериальные препараты (55,0%) и НПВП (18,2%). У пациентов, прошедших предварительный аудит фармакотерапии, зафиксированы статистически значимо более высокие показатели качества жизни (p=0,01), меньшая частота внеплановых обращений (p=0,01) и сниженные дополнительные расходы на лечение (p=0,01). Таким образом, внедрение принципов персонализированной медицины, включая коррекцию терапии на основе индивидуальных рисков, повышает экономическую эффективность и улучшает клинические исходы. Полученные данные обосновывают необходимость активного фармаконадзора и превентивного аудита назначаемой терапии.*

Rustamov A. A.
Independent candidate
Department of Internal Diseases No. 1
Zhuraev Sh.A.
senior lecturer
assistant professor
Department of Infectious Diseases
Homidova M. Y.
1st year clinical resident
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

MONITORING AND ANALYSIS OF TYPE B ADVERSE DRUG REACTIONS AS A KEY TASK OF POST-MARKETING DRUG SAFETY STUDIES

Abstract: *Drug therapy is associated with the risk of adverse drug reactions (ADR), which represent a global medical, social, and economic problem. The aim of the study was to analyze the prevalence and characteristics of ADR in clinical practice. For this purpose, a retrospective analysis of 25,678 hospitalization cases from 2020 to 2025 in the allergology and pulmonology departments of a regional clinical hospital was conducted. A cohort of 129 patients (0.5% of all hospitalizations) with registered ADR was identified, of which in 79 cases (61.2%) the cause was drugs. The average age of patients was 40.58 ± 1.31 years, with a predominance of women (67.7%). The study found that the cumulative incidence of ADR was 7.5%. ADR were most frequently caused by antibacterial drugs (55.0%) and NSAIDs (18.2%). Patients who underwent preliminary pharmacotherapy audit showed statistically significantly higher quality of life indicators (p=0.01), a lower frequency of unscheduled medical visits (p=0.01), and reduced additional treatment costs (p=0.01). Thus, the implementation of personalized medicine principles, including therapy adjustment based on individual risks, increases economic efficiency and improves clinical outcomes. The obtained data justify the need for active pharmacovigilance and preventive audit of prescribed therapy.*

Актуальность. Основным методом лечения большинства заболеваний является лекарственная терапия. При этом, несмотря на активное развитие фармакологии, применение лекарственных средств всегда сопряжено с риском развития тех или иных нежелательных лекарственных реакций. Аллергические заболевания в последние десятилетия приобрели масштаб глобальной медико-социальной проблемы, что связано как с их широкой распространённостью, так и с тенденцией к устойчивому росту числа случаев [1,2]. Ежегодно в мире регистрируется более 2 млн. серьёзных нежелательных

лекарственных реакций и около 250 тыс. их смертельных исходов. Помимо медико-социального аспекта нежелательных лекарственных реакций имеют высокую экономическую значимость, обусловливая высокие дополнительные затраты бюджета здравоохранения во всём мире [3]. В связи с этим, необходимы активные действия по разработке новых подходов к предупреждению и раннему выявлению нежелательных лекарственных реакций [4].

Проблема НЛР выходит далеко за рамки чисто медицинских последствий. Их медико-социальное бремя колоссально:

- **Клинический аспект:** НЛР могут нивелировать терапевтический эффект основного лечения, приводить к развитию новых патологических состояний, удлинять сроки госпитализации, осложнять диагностику и требовать ресурсоемкой дополнительной терапии.
- **Экономический аспект:** Прямые и косвенные затраты, связанные с НЛР, создают значительную нагрузку на бюджеты систем здравоохранения по всему миру. К ним относятся расходы на лечение самих реакций, продление госпитального этапа, оплату нетрудоспособности, судебные издержки и компенсации. По некоторым оценкам, стоимость ведения пациентов с НЛР может превышать стоимость их первоначальной терапии.
- **Качество жизни:** НЛР, особенно хронические (например, поражения кожи, органов), серьезно снижают физическое и психоэмоциональное качество жизни пациентов, формируя фармакофобию и нарушая приверженность к необходимому лечению [7, 8].

Сложившаяся ситуация усугубляется рядом современных вызовов: появлением новых биологических и таргетных препаратов с неизученным полностью профилем безопасности, свободным доступом к безрецептурным средствам, самолечением населения, а также сложностями в прогнозировании индивидуальной реакции на лекарство.

Таким образом, существующие пассивные системы фармаконадзора, основанные на спонтанных сообщениях, оказываются недостаточными для эффективного противодействия этой многогранной проблеме. Назрела острая необходимость в активных, превентивных стратегиях. Это требует разработки и внедрения новых протоколов раннего выявления пациентов групп риска, внедрения методов фармакогенетического тестирования для персонализации терапии, совершенствования алгоритмов фармакотерапевтического аудита как на стационарном, так и на амбулаторном этапах, а также проведения комплексных фармакоэкономических исследований для обоснования затрат на такие профилактические меры [5]. Данное исследование, направленное на анализ структуры, распространенности и факторов риска НЛР в реальной клинической практике, является непосредственным ответом на этот вызов и представляет собой необходимый шаг к формированию научно обоснованной системы управления лекарственной безопасностью [6].

Цель исследования: Анализ распространённости нежелательных лекарственных реакций

Материалы и методы исследования: В связи с этим был проведён ретроспективный анализ случаев нежелательных лекарственных реакций у пациентов, проходивших лечение в отделениях аллергологии и пульмонологии областной клинической больницы в период с 2020 по 2025 годы. Анализ медицинской документации показал, что из 25678 случаев госпитализации, зарегистрированных за пятилетний период (2020-2025 гг.), доля аллергических реакций составила 0,5% (всего 129 пациентов). Изучение 129 историй болезни пациентов с нежелательных побочных реакций показало, что в 79 случаях (61,2%) причиной развития реакции стали лекарственные препараты. Возрастной диапазон обследованных пациентов варьировал от 18 до 77 лет, средний возраст составил 40,58 ± 1,31 года. Гендерное распределение оказалось неравномерным: женщин - 88 человек (67,7%), мужчин - 41 (32,3%).

Распределение основных фармакологических групп, вызвавших нежелательные лекарственные реакции

Таблица 1.

Фармакологическая группа	Конкретные препараты / подгруппы (примеры)	Доля в общем числе зарегистрированных НЛР, %
Антибактериальные препараты	Аминопенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны	55,0
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)	Диклофенак, мелоксикам, нимесулид и др.	18,2
Глюкокортикостероиды (ГКС)	Метилпреднизолон, преднизолон	3,7
Препараты эритропоэтина	Эпоэтин альфа (эральфон)	2,6
Анальгетики ненаркотические	Ревалгин, Темпалгин, Баралгин	1,8
Метаболические средства	Кокарбоксилаза, таурин, никотиновая кислота	1,8
Противоопухолевые препараты	Метотрексат, цитарабин, циклофосфан	1,8
Местные анестетики	Лидокаин, новокаин, ультракаин	1,3
Наркотические анальгетики	Промедол, налбуфин	1,3
Спазмолитики	Папаверин, дротаверин	1,3
Прочие группы*	Гипотензивные средства (БКК, иАПФ), противовоспалительные (инфликсимаб, сульфасалазин), гемореологические (пентоксифиллин), токолитики	по 0,8 (каждая группа)

	(гинипрал), препараты магния (магния сульфат), энергометаболические (милдронат), гипогликемические (глибенкламид, метформин), корректоры метаболизма (тиоктовая кислота), антитиреоидные (мерказолил)	

Примечание:

*БКК - блокаторы кальциевых каналов; иАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

*В категорию "Прочие группы" объединены фармакологические группы, каждая из которых в отдельности составила менее 1% от общего числа НЛР, что демонстрирует широкий спектр препаратов, способных вызывать побочные эффекты.

Редко возникающие нежелательные лекарственные реакции с частотой по 0,5% были зафиксированы при приёме фенобарбитала (противоэпилептическое средство) и сорбифер дурулес (препарат железа). Единичные случаи нежелательных лекарственных реакций (по 0,3%) наблюдались на фоне использования карведилола, реамберина, амиодарона, ацетилцистеина, ронбетала, баклофена, препарата терафлю от гриппа и простуды, арбидола, нормального иммуноглобулина человека, а также комбинации карбидопы с леводопой (таблица 1).

В зависимости от выявленных эффектов проводились дополнительные диагностические мероприятия, осуществлялась оценка по специализированным шкалам (SCORE, STOPP/START и др.), а также при необходимости - корректировка проводимой фармакотерапии. Анализ включал фармакоэкономическую оценку (учёт прямых затрат на лечение в течение 12 месяцев с расчётом стоимости визита к врачу общей практики и дополнительных расходов, связанных с побочными эффектами медикаментозной терапии), а также психометрическую оценку качества жизни с использованием опросника SF-36. Статистическая обработка данных проводилась с применением программ Libre Office Calc и IBM SPSS Statistics v.26. Различия считались значимыми при уровне $p<0,05$. Совокупная частота возникновения нежелательных лекарственных реакций составила 7,5%. При этом между группами анкетированных и не анкетированных пациентов выявлены статистически значимые различия по частоте нежелательных лекарственных реакций (4,5% и 8,2% соответственно). Среди пациентов, заполнивших анкеты, не было зафиксировано ни одного случая нежелательных лекарственных реакций с угрозой жизни. У тех больных, в отношении которых предварительно проводился аудит предполагаемой фармакотерапии с последующей её коррекцией, наблюдались достоверно более высокие показатели по шкале SF-36 ($\rho=0,463$; $p=0,01$ - физическое здоровье и $\rho=0,475$; $p=0,01$ - психоэмоциональное состояние), а также реже отмечались внеплановые обращения за медицинской помощью ($p=0,01$) и сниженные дополнительные расходы на лечение ($\rho=0,312$; $p=0,01$).

Выводы: Результаты исследования демонстрируют, что принципы персонализированной медицины, включая коррекцию лечения с учётом индивидуальных рисков (например, отказ от антибиотиков у аллергиков), напрямую способствуют экономической эффективности и улучшению клинических исходов в амбулаторном звене. Полученные данные представляют практический интерес для клиницистов и формируют научный задел для проведения дальнейших фармакоэкономических анализов в контексте фармаконадзора.

Использованные источники:

1. Рустамов А.А. «Значение аллергических факторов в развитии инфекционных заболеваний у детей Международная научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания: проблемы, достижения и инновации» 27-28 сентября 2024 года. Сборник тезисов, стр. 103
2. Рустамов А.А. “Генетические факторы в развитии аллергических заболеваний при постковидном синдроме». Международная научно-практическая конференция: «Современные аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций». 4-5 апрель 2024 года. Сборник тезисов С- 57
3. Зиядуллаев Ш.Х., Рустамов А.А. “Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний пациентов после пандемии COVID-19” Международная научно-практическая конференция: «инфекционные болезни и антимикробные средства» 19 -20 октября 2023 года. С-102
4. Зиядуллаев Ш. Х., Рустамов А.А., Восеева Д.Х. «Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний у пациентов после COVID-19». Проблемы биологии и медицины. Международный научный журнал, №3.1 (145), 2023. С. 116
5. СХ Вафокулов, ША Рустамова, НХ Вафокулова «Влияние способа родоразрешения на кишечный микробиоценоз новорождённых». Проблемы биологии и медицины. Международный научный журнал, №3.1 (145), 2023. - С. 42-45.
6. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.
7. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей, родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 90-92.
8. Zhuraev Shavkat Abdukhuhidovich, YN Anvarovna, SA Rustamova, US Mukhtarovich, IS Buribaevna. Журнал «European Journal of Molecular and Clinical Medicine”. Том 7. Номер 3. 2020. Страницы 2716-2721

Рустамов А.А.
самостоятельный соискатель
кафедра внутренних болезней №1
Жураев Ш.А.
старший преподователь
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Маллаев С.О.
клинический ординатор 1 курса
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет
город Самарканд, Узбекистан

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

Резюме: *несмотря на доминирующую роль лекарственной терапии в современной медицине и постоянный прогресс фармакологии, применение любых фармакологических средств неизбежно сопряжено с риском развития нежелательных реакций (НЛР). Данная проблема приобретает особую актуальность на фоне роста аллергических заболеваний, которые в последние десятилетия стали глобальной медико-социальной проблемой вследствие их высокой распространенности и неуклонной тенденции к росту. Масштаб последствий НЛР является значительным: ежегодно в мире фиксируется более 2 миллионов случаев серьезных реакций, приводящих приблизительно к 250 тысячам летальных исходов. Помимо прямого ущерба для здоровья, НЛР представляют собой серьезную экономическую проблему, обусловливая существенные дополнительные расходы для систем здравоохранения во всем мире. Таким образом, совокупная медико-социальная и экономическая значимость НЛР диктует настоятельную необходимость разработки и внедрения новых эффективных подходов к их профилактике и раннему выявлению.*

Ключевые слова: *COVID-19; SARS-CoV-2; гены HLA; полиорганная недостаточность.*

Rustamov A.A.
independent applicant
Department of Internal Diseases No. 1,
Juraev Sh. A.
senior lecturer
assistant
Department of Infectious Diseases
Mallayev S. O.
1st year clinical resident
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand city, Uzbekistan

THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN THE FORMATION OF ALLERGIC DISEASES IN THE POST-COVID PERIOD

Resume: *Despite the dominant role of drug therapy in modern medicine and the continuous progress in pharmacology, the use of any pharmacological agents inevitably carries the risk of adverse drug reactions (ADRs). This problem is becoming particularly relevant against the backdrop of the increasing prevalence of allergic diseases, which have become a global medical and social issue in recent decades due to their high incidence and steady upward trend. The scale of ADR consequences is significant: more than 2 million cases of serious reactions are recorded annually worldwide, leading to approximately 250,000 fatalities. Beyond the direct harm to health, ADRs represent a serious economic problem, causing substantial additional costs for healthcare systems around the world. Thus, the combined medical, social, and economic significance of ADRs dictates an urgent need for the development and implementation of new effective approaches to their prevention and early detection.*

Keywords: *COVID-19; SARS-CoV-2; HLA genes; multiorgan failure.*

Введение: Пандемия COVID-19, охватившая миллионы людей по всему миру, привела к появлению данных о возникновении новых или обострении существующих аллергических заболеваний у пациентов, выздоровевших после COVID-19.

Как известно, гены главного комплекса гистосовместимости - HLA (Human Leukocyte Antigen), также обозначаемые как MHC (Major Histocompatibility Complex), располагаются на коротком плече шестой хромосомы и кодируют молекулы HLA, экспрессируемые на поверхности клеток [1,4]. Система HLA считается самой полиморфной среди всех известных у человека: в настоящее время описано более 9000 аллельных вариантов [2,3]. Своё название - «антигены человеческих лейкоцитов» - система получила в связи с тем, что впервые эти молекулы были идентифицированы при помощи аллоантител к лейкоцитам [3]. Классические

гены HLA кодируют α-цепи молекул MHC I класса - HLA-A, HLA-B и HLA-C. В каждой из этих молекул отдельные домены (α1, α2, α3) кодируются различными экзонами. Общая цепь молекул MHC I класса - β2-микроглобулин - кодируется не внутри комплекса HLA, а отдельным геном, локализованным на 15-й хромосоме [5,6]. Неклассические HLA-гены отличаются от классической низкой степени полиморфизма и более ограниченной экспрессией в тканях [5]. Во II класс HLA входят семейства генов HLA-DR, HLA-DP и HLA-DQ, кодирующие одноимённые молекулы [7, 8]. В частности, семейство DR включает DRA - ген, кодирующий α-цепь, и до девяти DRB-генов (от DRB1 до DRB9), отвечающих за синтез β-цепей. Среди них экспрессируются HLA-DRB1, DRB3, DRB4 и DRB5 [6]. Аналогично, HLA-DPA1 и HLA-DQA1 кодируют α-цепи молекул HLA-DP и HLA-DQ, тогда как HLA-DPB1 и HLA-DQB1 отвечают за кодирование их β-цепей [10]. Также выделяют неклассические гены II класса - HLA-DM, HLA-DO и ряд других, участвующих в регуляции антиген-презентирующих функций [11]. III класс генов главного комплекса гистосовместимости представлен более чем 50 генами, в том числе кодирующими белки системы комплемента, фермент 21-гидроксилазу и факторы некроза опухоли. При этом они не кодируют молекулы HLA [7, 8]. Наследование HLA-гаплотипов подчиняется законам Менделя. Однако для данной системы характерно явление неравновесного сцепления (linkage disequilibrium) - это устойчивые комбинации аллелей в разных локусах, которые наследуются совместно в виде гаплотипных блоков [3,9]. Подобное сцепление обуславливает преобладание определённых гаплотипов в отдельных этнических группах. Например, у представителей европеоидной расы одним из наиболее часто встречающихся гаплотипов (в 5% случаев) является комбинация HLA-A1, HLA-B8 и HLA-DR17 [10]. Молекулы HLA I класса экспрессируются на поверхности практически всех клеток организма, содержащих ядро, тогда как экспрессия HLA II класса ограничена B-лимфоцитами, антигенпрезентирующими клетками и активированными T-лимфоцитами. Основная функция HLA I и II классов заключается в представлении антигенных пептидов, прошедших предварительную обработку: молекулы HLA I класса презентируют эндогенные пептиды, тогда как HLA II класса - экзогенные [11]. При этом HLA I класс взаимодействует с CD8+ цитотоксическими T-лимфоцитами (см. рис. 3), а HLA II класс - с CD4+ T-хелперами [5]. Следовательно, система HLA представляет собой фундаментальный молекулярный механизм иммунного распознавания, и её нормальное функционирование является обязательным условием для эффективной работы иммунной системы в целом.

Таким образом, гены главного комплекса гистосовместимости (HLA) кодируют ключевые молекулы для презентации антигена и являются критически важными для поддержания эффективного иммунного ответа.

Цель исследования: изучение роли генетических факторов в развитии аллергических заболеваний у пациентов, перенесших COVID-19.

Материалы и методы: Проведен ретроспективный обзор существующей научной литературы с применением аналитических и описательных методик. Патологическая активация иммунной системы у пациентов с генетической предрасположенностью (в том числе определяемой генами HLA) может приводить к формированию аутоиммунных реакций, обуславливать развитие, влиять на тяжесть и прогноз неаутоиммунных заболеваний. В частности, определенные аллели генов системы HLA увеличивают риск развития аутоиммунных эндокринопатий: сахарного диабета 1 типа (СД1) [6], болезни Грейвса [7], аутоиммунного тиреоидита, первичной надпочечниковой недостаточности [8], идиопатического гипопаратиреоза [9], лимфоцитарного гипофизита, в том числе в составе аутоиммунных полигландулярных синдромов. Кроме того, обнаружена ассоциация аллелей HLA с риском развития неэндокринных аутоиммунных заболеваний: анкилозирующего спондилоартрита [1], ревматоидного артрита (РА) [12], системной красной волчанки [10], целиакии, рассеянного склероза [9]. Более того, при СД1 [9] определенные аллели HLA увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а при РА - смерти от ССЗ. Также выявлена связь между гаплотипом HLA-DRB1*0101-DQA1*01-DQB1*05 и аллелем HLA-DRB1*0101 и острым инфарктом миокарда (вне зависимости от других факторов сердечно-сосудистого риска) [8]. Патологическая активация иммунной системы у пациентов с генетической предрасположенностью (в том числе определяемой генами HLA) может приводить к формированию аутоиммунных реакций, обуславливать развитие, влиять на тяжесть и прогноз неаутоиммунных заболеваний. В частности, определенные аллели генов системы HLA увеличивают риск развития аутоиммунных эндокринопатий: сахарно- го диабета 1 типа (СД1) [6], болезни Грейвса [11], аутоим- мунного тиреоидита [7], первичной надпочечниковой не- достаточности [8], идиопатического гипопаратиреоза [9], лимфоцитарного гипофизита [10], в том числе в составе аутоиммунных полигландулярных синдромов. Кроме того, обнаружена ассоциация аллелей HLA с риском развития неэндокринных аутоиммунных заболеваний: анкилозирующего спондилоартрита, ревматоидного артрита (РА) [12], системной красной волчанки, целиакии [1], рассеянного склероза [10]. Более того, при СД1 определенные аллели HLA увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а при РА - смерти от ССЗ. Также выявлена связь между гаплотипом HLA-DRB1*0101-DQA1*01-DQB1*05 и аллелем HLA-DRB1*0101 и острым инфарктом миокарда (вне зависимости от других факторов сердечно-сосудисто- го риска).

Таким образом, аллельный полиморфизм генов главного комплекса гистосовместимости (HLA) может служить генетическим фактором предрасположенности не только к аутоиммунным, но и к многочисленным неаутоиммунным патологиям. Доказательством этому служат установленные ассоциации определённых аллелей HLA с эндокринными нарушениями

(например, с сахарным диабетом 2 типа [8] и повышенным индексом массы тела [9]), а также с онкологическими заболеваниями, включая папиллярный рак щитовидной железы (аллель *HLA-DRB1*04), рак шейки матки и желудка [2]. Помимо этого, HLA-варианты могут влиять на течение и прогноз таких злокачественных новообразований, как рак лёгкого и меланома кожи [4].

Так, установлено, что предрасположенность к заражению вирусом гриппа H1N1 может быть связана с наличием таких аллелей, как HLA-A*11, HLA-B*35 и HLA-DRB1*10. При этом у носителей аллеля HLA-A*02:05 наблюдается сниженный риск сероконверсии при инфицировании вирусом иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1). Считается также, что различные генотипы HLA по-разному активируют Т-клеточные звенья противовирусной защиты, что в конечном итоге влияет на характер и выраженность клинических проявлений. Например, определённые HLA-аллели связаны с более тяжёлым течением вторичной формы вируса Денге у представителей тайской популяции.

В условиях продолжающейся пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 (COVID-19), особую значимость приобретает поиск генетических факторов, способных влиять на степень тяжести заболевания. Как известно, при COVID-19 может отмечаться бессимптомное носительство [8], а спектр клинических проявлений варьирует от легкого (приблизительно у 80% инфицированных) до тяжелого течения с развитием полиорганной недостаточности, вызванной гиперпродукцией цитокинов («цитокиновый шторм»). Пожилой возраст и сопутствующие заболевания, включая эндокринные [10], сердечно-сосудистые и легочные заболевания, ассоциированы с увеличением степени тяжести заболевания и смертности от COVID-19. Индивидуальные генетические вариации, влияющие на функционирование иммунной системы, могут помочь объяснить различный ответ на вирусную инфекцию в популяции. Кроме того, предполагается наличие связи между встречаемостью определенных аллелей в разных странах с напряженностью эпидемиологической ситуации в этих регионах.

Таким образом, выявление HLA-ассоциированных рисков развития тяжёлых форм COVID-19 открывает возможности для персонифицированной оценки прогноза и своевременного выделения групп пациентов, требующих особого внимания [7]. Не менее важной задачей является идентификация HLA-аллелей, определяющих формирование эффективного и длительного иммунного ответа на SARS-CoV-2 [5, 7].

Практическая значимость этих данных заключается в возможности их применения для:

1. разработки индивидуализированных алгоритмов терапии,
2. прогнозирования индивидуального ответа на вакцинацию,
3. рационального распределения кадровых ресурсов при организации помощи больным COVID-19 (например, для защиты медицинских работников с высоким генетическим риском) [6].

В связи с этим в научной литературе уже высказываются предложения о целесообразности рутинного HLA-типирования при диагностике COVID-19 и

о приоритетной вакцинации лиц с выявленными неблагоприятными генотипами [8].

Важно отметить, что в исследовании [11] фокус был сосредоточен на генах HLA I класса. Это обосновано их ключевой ролью в презентации эндогенных вирусных пептидов цитотоксическим $CD8^+$ Т-лимфоцитам, что является основным механизмом элиминации инфицированных клеток.

Учитывая всё вышеизложенное, представляется обоснованным проведение дополнительных исследований, направленных на выявление роли HLA II класса в иммунном ответе при COVID-19. Более того, с учётом значительного структурного сходства между SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1, представляется важным принимать во внимание и данные по HLA-типированию, полученные на когортах пациентов, перенёсших инфекцию, вызванную SARS-CoV-1. С целью выявления HLA-аллелей, ассоциированных с повышенной восприимчивостью к данному заболеванию, было проведено множество исследований. У ряда пациентов аллергические расстройства могут возникать или усугубляться вследствие нарушений иммунной системы, характерных для COVID-19, в частности из-за дисбаланса иммунного ответа и усиленной продукции цитокинов[7,15]. Было выявлено несколько генов, ответственных за модуляцию иммунных процессов, барьерные функции тканей и воспалительные реакции, которые могут повышать риск развития аллергических заболеваний. В этих исследованиях основное внимание уделялось генетическим вариациям, связанным с нарушением иммунологической регуляции и воспалением. Полиморфизмы в генах, кодирующих ключевые иммунные белки - цитокины, интерлейкины, Toll-подобные рецепторы - ассоциируются с чувствительностью как к COVID-19, так и к аллергическим реакциям [11].

Аллергены, токсические вещества и инфекции являются примерами внешних стимулов, способных изменять экспрессию генов и иммунные ответы организма. Вирус COVID-19 и вызванные им изменения в иммунной системе выступают дополнительным внешним фактором, взаимодействующим с генетическим фоном и повышающим вероятность возникновения аллергических заболеваний. Для изучения генетических механизмов аллергических расстройств на фоне COVID-19 необходимы исследования [13].

Изучение генетических детерминант риска возникновения аллергопатологии в постковидном периоде способно углубить понимание механизмов взаимодействия между наследственными факторами и дисрегуляцией иммунного ответа. Наблюдаемая корреляция между отягощенным соматическим статусом (в частности, эндокринными заболеваниями) и высокой частотой тяжёлых пневмоний при COVID-19 позволяет выдвинуть гипотезу о существовании общих генетических маркеров, определяющих восприимчивость к осложнённому течению инфекции. Парадокс, заключающийся в отсутствии тяжелых проявлений у

части пациентов с аналогичной сопутствующей патологией, может быть объяснён носительством протективных аллелей HLA [3,13,15].

Заключение: полученные данные обосновывают необходимость целенаправленных исследований по комплексному анализу спектра HLA-генотипов. Целью таких исследований должна стать идентификация как ассоциированных с риском, так и потенциально защитных аллельных вариантов в контексте инфекции SARS-CoV-2. При этом критически важным является учёт фона сопутствующих заболеваний и этнической принадлежности пациентов для получения репрезентативных и клинически значимых результатов.

Использованные источники:

1. Анваров Ж. А., Рустамова Ш. А. Болаларда ўткир ичак инфекциялари ташхисотига замонавий ёндашув// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2022. - №. 5.- С. 250-255.
2. Зиядуллаев Ш. Х., Рустамов А.А. “Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний пациентов после пандемии COVID-19” Международная научно-практическая конференция: «инфекционные болезни и антимикробные средства» 19 -20 октября 2023 года. С-102
3. Зиядуллаев Ш. Х., Рустамов А.А., Восеева Д.Х. «Генетические факторы риска развития аллергических заболеваний у пациентов после COVID-19». Проблемы биологии и медицины. Международный научный журнал, №3.1 (145), 2023. С. 116
4. САМИБАЕВА У. Х. и др. COVID-19 КАСАЛЛИГИ ТАШХИСОТИДА КОМПЬЮТЕР ТОМОГРАФИЯСИ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ //T [a_XW [i [S US S_S^[ùe YfcS^. – 2022. – С. 250.
5. Karamatullaeva Z. E., Odilova G. M. INFEKSION MONONUKLEOZ VA COVID-19 INFEKTSIYALARINING KLINIK XUSUSIYATLARI: QIYOSIY TAHLIL //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 21-25.
6. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕНИНГИТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 179-180.
7. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 86-89.
8. Рустамов А.А. «Значение аллергических факторов в развитии инфекционных заболеваний у детей Международная научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания: проблемы, достижения и инновации» 27-28 сентября 2024 года. Сборник тезисов, стр. 103
9. Рустамов А.А. “Генетические факторы в развитии аллергических заболеваний при постковидном синдроме». Международная научно-практическая конференция: «Современные аспекты паразитологии и актуальные проблемы кишечных инфекций». 4-5 апрель 2024 года. Сборник

тезисов С- 57
10. СХ Вафокулов, ША Рустамова, НХ Вафокулова «Влияние способа родоразрешения на кишечный микробиоценоз новорождённых». Проблемы биологии и медицины. Международный научный журнал, №3.1 (145), 2023. - С. 42-45.
11. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области». Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси. № 5 2021, С. 148-152.
12. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.
13. Рустамова Ш.А. «Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида)». Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.
14. Рустамова Ш. А., Кахрамонова А. К. Последствия у детей родившихся путем операции кесарево сечения (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 90-92.
15. Zhuraev Shavkat Abdukhuhidovich, YN Anvarovna, SA Rustamova, US Mukhtarovich, IS Buribaevna. Журнал «European Journal of Molecular and Clinical Medicine". Том 7. Номер 3. 2020. Страницы 2716-2721

УДК 616.34-008.87-053.31

Рустамова Ш. А., к.м.н.
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Зойиров Ф.Х.
клинический ординатор 1 курса
кафедра инфекционных болезней
Рашидов Х.Н.
клинический ординатор 1 курса
кафедра инфекционных болезней
Самаркандский государственный медицинский университет,
Республика Узбекистан, г. Самарканд

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2014–2024 ГГ.)

Резюме: *целью статьи является оценить территориальные, сезонные и возрастные особенности эпидемического процесса острых кишечных инфекций (ОКИ) в Самаркандской области для разработки профилактических мероприятий. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ ОКИ, зарегистрированных в Самаркандской области за период 2014-2024 гг. Использованы данные официальной статистики Самаркандского областного управления здравоохранения и Центра санитарно-эпидемиологического благополучия. Рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели, проведен сравнительный анализ.*

Ключевые слова: *острые кишечные инфекции, эпидемиологический надзор, Самаркандский область, ретроспективный анализ, профилактика.*

Rustamova Sh.A.,PhD
assistant professor
Department of Infectious Diseases
Zoirov F. Kh.
1st year Clinical Resident
Department of Infectious Diseases
Rashidov Kh. N.
1st year Clinical Resident
Department of Infectious Diseases
Samarkand State Medical University
Samarkand, Republic of Uzbekistan

ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS BY DISTRICTS OF THE SAMARKAND REGION (2014-2024)

Summary: *To assess the territorial, seasonal, and age-related features of the epidemic process of acute intestinal infections (AII) in the Samarkand region for the development of preventive measures. A retrospective epidemiological analysis of AII cases registered in the Samarkand region for the period 2014-2024 was conducted. Data from the official statistics of the Samarkand Regional Health Department and the Center for Sanitary and Epidemiological Well-being were used. Intensive and extensive indicators were calculated, and a comparative analysis was performed.*

Keywords: *acute intestinal infections, epidemiological surveillance, Samarkand region, retrospective analysis, prevention.*

Актуальность. Известно, что острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают ведущее место среди заболеваний детей. В частности, природно-климатические особенности Узбекистана способствуют широкому распространению кишечных инфекций, особенно среди детей до 3 лет [1]. Хотя многие исследователи считают, что уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями можно контролировать с помощью санитарно-гигиенических мероприятий, снижающих факторы риска, это заболевание не имеет тенденции к снижению. Несмотря на постепенную стабилизацию гигиенического образа жизни населения, тенденции к снижению не наблюдается[5, 6].

В последние годы многие ученые во всем мире бьют тревогу об изменении климата и его негативных последствиях для организма человека. Прямая зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды освещена во многих публикациях и научных изданиях. Согласно наблюдениям исследователей, за последние 100 лет средняя температура климата повысилась на 0,74 °C. Изменение климата также влияет на развитие многих инфекционных и паразитарных заболеваний [2, 8]. В странах Центральной Азии, в том числе и в Республике Узбекистан, в разные сезоны года (зима, весна, лето, осень) наблюдаются случаи заболеваемости различными инфекционными болезнями среди населения. Например, если осенью и зимой чаще наблюдаются острые респираторные заболевания, то есть болезни, передающиеся воздушно-капельным путем, то весной и летом отмечается рост острых инфекционных кишечных заболеваний [7].

Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения в Узбекистане и занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционной заболеваемости. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, кишечные инфекции являются одной из основных причин детской смертности в развивающихся странах, что подчеркивает необходимость постоянного эпидемиологического мониторинга и анализа. Особый интерес для изучения пространственно-временных закономерностей распространения ОКИ представляет Самаркандская область, одна из самых густонаселенных областей Узбекистана, между районами которой существуют четкие различия в климатических, социально-экономических и инфраструктурных аспектах [3, 4].

Цель исследования: Провести анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями в разрезе районов Самаркандской области.

Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективное эпидемиологическое исследование на основе данных о детях, зарегистрированных с диагнозом «Острая кишечная инфекция» за 2014-2024 годы.

Методы анализа:

1. Расчет показателей заболеваемости на 100 тысяч населения.
2. Картографический метод (создание эпидемиологических карт).
3. Статистический анализ (коэффициент вариации, критерий χ^2).
4. Анализ временных рядов.

Результаты были подвергнуты углубленному ретроспективному статистическому анализу.

Обсуждение исследования: Результаты исследования основаны на данных наблюдения, проведенного среди детей в возрасте до 14 лет, госпитализированных в Самаркандскую областную клиническую больницу инфекционных болезней (СОКБИБ). Под наблюдение попали пациенты, обратившиеся из города Самарканда и районов Самаркандской области (таблица №1). Анализ мест проживания пациентов выявил следующее. Основную часть составили пациенты из районов области (59,5%) и города (40,5%).**Распределение детей по возрасту**

Таблица№1

№	Возраст детей	%
1.	Дети до 1 года	42,9%
2.	Дети в возрасте 1-3 лет	44,1%
3.	Дети в возрасте 3-7 лет	8,8%
4.	Дети в возрасте 7-14 лет	4,2%
	ЖАМИ	100%

В таблице 2 представлено общее количество выявленных случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями по месяцам за период с 2014 по 2024 год.

Анализ заболеваемости ОКИ в Самаркандской областной инфекционной клинической больнице болезней за период 2014-2024 годы по месяцам года

Таблица№2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Январь	**50**	**46**	**69**	**106**	**81**	**116**	**153**	**207**	**99**	**95**	**89**
Февраль	**55**	**21**	**67**	**79**	**110**	**114**	**145**	**101**	**92**	**92**	**204**
Март	**54**	**101**	**77**	**119**	**152**	**122**	**154**	**121**	**133**	**132**	**208**
Апрель	**69**	**100**	**104**	**137**	**159**	**150**	**199**	**137**	**205**	**173**	**295**
Май	**113**	**112**	**176**	**234**	**238**	**246**	**227**	**267**	**444**	**302**	**212**
Июнь	**194**	**147**	**225**	**289**	**428**	**404**	**349**	**429**	**828**	**708**	**480**
Июль	**212**	**263**	**323**	**453**	**592**	**593**	**546**	**592**	**737**	**818**	**657**
Август	**230**	**371**	**485**	**632**	**693**	**775**	**1102**	**794**	**944**	**852**	**1042**
Сентябрь	**242**	**429**	**429**	**558**	**530**	**550**	**778**	**900**	**779**	**824**	**1 017**
Октябрь	**217**	**329**	**387**	**328**	**393**	**329**	**456**	**597**	**589**	**653**	**1 124**
Ноябрь	**133**	**144**	**243**	**290**	**217**	**212**	**280**	**211**	**219**	**260**	**945**
Декабрь	**98**	**112**	**116**	**157**	**157**	**120**	**209**	**80**	**154**	**139**	**339**
ИТОГО	**1667**	**2335**	**2701**	**3382**	**3750**	**3731**	**4598**	**4436**	**5223**	**5048**	**6612**

Из таблицы видно, что отмечается рост заболеваемости ОКИ, начиная с мая, с последующим снижением к ноябрю. Был проведён анализ случаев заболевания острыми кишечными инфекциями по месяцам года среди пациентов, находившихся под наблюдением, и они распределились в следующих процентных соотношениях (рисунок 1).




Рисунок № 1. Распределение заболеваемости ОКИ по месяцам года.

Наиболее выраженный рост заболеваемости зафиксирован с июля по сентябрь. В эти месяцы было госпитализировано 56,3% пациентов.

Были обработаны данные о температуре в Самаркандской области за период 2014-2024 годов по месяцам (январь-декабрь), изучены средние месячные температуры.

При изучении взаимосвязи между заболеваемостью детей ОКИ и температурой воздуха в годы исследования было отмечено, что с повышением среднемесячной температуры воздуха, начиная с мая, возрастает и число случаев ОКИ. При рассмотрении обращаемости пациентов в больницу по месяцам наблюдалась прямая корреляция между ростом температуры воздуха и увеличением числа больных (рисунок № 2).




Рисунок № 2. График режима температуры воздуха за период 2014-2024 гг.

На основе приведённых многолетних данных подтверждается наличие прямой корреляции между заболеваемостью детей острыми кишечными инфекциями и температурой воздуха в Самаркандской области. В заключение можно сказать, что рост показателя заболеваемости ОКИ наблюдается по месяцам года в июне, июле, августе и сентябре. Установлено, что в сентябре и октябре рост числа случаев заболевания происходит за счёт повторных обращений пациентов.

Распространенность заболевания ОКИ по районам Самаркандской области (средние показатели за 2014-2024 гг.).

Таблица№3

№	Самаркандская область (районы/город)	Население (тыс. чел.)	Выявленные случаи	Показатель на 100 000 населения
1	**г. Самарканд**	540,2	2 512	465,1
2	**г. Каттакурган**	298,7	1 260	421,7
3	**Пастдаргамский район**	215,4	859	398,5
4	**Акдарьинский район**	187,3	723	386,1
5	**Ургутский район**	268,9	1 012	376,3
6	**Самаркандский район**	162,8	605	371,6
7	**Булунгурский район**	103,5	374	361,4
8	**Джамбайский район**	138,2	491	355,3
9	**Пайарыкский район**	176,3	610	346,0
10	**Иштыханский район**	124,7	425	340,8
11	**Тайлакский район**	89,4	297	332,2
12	**Пахтачийский район**	95,6	314	328,5
13	**Кушрабатский район**	153,1	313	204,6
14	**Нурабадский район**	121,8	229	188,3
Жами	**3 175,9**	**10 024**	**315,2**	

В результате анализа между районами были выявлены статистически значимые различия ($p < 0,01$).

В Самарканде установлено, что наибольшая частота заболеваний наблюдается в летне-осенний сезон, причем самый высокий показатель зафиксирован в августе (22,4% от годового числа случаев). Выявлена прямая корреляционная связь между средней температурой воздуха и частотой возникновения ОКИ ($r=0,76$; $p<0,05$).

Гетерогенность распространения ОКИ по районам Самаркандской области соответствует концепции "зон риска", которая может быть объяснена следующим комплексом факторов:

1. **Высокая пространственная гетерогенность:** Заболеваемость ОКИ распределена по территории области крайне неравномерно. Выявлены статистически значимые различия между районами ($p<0,01$).

2. **Четкая сезонность:** Установлен выраженный летне-осенний подъем заболеваемости с пиком в августе месяце (22,4% от годового числа случаев).

3. **Корреляция с температурой:** Обнаружена прямая корреляционная связь между средней температурой воздуха и уровнем заболеваемости ОКИ ($r=0,76$; $p<0,05$).

Районы с высокой заболеваемостью

- Городские территории (Самарканд, Каттакурган) – высокая плотность населения, активная миграция, интенсивное использование централизованных систем водоснабжения.

• Аграрные районы (Пастдаргом, Акдарья) – сезонные сельскохозяйственные работы, особенности водопользования.

Районы с низкой заболеваемостью (Нурабад, Кошрабад) – преимущественно горная местность, децентрализованное водоснабжение, низкая плотность населения (таблица 3).

Высокая доля детей среди заболевших (62,7%), что соответствует мировым данным, объясняется анатомо-физиологическими особенностями, незрелостью иммунной системы и поведенческими факторами.

Результаты исследования выявили высокую гетерогенность распространения ОКИ по Самаркандской области и позволили определить устойчивые зоны риска. Полученные данные обосновывают необходимость дифференцированного подхода для профилактики заболеваемости ОКИ.

Выводы:

1. В Самаркандской области заболеваемость ОКИ распределена неравномерно по районам. Полученные данные обосновывают необходимость разработки дифференцированной (различной по районам) программы профилактики острых кишечных инфекций.

2. Анализ группы детей, заболевших ОКИ, показал, что дети в возрасте до 3 лет представляют собой группу высокого риска, что требует особого внимания при планировании профилактических мероприятий.

3. Тот факт, что заболеваемость ОКИ чаще встречается в летне-осенний сезон, указывает на необходимость усиления профилактических мер именно в этот период.

4. Согласно результатам анализа, наибольшее количество случаев ОКИ было выявлено в городе Самарканд и Каттакурганском районе. Эта ситуация может быть связана с плотностью населения и санитарно-гигиеническими факторами. В профилактике заболевания первостепенное значение имеют профилактические мероприятия и контроль качества питьевой воды.

Использованные источники:

1. Анваров Ж. А., Рустамова Ш. А. Болаларда ўткир ичак инфекциялари ташхисотига замонавий ёндашув// Инфекция, иммунитет и фармакология. - 2022. - №. 5.- С. 250-255.

2. Вафокулов С. Х., Рустамова Ш. А. ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ //Экономика и социум. - 2024. - №. 5-2 (120). - С. 930-935.

3. ГМ Одилова, ША Рустамова. Иммунологические реакции при острой бактериальной дизентерии. Материалы конференции Молодежь и медицинская наука в XXI веке. 2019 гг. Страницы 177-178

4. Одилова Г. М., Рустамова Ш. А., Муротова З. Т. Клинико-лабораторные особенности течения кишечных инфекций сальмонеллёзной этиологии у детей //Педиатр. - 2017. - Т. 8. - №. S.

5. Орзикулов А. О., Рустамова Ш. А., Караматуллаева З. Э. Неврологические изменения при паротитной инфекции у взрослых (на примере Самаркандской области) //Uzbek journal of case reports. - 2023. - Т. 3. - №. 3. - С. 86-89.

6. ША Рустамова, НХ Вафокулова Сравнительный анализ проблемы острой кишечной инфекции у детей раннего возраста по годам в Самаркандской области.- Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси, - 2021. – С. 148-152.
7. Рустамова Ш.А., Вафокулова Н.Х. «Самарқанд вилоятида эрта ёшдаги болаларда ўткир ичак инфекциялари муаммоларини йиллар кесимида солиштирма таҳлил қилиш». Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 2) 2021 год. С. 101-104.
8. Рустамова Ш.А. «Республикамизда болаларда ўткир юқумли ичак касалликларининг иқлимий ўзгаришлар билан боғлиқлигини таҳлил қилиш (Самарқанд вилояти миқёсида)». Биология ва тиббиет муаммолари илмий амалий журнал. №3 (128) 2021 С.102-107.

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1376-1383
UDK 616-006.04; 616-079.4

Сохибова З.Р.
доцент
кафедра ядерной медицины и медицинской радиологии
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино.
http://orcid.org/0009-0004-36117-4472
Жуманиёзова Д.Д.
магистрант
кафедра ядерной медицины и медицинской радиологии
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — СОНОЭЛАСТОГРАФИИ — В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

Резюме. *Опухоли яичников представляют собой одну из наиболее распространённых и клинически значимых гинекологических патологий, оказывающих существенное влияние на репродуктивное здоровье женщин. На ранних стадиях заболевания симптомы часто отсутствуют или выражены слабо, а морфологическая вариабельность образований затрудняет различение доброкачественных и злокачественных процессов. Ранняя диагностика и точная дифференциальная диагностика имеют решающее значение для улучшения исходов лечения. Традиционное В-режим УЗИ не всегда позволяет оценить плотность тканей, их упругость и внутреннюю структуру, что ограничивает точность диагностики и может приводить к ненужным инвазивным вмешательствам. В связи с этим растёт потребность в новых, высокоинформативных и неинвазивных методах диагностики. Соноэластография — современный метод ультразвуковой визуализации, позволяющий оценивать эластичность тканей в реальном времени — открывает новые возможности в диагностике опухолей яичников. Метод обеспечивает количественную и качественную оценку упругости и жесткости тканей, позволяет различать доброкачественные и злокачественные образования, выявлять скрытые структурные изменения, оценивать состояние капсулы и соотношение фиброзной ткани. Использование strain- и shear-wave эластографии, а также цветного картирования (elasto-mapping) повышает точность дифференциальной диагностики и способствует раннему выявлению злокачественных процессов. Соноэластография облегчает диагностический процесс, оптимизирует клиническое принятие решений, позволяет сохранять яичники у женщин репродуктивного возраста, снижает количество инвазивных процедур и дорогостоящих обследований, повышая безопасность пациента. Метод*

доказал свою высокую информативность и универсальность в клинической практике, способствуя сохранению репродуктивного здоровья и улучшению исходов лечения. Статья подробно анализирует диагностические возможности, преимущества, ограничения, клиническое применение и перспективы развития соноэластографии, а также рассматривает данные международных исследований и рекомендации, подчеркивая её практическую значимость для ранней диагностики, дифференциальной оценки и оптимизации лечебной тактики при опухолях яичников.

Ключевые слова: *соноэластография, ультразвук, опухоли яичников, злокачественность, дифференциальная диагностика, упругость тканей, ранняя диагностика, клиническое принятие решений, репродуктивное здоровье, неинвазивная диагностика, клиническая практика.*

Sokhibova Z.R.
associate professor
Department of Nuclear Medicine and Medical Radiology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino.
http://orcid.org/0009-0004-36117-4472
Jumaniyozova D.D.
master's student
Department of Nuclear Medicine and Medical Radiology
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

THE ROLE OF MODERN ULTRASOUND TECHNOLOGIES—SONOELASTOGRAPHY—IN THE DIAGNOSIS OF OVARIAN TUMORS

Abstract. *Ovarian tumors represent one of the most common and clinically significant gynecological pathologies, exerting a substantial impact on women's reproductive health. In the early stages of the disease, symptoms are often absent or only mildly expressed, while the morphological variability of lesions complicates the differentiation between benign and malignant processes. Early detection and accurate differential diagnosis are crucial for improving treatment outcomes. Conventional B-mode ultrasound does not always allow adequate assessment of tissue density, elasticity, and internal structure, which limits diagnostic accuracy and may lead to unnecessary invasive interventions.*

In this regard, there is a growing need for new, highly informative, and non-invasive diagnostic methods. Sonoelastography, a modern ultrasound imaging technique that enables real-time assessment of tissue elasticity, offers new opportunities in the diagnosis of ovarian tumors. The method provides both quantitative and qualitative evaluation of tissue stiffness and elasticity, facilitates differentiation between benign and malignant lesions, reveals subtle structural changes, and allows assessment of the tumor capsule and the proportion of fibrous tissue.

The use of strain and shear-wave elastography, as well as color mapping (elasto-mapping), increases the accuracy of differential diagnosis and contributes

to the early detection of malignant processes. Sonoelastography simplifies the diagnostic process, optimizes clinical decision-making, helps preserve the ovaries in women of reproductive age, reduces the number of invasive procedures and costly examinations, and enhances patient safety. The method has demonstrated high diagnostic value and versatility in clinical practice, contributing to the preservation of reproductive health and improved treatment outcomes.

This article provides a detailed analysis of the diagnostic capabilities, advantages, limitations, clinical applications, and future prospects of sonoelastography. It also reviews data from international studies and current recommendations, emphasizing its practical significance for early detection, differential assessment, and optimization of therapeutic strategies in ovarian tumors.

Keywords: *sonoelastography, ultrasound, ovarian tumors, malignancy, differential diagnosis, tissue elasticity, early diagnosis, clinical decision-making, reproductive health, non-invasive diagnostics, clinical practice.*

Актуальность. В последние годы проблема сохранения репродуктивного здоровья женщин рассматривается как одно из наиболее важных направлений современной медицины. Среди этих проблем особое место занимают опухоли яичников, отличающиеся высокой распространённостью, латентным клиническим течением и поздней выявляемостью. Опухоли яичников занимают одну из ведущих позиций в структуре гинекологических заболеваний и остаются одной из причин онкологической смертности среди женщин. В частности, вследствие слабой выраженности или полного отсутствия клинических проявлений на ранних стадиях заболевания опухоли нередко выявляются на поздних стадиях, что резко снижает эффективность лечения. Морфологическое и гистологическое разнообразие опухолей яичников создаёт значительные диагностические трудности при дифференциации доброкачественных и злокачественных процессов. Традиционные клинические обследования и лабораторные методы не позволяют в полной мере оценить биологические характеристики опухолей.

В настоящее время ультразвуковое исследование считается основным скрининговым методом выявления опухолей яичников; однако стандартное ультразвуковое исследование в В-режиме не предоставляет достаточной информации о плотности тканей, их эластичности и стромальной структуре опухолей. Такая ситуация может приводить к диагностическим ошибкам при разграничении доброкачественных и злокачественных опухолей и, как следствие, к чрезмерным инвазивным вмешательствам либо, напротив, к задержке проведения адекватных лечебных мероприятий. В современной медицине внедрение малоинвазивных, высокоточных и безопасных для пациента диагностических технологий рассматривается как одна из актуальных задач. С этой точки зрения соноэластография — современная ультразвуковая технология, позволяющая в режиме реального времени

оценивать эластичность и жёсткость тканей, — имеет большое научное и практическое значение в диагностике опухолей яичников.

Использование соноэластографии позволяет оценивать механические свойства опухолей, проводить более точную дифференциальную диагностику между доброкачественными и злокачественными процессами, а также выявлять риск малигнизации опухолей на ранних стадиях. Внедрение соноэластографии в клиническую практику повышает возможности сохранения яичников у женщин репродуктивного возраста, снижает количество необоснованных хирургических вмешательств и инвазивных биопсий, а также уменьшает необходимость в дорогостоящих радиологических исследованиях. Это не только способствует сохранению качества жизни пациенток и их репродуктивного здоровья, но и повышает экономическую эффективность системы здравоохранения.

На сегодняшний день диагностические возможности, преимущества и ограничения соноэластографии в диагностике опухолей яичников недостаточно изучены в систематическом аспекте. Несмотря на наличие отдельных зарубежных исследований, остаются актуальными вопросы, связанные с комплексной оценкой данного метода, его интеграцией в клинические протоколы и применением в местных условиях. В связи с этим научное исследование роли современных ультразвуковых технологий, в частности соноэластографии, в диагностике опухолей яичников и оценка её диагностической значимости являются актуальной научно-практической задачей. Указанные обстоятельства определяют актуальность данной темы исследования и обосновывают необходимость проведения научных работ, направленных на совершенствование ранней диагностики, дифференциальной оценки и лечебной тактики при опухолях яичников.

Материалы и методы. Настоящее научное исследование направлено на оценку диагностических возможностей современных ультразвуковых технологий, в частности соноэластографии, в диагностике опухолей яичников. Исследование проводилось на основе комплексного обследования с использованием клинических, инструментальных и аналитических подходов. В качестве материала исследования были отобраны женщины, у которых были выявлены объёмные образования в области яичников. В исследование включались пациентки различных возрастных групп, в том числе репродуктивного, пременопаузального и постменопаузального периодов. Отбор пациенток осуществлялся на основании клинических жалоб, анамнестических данных и результатов гинекологического обследования.

В исследование включались пациентки с подозрением на опухоли яичников; случаи вторичных опухолей других органов, острых воспалительных процессов и тяжёлой экстрагенитальной патологии были исключены. Для каждой пациентки собирались данные клинического анамнеза, репродуктивного анамнеза, характеристики менструального цикла и гормонального статуса. Все пациентки проходили общее клиническое обследование, гинекологический осмотр, бимануальное исследование и

оценку общего состояния. Клинические симптомы сопоставлялись с локализацией, размерами и предполагаемыми биологическими характеристиками опухолей яичников.

Ультразвуковое исследование использовалось как основной инструментальный метод оценки опухолей яичников. Обследование проводилось с применением трансабдоминальных и трансвагинальных ультразвуковых датчиков. В В-режиме оценивались форма, контуры, размеры, внутренняя структура, состояние капсулы и взаимоотношение опухолей яичников с окружающими тканями. Особое внимание уделялось наличию солидных и кистозных компонентов в структуре опухолей, перегородок, папиллярных разрастаний, а также признаков неоднородности внутренней структуры.

Соноэластография применялась как основной методологический компонент исследования. Соноэластографическое исследование позволяло в режиме реального времени оценивать эластичность и жёсткость опухолей. В ходе исследования использовались технологии компрессионной (strain) эластографии и эластографии сдвиговой волны (shear-wave elastography). С помощью соноэластографии анализировались механические свойства опухолей яичников, степень их эластичности, однородность внутренней структуры и градиенты жёсткости. Посредством цветового эластографического картирования (эласто-картирования) выявлялись различия эластичности в различных зонах опухолей, а также сопоставлялись признаки, характерные для доброкачественных и злокачественных процессов.

Помимо ультразвукового исследования применялись цветовая и энергетическая допплерография. С использованием данного метода оценивались особенности кровоснабжения опухолей, степень васкуляризации и характер кровотока. Допплерографические параметры подвергались сравнительному анализу с результатами соноэластографии. Все ультразвуковые и соноэластографические показатели сопоставлялись с клиническими данными и установленными диагнозами. На основании полученных данных оценивалась диагностическая значимость соноэластографии в диагностике опухолей яичников.

В ходе исследования анализировались преимущества, ограничения и возможности клинического применения соноэластографии в сравнении с традиционными ультразвуковыми методами исследования. Полученные результаты были систематизированы, сопоставлены между группами и подвергнуты комплексному анализу. Результаты исследования сравнивались с данными научной литературы и зарубежных исследований, что позволило более глубоко оценить роль и значение соноэластографии в диагностике опухолей яичников.

Результаты и обсуждение. В ходе настоящего исследования была проведена комплексная оценка диагностических возможностей современных ультразвуковых технологий, в частности соноэластографии, в диагностике опухолей яичников. Полученные результаты были подвергнуты

сравнительному анализу с данными традиционного ультразвукового исследования, а также определены клиническая значимость и практические преимущества соноэластографии. Согласно результатам исследования, несмотря на то что стандартное ультразвуковое исследование в В-режиме имеет большое значение для оценки анатомических характеристик опухолей яичников — таких как форма, контуры, размеры и внутренняя структура, — оно оказалось недостаточным для получения полноценной информации о биологических свойствах опухолей и эластичности тканей. В ряде случаев доброкачественные и злокачественные опухоли имели сходную ультразвуковую картину, что существенно затрудняло дифференциальную диагностику.

При применении соноэластографии возможности оценки механических свойств опухолей яичников значительно расширялись. Результаты эластографических исследований показали, что доброкачественные опухоли характеризовались относительно мягкой тканью с однородной эластичностью, при этом на эластографических картах отмечалось равномерное распределение цветового сигнала. В отличие от этого, злокачественные процессы отличались повышенной жёсткостью опухолевой ткани, неоднородным распределением эластичности, преобладанием жёстких зон и выраженными различиями градиентов эластичности. Указанные признаки были расценены как важные диагностические критерии идентификации злокачественных процессов.

Использование технологий компрессионной (strain) и сдвиговолновой (shear-wave) эластографии позволило более глубоко анализировать внутреннюю структуру опухолей. В частности, большое значение имели определение соотношения жёстких и мягких тканей, оценка состояния капсулы и сопоставление эластичности стромальных компонентов. Посредством цветового эластографического картирования были выявлены различия эластичности между центральными и периферическими зонами опухолей, что предоставляло дополнительную информацию для оценки вероятности малигнизации.

Исследования, выполненные в сочетании с допплерографией, дополнительно расширили диагностические возможности соноэластографии. При сопоставлении характеристик кровоснабжения опухолей с параметрами эластичности было установлено, что опухоли с более высокой жёсткостью чаще демонстрировали признаки усиленной васкуляризации. Это свидетельствует о том, что комбинированное применение соноэластографии и допплерографии повышает точность диагностики.

Полученные результаты оказали непосредственное влияние на процесс клинического принятия решений. В случаях, когда на основании данных соноэластографии предполагался доброкачественный характер процесса, выбиралась тактика динамического наблюдения или минимально инвазивных вмешательств, тогда как у пациенток с высокой вероятностью злокачественного процесса обеспечивалось своевременное направление на

углублённое обследование и хирургическое лечение. В частности, увеличение возможностей сохранения яичников у женщин репродуктивного возраста было расценено как одно из важных клинических преимуществ данного метода.

Результаты настоящего исследования согласуются с данными, представленными в зарубежных научных источниках. В многочисленных международных исследованиях отмечается высокая чувствительность и специфичность соноэластографии в дифференциальной диагностике опухолей яичников. Наши наблюдения также подтверждают более высокую информативность соноэластографии по сравнению с традиционным ультразвуковым исследованием. В то же время была выявлена оператор-зависимость метода и наличие технических ограничений в отдельных клинических ситуациях, что было предметом обсуждения.

В целом результаты исследования продемонстрировали, что соноэластография является важным дополнительным диагностическим методом в диагностике опухолей яичников. Данная технология обладает высокой эффективностью в дифференциальной оценке доброкачественных и злокачественных процессов, ранней диагностике и выборе индивидуализированной лечебной тактики. Широкое внедрение соноэластографии в клиническую практику имеет большое значение для сохранения репродуктивного здоровья женщин, снижения количества необоснованных инвазивных вмешательств и обеспечения раннего выявления онкогинекологических заболеваний.

Использованные источники:

1. World Health Organization (WHO). WHO classification of female genital tumours. 5th edition. IARC Press. 2020.
2. Moccia S., De Momi E., Guarnaschelli A., et al. Ultrasound elastography in gynecology: current applications and future perspectives. Diagnostics. 2020;10(11):1013.
3. Zhang M., Zhang Y., Fu J., et al. Shear wave elastography for differentiating benign and malignant ovarian tumors. Journal of Ultrasound in Medicine. 2020;39(10):1957–1966.
4. Sconfienza L.M., Albano D., Allen G., et al. Clinical indications for elastography: update of the EFSUMB consensus. European Radiology. 2021;31(12):8763–8775.
5. Testa A.C., Kaijser J., Wynants L., et al. Ovarian cancer diagnosis using IOTA models and ultrasound-based strategies. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2021;58(1):148–156.
6. European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). ESGO–ESMO consensus guidelines for ovarian cancer management. International Journal of Gynecological Cancer. 2021;31(5):672–705.
7. Li Y., Zhang X., Sun Y., et al. Diagnostic value of ultrasound elastography combined with Doppler imaging in ovarian tumors. Ultrasound in Medicine & Biology. 2022;48(4):755–763.

8. Woźniak S., Czuczwar P., Szkodziak P., et al. The role of elastography in the assessment of adnexal masses: recent advances. Ginekologia Polska. 2022;93(6):490–496.
9. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Evaluation and management of adnexal masses. Practice Bulletin No. 238. 2022.
10. Chen H., Lin X., Wang J., et al. Combined transvaginal ultrasound and shear wave elastography for ovarian tumor characterization. Frontiers in Oncology. 2023;13:1187423.

Тиркашев О.С., PhD
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Худойбердиева Г.Э.
студентка 6 курса, группа 604
лечебный факультет
Самаркандский государственный
медицинский университет
Узбекистан

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЬЮ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Аннотация. *Корь остается одной из наиболее контагиозных вирусных инфекций, представляющих серьезную проблему для общественного здравоохранения, несмотря на наличие эффективной вакцинации. Уровень гуморального иммунитета, прежде всего концентрация специфических IgG-антител к вирусу кори, является ключевым фактором защиты от заболевания. В статье представлен обзор современных данных о взаимосвязи напряженности поствакцинального и постинфекционного иммунитета с риском заболеваемости корью в различных возрастных группах. Рассматриваются особенности формирования иммунитета у детей раннего возраста, подростков и взрослых, а также причины снижения уровня антител со временем.*

Ключевые слова: *корь, гуморальный иммунитет, IgG, серопротективный уровень антител, вакцинация, возрастные группы, серомониторинг.*

Tirkashev O.S., PhD
assistant
Department of Infectious Diseases
Khudoyberdieva G.E.
6th-year student, Group 604,
Faculty of General Medicine
Samarkand State Medical University
Uzbekistan

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMORAL IMMUNITY LEVEL AND THE RISK OF MEASLES INFECTION IN DIFFERENT AGE GROUPS

Abstract. *Measles remains one of the most contagious viral infections, representing a serious public health problem despite the availability of effective vaccination. The level of humoral immunity, primarily the concentration of measles-*

specific IgG antibodies, is a key factor in protection against the disease. This article provides a review of current data on the relationship between the intensity of post-vaccination and post-infection immunity and the risk of measles across different age groups. The features of immune formation in early childhood, adolescents, and adults are discussed, as well as the causes of antibody level decline over time.

Keywords: *measles, humoral immunity, IgG, seroprotective antibody level, vaccination, age groups, seromonitoring.*

Введение. Корь — острая вирусная инфекция, вызываемая вирусом рода Morbillivirus, характеризующаяся высокой контагиозностью и риском тяжелых осложнений. Несмотря на широкое внедрение вакцинации, в последние годы в ряде стран наблюдаются подъемы заболеваемости [1,2]. Одним из ключевых факторов, определяющих восприимчивость населения, является уровень гуморального иммунитета.

Гуморальный иммунитет при кори. Основную роль в защите от вируса кори играют специфические IgG-антитела, формирующиеся после вакцинации или перенесенного заболевания. Наличие серопротективного уровня антител предотвращает развитие клинически выраженной инфекции [3,4]. После двукратной вакцинации формируется стойкий иммунитет у большинства привитых, однако уровень антител может постепенно снижаться, особенно при отсутствии естественной бустерной стимуляции вирусом в популяции [5,6].

Возрастные особенности иммунитета к кори

Дети раннего возраста.У новорожденных и детей первых месяцев жизни защита обеспечивается материнскими антителами, передающимися трансплацентарно. Однако к 6–9 месяцам их уровень снижается, что создает «иммунологическое окно» повышенной восприимчивости [4].

Дети школьного возраста и подростки. После проведения плановой вакцинации формируется напряженный иммунитет. Тем не менее исследования показывают, что у части подростков возможно снижение титров антител ниже защитного уровня, особенно при нарушении сроков вакцинации [7.8].

Взрослое население. Среди взрослых лиц, особенно родившихся в период снижения охвата вакцинацией, отмечаются случаи серонегативности или недостаточного уровня антител. Это повышает риск вспышек кори в организованных коллективах и медицинских учреждениях.

Связь уровня антител с риском заболеваемостию.Сероэпидемиологические исследования подтверждают, что снижение популяционного уровня серопротекции ниже 90–95 % создает условия для распространения вируса кори [9,10]. Лица с низким или отсутствующим уровнем специфических IgG имеют значительно более высокий риск инфицирования при контакте с больным.

Методы иммуноферментного анализа (ИФА) используются для оценки напряженности гуморального иммунитета и выявления групп риска [11,12,13].

Практическое значение серомониторинга.Регулярный мониторинг уровня антител в различных возрастных группах позволяет:выявлять группы повышенного риска;оценивать эффективность вакцинации;планировать дополнительные иммунизационные мероприятия;предупреждать развитие эпидемических вспышек. В условиях глобализации и миграционных процессов поддержание высокого уровня коллективного иммунитета приобретает особую значимость.

Заключение. Гуморальный иммунитет является основным фактором защиты от кори. Снижение уровня специфических IgG-антител в отдельных возрастных группах повышает риск заболеваемости и возникновения вспышек. Проведение регулярного сероэпидемиологического мониторинга и поддержание высокого охвата двукратной вакцинацией являются ключевыми мерами профилактики кори.

Использованные источники:

1.World Health Organization. Measles fact sheet. Geneva: WHO; 2023.
Moss WJ. Measles. Lancet. 2017;390(10111):2490–2502.
2.Strebel PM, Orenstein WA. Measles. N Engl J Med. 2019;381(4):349–357.
3.Leuridan E, Van Damme P. Passive transmission and persistence of maternal antibodies. Vaccine. 2007;25(34):6296–6304.
4.Plans P. Prevalence of antibodies associated with herd immunity. Vaccine. 2013;31(7):946–952.
5.Helfand RF, Kebede S, Alexander JP, et al. Comparative detection of measles-specific IgM. J Infect Dis. 1997;175(1):195–199.
7. Anvarovna YN, Egamovna MF, Tashtemirovna RN, Buribayevna MG, Saidovich TO. Clinical and Epidemiological Characteristics of Shigellosis in Adults at the Contemporary Stage. CAJMNS [Internet]. 2021 Jun. 28 [cited 2026 Feb. 12];2(3):311-8. Available from: https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/221
8. Yakubovna EM, Kudratovna YM, Egamovna MF, Tashtemirovna RN, Khurshedovna SU. Aspects of Clinical and Laboratory Diagnostics of Enteroviral Infection without CMS Damage. CAJMNS [Internet]. 2021 Nov. 9 [cited 2026 Feb. 12];2(6):1-5. Available from: https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/471
9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.
10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak

infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
12. Delkasheva S. D. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBESITY: CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chronic-obstructive-pulmonary-disease-and-obesity-clinical-and-social-aspects (дата обращения: 12.02.2026).
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

УДК 616.33/.342-005.1-089:338.45

Усманов А.Х.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Хакбердиев Б.Б.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Резюме. *Проведён обзор современных исследований (2010–2025 гг.) и сравнительный анализ результатов лечения более 500 пациентов с ЯГДК при применении традиционной тактики и дифференцированного подхода (с приоритетом эндоскопии, выборочным использованием лапароскопии и эмболизации). Изучены показатели: частота операций, осложнений, повторных кровотечений, летальность, длительность стационара, стоимость лечения. Дифференцированный подход позволил снизить операции до 10–20% случаев без ухудшения исходов; 80–90% пациентов успешно лечатся консервативно. Летальность в группе малоинвазивной тактики составила 0–3% против 10–15% при открытых операциях. Постоперационные осложнения уменьшились более чем в 2 раза. Средняя продолжительность госпитализации сократилась с ~19 до 12 дней. Экономически дифференцированный подход показал выгоду за счёт сокращения койко-дней и снижения затрат на лечение осложнений. По данным клинико-экономического анализа, стратегия раннего целенаправленного вмешательства при высоком риске рецидива оказалась в 2–3 раза эффективнее по критерию «затраты/качество жизни», чем выжидательная тактика.*

Ключевые слова: *язвенное кровотечение; гастродуоденальные язвы; хирургическое лечение; лапароскопия; экономическая эффективность; дифференцированный подход; эндоскопическая гемостаз; повторное кровотечение; клинико-экономический анализ.*

Usmanov A.Kh.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Khakberdiev B.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE SURGICAL TREATMENT OF PEPTIC GASTRODUODENAL BLEEDING

Annotation. *A review of current studies (2010–2025) and comparative analysis of treatment outcomes in >500 patients with ulcer bleeding under traditional tactics versus a differentiated strategy (prioritizing endoscopic hemostasis, selective use of laparoscopy and embolization). Key outcomes assessed: surgery rate, complications, rebleeding rate, mortality, hospital stay length, treatment costs. The differentiated approach reduced the need for surgery to 10–20% of cases without worsening outcomes; 80–90% of patients were successfully managed non-surgically. Mortality in the minimally invasive strategy group was 0–3% versus 10–15% with open surgery. Postoperative complications were more than halved. Average hospital stay decreased from ~19 to 12 days. Economically, the differentiated approach proved advantageous by shortening length of stay and reducing costs for managing complications. A cost-effectiveness analysis showed that early targeted intervention for high-risk cases was 2–3 times more efficient in "cost per quality-adjusted life year" than a wait-and-see tactic.*

Keywords: *ulcer bleeding; peptic ulcer hemorrhage; surgical treatment; laparoscopy; cost-effectiveness; differentiated approach; endoscopic hemostasis; rebleeding; clinical-economic analysis.*

Язвенные гастродуоденальные кровотечения (ЯГДК) остаются одной из наиболее частых и опасных неотложных ситуаций в абдоминальной хирургии. Ежегодная заболеваемость кровотечениями из язв составляет от 20 до 100 случаев на 100 тысяч населения. Несмотря на значительный прогресс в медикаментозной терапии (ингибиторы протонной помпы) и эндоскопических методах остановки кровотечения, летальность при острых язвенных кровотечениях остаётся высокой – до 10–14% в последние десятилетия. Это обусловлено в том числе изменением контингента пациентов: большинство больных – лица старших возрастных групп с тяжелыми сопутствующими патологиями и приемом антитромботических средств. Увеличение доли пожилых пациентов и широко распространённое использование нестероидных противовоспалительных препаратов и антикоагулянтов привели к тому, что язвенные кровотечения по-прежнему

сопровождаются значимой смертностью и осложнениями, требуя оптимизации подходов к их лечению.

В структуре верхних желудочно-кишечных кровотечений доля пептических язв составляет до 60% случаев. Причём дуоденальные язвы кровоточат в 1,3–2,3 раза чаще, чем желудочные, и ассоциируются с более высокой частотой рецидивов кровотечения, необходимостью хирургических вмешательств и смертностью по сравнению с желудочными язвами. Особенно опасны язвы, расположенные на задней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки, где эрозия ветвей гастродуоденальной артерии приводит к профузным кровопотерям и высокому риску повторного кровотечения.

За последние 30–40 лет произошёл сдвиг в тактике лечения ЯГДК от преимущественно хирургической к преимущественно эндоскопической. Эндоскопия в сочетании с фармакотерапией (ИПП, эрадикация H. pylori) позволила добиться окончательного гемостаза у 80–97% пациентов, что значительно снизило потребность в экстренных операциях. По данным различных авторов и отчетности, доля оперированных по поводу острого язвенного кровотечения снизилась до 10–20% случаев. Тем не менее, даже при современной тактике около каждой пятой-десятой госпитализации с ЯГДК требует хирургического вмешательства в силу неэффективности или невозможности эндоскопической остановки кровотечения (например, при продолжающемся массивном кровотечении) либо при повторном кровотечении после первичного гемостаза. Такие пациенты, как правило, находятся в более тяжелом состоянии (геморрагический шок, анемия, сопутствующие болезни), что обуславливает высокий операционный риск и худшие исходы.

Традиционно применявшиеся методы хирургического лечения язвенных кровотечений включали ушивание язвы через гастродуоденотомию или резекцию желудка (особенно при желудочных язвах для профилактики рецидива и исключения малигнизации). Однако монохирургический подход “одно решение для всех” показал свои недостатки. Отказ от простой гастродуоденотомии с прошиванием сосуда в язве связан с высоким процентом рецидивов кровотечения из-за прорезывания лигатур[10]. Поэтому многие хирурги предпочитали выполнять резекции (дистальная резекция желудка при кровоточащих язвах желудка, стволовая ваготомия с пилоропластикой или резекция при дуоденальных язвах) – эти радикальные вмешательства обеспечивали устранение язвенного дефекта и снижение кислотности, но сопровождались значительной травматичностью. Летальность при хирургическом лечении язвенных кровотечений исторически достигала 10–15%, а общее число послеоперационных осложнений – 30–45%. К основным осложнениям относились: повторные кровотечения из ушитой язвы, несостоятельность швов гастродуоденотомии, послеоперационные панкреатиты или перитониты, нагноение раны, грыжи передней брюшной стенки. Такие показатели явно свидетельствуют о необходимости совершенствования тактики ведения пациентов с ЯГДК.

Цель исследования: проанализировать клиническую и экономическую эффективность дифференцированного подхода в хирургическом лечении язвенных гастродуоденальных кровотечений на основе сравнения различных тактик (традиционной и современной) с учётом исходов лечения, затрат здравоохранения, длительности госпитализации, частоты рецидивов кровотечения и летальности.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в форме ретроспективного анализа и обзора актуальной литературы. Были обобщены данные отечественных и зарубежных публикаций за последние 10 лет, включая национальные клинические рекомендации, результаты рандомизированных исследований и крупные клинико-статистические обзоры. Особое внимание уделено работам, сравнивающим разные подходы к хирургическому лечению язвенных кровотечений – от традиционных открытых операций до современных малоинвазивных и гибридных технологий – а также исследованиям по клинико-экономической эффективности лечения.

Для более предметной иллюстрации клинических и экономических аспектов были изучены результаты лечения пациентов с острыми язвенными гастродуоденальными кровотечениями, поступавших в хирургические стационары по неотложным показаниям. В обзор включены данные нескольких исследований, суммарно охватывающие более 500 пациентов. В частности, использованы результаты следующих сравнительных наблюдений:

Группа традиционного подхода: пациенты, перенесшие экстренные открытые операции (ушивание язвы через гастротомию/дуоденотомию, резекции) без применения лапароскопии, либо оперированные после повторного кровотечения (при неудаче консервативной тактики). Для примера, в одном из исследований сравнения традиционной открытой тактики было проанализировано 52 пациента, оперированных лапаротомно. В другом – 55 пациентов, которым выполнена стандартная открытая операция по поводу язвенного кровотечения (группа сравнения).

Группа дифференцированного (современного) подхода: пациенты, лечение которых осуществлялось по алгоритму, включающему приоритет эндоскопического гемостаза и отбор на операцию только при строгих показаниях; при этом применялись органосберегающие вмешательства (ушивание язвы без резекции, ваготомия) и/или лапароскопические технологии. Например, основная группа в исследовании Мизамова и соавт. составила 59 пациентов, которым выполнено гибридное лапароскопическое ушивание язвы под эндоскопическим контролем. В другом центре 27 больным с высоким риском рецидива выполнено первичное лапароскопическое лигирование источника кровотечения по оригинальной методике. Кроме того, анализировались когорты пациентов, у которых при повторном кровотечении вместо открытой операции применяли транскатетерную эмболизацию (рентгеноэндоваскулярное вмешательство) – как альтернативу хирургии.

Основные оцениваемые показатели включали: частоту повторных кровотечений, потребность в повторных эндоскопиях или операциях, послеоперационные осложнения (нагноение раны, несостоятельность швов, и др.), летальность, а также ключевые экономические параметры – длительность пребывания в стационаре, объём применённых ресурсов (переливания крови, препараты, койко-дни интенсивной терапии) и стоимость лечения. Для анализа прямых затрат использованы данные клинико-экономических исследований, пересчитанные при необходимости к сопоставимым условиям. В частности, применялся метод «затраты-эффективность» (cost-effectiveness), оценивающий дополнительную стоимость достижения единицы эффекта (например, предотвращённого случая рецидива или год жизни с поправкой на качество – QALY).

Статистическая обработка литературных данных носила описательный характер. Результаты представлены в виде сравнительных таблиц и диаграмм с цитированием первоисточников.

Результаты и их обсуждение. Практика показывает, что подавляющее большинство язвенных кровотечений может быть успешно остановлено консервативными мерами (эндоскопия + медикаменты). Литературные данные подтверждают: около 80–85% пациентов удаётся лечить без операции. Лишь 15–20% случаев требуют хирургического вмешательства. На Диаграмме 1 наглядно показано соотношение долей пациентов, пролеченных без операции и оперативным путём при ЯГДК (по данным крупного клинического центра) – около пятой части больных потребовалась операция, в то время как у остальных достигнут окончательный гемостаз эндоскопическими методами.



Рисунок 1: Распределение способов лечения язвенных кровотечений (пример: у 84% пациентов гемостаз достигнут консервативно/эндоскопически, у 16% потребовалось хирургическое вмешательство). Приоритет эндоскопии позволил значительно сократить частоту операций по сравнению с прошлым, когда оперировать приходилось до 30–50% таких больных.

Дифференцированный подход в выборе тактики операции означает, что не всем пациентам с ЯГДК выполняется травматичная резекция или даже лапаротомия. Если состояние больного позволяет и имеется техническая возможность, предпочтение отдаётся менее инвазивным вмешательствам, обеспечивающим достаточный гемостаз. Так, Черкасов и Лагеза (Ростов-на-Дону) сообщают, что у них из 493 пациентов с язвенным кровотечением оперировано лишь 79 (16%), причём основной метод операции – органосохраняющий (ушивание язвы) в сочетании с ваготомией, вместо ранее широко применявшихся резекций. Аналогично, в работе Мизамова и соавт. сравнены две группы: гибридное лапароскопическое ушивание язвы против традиционного открытого ушивания/резекции. Новая методика (лапароскопия с эндоскопической навигацией) продемонстрировала не худшие, а во многом и лучшие результаты.

Результаты сравнительного анализа исходов открытых и лапароскопических вмешательств представлены на Диаграмме 2. Видно, что при традиционной открытой операции частота послеоперационных осложнений составила порядка 29%, тогда как при лапароскопическом вмешательстве – около 15%. В открытой группе в структуре осложнений отмечены: рецидив кровотечения из-под лигатуры язвы – 7,7% случаев, нагноение лапаротомной раны – 15,4%, несостоятельность швов гастродуоденотомии – 3,8%. В лапароскопической группе подобных осложнений практически не было (ни одного рецидива кровотечения из ушитой язвы, нагноения троакарных проколов не отмечено). После лапароскопии отмечались лишь отдельные случаи общих осложнений (пневмония, сердечно-сосудистая недостаточность у тяжелых пациентов), суммарно у ~14,8% больных – в два раза реже, чем при открытой тактике.

Что особенно важно – летальность существенно снизилась при использовании дифференцированного подхода и малоинвазивной техники. В открытой группе послеоперационная летальность составила 13,5%, то есть умер каждый восьмой оперированный пациент, что согласуется с общей литературной оценкой (10–15% смертности при экстренной хирургии ЯГДК). В то же время среди пациентов, оперированных лапароскопически, не отмечено ни одного летального исхода. Нулевая летальность в малоинвазивной группе частично объясняется отбором (лапароскопия выполнялась в специализированном центре опытными хирургами для определённых локализаций язв – передняя стенка), но также свидетельствует о преимуществах метода для профилактики грозных осложнений и тяжелого послеоперационного течения. Более мягкий послеоперационный период у таких больных способствует снижению риска декомпенсации сопутствующих заболеваний, развитию полиорганной недостаточности и т.п.




Рисунок 2: Сравнение исходов открытого и лапароскопического способов хирургического гемостаза язвенного кровотечения (по объединённым данным исследований). Открытая операция сопровождается более чем вдвое большим числом послеоперационных осложнений (28,8% против 14,8%) и существенной летальностью (до 13,5%), тогда как в лапароскопической группе летальных исходов не отмечено.

Следующим важным показателем эффективности является длительность госпитализации. Широкое внедрение эндоскопического лечения само по себе сократило средний койко-день, поскольку отсутствует необходимость в послеоперационном наблюдении для большинства пациентов. Однако если сравнивать пациентов, которым всё же потребовалась операция, то применение лапароскопического доступа позволило существенно уменьшить сроки стационарного лечения по сравнению с классической лапаротомией. По данным Ростовского центра, средняя продолжительность пребывания в больнице при открытом вмешательстве составила ~19 суток, тогда как у пациентов, оперированных лапароскопически – 12 дней Разница почти в неделю объясняется более легким и быстрым восстановлением после малоинвазивной операции (меньше болевой синдром, ранее активизация, меньший риск инфекций). Диаграмма 3 иллюстрирует это различие.




Рисунок 3: Средняя продолжительность стационарного лечения при разных методах хирургии язвенного кровотечения. После открытой операции больные находились в стационаре в среднем 19 дней, тогда как применение лапароскопического вмешательства сократило этот срок до ~12 дней, ускоряя возвращение пациентов к нормальной жизнедеятельности.

Сокращение времени госпитализации имеет не только медицинское, но и прямое экономическое значение. Каждый “лишний” койко-день в стационаре – это дополнительные затраты на пребывание, лечение, питание пациента, на работу персонала. Таким образом, уменьшение послеоперационного периода на 6–7 дней при лапароскопическом подходе означает существенную экономию ресурсов лечебного учреждения. Кроме того, более низкая частота осложнений в этой группе означала меньше затрат на их коррекцию (например, меньше перевязок и антибиотиков при отсутствии нагноений, отсутствие затрат на повторные операции или эндоскопии при отсутствии рецидивов кровотечения). Все эти факторы указывают на потенциальную экономическую выгоду дифференцированного малоинвазивного подхода по сравнению с традиционной тактикой.

Одним из ключевых моментов в лечении язвенных кровотечений является предупреждение рецидива. Повторное кровотечение значительно ухудшает прогноз: летальность при рецидивах намного выше, чем при единичном эпизоде, из-за развивающейся коагулопатии и истощения резервов организма. Дифференцированный подход подразумевает активную профилактику рецидива, что достигается как выбором оптимального метода (эндоскопия vs операция), так и добавлением сопутствующих процедур (ваготомия, эмболизация, интенсивная терапия).

Данный поэтапный подход крайне важен с точки зрения экономии: как показывают расчёты, выполнение профилактической “второй” эндоскопии (так называемый second-look) оправдано, когда риск рецидива превышает ~30%. В группах высокого риска повторного кровотечения проведение контрольной эндоскопии с превентивным подклипсованием сосудов или удалением сгустка позволяет избежать экстренной операции у значительного числа пациентов, что экономически выгодно (стоимость одной эндоскопической процедуры значительно ниже стоимости хирургического лечения и реанимации). Однако при очень высоком риске (например, активное кровотечение, геморрагический шок) – лучше сразу направить пациента на оперативный гемостаз, минуя неоднократные эндоскопии, так как промедление и множественные процедуры могут в итоге обойтись дороже и ухудшить исход.

Отдельно следует упомянуть о роли превентивных операций у очень высокорискованных пациентов. Дифференцированный подход предполагает, что если по сумме клинических данных вероятен ранний рецидив (например, обширная язва дуоденальной луковицы Forrest IA на фоне продолжающейся гипотензии и коагулопатии) – возможно обосновано выполнить оперативное вмешательство *до* развития рецидива, т.е. превентивно, несмотря на достигнутый эндоскопический гемостаз. Попандопуло и соавт. провели клинико-экономический анализ подобной тактики на примере радикальной дуоденопластики (РДП) у больных с язвой ДПК. В их исследовании одна группа (10 человек) перенесла экстренную операцию сразу при поступлении (не дожидаясь возможного повторного кровотечения), а другая группа (8 человек) – “отсроченную” операцию, уже после развития рецидива кровотечения, тогда как у остальных 125 пациентов удалось избежать хирургии вовсе. Результаты показали, что в группе отсроченной операции 2 из 8 пациентов умерли (25%), тогда как в группе ранней операции летальных исходов не было. Частота повторного кровотечения в отсроченной группе составила 100% (по определению, т.к. они оперировались из-за рецидива), а в группе ранней операции – 0%. Таким образом, обоснованно выполненное превентивное вмешательство спасает жизнь пациенту и предотвращает развитие тяжёлых последствий рецидива (шок, полиорганная недостаточность). Конечно, ранняя операция не показана всем подряд – она оправдана только при очень высоком прогнозируемом риске повторного кровотечения, когда вероятность ненужной операции минимальна по сравнению с риском промедления. Современные алгоритмы помогают идентифицировать таких пациентов (к ним относятся больные с активно кровоточащими язвами большого диаметра, градации Forrest I, на фоне шока, при продолжающемся снижении гематокрита несмотря на инфузии и т.п.).

Дифференцированный подход, по сути, направлен на оптимальное распределение ресурсов: дорогие и рискованные методы применяются только там, где без них не обойтись, тогда как безопасные и дешёвые – используются

максимально широко у остальных больных. Такой принцип является фундаментом клинико-экономической эффективности.

Результаты оценки экономической эффективности разных стратегий лечения наглядно представлены в работе Попандопуло и соавт. Они рассчитали отношение “затраты/эффективность” для двух альтернатив: экстренная операция всем высоким рискам vs операция только после рецидива. Эффективность измеряли в приросте качества жизни (QALY), затраты – в рублях. Выяснилось, что экстренное вмешательство (при строгих показаниях) имеет значительно более высокую отдачу: на единицу полученного эффекта тратится почти в 3,4 раза меньше средств, чем при отложенной тактике. В пересчёте: каждое предотвращённое ранней операцией повторное кровотечение экономит ресурсы, которые пришлось бы расходовать на лечение осложнений этого рецидива. Авторы пришли к выводу, что своевременное выполнение радикальной операции “по показаниям” спасает жизнь пациента и является экономически выгодным решением, так как предотвращает каскад дорогостоящих осложнений язвенной болезни.

Применение лапароскопических технологий первоначально ассоциировалось с некоторым повышением прямых затрат (дорогостоящее оборудование, инструменты). Однако в контексте ургентной хирургии язвенных кровотечений лапароскопия окупается за счёт снижения послеоперационных расходов. Как обсуждалось выше, сокращение койко-дней (в среднем на 7 дней) и осложнений при лапароскопическом методе приводит к снижению общих затрат на одного пациента. Дополнительные расходы на расходные материалы для лапароскопии (эндостеплеры обычно не требуются, достаточно шовного материала и клипс) весьма умеренны по сравнению с общим бюджетом лечения. К тому же, с распространением лапароскопии затраты на неё снижаются. В современных условиях лапароскопический гемостаз выгоден хотя бы тем, что позволяет быстрее вернуть пациента к труду и нормальной жизни, сокращая период инвалидизации и расходы системы социального страхования.

Важно подчеркнуть, что экономическая эффективность не должна рассматриваться в отрыве от клинической. Конечной целью дифференцированного подхода является улучшение исходов – снижение летальности, осложнений, улучшение качества жизни выздоровевших. И уже как следствие достигается экономия ресурсов (поскольку лечение осложнений и длительная реабилитация всегда дороже). В этом смысле, практическая значимость дифференцированного подхода огромна: он позволяет спасти больше жизней и одновременно рациональнее использовать бюджет здравоохранения. Например, внедрение алгоритмов стратификации риска и эндоскопического гемостаза по стране привело к снижению числа экстренных операций при ЯГДК и, как следствие, сокращению расходов на хирургическую помощь без ухудшения, а напротив – с улучшением показателей выживаемости пациентов.

Современные национальные рекомендации отражают описанные тенденции. В них настоятельно рекомендуется проводить эндоскопию всем пациентам с подозрением на язвенное кровотечение в первые 24 часа, а при признаках продолжающегося кровотечения – срочно. Эндоскопическая остановка кровотечения рассматривается как метод выбора; хирургическое вмешательство показано при неэффективности эндоскопического гемостаза или при рецидиве, а также при сочетании факторов высокого риска рецидива. Выбор объёма операции также дифференцируется: при дуоденальных язвах предпочтительно ушивание язвы в сочетании с ваготомией (или высокоселективной ваготомией) вместо травматичной резекции; при желудочных язвах при стабильном состоянии – ушивание с возможной последующей плановой антихеликобактерной терапии, а резекцию выполнять только при подозрении на малигнизацию язвы. Лапароскопические методы упоминаются как перспективные и допустимые в подготовленных руках при наличии оборудования. Такой подход в совокупности призван снизить травматичность лечения, улучшить результаты и сократить затраты. Международные рекомендации (например, Всемирного общества неотложной хирургии, 2021) также отмечают, что при отказе эндоскопии “золотой стандарт” лечения рецидивирующего язвенного кровотечения – либо хирургия, либо эмболизация, причём эмболизация всё чаще заменяет операцию при повторных кровотечениях ввиду меньшей инвазивности. Это отражает глобальный вектор развития – минимально достаточное вмешательство для контроля ситуации.

Подводя итог, следует отметить, что дифференцированный подход обладает и научной новизной, и явным практическим эффектом. Он интегрирует последние достижения наук: эндоскопические, рентгенохирургические технологии, методики ускоренного восстановления (ERAS), риск-стратификацию на основе большого массива клинических данных. Всё это представляет новую парадигму ведения язвенных кровотечений, существенно отличающуюся от протоколов середины XX века. Эта новизна подтверждается публикациями последних лет: появляются работы о допплер-навигации при эндоскопии, о применении овер-специфических клипс (OTSC) для снижение рецидивов – всё это элементы того же дифференцированного подхода, направленного на индивидуализацию лечения. Практическая значимость внедрения этих инноваций выражается в спасённых жизнях, уменьшении инвалидизации и экономии ресурсов системы здравоохранения.

Выводы

Персонализированная тактика, основанная на оценке риска рецидива и применении минимально достаточных инвазивных вмешательств, позволяет добиться окончательной остановки кровотечения у >80% пациентов без операции, снижая общую потребность в хирургическом вмешательстве. Одновременно обеспечивается своевременное оперативное лечение той

группы больных, которым оно действительно необходимо (≈10–20%), что улучшает исходы в этой наиболее тяжелой категории.

Дифференцированный подход с использованием современных технологий приводит к достоверному уменьшению послеоперационной летальности и частоты осложнений. Применение лапароскопических и гибридных методов хирургии язвенных кровотечений позволило снизить летальность с ~10–15% (при открытых операциях) до 0–3%. Частота гнойно-септических осложнений, рецидивов кровотечения из ушитой язвы и других послеоперационных проблем сокращается в 2–3 раза при малоинвазивной тактике по сравнению с традиционной открытой.

Применение классификации Форрест и клинических шкал риска позволяет прогнозировать рецидив и проводить профилактические мероприятия (эндоскопическая ревизия, ваготомия, активная ИПП-терапия). Это привело к снижению частоты повторных кровотечений и связанных с ними экстренных реинтервенций. Противоязвенная терапия в сочетании с эндоскопическим лечением снизила риск рецидива в высокорискной группе с ~30–40% до менее 10%.

Дифференцированный подход оказался экономически более эффективным. Исключение ненужных операций и осложнений обеспечивает прямую экономию денежных средств. Стоимость лечения пациента без операции в несколько раз ниже, чем оперированного. Даже с учётом затрат на современные технологии, общий ресурс на 1 успешно вылеченного больного уменьшается. Расчёты показали, что стратегия раннего целевого оперативного вмешательства (при строгих показаниях) на 200–300% эффективнее по показателю “затраты/качество жизни”, чем выжидательная тактика с возможной последующей операцией.

Необходимо продолжать внедрение дифференцированных алгоритмов в практику неотложной хирургии. Следует оснащать центры необходимым эндоскопическим и лапароскопическим оборудованием, обучать персонал методикам гибридных операций. Также важно междисциплинарное взаимодействие: участие эндоскопистов, хирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов в единой команде. При наличии условий предпочтительно выполнять лапароскопическое ушивание язвы (с или без ваготомии) вместо лапаротомии, а при повторных кровотечениях у пожилых – рассматривать эмболизацию как альтернативу повторной операции. Такой подход соответствует современным клиническим руководствам и доказал свою эффективность на практике.

Использованные источники:

1. Мизамов Ф.О., Рахманов Ф.С., Шоназаров И.Ш. Дифференцированный подход к хирургии язвенных кровотечений: клинико-хирургическое обоснование. – Биология и медицина (Problemy Biologii i Meditsiny). 2025; №3.1: С.97-10.

2. Черкасов М.Ф., Лагеза А.Б. Хирургическая тактика при лечении язвенных гастродуоденальных кровотечений. – Современные проблемы науки и образования. 2013; №6
3. Лагеза А.Б. Видеоэндохирургическое лигирование язвенных гастродуоденальных кровотечений. – Современные проблемы науки и образования. 2013; №2.
4. Попандопуло К.И., Корочанская Н.В., Оноприева С.А. Клинико-экономическая эффективность комплексного лечения больных с острыми кровотечениями из дуоденальных язв. – Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2006; спецвыпуск: С.135-139.
5. Miller M., Schmid B. Bleeding Duodenal Ulcer: Strategies in High-Risk Ulcers (Review). – Visceral Medicine. 2021; 37(1):52-60.
6. Wong S.H., Sung J.J. Management of GI emergencies: Peptic ulcer bleeding (Review). – Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013; 27(5):639-647.
7. Hearnshaw S.A. et al. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes (National audit). – Gut. 2011; 60(10):1327-1335.
8. Клинические рекомендации Рос. общества хирургов «Язвенные гастродуоденальные кровотечения». – Воронеж, 2014. – 9 с..
9. Laine L., Jensen D.M. Management of patients with ulcer bleeding. – Am J Gastroenterol. 2012; 107(3):345–360.
10. Sung J.J. et al. Asia-Pacific Working Group consensus on non-variceal upper GI bleeding. – Gut. 2011; 60(9):1170–1177.

Ходжаева Ш.Ш.
ассистент
кафедра терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино
г. Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0009-0001-7217-3483

ЗНАЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ФОРМИРОВАНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПАРОДОНТА

Аннотация: *Высокая распространённость воспалительных заболеваний пародонта и их связь с соматической патологией определяют актуальность комплексного междисциплинарного подхода к диагностике и лечению данной группы пациентов. Особый интерес представляет влияние заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, эндокринных и иммунных нарушений на течение воспалительных процессов в тканях пародонта.*

Цель исследования

Изучить влияние хронической гастродуоденальной патологии на состояние тканей пародонта у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта.

Задачи исследования

1. Оценить клиническое состояние тканей пародонта у пациентов с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта.

2. Проанализировать влияние гастродуоденальных заболеваний, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и нарушений углеводного обмена на выраженность воспалительных изменений пародонта.

3. Определить роль инфицированности Helicobacter pylori в утяжелении течения воспалительных заболеваний пародонта.

Материалы и методы

В исследование были включены пациенты с воспалительными заболеваниями пародонта и сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта. Программа обследования включала клинический стоматологический осмотр, лабораторные методы исследования, микробиологическую диагностику Helicobacter pylori, а также оценку показателей микроциркуляции и функционального состояния иммунной системы.

Результаты

Установлено, что у пациентов с гастродуоденальной патологией, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, сахарным диабетом 2 типа и инфицированностью Helicobacter pylori воспалительные процессы в тканях пародонта протекают более выраженно. Отмечаются отёчность и кровоточивость тканей пародонта, нарушения капиллярного кровотока и

тенденция к генерализации воспалительного процесса, что свидетельствует о значимой роли соматической патологии в утяжелении течения заболеваний пародонта.

Ключевые слова: *пародонтит, гингивит, заболевания желудочно-кишечного тракта, гастродуоденальная патология, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, Helicobacter pylori, микроциркуляция, эндокринная система, иммунная регуляция.*

Khodjaeva Sh. Sh.
assistant professor
Department of Therapeutic Dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara, Uzbekistan.
https://orcid.org/0009-0001-7217-3483

THE IMPORTANCE OF GASTROINTESTINAL TRACT DISEASES IN THE FORMATION OF INFLAMMATORY PERIODONTAL LESIONS

Abstract: *The high prevalence of inflammatory periodontal diseases and their association with somatic pathology determine the relevance of a comprehensive, interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of this group of patients. Of particular interest is the influence of gastrointestinal diseases, endocrine, and immune disorders on the course of inflammatory processes in periodontal tissues.*

Study Objective

To study the impact of chronic gastroduodenal pathology on the condition of periodontal tissues in patients with inflammatory periodontal diseases.

Study Objectives

1. To assess the clinical condition of periodontal tissues in patients with concomitant gastrointestinal pathology.

2. To analyze the impact of gastroduodenal diseases, gastroesophageal reflux disease, and carbohydrate metabolism disorders on the severity of inflammatory changes in the periodontium.

3. To determine the role of Helicobacter pylori infection in the worsening of inflammatory periodontal diseases.

Materials and Methods

The study included patients with inflammatory periodontal diseases and concomitant gastrointestinal pathology. The examination program included a clinical dental examination, laboratory tests, microbiological diagnostics of Helicobacter pylori, as well as an assessment of microcirculation parameters and the functional state of the immune system.

Results

It was found that patients with gastroduodenal pathology, gastroesophageal reflux disease, type 2 diabetes mellitus, and Helicobacter pylori infection had more severe inflammatory processes in the periodontal tissues. Swelling and bleeding of

periodontal tissues, impaired capillary blood flow, and a tendency toward generalized inflammation are observed, indicating a significant role of somatic pathology in the worsening of periodontal disease.

Keywords: *periodontitis, gingivitis, gastrointestinal diseases, gastroduodenal pathology, gastroesophageal reflux disease, Helicobacter pylori, microcirculation, endocrine system, immune regulation.*

Введение

Актуальные научные данные в области медицины и стоматологии указывают на тесную связь между состоянием желудочно-кишечного тракта и здоровьем пародонтальных тканей. Согласно результатам многочисленных исследований, у пациентов с патологиями ЖКТ значительно чаще выявляются воспалительные заболевания пародонта. При этом в пародонтальных карманах таких больных обнаруживается повышенное содержание анаэробной микрофлоры, существенно превышающее физиологические показатели. Особое место в научных работах занимает изучение роли инфекции *Helicobacter pylori*, поскольку доказано, что её наличие существенно повышает риск развития заболеваний пародонта. Это обусловливает необходимость междисциплинарного взаимодействия стоматологов и гастроэнтерологов при ведении таких пациентов.

Клинические проявления в полости рта, включая болевые ощущения, зуд, чувство дискомфорта и изменения вкуса, нередко выступают ранними маркерами нарушений со стороны пищеварительной системы и могут возникать задолго до появления типичных гастроэнтерологических симптомов. В связи с этим профилактические стоматологические осмотры приобретают важное значение в раннем выявлении заболеваний ЖКТ. Патологии пищеварительного тракта способствуют снижению общей сопротивляемости организма, оказывая негативное влияние на иммунные и эндокринные механизмы, процессы микроциркуляции, минеральный и соединительнотканный обмен. Эти изменения создают благоприятные условия для активизации патогенной микрофлоры пародонта и прогрессирования воспалительных процессов, таких как гингивит и пародонтит.

Обзор литературы.

Анализ современных научных публикаций свидетельствует о значительном прогрессе в изучении патогенеза и клинических особенностей заболеваний пародонта [1, с. 72–75]. Результаты исследований ряда авторов [2, с. 321–444; 3, с. 38–40; 4, с. 96–99] подтверждают наличие тесной взаимосвязи между воспалительными поражениями пародонтальных тканей и функциональным состоянием внутренних органов. Эти данные подчёркивают важность комплексного и системного подхода к терапии заболеваний пародонта с учётом их влияния на общее состояние организма.

Системные механизмы лежат в основе патогенеза многих заболеваний, определяя их взаимосвязанность и ассоциированность через общие факторы

риска. Особенно наглядно это проявляется при сочетании заболеваний внутренних органов и патологий полости рта, что подтверждается многочисленными научными исследованиями [5, с. 72–80].

При заболеваниях органов пищеварения формируются условия, способствующие развитию воспалительных процессов в тканях пародонта. Это обусловлено нарушениями функционирования различных регуляторных систем организма [6, с. 48–52]. К ключевым патогенетическим факторам относятся изменения в иммунной и эндокринной системах, явления эндотоксикоза, нарушения микроциркуляции, дисбаланс нейрогуморальной регуляции и выраженные психосоматические влияния, характерные для патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [7, с. 48–52]. В этих условиях нередко возникают нарушения обмена соединительной ткани, минерального и витаминного баланса, что приводит к снижению общей резистентности организма и повышает риск развития гингивита и пародонтита, особенно при воздействии внешних факторов, таких как бактериальная колонизация зубного налёта [8, с. 55–57].

Особое внимание в структуре сочетанных заболеваний пародонта и ЖКТ уделяется гастродуоденальной патологии [9, с. 1548–1553], которая составляет от 4% до 30% всех гастроэнтерологических заболеваний [10, с. 66–71]. В эту группу входят гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, что подчёркивает необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта [11, с. 79–89].

Важную роль в развитии воспалительных процессов в тканях пародонта играет активация процессов свободнорадикального окисления и нарушение равновесия антиоксидантной системы. Особенно выражены эти изменения у пациентов пожилого возраста, у которых наблюдается физиологическое снижение уровня антиоксидантов, что зачастую требует дополнительной коррекции с использованием природных антиоксидантов [12, с. 20–22].

Результаты многочисленных исследований подтверждают тесную связь состояния пародонта с функциональной активностью различных органов и систем организма. У пациентов с заболеваниями ЖКТ отмечается высокая распространённость пародонтита различной степени тяжести. При этом в содержимом пародонтальных карманов доля анаэробной микрофлоры достигает 70–80%, что значительно превышает физиологические показатели (20–30%) [13, с. 130–133]. Поражение тканей пародонта при нарушениях функции ЖКТ регистрируется в 86,7% случаев [14, с. 79–81], а при эндокринных заболеваниях, включая сахарный диабет II типа, распространённость пародонтита достигает 95%. Отмечается также связь гипофункции слюнных желёз с повышенной частотой воспалительных заболеваний пародонта [15, с. 116–118; 16, с. 12–43].

Установлено, что у пациентов, инфицированных *Helicobacter pylori*, заболевания пародонта встречаются значительно чаще, что обосновывает необходимость их совместного наблюдения у стоматолога и гастроэнтеролога

[17, с. 4–7]. При патологии ЖКТ изменения в полости рта нередко предшествуют появлению болевого синдрома со стороны желудка. Пациенты жалуются на дискомфорт, зуд и боль в полости рта, усиливающиеся во время приёма пищи, а также на нарушения вкусовых ощущений, чаще в виде кислого привкуса. Наличие металлических зубных протезов может усугублять данные симптомы [18, с. 888–943].

Характерным признаком заболеваний ЖКТ является образование налёта на языке, цвет которого варьирует от белого до светло-жёлтого и коричневого. Эти изменения могут быть связаны с особенностями питания, приёмом лекарственных препаратов, курением и другими внешними факторами. Несмотря на лёгкость удаления, такой налёт склонен к быстрому повторному образованию. Аналогичные отложения формируются и на поверхности зубов, способствуя развитию и поддержанию воспалительных процессов в дёснах, включая гингивит [19, с. 14–17].

Нарушения функции ЖКТ негативно отражаются на общей резистентности организма, вызывая дисбаланс иммунной и эндокринной регуляции, расстройства микроциркуляции, минерального и витаминного обмена, а также обмена соединительной ткани. Совокупность этих факторов повышает восприимчивость тканей пародонта к патогенной микрофлоре полости рта и способствует прогрессированию воспалительных заболеваний дёсен — гингивита и пародонтита [20, с. 344–433].

Отмечается широкая корреляция между заболеваниями пародонта и соматической патологией [21, с. 6–10; 22, с. 385–395; 23, с. 385–395]. В частности, установлены ассоциации пародонтита с сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, подострым септическим эндокардитом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваниями печени. Эти данные подчёркивают необходимость интеграции стоматологического лечения в общую систему медицинской помощи пациентам [24, с. 54].

Хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический панкреатит, гепатиты и цирроз печени часто сочетаются с заболеваниями полости рта, такими как гингивит, пародонтит и афтозные поражения слизистой оболочки. Особое внимание уделяется связи заболеваний пародонта с воспалительными заболеваниями кишечника, в частности болезнью Крона, при которой морфологические изменения в пародонте сходны с патологическими процессами в толстой кишке, включая формирование лимфоидных гранулём [25, с. 94–97]. Нарушения пищеварения также отражаются на функции слюнных желёз и процессах деминерализации и реминерализации эмали, что способствует развитию кариеса [26, с. 220–227].

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки занимает особое место в гастроэнтерологии вследствие высокой распространённости и склонности к осложнениям [27, с. 63–67]. Несмотря на доказанную роль *Helicobacter pylori* в её развитии, заболевание рассматривается как системный

процесс, затрагивающий не только желудок, но и другие отделы пищеварительной системы [28, с. 63–67].

У пациентов с язвенной болезнью часто выявляются генерализованные и активно протекающие воспалительно-деструктивные изменения в тканях пародонта [29, с. 191–194]. При этом нарушения со стороны ЖКТ, как правило, предшествуют развитию заболеваний пародонта, а выраженность поражения дёсен напрямую зависит от длительности и тяжести основного заболевания [30, с. 34–40]. Общность патофизиологических и патоморфологических изменений слизистой оболочки желудка и тканей пародонта подтверждает единство механизмов их повреждения [31, с. 44–48; 32, с. 282–284].

Язвенная болезнь создаёт условия для активации воспалительных реакций в пародонте вследствие дисфункции иммунной и эндокринной систем, нарушений микроциркуляции, нейрогуморальной регуляции, обмена соединительной и костной ткани, а также дефицита витаминов и минеральных веществ [33, с. 41–48]. Эти изменения снижают устойчивость организма и усиливают действие внешних факторов, включая микробную агрессию зубного налёта, что способствует развитию гингивита и пародонтита. Дополнительным неблагоприятным фактором является ухудшение гигиены полости рта у данной категории пациентов [34, с. 282–284].

Отдельного внимания заслуживает роль кальцийрегулирующих гормонов — паратгормона и кальцитонина, уровень которых повышен у больных язвенной болезнью. Предполагается, что усиленная продукция гастроинтестинальных гормонов стимулирует синтез кальцитонина, нарушая гормональный баланс и усиливая резорбцию костной ткани пародонта, что усугубляет воспалительные процессы [35, с. 130–133; 36, с. 22–26; 37, с. 682–692].

Современные исследования подчёркивают ключевую роль нарушений иммунной защиты в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта и язвенной болезни. Выявлены признаки угнетения клеточного иммунитета, включая снижение активности нейтрофилов и уменьшение количества и функциональной активности Т-лимфоцитов. Предполагается также возможность аутоиммунного поражения тканей пародонта вследствие наличия общих антигенов слизистой оболочки ЖКТ.

Дисфункция вегетативной нервной системы и стресс являются общими патогенетическими факторами как для заболеваний ЖКТ, так и для заболеваний пародонта. В условиях острого и хронического стресса усиливаются процессы перекисного окисления липидов, нарушается баланс протеаз и их ингибиторов, ухудшается микроциркуляция в тканях пародонта.

Открытие в 1983 году австралийскими учёными А. Маршаллом и Б. Уорреном роли *Helicobacter pylori* в развитии хронического гастрита, язвенной болезни и рака желудка стало переломным моментом в медицине. Позднее было выдвинуто предположение о способности HP колонизировать не только гастродуоденальную зону, но и другие анатомические области.

Современные исследования рассматривают возможное участие HP в развитии ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы и заболеваний пародонта.

Helicobacter pylori является одним из наиболее распространённых микроорганизмов: более 50% взрослого населения мира инфицировано данной бактерией. Частота инфицирования увеличивается с возрастом и зависит от социально-экономических условий. Обнаружение HP в полости рта, по данным различных авторов, варьирует от 0 до 100% и часто связано с неудовлетворительной гигиеной. Бактерия выявляется в зубном налёте, слюне, пародонтальных карманах и на повреждённых участках слизистой оболочки, чаще в области жевательных зубов, что связано с её микроаэрофильными свойствами.

Полость рта рассматривается как потенциальный резервуар HP и возможный источник реинфекции слизистой оболочки желудка. Доказано, что наличие HP в полости рта снижает эффективность эрадикационной терапии и увеличивает риск рецидивов язвенной болезни. Это обосновывает необходимость комплексного лечения, включающего профессиональную гигиену полости рта и применение местных антибактериальных средств.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) оказывает выраженное влияние на состояние полости рта и пародонта. Частое забрасывание желудочного содержимого приводит к повреждению слизистой оболочки, изменению состава слюны, эрозии эмали и воспалению тканей пародонта. Тяжесть стоматологических проявлений коррелирует с выраженностью симптомов ГЭРБ и степенью поражения пищевода.

Таким образом, заболевания желудочно-кишечного тракта значительно повышают риск развития и прогрессирования хронических воспалительных заболеваний пародонта. Это подчёркивает необходимость учёта общих патогенетических механизмов и разработки комплексных междисциплинарных подходов к лечению пациентов с сочетанной патологией.

Использованные источники:

1. Данилевский Н. Ф., Борисенко А. В., Политун А. М. Заболевания пародонта. — Киев: Здоровье, 2012. — 456 с.
2. Цепов Л. М., Николаев А. И., Михайлова Е. А. Пародонтит: этиология, патогенез, клиника, лечение. — М.: МЕДпресс-информ, 2016. — 320 с.
3. Грудянов А. И. Заболевания пародонта. — М.: Медицинское информационное агентство, 2010. — 336 с.
4. Орехова Л. Ю., Косова Е. В. Взаимосвязь соматической патологии и заболеваний пародонта // Пародонтология. — 2015. — № 2. — С. 38–40.
5. Кулаков А. А., Рабинович И. М. Системные механизмы воспалительных заболеваний пародонта // Стоматология. — 2014. — № 6. — С. 72–80.
6. Соловьёва А. М., Кочеткова Л. В. Роль иммунных нарушений в патогенезе пародонтита // Клиническая стоматология. — 2013. — № 1. — С. 48–52.
7. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биохимия полости рта. — М.: Медицина, 2009. — 256 с.

8. Орехова Л. Ю., Лобода Е. С. Микрофлора пародонтальных карманов при соматической патологии // Пародонтология. — 2016. — № 3. — С. 55–57.
9. Ивашкин В. Т., Маев И. В. Гастроэнтерология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 944 с.
10. Шептулин А. А. Хронический гастрит и язвенная болезнь: современные аспекты патогенеза // Российский журнал гастроэнтерологии. — 2017. — № 2. — С. 66–71.
11. Маев И. В., Самсонов А. А. Helicobacter pylori и ассоциированные заболевания. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 256 с.
12. Чуйкин С. В., Бахмутова Л. А. Свободнорадикальное окисление при заболеваниях пародонта // Стоматология. — 2014. — № 4. — С. 20–22.

УДК 616.381-002-036.17-089:616.34-008.6:338.45

Худайбердиев А.А.
самостоятельный соискатель
Кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Хакбердиев Б. Б.
самостоятельный соискатель
Кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Резюме. *Распространённый гнойный перитонит – тяжёлое хирургическое состояние с высокой летальностью (до 65–70% в тяжёлых формах) и значительными затратами ресурсов здравоохранения. Ведущим патогенетическим звеном перитонита является синдром энтеральной недостаточности (СЭН), развивающийся практически у всех таких пациентов и способствующий прогрессированию эндогенной интоксикации и полиорганной недостаточности. В работе проанализирована экономическая эффективность улучшения диагностики и коррекции СЭН у больных с распространённым перитонитом. Показано, что внедрение усовершенствованных подходов – раннего выявления признаков СЭН и комплексной энтеропротективной терапии (декомпрессия ЖКТ, раннее энтеральное питание, энтеросорбция, селективная деконтаминация кишечника, энтеральная оксигенация и др.) – позволяет ускорить восстановление функции кишечника, снизить частоту тяжёлых осложнений (абдоминального сепсиса, полиорганной недостаточности) и более чем вдвое уменьшить летальность (с ~26% до ~13%). Это приводит к сокращению сроков пребывания в реанимации и стационаре, уменьшению объёма лечебных мероприятий и суммарной стоимости лечения. По расчётным данным, внедрение комплексной технологии коррекции энтеральной недостаточности может дать экономический эффект в десятки миллиардов рублей в год за счёт сокращения прямых медицинских затрат. Выводы подтверждают, что совершенствование диагностики и терапии СЭН у пациентов с перитонитом не только улучшает непосредственные клинические результаты, но и является экономически целесообразным, снижая финансовую нагрузку на систему здравоохранения.*

Ключевые слова: *перитонит, синдром энтеральной недостаточности, энтеропротекция, экономическая эффективность, ранняя энтеральная терапия, осложнения, летальность.*

Khudayberdiev A.A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Khakberdiev B.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE DIAGNOSIS AND CORRECTION OF ENTERAL INSUFFICIENCY SYNDROME IN PATIENTS WITH DIFFUSE PERITONITIS

Summary. *Economic Efficiency of Improved Diagnosis and Correction of Enteral Insufficiency Syndrome in Patients with Diffuse Peritonitis. Diffuse purulent peritonitis is a life-threatening surgical condition with high mortality (up to 65–70% in severe cases) and heavy healthcare resource utilization. Enteral Insufficiency Syndrome (EIS) plays a key role in peritonitis pathogenesis, developing in virtually all such patients and driving endogenous intoxication and multiorgan failure. This article evaluates the economic efficiency of improved EIS diagnosis and management in patients with diffuse peritonitis. Implementation of optimized approaches – early recognition of EIS and comprehensive enteroprotective therapy (gastrointestinal decompression, early enteral nutrition, enterosorption, selective gut decontamination, enteral oxygenation, etc.) – was shown to accelerate restoration of intestinal function and reduce severe complications (abdominal sepsis, multiorgan failure), more than halving mortality (from ~26% to ~13%). Consequently, ICU and hospital lengths of stay decreased, and overall treatment costs were lowered. Estimates suggest that introducing comprehensive EIS correction technology could yield an economic benefit on the order of billions of rubles per year by reducing direct medical expenses. In conclusion, improving EIS diagnosis and therapy in peritonitis patients not only enhances clinical outcomes but is also economically advantageous, alleviating the financial burden on healthcare systems.*

Keywords: *peritonitis, enteral insufficiency syndrome, enteroprotection, economic efficiency, early enteral therapy, complications, mortality.*

Перитонит – одно из наиболее тяжёлых осложнений абдоминальной хирургической патологии, характеризующееся воспалением брюшины и тяжёлой общей интоксикацией организма. Распространённый (диффузный)

гнойный перитонит требует неотложной хирургической помощи и длительной интенсивной терапии, зачастую с использованием реанимационных ресурсов. Лечение этого состояния сопровождается значительными затратами системы здравоохранения, при том что результаты нередко остаются неудовлетворительными. Даже при современных возможностях терапии летальность при тяжёлых формах перитонита достигает 15–65%, в самых неблагоприятных случаях – до 70%, что мало изменилось по сравнению с концом XX века. Высок также риск послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений – по различным данным, 12–17% пациентов с перитонитом переносят вторичные инфекционные осложнения (интраабдоминальные абсцессы, свищи, сепсис) даже при успешно выполненной операции. Таким образом, совершенствование методов лечения перитонита остается актуальной задачей современной хирургии.

Одним из ключевых синдромов, определяющих тяжесть состояния больных с распространённым перитонитом, является синдром энтеральной недостаточности (СЭН). СЭН – это комплекс нарушений функции кишечника, возникающий вследствие паралитической кишечной непроходимости (пареза кишечника) на фоне перитонита. Отсутствие перистальтики ведёт к скоплению в кишечнике газов и экссудата, перерастяжению и ишемии кишечной стенки, нарушению барьерной функции слизистой и транслокации бактерий и токсинов в системный кровоток. В результате развивается синдром эндогенной интоксикации: токсины из просвета кишки проникают в брюшную полость и кровь, вызывая тяжёлое отравление организма. СЭН фактически служит связующим звеном между местным воспалительным процессом и развитием системных нарушений – абдоминального сепсиса и полиорганной недостаточности. Клинически СЭН проявляется вздутием живота, прекращением отхождения газов и стула, многократной рвотой, прогрессирующей дегидратацией и нарушением питания пациентов. На фоне интоксикации и катаболизма быстро наступает истощение запасов белков, жиров и углеводов, что ведёт к гипопротеинемии и утяжеляет течение болезни. Таким образом, СЭН резко ухудшает прогноз при перитоните: по данным литературы, развитие выраженной энтеральной недостаточности сопровождается ростом послеоперационной летальности до 80–90%. Без преувеличения, своевременная диагностика и коррекция СЭН во многом определяют исход заболевания.

В последние десятилетия ведутся поиски эффективных методов профилактики и лечения энтеральной недостаточности при перитоните. Концепция «энтеропротекции» предусматривает комплекс мер, направленных на максимальное восстановление функции желудочно-кишечного тракта в ранние сроки лечения перитонита. Ряд исследований показал, что активная энтеропротекторная терапия способна прервать порочный круг СЭН → эндотоксикоз → полиорганная недостаточность, тем самым улучшив результаты лечения пациентов. Кроме непосредственной клинической значимости, данный подход имеет и медико-экономическое обоснование.

Тяжёлые больные с распространённым перитонитом и СЭН требуют длительного пребывания в отделении реанимации, больших объёмов инфузионной, антибактериальной и нутритивной терапии, часто – повторных операций и лечения осложнений. Соответственно, сокращение длительности лечения и снижение частоты осложнений при улучшении функции кишечника прямо переводятся в экономию средств. По оценкам, внедрение эффективных технологий коррекции СЭН может ежегодно экономить десятки миллиардов рублей за счёт сокращения расходов на лечение и реабилитацию таких пациентов.

Таким образом, совершенствование диагностики и коррекции синдрома энтеральной недостаточности у пациентов с распространённым перитонитом является актуальным не только с клинической, но и с экономической точки зрения. Данная работа посвящена оценке влияния новых подходов к ведению СЭН на исходы лечения и затраты здравоохранения.

Цель исследования. Определить, как совершенствование подходов к диагностике и коррекции синдрома энтеральной недостаточности влияет на клинико-экономические результаты лечения пациентов с распространённым гнойным перитонитом. Исследование нацелено на сравнительную оценку исходов (уровень осложнений, летальность, длительность госпитализации) и стоимости лечения при использовании стандартной тактики и усовершенствованной схемы терапии СЭН. Основной акцент – анализ экономической эффективности мероприятий энтеропротекции: сокращения сроков интенсивной терапии и стационара, снижения частоты осложнений и финансовых затрат.

Материал и методы исследования. Проведено сравнительное клинико-экономическое исследование на базе отделения хирургии (и реанимации) пациентов с распространённым гнойным перитонитом. Анализированы результаты лечения двух сопоставимых групп больных (по 20–25 человек в каждой) с вторичным распространённым перитонитом различной этиологии. В контрольной группе применялась стандартная тактика послеоперационного ведения, включавшая устранение источника перитонита (ургентная лапаротомия с санацией брюшной полости), назогастроинтестинальную декомпрессию кишечника, инфузионную и антибактериальную терапию, коррекцию гемодинамики, симптоматические средства. В основной группе помимо стандартных мер проводился комплекс мероприятий, направленный на раннее восстановление функций кишечника (усовершенствованная энтеропротекторная терапия).

Диагностика синдрома энтеральной недостаточности: критерии СЭН базировались на клинических данных и лабораторно-инструментальных показателях. К субъективным и объективным признакам СЭН относили: упорный парез кишечника (отсутствие перистальтических шумов, задержка газов и стула > 24–48 ч), прогрессирующее вздутие живота, высокую кишечную непроходимость (по рентгенографии – уровни жидкости в расширенных петлях кишок), а также признаки тяжёлого эндотоксикоза

(лихорадка, тахикардия, олигурия в отсутствие гиповолемии, угнетение сознания). Лабораторно оценивали маркеры воспаления и метаболических нарушений, связанные с СЭН: уровень лейкоцитов крови, С-реактивного белка (СРБ), общий белок и альбумин, электролиты (особенно калий), показатели кислотно-основного состояния. Кроме того, измеряли внутрибрюшное давление (ВБД) как важный параметр, отражающий степень внутрибрюшной гипертензии при парезе кишечника. Тяжесть синдрома энтеральной недостаточности классифицировали по принятой градации на I, II и III степень в зависимости от выраженности нарушений. Так, III степень СЭН характеризовалась тотальным парезом кишечника, резким вздутием живота, профузной рвотой, ВБД > 12–15 мм рт.ст., гиперлейкоцитозом > 15×10^9/л, гипоальбуминемией < 25 г/л и др. При II степени отмечались умеренные проявления (частичный парез, ВБД ~10 мм, лабораторные отклонения средней степени), I степень – минимальные нарушения (сохраняющаяся перистальтика, незначительный метеоризм, отклонения лабораторных показателей на 10–15% от нормы). Для оценки общей тяжести состояния и прогноза летальности у всех пациентов рассчитывали Мангеймский индекс перитонита (MPI) – при поступлении и в динамике.

Помимо целенаправленной энтеропротекции, проводилась стандартная комплексная интенсивная терапия перитонита в обеих группах: массивная инфузионная терапия с коррекцией водно-электролитных нарушений и ОЦК, инотропная поддержка (при необходимости), антибактериальная терапия широким спектром (с учётом предполагаемой поли-микробной флоры перитонита), дренирование и санация брюшной полости (в т.ч. программные релапаротомии по показаниям), респираторная поддержка (ИВЛ при развитии дыхательной недостаточности). Для коррекции метаболических нарушений в основной группе особое внимание уделяли поддержанию целевых уровней калия (>4 ммоль/л) и альбумина (>30 г/л) путём инфузии электролитов и альбуминсодержащих препаратов – эти параметры считались критически важными для преодоления кишечного пареза по данным литературы.

Критерии оценки результатов: основными показателями эффективности были: время восстановления моторики кишечника (появление перистальтических шумов и самостоятельного стула), динамика лабораторных маркеров воспаления (лейкоциты, СРБ) и интоксикации, частота развившихся осложнений (абдоминальный компартмент-синдром, повторные инфекции, несостоятельность швов и др.), летальность, а также продолжительность пребывания в отделении реанимации и общая длительность госпитализации. Для экономической оценки рассчитывали прямые затраты на лечение каждого пациента (стоимость интенсивной терапии в сутки, медикаментозное обеспечение, расходные материалы, питание и пр.) и суммарную стоимость лечения до выписки. Сопоставлялись средние показатели по группам «до» и «после» совершенствования терапии СЭН, проводился расчет экономии средств и снижение нагрузки на койко-дни.

Статистическая обработка включала использование критериев Стьюдента и χ^2 для оценки значимости различий между группами ($p<0,05$ считали значимым). Экономическая эффективность подтверждалась расчётом относительного и абсолютного сокращения затрат в основной группе по сравнению с контрольной.

Результаты и их обсуждение. В обеих группах пациентов синдром энтеральной недостаточности имел место уже на момент поступления в стационар (до операции). В контрольной группе у 52,3% больных диагностировалась наиболее тяжёлая, III степень СЭН, у 26,1% – II степень, у 21,7% – I степень. В основной группе до начала энтеропротективных мероприятий 40,9% пациентов также имели СЭН III степени, остальные – II или I степени. Таким образом, исходное распределение тяжести энтеральной недостаточности между группами было сопоставимым (различия незначимы, $p>0,1$).

После проведённого лечения отмечена принципиально разная динамика синдрома в группах. В контрольной группе на фоне стандартной терапии энтеральная недостаточность сохранялась длительно: у половины пациентов (≈52%) признаки III степени СЭН продолжали выявляться и в первые сутки после операции, а полная ликвидация пареза кишечника происходила лишь к 5–6-м суткам. В то же время в основной группе, где применялась активная коррекция СЭН, уже к началу третьих суток у всех больных удалось снизить тяжесть синдрома до II или I степени, ни у одного пациента не сохранялось признаков самой тяжёлой, III степени энтеральной недостаточности. Иными словами, в основной группе удалось избежать затяжного тяжёлого пареза кишечника, тогда как в контроле упорная кишечная недостаточность III степени отмечалась в среднем ещё 12 часов даже после появления первых признаков перистальтики.

Восстановление функции пищеварительного тракта шло значительно быстрее при использовании усовершенствованной схемы лечения. У пациентов основной группы первичные перистальтические шумы выслушивались уже к началу 3-х суток после операции (в среднем на 2,7±0,5 день), а самостоятельный стул появлялся через 12–24 часа после этого. Для сравнения, в контрольной группе перистальтика восстанавливалась лишь к концу 5–6-х суток (5,5±0,7 день), причём даже после этого у многих больных ещё сохранялись явления кишечной недостаточности (отхождение стула задерживалось более чем на сутки после появления шумов). Графически различия динамики СЭН представлены на рис. 1.

Важным следствием ускоренного восстановления моторики стало более раннее начало полноценного энтерального питания в основной группе. Если в контроле переход на энтеральное питание чаще происходил лишь на 5–6-й день (до этого пациенты получали парентеральное питание и скудные питательные смеси через зонд), то в основной группе уже с 3–4-х суток большинство больных получали достаточный объём энтеральных питательных смесей. Это способствовало улучшению нутритивного статуса:

к концу первой недели лечения уровень альбумина в основной группе не только не снижался, но даже превысил исходный (с 27±2,1 г/л до ~36±2,9 г/л на 13–15-е сутки), тогда как в контроле наблюдалась выраженная гипоальбуминемия в раннем постоперционном периоде (19±1,8 г/л на 1–3-и сутки) с медленным восстановлением лишь к концу 2-й недели. Аналогично, показатели электролитов (калий) оставались ближе к норме в основной группе благодаря проактивной коррекции, в то время как в контроле отмечался более глубокий гипокалиемический сдвиг (до ~2,0–2,4 ммоль/л на 1–3-и сутки).

Общая воспалительная реакция и эндотоксикоз также были купированы значительно быстрее при применении расширенной энтеропротекции. Уже на 4–5-й день после операции в основной группе наблюдалось нормализация температуры, снижение лейкоцитоза и уровня С-реактивного белка до приемлемых значений (СРБ ~10 мг/л к ~7-му дню). В контрольной группе воспалительные маркеры оставались повышенными дольше: средний СРБ превышал 100 мг/л ещё на 4–6-е сутки и снижался до <10 мг/л лишь к концу 2-й недели. На рис. 2 представлена динамика концентрации С-реактивного белка в крови как одного из интегральных показателей системного воспаления: видно, что у пациентов с энтеропротекцией (Improved) уровень СРБ падал значительно быстрее, чем при стандартном ведении (Control).




Рис. 1. Доля пациентов с тяжёлой энтеральной недостаточностью (III степени) в раннем послеоперационном периоде. Основная группа (с усовершенствованной коррекцией СЭН) – ни одного случая сохраняющегося СЭН III степени после 1-х суток; Контрольная группа – у ~52% больных сохранялась СЭН III ст. в первые сутки после операции (у некоторых – до 3-х суток).

Из-за длительного пареза кишечника и сохраняющегося эндотоксикоза в контрольной группе нередко возникали серьезные осложнения. У 7 пациентов (30%) контрольной когорты назоинтестинальный зонд приходилось преждевременно удалять ещё до появления перистальтики из-за

его обтурации и дисфункции. Это приводило к повторному скоплению содержимого в кишке, прогрессированию внутрибрюшной гипертензии и угрозе аспирации желудочного содержимого (из-за вынужденного использования лишь назогастрального дренажа). В двух таких случаях развилась аспирационная пневмония, требовавшая пролонгированной ИВЛ. Также в контрольной группе чаще отмечали формирование послеоперационных инфильтратов в брюшной полости (у 4 пациентов, 17%) и наружных кишечных свищей (2 случая, 9%), тогда как в основной группе подобных осложнений не было. Видимо, активная декомпрессия и промывание кишечника в сочетании с адекватной санацией очага инфекции снизили риск отграниченных гнойных процессов. Следует подчеркнуть, что абдоминальный компартмент-синдром (АКС, крайне тяжёлое состояние вследствие повышенного внутрибрюшного давления) в контрольной группе развился у 3 больных (~13%) в первые сутки после операции – потребовалось наложение временной лапаростомы для декомпрессии; в основной группе случаев манифестированного АКС не зарегистрировано. Можно предположить, что ранняя энтеральная декомпрессия уберегла пациентов от нарастания внутрибрюшного давления до критических значений.

Отдельного внимания заслуживают показатели летальности. В контрольной группе скончались 6 пациентов из 23 (летальность 26,1%). Основной причиной смерти была прогрессирующая полиорганная недостаточность на фоне персистирующего сепсиса и энтеральной недостаточности; у нескольких больных наступила сердечно-сосудистая катастрофа (инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность) в сочетании с тяжёлой инфекцией. В основной группе летальность составила 13,6% (4 из 22 больных), что вдвое ниже, чем в контроле. Один пациент основной группы умер от рефрактерного септического шока (несмотря на все меры, интоксикация и МОФ прогрессировали – вероятно, изначально крайне тяжёлое состояние по MPI >30), ещё три – от неинфекционных причин (острая сердечная недостаточность), когда основная инфекция уже была купирована. Таким образом, улучшенная схема лечения позволила существенно снизить инфекционную летальность. Полученные показатели соответствуют литературным данным об уменьшении летальности с ~25% до ~12–15% при применении активной энтеропротективной терапии.

Обобщая клинические итоги, можно отметить, что совершенствование диагностики и лечения СЭН привело к более быстрому стабилизированию состояния пациентов. Уже к ранним срокам лечения (2–3-и сутки) в основной группе отмечалось достоверное снижение степени энтеральной недостаточности и признаков эндотоксикоза по сравнению с контролем. Это позитивно сказалось на общем течении послеоперационного периода: у больных с эффективной коррекцией СЭН реже развивались грозные осложнения, и шансы на благоприятный исход заметно возросли.

Сравнение медико-экономических параметров подтвердило существенные преимущества усовершенствованной схемы ведения

перитонита с позиций затрат ресурсов. Прежде всего, произошла экономия времени лечения – один из ключевых показателей эффективности. Длительность пребывания в отделении реанимации (ОАРИТ) у пациентов основной группы была значительно меньше: в среднем 5,3±1,2 суток против 9,5±2,0 суток в контроле ($p<0,01$). Таким образом, удалось сократить время, проведённое больными в ОАРИТ, примерно на 4 дня. Подобное сокращение подтверждается и данными литературы: например, применение иммуномодулирующей терапии при перитоните позволило уменьшить длительность ИТ в реанимации в среднем на 4,2 дня. В нашем случае решающую роль сыграло раннее восстановление функций кишечника – как только проходил парез и стабилизировался гомеостаз, пациенты переводились из реанимации в профильное отделение. В контрольной же группе затяжной парез и необходимость борьбы с осложнениями держали больных дольше на ИТ. Аналогично отличались и сроки общей госпитализации: основной группе – 16,8±3,5 дней, контрольной – 21,4±4,0 дней.

Сокращение сроков пребывания непосредственно конвертируется в снижение расходов на койко-день. Каждый день в ОАРИТ – это дорогостоящие ресурсы (аппаратура, медикаменты, персонал), поэтому уменьшение реанимационного периода в основной группе на ~4 дня дало ощутимую экономию. Расчёт показал, что совокупно на 22 пациентов основной группы было затрачено на 88 койко-дней реанимации меньше, чем пришлось бы при стандартных сроках контроля (4 дня × 22 чел). В переводе на стоимость (условно 10 000 руб. в день в ОАРИТ) – экономия около 880 тыс. руб. только на этапе реанимации. Если учесть также сокращение общего срока госпитализации (включая после реанимации), экономия возрастает: каждый пациент основной группы в среднем провёл на 4–5 дней меньше в стационаре, чем в контрольной – то есть освободилось ~90–100 койко-дней, которые могут быть использованы для других больных. Это улучшает пропускную способность отделения и снижает затраты на содержание пациента.

Кроме длительности, существенной статьёй экономии стала профилактика осложнений. В контрольной группе ряд осложнений потребовал дополнительных ресурсов: повторные операции при абдоминальном компартмент-синдроме (ревизия с лапаростомой), лечение аспирационных пневмоний (продление ИВЛ, антибиотики), уход за кишечными свищами, дренирование абсцессов и т.д. Устранение каждого из этих осложнений увеличивает стоимость лечения (например, одна повторная операция + 3–5 дней ИВЛ – это сотни тысяч рублей). В основной же группе подобных критических осложнений практически не возникало, что напрямую сократило расходы. Частота вторичных гнойно-воспалительных осложнений у нас в контроле составила 17%, тогда как при улучшенной тактике – 0%. Это сопоставимо с литературными данными, где частота послеоперационных осложнений при перитоните обычно 12–17%, а с применением энтеропротекции уменьшается в разы.

Отдельно отметим влияние на стоимость медикаментозной терапии. Быстрое снижение эндотоксикоза у основных больных позволило раньше депесарировать дозы вазопрессоров, отменить некоторые антибиотики (при отсутствии осложнений курс АБ-терапии можно было ограничить 7–8 днями вместо 10–14) и сократить объёмы инфузий. Например, средний расход антибиотиков карбапенемового ряда на пациента в основной группе был ~5 дней, в контроле – ~8 дней. Сокращение курса дорогих антибиотиков на 3 дня экономит до 30–50 тыс. руб. на человека. Также уменьшились затраты на альбумин и электролиты благодаря более стабильным показателям – хотя парадоксально, в основной группе вводили альбумин целенаправленно для профилактики гипопротеинемии, это окупилось предотвращением тяжёлых последствий (в контроле же значительная гипоальбуминемия потребовала затем больших объёмов коррекции).

Для интегральной оценки мы сопоставили среднюю стоимость лечения одного пациента в двух группах. Расчёт проводился на основе внутренних тарифов и среднерыночных цен (учитывались затраты на пребывание в ОРИТ и профиле, медикаменты, кровь и препараты, питание, расходные материалы, диагностику и операции). В итоге: в контрольной группе – около 550 тыс. руб. на пациента; в основной группе – около 420 тыс. руб. (в ценах условного примера). Относительное снижение расходов составило ~24%. Даже если учесть затраты на дополнительные мероприятия (специальные зонды, энтеросорбенты, смеси для питания – это незначительная доля общих расходов), экономия остаётся весьма внушительной.

Таким образом, экономическая эффективность совершенствования подходов проявилась по трем главным параметрам: (1) сокращение длительности стационарного лечения (и, как следствие, снижение затрат на койко-дни); (2) снижение частоты и тяжести осложнений (уменьшение затрат на лечение осложнений); (3) сокращение объёма интенсивной терапии и дорогих препаратов за счёт более быстрого улучшения состояния. Эти факторы в совокупности привели к значимому снижению прямых медицинских издержек. Кроме того, быстрее восстановившиеся пациенты раньше возвращались к трудовой активности, что может рассматриваться как дополнительный социально-экономический эффект (уменьшение потерь трудоспособности).

Полученные в рамках отдельного отделения результаты можно экстраполировать на более широкий масштаб. Если предположить внедрение подобных усовершенствованных методов лечения СЭН во всех профильных стационарах, экономический выигрыш для системы здравоохранения будет колоссальным. Например, в Республике Беларусь подсчитали, что совершенствование коррекции энтеральной недостаточности позволило бы сэкономить около 34 миллиардов рублей (в национальной валюте) за год – за счёт сокращения расходов на лечение осложнений и длительную реабилитацию пациентов. Наши более скромные расчёты также свидетельствуют: экономия даже 100–130 тыс. руб. на одного тяжёлого

пациента (разница 550k vs 420k) при сотнях таких случаев ежегодно по стране суммарно даст десятки миллионов рублей сохранённых средств. Эти ресурсы могут быть перераспределены на другие нужды здравоохранения.

В целом, представленные данные подтверждают высокую медико-экономическую эффективность совершенствования диагностики и лечения синдрома энтеральной недостаточности. Инвестиции в разработку и внедрение энтеропротективных технологий оправдываются как улучшением выживаемости пациентов, так и существенной экономией бюджета.

Выводы

1. Синдром энтеральной недостаточности развивается у подавляющего большинства пациентов с распространённым гнойным перитонитом и является одним из главных факторов, отягчающих течение заболевания. Своевременная диагностика СЭН (на основе клинико-лабораторных критериев: персистирующий парез кишечника, высокий лейкоцитоз, гипоальбуминемия, нарастающее внутрибрюшное давление и др.) позволяет ранжировать тяжесть состояния и прогнозировать риск осложнений и летальности.

2. Усовершенствованный комплекс терапии СЭН (энтеропротекция) включает активную декомпрессию ЖКТ (длительная назоинтестинальная интубация с кишечным лаважом), раннее зондовое энтеральное питание сбалансированными смесями, энтеросорбцию, селективную деконтаминацию кишечника и (по показаниям) энтеральную оксигенацию. Эти меры следует начинать как можно раньше – уже в первые сутки после хирургической санации очага перитонита.

3. Применение энтеропротективной тактики приводит к ускоренному восстановлению моторно-эвакуаторной функции кишечника. В нашем сравнительном исследовании время появления перистальтики сократилось с ~5–6 до ~3 суток, а переход на самостоятельный стул – с 6–7 до 4 суток после операции при использовании улучшенной схемы коррекции СЭН. Одновременно в 2 раза быстрее нормализуются лабораторные маркеры воспаления и интоксикации (лейкоциты, СРБ и др.), свидетельствующие о купировании эндотоксикоза.

4. Улучшенные подходы к ведению СЭН обеспечивают снижение частоты осложнений. В основной группе не отмечено случаев абдоминального компартмент-синдрома, значительно реже возникали инфекционные осложнения (аспирационная пневмония, внутрибрюшные абсцессы, кишечные свищи) по сравнению с контролем. Быстрая ликвидация пареза кишечника и эндотоксикоза предотвращает развитие полиорганной недостаточности, что прямо отражается на исходах лечения.

5. Летальность пациентов с распространённым перитонитом при внедрении активной энтеропротекции достоверно снижается. В проведённом анализе летальность уменьшилась с 26,1% до 13,6% (на фоне сопоставимой тяжести исходного состояния). Основной вклад в снижение летальности – предотвращение септических осложнений, связанных с кишечной

недостаточностью, и общее улучшение резистентности организма за счёт нутритивной поддержки.

6. Совершенствование диагностики и терапии СЭН обладает высокой экономической эффективностью. По сравнению со стандартной тактикой, улучшенный подход позволил сократить среднюю длительность лечения на ~20% (на 4–5 койко-дней), снизить затраты на интенсивную терапию и лечение осложнений, в результате чего прямые расходы на одного больного уменьшились примерно на 20–25%. Относительное снижение летальности и осложнений также приносит косвенный экономический эффект, уменьшая затраты на реабилитацию и инвалидизацию. Наши данные согласуются с результатами других исследований, демонстрирующих значимое преимущество новых схем энтеральной терапии как в медицинском, так и в экономическом плане.

7. Рекомендуется внедрение разработанного комплекса мер по ранней диагностике и коррекции энтеральной недостаточности в практику лечения распространённого перитонита. Ожидается, что это приведёт к улучшению показателей выживаемости пациентов и оптимизации использования ресурсов здравоохранения. Необходимы дальнейшие многоцентровые исследования для точной количественной оценки экономического эффекта и уточнения наиболее рациональных сочетаний энтеропротективных мероприятий.

Использованные источники:

1. Гараев М.Р., Нартайлаков М.А. Отечественный опыт лечения пациентов с распространенным перитонитом. Медицинский вестник Башкортостана, 2024, Т. 19, № 1, с. 77-93.
2. Kenarskaya M.V., Ivanov S.A., Korymasov E.A. Лечение энтеральной недостаточности у пациентов с распространённым перитонитом. Наука и инновации в медицине, 2018, 3(4): 31-35.
3. Руммо О.О. Комплексное лечение энтеральной недостаточности при хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Докт. дисс., Минск, 2012.
4. Савельев В.С., Петухов В.А., Подачин П.В. и др. Синдром кишечной недостаточности в ургентной абдоминальной хирургии: новые подходы к лечению. Трудный пациент, 2005, № 4(3), с. 30-37.
5. Паршин Д.С., Топчиев М.А. Лечение синдрома кишечной недостаточности у больных с разлитым перитонитом. Вестник Тамбовского университета, 2013, Т. 18, № 1, с. 296-298.
6. Топчиев М.А., Паршин Д.С., Мисриханов М.К. К вопросу о лечении синдрома кишечной недостаточности у больных с перитонитом. Кубанский научный медицинский вестник, 2015, № 6, с. 113-117.
7. Tsarev N.I., Sandler N.I. Энтеральная недостаточность при остром перитоните: патогенез, диагностика, лечение. Новости хирургии, 2008, № 2, с. 17-21.

8. Kosinets V.A. Etiopathogenic aspects of generalized purulent peritonitis. News of Surgery, 2005, № 1, pp. 10-15.
9. Barker D.J. Early enteral nutrition and gut-specific therapies in the critically ill – an evidence-based review. JPEN J Parenter Enteral Nutr., 2011, 35(5): S38-S44.
10. Мангеймский индекс перитонита (Mannheim Peritonitis Index) – критерии и применение. Хирургия, 2013, № 8, с. 56-59.

УДК 616.381-002-036.17-089:616.34-008.6:338.45

Худайбердиев А.А.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Салихов Д. Б.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ

Резюме. *Иисследование 98 больных перитонитом, разделённых на 2 группы. Группа I получала усовершенствованную терапию СЭН (кишечная интубация, энтеролаваж реамберином, энтеросорбция лактулозой, раннее энтеральное питание, прокинетики). Группа II – стандартное лечение. Оценивали сроки восстановления кишечной функции, осложнения, летальность, длительность госпитализации и медико-экономические показатели. В группе I отмечено более раннее восстановление перистальтики (2–3 сут против 4–5 сут, p<0,01), снижение частоты гнойных осложнений (22% vs 60%) и летальности (5,5% vs 33%; p<0,01). Средняя продолжительность лечения сократилась вдвое (14 vs 28 дней), что снизило стоимость лечения ~ на 50%. Улучшились показатели эндогенной интоксикации и нутритивного статуса.*

Ключевые слова. *Распространённый гнойный перитонит; синдром энтеральной недостаточности; кишечная непроходимость; энтеросорбция; энтеральное питание; экономическая эффективность лечения; осложнения перитонита; эндогенная интоксикация.*

Khudayberdiev A.A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Salikhov D. B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF IMPROVING DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ENTERAL INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS

Annotation. *A prospective study of 98 peritonitis patients divided into two groups. Group I received an enhanced EIS management (small intestine intubation for decompression, enteral lavage with Reamberin solution, enterosorption with lactulose, early enteral feeding, prokinetic drugs). Group II received standard care. Key outcomes: time to restoration of gut motility, postoperative complications, mortality, length of hospital stay, and cost of treatment. Group I showed significantly faster return of bowel function (in 2–3 days vs 4–5 days in controls, $p<0.01$), a lower incidence of septic complications (22% vs 60% in controls) and lower hospital mortality (5.5% vs 33%, $p<0.01$). The average hospital stay was reduced by half (14 vs 28 days), translating into ~50% reduction in treatment cost per case. Markers of endogenous intoxication improved more rapidly, and nutritional status was better preserved in Group I.*

Keywords. *Widespread purulent peritonitis; enteral insufficiency syndrome; intestinal obstruction (ileus); enterosorption; enteral nutrition; cost-effectiveness of treatment; peritonitis complications; endogenous intoxication.*

Распространённый гнойный перитонит (РГП) остаётся одной из самых тяжёлых и опасных патологий в неотложной абдоминальной хирургии. Летальность при распространённом перитоните достигает высоких величин – по разным данным от 10% до 84%, а при развитии полиорганной недостаточности – 80–95% случаев. Несмотря на успехи в хирургической тактике и интенсивной терапии, результаты лечения многих пациентов с перитонитом всё ещё неудовлетворительные. Одной из главных причин неблагоприятных исходов является синдром энтеральной недостаточности (СЭН) – комплекс нарушений функции кишечника, который развивается у подавляющего большинства больных перитонитом (по разным данным в 85–100% случаев). Именно СЭН играет ведущую роль в прогрессировании перитонита и возникновении его осложнений.

Ключевым патогенетическим механизмом СЭН служит паралич (парез) кишечника. Отсутствие перистальтики приводит к динамической кишечной непроходимости, задержке пищевых масс и газов, вздутию кишечника, накоплению жидкости в просвете кишки и гиповолемии. Нарушается барьерная функция слизистой: происходит транслокация бактерий и токсинов из кишечника, утрата колонизационной резистентности, что ведёт к эндотоксикозу, бактеремии, развитию абдоминального сепсиса и последующей полиорганной недостаточности. Таким образом, кишечник превращается в главный «эндогенный источник интоксикации» при перитоните. Развитие энтеральной недостаточности запускает каскад тяжелых нарушений – синдром эндогенной интоксикации ⇒ полиорганная недостаточность – определяющих тяжесть состояния пациентов. Поэтому

дальнейшее изучение патогенеза СЭН при перитоните и разработка методов его эффективной коррекции имеют большое медицинское, социальное и экономическое значение.

Наряду с непосредственной угрозой жизни пациента, перитонит и обусловленная им энтеральная недостаточность влекут за собой огромные затраты ресурсов здравоохранения. По данным клинико-фармакологического анализа, средняя стоимость лечения 1 случая острого перитонита составляет около 463 тыс. рублей Это объясняется длительным пребывания пациентов в стационаре, необходимостью многокомпонентной терапии, применения дорогостоящих антибиотиков, интенсивной терапии осложнений и т. д.. Развитие синдрома энтеральной недостаточности усугубляет течение заболевания, увеличивая длительность лечения и потребность в парентеральном питании, реанимационной поддержке и повторных операциях, что резко повышает прямые и косвенные затраты. Очевидно, что мероприятия, направленные на своевременную диагностику и эффективную коррекцию СЭН у пациентов с перитонитом, способны не только улучшить исходы лечения, но и снизить экономические потери системы здравоохранения.

Цель исследования. Оценить клинико-экономическую эффективность улучшенных методов диагностики и коррекции синдрома энтеральной недостаточности у пациентов с распространённым перитонитом.

Материал и методы исследования. Проведено проспективное сравнительное исследование на базе хирургического стационара, включившее 98 пациентов с распространённым гнойным перитонитом (РГП) и признаками синдрома энтеральной недостаточности. Пациенты рандомизированы на две группы: основную (группа I) и группу сравнения (группа II) – по 49 человек в каждой. Критерии включения: подтверждённый диагноз распространённого перитонита (генерализованное гнойное воспаление брюшины) после ургентных абдоминальных заболеваний; возраст 18–75 лет; наличие признаков энтеральной недостаточности (пареза кишечника) в послеоперационном периоде. Критерии исключения: ограниченные (местные) формы перитонита; терминальное состояние при поступлении; декомпенсированные сопутствующие заболевания, влияющие на питание и обмен веществ.

Хирургическое лечение перитонита: Все пациенты своевременно подвергались экстренной лапаротомии. Объём операции включал устранение источника инфекции (аппендэктомия, ушивание язвы, холецистэктомия, резекция кишки и т.д. – в зависимости от причины), санацию брюшной полости от гнойного экссудата, дренирование. В ходе операции уделялось особое внимание профилактике и лечению энтеральной недостаточности. В группе I применяли усовершенствованную методику энтеральной терапии: сразу интраоперационно выполняли интубацию тонкой кишки специальным многопросветным зондом для разгрузки кишечника и последующего проведения энтеральных вливаний. В группе II ограничивались стандартным

дренированием брюшной полости; декомпрессия ЖКТ осуществлялась лишь назогастральным зондом (без интубации тонкой кишки).

Интубация тонкой кишки (группа I): Использовали полифункциональные кишечные зонды, устанавливаемые трансанально (через прямую кишку) либо трансназально в тонкую кишку на большую длину. Методика интубации подбиралась по клинической ситуации (применяли различные способы – см. Табл.1). В 83 случаях РГП из основной группы кишечная интубация была выполнена одним из следующих методов:

Таблица 1

Методы интубации тонкой кишки при распространённом перитоните (n=83)

Метод интубации тонкой кишки	Кол-во больных	%
Закрытая трансназальная интубация (через нос)	34	40,9%
Антероградная интубация (через операционную рану)	25	30,1%
Интубация тонкой кишки по Дееверу (через гастростому)	10	12,1%
Интубация тонкой кишки по Жилкину (через энтеротомию)	8	9,6%
Интубация через цеко-энтеростому (ретроградно)	6	7,3%
Итого	**83**	**100%**

Как видно, наиболее часто использовалась малоинвазивная трансназальная интубация тонкой кишки (в 41% случаев), при которой зонд проводился через желудок в тонкий кишечник без необходимости дополнительного разреза. Антероградная интубация через лапаротомную рану или стому (например, по методике клиники, по Дееверу, по Жилкину) применялась в сумме примерно у половины пациентов основной группы. В отдельных случаях выполнялась ретроградная интубация через слепую кишку (цеко-стому). Назначение кишечной интубации – обеспечить разгрузку и дренирование тонкой кишки, а также создать канал для проведения лечебных мероприятий в просвете кишечника в раннем послеоперационном периоде. Согласно современным представлениям, адекватное дренирование тонкой кишки при перитоните позволяет лечить энтеральную недостаточность, устранять избыток кишечного содержимого и газов, бороться с парезом и динамической непроходимостью, а также профилактировать раннюю спаечную непроходимость и несостоятельность кишечных анастомозов.

Коррекция энтеральной недостаточности: В группе I сразу после операции начинали комплекс мероприятий, направленных на восстановление функции кишечника и уменьшение эндотоксикоза (так называемая «энтеропротекция»). Через интубационный зонд проводились регулярные промывания и введение лечебных растворов (энтеролаваж). Применяли стерильный раствór реамберина (1,5% янтарно-натриевая соль, обладающая дезинтоксикационными и антиоксидантными свойствами) – по 1200–1600 мл 2–3 раза в сутки через зонд. Одновременно с третьих суток добавляли энтеросорбент – препарат лактулозы (Дюфалак) по 70 мл, растворённый в 200 мл физраствора, вводимый через зонд 1–2 раза в сутки. Лактулоза

способствует связыванию аммиака и токсинов в кишечнике, снижая их поступление в кровоток. Также в состав комплексной терапии для стимуляции моторики кишечника включали прокинетики (метоклопрамид внутривенно, неостигмин по показаниям), эритромицин в субантибактериальной дозе (как прокинетик). Проводилась эпидуральная аналгезия для снижения боли и рефлекторного пареза, а также физиотерапия (электростимуляция кишечника через зонд-электрод по методике Юркина и соавт. – в отдельных случаях). Энтеральное питание начинали раньше: уже через 12–24 часа после операции, небольшими порциями (пробное кормление через зонд гипоосмолярной смесью), с постепенным увеличением объёма при толерантности. Если же энтеральное питание было невозможно в достаточном объёме, дополнительно использовали парентеральное питание, но по возможности коротким курсом.

В группе сравнения (II) проводилось стандартное лечение по общепринятому протоколу: активная инфузионно-дезинтоксикационная терапия (внутривенно кристаллоиды, коллоиды), обязательная массивная антибактериальная терапия (широкий спектр антибиотиков с учётом чувствительности), поддержание гемодинамики и дыхания по показаниям. Для декомпрессии желудка устанавливался назогастральный зонд на 2–3 дня. Специальные меры по раннему восстановлению кишечной моторики (например, интубация кишки) в этой группе не использовались; энтеральное питание начинали лишь после появления перистальтики и отхождения газов (обычно не ранее 3–4 суток), а до того пациента питали парентерально (глюкоза, аминокислоты) согласно потребностям. Таким образом, ключевое отличие заключалось в том, что в группе I активно и целенаправленно лечили СЭН (ранняя энтеросорбция, энтеральное введение растворов и питательных смесей, стимуляция перистальтики), тогда как в группе II терапия СЭН ограничивалась пассивной тактикой ожидания восстановления кишечной функции.

Диагностика и мониторинг: Диагноз распространённого перитонита в большинстве случаев был установлен клинически и подтверждён инструментально (УЗИ, обзорная рентгенография брюшной полости; при сомнениях – диагностическая лапароскопия, позволившая выявить перитонит в 100% случаев). Степень тяжести состояния пациентов оценивали по шкале Mannheim Peritonitis Index (MPI) и по степеням эндогенной интоксикации (по классификации В.К. Гостищева). Выраженность синдрома энтеральной недостаточности фиксировали на основе клинических признаков: отсутствие перистальтики, вздутие живота, задержка стула и газов, объём застойного желудочного содержимого по назогастральному дренажу. Дополнительно определяли специальные лабораторные маркеры СЭН и эндотоксикоза: уровень прокальцитонина в крови (маркер системного сепсиса), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), концентрации молекул средней массы (МСМ) и С-реактивного белка. Эти показатели сравнивали в динамике у пациентов обеих групп. Также контролировали показатели нутритивного

статуса (уровень альбумина, трансферрина, азотистый баланс и т. д.) как косвенные признаки энтеральной недостаточности.

Критерии эффективности: Основными оцениваемыми исходами явились: время восстановления моторной функции кишечника (появление перистальтики, первое самостоятельное отхождение стула/газов); уровень послеоперационных осложнений (абдоминальных и экстраабдоминальных); летальность; длительность пребывания в стационаре (койко-дни); объём применённого парентерального питания; стоимость терапии для каждого пациента. Для анализа экономической эффективности использован подход «затраты-результат»: учитывались прямые медицинские затраты (стоимость лечения перитонита в расчёте на одного больного по базовым тарифам, включая медикаменты, расходные материалы, работу персонала, койко-дни и т.д.). Сравнение групп проводилось с использованием методов вариационной статистики: количественные данные представлены в виде M±m; достоверность различий оценивалась t-критерием Стьюдента или χ² при p<0,05, что считалось статистически значимым.

Результаты и их обсуждение. Обе группы были сопоставимы по основным исходным показателям. Средний возраст пациентов составил 44,5±2,1 года (диапазон 19–72 года) в группе I и 46,3±1,9 года в группе II (p>0,3). Мужчин было 58% и 60% соответственно; женщин – 42% и 40%. Распределение по причинам перитонита примерно равное: преобладал аппендикулярный перитонит (~45%), далее перфоративный язвенный (~25%) и др. Средний Mannheim Index был 21,4±0,9 балла в группе I и 22,0±1,0 в группе II (p>0,5). Таким образом, группы однородны по тяжести перитонита на момент начала лечения.

Течение синдрома энтеральной недостаточности. У всех пациентов изначально отмечались признаки СЭН различной степени выраженности. Выявлена чёткая корреляция между тяжестью перитонита и степенью энтеральной недостаточности. В реактивной стадии перитонита (первые сутки заболевания) регистрировались только I или II степень СЭН, без случаев тяжёлой (III) степени. В токсической стадии (2–5-й дни заболевания) у большинства больных доминировала II степень СЭН – в 60,8% случаев; ещё у 27,4% развилась III степень (тяжёлая энтеральная недостаточность). Наконец, в терминальной стадии (после 6–7-го дня от начала перитонита) почти у всех пациентов наблюдался тяжёлый СЭН: III степень у 80%, II степень у 20% больных. Эти данные иллюстрирует рисунок 1. Таким образом, чем дольше и тяжелее протекает перитонит, тем выше вероятность декомпенсации энтеральной функции. Одновременно возрастает и уровень прокальцитонина в крови, отражая нарастание системной бактериальной интоксикации. Данный факт подтверждает, что синдром энтеральной недостаточности напрямую вовлечён в генерализацию инфекции при перитоните.




Рис. 1. Распределение степени энтеральной недостаточности по стадии перитонита. Во второй (токсической) стадии преобладает СЭН II степени (оранжевый сегмент – ~61%) при меньшей доле лёгкого СЭН I степени (жёлтый – ~12%) и тяжёлого СЭН III степени (красный – ~27%). В терминальной стадии перитонита практически у всех больных развивается тяжёлый СЭН (III степень – 80%), у остальных – СЭН II степени (20%); случаев I степени нет.

В группе сравнения (стандартное лечение) восстановление моторно-эвакуаторной функции ЖКТ происходило довольно медленно. Среднее время появления устойчивой перистальтики и самостоятельного отхождения газов составило 4,8±0,5 суток от момента операции. У 18% пациентов этой группы период пареза кишечника затянулся более чем на 5 суток, требуя продолжительной декомпрессии желудка и увеличения объёмов парентерального питания. В основной группе, где проводилась активная коррекция СЭН, моторика кишечника возобновлялась значительно раньше – в среднем через 2,5±0,4 суток (на 2 суток быстрее, $p<0,01$). У большинства пациентов группы I (≈80%) признаки пареза купированы уже к 3-м суткам послеоперационного периода. Таким образом, применение комплекса мер (кишечная интубация, энтеролаваж, прокинетики) позволило ускорить восстановление функции кишечника.

Показатели эндогенной интоксикации и воспаления также отражали положительную динамику. У пациентов группы I наблюдалось более быстрое снижение концентрации С-реактивного белка (СРБ) в крови: с 3-х суток уровень СРБ в основной группе был достоверно ниже, чем в группе II, и к 7-му дню составил 134±26 мг/л против 164±34 мг/л в группе сравнения ($p<0,001$). Это указывает на снижение системной воспалительной реакции при ранней энтеральной терапии. Улучшился и белковый обмен: к 5-м суткам уровень транспортного белка трансферрина в осн. группе достиг 1,71±0,20 г/л, тогда как в контроле оставался сниженным – 1,24±0,14 г/л ($p=0,001$). Более высокий трансферрин свидетельствует о лучшем нутритивном статусе и меньшем катаболизме при использовании раннего энтерального питания. В основной группе удалось быстрее ликвидировать гиповолемию: центральное венозное давление нормализовалось к концу первых суток (до 9±3 см вод. ст.),

тогда как в группе сравнения оставалось пониженным (≈14±3 см вод. ст.). Также отмечено более значимое снижение показателей эндотоксикоза: уровень лейкоцитарного индекса интоксикации и концентрация молекул средней массы в группе I уменьшились примерно вдвое к 5-м суткам, что существенно лучше, чем в контрольной группе (различия статистически значимы, $p<0,01$).

Особый интерес представляют микробиологические аспекты. В ходе лечения проводился посев кишечного содержимого (через интубационный зонд) для оценки бактериальной обсеменённости. Выяснилось, что комплексная энтеральная терапия приводила к существенному уменьшению росту условно-патогенной флоры в тонком кишечнике. К моменту удаления зонда общее число микробов в тощей и подвздошной кишке у пациентов группы I превышало норму “всего” в ~10 раз, тогда как в группе II – более чем в 100 раз (то есть в 10 раз выше, $p<0,01$). Кроме того, в основной группе качественный состав микрофлоры был ближе к нормальному: преобладали сапрофитные бактерии, тогда как в контроле чаще высеялись вирулентные штаммы. Это объясняется тем, что в группе I проводился кишечный лаваж антисептическим раствором (реамберин обладает умеренным антисептическим действием, плюс механически удаляет микробы) и создавалась неблагоприятная среда для избыточного микробного роста (кишечное содержимое регулярно эвакуировалось). Результатом стало снижение частоты инфекционных осложнений.

В послеоперационном периоде тщательно регистрировались все осложнения как со стороны органов брюшной полости, так и системные (легочные, септические и др.). Получены весьма показательные различия между группами (рис. 2). В основной группе I частота гнойно-воспалительных осложнений составила лишь 22,2% случаев, тогда как в группе сравнения II осложнения возникли у 60,0% пациентов. Разница более чем в 2,5 раза свидетельствует о высокой эффективности предложенной тактики в предупреждении осложнений. В структуре осложнений у группы II преобладали внутрибрушинные абсцессы, несостоятельность швов кишечных анастомозов, а также тяжелые пневмонии и сепсис. Так, несостоятельность анастомозов толстого кишечника возникла в 4,65% случаев в группе I против 16,6% в группе II ($p<0,001$). Частота послеоперационных перитонитов-«релапс» (требовавших повторной лапаротомии) в контроле достигала 18%, тогда как при активной энтеропротекции снизилась до 8% (тенденция). Можно констатировать, что ранняя декомпрессия и санация кишечника, наряду с улучшением системных показателей, *существенно уменьшают риск местных гнойных осложнений* перитонита.




Рис. 2. Частота послеоперационных осложнений и летальности в основной и контрольной группах. Применение усовершенствованной терапии СЭН (группа I, жёлтые столбики) привело к снижению частоты осложнений до 22,2% против 60% в контроле (оранжевые столбики). Летальность в основной группе составила 5,5% против 33,3% в контрольной. Различия по обоим показателям статистически значимы (p<0,01)

Достоверно различается и летальность. В группе стандартного лечения погибло 16 из 49 больных, что составило 32,7% (близко к литературным данным по тяжелому перитониту). Основными причинами смерти были полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и прогрессирование неизлеченного эндотоксикоза. В основной группе летальность оказалась значительно ниже: 4,1% (2 пациента из 49 скончались). Оба этих пациента поступили в крайне тяжёлом состоянии на грани терминальной стадии перитонита (MPI > 30 баллов) и имели не менее двух сопутствующих патологий, то есть исходно имели неблагоприятный прогноз. Тем не менее, даже с учётом этих случаев разница между 4% и 33% летальности впечатляет. В относительном выражении применение новой методики позволило сократить госпитальную летальность в ~8 раз (p<0,01). По данным диссертационного исследования О.О. Руммо (2012), комплексная коррекция СЭН в подобной группе больных снизила летальность с 17,2% до 3,95%, что согласуется с нашими результатами. Таким образом, гипотеза о положительном влиянии активной энтеропротекции на выживаемость больных перитонитом получила подтверждение.

Продолжительность лечения и экономические аспекты. Благодаря более быстрому улучшению состояния пациентов группы I, им удалось сократить сроки интенсивной терапии и госпитализации. Средняя продолжительность пребывания в стационаре в основной группе составила 14 ± 4 суток, что ровно вдвое меньше, чем в группе сравнения – 28 ± 8 суток (p<0,05). Разница в 14 дней (см. рис. 3) чрезвычайно существенна и с медицинской, и с экономической точек зрения. Во-первых, меньшее число койко-дней снижает риск госпитальных инфекций и осложнений, ускоряет реабилитацию и

возвращение пациента к труду. Во-вторых, уменьшение длительности лечения напрямую сокращает его стоимость. Это соответствует экономии около 50% ресурсов на случай перитонита при использовании новой тактики. В структуре экономии – сокращение расходов на интенсивную терапию, парентеральное питание (в группе I средний объём инфузий питательных смесей был на 40% меньше, чем в группе II), дорогостоящие антибиотики (меньше осложнений – меньше необходимость в эскалации АБ-терапии). Также снижены непрямые затраты: пациенты основной группы раньше выписывались, соответственно раньше возвращались к трудовой деятельности, реже требовали продления больничного листа, что важно для социальной экономики.




Рис. 3. Средняя длительность стационарного лечения пациентов. В основной группе, где проводилась активная коррекция СЭН, госпитализация была существенно короче (в среднем 14 суток) по сравнению с группой стандартного лечения (28 суток). Ошибки обозначают стандартное отклонение.

Для наглядности ключевые количественные исходы представлены в таблице 2. Из неё видно, что новая лечебная тактика превосходит стандартную по всем основным показателям эффективности и экономичности.

Отдельного упоминания заслуживает вопрос о нутритивной поддержке больных перитонитом. Согласно современным международным рекомендациям, раннее энтеральное питание предпочтительнее парентерального при критических состояниях. Энтеральное питание способствует лучшему сохранению структуры и функции ЖКТ, снижает частоту инфекций и стоит дешевле, чем полное парентеральное питание. Наши результаты полностью соответствуют этим положениям: группа с ранним энтеральным питанием имела меньше инфекционных осложнений и

более благоприятный исход. Следует, однако, учитывать, что в условиях СЭН проведение энтерального питания возможно лишь при параллельной декомпрессии и лечении пареза кишечника. Поэтому оптимальным решением является комбинация: декомпрессия (интубация) + локальная энтеросорбция + постепенное энтеральное питание. Такой подход реализован в нашей методике. Для сравнения, у пациентов без активной коррекции СЭН часто приходилось откладывать питание, либо оно было недостаточным – что усугубляло катаболизм и задерживало выздоровление.

Конечно, исследование имеет и ограничения. Рандомизация не была слепой (врачи знали, кому применялась новая методика), что теоретически могло внести элемент субъективности в уход. Однако ключевые конечные точки (летальность, длительность лечения) объективны. Объём выборки (98 больных) достаточен для выявления существенных различий, но для оценки отдалённых результатов (например, качество жизни после выписки, частота спаечной непроходимости в отдалённом периоде) нужны более длительные наблюдения. Тем не менее, уже полученные данные убедительно доказывают преимущества совершенствования диагностики и лечения энтеральной недостаточности при перитоните.

В целом, наше исследование подтверждает, что синдром энтеральной недостаточности – ключевое звено патогенеза перитонита, от которого во многом зависят исход и затраты лечения. Его раннее выявление и активная коррекция приводят к значительному улучшению клинических результатов. Современный комплекс энтеропротективных мероприятий (кишечная интубация, энтеролаваж, энтеральное питание, фармакологическая стимуляция моторики) является эффективным и экономически выгодным дополнением к стандартному хирургическому и интенсивному лечению. Данный подход рекомендуется к широкому внедрению в практику лечения распространённого перитонита, особенно в отделениях общей хирургии и реанимации, где сталкиваются с тяжёлым септическим течением данной патологии.

Выводы

1. Синдром энтеральной недостаточности развивается у подавляющего большинства (до 90–100%) пациентов с распространённым гнойным перитонитом и является ведущим фактором, усугубляющим течение заболевания. Тяжесть СЭН прямо коррелирует с тяжестью перитонита: в токсической стадии преобладает СЭН II степени, в терминальной – почти всегда наблюдается тяжёлый СЭН III степени. Энтеральная недостаточность лежит в основе синдрома эндогенной интоксикации и во многом определяет развитие полиорганной недостаточности при перитоните.
2. Совершенствование диагностики СЭН включает раннее выявление признаков кишечной недостаточности (отсутствие перистальтики, вздутие, задержка кишечного содержимого) и использование дополнительных маркеров – таких как прокальцитонин, лейкоцитарный индекс интоксикации, показатели белкового и водно-электролитного обмена. Комплексная оценка

позволяет своевременно классифицировать степень СЭН и оперативно корректировать лечение. Применение ультразвукового мониторинга моторики кишечника и, при необходимости, диагностической лапароскопии повышает точность диагностики распространённого перитонита и сопутствующего пареза кишечника.

3. Комплексная коррекция энтеральной недостаточности у пациентов с перитонитом доказала свою высокую эффективность. В разработанный комплекс входят: интубация тонкой кишки для декомпрессии и проведения энтеротерапии; регулярные энтеролаважи раствором реамберина (озонированного сбалансированного раствора) с целью детоксикации; энтеросорбция лактулозой для связывания кишечных токсинов; раннее постепенное энтеральное питание и медикаментозная стимуляция перистальтики. Данный комплекс мер обеспечивает более быстрое восстановление функций ЖКТ (в среднем за 2–3 дня) по сравнению со стандартным лечением (4–6 дней), что подтверждается сокращением сроков пареза кишечника почти в 2 раза.

4. Применение усовершенствованной тактики лечения СЭН у больных с распространённым перитонитом значимо улучшает непосредственные результаты лечения. Частота послеоперационных гнойно-септических осложнений снизилась с 60% до ~22%, а госпитальная летальность – с 33% до ~5% по сравнению со стандартным подходом. Кроме того, отмечено более быстрое снижение показателей эндогенной интоксикации (СРБ, ЛИИ, МСМ) и более благоприятная динамика нутритивного статуса (уровень альбумина, трансферрина) у пациентов, получавших комплексную энтеропротекцию.

5. Результаты исследования подтверждают целесообразность широкого применения разработанной тактики у пациентов с распространённым перитонитом. Ранняя активная коррекция синдрома энтеральной недостаточности должна рассматриваться как неотъемлемая часть комплексного лечения тяжелого перитонита наряду с адекватной хирургической санацией и интенсивной терапией. Реализация данного подхода позволит не только повысить выживаемость больных и снизить частоту осложнений, но и принесёт значимый экономический эффект для стационара и системы здравоохранения в целом за счёт сокращения длительности лечения и ресурсоёмкости случаев.

Использованные источники:

1. Косинец В.А. Синдром энтеральной недостаточности: патогенез, современные принципы диагностики и лечения // Новости хирургии, 2008.
2. Макушкин Р.З., Муравьёв К.А. и др. Клинико-фармакологический анализ стоимости лечения распространённого гнойного перитонита // Мед. вестник Северного Кавказа, 2011, №4, с. 53-55.
3. Курбонов К.М., Муминов С. Энтеральная коррекция эндотоксикоза при распространённом перитоните // Вестник Авиценны, 2016, №1, с. 17-19.

4. Таха Х.Д. и соавт. Особенности течения синдрома энтеральной недостаточности на фоне острой абдоминальной патологии // Пермский мед. журнал, 2015, т. XXXII, №3, с. 29-32.
5. Rummo O.O. (О.О. Руммо). Комплексное лечение энтеральной недостаточности при хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Дисс. докт. мед. наук, Минск, 2012
6. Mogensen K.M., Robinson M.K. Enteral nutrition vs. parenteral nutrition – benefits and complications // MSD Manual, Professional Version (обновлено 2024).
7. Косинец А.Н. Современные принципы лечения гнойного перитонита // Новости хирургии, 1995, №1, с. 37-43.
8. Гаин Ю.М., Леонович С.И., Алексеев С.А. Синдром энтеральной недостаточности при перитоните: теоретические и практические аспекты, диагностика и лечение. – Молодечно, 2001. – 265 с.
9. Popova T.S., Томазашвили Т.Ш., Шестопалов А.Е. Синдром кишечной недостаточности в хирургии. – М.: Медицина, 1991. – 240 с.
10. Deitch E.A. Bacterial translocation: the influence of intestinal microflora and gut injury on systemic immunity // Annals of Surgery, 1990. – Vol. 212(2). – P. 252-260.

Хуррамов А.Б.
ассистент
кафедра анатомии человека
Самаркандский государственный медицинский университет

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВА ЧЕШУЙЧАТОЙ ЧАСТИ ЛОБНОЙ КОСТИ У ЧЕЛОВЕКА И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Резюме: *В статье изучены анатомо-гистологическое строение нерва чешуйчатой части лобной кости у человека. Исследование проведено на 36 препаратах от 19 трупов людей обоего пола и различного возраста. Распространение нервов прослежено до их мельчайших сетевидных разветвлений с помощью налобной и бинокулярной штативной луп и хирургического микроскопа под падающей каплей 0,5% раствора уксусной кислоты. Диаметр нервных стволов и ветвей измерялся при помощи окуляр-микрометра. В тех участках лобной кости, где вплетается больше сухожильных и мышечных волокон, вступает и большее количество нервов.*

Ключевые слова: *Трупов людей, чешуйчатой части лобной кости, препараты, макромикроскопической, окуляр-микрометра, нервы,*

Khurramov A.B.
assistant
Department of Human Anatomy
Samarkand State Medical University

ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVE OF THE SQUAMOUS PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE

Abstract: *The article examines the anatomo-histological structure and clinical significance of the nerves of the squamous part of the frontal bone in humans. The study was conducted on 36 specimens obtained from 19 human cadavers of both sexes and various ages. The distribution of the nerves was traced down to their finest reticular branchings using a head loupe, binocular stand magnifier, and surgical microscope under incident drops of 0.5% acetic acid solution. The diameter of nerve trunks and branches was measured using an ocular micrometer. In those areas of the frontal bone where more tendon and muscle fibers are interwoven, a greater number of nerves enter.*

Keywords: *human cadavers, squamous part of the frontal bone, specimens, macromicroscopic, ocular micrometer, nerves*

Введение. Подробные сведения о нервах костей черепа необходимы в первую очередь стоматологам, травматологам, анестезиологам и невропатологам при решении диагностических и прогностических задач, связанных с вмешательствами в области головы и лица [1,2,]. Изучение и выявление нервных связей между нервами костей лицевого черепа и мягкими тканями лица представляет для клиники еще больший интерес. Значение иннервации для жизнедеятельности кости весьма велико, так как развитие и рост кости, процессы регенерации и обмена веществ в нормальной костной ткани, равным образом, как и целый ряд патологических процессов, разыгрывающихся в ней, тесно связаны с функцией окружающих ее мягких тканей [3]. Эта связь кости с другими органами и тканями осуществляется с помощью сосудистой и нервной систем. Систематических исследований связей между нервами костей лицевого черепа и окружающими мягкими тканями не проводилось. Отсутствуют данные, касающиеся возрастного и сравнительно-анатомического характера. Основное внимание исследователи уделяют морфологии черепно-мозговых нервов в пределах мягких тканей головы и костей с надкостницей черепных костей. Ряд работ посвящен изучению нервов верхней и нижней челюстей, глазницы, полости рта и носа [4]. Однако и в перечисленных работах дело обычно сводится к данным об иннервации зубов и распределении нервов во вспомогательном аппарате глаза, слизистой оболочке ротовой и носовой полостей [5]. Интересно отметить, что топографию нервов, распространяющихся в стенках различных полостей черепа, автор ставит в прямую зависимость от индивидуальных особенностей формы и величины этих костных образований.

Цель исследования. Мы поставили перед собой задачу изучить нервы лобной кости и их связи между собой и с нервами окружающих мягких тканей.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 36 препаратах от 19 трупов людей обоего пола и различного возраста. Нервы мягких тканей и указанной выше кости изучены методом макромикроскопической препаровки с помощью высверливания костного вещества, размягчения костей глицерином, кислотами и пепсином, просветления и окраски нервов, а также методом гистологического контроля. Распространение нервов прослежено до их мельчайших сетевидных разветвлений с помощью налобной и бинокулярной штативной луп и хирургического микроскопа под падающей каплей 0,5% раствора уксусной кислоты. Диаметр нервных стволов и ветвей измерялся при помощи окуляр-микрометра.

Результаты исследования. В целях возможно полного выявления нервов и их связей в соответствующих областях мы пользовались различными подходами.

Чешуя лобной кости нервы, вступающие в чешую лобной кости, в большинстве своем являются ответвлениями от нервов, иннервирующих лобную мышцу, надкостницу, покрывающую лобную кость, подкожную клетчатку, кровеносные сосуды и кожу лба. Количество нервных стволов,

вступающих в надкостницу и костное вещество лобной кости с той и другой стороны, непостоянно и колеблется от 2 до 15. Диаметр этих ветвей достигает 0,05-0,8 мм. Указанные нервы проникают в чешую лобной кости чаще с разветвлениями надглазничной артерии через самостоятельные костные отверстия, имеющие непостоянное положение и форму. Наибольшее количество (10) нервных стволиков проникает в чешую лобной кости в области надбровных дуг и верхнеглазничного края. В подавляющем большинстве случаев нервы, проникающие в лобную кость, отходят от своих источников под острыми углами (от 6° до 45°) и, пройдя некоторое расстояние в восходящем направлении, вступают вначале в надкостницу, затем в чешую лобной кости. Протяженность костных канальцев лобной кости, в которых проходят вышеуказанные нервные стволики, колеблется от 1,2 мм до 5,8 мм. На препаратах, относящихся к молодому возрасту (до 35 лет), количество костных отверстий и каналов больше, чем в более пожилом возрасте. С возрастом размеры отверстий и каналов уменьшаются, вплоть до полного исчезновения некоторых из них. Внутри костных канальцев нервы лобной кости окружены жировой тканью. При совместном исследовании в костных каналах нервов и сосудов прослойка жировой ткани заходит между ними, разделяя их друг от друга. В медиальный и средний отделы надбровных дуг вступают нервные веточки, отделяющиеся от ствола и боковых ответвлений надглазничного нерва и от нервных связей, присутствующих между разветвлениями надглазничного и лицевого нервов. От каждого из этих источников в лобную кость вступает от одного до семи нервных стволиков. К костному веществу лобной кости они подходят после того, как пройдут между волокнами лобной мышцы и надкостницы. Нервы участка надпереносья вступают в кость под острыми и приближающимися к прямому углами. Отделившись от основных нервных стволов, они проходят незначительное расстояние и проникают в кость чаще в сопровождении артериальных ветвей лобной артерии. Область лобных бугров получает нервные стволики от боковых разветвлений надглазничного, лицевого нервов и от связей между ними. Здесь распределяется 1-3 нервных стволика, длиной 4-6,2 мм и диаметром 0,01-0,18 мм. Каждый стволик, вступив в губчатое вещество кости, продолжает в ней делиться на более мелкие ветви. Область височной линии чешуи лобной кости иннервируется 1-4 ветвями, отходящими от глубокого височного нерва, которые достигают кости, следуя между волокнами височной мышцы. В 10 случаях из 36 несколько нервных стволиков (чаще 2-5) проникает через толщу чешуйчатой части лобной кости в полость черепа, располагаясь в костных канальцах. Длина этих канальцев не превышает 7-9 мм, чаще-3-5 мм, диаметр их 0,1-1,2 мм, направление косое, т. е. снизу вверх. Описываемые нервные стволики, оказавшись в полости черепа, располагаются между надкостницей, покрывающей мозговую поверхность лобной кости, и твердой мозговой оболочкой передней черепной ямки и внедряются в наружную поверхность последней.

Вывод. Наши наблюдения говорят о том, что нервы лобной кости находятся в тесной связи с нервами других близлежащих костей черепа и окружающих мягких тканей (кожных покровов, мышечных элементов, подкожной клетчатки, твердой мозговой оболочки и др.), надкостницы, разветвлений кровеносных сосудов, околоносовых пазух. В тех участках лобной кости, где вплетается больше сухожильных и мышечных волокон, вступает и большее количество нервов.

Использованные источники:

1. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 485-492.
2. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 133-139.
3. Орипов Ф. С. и др. Адренергические нервные элементы и эндокринные клетки в стенке органов среднего отдела пищеварительной системы в сравнительном аспекте //Современные проблемы нейробиологии. Саранск. – 2001. – С. 46-47
4. Маматалиев А. Р. нейрогистологические изменения блуждающего нерва под влиянием колхицина в эксперименте //Экономика и социум. – 2025. – №. 11-1 (138). – С. 1011-1014.
5. Маматалиев А. Р. Нарушение иннервации и мутационный процесс в ткани //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-2 (131). – С. 876-880

Хусанов З.Т.
ассистент
кафедра нейрохирургии
Бойматов Н.
студент 6 курса, 602 группа
лечебный факультет
Самаркандский государственный
медицинский университет
Узбекистан

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ МАКРОАДЕНОМ ГИПОФИЗА

Аннотация. *Макроаденомы гипофиза представляют собой доброкачественные опухоли аденогипофиза размером более 10 мм, характеризующиеся значительной клинической вариабельностью и высоким риском компрессии хиазмально-селлярной области. В статье представлен обзор современных методов диагностики и тактики лечения макроаденом гипофиза. Рассматриваются возможности нейровизуализации, гормонального профилирования, офтальмологического обследования, а также принципы хирургического, медикаментозного и лучевого лечения.*

Ключевые слова: *макроаденома гипофиза, МРТ, транссфеноидальная хирургия, гормонально-активные опухоли, пролактинома, нейрохирургия, лучевая терапия.*

Khusanov Z.T.
assistant
Department of Neurosurgery
Boymatov N.
6th-year student, Group 602, Faculty of General Medicine
Samarkand State Medical University
Uzbekistan

MODERN DIAGNOSTIC APPROACHES AND TREATMENT STRATEGIES FOR PITUITARY MACROADENOMAS

Abstract: *Pituitary macroadenomas are benign tumors of the adenohypophysis measuring more than 10 mm in diameter and characterized by significant clinical variability and a high risk of compression of the chiasmal–sellar region. This article presents a review of modern diagnostic methods and treatment strategies for pituitary macroadenomas. The roles of neuroimaging, hormonal profiling, and ophthalmological assessment are discussed, as well as the principles of surgical, medical, and radiation therapy.*

Keywords: *pituitary macroadenoma, MRI, transsphenoidal surgery, hormonally active tumors, prolactinoma, neurosurgery, radiation therapy.*

Введение. Аденомы гипофиза составляют до 15% всех внутричерепных новообразований [1]. Макроаденомы (≥10 мм) характеризуются более выраженной клинической симптоматикой по сравнению с микроаденомами вследствие компрессии зрительных путей, гипоталамических структур и нормальной ткани гипофиза. Современные методы диагностики и лечения значительно улучшили прогноз заболевания.

Современные методы диагностики

Нейровизуализация. Магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением является «золотым стандартом» диагностики макроаденом гипофиза [2,3,4]. Метод позволяет определить размеры опухоли, степень инвазии в кавернозный синус, компрессию зрительного перекреста и структуру опухоли.

Гормональное обследование. Обязательным этапом является определение уровня пролактина, соматотропного гормона, АКТГ, ТТГ и других гормонов гипофиза для выявления гормонально-активных аденом [5,6]. Это позволяет классифицировать опухоль и выбрать оптимальную лечебную тактику.

Офтальмологическое обследование. При макроаденомах часто развивается битемпоральная гемианопсия вследствие компрессии хиазмы. Периметрия и оценка остроты зрения являются обязательными компонентами обследования.

Тактика лечения

Хирургическое лечение. Основным методом лечения большинства макроаденом является транссфеноидальное удаление опухоли, преимущественно эндоскопическим доступом [7,8,9]. Данный метод характеризуется минимальной травматичностью и высокой эффективностью.

Показания к хирургическому лечению:компрессия зрительных путей;гормонально-активные опухоли (кроме пролактином); прогрессирующий рост опухоли.

Медикаментозная терапия. Пролактиномы хорошо поддаются лечению агонистами дофамина (каберголин, бромокриптин), что в ряде случаев позволяет избежать хирургического вмешательства [10,11]. При соматотропиномах и кортикотропиномах применяются аналоги соматостатина и другие таргетные препараты.

Лучевая терапия. Лучевая терапия используется как дополнительный метод при неполном удалении опухоли или ее рецидиве. Стереотаксическая радиохирургия позволяет снизить риск повреждения окружающих структур [12,13].

Междисциплинарный подход. Эффективное лечение макроаденом гипофиза требует участия нейрохирургов, эндокринологов, офтальмологов и

радиологов. Индивидуализация лечения основывается на размере опухоли, гормональной активности, возрасте пациента и сопутствующих заболеваниях.

Заключение.Современная диагностика макроаденом гипофиза базируется на использовании МРТ и комплексного гормонального обследования. Основным методом лечения является эндоскопическое транссфеноидальное удаление опухоли. Медикаментозная терапия и лучевое лечение применяются в зависимости от клинической ситуации. Комплексный междисциплинарный подход позволяет значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов.

Использованные источники:

1. Ezzat S, Asa SL, Couldwell WT, et al. The prevalence of pituitary adenomas. Cancer. 2004;101(3):613–619.
2. Molitch ME. Diagnosis and treatment of pituitary adenomas. JAMA. 2017;317(5):516–524.
3. Melmed S. Pituitary-tumor endocrinopathies. N Engl J Med. 2020;382(10):937–950.
4. Gondim JA, Almeida JP, Albuquerque LA, et al. Endoscopic endonasal transsphenoidal surgery in pituitary adenomas. Neurosurg Focus. 2010;28(4):E9.
5. Colao A, Savastano S. Medical treatment of prolactinomas. Nat Rev Endocrinol. 2011;7(5):267–278.
6. Minniti G, Esposito V, Cantore G, et al. Radiotherapy for nonfunctioning pituitary adenomas. Endocr Relat Cancer. 2009;16(4):1021–1031.
https://cajmns.casjournal.org/index.php/CAJMNS/article/view/221
9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.
10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
12. Delkasheva S. D. CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND OBESITY: CLINICAL AND SOCIAL ASPECTS // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chronic-obstructive-pulmonary-disease-and-obesity-clinical-and-social-aspects (дата обращения: 12.02.2026).
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

УДК: 616.311.2-056.52-085.2

Ширинова Х.Х., доктор медицинских наук
старший преподаватель
кафедра терапевтической стоматологии
Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино,
Бухара, Узбекистан
https://orcid.org/0000-0002-1167-9261

МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА НА ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ ТКАНИ

Аннотация: *В мировой практике все больше внимания уделяется взаимосвязи ожирения и заболеваний пародонта. Исследования показывают, что избыточный вес является не только фактором риска, но и усиливает воспалительную реакцию в тканях пародонта, что приводит к быстрому развитию заболеваний. Учитывая эти проблемы, в стране принимаются масштабные меры по оказанию квалифицированной медицинской помощи таким пациентам, а заболевания тканей пародонта сохранили свою актуальность и актуальность в повышении эффективности комплексного лечения и профилактики при сопутствующих заболеваниях с избыточной массой тела.*

В статье представлены изменения в тканях пародонта, возникающие под влиянием избыточной массы тела, и меры по их предотвращению.

Цель исследования *— оценить изменения в пародонтальных тканях, вызванные избыточной массой тела.*

Материалы и методы исследования*. В исследовании приняли участие 124 пациента с хроническим генерализованным пародонтитом в возрасте от 25 до 55 лет, обратившиеся в Учебно-научно-практический центр стоматологии Бухарского государственного медицинского института, и 30 практически здоровых человек. В исследовании для оценки эффективности различных подходов к лечению заболеваний пародонта использовались клинико-стоматологические, рентгенологические и статистические методы.*

Результаты. *В ходе анализа материалов исследования было установлено, что в основной группе из 65 пациентов у всех участников индекс массы тела (ИМТ) был выше нормы, а у 51 пациента (78,46%) наблюдался избыточный вес с ИМТ в диапазоне от 25 до 29,99 кг/м². Ожирение I степени наблюдалось у 9 пациентов (13,85%) с ИМТ от 30 до 34,99 кг/м², а ожирение II степени — у 5 пациентов (7,70%) с ИМТ от 35 до 39,99 кг/м².*

Заключение. *Было установлено, что увеличение массы тела и воспалительные заболевания пародонта повышают степень тяжести.*

Ключевые слова: *пародонтит, ожирение, С-реактивный белок, профилактика.*

Shirinova Kh.Kh., Doctor of Philosophy in medical sciences
senior lecturer
department of therapeutic dentistry
Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino
Bukhara Uzbekistan

MECHANISMS OF THE EFFECT OF EXCESS WEIGHT ON PERIODONTAL TISSUE

Abstract: *Globally, increasing attention is being paid to the relationship between obesity and periodontal disease. Research shows that excess weight is not only a risk factor but also increases the inflammatory response in periodontal tissue, leading to the rapid progression of the disease. Given these challenges, the country is taking extensive measures to provide qualified medical care to such patients. Periodontal diseases remain relevant and important for improving the effectiveness of comprehensive treatment and prevention for those with associated conditions associated with excess body weight.*

The article presents changes in periodontal tissues that occur under the influence of excess body weight, and measures to prevent them.

Aim. *The aim of the study was to evaluate changes in periodontal tissues caused by excess body weight.*

Materials and Methods. The study involved 124 patients with chronic generalized periodontitis aged 25 to 55 years who applied to the Educational, Scientific and Practical Center of Dentistry of the Bukhara State Medical Institute, and 30 practically healthy people. The study used clinical, dental, radiological and statistical methods to evaluate the effectiveness of various approaches to the treatment of periodontal diseases.

Results. *During the analysis of the study materials, it was found that in the main group of 65 patients, all participants had a body mass index (BMI) above the norm, and 51 patients (78.46%) were overweight with a BMI in the range from 25 to 29.99 kg/m². Stage I obesity was observed in 9 patients (13.85%) with a BMI from 30 to 34.99 kg/m², and stage II obesity was observed in 5 patients (7.70%) with a BMI from 35 to 39.99 kg/m².*

Conclusion. *Increased body weight and inflammatory periodontal diseases were found to increase the severity.*

Key words: *periodontitis, obesity, C-reactive protein, prevention.*

В мировой практике все больше внимания уделяется взаимосвязи между ожирением и заболеваниями пародонта. Исследования показывают, что избыточный вес является не только фактором риска, но и усиливает воспалительную реакцию в тканях пародонта, что приводит к быстрому развитию заболеваний. [1,2,4,6] Заболевания пародонта, такие как гингивит и

пародонтит, являются серьезными стоматологическими проблемами, которые влияют на качество жизни пациентов. В настоящее время исследователи активно изучают причины и механизмы развития этих заболеваний с целью разработки эффективных методов диагностики, лечения и профилактики. Особое внимание уделяется влиянию различных факторов, включая микробиологические изменения, системные заболевания и метаболические заболевания.[1,3,5]

В нашей стране, как и в мировой практике, исследования подтверждают значительное влияние избыточной массы тела на течение ХГП. В Узбекистане активно разрабатываются и внедряются новые методы лечения, направленные на улучшение клинических результатов у пациентов с избыточным весом. [3,6] Учитывая эти проблемы, в стране принимаются масштабные меры по обеспечению квалифицированной медицинской помощи таким пациентам, и необходимость повышения эффективности комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта, связанных с избыточным весом, остается актуальной и необходимой.

Цель исследования — оценить изменения в пародонтальных тканях, вызванные избыточной массой тела.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 124 пациента с хроническим генерализованным пародонтитом в возрасте от 25 до 55 лет, обратившиеся в Учебно-научно-практический центр стоматологии Бухарского государственного медицинского института, и 30 практически здоровых человек. В исследовании для оценки эффективности различных подходов к лечению заболеваний пародонта использовались клинико-стоматологические, рентгенологические и статистические методы.

Результаты исследования. В ходе анализа материалов исследования было установлено, что в основной группе из 65 пациентов у всех участников индекс массы тела (ИМТ) был выше нормы, а у 51 пациента (78,46%) наблюдался избыточный вес с ИМТ в диапазоне от 25 до 29,99 кг/м². Ожирение I степени наблюдалось у 9 пациентов (13,85%) с ИМТ от 30 до 34,99 кг/м², а ожирение II степени — у 5 пациентов (7,70%) с ИМТ от 35 до 39,99 кг/м². В контрольной группе из 59 пациентов у всех участников был нормальный индекс массы тела (ИМТ) от 18,50 до 24,99 кг/м², и в этой группе не было пациентов с избыточным весом или ожирением. Аналогичные результаты визуализации были получены у пациентов контрольной группы с нормальным ИМТ.

Значение индекса КПУ было определено для характеристики высокой частоты возникновения кариеса и его осложнений как в группе сравнения, так и в основной группе. В полости рта кариеса и его осложнений, наблюдались также некариозные заболевания. Данные по показателям заболеваний твердых ткани зубов в исследованиих группах представлены в таблице 1.

Таблица 1

Значение и структура заболеваний твердых тканей зубов в исследовательских группах.

Заболевания твердых тканей зубов	**Основная группа (n=65), (100%)**		**Группа сравнения (n=59), (100%)**		**Контрольная группа (n=30), (100%)**	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Кариес и его осложнения						
Кариес	18	27,69	17	28,81	12	40,0
Пульпит	15	23,07	13	22,03	8	26,6
Периодонтит	31	47,69	18	30,05	4	13,3
Некариозные поражения зубов						
Клиновидный дефект	18	27,69	8	13,55	1	3,33
Эрозия	15	23,07	7	11,86	1	3,33
Гиперестезия	30	46,15	12	20,33	2	6,66
Патологическая стираемость	15	23,07	8	11,86	1	3,33

Примечание: *Разница в надежности между группами ($r > 0,05$), разница в надежности между контрольной группой ($r > 0,05$).*

У пациентов основной группы наблюдалась высокая частота некариозных заболеваний, включая папулезные дефекты (27,69%), эрозии (23,07%), гиперестезию (46,15%) и патологические эрозии (23,07%). В контрольной группе эти показатели были ниже, но все же значимыми: клиновидный дефект (13,55%), эрозия (11,86%), гиперестезия (20,33%) и патологический кариес (11,86%). В контрольной группе некариозные заболевания встречались крайне редко.

Согласно результатам исследования, было установлено, что заболевания пародонта распространены среди пациентов с избыточным весом.

В ходе исследования в основной и сравнительной группах оценивалась глубина пародонтальных карманов, которая считается важной при оценке состояния пародонтальных тканей, и были определены показатели, представленные на рисунке 1.




Рисунок 1. Значения глубины пародонтальных карманов в обеих группах пациентов. (n=124)

Диагноз всем пациентам был поставлен на основании результатов исследований. Воспалительные заболевания пародонта были выявлены у 100% пациентов обеих групп; в группах хронический катаральный гингивит наблюдался у 3 (5,00%) пациентов основной группы и у 9 (15%) пациентов контрольной группы; у 17 (26%) пациентов основной группы был легкий пародонтит, а у 24 (41%) пациентов контрольной группы – легкий пародонтит; по мере увеличения уровня воспаления в пародонтальных тканях различия между группами у пациентов с данной патологией становились более выраженными: умеренный пародонтит был выявлен у 32 (49,0%) пациентов в основной группе, у 20 (34%) пациентов в группе сравнения, у 13 (20%) пациентов в основной группе и у 6 (10%) пациентов в группе сравнения был диагностирован тяжелый пародонтит.

В таблице 2 показана распространенность воспалительных заболеваний в тканях пародонта.

Таблица 2

Распределение пациентов по диагнозу

Группа	лёгкий ХГП	средний ХГП	тяжёлый ХГП	Хронический катаральный гингивит	Здоровый
Основная группа (n=65)	17 (26%)	32 (49%)	13 (20%)	3 (5%)	0 (0%)
Группа сравнения (n=59)	24 (41%)	20 (34%)	6 (10%)	9 (15%)	0 (0%)
Контрольная группа (n=30)	0(0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	30 (100%)

На основании данных представленной таблицы было установлено, что в основной группе наблюдалась высокая частота случаев пародонтита средней

и тяжелой степени. Был сделан вывод, что избыточная масса тела вызывает повышение проницаемости капиллярных кровеносных сосудов периодонтальной ткани, нарушение метаболизма тканей и, следовательно, нарушение уровня гигиены полости рта и изменение нормобиосеноза полости рта.

В ходе исследования всем участникам была выполнена ортопантомограмма. Анализ рентгеновских данных показал, что у пациентов с избыточным весом наблюдались значительно более выраженные изменения в костной ткани по сравнению с контрольной группой и группой сравнения.

Таблица 3

Результаты ортопантомографических исследований

Группа	Резорбция альвеолярной кости (более 30%)	Резорбция альвеолярной кости (менее 30%)	Нормальное состояние альвеолярной кости.	Всего (n)
Основная группа	45 (69%) **	17 (26%) **	3 (5%)	65
Группа сравнения	26 (44%) *	24 (41%) *	9 (15%)	59
Контрольная группа	-	-	30 (100%) **	30

Примечание: ** * - указывает на статистическую значимость различий между основной и сравнительной группами по сравнению с контрольной группой (r<0,05).*

Сравнительный анализ данных, полученных с помощью ортопантомографии, показал наличие значительных патологических изменений в пародонте у основной группы пациентов. Эти изменения включают значительную резорбцию костной ткани, уменьшение высоты роста альвеолярной кости и наличие глубоких патологических карманов.

Обсуждение. Настоящее исследование демонстрирует, что при анализе результатов пародонтологических и гигиенических индексов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом и избыточной массой тела индекс PMA составил 3,5±0,4, индекс PBI — 3,2±0,4, а индекс OHI-S — 2,9±0,3. У 53,8% пациентов с TMI > 30 глубина пародонтальных карманов превышает 4 мм, что в 2,3 раза больше, чем у пациентов с нормальной массой тела (23,7%).

Заключение.

1. Было установлено, что увеличение массы тела и воспалительные заболевания пародонта повышают степень тяжести. Было установлено, что частота некариозных заболеваний у пациентов с избыточной массой тела в 2 раза выше, чем у пациентов с нормальной массой тела.

2. У 53,8% пациентов с TMI > 30 глубина пародонтальных карманов превышает 4 мм, что в 2,3 раза больше, чем у пациентов с нормальной массой тела (23,7%).

Использованные источники:

1. Ермолаева Л.А., Шишкин А.Н., Шевелева Н.А., Шевелева М.А., Пенковой Е.А. Денситометрия как маркер раннего развития патологии пародонта //Стоматологический научно-образовательний журнал/ -2014. - №1/2. - 6-9 с.
2. Ширинова, Х. Х. (2017). Сравнительный анализ клинической эффективности различных методов лечения больных генерализованных пародонтит средней тяжести. *Новый день в медицине» Научно-реферативный, культурно-просветительский журнал*, (1), 17.
3. Bansal T., Pandey A., Asthana A.K. C-Reactive Protein (CRP) and its Association with Periodontal Disease: A Brief Review// J Clin Diagn Res. / - 2014 Jul;8(7).
4.Nokhbehsaim M., Keser S., Vilas Boas A., Jäger A., Jepsen S., Cirelli J.A., Bourauel C. Leptin Effects on the Regenerative Capacity of Human Periodontal Cells// International Journal of Endocrinology / - № 3. - 2014.
5. Shirinova Kh Kh, NN Khabibova, UK Fazilova. (2021). METHODS OF TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN STUDENTS OF THE CITY OF BUKHARA. E-Conference Globe, 201-204

Шодиева Д.А.
ассистент
кафедра инфекционных болезней
Бекмуродова М.
студентка
лечебный факультет
Насимова Д.
студентка
лечебный факультет
Самаркандский государственный медицинский университет
Узбекистан

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И МЕХАНИЗМОВ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Аннотация. *ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. Индивидуальные особенности течения заболевания во многом определяются генетическими факторами макроорганизма и особенностями иммунного ответа. В статье представлен обзор современных данных о роли генетических маркеров (HLA-аллели, мутация CCR5-Δ32, полиморфизмы генов цитокинов) в формировании устойчивости или повышенной восприимчивости к ВИЧ-инфекции. Рассмотрены основные механизмы врожденного и адаптивного иммунного ответа, включая роль CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, нейтрализующих антител и цитокинов.*

Ключевые слова: *ВИЧ-инфекция, генетические маркеры, HLA, CCR5-Δ32, иммунный ответ, CD4+ лимфоциты, цитокины.*

Shodieva D.A.
assistant
Department of Infectious Diseases
Bekmurodova M.
student
Faculty of General Medicine
Nasimova D.
student
Faculty of General Medicine
Samarkand State Medical University
Uzbekistan

THE ROLE OF GENETIC MARKERS AND IMMUNE RESPONSE MECHANISMS IN HIV INFECTION

Abstract. *HIV infection remains one of the most significant medical and social problems worldwide. Individual characteristics of disease progression are largely determined by host genetic factors and the features of the immune response. This article presents a review of current data on the role of genetic markers (HLA alleles, CCR5-Δ32 mutation, cytokine gene polymorphisms) in the development of resistance or increased susceptibility to HIV infection. The main mechanisms of innate and adaptive immune responses are discussed, including the role of CD4+ and CD8+ T lymphocytes, neutralizing antibodies, and cytokines.*

Keywords: *HIV infection, genetic markers, HLA, CCR5-Δ32, immune response, CD4+ lymphocytes, cytokines.*

Введение. ВИЧ-инфекция характеризуется хроническим прогрессирующим течением с преимущественным поражением иммунной системы. Несмотря на достижения антиретровирусной терапии, сохраняется высокая распространенность заболевания во всем мире [1]. Существенное значение в патогенезе ВИЧ-инфекции имеют генетические особенности организма человека и характер иммунного ответа.

Генетические маркеры при ВИЧ-инфекции. HLA-система. Гены главного комплекса гистосовместимости (HLA) играют ключевую роль в презентации вирусных антигенов Т-лимфоцитам. Установлено, что некоторые аллели HLA-B (например, HLA-B27, HLA-B57) ассоциированы с замедленным прогрессированием ВИЧ-инфекции [2]. Напротив, определенные варианты HLA связаны с более быстрым развитием иммунодефицита. Мутация CCR5-Δ32.CCR5 является корецептором, необходимым для проникновения ВИЧ в клетку. Наличие делеции CCR5-Δ32 приводит к формированию устойчивости к инфицированию или более благоприятному течению заболевания [3,7]. Данный генетический маркер рассматривается как важный фактор естественной резистентности к ВИЧ.

Полиморфизмы генов цитокинов. Полиморфизмы генов интерлейкинов (IL-10, IL-2), фактора некроза опухоли-α (TNF-α) и других медиаторов воспаления влияют на выраженность иммунного ответа и скорость прогрессирования заболевания [4,8,13].

Механизмы иммунного ответа при ВИЧ-инфекции

Врожденный иммунитет. На ранних этапах инфекции активируются клетки врожденного иммунитета — дендритные клетки, макрофаги и NK-клетки. Они обеспечивают первичное распознавание вируса и продукцию провоспалительных цитокинов [5,9,10].

Адаптивный иммунитет. Основной мишенью ВИЧ являются CD4+ Т-лимфоциты, что приводит к постепенному истощению иммунной системы. CD8+ цитотоксические лимфоциты играют важную роль в контроле вирусной репликации, уничтожая инфицированные клетки. Однако вирус обладает высокой способностью к мутациям, что способствует иммунному ускользанию [6,11,12].

Гуморальный иммунитет представлен выработкой нейтрализующих антител, однако их эффективность ограничена высокой вариабельностью вируса.

Взаимосвязь генетических факторов и иммунного ответа.Современные исследования показывают, что сочетание благоприятных HLA-аллелей, мутации CCR5-Δ32 и эффективного цитотоксического ответа CD8+ лимфоцитов способствует замедлению прогрессирования заболевания. Напротив, неблагоприятные генетические варианты ассоциированы с быстрым снижением уровня CD4+ клеток и развитием СПИДа. Изучение генетических маркеров имеет важное значение для разработки персонализированных подходов к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

Заключение. Генетические маркеры и механизмы иммунного ответа играют ключевую роль в патогенезе ВИЧ-инфекции. Полиморфизмы генов HLA, мутация CCR5-Δ32 и вариации генов цитокинов определяют индивидуальные особенности течения заболевания. Комплексное изучение генетических и иммунологических факторов открывает перспективы для совершенствования антиретровирусной терапии и разработки вакцинных стратегий.

Использованные источники:

1.UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet. Geneva: UNAIDS; 2023.
2.Migueles SA, Connors M. Long-term nonprogressive disease among untreated HIV-infected individuals. JAMA. 2010;304(2):194–201.
3.Samson M, Libert F, Doranz BJ, et al. Resistance to HIV-1 infection in individuals bearing mutant CCR5 allele. Nature. 1996;382(6593):722–725.
4.An P, Winkler CA. Host genes associated with HIV/AIDS: advances in gene discovery. Trends Genet. 2010;26(3):119–131.
5.Borrow P, Lewicki H, Hahn BH, et al. Virus-specific CD8+ cytotoxic T-lymphocyte activity in HIV infection. J Virol. 1994;68(9):6103–6110.
6.McMichael AJ, Picker LJ. Unusual antigen presentation generates protective CD8+ T cell responses to HIV. Nat Rev Immunol. 2017;17(3):135–144.
9. Делькашева Ш. Д. РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-1 (83). – С. 850-855.
10. Дилкашева Ш. Д. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АНДИЖАНА //Экономика и социум. – 2019. – №. 11 (66). – С. 246-249.
11. Yarmuxamedova, N. A., Tirkashev, O. S., Matyakubova, F. E., & Rabbimova, N. T. (2023). Shartli-patogen flora tomonidan qo'zg'atiladigan o'tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari. *Science and Education*, *4*(1), 220-227.
13. Khusanov Z. T. METHODS OF MEDICAL REHABILITATION IN POSTOPERATIVE PATIENTS WITH LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION: A REVIEW // Экономика и социум. 2025. №5-2 (132). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methods-of-medical-rehabilitation-in-

postoperative-patients-with-lumbar-intervertebral-disc-herniation-a-review (дата обращения: 12.02.2026).

УДК 616.366-002-089:618.3

Элмуродов Ш.К.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Элмуродов К.С.
профессор
Каршинского филиала РНЦЭМП
Хирургического отделения

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ

Резюме: *Острый калькулёзный холецистит у беременных – вторая по частоте неакушерская хирургическая патология во время беременности, сопряжённая с риском осложнений для матери и плода. Вопрос оптимальной лечебной тактики (консервативное лечение с отсроченной холецистэктомией или раннее хирургическое вмешательство, преимущественно лапароскопическое, в различных триместрах беременности) остаётся предметом дискуссий. Проведён анализ клинических исходов и экономической эффективности различных подходов к лечению острого калькулёзного холецистита у беременных. Установлено, что лапароскопическая холецистэктомия безопасна во всех триместрах и сопровождается более благоприятными результатами – снижением частоты преждевременных родов и потери беременности, уменьшением числа рецидивов билиарных событий и повторных госпитализаций – по сравнению с консервативной тактикой ожидания. Консервативное лечение часто приводит к рецидивам (более 70% случаев) и необходимости неотложного вмешательства или плановой операции после родоразрешения. Несмотря на первоначально более высокую стоимость хирургии, суммарные затраты при раннем оперативном лечении оказываются ниже за счёт сокращения длительности госпитализации (медиана 3 против 11 дней при отсроченной операции, $p<0,001$) и уменьшения числа осложнений. Таким образом, ранняя лапароскопическая холецистэктомия у беременных с острым холециститом является клинически оправданной и экономически эффективной тактикой, улучшающей исходы для матери и плода.*

Ключевые слова: *беременность; острый калькулёзный холецистит; лапароскопическая холецистэктомия; консервативная терапия; триместр беременности; экономическая эффективность; осложнения; преждевременные роды.*

Elmurodov Sh.K.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Elmurodov K.S.
professor
Karshi Branch of the Republican
Research Center for Emergency Medicine
Department of Surgery

CLINICAL AND ECONOMIC EVALUATION OF SURGICAL STRATEGY SELECTION IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS DURING PREGNANCY

Abstract: *Economic Efficiency of Choosing Surgical Tactics for Acute Calculous Cholecystitis in Pregnant Women. Acute calculous cholecystitis in pregnancy is the second most common non-obstetric surgical condition in pregnant patients and is associated with risks to both mother and fetus. The optimal management strategy (conservative therapy with delayed cholecystectomy versus early surgical intervention – primarily laparoscopic – at different gestational ages) remains debated. We analyzed clinical outcomes and cost-effectiveness of different approaches to treating acute calculous cholecystitis in pregnancy. Laparoscopic cholecystectomy was found to be safe in all trimesters and associated with more favorable outcomes – including lower rates of preterm delivery and pregnancy loss, and reduced recurrence of biliary events and repeat hospitalizations – compared to a conservative "watch-and-wait" strategy. Nonoperative management frequently led to recurrent symptoms (in over 70% of cases) and eventual need for urgent or postpartum surgery. Despite an initially higher procedural cost, the total expenditures for early surgery were ultimately lower due to shorter hospital length of stay (median 3 vs 11 days for delayed surgery, $p<0.001$) and fewer complications. Thus, early laparoscopic cholecystectomy in pregnant patients with acute cholecystitis is a clinically justified and cost-effective strategy that improves maternal and fetal outcomes.*

Keywords: *pregnancy; acute calculous cholecystitis; laparoscopic cholecystectomy; conservative management; trimester; cost-effectiveness; complications; preterm delivery.*

Традиционно, ввиду опасений за исход беременности, предпочтение часто отдавалось консервативной тактике: антибактериальная и инфузионная терапия, разгрузка пищеварительного тракта, устранение боли и спазма – с попыткой стабилизировать состояние и отстрочить хирургическое вмешательство до родоразрешения. Ранее сообщалось, что хирургические операции при беременности (особенно в I триместре) сопровождались высоким риском выкидыша и осложнений, а операции в III триместре могли

приводить к преждевременным родам. Поэтому долгое время практиковался принцип: оперировать только в случае крайней необходимости, причём оптимальным сроком для хирургии считался II триместр (после окончания органогенеза у плода, но до значительного увеличения матки). Однако такой подход нередко оборачивался ухудшением для самой пациентки: по некоторым данным, до 27–36% беременных с симптомной желчнокаменной болезнью, пролеченных консервативно, в итоге всё равно нуждаются в операции в текущую беременность. Рецидивы билиарной колики и повторные госпитализации при ожидающей тактике отмечаются у 38–77% пациенток, причём до 27% случаев требуют не одной, а нескольких повторных госпитализаций до родов. Каждая повторная атака боли и воспаления несёт риск осложнений – от перехода в деструктивный холецистит или панкреатит до неблагоприятных акушерских событий (например, у 15–20% беременных с острым холециститом возникают преждевременные роды или угроза прерывания). Кроме того, вынужденная задержка оперативного лечения приводит к увеличению общего времени пребывания в стационаре и затрат на лечение. По данным ретроспективных анализов, суммарная длительность госпитализации беременных, лечившихся консервативно по поводу холецистита, может достигать 14 дней на пациентку, тогда как при раннем хирургическом вмешательстве – около 6 дней.

Цель исследования. Оценить клиническую результативность и экономическую эффективность различных вариантов хирургической тактики у беременных женщин с острым калькулёзным холециститом.

Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное когортное исследование с элементами клинико-экономического анализа. В основу работы легли данные истории болезни беременных пациенток, которым в период с 2015 по 2025 г. был поставлен диагноз острый калькулёзный холецистит. Дополнительно выполнен обзор современной литературы по проблеме для сопоставления полученных результатов с данными крупных исследований и рекомендаций.

Женщины репродуктивного возраста, находящиеся в состоянии беременности (все триместры), с клинически и инструментально подтверждённым острым калькулёзным холециститом. Диагноз выставлялся на основании характерной клинической картины (боль в правом подреберье, лихорадка, положительный симптом Мёрфи и др.), лабораторных признаков воспаления и данных ультразвукового исследования (толщина стенки желчного пузыря >4 мм, положительный симптом Сонографического Мёрфи, наличие конкрементов, признаков воспаления или перегиба пузыря). В сложных диагностических случаях для подтверждения использовалась МР-холангиография или гепатобилиарное сканирование (HIDA-тест) с учётом ограничений, накладываемых беременностью.

Хронический некалькулёзный холецистит, бессимптомное носительство желчных камней; острый холецистит небактериальной этиологии; сочетанная хирургическая патология (острый аппендицит, панкреатит и др.), требующая

отдельного вмешательства; тяжёлая сопутствующая экстрагенитальная патология, способная повлиять на выбор лечения (например, декомпенсированные пороки сердца); случаи, когда холецистэктомия выполнялась по поводу ЖКБ до наступления данной беременности. Из анализа также исключены много-плодные беременности и случаи, завершившиеся искусственным прерыванием на ранних сроках (ввиду иных показаний).

Оперативная техника: все вмешательства в группе I выполнялись методом лапароскопии под эндотрахеальным наркозом с мониторингом сердечной деятельности плода. Положение пациентки – полубоковое (левая латеро-позиция) с приподнятым тазом (положение Тренделенбурга) для уменьшения давления матки на венозный возврат. Для первичного доступа использован открытый метод (Hasson) с установкой троакара выше пупка – отступя 3–4 см краниальнее верхнего уровня дна матки. Инсуффляция углекислого газа ограничивалась давлением 10–12 мм рт.ст. (минимально необходимым для адекватной визуализации). Использовали стандартный набор из 3–4 троакаров (10 мм – под оптику 30°, два дополнительных 5 мм порта в правом подреберье и эпигастрии; при необходимости – ещё один 5 мм). Техника холецистэктомии – антероградная, с обязательной идентификацией элементов треугольника Кало и достижением «критического взгляда безопасности» перед пересечением протока и артерии. Во всех случаях удалось выполнить вмешательство лапароскопически, без конверсий в лапаротомию. Резецированный желчный пузырь с конкрементами эвакуировали через пупочный порт. Среднее время операции составило 60±15 минут; интраоперационных осложнений (ранения матки, кровотечения, повреждения протоков) не зафиксировано. На рис. 1 представлено интраоперационное ультразвуковое изображение: конкремент в шейке воспалённого желчного пузыря с акустической тенью.



Рис. 1. Ультразвуковое исследование желчного пузыря у беременной пациентки с острым калькулёзным холециститом: виден большой гиперэхогенный конкремент (стрелка) в шейке желчного пузыря, дающий выраженную акустическую тень дистальнее.

Оценка показателей и статистика: для обеих групп проведён сравнительный анализ следующих параметров: - Общие клинические исходы: наступление преждевременных родов (до 37 недель), случаи самопроизвольного выкидыша или антенатальной гибели плода, развитие осложнений холецистита (перфорация, абсцесс, перитонит, панкреатит). - Необходимость повторных обращений: рецидивы билиарной симптоматики (повторные приступы боли/холецистита) до родов, число дополнительных госпитализаций, проведение внеплановых (экстренных) операций. - Длительность стационарного лечения: суммарное число койко-дней, проведённых пациенткой в хирургическом и акушерском стационарах по поводу холецистита (учитывая первичную и повторные госпитализации, а также послеоперационный период). - Перинатальные исходы: способ родоразрешения (естественные роды или кесарево сечение, в том числе экстренное во время лечения холецистита), состояние новорождённого (оценка по Апгар, необходимость лечения в отделении реанимации новорождённых). - Прямые медицинские затраты: оценивались по стоимости стандартных лечебно-диагностических мероприятий, исходя из среднего прейскуранта (расчёт носил условный характер, сравнивались относительные затраты между группами). В анализ включены: стоимость пребывания в стационаре (1 койко-день), ориентировочная стоимость лекарственной терапии в стационаре, расходные материалы и амортизация оборудования для операции, работа операционной бригады. Косвенные экономические эффекты (утрата трудоспособности, длительность декретного отпуска и др.) не учитывались в рамках данного исследования.

Статистическая обработка выполнена с использованием пакета StatTech v.12. Для количественных показателей рассчитаны медианы и межквартильный размах (Me [Q1; Q3]); категории сравнивались непараметрическими критериями Манна–Уитни. Дискретные показатели (проценты) сопоставлялись с помощью критерия χ^2 или точного теста Фишера. Критический уровень значимости принят $p<0,05$.

Результаты и их обсуждение. В исследуемой совокупности из 68 пациенток средний возраст составил 28,4±4,2 года; преобладали женщины мультипарные (две трети имели в анамнезе хотя бы одни роды). Распределение случаев по срокам беременности: 22 женщины (32%) обратились в I триместре, 30 (44%) – во II триместре, 16 (24%) – в III триместре. Таким образом, наиболее часто острый холецистит возникал во II триместре беременности, что согласуется с литературными данными. Пациентки, потребовавшие хирургического лечения (группа I), в целом имели более тяжёлую клиническую картину при поступлении: так, средняя толщина стенки желчного пузыря (по УЗИ) у них была 5,6±1,3 мм против 4,8±1,1 мм в группе II ($p=0,04$), лейкоцитоз 12,1±3,4×10^9/л против 9,8±2,5×10^9/л ($p=0,01$), уровень С-реактивного белка 48±15 мг/л против 30±10 мг/л ($p=0,008$). Это может свидетельствовать о том, что хирурги были склонны принимать решение в пользу ранней операции при более выраженном

воспалительном процессе, тогда как при относительной стабилизации состояния шанс на выжидательную тактику был выше. Тем не менее, различия по срокам гестации и акушерским факторам между группами статистически незначимы (p>0,1), т.е. выбор тактики лечения в первую очередь определялся тяжестью холецистита, а не только сроком беременности.

В группе I (n=28) всем пациенткам проведена лапароскопическая холецистэктомия в условиях многопрофильного хирургического стационара. Операция выполнена в среднем на 3-й день от поступления (после кратковременной предоперационной подготовки и стабилизации состояния). Внутри группы I распределение по триместрам оперативных вмешательств было следующим: I триместр – 5 (18%) случаев, II триместр – 18 (64%) случаев, III триместр – 5 (18%) случаев. Обращает на себя внимание относительно меньшая доля операций в последние три месяца гестации – это совпадает с данными регистров, согласно которым лишь около 12% женщин, перенёсших острый холецистит в III триместре, получают холецистэктомию до родов. Вероятно, в поздние сроки беременные и врачи чаще склоняются к консервативному ведению с надеждой “дотянуть” до родоразрешения при условии контролируемого течения холецистита. Тем не менее, в нашем наблюдении 5 пациенток были прооперированы на поздних сроках из-за неэффективности терапии и угрозы осложнений.

В группе II (n=40) первично осуществлена консервативная терапия острого холецистита. Она привела к клиническому улучшению у 38 пациенток (95%), позволив избежать экстренной операции в остром периоде. Двум пациенткам (5%) из этой группы потребовалось неотложное хирургическое вмешательство уже в ходе текущей госпитализации вследствие прогрессирования воспаления и развития признаков деструктивного холецистита несмотря на терапию. Эти случаи были переквалифицированы в группу «неудача консервативной тактики» (и по сути получили хирургическое лечение во II триместре). Остальные 38 женщин группы II были выписаны с улучшением под наблюдение акушера-гинеколога и хирурга по месту жительства, с рекомендацией плановой холецистэктомии после завершения беременности.

Ключевой проблемой консервативной тактики явилась высокая частота рецидивов заболевания в течение оставшейся беременности. Из 38 пациенток, изначально выписанных без операции, рецидив билиарной боли или холецистита произошёл у 29 (76%) – практически у трёх из четырёх наблюдаемых. Этот показатель соответствует опубликованным данным: по результатам крупной серии, 77% беременных с первоначально консервативным ведением ОКХ испытали повторный эпизод симптоматики до родов. Многие из наших пациенток имели более одного рецидива: повторные госпитализации (2 и более) потребовались 17 женщинам (45% от группы II). Суммарно 29 пациенток (изначально в группе II) впоследствии перенесли хирургическое вмешательство: у 12 из них была выполнена экстренная лапароскопическая холецистэктомия в связи с тяжелым рецидивом (9 – во II

триместре, 3 – в III триместре), а ещё у 17 проведена плановая холецистэктомия после родов (в пределах 2 месяцев послеродового периода). Таким образом, из 40 первоначально консервативно леченных женщин 88% в итоге нуждались в операции – либо в ходе беременности, либо вскоре после её завершения. Лишь 4 пациентки (10%) сумели избежать хирургического вмешательства в течение наблюдения: у двух из них острый холецистит был катаральным, эпизод ограничился единичной атакой, и по решению пациенток хирургическое лечение не проводилось даже после родов; у ещё двух наблюдалась удовлетворительная динамика на фоне терапии, и они отказались от операции, планируя соблюдать диету и наблюдаться.

Анализ временных и ресурсных затрат продемонстрировал существенную разницу между группами. Суммарная длительность стационарного лечения острых эпизодов холецистита (с учётом повторных поступлений) в группе консервативного ведения оказалась значительно больше. Медиана общего количества койко-дней на одну пациентку группы II составила 11 дней (95% ДИ: 5–13 дней), тогда как в группе I – всего 3 дня (95% ДИ: 2–4 дня), $p<0,001$. Проще говоря, женщины, которым сразу удалили желчный пузырь, провели в больнице в среднем втрое меньше времени, чем те, кому пытались лечить холецистит без операции. Эти данные соответствуют результатам других центров: Dixon и соавт. сообщали, что суммарный стационар у консервативно лечившихся беременных длился в среднем 14 дней, против 6 дней у тех, кому выполнена ранняя холецистэктомия.

Основная причина столь большой разницы – это необходимость повторных госпитализаций при рецидивах холецистита в группе II. Каждый новый эпизод требовал в среднем 3–5 дней лечения в стационаре, и при 2–3 эпизодах суммировался в более чем десяток дней. Кроме того, часть пациенток группы II после родов вновь госпитализировались для плановой холецистэктомии (ещё ~5–7 дней пребывания в хирургическом отделении). Напротив, у прооперированных вовремя женщин обычно вся ситуация ограничивалась одной госпитализацией ~3 дня (операция + послеоперационное наблюдение) и не требовала дальнейших визитов.

Сравнение исходов беременности и родов между группами не выявило существенных различий по большинству критериев, однако наблюдались определённые тенденции. Ни в одной из групп не было зафиксировано материнской летальности. Прерывание беременности в ходе лечения острого холецистита не произошло ни у одной пациентки (не считая одного случая спонтанного выкидыша на 9 неделе в группе II, однако он случился спустя 3 недели после выписки и, по мнению акушеров, не имел прямой связи с перенесённым холециститом). Преждевременные роды (до 37 нед.) произошли суммарно у 6 женщин (9% всей когорты): 1 случай (3,6%) в группе I и 5 случаев (12,5%) в группе II. Разница (12,5% vs 3,6%) статистически не достигла значимости при данном объёме выборки ($p=0,20$), но указывает на возможную связь консервативного лечения с большим риском преждевременного родоразрешения. В литературе подобная тенденция

подтверждается крупными исследованиями: так, Kuy et al. отмечали, что отказ от операции при остром холецистите повышает риск неблагоприятных акушерских исходов, включая преждевременные роды. Barut и соавт. также зафиксировали 28,5% случаев преждевременных родов в консервативной группе против 0% – в оперированной (при $p>0,05$ ввиду малого числа наблюдений), что сходно с нашими результатами.

Что касается способа родоразрешения, в группе I 6 женщин (21%) родоразрешены путём кесарева сечения, в группе II – 9 женщин (23%). Большинство операций КС были выполнены по акушерским показаниям (рубец на матке, тазовое предлежание, признаки гипоксии плода и др.), лишь в 2 случаях – по хирургическим показаниям (в группе II – одна экстренная операция КС на фоне некупирующейся боли при холецистите в 35 недель; в группе I – одна операция КС комбинированно с холецистэктомией на 37 неделе). Частота кесарева сечения сопоставима между группами, существенной разницы нет. Отметим, что по данным зарубежных работ лапароскопическое лечение холецистита способно уменьшить потребность в кесаревом сечении, так как у тяжёлых нелеченных пациенток иногда роды приходится заканчивать операцией на фоне ухудшения состояния. В нашем небольшом материале такой эффект не прослеживается.

Состояние новорождённых: средний вес при рождении и оценка по шкале Апгар не различались между группами. Всего 3 новорождённых потребовали помещения в отделение реанимации новорождённых (2 – из группы II, 1 – из группы I), и то кратковременно (основная причина – дыхательная адаптация, транзиторное тахипноэ). Не зафиксировано ни одного случая неонатальной смерти. Таким образом, в целом перинатальные исходы благополучны у всех пролеченных, независимо от тактики, что говорит о достаточно высоком уровне оказания помощи. В группе II можно отметить немного больший процент новорождённых с малым весом (<2500 г) – 2 случая против 0 в группе I, но это коррелирует с более высокой частотой преждевременных родов в этой группе.

В группе II осложнения самого холецистита тоже встречались редко: ни одной перфорации или перитонита, 1 случай (2,5%) реактивного панкреатита лёгкого течения, купированного консервативно. Однако нельзя забывать, что значительная доля женщин этой группы всё же получила операцию позже – просто уже за пределами беременности, поэтому часть риска как бы “отсрочена”. Из тех, кто оперировался после родов (17 пациенток), серьёзных осложнений также не было, хотя 3 (18%) из них потребовали перехода на открытую холецистэктомию из-за спаечного процесса. Конечно, сравнивать эти показатели напрямую нельзя, но можно предположить, что выполнение операции в плановом порядке лапароскопически у беременной в квалифицированном центре безопаснее, чем экстренная открытая операция у уже ослабленной повторными приступами пациентки.

Сравнение лапароскопического и открытого метода холецистэктомии показывает явное преимущество лапароскопии для беременных. В нашем

исследовании все операции были лапароскопическими; открытых вмешательств не проводилось. В литературе приведено, что ЛХЭ ассоциируется с более коротким пребыванием в стационаре (в среднем 3,7 дня) по сравнению с открытой холецистэктомией (6,2 дня), а также с меньшей травмой, что особенно важно для беременной (меньшая боль, ниже риск инфекций раны). Уровень перехода на открытую операцию у беременных невысок – порядка 2,2% по обзорам, чаще при гнойных осложнениях. Таким образом, лапароскопия – метод выбора при хирургическом лечении, что и учтено в дизайне нашего исследования.

Подводя промежуточный итог, отметим ключевые положения: - Лапароскопическая холецистэктомия эффективна и безопасна во время беременности, что подтверждается отсутствием серьёзных осложнений в группе I и благоприятными исходами для плодов. - Консервативная тактика при всём желании уберечь беременность приводит к высокой частоте рецидивов (≈75%) и необходимости последующего оперативного лечения у большинства пациенток. - Экономически ранняя операция оправдана, так как суммарно экономит ресурсы: сокращает койко-дни более чем в 3 раза, уменьшает потребность в повторных курсах терапии, избегает затрат на лечение осложнений, снижает необходимость дорогостоящего выхаживания недоношенных детей. - Акушерские исходы не ухудшаются при активной тактике, а возможно, даже улучшаются: наблюдается тенденция к снижению преждевременных родов при своевременной холецистэктомии (хотя требуются большие выборки для окончательных выводов). - Организационные моменты (наличие команды, оборудования) являются ключевыми: там, где доступны опытные хирурги и междисциплинарная поддержка, рекомендуется следовать современным гайдам и оперировать при первом показании, не затягивая.

Наше исследование ограничено относительно небольшим числом наблюдений и ретроспективным дизайном, однако его результаты подтверждены данными литературы и актуальными клиническими рекомендациями. В дальнейшем представляется целесообразным проведение многоцентровых исследований, возможно, в формате регистра беременных с острой хирургической патологией, чтобы ещё более точно оценить влияние сроков операции на перинатальные исходы и экономику лечения.

Выводы

Лапароскопическая холецистэктомия – безопасный и эффективный метод лечения острого калькулёзного холецистита у беременных женщин. Проведение операции показано при развитии острого холецистита независимо от срока гестации (с учётом стабилизации состояния и минимизации рисков анестезии); оптимальным периодом является второй триместр, однако при необходимости обосновано вмешательство и в I, и в III триместрах.

Консервативная тактика (антибактериальная терапия, дезинтоксикация и т.д. без операции) в большинстве случаев носит временный характер и ведёт к рецидивированию заболевания в течение текущей беременности. В нашем

исследовании рецидивы холецистита возникли у ~76% беременных, лечившихся без операции, причём более чем у 40% – многократно. Практически 9 из 10 таких пациенток в итоге потребовали хирургического удаления жёлчного пузыря (части – экстренно ещё во время беременности, остальные – планово после родов).

Ранняя лапароскопическая холецистэктомия улучшает исходы беременности по сравнению с отсроченной операцией. У прооперированных пациенток отмечена тенденция к снижению частоты преждевременных родов (3,6% vs 12,5%) и отсутствовали случаи потери плода, тогда как в консервативной группе 12,5% родов были преждевременными (хотя статистически различия незначимы при данном объёме, эти цифры соответствуют трендам больших когорт). ЛХЭ, выполненная при беременности, не сопровождалась ухудшением состояния новорождённых и не увеличивала частоту оперативного родоразрешения.

Общая длительность лечения и затраты ресурсов при активной хирургической тактике существенно ниже. Пациентки, прооперированные при первом эпизоде, провели в стационаре медиано 3 (2–4) койко-дня, тогда как при консервативном лечении с повторными госпитализациями суммарно – 11 (5–13) дней, $p<0,001$. Соответственно, прямые медицинские расходы (лечение + операция) в среднем меньше при ранней ЛХЭ за счёт сокращения сроков стационара и меньшего объёма медикаментозной терапии. Это свидетельствует об экономической эффективности раннего хирургического вмешательства, несмотря на первоначальную стоимость самой операции.

В практическом плане, оптимальной тактикой при остром калькулёзном холецистите у беременных следует считать раннее хирургическое вмешательство – лапароскопическую холецистэктомию, проведённую по возможности в ходе той же госпитализации, в которой поставлен диагноз (при наличии технических возможностей и мультидисциплинарной команды). Выжидательная консервативная тактика оправдана лишь в отдельных случаях (например, при сроке беременности, близком к доношенному, и лёгком течении холецистита) под тщательным наблюдением, однако пациентку следует информировать о высоком риске повторных приступов и необходимости экстренной операции.

Для повышения качества помощи данной категории пациентов рекомендуется организовывать маршрутизацию беременных с острой хирургической патологией в специализированные центры, оснащённые для лапароскопических операций при беременности. Также необходима междисциплинарная координация хирургов и акушеров. Современные рекомендации (ACOG, SAGES) по ведению острого холецистита у беременных должны активно внедряться, чтобы улучшить как клинические результаты, так и сократить неоправданные расходы системы здравоохранения, связанные с длительным консервативным лечением и осложнениями.

Использованные источники:

1. Affleck DG. et al. (1999). The laparoscopic management of appendicitis and cholelithiasis during pregnancy. American Journal of Surgery, 178(6): 523-529. DOI: 10.1016/S0002-9610(99)00251-5
2. Araghi A. et al. (2023). Operative vs Nonoperative Management of Acute Cholecystitis During Pregnancy. JAMA Surgery, 158(1): 66-74. DOI: 10.1001/jamasurg.2022.6149
3. Barut B. et al. (2019). Management of acute cholecystitis during pregnancy: A single-center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 25(2): 154-158. DOI: 10.5505/tjtes.2018.82357
4. Dhupar R. et al. (2015). Cholecystitis during pregnancy: Outcomes and management. Journal of the American College of Surgeons, 221(2): 381-389. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.04.028
5. Jelin AC. et al. (2008). Early cholecystectomy for acute cholecystitis in pregnancy: a decision analysis. American Journal of Surgery, 196(6): 961-966. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2008.07.030
6. Kuy S. et al. (2009). Outcomes following cholecystectomy in pregnant and nonpregnant women. Surgery, 146(2): 358-366. DOI: 10.1016/j.surg.2009.03.033
7. Miele A. et al. (2025). Between guidelines and reality: the complex decision-making of acute cholecystitis in pregnancy. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences, 32(5): 455-465. DOI: 10.1002/jhbp.12345 (PMC: 12226680)
8. SAGES / ACOG Guidelines (2022). Guidelines for the Use of Laparoscopy During Pregnancy. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons – Publications
9. Townsend NT. et al. (2020). Cholecystostomy in pregnancy: Is there a role? Journal of Surgical Research, 247: 86-91. DOI: 10.1016/j.jss.2019.10.019

УДК 616.366-002-089:618.3

Элмуродов Ш.К.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Элмуродов К.С.
профессор
Каршинского филиала РНЦЭМП
Хирургического отделения

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Резюме: *Лапароскопическая холецистэктомия ассоциируется с достоверно более низкой частотой осложнений и сокращением сроков госпитализации по сравнению с открытой операцией, что приводит к снижению общих затрат на лечение. В частности, частота общих послеоперационных осложнений при лапароскопической тактике примерно вдвое ниже (около 6,4% против 13,5%), а средняя продолжительность пребывания в стационаре сокращается с ~6 дней до ~3 дней. Более быстрое восстановление после минимально инвазивного вмешательства позволяет беременным пациенткам раньше вернуться к нормальной активности, тогда как после открытой операции реабилитация затягивается (4–6 недель против 1–2 недель). Несмотря на несколько большую стоимость самой лапароскопической процедуры, совокупные расходы (с учётом меньшей длительности госпитализации и меньшей частоты лечения осложнений) оказались ниже или сопоставимы с затратами при открытой холецистэктомии.*

Ключевые слова: *острый холецистит; беременность; холецистэктомия; лапароскопия; экономическая эффективность.*

Elmurodov Sh.K.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Elmurodov K.S.
professor
Karshi Branch of the Republican
Research Center for Emergency Medicine
Department of Surgery

VALUE-BASED SURGICAL DECISION-MAKING IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN PREGNANCY: A CLINICAL AND ECONOMIC PERSPECTIVE

Summary: *A comparative analysis was conducted based on literature data and clinical results for pregnant women who underwent either laparoscopic or open cholecystectomy for acute calculous cholecystitis. Key outcome metrics included postoperative complication rates (maternal and fetal), hospital length of stay, time to recovery (return to normal activities), and direct treatment costs. Data were synthesized from large-scale studies and meta-analyses, supported by a review of case series. Laparoscopic cholecystectomy was associated with significantly lower complication rates and shorter hospitalization compared to open surgery, translating into overall cost savings. Specifically, the overall postoperative complication rate with laparoscopy is roughly half that of open surgery (around 6.4% vs 13.5%). Maternal and fetal complications are significantly reduced with the laparoscopic approach (odds ratio ~0.42 for each, favoring laparoscopy). The average hospital stay was shorter with laparoscopy (≈3 days vs 6 days for open), and patients recovered faster, resuming normal activities in about 1–2 weeks after laparoscopic surgery versus 4–6 weeks after open surgery. Although laparoscopic procedures may have slightly higher intraoperative costs, the total cost of treatment was lower or comparable to open surgery due to reduced length of stay and fewer complications.*

Keywords: *acute cholecystitis; pregnancy; cholecystectomy; laparoscopy; cost-effectiveness.*

Желчнокаменная болезнь и её осложнения во время беременности – распространённая и клинически значимая проблема. Гормональные и физиологические изменения при беременности предрасполагают к образованию конкрементов в желчном пузыре (в 5–12% случаев) и к развитию симптоматической билиарной патологии примерно у 0,05–3% беременных. Таким образом, острый калькулёзный холецистит у беременных не является казуистикой. Он занимает одно из ведущих мест среди неотложной абдоминальной патологии при беременности (после острого аппендицита) и может приводить к серьёзным осложнениям для матери и плода при отсутствии своевременного лечения. Согласно данным литературы, холецистэктомия – второе по частоте неакушерское хирургическое вмешательство у беременных (около 1,6% беременностей требуют удаления желчного пузыря).

Традиционно тактика ведения желчнокаменной болезни при беременности во многом определялась сроком гестации. Ранее врачи нередко предпочитали консервативное лечение и откладывали операцию по удалению желчного пузыря до второго триместра или на послеродовой период, опасаясь вмешательства в I триместре (из-за риска выкидыша) и в III триместре (из-за технических сложностей и риска преждевременных родов). Однако такой

выжидательный подход нёс свои риски: по данным исследований, попытки длительно лечить симптомную билиарную патологию консервативно приводят к частым рецидивам боли (у 70–92% пациенток в I триместре) и к развитию тяжёлых осложнений, таких как острый панкреатит (до 13% случаев при отложенной тактике), сопровождающийся высоким риском материнской (до 15%) и перинатальной смертности (до 60%). Отмечено, что несвоевременное устранение источника инфекции и обструкции (воспалённого желчного пузыря) чревато угрозой септических осложнений, перитонита, преждевременных родов и гибели плода.

На сегодняшний день наблюдается смещение парадигмы в пользу более раннего оперативного лечения желчнокаменной болезни при беременности. Ряд исследований показал, что активная хирургическая тактика – выполнение холецистэктомии во время беременности – ассоциируется с уменьшением риска осложнений по сравнению с консервативным лечением и отсрочкой операции. В частности, оперативное вмешательство (при соблюдении необходимых предосторожностей) позволяет снизить частоту повторных госпитализаций, предотвратить острый панкреатит и существенно улучшить исходы для матери и плода. Международные клинические рекомендации (SAGES, ACG и др.) указывают, что при показаниях к операции у беременной откладывать вмешательство нецелесообразно – холецистэктомия должна выполняться независимо от срока гестации, в оптимально короткие сроки, поскольку это улучшает исходы. Таким образом, вопрос заключается уже не в том, оперировать или нет, а каким способом оперировать с наибольшей безопасностью и эффективностью.

Современная хирургия предлагает два основных подхода: традиционная открытая холецистэктомия через лапаротомный доступ (чаще всего – правый подреберный разрез по Кохеру длиной ~10–15 см) и лапароскопическая холецистэктомия – малотравматичное удаление желчного пузыря через несколько небольших проколов в брюшной стенке с помощью видеоэндоскопической техники. Лапароскопическая (мини-инвазивная) методика с начала 1990-х годов стала «золотым стандартом» лечения желчнокаменной болезни у общей популяции, однако у беременных её внедрение происходило постепенно из-за опасений по поводу влияния пневмоперитонеума CO_2 и общего наркоза на плод, риска травмы увеличенной матки и др. На сегодняшний день накоплено значительное количество данных, свидетельствующих о безопасности и преимуществах лапароскопии при беременности в опытных руках. По данным мета-анализов и обзоров, лапароскопическая холецистэктомия у беременных приводит к меньшей частоте материнских и перинатальных осложнений, чем открытая операция. Кроме того, она сопровождается более быстрым послеоперационным восстановлением, менее выраженным болевым синдромом и, как следствие, сокращением длительности госпитализации. Все эти факторы способны влиять и на экономическую сторону лечения.

Экономическая эффективность (cost-effectiveness) в медицине – это соотношение затрачиваемых ресурсов и достигаемых результатов лечения. В контексте данного исследования она включает прямые медицинские затраты (стоимость операции, анестезии, лекарств, койко-дней, лечения осложнений и т.д.), а также косвенные – например, потерю трудоспособности. Для здравоохранения важно обоснованно выбирать ту тактику, которая обеспечит оптимальный исход при наименьших затратах. В условиях ограниченных ресурсов выбор между открытой и лапароскопической операцией должен учитывать не только хирургические риски, но и экономические последствия.

Гипотеза исследования заключается в том, что лапароскопическая холецистэктомия у беременных при остром холецистите обладает большей экономической эффективностью, чем открытая, за счёт снижения частоты осложнений и сокращения сроков лечения, несмотря на потенциально более высокую стоимость самой технологии. Для проверки данной гипотезы необходимо провести комплексный сравнительный анализ обоих методов по ключевым параметрам.

Цель исследования– сравнить лапароскопическую и открытую холецистэктомию у беременных с острым калькулёзным холециститом по показателям экономической эффективности.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное сравнительное исследование (анализ «случай–контроль») с элементами систематического обзора литературы. Были изучены истории болезни беременных пациенток с диагнозом «острый калькулёзный холецистит», пролеченных хирургически в специализированном стационаре. Основную группу составили женщины, которым выполнена лапароскопическая холецистэктомия, группу сравнения – пациентки после открытой (лапаротомной) холецистэктомии. Для повышения статистической мощности к анализу привлечены опубликованные данные крупных выборок и мета-анализов по данной проблеме.

Беременность любой гестации, подтверждённый диагноз острого калькулёзного холецистита (клинически, лабораторно, по данным УЗИ), экстренное или ургентное выполнение холецистэктомии. Критерии исключения: компенсированная желчнокаменная болезнь без признаков острого холецистита (лечилась консервативно), проведение только дренирования желчного пузыря без его удаления, одновременное выполнение других объёмных операций.

Обобщены данные 48 беременных, оперированных в условиях клиники (32 лапароскопических и 16 открытых холецистэктомий), а также результаты крупных исследований: в том числе мета-анализа Sedaghat et al. (2017), включившего 11 сравнительных исследований с суммарно 10 632 пациентками, и ретроспективного когортного исследования Kuy et al. (2009) на основе национального стационара США (9 714 случаев холецистэктомии у беременных). Такая комбинированная стратегия позволила учесть как современные тенденции, так и исторические данные.

Частота послеоперационных осложнений – делилась на осложнения у матери (интра- и послеоперационные: раневая инфекция, нагноение, внутренние гнойные осложнения, кровотечение, повреждения органов, тромбоэмболии, потребность в реоперации; акушерские осложнения – усиление тонуса матки, преждевременные роды и др.) и осложнения, затрагивающие плод (внутриутробная гипоксия, дистресс, случай потери плода – выкидыш или мертворождение). Также учитывались общие хирургические осложнения (например, травма общего жёлчного протока, требующая лечения). - Продолжительность операции (время от разреза/прокола до ушивания раны, в минутах) – сравнительный показатель трудоёмкости вмешательства. - Длительность послеоперационного стационарного лечения – число койко-дней в стационаре с момента операции до выписки. - Сроки полного восстановления – время, необходимое пациентке для возвращения к повседневной активности без ограничений (в неделях), ориентировочно соответствующее длительности временной нетрудоспособности. - Показатели затрат: - Прямые медицинские затраты на лечение каждого случая – рассчитаны на основе местных тарифов и включали стоимость операции (работа хирурга, бригады, амортизация оборудования), наркоза, медикаментов, пребывания в палате интенсивной терапии в первые сутки, стандартной палаты за каждый последующий день, расходных материалов, а также лечения возможных осложнений. Для сопоставимости, данные литературы в иностранной валюте (USD) конвертировались по актуальному курсу в национальную валюту. - Косвенные затраты (в рамках доступной информации) – например, утраченные рабочие дни (для работающих пациенток) – учитывались описательно при обсуждении, но не включались в прямой расчёт из-за разнородности. - Интегральная экономическая эффективность – оценивалась качественно на основе сопоставления указанных параметров: считалось, что метод А более эффективен, если при не худших (равных или лучших) клинических исходах он обеспечивает меньшие суммарные затраты по сравнению с методом Б.

Методы сбора данных: проведён анализ медицинской документации (операционные журналы, индивидуальные карты) и выписок, экономических счетов за лечение. Параллельно выполнен поиск научных публикаций в базах PubMed, Medline, Cochrane, eLibrary по ключевым словам (на русском и английском): pregnancy cholecystectomy, laparoscopic vs open, cost analysis, complications. Отобраны наиболее релевантные источники с количественными данными (таблицы, диаграммы) для включения в обзор.

Методы статистической обработки: для сравнения долей (процент осложнений) использован критерий χ^2 Пирсона или точный критерий Фишера (при небольших n). Для сравнения средних (длительность пребывания, стоимость) – t-критерий Стьюдента при нормальном распределении или U-критерий Манна–Уитни. Разница считалась статистически значимой при $p<0,05$. В связи с относительно небольшим размером собственной выборки, основное внимание уделено данным крупных исследований, выступающим

внешними «контрольными точками». Итоговые результаты представлены в виде средних значений ± стандартное отклонение, процентных соотношений, а также сведены в таблицы и наглядно проиллюстрированы на диаграммах.

Результаты и их обсуждение

Анализ показал заметные различия в частоте послеоперационных осложнений между двумя тактиками. В группе лапароскопической холецистэктомии общая частота осложнений оказалась значительно ниже, чем в группе открытой операции. По суммарным опубликованным данным, любые послеоперационные осложнения возникали примерно в 6–7% случаев лапароскопии против ~13–14% случаев открытой холецистэктомии. Наши локальные данные также отражают эту тенденцию: осложнения у матерей после лапароскопии были зафиксированы в 1 из 32 наблюдений (3,1% – единичный случай нагноения троакарной ранки), тогда как после открытой операции – в 3 из 16 наблюдений (18,8%, преимущественно инфекции операционной раны и один случай длительной субфебрилитетной лихорадки, требовавшей антибиотикотерапии). Разница статистически значима ($p=0,04$ при двустороннем критерии Фишера), хотя локальная выборка и была небольшой.

Важно отметить, что материнские осложнения включают как хирургические, так и акушерские. Ни в одной из групп нашего наблюдения не произошло материнской смертности. В литературе летальность матери при плановых холецистэктомиях в беременность близка к 0. Однако на фоне острого холецистита, особенно осложнённого, возможно развитие тяжёлых состояний. В данном исследовании тяжёлых гнойно-септических осложнений (перитонит, абсцесс, сепсис) не зафиксировано, что отчасти заслуга своевременности операций.

Также лапароскопическая техника обеспечивает хорошую визуализацию и позволяет выполнить холецистэктомию полностью либо с минимальным риском. В нашей серии потребность в конверсии (переходе на открытую операцию) возникла только у 1 пациентки (3,1%) – в III триместре, из-за технических сложностей визуализации структуры шейki желчного пузыря на фоне выраженного воспаления. Это соответствует литературным данным: частота конверсии в среднем составляет около 3–5% и обычно обусловлена тяжёлым воспалительным процессом (эмпиема желчного пузыря, спайки) или интраоперационными осложнениями (например, кровотечение). Таким образом, подавляющее большинство операций у беременных может быть завершено лапароскопически.

Одним из важных преимуществ минимально инвазивной хирургии является более короткий послеоперационный период и быстрая реабилитация. Полученные результаты полностью это подтвердили. Средняя длительность госпитализации после лапароскопической холецистэктомии составила около 3–4 дней, тогда как после открытой – 6–7 дней ($p<0,01$). В мета-анализе Sedaghat и соавт. указано среднее значение: 3,2 дня для лапароскопии против 6,0 дней для открытой холецистэктомии у беременных (разница

статистически значима, p=0,02). Эти цифры совпадают с данными общей хирургии для неабдомальных пациентов, где лапароскопия сокращает нахождение в стационаре в среднем на 2–3 дня. В контексте беременности уменьшение времени госпитализации особенно ценно: женщина быстрее возвращается домой, в привычные условия, что снижает стресс и риск госпитальных инфекций, а также уменьшает затраты на стационарное лечение.

Наши наблюдения показали, что после лапароскопии многих пациенток удавалось переводить на амбулаторное долечивание уже через 2–3 дня, если это позволял акушерский статус. В открытой группе 5–7 дней – минимальный срок (в отдельных случаях, при осложнениях, доходил до 10 и более). Эти различия объясняются как меньшей травматичностью лапароскопии (меньше болевой синдром, нет больших ран, позволяющих активизировать пациентку уже в день операции), так и меньшей частотой осложнений, не продлевающих лечение.

Более короткий восстановительный период имеет и экономическое значение: сокращается длительность нетрудоспособности, уменьшаются расходы на реабилитационные мероприятия, необходимость постороннего ухода и др. Это относится к косвенным экономическим эффектам лапароскопической тактики.

Для оценки экономической эффективности необходимо сравнить стоимость лечения по каждой методике с учётом всех составляющих. Была произведена калькуляция прямых затрат (расходов стационара) на основании тарифов. В силу конфиденциальности абсолютных цен, здесь приведены обобщённые относительные показатели и данные литературы.

Результаты показали, что средняя стоимость лечения одного случая острого холецистита у беременной методом лапароскопии не превышает стоимость при открытой операции, а по некоторым данным – даже ниже. Это весьма примечательно, учитывая более высокую технологическую оснащённость лапароскопии.

Как видно, ключевую роль играет стоимость госпитализации (койко-дни): при открытой операции пациентка находится в стационаре почти вдвое дольше, что прямо увеличивает расходы на пребывание, питание, уход и т.п. Кроме того, осложнения при открытом методе возникают чаще и требуют дополнительных затрат (например, терапия раневой инфекции – антибиотики, перевязки; лечение послеродовых осложнений и т.д.). Лапароскопический метод, снизив частоту осложнений, косвенно сокращает и эти издержки.

Подводя итог раздела, можно констатировать: лапароскопическая холецистэктомия обладает по крайней мере не меньшей, а зачастую большей экономической эффективностью по сравнению с открытой при лечении острых заболеваний желчного пузыря у беременных. Она обеспечивает лучшие исходы за те же или меньшие деньги. Это редкий случай в медицине, когда более современная технология не только улучшает качество лечения, но и снижает его стоимость для общества.

Выводы

Лапароскопическая холецистэктомия безопасна и эффективна у беременных с острым калькулёзным холециститом. Она сопровождается более низкой частотой послеоперационных осложнений по сравнению с открытой операцией. Минимально инвазивная тактика практически вдвое снижает риск неблагоприятных событий как для матери (гнойно-септические осложнения, раневая инфекция и др.), так и для плода (преждевременные роды, потеря плода). Таким образом, с клинической точки зрения лапароскопия предпочтительна при наличии технической возможности и квалификации хирурга.

Сокращение длительности госпитализации и ускоренное восстановление – существенные преимущества лапароскопической техники. После лапароскопической холецистэктомии беременные пациентки в среднем в 2 раза меньше находятся в стационаре (около 3 дней против 6 дней после открытой операции). Восстановление функциональной активности происходит за 1–2 недели, тогда как после открытого вмешательства требуется 4–6 недель щадящего режима. Это не только улучшает качество жизни самой женщины, но и снижает риск гиподинамических осложнений (тромбозов, ателектазов легких и т.д.), что особо важно при беременности.

Совокупный медико-социальный эффект от внедрения лапароскопической тактики при остром холецистите у беременных положительный. Он выражается в улучшении исходов беременности, снижении материнской заболеваемости, более быстром возвращении женщин к нормальной жизни и уменьшении финансовой нагрузки на систему здравоохранения. Лапароскопическая холецистэктомия отвечает критериям «value-based medicine» (медицины, ориентированной на ценность): обеспечивает высокое качество помощи при оптимальном использовании ресурсов.

Рекомендуется повсеместное внедрение лапароскопической техники для хирургического лечения острых заболеваний желчного пузыря у беременных, при условии наличия соответствующего оснащения и обученного персонала. Необходимо продолжать обучение хирургов и анестезиологов особенностям ведения беременных, соблюдать протоколы мониторинга матери и плода во время операции, что позволяет свести риски к минимуму. Важна междисциплинарная координация: участие акушера-гинеколога в планировании тактики, наблюдение плода (УЗИ, КТГ) в периоперационном периоде.

Ограничения и особые случаи: открытая холецистэктомия может оставаться резервной опцией в ситуациях, когда лапароскопия технически невыполнима или крайне рискованна (например, при отсутствии необходимого оборудования, при жизнеугрожающем состоянии, не терпящем даже минимальной задержки на наладку лапароскопии, или при неудачной лапароскопической попытке). Однако такие случаи редки. Общий вывод состоит в том, что выбор в пользу лапароскопии – наиболее обоснованное

решение в большинстве клинических ситуаций острого холецистита у беременных.

Использованные источники:

1. Ball E., Waters N., Cooper N. Et al. Evidence-based guideline on laparoscopy in pregnancy (BSGE and RCOG). Facts Views Vis Obgyn. 2019; 11: 5–25.
2. Brooks D.C. Gallstone diseases in pregnancy. Uptodate, 2022 (дата обращения: авг 2023).
3. Chan K.-H., Tam W.-H., Lee S.W. et al. Laparoscopic cholecystectomy versus open cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis: a prospective study. Arch Surg. 1996; 131(3): 261–264.
4. De Bari O., Wang T.Y., Liu M. Et al. Cholesterol cholelithiasis in pregnant women: Pathogenesis, prevention and treatment. Ann Hepatol. 2014; 13: 728–745.
5. Fajardo R., Valenzuela J.I., Olaya S.C. et al. [Cost-effectiveness of laparoscopic versus open cholecystectomy. Biomedica. 2011; 31(4): 514–524 (статья на испанском).
6. Ibiebele I., Schnitzler M., Nippita T., Ford J.B. Outcomes of gallstone disease during pregnancy: A population-based data linkage study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2017; 31: 522–530.
7. Internist.ru – Чем грозит проведение холецистэктомии во время беременности? (опрос экспертов, 2020).
8. Jorge A.M., Keswani R.N., Veerappan A. Et al. Non-operative management of symptomatic cholelithiasis in pregnancy is associated with frequent hospitalizations. J Gastrointest Surg. 2019; 23(7): 1394–1401.
9. Kuy S., Roman S.A., Desai R., Sosa J.A. Outcomes following cholecystectomy in pregnant and nonpregnant women. Surgery. 2009; 146(2): 358–366. DOI: 10.1016/j.surg.2009.03.033.
10. Mendez-Sanchez N., Chavez-Tapia N.C., Uribe M. Pregnancy and gallbladder disease. Ann Hepatol. 2006; 5: 227–230.
11. Nasioudis D., Tsilimigras D., Economopoulos K.P. Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy: A systematic review of 590 patients. Int J Surg. 2016; 27: 165–175. DOI: 10.1016/j.ijsu.2016.01.070.
12. Paramanathan A., Walsh S.Z., Zhou J., Chan S. Laparoscopic cholecystectomy in pregnancy: An Australian retrospective cohort study. Int J Surg. 2015; 18: 220–223.
13. Pearl J.P., Price R.R., Tonkin A.E. et al. SAGES guidelines for the use of laparoscopy during pregnancy. Surg Endosc. 2017; 31: 3767–3782.
14. Rios-Diaz A.J., Oliver E.A., Bevilacqua L.A. et al. Is it safe to manage acute cholecystitis nonoperatively during pregnancy? A nationwide analysis of morbidity according to management strategy. Ann Surg. 2021; 273: 1–7.
15. Schwulst S.J., Son M. Management of gallstone disease during pregnancy. JAMA Surg. 2020; 155(12): 1162–1163.
16. Sedaghat N., Cao A.M., Eslick G.D., Cox M.R. Laparoscopic versus open cholecystectomy in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Surg Endosc. 2017; 31(2): 673–679. DOI: 10.1007/s00464-016-5019-2.

17. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Guidelines for diagnosis, treatment and use of laparoscopy for surgical problems during pregnancy (2016).
18. Soper N.J., Barteau J.A., Clayman R.V. et al. Comparison of early postoperative results for laparoscopic versus standard open cholecystectomy. Surg Gynecol Obstet. 1992; 174: 114–118.
19. Stock S.J., Thomson A.J., Papworth S. Et al. Antenatal corticosteroids to reduce neonatal morbidity and mortality (Green-top guideline no. 74). BJOG. 2022; 129: e35–e60.
20. Stone K., Taylor J., Quintana D. Et al. The impact of laparoscopic cholecystectomy on pregnancy outcomes in the United States. Surg Endosc. 2025 (online ahead of print, DOI: 10.1007/s00464-025-10069-8).
21. Teachmesurgery.com. “Abdominal Surgical Incisions and Scars” (2024).
22. Valley Surgical Group (mcallen, TX). “Laparoscopic vs. Open Cholecystectomy: Which is Right for You?” (patient information article, accessed 2025).
23. Weber A.M., Bloom G.P., Allan T.R., Curry S.L. Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy is safe for both mother and fetus. J Gastrointest Surg. 1997; 1: 48–52.

Юсупов Т.А.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Салихов Д.Б.
самостоятельный соискатель
кафедра Хирургических болезней №1 и трансплантологии
Самаркандский государственный медицинский университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГЕМИГЕПАТОЭКТОМИИ

Резюме. *Проведен ретроспективный анализ 120 случаев гемигепатэктомии: 60 – открытым способом (2010–2015 гг.) и 60 – с внедрением лапароскопических/роботизированных технологий (2016–2021 гг.). Оценивались клинические исходы (осложнения, летальность, длительность госпитализации) и экономические показатели (стоимость лечения, структура затрат). Малоинвазивные технологии привели к снижению общей частоты осложнений с 30% до 15%, тяжелых осложнений – с 15% до 5%, сокращению послеоперационной летальности (с 5% до 1,7%). Средняя продолжительность госпитализации уменьшилась с 12 до 7 дней ($p<0,001$). Несмотря на более высокую стоимость оборудования и материалов при лапароскопических и робот-ассистированных вмешательствах, общая средняя стоимость лечения одного пациента снизилась ~на 12% за счет сокращения расходов на послеоперационный период. Лапароскопическая гемигепатэктомия оказалась наиболее экономически эффективной стратегией, демонстрируя сочетание лучших клинических исходов и меньших затрат по сравнению с открытой операцией. Робот-ассистированные резекции обеспечили сходные клинические преимущества, однако их стоимость пока несколько выше, чем у традиционного подхода. Современные технологии (3D-визуализация, индоцианиновая флуоресценция, ультразвуковые диссекторы, ERAS-протоколы) сыграли ключевую роль в улучшении результатов.*

Ключевые слова: *гемигепатэктомия; резекция печени; лапароскопическая хирургия; робот-ассистированная хирургия; экономическая эффективность; осложнения; малоинвазивные технологии; стоимость лечения.*

Yusupov T. A.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University
Salikhov D.B.
independent researcher
Department of Surgical Diseases No. 1 and Transplantology
Samarkand State Medical University

ECONOMIC EFFECTIVENESS AND IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL ASPECTS OF HEMIHEPATECTOMY

Annotation. *A retrospective analysis of 120 hemihepatectomies was conducted: 60 open surgeries (2010–2015) and 60 surgeries with introduced laparoscopic/robotic techniques (2016–2021). Clinical outcomes (complications, mortality, length of hospital stay) and economic parameters (treatment cost, cost structure) were assessed. The adoption of minimally invasive techniques led to a reduction in overall complication rate from 30% to 15%, including a decrease in severe complications from 15% to 5%, as well as lower postoperative mortality (from 5% to 1.7%). The average hospital stay decreased significantly from 12 to 7 days ($p<0.001$). Despite higher upfront costs for equipment and disposables in laparoscopic and robotic procedures, the total average treatment cost per patient was reduced by approximately 12% due to lower postoperative expenses. Laparoscopic hemihepatectomy proved to be the most cost-effective strategy, offering superior clinical outcomes at lower overall cost compared to open surgery. Robot-assisted resections provided similar clinical benefits, though their current total cost remains slightly higher than the traditional approach. Modern technologies (3D visualization, indocyanine fluorescence, ultrasonic dissectors, ERAS protocols) played a key role in improving outcomes.*

Keywords*: hemihepatectomy; liver resection; laparoscopic surgery; robot-assisted surgery; cost-effectiveness; complications; minimally invasive techniques; treatment cost.*

Гемигепатэктомия (удаление половины печени) является одной из самых сложных операций в абдоминальной хирургии, применяемой для лечения злокачественных новообразований печени (первичных опухолей и метастазов), обширных травм и других тяжелых поражений печени. Ежегодно в мире отмечается рост заболеваемости раком печени: по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2040 году число новых случаев рака печени достигнет 1,4 млн, а смертность – 1,3 млн случаев в год. В современной онкологии около 80% пациентов, которым проводится гемигепатэктомия, – это онкологические больные с первичными или метастатическими опухолями печени. У пациентов с колоректальным раком отдаленные метастазы в печень развиваются до 70% случаев, что делает

резекционные вмешательства на печени крайне востребованными. Хирургическое удаление пораженных сегментов печени зачастую является единственным радикальным методом лечения, позволяющим достичь 5-летней выживаемости порядка 40–50% и более у отобранных пациентов при гепатоцеллюлярном раке и метастатическом поражении. Таким образом, совершенствование технологий выполнения гемигепатэктомий имеет высокую актуальность для улучшения онкологических результатов и выживаемости пациентов.

Помимо клинической эффективности, существенное значение имеет экономическая эффективность данных вмешательств. Традиционная открытая гемигепатэктомия сопровождается значительным травматизмом, большим объемом интраоперационной кровопотери и высоким риском осложнений, что приводит к длительной госпитализации и росту затрат на лечение. С развитием техники появились усовершенствованные технологии: малоинвазивные (лапароскопические) и робот-ассистированные методы резекции печени, а также современные инструменты и подходы (ультразвуковые диссекторы, лазерные скальпели, сшивающие аппараты, интраоперационная ультразвуковая навигация, флуоресцентная визуализация с индоцианином зеленым и т.д.). Эти инновации призваны снизить травматичность операции, уменьшить частоту осложнений и сократить период нетрудоспособности, что в перспективе повышает экономическую эффективность лечения. По данным литературы, уже к 2020-м годам в ведущих центрах до 30–50% резекций печени выполняются лапароскопически, а в некоторых регионах (например, в Москве) большинство операций на передних сегментах печени (II–III) проводится малоинвазивно, что достоверно уменьшает объем кровопотери и сокращает реабилитационный период. Тем не менее, внедрение новых технологий связано с существенными первоначальными расходами (например, стоимость роботических систем, одноразового инструментария и обучения персонала). Возникает необходимое для здравоохранения вопрос: насколько оправдано с экономической точки зрения широкое внедрение малоинвазивных и роботизированных методов гемигепатэктомии по сравнению с традиционными подходами?

Таким образом, актуальность исследования определяется потребностью в обосновании экономической эффективности внедрения усовершенствованных технологий при выполнении гемигепатэктомии. Необходимо всесторонне оценить, дают ли новые методы достаточные клинические преимущества (снижение осложнений, сокращение пребывания в стационаре, улучшение качества жизни), которые компенсируют их более высокую стоимость, и каковы современные тенденции и результаты применения этих технологий.

Цель исследования. Оценить экономическую эффективность внедрения современных технологических подходов при выполнении гемигепатэктомии и обосновать их применение на основе сравнения с традиционной открытой

хирургией. В рамках этой цели предполагается анализ клинико-экономических показателей (частота осложнений, продолжительность госпитализации, затраты на лечение и др.) при использовании усовершенствованных технологий (лапароскопические и робот-ассистированные гемигепатэктомии, современные инструменты) по сравнению с классическим открытым методом, а также обзор современных малоинвазивных и высокотехнологичных подходов к резекции печени.

Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное сравнительное исследование “до и после” внедрения новых технологий на базе крупного хирургического центра. Проанализированы данные пациентов, перенесших гемигепатэктомию в период 2010–2015 гг. преимущественно открытым способом (группа 1, традиционный подход), и пациентов, оперированных в 2016–2021 гг., когда в практику были внедрены лапароскопические и роботизированные резекции печени (группа 2, усовершенствованный технологический подход). Критерием включения были радикальные резекции половины печени (правосторонние или левосторонние гемигепатэктомии) по поводу опухолевых поражений. Исключались случаи резекции меньшего объема или сочетанных операций на других органах, чтобы обеспечить сопоставимость данных. Всего в анализ включено 120 пациентов: 60 в группе 1 и 60 в группе 2.

Средний возраст пациентов составил ~58 лет, мужской пол преобладал (≈62%). В обеих группах преобладали онкологические поражения печени: около 40% – гепатоцеллюлярная карцинома или другие первичные опухоли печени, ~60% – метастазы (чаще колоректального рака). Распределение по нозологиям и демографические показатели двух групп были статистически сопоставимы (подробные данные приведены в табл. 1).

В группе 1 операции выполнялись лапаротомным доступом с применением стандартных инструментов. В группе 2, после 2016 г., 70% операций выполнено лапароскопически, 10% – с роботассистированием; остальные 20% представляли собой открытые вмешательства (в случаях технической неосуществимости малоинвазивного подхода). При малоинвазивных операциях использовалось современное оснащение: ультразвуковой диссектор для паренхимы печени, аппараты для сосудистой герметизации (Ligasure, ультразвуковые коагуляторы), интраоперационный ультразвук для навигации и оценки границ резекции. При роботизированных вмешательствах применялась система Da Vinci с 3D-визуализацией высокого разрешения и инструментами с увеличенной подвижностью, что повышает точность манипуляций в труднодоступных зонах печени. В предоперационном периоде всем пациентам выполнялось детальное обследование (УЗИ, КТ/МРТ с 3D-моделированием сосудистой анатомии печени), при необходимости – предоперационная эмболизация воротной вены для гипертрофии оставшейся части печени. В обеих хронологических группах проводилась стандартизированная периоперационная подготовка и

послеоперационное ведение, включая протоколы ранней реабилитации (ERAS).

Основными оцениваемыми параметрами были: 1) интраоперационные показатели – длительность операции, объем кровопотери, потребность в трансфузиях; 2) послеоперационные исходы – частота осложнений (общая и тяжелых – классификация Clavien-Dindo III–IV), послеоперационная летальность (в пределах 30 дней), продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и общей госпитализации; 3) экономические показатели – прямые медицинские затраты на лечение одного пациента (включая стоимость операции, анестезии, расходных материалов, пребывания в стационаре, лечения осложнений). Данные о затратах собирались через отдел экономического анализа больницы: для каждого случая рассчитана полная стоимость лечения от госпитализации до выписки. Валюта расчетов – рубли РФ; для сопоставимости усредненные стоимости представлены в тысячах условных единиц (тыс. у.е.). Кроме того, проведен анализ структуры затрат (распределение совокупной стоимости между основными категориями: операция, материалы, койкодни, интенсивная терапия, прочее) для разных типов вмешательств.

Сравнение показателей между группами проводилось с использованием t-критерия Стьюдента или U-критерия Манна–Уитни для количественных данных (в зависимости от нормальности распределения) и χ^2-теста для категориальных данных. Различия считались статистически значимыми при $p<0,05$. Для оценки экономической эффективности новых технологий рассчитана разница средних затрат на пациента между группами и проведен анализ "стоимость–эффективность" с позиции стационара. Также выполнен обзор современной литературы по теме для сопоставления полученных результатов с данными других исследований.

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 120 пациентов, удовлетворяющих критериям, из них 60 человек в группе традиционной открытой гемигепатэктомии (группа 1) и 60 – в группе с внедрением новых технологий (группа 2). Демографические показатели и структура патологии представлены в таблице 1. Группы статистически сопоставимы по среднему возрасту (≈57–58 лет), гендерному составу (доля мужчин ~60–65%) и структуре заболеваний. Основными показаниями в обеих группах были злокачественные опухоли печени: около 40% пациентов – с первичным раком печени (гепатоцеллюлярная карцинома, холангиокарцинома) и порядка 55–60% – с метастатическим поражением (преимущественно метастазы колоректального рака, реже – нейроэндокринные и др.). Единичные пациенты оперированы по поводу доброкачественных поражений или травмы (не более 5% выборки). Таким образом, сравниваемые группы однородны и различаются главным образом применяемой хирургической тактикой.

Таблица 1

Демографическая и клинико-патологическая характеристика пациентов (группы традиционной открытой хирургии и усовершенствованных технологий).

Показатель	**Группа 1** (традиционная, *n*=60)	**Группа 2** (новые технологии, *n*=60)
Средний возраст, лет	58 ± 11	57 ± 10
Мужской пол, %	65%	60%
Первичные опухоли печени, %	40%	38%
Метастатические опухоли печени, %	60%	62%
Правосторонние гемигепатэктомии	55%	50%
Левосторонние гемигепатэктомии	45%	50%
Дополнительная резекция сегментов*	18%	20%

Отдельно стоит обсудить робот-ассистированную хирургию. В нашей когорте было несколько роботических гемигепатэктомий, и их прямые затраты (операционный этап) были на ~20–30% выше даже лапароскопических из-за дорогостоящего обслуживания роботической системы и инструментов. Тем не менее, эти операции выполнялись у сложных пациентов, и несмотря на более высокую цену процедуры, их послеоперационное восстановление шло лучше, чем можно было бы ожидать при открытом вмешательстве аналогичной сложности. В литературе отмечается, что робот-ассистированные резекции печени имеют самые низкие послеоперационные расходы среди всех методов (благодаря минимизации осложнений и короткой госпитализации), но общие затраты пока остаются максимальными из-за цены техники. С ростом распространенности роботической хирургии можно ожидать снижения стоимости оборудования и расходников, что улучшит экономику этого метода. Уже сейчас роботические технологии расширяют возможности хирургов выполнять операции, ранее считавшиеся неоперабельными или крайне рискованными (например, резекции задних сегментов печени, множественные опухоли). Если учесть долгосрочную перспективу и потенциальный прирост выживаемости от таких вмешательств, экономическая оценка роботической гемигепатэктомии может улучшаться.

Опыт последних двух десятилетий убедительно показал, что лапароскопическая гемигепатэктомия способна заменить открытую во многих случаях, обеспечивая лучший непосредственный результат без ухудшения онкологической радикальности. Начиная с первого международного консенсуса по лапароскопической хирургии печени (2008 г.) данная методика широко внедрена для резекций различного объема, включая анатомические гемигепатэктомии. Малоинвазивная хирургия печени теперь

признана новым стандартом в ведущих клиниках Азии и Европы. Она обеспечивает пациентам ряд преимуществ: меньше интраоперационная кровопотеря, меньшая послеоперационная боль, быстрое восстановление функции кишечника и более раннее начало адъювантной терапии. Как показывают обзоры, лапароскопический доступ ассоциируется с минимизацией объемов кровопотери и потребности в трансфузиях за счет лучшей визуализации и увеличения изображения оперируемых структур. Улучшенный обзор операционного поля и точность движений инструментов способствуют более щадящему выделению сосудов и паренхимы. Совокупность этих факторов объясняет более низкую частоту осложнений при лапароскопии, в том числе осложнений со стороны раны и брюшной полости.

Робот-ассистированная резекция печени – дальнейшая эволюция малоинвазивной хирургии. Роботические системы (например, Da Vinci) предоставляют хирургу 3D-визуализацию высокой четкости, инструментальную артикуляцию с 7 степенями свободы и фильтрацию тремора, что особенно полезно при сложных анатомических резекциях. Роботизированная гемигепатэктомия позволяет с высокой точностью выделять сосудисто-ductal структуры, что снижает риск повреждения важных элементов и кровотечений. В нашем центре робот использовался для случаев с опухолями в труднодоступных сегментах и при необходимости сложной реконструкции. К достоинствам роботической техники относятся: минимизация человеческого фактора усталости, лучшая эргономика для хирурга, возможность масштабирования изображения и выполнения тончайших маневров. Клинически это выражается в снижении потерь крови, меньшей травматизации здоровой ткани и, как следствие, сокращении осложнений. Например, робот-ассистированные операции демонстрируют сниженную частоту послеоперационной печеночной недостаточности и желчеистечения за счет прецизионной техники диссекции. В то же время ограничениями метода являются высокая стоимость и продолжительность освоения. Как отмечено выше, затраты на один робот-ассистированный случай выше лапароскопического. Тем не менее, по мере распространения технологии издержки могут снижаться. Уже сейчас ведущие западные клиники активно внедряют робот-ассистированные резекции печени, особенно для сложных многоочаговых поражений. Ожидается, что роботическая хирургия займет важную нишу в лечении опухолей печени, дополняя лапароскопию в самых сложных ситуациях.

Медицина продолжает двигаться к еще большей технологичности и цифровизации хирургии. Уже сейчас обсуждается внедрение систем дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта для помощи хирургу при резекциях печени. Визуализация с добавлением виртуальных контуров опухоли и сосудов прямо на поле зрения хирурга (через специальные дисплеи) может повысить точность и безопасность операций. Искусственный интеллект способен анализировать видео с камеры в реальном

времени, подсказывая оптимальные линии резекции и заранее предупреждая об анатомических особенностях. Также развивается концепция хирургии без касаний – применение роботизированных систем, управляемых голосом или жестами, что может ускорить и упростить работу хирурга. В области экономической эффективности важна оптимизация использования ресурсов: ожидается появление более доступных отечественных роботических комплексов, многоразовых лапароскопических инструментов нового поколения, что снизит себестоимость операций.

Выводы.

1. Внедрение малоинвазивных и роботизированных технологий при гемигепатэктомии обеспечивает улучшение клинических результатов: снижает частоту послеоперационных осложнений (с 30% до 15%, тяжелых – с 15% до 5%), уменьшает интраоперационную кровопотерю и потребность в гемотрансфузии, сокращает среднюю длительность госпитализации более чем на 40% (с ~12 до ~7 дней). При этом онкологическая радикальность и отдаленная выживаемость не страдают, оставаясь на уровне традиционной открытой хирургии.

2. Экономическая эффективность усовершенствованных технологий подтверждена: средняя общая стоимость лечения одного пациента снижается примерно на 10–15% по сравнению с открытой операцией благодаря уменьшению расходов на послеоперационный период (короче пребывание, меньше затрат на лечение осложнений). Лапароскопическая гемигепатэктомия является клинически и экономически более предпочтительной стратегией, доминируя над открытой по показателям "затраты–эффективность". Робот-ассистированные операции также превосходят открытую хирургию в клинических исходах, однако их стоимость пока остается несколько выше; с развитием технологий ожидается повышение и их экономической целесообразности.

3. Современные технологические аспекты гемигепатэктомии позволяют оптимизировать процесс операции и послеоперационного ведения. Малоинвазивный доступ (лапароскопия) и роботизированные системы обеспечивают лучшее поле зрения и точность манипуляций, что ведет к снижению кровопотери и травмы тканей. Использование ультразвуковых диссекторов, электро- и лазерных коагуляторов, флуоресцентной навигации с ICG и других инноваций повышает безопасность резекции печени. Интраоперационная 3D-навигация и тщательное предоперационное планирование уменьшают риск осложнений. Всё это в совокупности улучшает исход для пациента и экономит ресурсы клиники.

4. Перспективы развития включают дальнейшее повышение технологичности и доступности инноваций. Расширение применения робототехники, развитие систем дополненной реальности и искусственного интеллекта, появление более дешевого оборудования и инструментария – все это позволит еще более эффективно и экономично выполнять сложнейшие резекции печени. Одновременно с этим, успех зависит от подготовки кадров:

обучение хирургов современным методикам и мультидисциплинарное взаимодействие будут определяющими факторами для достижения оптимальных результатов.

Использованные источники:

1. Apollo Hospitals. Минимально инвазивная хирургия печени: достижения в лапароскопических и роботизированных процедурах (обзор). 2025
2. Chan AC, et al. Indocyanine green fluorescence imaging in laparoscopic liver resection. Hong Kong Med J. 2020;26(3):207-213.
3. Ciria R, et al. Comparative short-term benefits of laparoscopic liver resection: 9,000 cases and climbing. Ann Surg. 2016;263(4):761-777.
4. Fitzgerald K. Liver Cancer Rates, Mortality Continue to Rise... GI Oncology Now. 2025 (со ссылкой на данные ВОЗ)
5. Koh YX, et al. Comparative cost-effectiveness of open, laparoscopic, and robotic liver resection: a systematic review and network meta-analysis. Surgery. 2024;176(1):11-23. DOI: 10.1016/j.surg.2024.04.015
6. Koh YX, et al. Cost-Effectiveness of Laparoscopic vs Open Liver Resection: A Propensity Score-Matched Analysis of 920 Cases. J Am Coll Surg. 2025;241(2):203-219. DOI: 10.1097/XCS.0000000000001250
7. Nguyen KT, et al. World review of laparoscopic liver resection – 2,804 patients. Ann Surg. 2009;250(5):831-841.
8. Wakabayashi G, et al. Recommendations for laparoscopic liver resection: a report from the second international consensus conference. Ann Surg. 2015;261(4):619-629.
9. Егиев В.Н. Гемигепатэктомия — сложная, но щадящая операция по удалению части печени (статья в блоге). 2024
10. Трахтенберг К.А. Экономическая эффективность внедрения ERAS-протоколов в хирургии печени. Вестник хирурга. 2021;10(2):45-52.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

DOI 10.24412/2225-1545-2026-2-1141-1483-1491

Кучкаров М.М.
преподаватель
филиал ВГИК
г. Ташкент

КИНОПРОКАТ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Аннотация: *В статье рассматривается эволюция системы кинопроката и механизмов продвижения кинофильмов в Узбекистане в контексте институциональных и социально-экономических трансформаций. Анализируется функционирование централизованной модели кинопроката в советский период, особенности репертуарной политики и нормативного регулирования, а также изменения, произошедшие в условиях перехода к рыночной экономике в 1990-е годы. Особое внимание уделяется влиянию процессов разгосударствления, приватизации и коммерциализации отрасли на доступность кино и формирование зрительской аудитории. На основе нормативных документов и научных исследований выявляются ключевые факторы, определившие трансформацию кинопрокатной системы и её роль в обеспечении зрительской востребованности отечественного кино.*

Ключевые слова: *кинопрокат, продвижение кинофильмов, отечественный кинематограф, зрительская аудитория, рыночная экономика, Узбекистан.*

Kuchkarov M.M.
teacher
VGIK branch
Tashkent

FILM DISTRIBUTION IN UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION

Abstract: *The article examines the evolution of the film distribution system and mechanisms for promoting motion pictures in Uzbekistan in the context of institutional and socio-economic transformations. It analyzes the functioning of the centralized film distribution model during the Soviet period, the features of repertoire policy and regulatory frameworks, as well as the changes that occurred during the transition to a market economy in the 1990s. Particular attention is paid to the impact of de-statization, privatization, and commercialization processes on the accessibility of cinema and the formation of the audience. Based on regulatory*

documents and scholarly research, the study identifies key factors that shaped the transformation of the film distribution system and its role in ensuring audience demand for domestic cinema.

Keywords: *film distribution, film promotion, national cinema, audience, market economy, Uzbekistan.*

В научной традиции становление кинематографа как вида искусства соотносится с возникновением платного кинопоказа, начиная с декабря 1895 года, когда братья Люмьер организовали первые публичные киносеансы в Париже. С этого периода кино стало рассматриваться не только как форма досуга, но и как средство информационного и социокультурного воздействия.

Вслед за становлением кинематографа как самостоятельного вида искусства произошло последовательное развитие визуальных технологий, включающее появление телевидения и последующее широкое распространение цифровых средств производства и дистрибуции аудиовизуального контента. В условиях интенсификации информационных потоков особую актуальность приобретают вопросы продвижения кино- и видеопродукции, что обусловливает необходимость научного анализа эффективных механизмов повышения зрительской востребованности отечественного кино.

Исторически связь между кинопроизведением и зрительской аудиторией обеспечивалась посредством системы кинопроката, функционировавшей через специализированные организации, осуществлявшие распределение фильмов между кинотеатрами.

В рамках настоящего исследования художественно-эстетические аспекты фильмов не являются предметом анализа; основное внимание уделяется эволюции организационно-экономических и институциональных механизмов продвижения кинофильмов к социуму зрительской аудитории.

В советский период система продвижения кинофильмов характеризовалась высокой степенью централизации и ограниченным набором инструментов, включавших преимущественно наружную рекламу и тематические передачи на радио и телевидении. Прокатный потенциал фильма во многом определялся профессиональным уровнем творческого коллектива. При этом на киностудии «Узбекфильм» производственные условия для съёмочных групп были унифицированы, а различия между проектами в создании фильмов носили преимущественно экономический характер и выражались в объёмах сметного финансирования. Более высокие бюджеты позволяли расширять производственные возможности (строительство больших декораций, длительные кино экспедиции, привлечение большого количества участников массовых сцен и пр.), однако в целом сохранялся единый технологический стандарт кинопроизводства.

Процедура допуска фильма к прокату в Узбекистане, как и во всей стране предусматривала представление установленного комплекта исходных материалов на комиссию в Москве, включавшего: негатив и позитив копий

фильма, фотоматериалы и рекламный ролик установленной продолжительности.

Репертуар фильмов данного периода отличался неоднородностью с точки зрения зрительского потенциала. Наряду с коммерчески успешными картинами («Али баба и 40 разбойников», «Пираты XX века»), выпускались фильмы, ориентированные преимущественно на идеологические задачи («Член правительства», «Чрезвычайный комиссар») и не пользовавшиеся устойчивым спросом. Распределение фильмов между кинотеатрами осуществлялось в соответствии с пропорциями между советской и зарубежной продукцией, включая фильмы социалистических, развивающихся и капиталистических стран. Для кинотеатров действовали чёткие нормативы получения фильмов советской и зарубежной продукции через кинопрокатные конторы. Как правило, около 70 % репертуара для киноустановок составляли советские фильмы и до 30 % — зарубежные. Из них порядка 15 % приходилось на продукцию стран социалистического содружества (ГДР, Болгария, Румыния), около 10 % — развивающихся стран (Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия) и примерно лишь 5 % — капиталистических государств (США, Франция, Великобритания, Япония).

Анализ репертуарной политики показывает, что в условиях ограниченного культурного предложения наибольший зрительский интерес вызывали отечественные фильмы, отличавшиеся доступностью повествования и жанровой универсальностью - «Об этом говорит вся махалля» - (реж. Аббасов), «Бунт невесток (реж. М. Абзалов), а также картины зарубежного производства.

Это обстоятельство приводило к формальному выполнению кинотеатрами репертуарных нормативов при фактическом смещении акцента на ограниченное число коммерчески успешных фильмов. Наибольший зрительский интерес вызывали фильмы дальнего зарубежья. В связи с этим руководители кинотеатров, формируя недельный репертуар, стремились любыми доступными способами включить в него индийские или французские картины. Идеологически выверенные фильмы, полученные по утверждённой «разнарядке», зачастую оставались на складах кинотеатров, порой так и не доходя до экрана. При этом в отчётной документации указывались формальные данные о количестве сеансов, тогда как реальная кассовая выручка обеспечивалась в основном зарубежными, коммерчески успешными фильмами.

Существенные трансформации в системе кинематографии произошли в период перестройки, в результате чего была демонтирована государственная модель кинопроката, а отрасль начала функционировать в условиях рыночной экономики. Данный процесс сопровождался резким снижением посещаемости кинотеатров, а также значительным сокращением объёмов кинопроизводства. В условиях отсутствия систематизированных статистических данных можно предположить, что к середине 1990-х годов совокупное количество выпускаемых на экраны страны зарубежных

художественных фильмов сократилось до 40–50 единиц в год, тогда как объёмы национального кинопроизводства в Узбекистане снизились до 10–15 художественных фильмов ежегодно.

Для сопоставления следует отметить, что: «В 1970–1980-е годы на экраны страны ежегодно поступало в среднем 130–150 художественных фильмов, около 35 полнометражных документальных, свыше 400 короткометражных научно-популярных и порядка 60 анимационных фильмов. Кроме того, зрительской аудитории предоставлялась возможность просмотра около 100 наименований фильмов иностранного производства» [1, С.32].

Несмотря на попытки сохранения традиционных функций кино — познавательной, развлекательной, воспитательной, коммуникативной, исследовательской и информативной, — в указанный период особую актуальность приобрела концепция «кино как товара». Это потребовало пересмотра принципов функционирования отрасли с позиций экономической эффективности и рыночного спроса.

В рамках экономической либерализации в Узбекистане был осуществлён процесс приватизации организаций кинематографии, в том числе их преобразование в акционерные общества. При этом государство сохранило финансирование производства фильмов социально значимой направленности. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 247 от 12 июня 1996 года были определены параметры государственной поддержки кинопроизводства. Министерству финансов было поручено сохранить до 2000 года ежегодное выделение дотаций на производство шести художественных, сорока документальных, научно-популярных и мультипликационных фильмов, а также восьми выпусков киножурналов «Зумраша» и «Каракалпакстан».

Возобновление бюджетного финансирования в последующие, 2000-е годы, позволило реализовать ряд значимых кинопроектов исторической и современной тематики - «Земля отцов» (реж. Ш. Аббасов), «Минувшие дни» (реж. М. Абзалов, Х. Файзиев), «Алпомиш» (реж. П. Файзиев), «Мальчики в небе» (реж. З. Мусаков), «Оратор» (реж. Ю. Разыков) и ряд других.

Также были приняты меры по реорганизации системы кинофикации и кинопроката. Это меры по их преобразованию в акционерные общества открытого типа, при этом государственная доля в организациях кино- и видео обслуживания (кинотеатры, кинопрокатные конторы, подразделения «Видео-центра») должна была составлять от 25 до 40 % от уставного фонда.

Вместе с тем либерализация экономики, общий спад, отмена цензуры и сокращение государственного регулирования привели к росту импортной продукции низкого качества, закрытию части кинотеатров и усилению коммерциализации кинопоказа, что негативно отразилось на посещаемости кино для массового зрителя.

Практика реализации данных мер показала их ограниченную эффективность, что было обусловлено недостаточной инвестиционной

активностью и отсутствием у субъектов рынка необходимых финансовых ресурсов.

Тем не менее к началу 2000-х годов в сфере кинопоказа в кинотеатрах страны обозначились некоторые тенденции к стабилизации и постепенному улучшению ситуации. Данные изменения были обусловлены совокупностью взаимосвязанных факторов, отражающих процессы адаптации национальной кинематографии к рыночным условиям. Прежде всего, активизация производства фильмов, ориентированных на национальную тематику и культурные ценности, способствовала восстановлению интереса зрительской аудитории к отечественному кинематографу. Это, в свою очередь, выразилось в росте кассовых сборов и частичном восстановлении посещаемости кинотеатров.

При этом наблюдается повышение требований зрителей к качеству демонстрации кинопроизведений, что формирует новые стандарты работы кинотеатров и стимулирует модернизацию кинопрокатной инфраструктуры. «Множество художественных фильмов с равным успехом смотрится по телевизору и на киноэкране. Однако это не препятствует созданию таких фильмов, для которых внутренне значимы размер экрана, развёрстка изображения, количество звуковых дорожек и т.п.» [2, С.112].

Существенное значение имело и расширение участия частного сектора в кинопроизводстве. Появление фильмов, созданных на частных студиях с привлечением внебюджетных источников финансирования, способствовало диверсификации репертуара и обновлению жанрово-тематической структуры кинопоказа, что также положительно сказалось на зрительском спросе. Одновременно с этим в крупных городах Узбекистана начался процесс формирования сети частных кинотеатров нового, цифрового поколения, что привело к модернизации инфраструктуры кинопоказа и повышению качества предоставляемых услуг.

Как отмечает киновед Н. Каримова: «Переход к рыночным отношениям способствовал формированию коммерческого частного игрового кинематографа, ориентированного прежде всего на зрителя как ключевой фактор коммерческого успеха. Именно это позволило Узбекистану, в отличие от ряда других государств Центральной Азии, сохранить определенный сегмент зрительской аудитории игрового кино» [3, С.77].

Динамика роста производства художественных фильмов, созданных в Узбекистане с 2004 г. по 2012 г.




Таблица № 1

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Фильмы, созданные за счёт внебюджетных средств частными студиями	14	16	29	22	29	35	38	57	53
Фильмы, созданные за счёт государственных бюджетных средств	4	14	10	15	11	10	10	15	12
Всего за год	18	30	39	37	40	45	48	72	65

**По отчетным данным лицензионного отдела НА «Узбеккино»*

В то же время нельзя однозначно утверждать, что все фильмы, создаваемые на частных студиях, преимущественно в жанрах комедии и мелодрамы, отличались высоким художественным и профессиональным уровнем. Однако принципиально важным обстоятельством являлось сохранение устойчивого интереса зрительской аудитории к отечественной кинопродукции, что свидетельствовало о наличии стабильного потребительского спроса. При этом ряд кинолент продемонстрировал выраженный коммерческий успех, подтверждая возможность возврата инвестиций, вложенных в кинопроизводство, и тем самым формируя у

предпринимателей уверенность в экономической целесообразности участия в данной сфере.

Показ отдельных фильмов сопровождался повышенным, в ряде случаев ажиотажным, зрительским спросом, к числу которых относятся «Испытание любви» (реж. Р. Сагдиев), «Шариф и Мариф» (реж. И. Эргашев), «Взгляд на дорогу» (реж. Ф. Мусаджанов), «Суперневестка» (реж. Б. Якубов), «Севинч» (реж. Ё. Туйчиев, А. Шахабудинов) и др. Данные примеры позволяют рассматривать коммерчески успешные проекты частных студий как важный фактор формирования рыночных механизмов в национальной кинематографии начала 2000-х годов.

Важную роль в активизации указанных процессов сыграло совершенствование нормативно-правовой базы. Принятие Закона Республики Узбекистан от 25 мая 2000 года «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» создало институциональные условия для привлечения частных инвестиций в кинематографическую сферу, обеспечив правовые механизмы участия субъектов предпринимательства в производстве и распространении кинофильмов. В совокупности данные факторы заложили основу для структурных изменений в национальной системе кинопоказа и обозначили переход к новой модели функционирования отрасли.

Кинобизнес относится к числу наиболее высокорискованных видов предпринимательской деятельности по сравнению с большинством отраслей материального производства. В отличие от таких сфер, как производство мебели или продукции химической промышленности, где уровень спроса и параметры рентабельности в большей степени поддаются прогнозированию, экономические результаты кинопроизводства и проката созданных фильмов характеризуются высокой степенью неопределённости. Это обусловлено тем, что коммерческий успех фильма во многом зависит от субъективных факторов, прежде всего от восприятия и оценок зрительской аудитории, неоднородной по социальным, возрастным и культурным характеристикам.

Учитывая высокую степень неопределённости и ограниченную предсказуемость результатов кинопроката, «… в ряде европейских стран реализуются специальные программы государственной поддержки распространения национальных фильмов. На наднациональном уровне Европейского союза функционирует программа «Евримаж» (Eurimages), деятельность которой осуществляется по нескольким взаимосвязанным направлениям» [4, С.14].

В частности, программа предусматривает финансовое стимулирование проката национальных фильмов, а также оказание частичной финансовой поддержки кинотеатрам, расположенным в малых и средних городах, в целях приобретения и обновления цифрового кинопроекционного оборудования. Кроме того, «Евримаж» осуществляет поддержку международного совместного кинопроизводства и содействует прокату аудиовизуальных произведений, способствуя тем самым расширению культурного обмена и укреплению устойчивости национальных кинорынков.

Представляется, что адаптация и внедрение элементов зарубежного опыта в сфере государственной поддержки кинопроката могли бы способствовать улучшению ситуации с продвижением национальных фильмов на внутреннем рынке Узбекистана. Использование апробированных механизмов финансового стимулирования проката и модернизации кинотеатральной инфраструктуры способно повысить доступность кинопродукции для зрительской аудитории и укрепить позиции национального кинематографа в условиях рыночной конкуренции.

Эффективному формированию механизма доведения информации о фильмах, выходящих на экраны, способствуют специализированные кино издания. В России и за рубежом такие издания представляют собой профессиональные и аналитические медиа, освещающие новости киноиндустрии, публикующие рецензии и материалы по теории и практике кино. К ведущим российским изданиям относятся «Искусство кино» и Filmz.ru, а к зарубежным — такие авторитетные бренды, как Variety и Sight & Sound, анализирующие мировой кинопроцесс, фестивальное движение и индустриальные тренды.

Отечественная отрасль кинематографии испытывает дефицит изданий, способных сформировать устойчивую коммуникационную среду для представителей кинотеатрального, дистрибуторского и кино производственного бизнеса, а также обеспечить постоянный доступ к информации, необходимой для принятия управленческих решений, репертуарного планирования и формирования маркетинговых кампаний.

Попытки создать информационно-развлекательные иллюстрированные киножурналы, ориентированные как на профессионалов, так и на широкую аудиторию, такие как «Филм-S» и Cinema Magazine, предпринимались у нас и ранее. Однако с распространением интернета печатные СМИ во всём мире утрачивают позиции и теряют читателей, которые всё чаще предпочитают онлайн-форматы.

В настоящее время внедрена система информирования зрителей о кинопоказах через интернет-ресурсы, что оказывает положительное влияние на посещаемость киносеансов и способствует повышению эффективности их функционирования

Зрительская посещаемость кинотеатров является важным показателем уровня их организационно-технической и социально-культурной подготовки. Современные кинотеатры, должны соответствовать актуальным требованиям, включающим высокое качество визуального и звукового сопровождения, эргономичное и комфортное размещение зрителей, продуманный интерьер, а также широкий спектр дополнительных сервисов, способствующих повышению привлекательности объектов для посетителей.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № 3176 от 07.08.2017 г. «О мерах по дальнейшему развитию национальной кинематографии» поставлена задача разработки типового проекта кинотеатров на основе анализа передового международного опыта. В проекте

предусмотрено размещение современных кинозалов на втором этаже и объектов торгово-развлекательной инфраструктуры на первом этаже, что позволяет сочетать культурно-досуговую и коммерческую функции.

На сегодняшний день кинотеатры нового типа функционируют во всех крупных городах Республики Узбекистан. Среди них можно выделить: «Magic Cinema», «Cinematica», «Riviera Cinema» в Ташкенте; «Family Cinema» в Самарканде; «Buxoro Cinema» в Бухаре, «O'zbegim Cinema» в Андижане и многие другие. Создание и эксплуатация таких современных объектов способствует не только развитию национальной кинематографии, но и повышению социальной доступности культурных услуг.

Таким образом, внедрение типовых проектов кинотеатров нового поколения является стратегически значимой мерой, направленной на повышение уровня обслуживания населения, а создание развитой сети кинотеатров, включая региональные, и использование онлайн-платформ позволяет охватить максимально широкую зрительскую аудиторию.

Развитие кинопроката в условиях социально-экономической трансформации Узбекистана выступает важным инструментом повышения культурной и социальной активности населения, а также укреплению позиций национального кинематографа на современном этапе.

Использованные источники:

1. *Фомин В. «*Кино и время». М.: Искусство, Вып. 6. 1986 г.
2. *Мирзоян К.* «Пути развития национальных кинематографий на современном этапе» https://cyberleninka.ru/article/n/ 2015 г.
3. *Каримова Н.* «Киноиндустрия Узбекистана и её вклад в социально-экономическое развитие страны» Ташкент, 2019 г.
4. *Колобова Е.* «Международная интеграция, как фактор повышения конкурентоспособности организаций кинематографии» https://cyberleninka.ru/article/n/ Журнал «Евразийская интеграция: экономика, право, политика» 2017 г.

УДК: 574.5(285.2):595.7

Туйназарова И.А., к.б.н.
старший преподаватель
кафедра «Экологии и охраны труда»
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОИНДИКАЦИИ ПРЕСНОВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СООБЩЕСТВ ЛИЧИНОК НАСЕКОМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ

Аннотация: *В обзоре рассмотрены принципы биоиндикации водных экосистем с использованием сообществ личинок насекомых (EPT, Chironomidae). Показано, что комбинация классических биотических индексов и методов ДНК-баркодинга повышает точность оценки антропогенного воздействия. Подчёркивается важность учёта региональной специфики для корректной интерпретации данных биоиндикации.*

Ключевые слова: *биоиндикация, водные макробеспозвоночные, ДНК-баркодирование, биотические индексы, экологический мониторинг.*

Tuynazarova I. A., Ph.D., Candidate of Biological Sciences.
senior lecturer
Department of Ecology and Occupational Safety
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh city

ADVANCING FRESHWATER BIOINDICATION USING INSECT LARVAL COMMUNITIES AND MOLECULAR TOOLS

Abstract: *The review examines the principles of bioindication in aquatic ecosystems using insect larvae communities (EPT, Chironomidae). It is shown that combining classic biotic indices with DNA barcoding methods enhances the accuracy of anthropogenic impact assessment. The importance of accounting for regional specificity for the correct interpretation of bioindication data is emphasized.*

Keywords: *bioindication, aquatic macroinvertebrates, DNA barcoding, biotic indices, environmental monitoring.*

Введение: Биоиндикация с использованием личинок насекомых, таких как представители отрядов EPT и Chironomidae, служит высокочувствительным методом оценки состояния водных экосистем, поскольку их сообщества чётко реагируют на изменения физико-химических параметров воды, включая содержание кислорода, pH и питательных веществ. Интеграция молекулярных методов, например ДНК-баркодирования, с классическими биологическими индексами (FBI, BMWP) значительно повышает точность мониторинга, позволяя выявлять антропогенное воздействие на уровне видовых распределений. Это обеспечивает комплексный биологически значимый подход, критически важный для устойчивого управления пресноводными ресурсами и превосходящий по своей информативности исключительно химические анализы [7; 8].

Научные данные подтверждают, что группа EPT (Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera) служит надежным биоиндикатором чистых водоемов благодаря высокой чувствительности к органическому загрязнению и дефициту кислорода, тогда как массовое развитие хирономид (Chironomidae) прямо указывает на эвтрофикацию и загрязнение. Например, исследования в бассейне реки Чалакуди зафиксировали корреляцию высокого обилия таксонов EPT с хорошим качеством воды, а преобладание хирономид — с деградированными участками. Эти взаимодополняющие индикаторы, где богатство EPT отражает благополучие экосистемы, а численность хирономид — степень её нарушения, легли в основу современных протоколов биомониторинга пресноводных систем [1; 2].

Личинки стрекоз и вислокрылок выступают эффективными биоиндикаторами, поскольку их трофическое положение и структура сообществ чутко реагируют на качество воды, доступность кормовых ресурсов и уровень загрязнений. Физиологические адаптации, такие как хватательная маска у личинок стрекоз, обеспечивают им роль высокоэффективных хищников, чей рацион и накопление веществ, например, метилртути, напрямую отражают изменения в экосистеме. Анализ стабильных изотопов и видового состава этих организмов позволяет достоверно оценить состояние донных сообществ и трофический статус водоёмов в условиях антропогенного воздействия. [6].

Современные биоиндикаторные индексы (BMWP, ASPT, EPT), основанные на распределении водных макробеспозвоночных, широко применяются в международных программах мониторинга для оценки качества воды. Эти индексы эффективно отражают антропогенное воздействие, интегрируя реакцию сообществ на различные стрессоры, что обеспечивает более целостную оценку состояния экосистем по сравнению с физико-химическими методами. Их региональная адаптация, например TR-BMWP для Турции, повышает точность оценки экологического здоровья пресноводных водоемов в разных географических условиях. [4].

Личинки насекомых, особенно в водных экосистемах, служат эффективными биоиндикаторами, интегрируя в своей видовой структуре и

плотности популяций влияние как химических загрязнений, так и долгосрочных изменений, включая перестройку трофических сетей и сокращение биоразнообразия Их чувствительность на разных стадиях развития позволяет отслеживать широкий спектр нарушений — от токсического воздействия до климатических стрессоров, косвенно сигнализируя, например, о сдвигах в фенологии растений-хозяев (Durney et al., 2025). Применение современных методов, таких как ДНК-баркодирование и автоматизированный мониторинг, существенно повышает точность и детальность оценки состояния экосистем на основе сообществ личинок [3].

Биологические методы оценки воздействия загрязнителей, основанные на реакциях биоиндикаторов, дают интегрированную картину долгосрочного эффекта, в отличие от моментальных физико-химических измерений. Их точность принципиально зависит от корректной видовой идентификации, где методы ДНК-баркодинга и нейронные сети, например ResNet-50, существенно повышают эффективность таксономической классификации. При этом интерпретация данных требует обязательного учёта региональных природно-климатических факторов, поскольку они формируют видовой состав и толерантность сообществ, что исключает универсальные оценочные стандарты. [5].

Заключение: Сообщества личинок насекомых, такие как EPT и Chironomidae, служат высокочувствительными биоиндикаторами, чьи структура и обилие точно отражают уровень антропогенного воздействия на водные экосистемы. Интеграция молекулярных методов идентификации с классическими биотическими индексами значительно повышает разрешающую способность и надёжность биомониторинга. Для корректной интерпретации данных необходимо учитывать региональные экологические условия, что делает биоиндикацию комплексным и информативным инструментом для оценки экологического состояния водоёмов.

Использованные источники:

1. Athulya, P., Prasad, P. V., Sivalingam, R., Sajeev, T. V., Kumar, C. S. R., & Syamkumar, R. N. P. (2024). Aquatic insects for monitoring the health status of riverine potholes: A case study in Chalakudy river basin, Kerala, India. Environmental Monitoring and Assessment, 196(2). https://doi.org/10.1007/s10661-023-12254-x

2. Baturina, M., Kononova, O., Fefilova, E., & Loskutova, O. (2021). The fauna of aquatic invertebrates in the river impacted by wastewaters from the pulp and paper industry (Komi Republic). Biodiversity Data Journal, 9(6). https://doi.org/10.3897/bdj.9.e75362

3. Chiavassa, J. A., Kraft, M., Noack, P., Walther, S., Kirse, A., & Scherber, C. (2024). The Field Automatic Insect Recognition-Device-A Non-Lethal Semi-Automatic Malaise Trap for Insect Biodiversity Monitoring: Proof of Concept. Ecology and Evolution, 14(12). https://doi.org/10.1002/ece3.70642

4. Etriieki, A. M. O., & Küçükbasmacı, İ. (2024). Using macroinvertebrate-based biotic indices and diversity indices to assess water quality: A case study on the

Karasu Stream (Kastamonu, Türkiye). Ecohydrology, 17(2). https://doi.org/10.1002/eco.2627
5. Habib, S., Ahmad, M., Ul Haq, Y., Sana, R., Muneer, A., Waseem, M., Pathan, M. S., & Dev, S. (2024). Advancing Taxonomic Classification Through Deep Learning: A Robust Artificial Intelligence Framework for Species Identification Using Natural Images. IEEE Access, 12, 146718–146732. https://doi.org/10.1109/access.2024.3450016
6. Mariani-Ríos, A., Maldonado-Benítez, N., & Ramírez, A. (2022). Natural history of Odonata assemblages in tropical streams in Puerto Rico. Neotropical Biodiversity, 8(1), 112–123. https://doi.org/10.1080/23766808.2022.2043699
7. Prommi, T. O. (2023). Water quality assessment in an irrigation pond based on adult caddisfly (Insecta: Trichoptera) assemblages. Ecologica Montenegrina, 62, 87–100. https://doi.org/10.37828/em.2023.62.11
8. Vitheepradit, A., Mitpuangchon, N., & Prommi, T.-O. (2024). Aquatic insect biodiversity, water quality variables, and microplastics in the living weir freshwater ecosystem. Ecologica Montenegrina, 79, 41–63. https://doi.org/10.37828/em.2024.79.5

УДК: 631.147:631.46:504.7

Холматов Б.Т., Ph.D. к.с-х.н.
старший преподаватель
кафедра «Экологии и охраны труда»
Джизакский политехнический институт
Республика Узбекистан, г. Джизак

РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СЕКВЕСТРАЦИИ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА И АДАПТАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Аннотация: *Проведённый анализ демонстрирует, что методы органического земледелия, основанные на использовании сидератов, органических удобрений и биопрепаратов, служат ключевым механизмом стабилизации агроэкосистем. Они напрямую способствуют секвестрации углерода в почве, повышению её биоразнообразия и структурного здоровья, что снижает углеродный след сельского хозяйства и усиливает его устойчивость к изменению климата.*

Ключевые слова: *органическое земледелие, секвестрация углерода, здоровье почвы, устойчивость агросистем, климатические риски.*

Kholmatov B.T., Ph.D. in Agricultural Sciences.
senior lecturer
Department of Ecology and Occupational Safety
Jizzakh Polytechnic Institute
Republic of Uzbekistan, Jizzakh city

THE ROLE OF ORGANIC FARMING IN SOIL CARBON SEQUESTRATION AND THE ADAPTATION OF AGROECOSYSTEMS TO CLIMATE CHANGE

Abstract: *The analysis demonstrates that organic farming practices, including the use of cover crops, organic fertilizers, and biopreparations, serve as a key mechanism for stabilizing agroecosystems. They directly contribute to soil carbon sequestration, enhance biodiversity and soil structural health, thereby reducing the carbon footprint of agriculture and increasing its resilience to climate change.*

Keywords: *organic farming, carbon sequestration, soil health, agroecosystem resilience, climate risks.*

Введение: Органическое земледелие существенно снижает углеродный след агроэкосистем, отказываясь от синтетических удобрений: расширение его площади до 23% к 2035 году способно сократить выбросы парниковых газов примерно на 14% [2]. Одновременно применение биологических

ресурсов, таких как органические добавки и биопестициды, повышает плодородие и структурное здоровье почв, укрепляя их устойчивость к засухам и эрозии. Диверсификация культур и интеграция местных сортов усиливают адаптивный потенциал фермерских систем к климатическим стрессам и биотическим угрозам [8].

Органическое земледелие формирует устойчивые агросистемы, напрямую повышая биоразнообразие и улучшая структуру почвы за счет увеличения запасов органического углерода и активности почвенной микробиоты. Практики, такие как отказ от синтетических удобрений и интеграция агролесоводства, способствуют значительному снижению эмиссии парниковых газов — модели прогнозируют сокращение выбросов почти на 14% в ЕС к 2035 году при расширении органических площадей. Данные исследования подтверждают, что эта система эффективно объединяет экологические цели, сокращая углеродный след сельского хозяйства и усиливая устойчивость экосистем к изменению климата [2].

Научные данные убедительно демонстрируют, что внесение органических материалов — компостов, навоза, биочара или биодеградируемых мульч — напрямую повышает содержание органического углерода в почве. Этот процесс улучшает почвенную структуру, увеличивает пористость и водоудерживающую способность, что особенно эффективно стабилизирует влажность корнеобитаемого слоя в засушливых условиях. Следовательно, долгосрочные практики органического земледелия обеспечивают устойчивое накопление углерода, усиливая устойчивость к засухе агросистем и их продуктивность [5].

Органическое земледелие снижает зависимость от синтетических средств, используя органические удобрения и биопрепараты, которые улучшают здоровье почвы и активируют круговорот питательных веществ. Стимулируя развитие почвенной микробиоты, этот подход повышает влагоудержание и структурную устойчивость почв, что усиливает сопротивляемость растений к засухе и засолению. Такие методы сокращают химическое загрязнение и углеродный след, одновременно повышая устойчивость агросистем к климатическим стрессам через биологическое управление и сохранение биоразнообразия [4].

Переход к органическому земледелию повышает адаптивный потенциал агросистем за счёт улучшения физико-химических и биологических свойств почв. Применение органических методов, включающих севооборот и минимальную обработку, увеличивает содержание органического вещества и углерода, что укрепляет почвенные агрегаты, улучшает структуру и влагоудерживающую способность. В результате повышается устойчивость почв к засухе и эрозии, а усиленная микробиологическая активность дополнительно способствует формированию стабильной почвенной структуры и сохранению влаги [6].

Севообороты с бобовыми сидератами и внесение органических удобрений напрямую увеличивают запас органического углерода и азота в

почве, активизируя ферментативную деятельность и повышая биоразнообразие микробиоты для эффективного круговорота элементов. Эти практики улучшают структуру почвы и её влагоудерживающую способность, что снижает зависимость от минеральных удобрений и смягчает негативные последствия экстремальных погодных явлений. Комплексное применение данных агроприёмов обеспечивает долгосрочную секвестрацию углерода, повышая устойчивость и продуктивность агроэкосистем при одновременном снижении экологических рисков [1].

Органическое земледелие повышает адаптационный потенциал агросистем, напрямую улучшая физико-химические и биологические свойства почвы. Внесение органических материалов и покровных культур увеличивает содержание органического углерода, улучшает структуру и влагоудержание, что снижает уязвимость к засухе и эрозии. Одновременно рост микробной активности и стабилизация питательного режима усиливают устойчивость почвы к стрессам, обеспечивая долгосрочную продуктивность и экологическую стабильность [3].

Севообороты с сидератами и органические удобрения стабилизируют агроэкосистемы, напрямую повышая содержание органического углерода и азота в почве, улучшая её структуру и стимулируя микробиологическую активность. Эти практики снижают зависимость от минеральных удобрений, сокращают эмиссию парниковых газов и минимизируют риски нитратного загрязнения. Комплексное их применение укрепляет устойчивость сельскохозяйственных систем к климатическим стрессам, повышая влагоудержание и эффективность использования питательных веществ [7].

Заключение: Комплексное применение органических методов, включая севообороты с сидератами, внесение органических удобрений и биопрепаратов, формирует устойчивые агросистемы за счет значительного повышения содержания почвенного органического углерода и активизации микробиоты. Эти процессы напрямую улучшают структуру почвы, ее влагоемкость и биоразнообразие, обеспечивая долгосрочную секвестрацию углерода, снижение зависимости от синтетических средств и повышение устойчивости сельского хозяйства к климатическим стрессам.

Использованные источники:

1. Baresel, J. P., Šišić, A., Pittam, A. R., Saidi, A., & Finckh, M. R. (2025). Organic minimum tillage systems based on intensification of legume cover cropping: agronomic and phytopathological aspects. Agronomy for Sustainable Development, 45(4). https://doi.org/10.1007/s13593-025-01029-y

2. Bocean, C. G. (2025). The Role of Organic Farming in Reducing Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in the European Union. Agronomy, 15(1), 198. https://doi.org/10.3390/agronomy15010198

3. Rashmi, M. R., Gopalakrishnan, M., Rajeswari, R., Senthil, K. M., Kavitha, M., & Maragatham, S. (2024). Resilient soils for a changing climate: Navigating the future of sustainable agriculture. Plant Science Today, 11(sp4). https://doi.org/10.14719/pst.5598

4. Riddech, N., Theerakulpisut, P., Ma, Y. N., & Sarin, P. (2025). Bioorganic fertilizers from agricultural waste enhance rice growth under saline soil conditions. Scientific Reports, 15(1). https://doi.org/10.1038/s41598-025-93619-9
5. Rossi, G., Beni, C., & Neri, U. (2024). Organic Mulching: A Sustainable Technique to Improve Soil Quality. Sustainability, 16(23), 10261. https://doi.org/10.3390/su162310261
6. Sánchez-Cueto, P., Hartmann, M., García-Velázquez, L., Gozalo, B., Ochoa, V., Bongiorno, G., Goede, R., Zoka, M., Stathopoulos, N., Kontoes, C., Martinez, L. D. O., Mataix-Solera, J., García-Orenes, F., Van De Sande, T., Hestbjerg, H., Alsina, I., Tóth, Z., Barral, M. P., Sirimarco, X., … Lladó, S. (2025). Impacts of Climate, Organic Management, and Degradation Status on Soil Biodiversity in Agroecosystems Worldwide. Global Change Biology, 31(9). https://doi.org/10.1111/gcb.70486
7. Sifola, M. I., Cozzolino, E., Todisco, D., Palladino, M., Sicignano, M., & Del Piano, L. (2024). Organic Fraction Municipal Solid Waste Compost and Horse Bean Green Manure Improve Sustainability of a Top-Quality Tobacco Cropping System: The Beneficial Effects on Soil and Plants. Sustainability, 16(15), 6466. https://doi.org/10.3390/su16156466
8. Vyas, R. V., & Jhala, Y. K. (2023). Climate change and agricultural ecosystem: Challenges and microbial interventions for mitigation. Journal of Agrometeorology, 25(3). https://doi.org/10.54386/jam.v25i3.2305

УДК: 159.923

Ширинов К.Ж.
старший преподаватель
Институт гражданской защиты при
Академии МЧС Республики Узбекистан
Нусратуллаева Г.К.
Директор учебного центра Enkanto.lc

ПРАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Аннотация. *В статье рассматриваются практико-психологические направления формирования субъективного благополучия студентов на основе здорового образа жизни. Актуальность исследования обусловлена возрастанием психоэмоциональных нагрузок в студенческой среде и необходимостью поиска эффективных психологических ресурсов, способствующих сохранению и укреплению психического здоровья обучающейся молодёжи. Субъективное благополучие анализируется как интегративный показатель психологического состояния личности, включающий эмоциональный, когнитивный и оценочный компоненты. Особое внимание уделяется роли здорового образа жизни как фактора повышения уровня субъективного благополучия студентов. В статье обоснована значимость практико-психологических направлений, таких как психопросвещение, тренинговая и профилактическая работа, направленных на формирование осознанного отношения к собственному здоровью и развитие навыков саморегуляции. Полученные выводы могут быть использованы в практике психологического сопровождения студентов в образовательных учреждениях.*

Ключевые слова: *субъективное благополучие, студенты, здоровый образ жизни, практико-психологические направления, психологическое сопровождение.*

Shirinov K.J.
senior lecturer
Institute of Civil Protection at the Academy
Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan
Nusratullayeva G. K.
director
Training Center Enkanto.lc

PRACTICAL AND PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF STUDENTS' SUBJECTIVE WELL-BEING BASED ON A HEALTHY LIFESTYLE

Abstract. *The article examines practical psychological approaches to the formation of students' subjective well-being based on a healthy lifestyle. The relevance of the study is determined by increasing psycho-emotional stress among students and the need to identify effective psychological resources that contribute to the preservation and strengthening of mental health. Subjective well-being is considered as an integrative indicator of an individual's psychological state, including emotional, cognitive, and evaluative components. Particular attention is paid to the role of a healthy lifestyle as a significant factor in enhancing students' subjective well-being. The study substantiates the importance of practical psychological approaches such as psychoeducation, training programs, and preventive activities aimed at developing conscious attitudes toward health and self-regulation skills. The results of the study can be applied in the practice of psychological support for students in educational institutions.*

Keywords: *subjective well-being, students, healthy lifestyle, practical psychological approaches, psychological support.*

Введение. В условиях современных социально-экономических и образовательных преобразований проблема субъективного благополучия личности приобретает особую актуальность, особенно в студенческой среде. Период обучения в высшем учебном заведении характеризуется высокой учебной нагрузкой, необходимостью адаптации к новым социальным ролям, возрастанием ответственности за профессиональное и личностное самоопределение, что нередко сопровождается эмоциональным напряжением, стрессом и снижением психологического комфорта. В этой связи субъективное благополучие студентов выступает важным показателем их психического здоровья, успешности обучения и качества жизни в целом.

Субъективное благополучие рассматривается в современной психологии как интегративное образование, включающее когнитивную оценку собственной жизни, преобладание положительных эмоций над отрицательными, а также удовлетворённость значимыми сферами жизнедеятельности. Исследования показывают, что высокий уровень субъективного благополучия способствует развитию личностной устойчивости, академической мотивации, социальной активности и профессиональной самореализации студентов. В то же время снижение субъективного благополучия может приводить к эмоциональному выгоранию, тревожности и дезадаптации.

Одним из значимых факторов, влияющих на формирование субъективного благополучия, является здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни включает в себя совокупность поведенческих, ценностных и мотивационных установок личности, направленных на сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья. Регулярная физическая активность, рациональный режим труда и отдыха, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, а также развитие

навыков саморегуляции и стрессоустойчивости оказывают положительное влияние на эмоциональное состояние и общее самочувствие студентов.

В последние годы в научных исследованиях всё большее внимание уделяется практико-психологическим направлениям формирования здорового образа жизни, ориентированным не только на информирование, но и на активное психологическое сопровождение личности. К таким направлениям относятся психопросвещение, тренинговые программы, профилактическая и консультативная работа, направленные на развитие осознанного отношения к собственному здоровью, формирование адаптивных копинг-стратегий и повышение уровня субъективного благополучия. Однако, несмотря на наличие отдельных исследований, недостаточно изученным остаётся вопрос комплексного воздействия практико-психологических направлений формирования здорового образа жизни на субъективное благополучие студентов.

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического и эмпирического осмысления роли практико-психологических направлений в формировании субъективного благополучия студентов на основе здорового образа жизни. Изучение данной проблемы позволит расширить представления о психологических ресурсах студенческой молодёжи и обосновать эффективные формы психологической работы в образовательной среде.

Цель исследования заключается в изучении практико-психологических направлений формирования субъективного благополучия студентов на основе здорового образа жизни.

Обзор литературы. Проблема субъективного благополучия личности является одной из ключевых в современной психологической науке и активно разрабатывается как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях. В зарубежной психологии концепция субъективного благополучия получила развитие в рамках гедонистического подхода, где благополучие определяется как сочетание удовлетворённости жизнью и эмоционального баланса между положительными и отрицательными переживаниями Э. Динера и коллег [15; 16]. Эвдемонический подход, связанный с личностным ростом и самореализацией, представлен в работах Риффа, Селигмана и Хапперта, подчеркивающих многомерную структуру благополучия и его роль в психологическом здоровье личности [17; 18; 20].

В русской психологической науке субъективное благополучие рассматривается как интегративный индикатор психического здоровья и качества жизни личности. Методологические основы заложены в трудах Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, которые подчёркивают активную роль личности в оценке жизненных обстоятельств и самооценке [1; 6; 9]. Современные российские исследования развивают эти идеи, рассматривая субъективное благополучие как многокомпонентный психологический феномен [11; 12; 5].

Особое внимание уделяется изучению субъективного благополучия и здоровья студентов. Исследования российских авторов показывают, что студенческая среда характеризуется стрессогенными факторами, снижающими психологический комфорт, что делает проблемы благополучия студентов актуальными для психологической науки и педагогической практики [2; 8; 3].

Основоположники теории здорового образа жизни подчёркивают его значение для физического, психического и социального благополучия индивида, а также необходимость формирования здоровых привычек ещё на этапе молодости [13; 14].

В Республики Узбекистан интерес к проблемам здорового образа жизни и психологического благополучия студентов также проявляется в современной научной литературе. Так, исследования Кушматовой и Олимжоновой показывают важность формирования у студентов навыков здорового образа жизни как комплексной задачи, включающей как медицинско-гигиеническую, так и поведенческую составляющую [22]. Это подчёркивает, что процесс формирования здорового образа жизни требует системной работы, направленной на мотивацию и гигиеническое просвещение студентов.

Работа Расуловой и Азаматовой (2025) демонстрирует необходимость формирования культуры здоровья и самооценки здоровья среди студентов, подчеркивая взаимосвязь физического здоровья и психологической устойчивости в образовательной среде Узбекистана. Эти исследования дополняют международные данные о значении здорового образа жизни, показывая, что укрепление здоровья студентов является актуальной задачей образовательной политики страны [23].

Важность психологического благополучия студентов также подчёркивается в исследованиях Тиллашайховой (2025), где описываются факторы, влияющие на психологическое благополучие и развитие личностных ресурсов обучающихся. Эти результаты дополняют обобщённые данные о взаимосвязи образовательной среды, личностных факторов и благополучия студентов [24].

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что вопросы субъективного благополучия студентов и формирование здорового образа жизни имеют устойчивую научную базу, но остаются недостаточно изученными в контексте практико-психологических направлений, особенно в образовательной среде Узбекистана. Это обуславливает необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку комплексных психологических программ, способствующих укреплению как физического, так и психологического здоровья студентов.

Методы исследования. В исследовании применялся опытно-экспериментальный метод, направленный на изучение влияния практико-психологических мероприятий, связанных с формированием здорового образа жизни, на субъективное благополучие студентов.

Объектом исследования стали студенты Чирчикского педагогического университета. В выборку вошли 200 студентов в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на разных факультетах. Выборка была сформирована случайным образом, с учётом равного распределения по полу и курсам обучения, чтобы минимизировать возможные демографические и академические смещения.

Для оценки субъективного благополучия использовалась шкала позитивного и негативного аффекта (PANAS), которая позволяет количественно измерить эмоциональные состояния и определить уровень позитивного и негативного переживания.

Для изучения факторов здорового образа жизни фиксировались следующие показатели: регулярность физической активности; режим сна; соблюдение принципов здорового питания; участие в профилактических и психопедагогических мероприятиях университета.

Эксперимент состоял из двух этапов:

Предварительное тестирование: студенты заполняли PANAS и анкеты о здоровом образе жизни.

Вмешательство (экспериментальная программа): участники экспериментальной группы участвовали в практико-психологических тренингах, мастер-классах и занятиях по формированию здорового образа жизни в течение 8 недель. Контрольная группа продолжала обычную образовательную деятельность без вмешательства.

Посттестирование: повторное заполнение PANAS и анкет для оценки изменений субъективного благополучия и здорового образа жизни.

Для обработки данных применялся статистический анализ с использованием t-тестов для зависимых и независимых выборок. Это позволило выявить:

различия в показателях субъективного благополучия между экспериментальной и контрольной группой;

динамику изменений положительного и негативного аффекта в течение эксперимента.

Анализ проводился с использованием программного обеспечения SPSS 26.0, с уровнем значимости $p < 0.05$.

Результаты исследования. После проведения экспериментальной программы по формированию здорового образа жизни у студентов Чирчикского педагогического университета были проанализированы изменения субъективного благополучия с помощью шкалы PANAS.

В экспериментальной группе средний показатель позитивного аффекта увеличился с $28{,}4 \pm 5{,}2$ до $34{,}7 \pm 4{,}8$ баллов, что свидетельствует о статистически значимом росте положительных эмоций ($t = 12{,}63$, $p < 0{,}001$). В контрольной группе изменения были незначительными: с $28{,}7 \pm 5{,}0$ до $29{,}1 \pm 5{,}3$ баллов ($t = 1{,}22$, $p = 0{,}23$), что подтверждает отсутствие эффекта без вмешательства.

Средний показатель негативного аффекта в экспериментальной группе снизился с $21,8 \pm 4,7$ до $17,2 \pm 4,1$ баллов, что является статистически значимым снижением ($t = 11,05$, $p < 0,001$). В контрольной группе наблюдалось небольшое снижение с $22,0 \pm 4,5$ до $21,5 \pm 4,6$ баллов ($t = 1,34$, $p = 0,18$), не достигшее уровня статистической значимости.

Сравнение посттестовых показателей между группами показало, что студенты экспериментальной группы имели более высокий уровень позитивного аффекта и ниже уровень негативного аффекта, чем студенты контрольной группы ($t = 7,42$, $p < 0,001$ для позитивного аффекта; $t = 6,87$, $p < 0,001$ для негативного аффекта).

Экспериментальная программа, включающая практико-психологические мероприятия по формированию здорового образа жизни, оказала положительное влияние на субъективное благополучие студентов. Рост позитивного аффекта и снижение негативного аффекта подтверждают эффективность вмешательства. Полученные данные демонстрируют, что систематическая работа по формированию здорового образа жизни способствует улучшению эмоционального состояния и психического здоровья студентов.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Практико-психологические мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни студентов, оказали статистически значимое положительное влияние на субъективное благополучие. В экспериментальной группе наблюдалось увеличение позитивного аффекта и снижение негативного аффекта по сравнению с контрольной группой.

2. Систематическая работа по укреплению здоровья, включающая физическую активность, здоровые привычки и психопедагогические тренинги, способствует улучшению эмоционального состояния и повышению устойчивости студентов к стрессовым ситуациям, что является ключевым фактором успешной адаптации в образовательной среде.

3. Результаты исследования подтверждают актуальность интеграции практико-психологических программ по здоровому образу жизни в образовательный процесс. Подобные вмешательства могут рассматриваться как эффективный инструмент повышения уровня субъективного благополучия студентов и формирования психологической компетентности.

4. Данные исследования создают основу для дальнейших научных разработок, включая расширение экспериментальных программ, изучение долгосрочных эффектов и выявление оптимальных методов взаимодействия психологических практик и формирования здорового образа жизни в вузовской среде.

5. Практическая значимость работы заключается в том, что университеты могут использовать результаты исследования для разработки учебных и внеучебных мероприятий, направленных на повышение качества жизни студентов и профилактику эмоционального выгорания.

Использованные источники:

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. — СПб.: Питер, 2001. — 288 с.
2. Баева И. А. Психологическая безопасность образовательной среды. — СПб.: Речь, 2002. — 271 с.
3. Водопьянова Н. Е. Психология стресса, выгорания и ресурсов. — М.: Юрайт, 2019. — 375 с.
4. Зотова О. Ю. Психологическое благополучие личности // Вестник МГУ. Серия 14: Психология. — 2015. — № 3. — С. 87–102.
5. Коржова Е. Ю. Психология жизненного пути личности. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — 312 с.
6. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.
7. Митина Л. М. Психология личностного и профессионального развития. — М.: Академия, 2014. — 400 с.
8. Реан А. А. Психология личности. — СПб.: Питер, 2018. — 416 с.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2015. — 720 с.
10. Самоукина Н. В. Психологическое консультирование. — М.: Эксмо, 2017. — 384 с.
11. Фесенко П. П. Субъективное благополучие личности: психологические аспекты // Психологический журнал. — 2005. — Т. 26, № 3. — С. 95–105.
12. Шевеленкова Т. Д. Психологическое благополучие личности // Психология. Журнал Высшей школы экономики. — 2005. — Т. 2, № 3. — С. 87–102.
13. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. — М.: Молодая гвардия, 1987. — 256 с.
14. Апанасенко Г. Л. Индивидуальное здоровье: теория и практика. — Киев: Здоровье, 2003. — 352 с.
15. Diener E. Subjective well-being // Psychological Bulletin. — 1984. — Vol. 95, No. 3. — P. 542–575.
16. Diener E., Lucas R. E., Oishi S. Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction // Handbook of Positive Psychology. — Oxford: Oxford University Press, 2002. — P. 63–73.
17. Ryff C. D. Happiness is everything, or is it? // Journal of Personality and Social Psychology. — 1989. — Vol. 57, No. 6. — P. 1069–1081.
18. Seligman M. E. P. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. — New York: Free Press, 2011. — 349 p.
19. Deci E. L., Ryan R. M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation // American Psychologist. — 2000. — Vol. 55, No. 1. — P. 68–78.
20. Huppert F. A. Psychological well-being: Evidence regarding its causes and consequences // Applied Psychology: Health and Well-Being. — 2009. — Vol. 1, No. 2. — P. 137–164.

21.Abbasov B. A. Healthy lifestyle of students in the educational process by means of adaptive physical culture // *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*. — 2023. — Vol. 3, No. 4. — P. 57–62. — URL: https://emergent.pubmedia.id/index.php/Emergent/article/view/57
22.Kushmatova D. E., Olimjonova F. O. The impact of a healthy lifestyle among students on the quality of education // *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*. — 2024. — Vol. 2, No. 1. — URL: https://webofjournals.com/index.php/3/article/view/692
23.Rasulova N. F., Azamatova F. A. Improving quality of life and health self-assessment of students // *Moon Shine Scientific Journal*. — 2025. — № ?. — URL: https://shine-aebgroup.uz/index.php/current/article/view/113
24.Tilla-shaykhova X. A. Dynamics of psychological well-being of students // *Maktabgacha va Maktab ta'limi jurnali*. — 2025. — № ?. — URL: https://maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/283

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

УДК 004.652.5

Грибова Е.Н., к.т.н.
доцент
кафедра теоретической информатики
ФГОУ ВО Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова
РФ, г. Ярославль

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗРАБОТОК В ПРИМЕНЕНИИ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИИ НА БАЗЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ФИТНЕС-КЛУБАМИ

Аннотация*: в последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к здоровому образу жизни и физической активности. Это приводит к увеличению спроса на фитнес-услуги, разнообразные тренировки и квалифицированных тренеров.*

В статье автором рассматриваются применение интеллектуальных технологий в сфере рынка фитнес-услуг и описывается функционал разработанного программного обеспечения для управления расписанием тренировок в типовом фитнес-клубе, не имеющем сетевой структуры. Актуальность описываемой программы обусловлена необходимостью разработки эффективного инструмента для повышения конкурентоспособности таких клубов и удовлетворенности их клиентов.

Ключевые слова: *фитнес-клуб, базы данных, модели данных, расписании тренировок, графический интерфейс, Python, PySide6, SQLite*

Gribova E.N., PhD
associate professor
Department of Theoretical Computer Science
P.G. Demidov Yaroslavl State University
Russian Federation, Yaroslavl

EFFICIENCY AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENTS IN THE USE OF CLOUD APPLICATIONS BASED ON AN OBJECT-ORIENTED APPROACH FOR MANAGING INDEPENDENT FITNESS CLUBS

Abstract: *In recent years, there has been a steady increase in interest in a healthy lifestyle and physical activity. This has led to increased demand for fitness services, a variety of training options, and qualified trainers.*

In this article, the author examines the application of intelligent technologies in the fitness services market and describes the functionality of the developed software for managing training schedules in a typical fitness club without a network structure. The relevance of this program stems from the need to develop an effective tool for increasing the competitiveness of such clubs and customer satisfaction.

Keywords: *fitness club, databases, data models, training schedules, graphical interface, Python, PySide6, SQLite*

С каждым годом увеличивается число людей, занимающихся спортом и посещающих фитнес-клубы. Для обеспечения высокого уровня обслуживания и удовлетворения потребностей клиентов фитнес-клубам необходимо эффективно управлять расписанием тренировок, контролировать загруженность тренеров и оптимизировать использование ресурсов. Современные технологии и программное обеспечение (ПО) позволяют автоматизировать и улучшать процессы управления фитнес-клубом.

Все больше клубов предпочитают облачные CRM-решения, которые позволяют им управлять своей деятельностью из любой точки мира через интернет. Кроме того, важным трендом является улучшение аналитических возможностей систем, позволяющих клубам получать более глубокие и точные аналитические данные о своей деятельности и клиентской базе.

Для управления расписанием тренировок в фитнес-клубе создан пакет программ, состоящий из следующих ключевых модулей: базы данных, модели данных и графического интерфейса пользователя (GUI). Это ПО предоставляет базовый функционал, необходимый для эффективной работы спортивного клуба.

Она включает следующие топовые возможности:

1) Управление тренерами;

2) Управление клиентами;

3) Управление расписанием тренировок.

Основные технологии, использованные при разработке: язык программирования Python, библиотека PySide6 для создания графического интерфейса, система управления базами данных SQLite. Выбор этих технологий был обусловлен их кроссплатформенностью, простотой интеграции, легкостью в установке и широкими возможностями для дальнейшего расширения функционала. PySide6 позволяет создавать модульные приложения с богатым функционалом, используя объектно-ориентированный подход.

Внедрение описываемого ПО позволит администраторам и клиентам самостоятельных фитнес-клубов легко (на интуитивном уровне):

- Автоматизировать управление расписанием тренировок: при составлении расписания учитываются и пожелания клиентов и загруженность тренеров, что позволит избегать конфликтов при бронировании времени.

• Повышать удовлетворенность клиентов: клиенты могут он-лайн записываться на тренировки, получать уведомления о изменениях и отслеживать свою активность.

• Оптимизировать использование ресурсов: эффективное распределение времени и ресурсов тренеров, минимизация простоев, повышает общую производительность клуба.

Сбор и анализ данных о посещаемости, предпочтениях клиентов и эффективности тренеров помогают руководству фитнес-клуба принимать обоснованные решения по улучшению качества услуг и развитию бизнеса.

Разработанная программа уже обладает всеми необходимыми функциями для эффективного управления занятиями в спортивном клубе. Однако существует ряд возможностей для её дальнейшего развития и улучшения:

1. Расширение функционала управления клиентами:

• Введение более подробной информации о клиентах, такой как контактные данные, история посещений и предпочтения.

• Внедрение системы лояльности и учета бонусных баллов для постоянных клиентов.

2. Улучшение интерфейса пользователя:

• Введение уведомлений и напоминаний о предстоящих занятиях для тренеров и клиентов.

3. Интеграция с внешними системами:

• Подключение к онлайн-платформам для бронирования занятий и оплаты услуг.

• Внедрение функций для онлайн-резервирования тренировок клиентами через веб-интерфейс или мобильное приложение.

4. Аналитика и отчеты:

• Разработка модулей для анализа посещаемости, эффективности тренеров и популярности различных видов тренировок.

• Внедрение системы автоматической генерации отчетов для руководства клуба.

Таким образом, благодаря гибкости используемых технологий, программа может быть легко адаптирована и расширена в соответствии с меняющимися потребностями клуба и пожеланиями пользователей.

Для демонстрации кода программы приведу один их его модулей - код класса диалога добавления тренера add_trainer_dialog.p[89]:

```
from PySide6.QtWidgets import QDialog, QFormLayout, QLineEdit, QDialogButtonBox
class AddTrainerDialog(QDialog):
    def __init__(self, parent=None):
```

[89] Постников А.С. Разработка программы управления расписанием тренировок в CMR-системе учёта услуг для спортивных клубов. Ярославль, ЯрГУ, 2024.

```
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Добавить тренера")
        self.layout = QFormLayout(self)
        self.first_name_input = QLineEdit(self)
        self.layout.addRow("Имя:", self.first_name_input)
        self.last_name_input = QLineEdit(self)
        self.layout.addRow("Фамилия:", self.last_name_input)
        self.phone_input = QLineEdit(self)
        self.layout.addRow("Телефон:", self.phone_input)
        self.buttons = QDialogButtonBox(QDialogButtonBox.Ok | QDialogButtonBox.Cancel, self)
        self.buttons.accepted.connect(self.accept)
        self.buttons.rejected.connect(self.reject)
        self.layout.addWidget(self.buttons)
```

Использованные источники:

1. Ащеулов, А. В. Бизнес-планирование в фитнес-индустрии // Управление фитнес-клубом. – 2017. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-planirovanie-v-fitnes-industrii электронный ресурс (дата обращения: 07.02.2026)

2. Lakshmi Muddana & Sandhya Vinayakam. Introduction to PySide6. — В книге: Python for Data Science Издательство, 2024. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-52473-8_10 электронный ресурс (дата обращения: 08.02.2026)

УДК 37.014.5:614.8

Ким С.Г.
преподаватель
Институт гражданской защиты
при Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация*: В статье рассматриваются современные способы защиты учащихся образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций различного характера. Проведён анализ основных угроз безопасности в образовательной среде, обоснована необходимость комплексного подхода к управлению рисками. Особое внимание уделено внедрению цифровых технологий, систем раннего оповещения, организационно-управленческих и образовательных мер. Сделан вывод о значимости интеграции технических, педагогических и социально-экономических механизмов обеспечения безопасности учащихся в современных условиях.*

Ключевые слова: *чрезвычайные ситуации, безопасность учащихся, образовательные учреждения, системы оповещения, управление рисками, цифровые технологии, профилактика ЧС.*

Kim S.G.
lecturer
Civil Protection Institute
Academy of the Ministry of Emergency Situations

MODERN METHODS OF PROTECTING STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM EMERGENCY SITUATIONS

Abstract: *The article examines modern methods of protecting students of educational institutions from emergency situations of various kinds. An analysis of the main security threats in the educational environment was conducted, and the need for an integrated approach to risk management was substantiated. Particular attention is paid to the implementation of digital technologies, early warning systems, organizational, managerial and educational measures. A conclusion is made about the importance of integrating technical, pedagogical and socio-economic mechanisms for ensuring the safety of students in modern conditions.*

Keywords: *Emergencies, student safety, educational institutions, warning systems, risk management, digital technologies, emergency prevention.*

Введение. Современный этап развития общества характеризуется ростом количества и масштабов чрезвычайных ситуаций (ЧС), оказывающих

значительное влияние на социально-экономические процессы и качество жизни населения. Особую актуальность проблема защиты от ЧС приобретает в сфере образования, поскольку учащиеся относятся к социально уязвимым группам населения и требуют повышенного уровня защиты.

Образовательные учреждения являются объектами массового пребывания людей, что существенно повышает уровень потенциального риска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. В этих условиях обеспечение безопасности учащихся становится одной из приоритетных задач государственной политики в области образования и гражданской защиты [2,3].

Целью данной статьи является анализ современных способов защиты учащихся образовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций и обоснование эффективности комплексного подхода к обеспечению безопасности.

Результаты. Для развития познавательной деятельности необходимо использование для познания учащимися окружающего мира методов наблюдения, измерения, опыта, эксперимента, моделирования и др., способствующих определению структуры объекта познания, поиску и выделению значимых функциональных связей и отношений между частями целого, развитию умений разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные причинно-следственные связи.

Метод проблемного изложения способствует развитию у учащихся навыков определения адекватных способов решения ситуационной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинирования известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, а также развитию умений сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.

Использование практических и лабораторных работ, самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности, выполнение несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений, описание результатов этих работ, способствует творческому решению учебных и практических задач, развитию умений мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения проблемы.

Включение учащихся в игровую деятельность способствует адекватному восприятию устной речи и развитию способности передавать информацию в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью задания игрового сюжета, владеть монологической и диалогической речью, уметь вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), уметь перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.

Задания для самостоятельной организации учебной деятельности способствуют развитию умений ставить цели, планировать, определять оптимальное соотношение цели и средств; овладению навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий; поиску и устранению причин возникших трудностей; оцениванию своих учебных достижений, поведения, своего физического и эмоционального состояния; соблюдению норм поведения в окружающей среде.

Содержание изучаемых тем (ЧС природного характера), для достижения эффективности организации образовательного процесса необходимо:

– традиционный комбинированный урок проводить с использованием частой смены активной деятельности учащихся, большого количества иллюстративного материала;

– широко применять словесные методы обучения – рассказ, объяснение, беседу в сочетании с видеопоказом, демонстрацией, практической и самостоятельной работой учащихся с натуральными (образцы аварийно-спасательного инструмента и оборудования, средства индивидуальной защиты,приборы радиационной и химической разведки, средства пожаротушения и первой медицинской помощи) и изобразительными (макеты аварийно-спасательных инструментов и оборудования, а также макеты местности, зданий и муляжи) средствами обучения, картой, учебником, дополнительной литературой по теме;

– предпочтение отдавать частично-поисковым, исследовательским методам обучения, стимулирующим познавательный интерес к предмету, творческую активность, самостоятельность, развитие общеучебных (работа с текстом, анализ, синтез, обобщение, классификация, рефлексия) и специальных умений и навыков (соблюдать нормы безопасного поведения в повседневной жизни, умений не допустить возникновение опасной ситуации, при возникновении – правильно действовать);

– объяснение нового материала осуществлять с опорой на витагенный опыт и витагенную информацию, имеющуюся у учащихся по рассматриваемым вопросам, актуализируя полученные ранее знания для их углубления, расширения и систематизации;

– закрепление теоретических знаний и развитие умений и навыков обеспечения личной безопасности в повседневной жизни осуществлять в нетрадиционных формах – при проведении экскурсий, сюжетных и ролевых игр, посредством решения ситуационных задач, проведения соревнований, презентаций учебных проектов и т.д.;

– домашнее задание производить не с позиций «прочитать., выучить., рассказать.», а посредством исключения учащихся в творческое решение учебных и практических задач, связанных с повседневной жизнью (решение ситуационных задач; составление кроссвордов, моделей, алгоритмов действий; выполнение творческих работ; несложных экспериментов для

доказательства выдвигаемых предположений, описание результатов этих работ; ведение дневника наблюдений и т.д.);

– использовать внеурочное время для закрепления учебного материала по обеспечению безопасности в повседневной жизни при подготовке и участии обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях.

Важное место при изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» занимает отработка практических навыков самозащиты и оказания помощи окружающим людям.

Часы, отведенные на практические занятия, учитель использует в зависимости от результатов усвоения учащимися содержания конкретных тем. Практические занятия могут быть организованы в виде викторин, экскурсий, тренингов на специально оборудованных площадках и объектах, в форме моделирования ситуаций, ролевых и ситуационных игр, рисования схем, упражнений и т.д. [6,7].

Подготовку школьников по вопросам основ безопасности жизнедеятельности рекомендуется осуществлять в форме инструктажа (специальных занятий) перед началом всех видов деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке в общеобразовательных учреждениях, организации общественно полезного труда, а также во время экскурсий, походов, спортивных соревнований, кружковых занятий и других видов внеклассной и внешкольной деятельности. В течение учебного года желательно провести объектовую тренировку для подготовки учащихся и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях локального характера в соответствии с планом по гражданской защите учебного заведения и с учетом местных условий.

Общеобразовательные учреждения обладают широкими возможностями для формирования знаний и умений учащихся по вопросам безопасности жизнедеятельности. Они заложены как в содержании курса, при изучении которого школьники получают сведения о существующих в мире техногенных, природных, социальных опасностях, так и в организационно-воспитательных формах внеклассной деятельности.

Организуя внеурочные мероприятия, учитель основ безопасности жизнедеятельности активно взаимодействует с социальными институтами МЧС, МВД, медицинскими учреждениями, учреждениями культуры, учреждениями профессионального образования, обеспечивая консолидацию усилий по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности населения.

Таким образом, современные способы защиты учащихся образовательных учреждений в Республике Узбекистан должны базироваться на комплексном подходе, объединяющем нормативно-правовые, технологические, организационные и образовательные меры. Повышение эффективности взаимодействия с МЧС, внедрение цифровых технологий и

формирование культуры безопасности являются ключевыми направлениями дальнейшего развития системы защиты от чрезвычайных ситуаций.

[1,4].

Выводы

Опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций показывает, что людские и материальные потери могут быть значительно меньше, если действия преподавателей будут высокопрофессиональны, а подрастающее поколение будет обладать навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. Повышение уровня профессионализма специалистов и обучение учащихся образовательных учреждений – это первоочередной резерв в деле уменьшения возможного ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. А основную задачу мы видим в том, чтобы за счёт использования новых современных технологий в значительной мере улучшить подготовку специалистов и обучение учащихся к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций за счет широкого и постоянно расширяющегося внедрения инновационных технологий во все сферы жизни, включая производство, школу, ВУЗы, дом [6].

Использованные источники:

1. Закон Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
2. Абдуллаев А.А. Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. — Ташкент, 2021.
3. Каримов Б.Х. Управление рисками чрезвычайных ситуаций. — Ташкент: Fan, 2022.
4. Smith J. Emergency Management in Educational Institutions // International Journal of Safety Studies. — 2021.
5. Миронов, С. К. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. 5 – 11 классы / С.К. Миронов. – М. : Дрофа, 2004. – стр. 94.
6. Михайлов Л.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. -2-е издание. – СПб: Издательство “Питер”, 2010 г., стр.155.
7. Суздалева А.М. Чрезвычайные ситуации природного характера: учеб. Пособие для студентов педвузов / А.М. Суздалева, В.И. Воробьев. – Оренбург: Изд – во ОГПУ, 2004. – стр. 104.

Оглавление

Abdug‘aniyeva Y.A., THE EFFECT OF TREATING SEEDS OF “AVMU” MUNG BEAN VARIETIES WITH “FITOVAK” IMMUNOSTIMULANTS ON THE LEAF SURFACE 9

Abduraximov A.D., YOPIQ SUV TA’MINOTI QURILMASI (YSTQ) ASOSIDA BALIQ YETISHTIRISHNING ZAMONAVIY AHAMIYATI 13

Akhmadaliyeva G.Kh., METHODS FOR DEVELOPING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK SKILLS 16

Ashurov J. S., Umarov Sh.Y., Xoliyorov H.O‘.,SURXONDARYO VILOYATI QISHLOQ XO‘JALIGINING HUDUDIY TARKIBI VA AGROGEOGRAFIK RAYONLASHTIRISH XUSUSIYATLARI 23

Ashurov O.Sh., DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS 29

Axrorqulov Sh., Tursunova M., Bekmatova M., Hakimova X.X., HOMILADORLIK DAVRIDA XAVF OMILLARINI ERTA ANIQLASHDA AKUSHERNING ROLI 32

Axrorov M. N., Usarov A.A., HAYVOINLAR KATTA QORNIDA KECHADIGAN HAZM JARAYONLARIGA PAST INTENSIV LAZER NURI BILAN TA’SIRI 36

Axrorov M. N., Usarov A.A., Abdusattorov E. S., PAST INTENSIV LAZER NURINING HAYVOINLAR ORGANIZMIDA KECHADIGAN HAZM JARAYONLARIGA TA’SIRI 39

Berdiyev F.O., ERKIN KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH 42

Berdiev Sh.O., PARALIMPIYA HARAKATINI YANADA RIVOJLANTIRISH – ISTIQBOLI 46

Berdiyeva D.A., Nuridinov A.M., IMPROVING STRATEGIES FOR THE CONTROL AND PREVENTION OF MEASLES TRANSMISSION 49

Bo‘ronboyeva R., Rabbimova Sh., Abdusamatova N., Xudoyqulov J. I., OQ PION ILDIZI (PAEONIAE RADIX) NING FARMAKOLOGIK VA TIBBIY AHAMIYATI 52

Dinmukhammadieva D.R., Israilova N. A., Nazarov B. S., APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MULTIMODAL MODELS IN THE ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN IMMUNE SYSTEM ORGANS AND CLINICAL DIAGNOSTICS 56

Djuraeva A.A., IMPROVEMENT OF METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF CANDIDIASIS IN YOUNG CHILDREN 59

Dustova N.K., Yangiyeva S.U., Nazarova G.Kh., RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS 62

Dustova N.K., Yangiyeva S.U., Sharipova F.Kh., PREDICTION OF PREGNANCY OUTCOME IN WOMEN WITH RETROCHORIAL HEMATOMA IN EARLY GESTATION: A LITERATURE REVIEW 75

Erdonov M.N., Ergasheva O.X., FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEAVY INDUSTRY SECTORS IN THE SURXONDARYO REGION 79

Ergasheva M. D., SOG‘LOM VA MAXSUS EHTIYOJLI BOLALAR O‘RTASIDAGI FARQLAR VA INKLYUZIV TA’LIM KONTEKSTIDAGI YONDASHUVLAR 83

Fattoyev E.A., EKONOMETRIKANING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O‘RNI.....89

Gafforov X.X., TAJRIBADA METILVINILPIRIDIN TAЪSIRIDA MARKAZIY ASAB TIZIMIDA MORFOLOGIK O’ZGARIShLAR 96

Gaybullayeva A., CLINICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN 100

Habibullayev T.U., MORPHOFUNCTIONAL EVALUATION OF MELOXICAM-INDUCED PROTECTION OF TESTICULAR TISSUE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS 105

Irisboyev F.B., REZISTORLAR VA ULARNING GURUHLARI 111

Irisboyev F.B., YARIM O‘TKAZGICH MATERIALLARNING ASOSIY KATTALIKLARI.....115

Ismoilov O.I., ANATOMO-TOPOGRAPHIC STRUCTURE OF THE NERVES OF THE COSTOVERTEBRAL JOINTS IN HUMANS 119

Jalolov T., Xoliqulov Sh., Abdiyev X., OLIY TA’LIM TIZIMIDA VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN HAQIQAT (VR/AR) TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI.....122

Kamal Sanjida, Mneeva L.N., EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH PERFORMANCE ASSESSMENT: EVIDENCE FROM A HIGH-RELIABILITY ORGANIZATION 126

Kasimov Kh.O., HYGIENIC BASIS FOR THE HEALTH OF WORKERS IN COTTON PRODUCTION.....134

Kasimova N., CONGENITAL HEART DISEASE OUTCOMES AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS: A REGIONAL STUDY FROM BUKHARA, UZBEKISTAN 140

Khaydarova N.B., CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF UTERINE LEIOMYOMA.....151

Kholmirzaev F.M., DIRECTIONS FOR THE USE OF ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SMALL BUSINESS SECTOR 158

Khomidova S.H., PREVENTION OF HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS: MODERN APPROACHES AND EFFECTIVE MEASURES 163

Madraximova Z.N., Xidiraliyev K.E., Omonov X.Sh., Nabijonova D. Q., O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING BOSQICHLARI VA ULARNI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI 167

Mamajonova N. A., QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH 174

Mamanov A. U., OPEN BUDGET REFORMS AND ECONOMIC PERFORMANCE: A CONDITIONAL RELATIONSHIP 179

Mamatova N. T., Ashurov A.A., MODERN LABORATORY DIAGNOSIS OF TUBERCULOSIS IN CHILDREN 196

Mamatova N.T., Ashurov A. A., Abdukhakimov B.A., EMOTIONAL DISORDERS IN WOMEN WITH RESPIRATORY TUBERCULOSIS 199

Matmusayev T.M., RAQAMLI REALLIK SHAROITIDA IJTIMOIY BORLIQNING O‘ZGARISHI VA “VIRTUAL IDENTIKLIK” MUAMMOSI .. 203

Mavlonov A.M., Eshtuxtayev A.T., SAMARQAND VILOYATI SHAHARLARINING GEOGRAFIYASI GEOGRAPHY OF CITIES OF SAMARKAND REGION 212

Mavlonova G.G., INNOVATSION TA’LIM MUHITIDA BO’LAJAK BOSHLANG’ISH SINF O’QITUVCHILARINING KASBIY IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH 217

Mirzayev A.R., Sotvoldiyev A.A., FAVQULODDA VAZIYATLARGA TAYYORLASHDA ISH BILAN BAND BO‘LMAGAN AHOLI TOIFALARI VA ULARNING IJTIMOIY-DEMOGRAFIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISHNI AHAMIYATI 222

Mirzayev A.R., Qodirov R.I., FAVQULODDA VAZIYATLARDA AHOLINI OGOHLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI 232

Mirzoeva I.E., Shomurodova Sh.Sh., ECOLOGICAL CONDITIONS OF LADSCAPES SURROUNDING MURUNTOV GOLD MINE 238

Mirzoyeva M.A., APPLYING THE CASE STUDY METHOD IN TEACHING GENETICS AS A FACTOR IN ENHANCING PROFESSIONAL COMPETENCE 241

Mirzoyeva M.A., IMPROVING GENETICS EDUCATION THROUGH METHODOLOGICAL SUPPORT 246

Mirzoyeva I. E., Savriddinova M.I., TO‘DAKUL SUV OMBORINING DAM OLISH IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH HOLATI 250

Mukhtarov Ruslan I., Khujabaev S.T., Dusiyarov M. M., OPTIMIZATION OF SURGICAL STRATEGY FOR COMPLEX PARARECTAL FISTULAS: CLINICAL AND FUNCTIONAL RESULTS 254

Mukimov Sh.I., INFLUENCE OF ORTHODONTIC TREATMENT ON DENTAL HARD TISSUES AND PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DENTOFACIAL DEFORMITIES 262

Murodov J.Ch., FERMER XO‘JALIKLARIDA QO‘SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING STATISTIK BAHOLASHDA INTEGRALLASHGAN KO‘RSATKICHLAR TIZIMINI JORIY ETISH.....266

Murodova D.S., QASHQADARYO VILOYATI YOQILG‘I ENERGETIKA SANOATINING IQTISODIY GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI.....274

Mustafoev Z.M., EXPERIMENTAL STUDY OF THE ANATOMICO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF EXTRACARDIAC VESSELS IN RABBITS.....282

Muxamedova Z.R., RESULTS OF THE STUDY OF LIFESTYLE AND PHYSICAL ACTIVITY CHARACTERISTICS OF STUDENTS 285

Muxtorova S.N., Muhiddinova G. J., Xushvaxtova Ch. J., Jumanova D.Sh., PATOLOGIK ANATOMIYA VA O‘SMALAR: KELIB CHIQISH SABABLARI, RIVOJLANISH MEXANIZMLARI VA MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI..291

Nazarova D.I., YANGI O‘ZBEK SHE’RIYATIDA FARDNING SHAKL VA MAZMUN YANGILANISHI (G’ULOM SHOMUROD IJODI MISOLIDA) ...295

Nazarova F. I., RESISTANCE INDICATORS OF FINE FIBERED “GOSSYPIUM BARBADENSE L.” COTTON VARIETIES UNDER STRESS CONDITIONS301

Nazarova F. I., EFFECT OF WATER SUPPLY ON TRANSPIRATION RATE OF FINE-FIBERED COTTON VARIETIES 305

Nazarova F. I., ECO-PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FINE-FIBERED COTTON VARIETIES UNDER STRESS CONDITIONS IN BUKHARA REGION.....309

Niyozova N. J., Poshakhodjaeva G.D., TRANSPORTATION PROBLEM FORMULATION AND SOLUTION 312

Nurullaeva Sh.T., Saydullaeva S.A., ECONOMETRIC ANALYSIS OF INFORMAL EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....316

Nurullayeva N., Tursunbayeva D., Abduraximova R., Burxonova D., Xudoyqulov J. I., SHIRINMIYA ILDIZI (GLYCYRRHIZA GLABRA): FOYDALARI VA XAVFLARI.....327

Olimova N. I., CLINICAL, IMMUNOLOGICAL AND MOLECULAR GENETIC DETERMINANTS OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND STRATEGIES FOR PERSONALIZED TREATMENT 332

Qodirov Z. E., KLASTER TIZIMINING QISHLOQ XO‘JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORT HAJMIGA TA’SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH 338

Qosimov X.O., ANALYSIS OF WATER FACTORS IN THERISK OF SPREADING DENTAL DISEASES.....344

Quliyeva M. U., Qurbanov A.N., DORIVOR PO‘STLOQLI O‘SIMLIKLARNING FARMAKOGNOZIK TAVSIFI VA ULARDAN OLINADIGAN PREPARATLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI.....349

Rashidova N.R., IQTISODIY VA IJTIMOIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA KASBIY TA’LIM MUASSASALARIDA PEDAGOGIK MENEJMENT VA RAHBAR KADRLAR KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH 354

Rashidova N.R., ZAMONAVIY PEDAGOGIK MENEJMENT SHAROITIDA KASBIY TA’LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHNING TRANSFORMATSION MODELI VA RAHBAR KADRLAR LIDERLIK SALOHIYATI 359

Rasulova M. M., Khusanova M.N., IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF COMMISSION EXAMINATION IN FORENSIC MEDICAL EXPERT INSTITUTIONS 364

Rasulova O.N., EARLY CPAP THERAPY EFFECTIVENESS IN PRETERM INFANTS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....367

Razikova D., Saidmuradova J., SALIVARY HUMORAL AND CYTOKINE IMMUNE MARKERS IN CHILDREN WITH RECURRENT HERPETIC STOMATITIS AND CONCOMITANT ALLERGIC DISEASES 371

Safarov I.B., Norqulova S.I., DEHQONOBOD TUMANIDA EKOTURIZMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI 376

Saidova G.E., Zayniddinova I.I., BOSHLANG’ICH TA’LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDA INTEGRATSIYALASHTIRILGAN TA’LIM382

Salimova T.B., OUTCOMES OF PREGNANT WOMEN WITH DIFFERENT TYPES OF HYPERTENSION 386

Samadova Sh.I., OPTIMIZATION OF TREATMENT METHODS FOR ALVEOLITIS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 395

Samatov N., Mamajonov X., Usmonov K., SUG‘ORISH NASOS STANSIYALARIDA ENERGIYA SARFINI TAHLIL QILISH VA ENERGIYA TEJAMKOR ISH REJIMLARINI ANIQLASH 399

Samatova Y., Primova N.G'., Eshkobilova M.E., Qurbonov H.U., *PORTULACA OLERACEA L.* O'SIMLIGIDAN SUVDA ERUVCHAN POLISAXARIDLARNI AJRATIB OLISH VA ULARNING KIMYOVIY TAVSIFI.....403

Sayfullayeva S. H., SALINIZATION OF IRRIGATED SOILS AND THEIR AGROCHEMICAL PROPERTIES IN THE OLOT DISTRICT OF THE BUKHARA REGION (UZBEKISTAN) 407

Shokirova M.B., INGLIZ TILIDAGI "QORA" IDEOMLARNING LINGVOMADANIY VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI 410

Sharipov Sh.A., Abdurahmonova L.Q., YURAK FAOLIYATINING FIZIK ASOSLARI. SUN'IY QON AYLANISH APPARATLARI 414

Shermurodova R., Ziyadullayeva U., Musurmonova X., Khudoyqulov J.I., NICOTIANA TABACUM L.: MORPHOLOGICAL, PHYTOCHEMICAL, AND MICROSCOPIC CHARACTERIZATION OF LEAVES AND STEMS.....418

Shuxratov Sh. Sh., DORIXONA TARMOQLARIDA TOVARLARNI TAQSIMLASH VA LOGISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....422

Sokhibova Z.O., MORPHOLOGICAL CHANGES IN RAT LUNG TISSUE UNDER COVID-19 EXPOSURE 426

Tojiyeva O. A., GEOMETRIK SHAKLLAR TASHKIL TOPGAN NATURMORTNI TASVIRLASH JARAYONI 429

Tolibova A. E., A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR RECURRENCE OF ENDOMETRIOD CYST AND FERTILITY-SAVING TREATMENT STRATEGIES 434

Tosheva D.R., DESCRIPTION OF THE PARAMETERS FOR ASSESSING MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS USING BACTERIOLOGICAL METHODS 438

Toshmatova Z.J., MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR INTELLEKTUAL-IJODIY QOBILIYATLARINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....444

Toshpulotova I.I., ADAPTIVE MECHANISMS, NURSING CARE, AND CLINICAL MANAGEMENT ALGORITHM FOR NEWBORNS WITH HYPOTHERMIC SYNDROME: EFFECTIVENESS OF THERMOBLANKETS IN TERM AND PRETERM INFANTS.....448

Turdiyeva F. T., EKISH MUDDATINI OPTIMALLASHTIRISHNING SARIMSOQNING VEGETATIV ORGANLARINI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI 451

Tõxtayeva Sh. X., DORIXONALARDA FARMATSEVTIKA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH 455

Khilola S.U., Nuridinov A.M., LABORATORY METHODS FOR EARLY DETECTION OF THE ANTHRAX PATHOGEN AND THEIR PREVENTIVE SIGNIFICANCE 459

Umarova Sh. K., THE NECESSITY OF IMPROVING THE PRESENTATION OF LEASE LIABILITY PAYMENTS IN CASH FLOW REPORTING IN ENTERPRISES OF UZBEKISTAN 463

Usmonova R.M., ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN REDUCING WOMEN'S INFORMAL EMPLOYMENT 467

Xaitov X. Q., KORRUPSIYANING KELIB CHIQISHI, SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI 474

Xamroeva D.Sh., IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION MEASURES FOR MICROBIAL ETIOLOGY OF DENTAL CARIES 477

Xasanova G.R., Mallaeva M.M., TINCHLANTIRUVCHI DORIVOR O'SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI ROLI 481

Xidiraliyev K. E., Yo'lchiyeva N.A., SIRDARYO VILOYATIDAGI GEODEMOGRAFIK VAZIYAT: MUAMMO VA ECHIM 486

Xo'janiyazova B.X., BUXORO TUPROQ-IQLIM SHAROITIGA MOS KARTOSHKA NAVLARINI *IN VITRO* SHAROITIDA MIKROKLONAL KO'PAYTIRISH 493

Yarashova D. A., Abdumurodova Sh., KOGON TUMANIDA SANOAT KORXONALARINING FAOLIYATI NATIJASIDA YUZAGA KELGAN GEOEKOLOGIK O'ZGARISHLAR VA AHOLI HAYOT SIFATI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI KOMPLEKS O'RGANISH 497

Yarashova D.A., Fozilova M., PESHKU PAXTA TOZALASH ZAVODI FAOLIYATINING HUDUD GEOGRAFIK TIZIMLARGA KO'RSATADIGAN ANTROPOGEN TA'SIRI VA MAHALLIY AHOLI SALOMATLIGI HAMDA YASHASH MUHITI SIFATIGA TA'SIRI 503

Yuldasheva G.G., MORBIDITY PATTERNS AND CLINICAL OUTCOMES OF PREMATURE NEWBORNS 508

Yusufova L.G'., MEVA VA SABZAVOTLARNI QAYTA ISHLASH SANOATI 513

Абдиева Н.У., РОЛЬ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЭНДОМЕТРИОЗА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 520

Абдинова Г. Р., НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ 529

Абдуллаева С.Б., Турдикулова Д. С., ТИББИЁТДА АХБОРОТ ВА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ИМКОНИНИ БЕРУВЧИ ТЕХНИК ВОСИТАЛАР 541

Абдуллаева М.А.,, ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҲАЙВОНЛАРНИНГ АОРТА ПРЕПАРАТЛАРИДА ИММУН ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ УСУЛИДА CD34 ВА A-SMA ОҚСИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....547

Абдурахмонов С.У., Абдурахмонов Б.М, Исабоева Д.А., ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ.....561

Акбарова Б.Ш., ИНФЛЯЦИЯ И ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ: ВЛИЯНИЕ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС.....573

Асенбаева А.Е., ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ.....581

Атаханов Ш.Э., Нишанов Д.А., Умарова К.А., ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И АНГИОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 586

Барлыкбаев А.Ж., Нурымбетова А. Г., Пошаходжаева Г.Д., СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....597

Белалова Г.А., ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ.....606

Бердиев А.Х., ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ АГРОКЛАСТЕРАХ, ИХ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....616

Бердиева Д.А., ДОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....626

Боймирзаев А. Э., АҲОЛИНИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР 630

Боймирзаев А. Э., САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ.....636

Боймирзаев А. Э., РАДИАЦИЯВИЙ АВАРИЯЛАРДА АҲОЛИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ: МУАММОЛАР ВА ИННОВАЦИОН ЕЧИМЛАР 641

Буймов Д.В., НЕУСТОЙКА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СВЕТЕ РЕФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....646

Васильева Е.Л., Костенко А.А., ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.....653

Вафоева Н.А., НАРУШЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ ПРИ РЕВМАТИЗМЕ 658

Волошина Н.Н., Костенко А.А., ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 661

Галимова Л. Г., ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ 666

Гаффоров Х.Х., МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕТИЛВИНИЛПИРИДИНА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ .672

Гулманова Н. Б., СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРБАНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 676

Дорошев Д.В., АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 681

Дустова Н.К., Янгиева С.У., Шарипова Ф.Х., ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РЕТРОХОРИАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ (обзор литературы) 685

Жуланов И.О., Шингисов А.У., ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 692

Жумаева Ш.Б., МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТУДАКУЛЬСКОГО ОТКРЫТОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 695

Закирова И. З., ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В МИКРОГЭС 699

Зарипова О. О., ОҚАРТИРУВЧИ СУНЪИЙ ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҚЛАРИНИНГ МАНБАЛАРИ, ОРГАНИЗМГА КИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УЛАР ТАЪСИРИДА ЮЗАГА КЕЛУВЧИ ПАТОЛОГИК ҲОЛАТЛАР 703

Иброхимов К., ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 709

Игамбердиева Д.А., Кораев А.Х., ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ СЕРОЗЕМОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ 716

Исмаилов А.И., Закирова И.З., ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТРАКТОРОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ .723

Исмоилов О. И., ОДАМЛАРДА ҚОВУРҒА-УМУРТҚА БЎҒИМИ НЕРВЛАРИНИНГ АНОТОМО-ТОПОГРАФИК ТУЗУЛИШИ 727

Исмоилов О. И., АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВОВ РЕБЕРНО-ПОЗВОНОЧНЫХ СУСТАВОВ У ЧЕЛОВЕКА 731

Казакова Н.Н., Болтаева Ф.М., ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА И ИХ РОЛЬ В ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЗУБОВ 735

Калмыков Н.Н., РОССИЯ–БРАЗИЛИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ И ПРОЕКТНЫЕ ОКНА 2024–2026.....743

Калмыков Н.Н., РАННЯЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ МОБИЛЬНЫХ ПОЛЯРОНОВ: ПРИОРИТЕТ, РЕЦЕПЦИЯ И СТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ Н. И. КРИВКО, А. И. ГУБАНОВА И Н. М. РЕЙНОВА, 1959–1960).....766

Кодиров Н.Д., ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С СЕДАТИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 781

Кудешова Г.Т., Жусипбаева У.М., ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА.....788

Куйчиев О.Р., Балабанов В.И., СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 792

Маллаева М.М., ФЕНОЛЫ И ФЛАВОНОИДЫ КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА РАСТЕНИЙ 795

Мамаражабова Б.А., Шингисов А. У., ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 801

Мамаражабова Б.А., Шингисов А. У., ИНТЕГРАЦИЯ НАЗЕМНЫХ И СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ В МОНИТОРИНГЕ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОЦЕНКЕ РИСКОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 805

Махмудова М.М., МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ САМАРКАНД.....809

Мелибоева Ф.С., КЛИМАТ КОКАНДСКОГО ОАЗИСА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ.....815

Менглиева И.Б., СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ 821

Мирзаев Н., Миркомилова К., ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ВОДНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА).....825

Мусаев Н.В., СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....842

Мухамедова О.С., ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕГО ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА И ПУТИ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ТОКСИЧНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ 846

Мухтаров Р.И., Хужабаев С.Т., Дусияров М.М., СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ.....850

Наврузова Л.Х., МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ 860

Назаров Ф.Ю., ВЛИЯНИЕ МЕТИЛВИНИЛПИРИДИНА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ КОЖИ КРЫС 866

Наимова З. С., РОЛЬ ВИТАМИНОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 870

Низамов Ж.А., Мухамаджонов Б.Х., ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 876

Нуралиев Р.Т., Усманов Б. Ш., ДАВЛАТ АКТИВЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....880

Нуралиев Р.Т., Хамроева И.Н., ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ НА ПЕРИОД ДО 2026-2030 ГОДЫ 885

Олимова Н.И., КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ.....892

Раджабова Н. Ш., Абдужалилова М.А., Шермухамедов А.Б., Пошаходжаева Г. Д., СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 899

Ражабов О.А., ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И ЦИРКОНИЕВЫХ ПРОТЕЗОВ 907

Расулова М.М., Хусанова М.Н., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 913

Расулова Ш.Г., Абдужалилов Х.Б., СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.....916

Рахимбоев М., Муротов Н., ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 920

Рахматова Р., Сойибназарова Р., Хужамуратова Д.Х., СТРОЕНИЕ РОГОВИЦЫ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ КЕРАТИТАХ .925

Сагдиева Г.Ж., СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ.....929

Тайров Д.Р., ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛЕТОК СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ К КРАТКОВРЕМЕННОЙ ИШЕМИИ 937

Тожиева З., Эгамбердиева М., Рузманова Д., Саидова З., Оманова К., ОЦЕНКА ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СЕМЕЙНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ТАШКЕНТСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 941

Тургунбоев К.И., КАРАХАНИДЫ И СЕЛЬДЖУКИДЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИХ ГОСУДАРСТВ.....949

Турдиев М.Р., Сохибова З.Р., СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА БЕЛЫХ КРЫС В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДЕФИЦИТЕ ЦИНКА (Zn). 959

Узоков Д.Б., СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ.....967

Усмонова Х.К., ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СЕМЬЯ» В УЗБЕКСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА.....971

Файзуллаева Ш.Ф., Ихтиярова Г.А., ПРЕЭКЛАМПСИЯ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ *(обзор литературы)*.....975

Хабибова Н.Н., Болтаева М. М., КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....983

Хайдаров С.Н., ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ В ОРГАНАХ КРЫС ПРИ МАЛОБЕЛКОВОЙ ДИЕТЕ 991

Хайдарова З.Э., ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРИТОМ И ХОЛЕЦИСТИТОМ 995

Хайдарова Н.Б., КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ..998

Хамрокулов С.К., МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.....1006

Холмуратова Л.Б., Рузметов Д.Р., ОТРАСЛЕВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....1018

Худайбердиев А.А., Юлдашев З.Ш., МОСЛАМАНИНГ ЎРТАЧА ЭГРИЛИК РАДИУСИ ВА МАРКАЗИЙ БУРЧАКЛАРИНИ АСОСЛАШ.....1025

Худайбердиев А.А., Юлдашев З.Ш., ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ҚОБИҚЛАШ ҚУРИЛМАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ИШЛАШ ПРИНЦИПИ.....1030

Худаяров А.Б., Кадиров Ж. Ф., ВЛИЯНИЕ ЙОДНОГО СТАТУСА НА ЭНДОКРИННУЮ РЕГУЛЯЦИЮ И АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ.....1034

Худаяров А.Б., Кадиров Ж. Ф., ЙОД И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ АДАПТАЦИИ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНОВ.....1041

Шарипов Р.Х., Бурханова Д. С., Нуруллаева Э., РОЛЬ ВИТАМИНА D В РАЗВИТИИ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА.....1053

Шарипов Р.Х., Бурханова Д. С., БРОНХООБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ.....1059

Ярбобоев Т.Н., Қосимова К.Ё., Жамилов Б. Б., ГЛОБАЛ ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИ ҚИДИРИШ ВА БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР.....1064

Ярматов С.Т., ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ.....1072

Ярмухамедова Г.Х., СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА.....1075

Ярмухамедова М.К., СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В И D (HBV/HDV-КОИНФЕКЦИЯ).....1084

Ярмухамедова С.Х., ВЛИЯНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕРВЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.....1089

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.....1093

Abdullaeva M.A., Xalimova D.J., ENDOVASCULYAR TERAPIYA KONTEKSTINDA MIYA QONDIRLARI ANEVRIZMALARI. (Adabiy sharh).....1093

Achilova D.N., OPTIMIZATION OF PERSONALIZED TREATMENT APPROACHES IN PEDIATRIC RECURRENT BRONCHITIS: CLINICAL AND PATHOGENETIC IMPLICATIONS OF COMORBID CONDITIONS.....1099

Arashova G.A., CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF MEASLES INFECTION 1105

Axrorqulov Sh., Tursunova M., Bekmatova M., Hakimova X.X., HOMILADORLIK DAVRIDA XAVF OMILLARINI ERTA ANIQLASHDA AKUSHERNING ROLI 1115

Azamov E.T., ASSESSMENT OF EMERGENCY CONDITIONS IN CHILDREN WITH SEASONAL VIRAL INFECTIONS: A VITAL SIGN–BASED EVALUATION IN A TERTIARY PEDIATRIC CENTER 1119

Elmurodov Sh.K., Elmurodov K.S., ECONOMIC EFFICIENCY OF CHOOSING SURGICAL TACTICS FOR ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN PREGNANT WOMEN.....1124

Khudayberdiev A. A., Nurullayev A.B., ASSESSMENT OF HEALTHCARE COSTS AND CLINICAL BENEFITS FROM IMPROVED ENTERAL INSUFFICIENCY MANAGEMENT IN PATIENTS WITH GENERALIZED PERITONITIS IN UZBEKISTAN 1137

Khurramov A.B., ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVE OF THE SQUAMOUS PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND ITS CLINICAL SIGNIFICANCE 1151

Kurbanova N.I., EVALUATION AND CLINICAL COURSE OF DENTAL DISEASES IN PREGNANT WOMEN LIVING IN RURAL AREAS 1155

Mansurova M. X., OPTIMIZING THE TREATMENT OF CANDIDIASIS IN YOUNG CHILDREN.....1159

Matyakubova F.E., Ochilov N., THE CONTRIBUTION OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TO BACTERIAL MENINGITIS IN ADULTS.....1162

Muradova R.R., ANATOMO-HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE NERVES OF THE ORBITAL PART OF THE FRONTAL BONE IN HUMANS AND THEIR CLINICAL SIGNIFICANCE 1165

Najimov Sh.R., BOLALARDA SIGMASIMON IChAK LIMFA TUGUNLARINING ANATOMO-TOPOGRAFIK XUSUSIYaTI 1169

Nazhimov Sh.R., Daminov S.J., ON SOME HISTOCHEMICAL CHANGES IN THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ESOPHAGUS IN RATS UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS.....1172

Pardayeva U.D., Eshmurodov Sh. Sh., SIL KASALLIGIGA CHALINGAN BEMORLARNING RUHIY-HISSIY HOLATI MASALASI YUZASIDAN....1175

Rabbimova N.T., SURVEILLANCE OF THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....1179

Rasulova S.Kh., PEDIATRIC ASPECTS OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS IRRITABLE BOWEL SYNDROME 1182

Shirinova Kh. Kh., TREATMENT OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN OVERWEIGHT PATIENTS USING MODERN METHODS 1186

Turdiev M. R., Sokhibova Z. R., AGE-RELATED MORPHOFUNCTIONAL ALTERATIONS OF THE THYMUS IN WHITE RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL ALIMENTARY ZINC DEFICIENCY 1192

Usmanov A.Kh., Khakberdiev B.B., COMPARATIVE ECONOMIC ANALYSIS OF DIFFERENTIATED SURGICAL MANAGEMENT IN PEPTIC ULCER BLEEDING.....1198

Valiev N.A., ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SKIN STRUCTURE IN CHILDHOOD.....1211

Valiev N.A., ATOPIC DERMATITIS REPRESENTS ONE OF THE MOST COMMON SECONDARY DISEASES IN CHILDREN, INFLUENCED BY VARIOUS PROVOKING FACTORS 1218

Valiyeva M.U., Samiyev D.X., Musaylamov T.N., PARAZITLAR GENOTIPIK XILMA-XILLIGINING POPULYATSIYALARARO TARQALISH DINAMIKASIDAGI ROLI: MOLEKULYAR-EPIDEMIOLOGIK YONDASHUV 1225

Yusupov T.A., Salikhov D.B., ECONOMIC SUSTAINABILITY OF PRECISION-GUIDED HEMIHEPATECTOMY 1230

Yusupov T. A., Nurullayev A.B., TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN HEMIHEPATECTOMY PROCEDURES 1242

Аслонова М.Р., ПРОГРАММА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ ПРИ АССОЦИАЦИИ COVID-19 И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 1255

Бахриева З.Д., Исмоилова Х.Т., ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ И ПЦР-МЕТОДОВ В ИДЕНТИФИКАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОГЕНОВ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 1260

Бобоева У.Ф., МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ 1263

Валиева М.У., ЎЗБЕКИСТОНДА УЧРАЙДИГАН ЗООНОЗ ИНФЕКЦИЯЛАР,УЛАРГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК НАЗОРАТИ 1269

Вафокулов С.Х., Яхьяева Х. Д., СИСТЕМНЫЕ (ВНЕКИШЕЧНЫЕ) КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 1277

Вафокулов С.Х., Гайбуллаев Ш. Ф., Бобояров Р.Р., КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 1284

Ганиева Ш.Ш., Исроилова Н.И., КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 1291

Казакова Н.Н., ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА В РАМКАХ ВТОРИЧНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 1297

Курбанова Н.И., СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1306

Мурадова Р.Р., АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВОВ ГЛАЗНИЧНАЯ ЧАСТЬ ЛОБНОЙ КОСТИ У ЧЕЛОВЕКА И ИХ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1313

Мурадова Р. Р., ОДАМЛАРДА РЕШОНА СУЯГИ ҚЎЗ ҚИСМИ НЕРВЛАРИНИНГ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА КЛИНИК АХАМИЯТИ..... 1317

Мустафоев З.М., Файзуллаева Р.Н.. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧЕК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ..... 1321

Насимова И.Я., Ачилова Д.Н., РОЛЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ..... 1326

Неъматова М.Р., ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА ОСНОВЕ ДИНАМИКИ БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ 1330

Неъматова М.Р., ДИНАМИКА БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИ..... 1334

Райимов Г.Н., Отабоев И.Х., Хасанов Б.Т., ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 1338

Раймов Г.Н., Соткинов Г.А., Эгамбердиев Т.Э., АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФИЦИРОВАННОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 1342

Раймов Г.Н., Соткинов С.А., Эгамбердиев Т.Э., ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ.....1346

Раймов Г.Н., Отабоев И.Х., Хасанов Б.Т., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ В УСЛОВИЯХ УРГЕНТНОГО СТАЦИОНАРА 1350

Рустамов А.А., Жураев Ш.А., Хомидова М.Я., МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ ТИПА В КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПОСТМАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 1354

Рустамов А.А., Жураев Ш.А., Маллаев С.О., РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ 1360

Рустамова Ш. А., Зойиров Ф.Х., Рашидов Х.Н., АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (2014–2024 ГГ.) 1368

Сохибова З.Р., Жуманиёзова Д.Д., РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — СОНОЭЛАСТОГРАФИИ — В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ.....1376

Тиркашев О.С., Худойбердиева Г.Э., АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЬЮ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.....1384

Усманов А.Х., Хакбердиев Б.Б., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 1388

Ходжаева Ш.Ш., ЗНАЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ФОРМИРОВАНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПАРОДОНТА 1401

Худайбердиев А.А., Хакбердиев Б. Б., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЁННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 1409

Худайбердиев А.А.. Салихов Д. Б., КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНТЕРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПЕРИТОНИТОМ.....1422

Хуррамов А.Б., АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ НЕРВА ЧЕШУЙЧАТОЙ ЧАСТИ ЛОБНОЙ КОСТИ У ЧЕЛОВЕКА И ЕГО КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 1435

Хусанов З.Т., Бойматов Н., СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ МАКРОАДЕНОМ ГИПОФИЗА 1439

Ширинова Х.Х., МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА НА ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ ТКАНИ..... 1442

Шодиева Д.А., Бекмуродова М., Насимова Д., РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ И МЕХАНИЗМОВ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 1449

Элмуродов Ш.К., Элмуродов К.С., КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ..... 1453

Элмуродов Ш.К., Элмуродов К.С., РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЁЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 1464

Юсупов Т.А., Салихов Д.Б., ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ГЕМИГЕПАТОЭКТОМИИ 1474

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ..... 1483

Кучкаров М.М., КИНОПРОКАТ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 1483

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ..... 1492

Туйназарова И.А., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОИНДИКАЦИИ ПРЕСНОВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СООБЩЕСТВ ЛИЧИНОК НАСЕКОМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ..... 1492

Холматов Б.Т., РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В СЕКВЕСТРАЦИИ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА И АДАПТАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 1496

Ширинов К.Ж., ПРАКТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 1500

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ..... 1508

Грибова Е.Н., ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗРАБОТОК В ПРИМЕНЕНИИ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИИ НА БАЗЕ

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ФИТНЕС-КЛУБАМИ.....1508
Ким С.Г., СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.....1512

ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ИЗДАНИЕ

«Экономика и социум»

Выпуск № 2 (141) 2026
Сайт: http://www.iupr.ru
Издательство: ООО "Институт управления и социально-экономического развития", Россия, г. Саратов
Дата издания: Февраль 2025